

57

HISTORIA
PLANTAR

·TO·2·






N

3

.





(Jac. Dalechamps)

HISTORIAE

GENERALIS

PLANTARVM,



PARS ALTERA,

Continens reliquos nouem libros.

*Eodem in hac parte studio, quo in superiore ampla
Plantarum descriptiones digesta.*



LUGDUNI,

APVD GVLIELMVM ROVILLIVM,

SVB SCVTO VENETO.

M. D. LXXXVI.

Cum Priuilegio Pont. Max. Caesarex Maieft. & Christian. Galliarum Regis.



HISTORIAE

OMNIVM PLANTARVM

LIBER DECIMVS,

*In quo describuntur & ad vinum depinguntur planta omnes, quae in
asperis, saxosis, sabulosis & apricis nascuntur.*

BURSA PASTORIS,

CAP. I.



à theculis siue folliculis semen cōcludentibus, marsupiioli siue crumene aut cordis

BURSA, Pastoris.



ONTRARIAM nunc viam ingredimur. In vndis enim & aquaticis locis stirpes, quanta potuimus diligentia, vestigauimus: nunc in aridis & sitientibus indagamus, & inter saxa rimamur, hic natura non minus quàm illic vires & diuitias suas ostēdante, in quibus explicandis à vulgarioribus & notioribus ad rariores & minùs notas progrediemur. Et cui non notissima recentiorum & planta & nomenclatura Bursa pastoria, siue pera & Bursa pastoris, Gallicè *Tabouret*, & *bourse de berger*, Germanicè *Deschelkraut*, sic dicta effigiem referentibus? nullum enim aliud ei nomen Græcū Latinūve à veteribus positum fuisse sciunt herbarij. Caulis habet rotundos, lentos, pedales aut maiores, folia longa, altius incisa, irionis, aut erucæ: flores albicantes thlaspi non dissimiles, cui etiam congener est, & folliculos siue marsupiola latiuscula, in quibus semen cōcluditur exiguum, nigrum: radicem longam singularem, & cādīdam. Vbiuis copiosissima est, secus vias, vrbiū areas, locis incultis, asperis & saxosis. Iunio & Iulio mensibus floret. Calida est & sicca tertio ordine. Sanguinem efficacissimè sistit: Nec ideo refrigerare putandum, vt recentiorum quidam non rectè tradiderunt. Nam flores gustanti acrimoniae non nihil inurunt. Quare non refrigerādo, sed siccādo cogendōq; sanguinis fluxiones cohibet. Huius herba decoctum potumalui fluores, dysenterias, sanguinis excreationes reprimat, & eiusdem sanguinis ex vtero, renibus, deniq; quauis ex parte profluvia inhibet, quouis modo sumpta, ita vt scripserint quidam manu

Nonina

Forma.

Locus.

Tempus.

Dod. lib. 1.
cap. 14.

Temper.

& Vires

In cap. 150. lib. 2.
 solùm, aut quauis alia corporis parte delatam posse sanguinem sistere. Prodest, inquit Matthiolus, attrita & emplastri modo imposita, inflammationibus, & sacris ignibus. Decoquitur pluuiali aqua cum plantagine, & armenia gleba, bibiturque eius decoctum ad intestinorum difficultatem, & cruentas excreationes. Herba succus recentiora vulnera glutinat, & auribus purulentis medetur. Sistit mensium abundantiam, si eius & persicariæ decocto insideant mulieres, esturque ad idem. Denique contra omnes sanguinis fluxiones efficax est, tenui pulcicula circumlita, & in oleo frixa. Additur emplastris quæ ad capitis vulnera componuntur, & vnguentis multis.

PILOSELLA,

CAP. II.

Nomina



Ec etiam huius notissimæ herbæ meminisse, nec nomen vllum ei indidisse veteres, aiunt herbarij, quam recentiores Pilosellam appellant à copiosis pilis, quibus tum cauliculi, tum folia vestiuntur, Galli *Piloselle*. Eius genera duo reperiuntur. Est enim Pilosella maior, Germanis propriè *Nigelkraut* nominata, & Pilosella minor, Germanis *Menszerlin*, vel

Genera

Forma. *Hänselkräut* peculiariter dicta. Pilosella maior foliis est per terram graminis modo

PILOSELLA Maior,
Matthioli.PILOSELLA Minor,
Fuchsj.

sparsis candicantibus, hirsutis, oblongis, aliquantum supernè concavis, & aurem murinam referentibus: cauliculis villosis, gracilibus, palmaribus, & sesquipalmaribus: floribus luteis, aut pallidiusculis, duplici foliorum ordine: radice digitum longa, multum fibrata. Huic Pilosella altera similis est, nisi multò minor esset foliis paruis, hirsutis, altera parte candidis. In summis cauliculis flores congesti modò lutei sunt, modò rubri, modò fusi, modò varij: radix parua, fibrata. Hanc pro gnaphalio montano describunt alij & depingunt. Et si quidam Pilosellam dixerint esse Myosotidem, id est, muris auriculam, tamen longè alia est à Myosotide Dioscoridis: nam, vt reliquas dissimiles notas taceam, neq; maior Pilosella, neque minor florem

florem cæruleum velut anagallis obtinet. Pilosellam aliam maximam spectandam nobis dedit Lobellius, quam habuit Syria missam, foliis maioribus, carnosiss, densè ab imo stipatis, candore & lanugine sericeove vellere, Holocericis atrectati, hilari & specioso aspectu, incanis. Caules ternos quaternosve, quadrangulos, geniculatos, pedales emittit : radicè duriorem, lignosam, fibratam, flores videre non contigit. Hæc Lobellius. Pilosella maior montosis locis, & collibus terrenis nascitur, & agrorum herbidis limitibus: minor in aridis montibus, & locis aliis asperis, & incultis. Maio & Iunio mensibus potissimum florèt. Calidas & siccas esse Pilosellas gustus demonstrat. Habèt enim adstrictione cum exigua quadam acrimonia coniunctam, vt hoc nomine ad purificanda & glutinanda vulnera mirè sint utiles. Ferunt enim foliorum farinam id strenuè efficere. Herbarum recentis succi exprimunt ad cohibendos quartanæ febris horrores. Eodè tingunt gladiorum aciem, vt omne ferrum aliud domet, secèrque. Ferrum enim quod eius succo commaduit, tantam contrahit duritiam, vt chalybis acie respuat. Sunt qui huius herbarum radicè Maio mense effossam, siccata, & in puluerem redactam ac potam, aut in cibo datam, efficacissimum esse aduersus ramicem remedium tradunt. Pilosellæ vis est præsentissima ad calculum. Huic plantas duas & forma & facultate affines misit Myconus ex Hispania. Prior & minor passim in præ-

*PILOSELLA Maxima,
Syriaca, Lobellij.*



*TVBERARIA Maior,
Myconi.*



*TVBERARIA Minor,
Myconi.*



tis reperitur, & terrenis locis pinguibsq; , folia habet plantagini similia, sed multò minora, humi repentia. villosa: caules dodrantes, rotundos, inanes, hirsutos, in quibus per intervalla folia sunt bina, exigua, caulem ambientia, minora iis quæ circa radices humi iacent: in caulium vertice flores luteos, in quorum medio purpureum quiddam est in nigrū vergens: semen in exiguo folliculo dilapso flore statim conspicitur, radix admodum parva est, tenuis, nonnihil fibrata. Tota herba hirsuta est: totius etiam sapor adstringit cum siccitate. Castellani eam *Terna Turnera* vocant, id est, Herbam Tuberariam: quoniam ubi illa crescit, tubera frequentissimè reperiuntur. Quæ si veteribus cognita fuerit, eam esse suspicatur Myconus, quam apud Athenæum Pamphilus hyduophyllum vocat, quia sæpissimè tubera demonstrat: vnde nomen Tuberariæ ei, quæ hic picta est, à Castellanis inditum. Altera à Mycono Tuberaria maior dicta, quod foliorum & florum figura, hirsutia, & facultate superiori sit similis, magnitudine tantum distans, in locis siccis nascitur, & vix à terra sese attollentibus: caules multos fundit, subhirsutos, rotundos, in quibus folia sunt per intervalla, caulem amplectentia, minora iis quæ humi repunt. In caulium summitate flores visuntur lutei: deinde semen folliculo inclusum. Radix lignosa per summa cespitum spargitur. Tota herba aliquantum pilosa est, cuiusque sapor adstringens, maioris quam superior efficaciam.

ANCHUSA, CAP. III.

Nomina

De morb. mulieb.

Lib. 3. c. 42.

Lib. 7. c. 17.



ΓΧΟΥΣΑ similiter Latinis Anchusa dicitur, Officinis Alcannæ radices, Gallis *Orcanette*, Hispanis *Soagem*, Germanis *Kooloschenzung*. Hippocrates *χεδιάλα την μικρήν*, & *χελιάδα την μεγάλην* nominat. Galenus in glossis *την ἄγχουσαν* interpretatur, atq; sic etiam appellari scribit. Paulus anchusam quæ spinosum, & latum, & nigrum folium habet *χοιροσπέλεθρον* appellari dicit, & alibi anchusam cherospelethron, onoclea esse ipse exponit, significat autem hæc vox iugerum porcinum. Verbum Græcum *ἀγχουσιζεν*, quod

ANCHUSA Prima,
Matthioli.Genera.
Lib. 4. c. 23.Lib. 6. sim.
Li. 22. c. 20.
Lib. 4. c. 23.
Forma.Pet. Pcn.
in Adu.
In Theria.

est fucare & colorare formam, huic herbæ nomen fecit, ob radices sanguineum floridumve colorem, insignem nimirum eius raritatem; hanc in aliis plantis coloris notam, cuique anchusarum cognitione acceptam referre debemus: vix enim innotuissent tum propter magnam cum echii, lycopside, buglosis similitudinem, tum propter incertam, & minùs perspicuam foliorum in Dioscoride delineationem, ut dicemus. Is tria anchusæ genera facit. Vnam quæ alio nomine Calix, & Onoclea appellatur, alteram quæ Alcibiadion, & Onochiles, tertiam huic haud dissimilem. Galenus his quartum genus addidit, lycopsim. Plinius Pseudanchusam. Anchusa prima, ut describit Dioscorides, folia habet lactuca, in acum fastigiata (sic vertit Ruelius, cum tamen Græci codices, & Oribasius habeant, *ὅμοιόν τῃ λαχύνῃ* θρίδαχι τῇ ὀξυφύλλῳ παραπλήσια, id est, folia habet lactuca, cui acuta sunt folia, similia quod nonnullis accipiendum videtur de lactuca agresti, quæ hirsutior est, & horridior. Etiam Nicander lactuca foliis Anchusæ folia comparat hoc versu.

Δὴ γὰρ οὗτ' ἀγγέλλουσιν θρῆνακινίδιαι λέγειο χαίτην.

Id est, sumito Anchusæ similem lactuca comā) hirsuta, aspera, nigra, multa (additur in veteri codice *μεγάλη*, id est, magna, & ita Oribasius habet) quoquo uersum à radice per terrā sparsa (*προσπεπλεγμένα τῇ γῇ* dixit Dioscorides folia anchusæ, quam similiter Theophrastus in iis numerat, quæ *ἐπιγείφυλλα* vocat, id est, folia per terram spargentia, Gaza ab radice foliata conuertit) spinosa. Radix est digiti crassitudine, quæ æstate provenit, ac manus inficit sanguineo colore (Ruellius sic interpretatus est Græca, ut leguntur in vulgatis codicibus, *τὴν χροὴν ὕψαιμος ἐν τῷ θέρει γενομένην, καὶ ἐάπτου τοῦ χύσας*, legendum, ἐν τῷ θέρει γενομένην: Plinius legisse videtur siue apud Crateum, siue apud Dioscoridem: *ἢ ὅτι ῥίζα δακτύλου ἐπ' αὐχὸς τὴν χροὴν ὕψαιμος, ὡς πᾶν πῦρον χύσμεν, καὶ βλάπτει τοῦ χύσας*, quæ in veteri codice And: Lacu. sic legi affirmat, *τὴν χροὴν ὕψαιμος ἐν τῷ θέρει γενομένην, καὶ βλάπτουσι τοῦ χύσας* Quod est, quæ per æstatem gustata colore sanguineo suffunditur manūque tingit, &c. Quæ lectio, inquit, ille, alteri præstat. Nam dicere Anchusæ radicem provenire tantum æstate, videtur ineptum, cum omnes omnium plantarum radices proveniant quavis tempestate. Marcellus ex antiquissimi codicis fide, pro *γενομένην* inauravit *γινσκομένην*, ut intelligat Dioscorides non toto anno, sed æstate tantum hanc radicem eo colore esse, tuncque dignosci & deprehendi certò posse. Sed & vulgata lectio Latine sic reddi potest, sanguinei coloris æstate fit, & manus inficit.) Nascitur in pinguibus locis. Eam ex Matthiolo sic expressimus. Anchusæ altera quam aliqui Alcibiadion, vel Onochiles vocarunt, à priore distat, quod minora folia habeat, sed aspera similiter: ramulos tenues, in quibus flos purpureus in puniceum vergens (sic interpretatur Ruellius *ἀνθος πορφύρεδες ὑποφαινούζον*, id est, flos purpureus subpuniceus. Oribasius legit, *ἢ χωνεύειν*, id est, aut puniceus) radices rubras, benè lōgas, quæ circa messes sanguineum succum habent. Gignitur in arenosis locis. Est etiam ex Matthiolo hic appicta. Item tertia quæ secunda similis est, nisi q̄ florem minus puniceum habeat. Plinius de tribus Anchusæ generibus diuersis in locis scribit. De prima hæc. Et Anchusæ radix in usu est, digitali crassitudine. Finditur papyri modo, manūq; inficit sanguineo colore. De altera verò sic tradit. Est & alia herba proprio nomine Onochiles, quam aliqui Anchusam vocant, alij Architelion, alij Onocleam, aliqui rhexiam, multi Anchusam, paruo frutice, flore purpureo, asperis foliis & ramis, radice melsibis sanguinea, cæterò nigra, in sabulosis nascens. Et mox addit etiam de tertia Est & alia huic similis, flore rubro, minor, & ipsa ad eodē usū. Pseudanchusam verò primæ Anchusæ subiungit. Est & alia similis, Pseudanchusæ ob id appellata, à quibusdam verò Enchusæ, aut Doris, &c. Cum Anchusæ primæ florem cæruleum in puniceum vergentem tribuant herbam, secunda

Lib. 7. hist. cap. 9.

ANCHUSA II. Matth.



& tertiæ huic simili florem purpureum, aut subpuniceum, lycopsidi quæ etiam Anchusæ generibus adnumeratur, purpurascens, id quod hic ex Dalecham-
pio proponimus, ab omnibus his generibus floris luteo colore diuersum statuen-
dum est. Nascitur in sabulosis propè Lugdunum, & qua Lugduno itur Va-

Li. 22. c. 20.

Ibid. ca. 20.

Ibidem.

Li. 22. c. 20.

Locus.

ANCHUSA 111. Matth.

Forma.

Vires &
Temper.
Lib. 4. c. 23.

lentiam Allobrogum, in aridis campis circa D. Ramberti pagum, radice longa, crassa, sanguineo succo manus ringente, foliis Onoclea, hirsutis, circa radicem multis, caule pede altiore, lanuginoso: flore oblongo, cauo, luteo, digitalis simili. Describitur etiam à Pena Anchusa lignosior, angustifolia, omnium minima, & vix Anchusa habenda, inquit, ut cuius radix nihil aut parum sit purpurea, fundens cauliculos sesquipalmes, lignosos, satuireæ: foliola oblonga, Alcibiadij Anchusæ minora, minusq; hirsuta: flores non multum absimiles, pusillos, cæruleos. Hæc radix lignea est, ex fusco rufescens parum aut nihil inficiens. Marginibus agri Frontignani, & Valenæ silvæ hæc interdum occurrit. Non omnes Anchusæ iisdem facultatibus viribusque præditæ sunt. Primæ radix adstringendi vim habet, inquit Dioscorides, faciens ad ambusta & vetera ulcera cum oleo & cera cocta: erysipelata cum polenta imposita sanat, & vitiliginis & lepras cum aceto admota. Eadem apposita fœtus detrahit.

ANCHUSA Lutea,
Dalechamp.*ANCHUSA* Lignosior,
Pena.

L. 22. c. 20.

Ad decoctum ipsius datur ictericis nephriticis, splenicis, febrientibus quidem cum aqua mulsa. Folia aluum sistunt cum vino pota. Utuntur vnguentarij radice ad spissanda vnguenta. De eadem hæc Plinius, Sanat ulcera in cerato, præcipue

cipue senum, item adusta. Liquari non potest in aqua, oleo dissoluitur, idq; sinceræ experimentum est. Datur & ad renum dolores drachma eius potui in vino: aut si febris sit, in decocto balani. Item iocinorum vitiis & lienis, & bile suffusis. Lepris & lentigini illinitur ex aceto. Folia trita cum melle & farina luxatis imponuntur, & pota drachmis duabus in mulso aluum sistunt. Pulices necare radix in aqua decocta traditur. In quibus Plinius vlcera senū dixit, quæ Dioscorides παλαιοί, idest, vlcera antiqua: deinde balani decoctum pro aqua mulsa: mox lentigini vox supposita est pro vitiligini. Dioscorides enim habet ἄλφες ἢ λέπρας, idest, vitilignes & lepras: postremo cum mulso dixit, pro vino. Cæterum quod Dioscorides dixit vnguentarios radice Anchusæ vti ad spissanda vnguenta, Plinius de vnguentis tractans ad colorem retulit his verbis. Tertius inter hæc est colos à multis neglectus: huius causa adduntur cinnabari & Anchusæ, &c. Secundæ Anchusæ vis foliorumq; ipsius est, eodem Dioscoride auctore, vt demorsis à serpentibus, & maximè à viperis auxilietur, siue edantur, siue bibantur, siue adalligentur: & si quis manducata in os serpentis inspuat, ipsum occidet. Eadem Plinius, atque alia quæ Dioscorides non habet, tradidit. Efficax, inquit, contra serpentes, maximèq; viperas, & radice, & foliis, & quæ cibo ac potu. Vires habet melsibus. Folia trita odorem cucumeris reddunt. Datur in cyathis tribus vulua procedente. Pellit & tineas cum hyssopo: & in dolore renum aut iocinoris ex aqua mulsa, si febris sit: sin aliter, ex vino bibitur. Lentigini ac lepris radix illinitur: habentes eam à serpentibus feriri negantur. Tertiæ Anchusæ semen manducatum, vt Dioscorides tradit, si quis in os serpentis expuerit, ipsum necabit: radix acetabuli mensura cum hyssopo & nasturtio pota latos lumbricos expellit. Plinius, est alia, inquit, huic (secundæ Anchusæ sub.) similis, flore rubro, minor, & ipsa ad eosdem vsus: traduntque commanducata ea, si inspuatur, mori serpenterem. Galenus verò enucleatius & magis distinctè, vt solet, vires omnium sic declarat. Onoclea radicem habet simul adstringentem & subamaram, corporibus condensandis, & modicè extenuandis idoneam, tum abstergēdis quoq; & ablueendis biliosis & salis succis. Dictum est enim suprā, quod qualitas acerba mixta amaritudini ea præstare queat. Sic sanè aurigini, & lienosis, & renum affectibus est vilis. Sed & refrigerare idonea est. Et sanè cum polenta illita iuuat erysipclata, & abstergit non modò epota, sed & foris imposita. Proinde vitilignes & lepras sanat cum aceto. Ac radicis quidem hæc opera sunt, & operum facultates, quas diximus. At folia ipsius herbæ radice quidem sunt imbecilliora, non tamen aliena sunt à resiccatione, & adstrictione: itaque etiam profluuium sanant pota cum vino. At Onochili & Alcibiadij cognominatæ vis magis est medicata. Nam & gustu protinus maiorem habet acrimoniam, & eos qui à viperis morfi sunt, admodum iuuat, tum illita, tum suspensa, tum esā. Reliqua verò quæ parua est, & ferè nomine caret, ferè ex illis sola Alcibiadio quidem persimilis est, verum & amarior, & magis medicamentosa, ac proinde ad latos lumbricos idonea, oxybaphi mensura, cum hyssopo, & nasturtio pota.

Cornar.
Embl. 21.
lib. 4.

Lib. 13. ca. 4.

Ibidem.

Li. 22. c. 20.

Ibidem.

Li. 22. c. 20.

Li. 6. simpl.

Nomina
Li. 6. simpl.
Li. 4. ca. 24.

EST Lycopsis Galeno anchusæ quarta species. Hanc etiam anchusam vocari testatur Dioscorides. Dicta autem est Lycopsis ob radicis fuscum ex purpureo colorem, quasi fuscado, seu obscuritas quædam, qualis est summi diluculi, & primæ lucis, quæ ortum solis præcedit, vel vespertini crepusculi, vulgo nostro, *Entre chien & loup*, nominata: Græcis *Λυκόψος* à lupo, cuius color cinereus est, nigrorem præferens, sed non intensiorem, nisi si quis ab hispida caulis, foliorum, & florum, impexaq; hirsutie, pedem lupinum referente, herbam Lycopsin nuncupatam fuisse malit. Multi, inquit Ruellius, Lycopsin hanc esse putant, nec abs re, quam vulgus herbariorum appellat Linguam canis, Horum sententiam refellit Matthiolus, quod Lycopsis, vt describit Dioscorides, folia habeat lactucæ similia, longiora, asperiora, crassa & latiora, circa radicis caput prolapsa, caulem longum, rectum, asperum, propagines multas emittentem, cubitales, asperas, & in iis flores paruos, purpurascens, radicem rubram, Linguae canis autem radix candida sit, non rubra: folia læuia, non aspera, sursum spectantia, non ad terram recidentia, caule molli, non scabro. Sed aliam genuinā, videlicet Dioscoridis Lycopsin ipse, nec depinxit, nec descripsit, ait duntaxat se credere Lycopsin herbam esse anchusæ non absimilem, quam ideo non temerè Galenus & Aetius eum secutus in anchusarum genera retulerunt, seq; Lycopsin legitimam vidisse sapius in campestribus, siccantibus, aridissq; locis enatam, anchusæ adeo similem, vt vix ab ea discerni possit. Lonicerus Lycopsin aliam hinc depictam siluestris videlicet buglossi speciem descripsit. Nascitur, inquit, in campestribus: caulibus longis, hirsutis: floribus purpureis: foliis lactucæ, longioribus, asperioribusq;: circa radicem recidentibus, adnatis in summo multis. Denique echio similis est, nisi quod omnia minora habet. Periti herbarij longè aliam Lycopsin ostendunt, eam scilicet herbam, quam Matthiolus verum Cynoglossum esse censet, vt fusiùs alio in loco diximus. Radix Lycopsidis adstringit, inquit Dioscorides, cum oleo im-

Lib. 3. c. 89.

Ca. 24. li. 4.

Li. 4. ca. 24.

Forma.

LYCOPSIS Loniceri.



Pet. Pen. in
Ad.

Lib. de pl.
quæ invm-
brof. &c.
cap. 27.
Li. 27. ca. 11.

Li. 6. simpl.

posita vulnera sanat: cum polenta verò erysipelata. At si cum oleo trita illinatur, sudores mouet. Plinius, Lycopsis, inquit, longioribus quam lactuca est foliis, crassioribusq;: caule longo, hirsuto, adnatis multis, cubitalibus: flore paruo, purpureo. Nascitur in campestribus. Illinitur cum farina hordeacea igni sacro: sudorem in febribus mouet, succo aquæ calidæ admixto. Hæc Plinius ferè ex Dioscoridis sententia. Galenus verò, Lycopsis, inquit, refrigerat & desiccatur, magisq; quam onoclea adstringit.

ECHIVM,

CAP. V.

Nomina

EXION, *ἄλκιβιάδιον*, & *ἄλκιβιον* Græcis, Apuleio *ἡνερίδιον*, & *ἐχιδνιον*, Latinis Echium, Alcibiadium, & Alcibion, Serpentaria, & Viperina. Vulgus herbariorū siluestre Buglossum vocat, quod sequentes Germani *Wuldochsenzungen* appellant, Galli *Borache sauuage*, l'herbe aux vipères,

viperes, l'herbe aux serpens. Dictum est Echium teste Dioscoride, quòd semina habeat viperino capiti similia, quo indicio sagacissima natura homines commonefaceret herbam hanc aduersus viperarum & ceterarum venenatarum bestiarum morfus salutarem esse. Alcibiadion autem siue Alcibium ab inuentore Alcibio, vt scribit Nicander. Is enim cùm dormiens in extremo inguine à vipera ictus esset, excitatus à somno succum huius herbæ commanducando, palato & dentibus expressit, hausitque in corpus, mansæ verò herbæ reliquum vulneri imposuit contra dolorem: quo medicamento sanus euasit. Sed quum Dioscorides Echium vocari Alcibiadion scripserit, Nicander etiam Alcibium, mirum est Plinium dixisse Alcibiadium, qualis esset herba apud auctores non reperi. Sed radicem eius & folia trita ad serpentis morsus imponi & bibi iubent, &c. Echij vnus duntaxat meminit Dioscorides, Plinius duorum eius generum his verbis. Echios vtriusque generis Pulegio similis, foliis coronata, drachmis duabus ex vini cyathis quatuor datur. Item altera, quæ lanugine distinguitur spinosa, cui & capitula viperæ similia sunt: hæc ex vino & aceto. Hæc Plinius Nicandrum fortasse imitatus, qui Echium vnum facit spinoso folio, simili Anchusæ, parua & modicè in terram descendente radice. Alterum foliis & semine viride, & alterum, modico circum flosculo, purpurea specie: cui semen est viperæ forma, durumque supernè caput. Quo loco Nicandri Scholiastes Numenium citat, qui in Theriaco duo etiam Echij genera fecerit: vnum minus, Ocimoides nomine, quòd folia ei sint Ocimo similia. Sunt etiam herbarij qui Echij plura statuunt genera, vt dicemus. Echium Dioscoridis folia habet oblonga, aspera, aliquantum tenuia, Anchusæ proxima, minora tamen, subrubra & pingua, spinulas tenues incumbentes, quæ etiam folia exasperant: cauliculos tenues, multos, & ab his vtrinque foliola minuta, expansa, nigra, in summo caule proportionè minora: flores iuxta folia purpureos, in quibus semina capituli viperarum similia insunt. Radix digito tenuior est, & subnigra. Hæc herba Plinij Pseudanchusæ videtur esse. Sic enim is de ea scribit. Est & alia similis (Anchusæ) Pseudanchusæ ob id appellata, à quibusdam verò Anchusæ, aut Doris, & multis aliis nominibus, lanuginosior, & minùs pinguis, tenuioribus foliis & languidioribus, &c. Echium hîc ex Matthiolo depictum vbique ferè prouenit, in aridis præsertim & asperis locis, secundæ Dioscoridis Anchusæ non absimile. Flores profert in rubrum purpurascens inter minuta folia, ab medio caule ad summum, è quibus semen prodit nigrum, hirsutum, spinosiusque inuolucris inclusum, viperarum capitibus simile. Lonicerus vulgare Buglossum, quo officinæ vtuntur, Echium Dioscoridis esse putat, describitque his verbis. Folia circa terram enascuntur, oblonga, tenuia, asperaque, cuiusmodi etiam in Anchusæ conficiuntur, aliquanto tamen minora, & crassa: caules vtrinque à terra foliis tenuibus, pennatis, linguæ similitudine in acutum exeuntibus, versus caulis summitatem minoribus sunt vestiti. Flores habet purpureos, stellatos, qui in cæreulos tandem mutantur. Semen flore decedente inuenitur rugosum

In Theria.

Lib. 17. c. 6.

Lib. 4. c. 24.

Li. 25. c. 9. Genera.

In Theria.

Li. 4. c. 25. Forma.

Li. 22. c. 20


Locus.

Tomus 2. cap. 73.

ECHIVM Matthioli.



& longius



ECHIVM montanum
Dalechampij.



Cap. 102.

Locus.



Vires.
Lib. 4. c. 25.

Lib. 5. fm.
cap. 20.

& longiusculum, cuiusmodi in symphyto, sed maius forma caput serpentis referens, gustu dulce. Porro alias duas Echij species idem addit, quibus forma ferè similis est, ac folia Echij superioris similitudinem referunt, in altero tamen minus hirsuta: flore cæruleo, quas Echij siluestris nomine appellat. Id cuius folia sunt magis hirsuta, Echium est à Fuchsio descriptum, & depictum. Hic quoque depictam plantam herbarij Echium montanū vocant, alij Alopecurum montanum. In montium vdis recessibus gignitur, radice crassa, sensim gracilescente, nonnihil surculosa: caule singulari, terete, rubro, tenero, pedali: foliis Echij, sed non ita asperis, hinc inde è caule prodeuntibus, & eum circumuestientibus, in vertice densius confertis ac stipatis caudæ instar: flore pallido, oblongo, vasculi instar, in caulis cacumine è mediis foliis sese proferente, tenuibus filis geminis præpilato. Rara quidem certè & aspectu pulcherrima hæc est planta. Echij radix, auctore Dioscoride, non modò mōris à serpentibus cum vino pota auxilia-

tur, sed etiam eos qui præbiberunt conseruat ne seriantur. Idem præstant folia & semen. Sedat dolores lumborum, & cum vino aut sorbitione sumpta lac attrahit. Hæc Dioscorides. Ex quibus colligere licet Echium calidum esse, citra tamen insignem siccitatem, quod lactis procreatricem facultatem habeat. Medicamenta enim Galeno auctore, quia pituitosos humores calfacientia in sangu-

in sanguinem vertunt, lac gignere solent. Galenus in libris simpl. medicamentorū Echij nō meminit, sed Paulus ex Dioscoride his verbis. Echium spinosa herba est, quæ non modò à serpente demorsis cum vino pota auxiliatur, sed præsumentes quoque percuti non patitur. Plinius Pseudanchusa, quam Echium Dioscoridis videri diximus, easdem ferè vires tribuit. Radix, inquit, oleum nō fundit, sed rubentem succum, (Cornarius ex vetere codice emendat, Radix in oleum non fundit rubentem succum: vius contrarium paulò antè de vera anchusa dixit, sanguineum scilicet fundere succum, & oleo dissolui, aqua verò non posse liquari. Quidam legunt: Radix illius non fundit rubentem succum, &c.) Et hoc ab anchusa discernitur. Contra serpētes efficacissimā, potu foliorum, vel seminis. Folia icibus imponuntur: virus serpentium fugat. Bibitur & propter spinam. Cornarius ex veteri codice legit, Virus serpentes fugat: quòd de odore eius dum sufficit, intelligit. Quod verò dicit, Bibitur & propter spinam, videtur id esse quod Dioscorides ait, Πένυ καὶ ὀσφύος ἀλγύμενα. Sedat & lumborum dolorem.

Embl. 23.
lib. 4.

libidem.

ONOSMA,

CAP. VI.



NOSMA Græcis Latīnq; dicitur, & Galeno teste Osmas, vel Phlomis, vel Ononis. Folia habet, inquit Dioscorides, similia anchusæ foliis, longitudine quatuor digitorum, latitudine vnus, per terram instrata, simillimo anchusæ modo. Est autem sine caule, sine flore, sine semine. Radix subest oblonga, infirma, tenuis, modicè rubra. Nasctur in asperis

Nomina
Li. 8. simpl.
Lib. 3. c. 190.
Forma.

Locus.
Li. 27. ca. 12.

ONOSMA, Matthioli.



locis. Eadē ferè Plinius habet. Onosma longa folia habet ferè ad tres digitos, in terra iacentia, tria, ad similitudinē anchusæ incisa, sine caule, sine semine, sine flore. Ex qua delineatione nullus est rei herbariæ peritus qui nō coniciat Onosma in anchusis habēdum esse, & Lycopsidi, cognatum, quemadmodum & pictura ipsa demonstrat. Folia eius, inquit Dioscorides, in vino pota factus extrahunt: pragnans si supergrediatur abortum illi facere dicitur. Eadē Plinius tradit. Pragnans si edat eam aut supergrediatur, abortum facere dicitur. Constat enim, vt scribit Galenus, ex acri & amara substantia: quare creditur fœtus necare, & elicere, foliis eius in vino potis.

Vires.
libidem.
Li. 26. ca. 12.
Li. 8. simpl.

SCABIOSA MONTANA,

CAP. VII.




OMEN Scabiosæ de multis plantis dici sciunt herbarij, vt & de iis quæ hîc depinguntur, vt de ea quam montanam & capitatam cognominant. In terrenis collibus alpinis prouenit, radice crassa, nigra, valde fibrata, sic se crassiori aduoluentibus radiculis aliis, vt in mali figuram quandoque rotundentur, foliis centaurei minoris aut erucæ, crassis, asperis, laciniatis, caule cubitali, interdum proceriore: capitulis cyano aut centaureo magno similibus, squamosis: flore puniceo purpurascēte: semine oblongo, papporum molli lanugine obuoluto. Scabiosam aliam maiorem vulgarem pinxit Lobellius, Pena descripsit verbenæ Dioscoridis similem, sed latioribus foliis, pullis, hirsutis, in terram procumbentibus, & altioribus incisuris, nec tam Verbenam quā maiore Valerianam exprimentibus. Radix simplex, longior caulem sæpius singularem,

Nomen.
Locus.
Forma.

SCABIOSA Montana,
Dalechampij.Scabiosa
peregrina,
Lobellij.Pena in
Aduers.

quantum ferrata: flores Globulariæ aut Scabiosæ. Non omittenda hæc pictura à Lobellio posita Scabiosæ raræ & peregrinæ elegantia, quæ hætenus incognita non nisi in hortis quibusdam Belgicis spectatur, facie & virgultis Valerianæ rubræ, sed floribus & semine Scabiosæ Hispanicæ. His adiecit Pena Scabiosam omnium mi-

SCABIOSA Peregrina,
Lobellij.*SCABIOSA Maior vulgaris,*
Pene. & Lobellij.

nimam

SCABIOSA *Montana, omnium minima, Pena.*



nimam, quæ in montibus cretaceis & incultis provenit, cauliculos habens paucos, sesquipal-mum pedémve altos, foliis in imo sæpius dona-tos, angustioribus, floribus dilutæ purpuræ è squamosis capitulis. Alias plantas hîc adscri-bemus, quas Clusius ad Scabiosas seu laceas re-ferendas putat: quarum primam & secundam Salmantieensis Stœbes nomine donarunt. Pri-ma laceæ nigrae similis folia per terram expan-sa habet, Scabiosæ, laceæq; foliis latiora, ad ci-chorij folia accedentia, mollia, lanuginosa, & interdum candicantia: aliquot ex eadem radice caules, cubitales aut ampliores, multis alis bra-chiatos, quibus inhaerent minora minusq; dif-fecta, & mucrone quodammodo spinoso, spi-nosa folia: flores in summis ramis villosos, pur-pureos, è calicibus squamosis, semen subtrū-fum, cœtaurij maioris æmulū, sed minus. Radix est longa, candida, digiti interdū crassitudine. Huius generis aliam inueniri tradit omnibus foliis mollibus & lanuginosis, & erucæ modo laciniatis, caule infirmo, ramoso, & in terram procumbente, cuius flores superioribus maio-

Lib. 2. stirp.
Hist. p. ca. 38.

res, barbulis exterioribus cyani æmulis, sed purpureis, villi quibusdā luteis inter-mixtis, medium florem occupantibus: semen superiori simile, vel cyano: radix digi-talis, candida. Secunda numerosa promit folia, secundū radicem, humi sparsa, in-cana, oblonga, magnis & profundis incisuris, vt in nōnullis Scabiosarū generibus

SCABIOSA, seu Stœbe
Salmantica prior, Clusj.



STÔEBE *Salmantica
altera, Clusj.*



SCABIOSA Hispanica,
Clusij maior.

q̄ extrema folia vtrumq̄ acuminata sint: sed & alterā prioris generis ad cyanos referēbāt, altera etiā pro Scabiosa vtebātur. His addit Clusius Scabiosam Hispanicā, quę vulgaris Scabiosę folia similia habet, laciniata, & altē incisa, mollia, lanuginosaq̄: caules rotundos, nodosos interdum cubitales, ē quorum geniculis folia bina

aut eruca: caules plerumq̄ cubitales, locis autē frigidioribus & humidioribus bicubitales, aut maiores, in frequentes ramos diuisos, folia per ramos sparsa, altē quidem incisa, vti ea quę ad radicem nascuntur, sed minora multo & breuiora, & in molles quosdam aculeos desinentia: ramorū fastigio insident caliculi argenteis veluti squamis cōpacti, vnde flos exilit cyani forma, sed purpurę dilutioris, & medio villosus: semen lanugine quadam includitur vt in lacearū generibus, exiguum, nigricans, summo capite villosum: radix singularis, crassa, & nonnūquam fibrata. Alia autem in hortis Belgicis alitur semine ē Gallia misso, huic aded similis, vt ab ea, nisi à peritioribus vix dignosci possit: etenim folis caliculis, qui tam eleganti argenteo colore non splendent, secernitur. Nascuntur omnes præter postremam, Salmanticēsi agro frequentes in aruorū & vinetorū marginibus. Postretum in Gallia, tum in Viennensi agro copiosē. Florent omnes Iunio, Iulio, Augusto: deinde semen proferunt. Salmanticenses, vt diximus, priorem & alteram Stœbes nomine appellabāt,

SCABIOSA Montana calidarum
regionum, Lobell. & Pen.*SCABIOSA Media,*
Lobellij.

inter

inter se opposita: summis ramis capitula insidēt ex multis caliculis membranceis & paleaceis cōposita, qui singulos flores continēt candidātes, quibus deciduis, in medio quasi singulorū caliculorū vmbilico, exigua quædā stella subnigra cōspicitur, quatuor, quinq̃, aut sex radiolis constans: paulatim verò hi caliculi excrecentes expāduntur, donec semen hirsutū & crassum (quo caliculi sustinētur) maturefcere incipiat: radix cādida, crassa, vulgari similis. Alia inuenitur, inquit Clusius, huic perimilis, & sola magnitudine distās: est enim per omnia minor, foliisq̃ tenuius incis: caliculi & flores minores, & ex caruleo colore purpurascētes. Crescit vtrāq̃ iuxta vinearū margines & semitas, locisq̃; incultis agro Salmanticensi & per reliquā Hispaniam. Florent mense Iunio. Amara sunt, ideoq̃; caloris & siccitatis participes.


SAXIFRAGA,

CAP. VII.



VLTIUS plantis Herbarij Saxifragæ, Officinis Saxifragiæ dictæ, nomen imposuerunt, à mirifica in comminuendis frangendisq̃; calculis vi & efficacia. In quibus quædam sunt veteribus Græcis, Latinisq̃; fortassis incognita. Sed de Dioscoridis Saxifraga primum tractabimus. Saxiphagō, inquit, aliqui Sarxiphagō, vel, vt in vulgari Græcis legitur, Sarxiphragon, aliqui Sarxiphrangon, alij Empetrum, Romani Saxifragam vocant, frutex est furculosus, in petris & asperis locis nascens, epithymo similis. Coctus in vino mox potus febricitantibus opitulatur: stranguriæ prodest, singultum sedat, calculos vesicæ frangit, & vrinam ciet. Huic tum facie, tum viribus tam aptè cōuenit, quæ hīc

SAXIFRAGÆ Vera, Diosc.



ex Matthiolo appicta est, vt genuinā esse nemo nunc dubitet. Nam in aridis, montosis, saxosis, sterilibus & sabulosis Italiæ, Delphinatus, Galliæ, Angliæ locis, vbi Polium montanū & Thymum, prouenit: ramulis in summo sparsis, pedē altis, multis, crebris exilibus, serpilli, in imo cōtortis vnā & implicatis, geniculatis, in quibus foliola bina ex geniculis, in summo longiora & angustiora, Tunicæ: in singulis singuli flosculi, oblongi, quadātenus Tunicæ, summa ora fimbriati, vel apiculis tenuibus crenati, vbi semen subrubrum, rotundū, exiguum. Radix est parua, non multis fibris huc illuc sparsis capillata, albicans. Huic magna est cum epithymo similitudo: Matthiolus tamen non τῷ ἐπιθυμῷ, sed τῷ θυμῷ in quibusdam codicibus legi ait: quam lectionem magis probat, & Saxifragam thymo adeò similem esse scribit, vt nisi gustata ab eo discerni possit. In quibusdam codicibus neutrum legitur. Sed nec totum caput Dioscoridis esse multi putant, idq̃; inter notha reiecerunt. Aliis non videtur esse adscititium, cum in omnibus

ferè exemplaribus Græcis habeatur. Eandem Saxifragam copiosam nasci, ait Pena, Iulio & Augusto, in accliu, cretaceo, & arido monte inter Chipnam & Malburgū Angliæ, Bristolienſi à Londino via, sed variare floribus, qui longè sunt minores, albidī, non secus ac tota planta. Aliud Saxifragæ genus tradit Matthiolus, quod folia in caulibus per interualla habet, parua, longiuscula, vtrinque singula, comitātibus aliis longè minoribus, multis simul ex eadem origine procedentibus, quæ in cacumine numerosiora sunt, & breuioribus interuallis distincta. Flores promit in summis caulibus purpureos, odoris nō iniucūdi. Præter has duas Saxifragas, alia tria ge-

Nomina


Forma.

Pet. Pen. in Ad.


SAXIFRAGA Anglica, Pen.

nera Matth pinxit, quæ ad frangēdos educendosq; renū calculos plurimū valēt. Primū illud est quod in prima Latinorū Commētariorū editione Dioscoridis Saxifragā esse suspicabatur. Nascitur inter magnos ac durissimos lapides, aut sicco & admodum extenuato solo, foliis capillaceis fœniculi modo, sed longioribus, tenuioribus, rarioribus: caule similiter fœniculaceo, tenui, umbella in summitate: semine vulgaris petroselini, sed longiusculo, odorato: radice albicante, pastinacæ sapore. Tota planta, subacris & subdulcis. Secundum genus est Saxifraga alba seu maior, de qua paulò post ex Fuchsio & Dodonæo dicemus. Tertium genus, tum à forma, tum ab affectu Saxifragam maiorem appellat à Colzolario pharmacopœæ missam. In monte Baldo nascitur, ex viuo ac durissimo lapide exiliens. Frutex est furculosus caule lignoso, contorto, digiti crassitudine, duris, dentis, ac rimosis furculis stipato, subalbicante exteriore libro. Folia habet parua, oblonga, in acutū definentia: flosculos albos, & caliculos pallidos, oci-

moidis modo, crenatis oris, in coronæ modum, admodū pusillos, in quibus semen rubrum, papauere minus. Radix altius petris inhæret, vt auelli nequeat. Miris laudibus plantā hanc cōmendabat Calzolarius ad calculos è renibus educendos. Saxifragia verò maior seu alba, cuius paulò antè meminimus, à floribus albis, quibusdā Chelidonioides dicta, Gallicè *Romptierre*, vel *Saxifrage blanche*, Germanicè *Habenstein bruch*. Folia fert è petiolis pilosis, rotunda, plurima, humi iacentia, in extremitatibus

SAXIFRAGIA Altera, Matth.*SAXIFRAGIA III. Matth.*

incisa,

SAXIFRAGIA Magna,
Mautholi.*SAXIFRAGA Alba, Fuch.*
seu Saxifraga quarta, Marth.

incisa, ac veluti cristata, mollia, a farina aut hederæ terrestres, minora tamē, & magis
ex luteo virentia: caules rotundos, villosos, pedales, & sesquipedales in summitate
flores albicantes, nasturtij colore & effigie, aut erucæ: radicem nigricantem, fi-

SAXIFRAGA Aurea,
Dodonai.

bris multis stipatâ, ex quibus pendent quasi granu-
la quædam qualia chelidoni minoris, aut semini
coriandri paria, vel paulò maiora, fusca & obscura
purpurea, acris, amara, à vulgo femina huius her-
bæ falsò credita, quorû in medicina vltus est. Mon-
tibus aridis, saxosisq; locis & arenosis provenit.
Maio mense floret, deinde statim evanescit. Huc
inferenda est Saxifraga Alpina, sic dicta quòd fo-
liis Saxifragiam albam imitetur, & in Alpium ex-
celsis, nivosis, opacis montibus, sub fagis, abietibus,
piceis in putri & vliginoso solo nascatur, nec vlti-
quàm alibi. Crescit ad palmi altitudinem, radice
breui, in tenuissimas fibras diuisa, subnigra: foliis
circa radicem tribus aut quatuor, rotundis per am-
bitû incisis, venosis, longo pediculo sub erectis, gu-
stus amari: caule tereti, in ramulos aliquot diuiso,
& aliquot folia proferente flore parvulo, quinque
foliolis constante, colore è luteo pallescete, & pro-

Forma.
Fuch. ca. 8.
Pena in
Adu.

Locus.

Tempus.

Temper.

pemodû herbaceo: semine parvo, rotundo, duro. Temporalia est herba ad primû
veris teporē: Aprili mense exoritur, statimque interit. Alba Saxifragiæ flores, folia,
& præsertim radix, cum gustanti amara sint, calidâ & siccam esse ordine tertio ve-
rissimile est. Radicis cum granulis decoctum ex vino, potu vrinam mouet, calculos
frangit, & conterit. Stranguriæ itaq; confert: abstergit enim expurgatq;, & quæ in
venis est crassitiē, sicut omnia alia quæ amara sunt, incidit, menses quoq; cit, crassaq;

Vires.

SAXIFRAGA, Alpina.


Dod.lib.2.
cap.89.
Pena in
Adu.



Locus.

Vires.

cis ferè in maceris, ac veterū adificiorū ruinis, altitudine cubitali, radice lōgiuscula, digiti crassitudine, fibrata: foliis multis, circa radicē humi iacētibus, figura lōnchi, sapore acri, caulibus multis, in quibus folia supradictis minora, atriplici marinę similia, subobscurē virētia: flores pusilli, copiosi, ē ramulorū pediculis prodeuntes, ex albo herbacei: semen rufum, minutissimum in siliquis gracilibus & longis, feruidi gustus, quod drachmæ pondere sumptum ex decocto radice graminis, calculum efficacissimè exierit ac expellit.

SAXIFRAGA Romanorū, Lob.*SAXIFRAGA Aurea, Lob.*

GNAPHALIVM, CAP. IX.

M

VLTA plantæ gnaphalia herbarij nuncuparunt, quòd molli lanugine seu lana vel tomento essent obuolutæ. Est enim Græcis γνάφειν vellere, carperéve lanas, aut pannum, seu vellicando & deradendo expolire, vnde γνάφειον, tomentum quod culcitris infarcitur, & quorū natura mollis, candida, & omnino lanea est, γναφαλίδιον appellátur, cuiusmodi sunt

GNAPHALIVM

vulgare, Fuch.



GNAPHALIVM, Matth.



dictāni folia, quæ Dioscorides γναφαλίδιον vocat, id est, tomentosa seu tomentitia, tomento quodam pubescentia, siue mollia tomenti modo. Gnaphalium igitur herba dicta, quòd foliis eius mollibus & candidis pro tomento vterentur, auctoribus Dioscoride & Galeno, à Latinis Centunculus & Centūcularis herba, quòd centonibus cum tomento maxima sit cognatio, & Tomentaria seu Tomentitia. Aliquot gnaphalia iam exposuimus in maritimis plantis, de aliis hîc dicemus, ac primum de vulgari, quod filago nominatur, Gallis *Herbe à cotton*, Germanis *Rhurkraut*, ab eius facultate aduersus dysenteriam. Filago multos profert cauliculos ex vna radice, rotundos, graciles, cinericios, lanugine seu molli lana tectos, rectos, sæpius sine furculis, in quibus folia crebra, longiuscula, angusta, mollia, villosa, stæchadis citrinæ foliis similia, nisi quod longiora sunt, latiora, & paulò viridiora. Flores glomeratim oriuntur in summis furculis, cauliculisve, non tam lutei quàm stæchadis citrinæ, sed sublutei & pallentes. Duūm videtur esse generum, inquit Fuchsius. Vnum enim paulò latioribus ac candidioribus foliis constat, alterum tenuioribus, & minùs candidis. Illud flores fert partim mediis furculorum diuarticationibus, partim extremis furculis: hoc in cacumine tantum. Dodonæus tria eiusdem genera facit, primum genus Impiam herbam esse Plinij censet, sic dictam quoniam liberi super parètes excellant, id est, postremò geniti flores priùs genitos superant. In eadem sententia est Matthioli. Tragus amaranthi lutei, seu Tinearæ, seu Elichrysi Theophrasti sylvestre genus facit. Alij filaginem ad stæchadem citrinam potius referendam censent. Aridis & sterilibus locis potissimum prouenit. Iunio & Iulio mensibus floret. Adstringit & exsiccatur Gnaphalium. Bibuntur, auctore Dioscoride, efficaciter eius folia in vino austero ad dysenteriam. Et Galenus, Gnaphalij folia, inquit, modicè adstringunt, ac proinde quidam exhibent ex austero vinorum quopiam ad dysenterias. Item Plinius. Datur in vino austero ad dysenteriam ventris

Nomina

Lib. 3. c. 31.

Lib. 3. c. 15.
Lib. 6. sim.

Dodo. lib.
1 cap. 60.
Penain
Ad.

Cap. 8.
Genera.

ibid.
Lib. 24. c. 19

In cap. 115.
lib. 3.
Lib. 1. c. 109

Pena in
Adu.

Locus.
Tempus.
Temper.

Vires.
Lib. 6. sim.

Lib. 27. c. 10

GNAPHALIVM

Montanum, Dalech.

Locus.

Forma.

Lib. 2. c. 40.

Cap. 12.
Pec. Pe. in
Ad.

ventris solutiones, mensēſque mulierum sistit. Infunditur autem tenesmo. Illinitur & putrescentibus vlcerum. Similiter Filago dysentericis, & profluuiis immoderatis non parū vilis est. His Gnaphalij generibus cognatum est, quod Montanum vocant docti herbarij, quia in excelsorum & frigidorum montium summis verticibus prouenit, radice subnigra, breui, fibrata, multisq; villis tenuibus & prolixis capillata, foliis propè radicem densius congestis, in caule paucis, oblongis, albis, tomento lanuginosis: caule dodrantali, rotundo: flore in summo eius vertice nunc luteo, nunc ex albo rubescente, in orbem vmbellæ instar conformato. Quidam pilosellæ genus esse volunt. A' superioribus Gnaphaliis hæc discrepat floris colore, qualem diximus, in illis luteo: folio latiore, in illis angusto: & quod humilis sit, caulēque singulari, nec furculoso: illæ verò proceriores, fruticosæ, caulēque in furculos supernè diuiso. Tragus aliud Dioscoridis Gnaphalium esse censet, videlicet Linum pratense, & Lanam pratensem herbariis dictam, Germanis *Matthenſleichs*. Est autem iuncea graminis genus, de quo inter palustres diximus. Iuncum bombycinum alij vocant.

SONCHVS LANATVS, CAP. X.

Nomina

Locus.

Forma.



MENTITII'S coniungi debet Sonchus lanatus, sic dictus à candore, & mollitie ad tactum manus suau, in tota planta, præsertim in capitulis florem promētibus. Gignitur in saxosis & apricis, radice dimidio pede longiore, candida, fibrata, foliis sonchi, rugosis, laciniatis, sed magnis ex interuallis, multis, costa candida supernè diuisis, per totum caulem nascentibus, lanugine pubescentibus, ad quorum radices cauliculi exoriuntur, caule est cubitali, anguloso, in ramulos supernè diuaticato, in quorum verticibus capitula eminent, suau tomento villosa, Soncho similia, quæ in aureum florem explicantur. Tota planta lacteo succo turget cichoriædum more, gustūque amaro prædita est, sed minùs quàm reliqua cichoriæde, quorum & facultatem obtinet, licet imbecilliore. Quidam hanc Molluginem ob causam supradictam appellant, quamuis à Plinij Mollugine diuersa sit. Floret Iunio mense.

SIDE

SIDERITIS,

CAP. XI.

ΣΙΔΗΡΪΤΙΣ Græcis, Latinis quoque Sideritis, sic dicitur à ferro, quasi *Nomine* ferruminatrix, quòd vulneribus ferro factis perutilis sit, vel quoniam glutinandis vulneribus apta, præcipuum in bello habeat vsum, quod sæpe ab eo metallo in Græcis scriptoribus indicatur. Sed cum permultæ sint plantæ, diuersi etiam generis, earq; insignes, quæ ferro sauciatis partibus, vel vulneribus in bello acceptis opem polliceantur, ac ob id Sideritides, & Stratiotides, id est, militares, meritò nuncupandæ, de omnibus hîc minimè dicendum. Satis enim benè studiofis consultum fore putamus, si eæ, quæ à Dioscoride descriptæ sunt, & paucae quædam aliæ illis possint innotescere. Is tria facit sideritidis genera, Prima est Sideritis *Genera.* heraclea, siue ferruminatrix herculea, fortassè à viribus efficacissimis, & planè herculeis, quæ folia marrubio similia habet, inquit, sed oblongiora, ad saluicæ aut quercus folia accedentia, minora tamen & aspera: caules edit quadrangulos, palmares, aut etiam maiores, gustu non insuaues, & quodammodo subabstringentes, in quibus per intervalla verticilli rotundi velut in marrubio, & in ipsis semen nigrum. *Forma.* Nascitur in petrosis locis. Altera Sideritis ramos habet bicubitales, tenues, folia in pediculis longis similia foliis filicis, multa, vtrinq; in summo fissa, ex superioribus alis propagines longas, tenues, in summo globi speciem referentes, capitulum habentes asperum, in quibus semen betæ semini simile, sed rotundius & durius. Sideritis tertia, quam Crateus etiam heracleam vocat, nascentem in parietinis & vineis, folia habet multa ab vna radice, coriandro similia, circum cauliculos palmares, laues, teneros, subcandidos: flores puniceos, paruos, gustanti amaros, lentos. *Locus.* Plinius de achillea, quæ etiam sideritis nominatur, agens, mox ob cognationem de Sideritidis generibus subiungit hæc verba. Aliqui & hanc (Achillea subaud.) Panacen heracleam, alij Sideritim, & apud nos Millefolium vocant, cubitali scapo, ramosam, minutioribus quàm sceniculi foliis vestitam ab imo. Alij fatentur quidem

SIDERITIS Prima,
Matthioli.



illam vulneribus vtilem, sed veram achilleam esse scapo cæruleo, pedali, sine ramis, ex omni parte singulis foliis rotundis eleganter vestitam. Alij quadrato caule, capitibus marrubij, folio quercus. Hanc etiam præcisos nervos glutinare ferunt. Alij Sideritim in maceriis nascentem cum teritur, fœdi odoris: Etiamnum aliam similem huic, sed cãdidioribus foliis, & pinguioribus, tenerioribus cauliculis, in vineis nascentem. Aliam verò binum cubitorum, ramulis exilibus, triangulis, folio filicis, pediculo longo, betæ semine, omnes vulneribus præcipuas. Nostri eam, quæ est latissimo folio, scopas regias vocant. Medetur anginis suum. Hæc Plinius satis indistinctè, vt tamen agnosci & intelligi possit, primam Achileon eius, Dioscoridis Achilleam esse: secundam, Achilleon veram, scapo cæruleo, &c. esse Myriophyllon Dioscoridis. Tertiã quadrato caule, &c. esse Sideritim Heracleam primam Dioscoridis. Quartam in maceriis nascentem, &c. esse Heracleam Crateus, apud Dioscoridem. Quintam superiori similem, sed foliis candidioribus, &c. esse tertiam Sideritim Dioscoridis.

^{Lib. 8. sim.}
^{In cap. 29.}
^{lib. 4.} scoridis. Sextam, Dioscoridis Sideritin secundam. Galenus vnus duntaxat Sideritidis meminit. Matthiolo prima Sideritis videtur esse ea quæ hîc primo loco expressa est, quod notis omnibus, vt ait, eam referat: nec aliud obstare putat, quàm quòd ea frequentius nascatur humidis quàm siccis locis: quamquam sæpè eandem virentem in locis quoq; siccis se inuenisse affirmer. Huic tandem sententiæ, veri

SIDERITIS Secunda,
Matthioli.



SIDERITIS Tertia,
Matthioli.



SIDERITIS Quarta,
Matthioli.



Lib. 3. c. 92.
Cap. 294.

incertus aliam substituit, his verbis: Id itaq; tantum in causa est, vt hanc non ausim omnino legitimam facere Sideritim, præsertim cùm aliam nunc repperim plantam in Viennensi agro, ac aliis Austriæ locis, arido in solo, quæ sideritim primam perbellè refert. Exit enim quadrato caule, ipsoq; dodrantali, aut maiore, ramosoque, foliis marrubio longioribus, & ad saluix faciem accedentibus, crispis & albicantibus, per ambitum laciniatis, sapore haud ingrato: floribus verticillatim in caule prodeuntibus marrubij modo, vt ex appicta imagine perspicere licet. Deinde Ruellium & Fuchsium viros de re herbaria benemeritos erroris insinulat, quòd primam sideritidem dixerint herbam esse, quæ hodie nostris herbariis & Officinis barbaro nomine Terrahit, aliis Herba Iudaica nominatur. Postremo duas alias sideritides depinxit tantum, nulla prorsus aut figuræ, aut virium facta mentione, quas hîc quoq; expressimus. At periti & exercitati herbarij, tum Ruellio Fuchsioq; ætate superiores, tum inferiores multis rationibus inducti Terrahit siue Iudaicam herbam, primam, siue heracleam

TETRAHIT, Herba Iudaica
Sideritis prima, Fuch.



TETRAHIT, Sideritis Heraclea Dioscoridis.



voluerit, has ei prorsus cōuenire perspiciet, vt ex Sideritidis delineatiōe superiore, & iis quæ de Pimpinella alio in libro diximus, intelligere licet, etiā suffragante in Chio insula eius vernacula appellatione, in qua etiam hodie Sideritis appellatur. De palu. cap. 73.

cleam Sideritidem esse censuerūt. Primum omnes delineationis Dioscoridis notæ respondent. Nam folia habet marrubij cretici, sed longiora, & angustiora, incana, scabra & crispa, ambitu laciniato, vt chamædrys, aliquando laciniosa diuisura obscurius apparente in quibusdam foliis, quæ fortasse causa fuit cur Dioscorides illa modò cum quercus, modò cum salix aut marrubij foliis contulerit. Caules fundit modò depressos, modò surrectos, palmum sæpius excedentes, & pedales, quadratos, duriusculos, ternos aut quaternos, asperos & pungentes, non iniucundi gustus, aliquantum adstringentes, quos verticilla per intervalla coronant, vt in marrubio Cretico videre licet: flores sunt albi-cantes ex diluta purpura, vel lutei: semen nigrū, radix lignosa, marrubij. Ad hæc arida, petrosa, sabulosa, & inculta loca perpetuò amat. Iunio & Iulio mensibus floret, nec desinit nisi autumnī fine. Præterea vehementer exsiccat & adstringit, ad vulnera curanda planè nata, magnòque multorum cōmodo cognita practicis quibuldā Iudæis, qui hac enterocelas, & alba menstrua curant, inde Iudaicæ nomen adepta, quæ cum Dioscoride cōgruunt, scribente folia imposita vim habere glutinandi vulnera, & arcendi inflammationes. His Galenus adstipulatus, Sideritis, inquit, phlegmonen sedat, & glutinat. Item Plinius, Sideritis tantam vim habet, vt quamuis recenti gladiatoris vulnere alligata sanguinē claudat. Quare hæc prima Sideritis Dioscoridis fuerit, non herba illa Iudaica, cuius meminit Aui-cenna, quæ nihil aliud est quam eruum. Matthioli verò Sideritis prima, minimè Sideritis dicenda, quòd notæ eius multæ ei planè refragentur, sed Penç sententia marrubij potiùs aut verbenæ species, quam ob id herbarij marrubium palustre, siue aquaticum vocant, de quo in palustribus diximus. Altera autem quam illi substituit, cannabis siluestris est herbariorum, neutra ad vulnere curationem commendata. Dodonæus sidesitidem primam herbam eam esse putat, quæ Cardiacæ ab herbariis nominatur. Sideritis secunda Dioscoridis multorum doctorum iudicio nostra est Pimpinella, cuius partes omnes, qui cum Dioscoridis descriptione conferre-

Locus.

Tempus.

Temper.

et Vires.

Lib. 8. cap. 13.
 Lib. 26. cap. 13.

Lib. 2. cap. 39.

Cap. 47.

Lib. 1. cap. 187.

Penæ in
 Aduer.

Lib. 4. c. 10.
In cap. 31.
Lib. 4.

Sideritidis seminis foliorūq; vis, inquit Dioscorides, ad vulnera præcipua est. Qui verò sint illi nescio quos Matthiolus reprehendit, quòd hanc tertiam Sideritidem faciant, cum ei folia coriandri non sint, nec eadem circa caules orientur, sed pinnata ex longo vtrinq; pediculo exeant: præterea quòd caules præduros habeat, non teneros, ac etiam quòd flores capitulaq; non amaro, nec lento gustu sint, sed astingenti, & austero. Nullus enim est tam ignarus, qui nō perspicue videat Pimpinellā cum secunda, non cum tertia Sideritide prorsus conuenire. Quæ tertia Sideritis, Crateuæ herculeæ, in maceris & vineis nascitur eorundem peritissimorum herbariorum sententia, nostras est herba Roberti notissima, foliis coriādri, inter gerania à nobis descripta, non solum vulneribus & sanguinis eruptionibus, verum etiam vulneribus, & potionibus vulnerariis vtilissima, quod & de Crateuæ herculeæ tradidit Dioscorides, eam nimirum huius esse vim, vt quamvis recenti vulnere imposita sanguinem supprimat, interprete Ruellio, cum Græcè legatur, *καὶ τάντης ἡ δυνάμεις ἐπιτελεμένης κολλητικὴ ἐν αἵματι, καὶ νεοτρώτων*. Id est, Hæc etiam imposita vim habet glutinandi cruenta, & recentia vulnera. In veteri tamen codice legitur, *ἐν αἵματι καὶ νεοτρώτων*, id est, cruenta, & vulneratos neruos, sed prior lectio melior. Sideritides alias viri in re herbaria exercitati approbarūt, quas hic apposuimus. Primum eam quam Monspelienſium Schola præter herbam iudaicam nouit, in agro Monspe-

And. Lac.

Locus.

SIDERITIS, Monspelienſium.

HERBA Venti, Parietaria Cordi, Sideritis genus.



Forma. liensi frequentē, locis nimirum pinguibus, & triticeę messis fertilibus, radice crassa, valde fibrata, caulibus multis, cubitalibus, angulosis, tactu asperis, surculosis: foliis saluæ longioribus, latioribus, per oras diuisis, scabris, geminis semper, caulem & surculos per interualla amplectentibus, ex quorum veluti sinu flos emicat, verticillato ambitu, densus, puniceus: semen in hirsutis vasculis, vt in marrubio. Hanc Pharmacopœi Monspelienſes Herbam venti vocant, quòd eius folia tota pertusa & vento peruia cernantur, vt mox dicetur. Itali Verbaſci siluestris speciem, periti quidam Othonnam Dioscoridis, quòd areſcenti herbæ folia non defluant, sed per hyemē in planta ipsa remanentia, siue à tineis, siue ab aëris frigidi occurſu sic eroduntur,

SIDERITIS, Querno folio, Dalechampij.

duntur, vt absumpto reliquo eorum corpore durantibus, venosis; neruosisq; fibris, eo textu quo à natura reticulatim sunt implexæ, cribri modo pertulæ appareant, & quasi à blattis exesæ, quod apud Dioscoridē othonnē poscit historia. Alia herbariorum vulgò sideritis pratenfis rubra nominatur, ob exiguā quandam cum Tetrabit officinarum folijs similitudinē, quam sideritidem appellari diximus. In pratis & humidis locis provenit. Radicem mittit lignosā, breuem, nigrā, in multas radículas diuisā: caules multos, quadratos furculosos: folia multa, parua, in ambitu nonnihil diuisa, gustu perquā amara: florem copiosum, obscure purpurascentem, luteis apicibus è medio prodeuntibus: semen minutulum in latis caliculis alsines modo. Est & iisdem sideritis pratenfis lutea dicta, quæ in siccaneis pratis nascitur, flore, furculis, fructu, gustu, superiori similis, nisi quòd flos omnino luteus est: folijs autem distat, quæ longè minora sunt & angustiora, nec per margines incisa. Item aliud hîc etiam pictum Sideritidis genûs statuunt herbarij, quòd recentia vulnera ferro illata solidet: quòd folia quernis affinia sint, minora tamen, in ambitu dissecta, subaspera: quòd caules per interstitia rotundæ vertebræ, vt in prassio coronent, quæ omnia in Sideritide prima Dioscor. requirit. Aliam hîc quoq; appositam Sideritidis generibus adnumerant, quæ in vmbrosis reperitur, inter saxa, & muscosos lapides, radice breui, nigra, fibra-

SIDERITIS, Pratenfis rubra.*SIDERITIS, Pratenfis lutea.*

ALIA, Sideritis.

nec ingratam, vfu nullo exploratam.

ta : caulibus multis, nunc surrectis, nunc per vicina repentibus : folio marrubij, longiore, in ambitu valde inciso : flore luteo, aut pallido, verticillatim caulis superiora ad foliorum exortum circumdante, marrubio simili. Sideritidem Monspeliensem Pena depinxit & descripsit palmum & sesquipalmum altam, viticulis angulosis, rectis, multis, aridis, lignosis, coma & verticillis hyssopi, foliis, facie, colore scordij Dioscoridis, sed minoribus, magis rugosis, rigidis, crispis, pilosis quàm tetrahit Iudaicum, nec minus laciniosis, sed hirsutioribus, flosculis saturciæ vulgaris ad foliorum articulos, gustu amaricante & exsiccante, nonnihil aromatici suavisque spirantibus, quod Chamædryn aut betonicam referat. Aliam ex Sabaudia Alpina pictam exhibuit, quam Sideritidum vnam esse opinatur, & satis quadrare heracleæ sideritidi, ni folia angustiora multo essent, vique efficaciori carerent : alioqui verticillatos cirros habet, asperiusculos, pallidos, marrubij aut tetrahit, viticulas multas, tenues, lignosas, nec quadratas, binum palmarum : radicem flexuosam, prolixam, lignosam, pullam, amaricantem gustu, præsecam,

SIDERITIS Monspeliensis, Pena.*SIDERITIS Montana, Pena.*

POLY

POLYGONVM MAS.

CAP. XII.




POLYGONON ἀππεν Græcè, Latine etiam Polygonum mas, Seminalis, *Nomina*
Sanguinalis, & Sanguinaria, Proserpinaca, Arabibus *Bastirahagi*, Officinis
Corrigiola, & Centinodia, Gallis *Renouee masle*, & *Corrigiole*, Italis *Polygono*
majcho, & *Corrigiola*, Germanis *Vuegrafe*. Polygonum à geniculorum frequentia &
multitudine dicitur, feminalis à feminis multitudine, sanguinalis à cohibendo san-
guine, proserpinaca à serpendo. Polygoni duo genera facit Dioscorides, marem &
fœminam. De hoc in palustribus, de illo nunc dicemus, & de aliis generibus quæ re-
centiores herbarij adinuenerunt, de marino agemus in maritinis. Polygonum
mas, vt describit Dioscorides, herba est ramos habens tenues, teneros, multos, geni-
culis cinctos, repentes per terram velut gramen, folia rutæ similia, sed longiora & molliora (im-
pressi codices habent ἐπιτεκτέρεα, cum legendum
sit ἐπιτεκτέρεα, id est, longiora, addè etiam μαλα-
κώτερα, id est, molliora: sic enim Oribasius legit,
quem secuti sunt interpretes:) fructu iuxta singu-
la folia fert, vnde mas vocatur: florent candidum,
aut puniceum. Breuius sic Plinius, Polygonum
Græci vocant, quam nos sanguinariam. Non attol-
litur à terra, foliis rutæ, semine graminis. Nascitur
pæsim, quotidieq; pedibus conculcatur in aggeri-
bus & semitis, item secus arces, & compita. Aesta-
te floret. Vis epoti succi est spissare, ac refrigerare.
Prodest cruentæ excretioni. Sic Ruellius Græca
exemplaria secutus, quæ sic habent. *διυάμυν διδὲ*
ἔχει τρυπικὴν, ψυκτικὴν ὁ χυλὸς πινόμενος, ἀρμόζει διδὲ,
&c. In aliis verò legitur, *διυάμυν διδὲ ἔχει τρυπικὴν*
καὶ ψυκτικὴν, ὁ δὲ χυλὸς πινόμενος ἀρμόζει, &c. id est,
Vim adstringentem habet & refrigerantem: suc-
cus verò potus prodest sanguinæ spuentibus, alui
fluxionibus, cholericis & vrinæ stillicidio, vrinam
enimè euidenter ducit. Cum vino potus venenato-
rum moribus auxiliatur. Valet etiam ad febrium circuitus hora vna ante accessio-
nem sumptus, muliebri profluuium appositus sistit. Aurium doloribus, & purulen-
tis auribus instillatus confert. Cum vino decoctus, melle adiecto, eximie ad genita-
lium vlcera facit, folia contra stomachi ardorem, sanguinis reiectionem, herpetas,
erysipelata, inflammationes, & demata, & vulnera recentia illinuntur. Eadem ferè
Plinius habet. Succus eius infusus naribus supprimit sanguinem, & potus cum vino
cuiuslibet partis profluuium, excreationesq; purulentas inhibet. Vis eius est spis-
sare, ac refrigerare. Semen aluum largius sumptum soluit, vrinam ciet, rheumatif-
mos cohibet, qui si non fuere, non prodest. Stomachi feruori folia imponuntur,
vesicæ dolori illinuntur, & ignibus sacris. Succus & auribus purulentis instillatur,
& oculorum dolori per se. Dabatur & in febribus ante accessiones, duobus cya-
this in tertianis, quartanisve præcipue: item cholericis, dysentericis, & in solu-
tione stomachi. Polygonum, inquit Galenus, vt adstrictionem quandam obtinet,
ita sanè vincit in eo aqueum frigidum, vt videlicet secundi sit ordinis medicamen-
torum refrigerantium, aut etiam quodammodo in initio tertij. Est etiam exsicca-
torium. Quare quibus stomachus æstu feruet, extrinsecus illitum auxiliatur, veluti
etiam erysipelata, & calidas phlegmonas iuuat. Porro tale cum sit, & fluxiones re-

Lib. 4. c. 4.
Genera
Cap. 13.

Ibidem.

Forma

POLYGONVM Mas.



Lib. 27. c. 12

Locus.
Tempus.

Lib. 27. c. 12

Lib. 8. m.

primit, & hac ratione videtur exsiccativum esse. Quare cū herpetum tum vlcerum, aliorumq; bonum est remedium: efficacissimum autē inflammatione & fluxione laborantium partium. Est & cruentorum vulnerum glutinatorium. Sed & aurium vlceribus prodest: etsi vel satis puris insit, hoc tamen etiam desiccet. Easde ob facultates, & muliebri profluuiū & dysenteriam, & sanguinis eiectiones, & vndecumque aliunde immoderiores impetus sistit. Refert Dioscorides quod & vrinam prouocet exhibitum stillicidio affectis, non tamen affectum accurate distinguit, quo dari ipsi expedit: quamuis probabile sit vrinę sub stillo cōuenire, quod accidit renibus impacto lapillo, arenosave, aut crassa quadam materia, quoniā vim habet calculum frangendi, vt & Herniaria, proculdubio eius species. Pena alia Po-

POLYGONVM Montanum
niueum, Pena.



POLYGONVM Alterum
Serpylli folio, Pena.




POLYGONVM
Herniariae foliis.



Lib. 2. stir.
Hlsp. c. 91
91.

lygoni genera pingenda curauit. Primum mōtanum minimum, niueum & sericeum, herbula est vix vnciam & semūciam aequans, densis confertisq; ramusculis, sarmentosis, duriusculis, densissimis geniculis, & foliorum quasi denticellis, herniariae aut thymi tenuifolij foliolis minoribus, per parua interstitia visu vix discernēda. Eximio vellere sericeo, & niueo candore lucentibus glomerulis foliaceis, delicatissimis, tenuissimisq; membranulis contexti flores vniuersam superne plantam ornant & oculum texitilis radix, lignea, & quā cauliculi longior: semina paruula, acerosa, erythrodani marini vix visu capi queunt praexilitate. Alterum rarum & haecenus indictum, ramulis & cauliculis est furculosis, prolixis, gracilibus, Serpylli, humi sparsis. E' geniculis foliola prodeunt pusilla, teretia, succulenta, thymo paruo nostri aequalia & similia, radix praelonga lignosa, sapore amaricante, calidiufculo. In collibus maritimis Galloprovinciae non secus ac herniaria luxuriat. Tertium non minū rarum quā superius



superius. Est perpu-
silla herbula & humi
accumbens, cespite
femiobruta, ramulis
creberrimè genicula-
tis: foliolis & semi-
nibus parvis, albidis,
prorsum herniaria:
tota incana, flore
muloso, valde exi-
guo: radice ampliore
quàm pro plarè mo-
do, dura, furculosa,

implexa, & in se reticulatim conuoluta, auulsu difficili, gustu præsiccò, calidiuscula.
In amplissima Cretæ Salonenfis Galloprovinciæ planitie, media via inter Arela-
tem & Salonam provenit ad diuersorium D. Martini. Eandem plantâ Clusius Po-
lygoni maris genus esse arbitratur, eamque graphicè depinxit his fere verbis.
Multis viticulis per terram sternitur, dodrantalibus magna ex parte, sed interdum
etiam pedalis, aut longioribus, geniculatis, foliis Polygoni maris, minoribus,
& in nouella planta virentibus, deinde temporis spatio confertissima & nù-
merosa admodum adnascuntur foliola acerosâ & membranèa, omninò alba, sic
vt tota argenteis squamis constare videatur gratissimo spectaculo: flos can-
didus Polygoni, sed adeò parvus & inter membranulas istas latens, vt vix con-
spiciatur: semen Polygoni: radix candicans, oblòga & tenuis. Nusquâ abundantius
provenire ait, quàm in collibus petrosis & siccis Salmanticiæ vicinis, trans flumen
Thormû: item circa Valentia & Murcia: se etiâ vidisse in eodè quo Pena loco, nèpe
lapidoso illo campo supra Arelatè, nò procul à D. Martini diuersorio, qua Malsiliâ

Lib. 2. stirp.
Hisp. ca. 91.

CHRYSOCOME
Lanuginosa, Dalech.



iter est, sed multò minore, & vnciâ vix excedentem.
Floret Maio & Iunio, deinde semen profert. Murcia-
ni vulgò Asprilla vocant, à foliorum exsuccorum
fortasse asperitate. Salmanticensès & Valentini Pa-
ronychiam vocât, cum tamen etiam Clusij iudicio
nihil aliud sit quàm Polygoni maris genus peculia-
re, vt diximus. Etenim cum primùm è semine pro-
dit, à sanguinaria vulgari nihil differt, & comman-
ducata eodem gustu deprehenditur.

CHRYSOCOME LANUGINOSA,
CAP. XIII.

HÆC à florum colore & foliorum lan-
ugine, Chrysocome lanuginosa her-
bariis dicta, in aridis collibus Alpium,
& sabulosis cliuis gignitur: radice ni-
gra, crassiuscula, plurimis exilibus fibris capillata,
Ellebori nigri modo: caulibus multis, palmum altis,
foliis hyslopi vulgaris longioribus, canis, villosis:
flore aureo, ad foliorum exortu, quæ superiora cau-
lis parte prodeunt, in pappos abeunte. Quidam im-
piæ à Plinio memoratæ genus esse putant, quod do-
ctis herbariis iudicandum relinquimus.

Nomen.
Locus.
Forma.

HERNIARIA,

CAP. XIII.

Nomina


sive Herba Turca.

Lib. c. 81.

Locus.

Forma.

Vires.



VERBASCULVS

Alpinus.

Nomen.

Locus.

Forma.



QUIDAM plantam istam Lichontribon ab effectu, vt & Herniosam, siue Herniariam vocant, nonnulli Herbam Turcam, Cordus Milleganam, Itali *Centogranā*. Tragus Empetrum, Anguillara Epipactida, alij Elleborinē Dioscoridis esse censent. Sunt qui nec sine ratione Polygoni speciem faciunt. Matthiolus Polygoni minoris nomine, depinxit. Crescit in sabulosis, aridis & persflatis, in aruis & oliuetis Narbonensis Gallie, vt circa Monspelium, radice quatuor, aut quinque digitos longa, sensim gracilescētē, modicē fibrata: ramos edit teneros, numerosos, densos, surculosos, exiles, per terram repentes, folia lentis, valde parua, albescentes minimā minora, crebra, semina numerosissima, inter foliola & sub singulis cōgesta, atriplicis & Polygoni minora, flosculi luteoli, multi, tribuli terrestris multo minores, nec dissimiles. Tota ex herbaceo flauet. Experimentis multis certūque constat herbarū huius succum vino albo expressum, & potum, efficacissimē renum calculos comminuere, & exterere: item eximiē valere ad ramices & hernias, vel si trita, imponatur extrinsecus: vel si bibatur succus: vel si arida & tusa cochlear detur. Prodesse etiam dysentericis aiunt, & sanguinis eruptionibus, & aduersus viperarum & cæterarum venenatarum animantium venena, tum sumptam, tum foris impositam. Stillatitia eius aqua octo dierum spatio hausta, hepatis obstructiones, & icterum per sanare proditur.

VERBASCULVS ALPINVS,
CAP. XV.



AB herbariis verbasculus Alpinus, siue Caruleus dicitur, proueniens in asperis & opacis Alpium tractibus, radice breui, fibrata, candicante, foliis circa ipsam densis, humi procumbentibus, oblongis, læuibus, tribus aut quatuor cauliculis, pedalis, minimē foliosis: flore caruleo in caulium cacumine, ferē instar umbellæ coaceruato, speciosissimo, ac pulcherrimo.

VALE



ne, Belgis *Belthroppen*, quasi dicas lactucam campestem, quia folia primo pullulatu habet lactucis aut seridis adhuc tenellis similia, & in Quadragesima cibo & acerariis expetatur lactucarum modo. Frequentissima in agro Antuerpiano. Flos & radix Monspeliacam æmulatur, folia minùs laciniata.

PHV Minimum.



PHV Minimum alterum, Lobel.



Nomina

Locus.

Forma.

Nomina



ΕΙ'Ζ Ω ΟΝ Græci, Semperuium & Sedum Latini vocāt, Apuleius Vitalē, Arabes *Beihalalen*, seu *Haihaltez*, Officinæ Semperuiiū, vulgus Iouis barbam, Galli *Ioubarbe*, Itali *Semperuiuo*, Germani *Hanſzuurtz* & *Donderbar*, quod nonnullis locis plebis animos iampridem inuaſerit

opinio, non feriri fulmine domum, in cuius tegulis vireat Sedum. Aizoon autem & Semperuium appellant, quòd perpetuò tam æſtate quàm hyeme vireat, nec vllis frigoriſus, aut cæli iniuria quatumvis frigida emoriatur. Eius tria ſtatuit genera Dioſcorides, ἀΐζων μέγα, Aizoon, & Semperuium maius, Apuleius τέρνυθρον, & ζωόβαλμον vocat, Galli *Grande Ioubarbe*, Itali *Semperuiuo maggiore*: ἀΐζων μικρόν, Aizoon, ſedum & Semperuium minus, ſeu Semperuiiū medium, quibuſdā τεθαλές, quod ter anno floreat dicitur, Apuleio Erithales, Plinio Eriſithales, Gallis *Triquemadame*, & *Petite Ioubarbe*, Germanis *Kleinhanſzuurtz*, & *Kleindonderbart*, Italis *Semperuiuo minore*, & *Pignola*, à folio tereti pineo. Tertium genus ἀΐζων τετρον, Aizoon ſedum & Semperuiiū tertium: quidam ἀνδράχων ἀργίαν, ideſt, portulacam ſilueſtrem, & telephium nominauerunt. Romani, auctore Dioſcoride, Illecebrā, Arabes *Andrachahara*, *Alſcebran*, *Tilaſon*. Herbarij plura aſſignarunt genera, & aliter diſtinxerunt. Fuchſius tria deſcripſit & depinxit. Primum maius Aizoon, deinde minus, ſed id duplex: alterum marem, quod floribus luteis ſpectatur: alterum ſcæminam, quod floribus candidis ſeu pallidis conſpicitur: poſtremò Aizoon minimum, de quo mox, quod tertium Dioſcoridis eſſe putat. Dodonæus quatuor, ſemperuium maius, ſemperuium minus, craſſulam minorem ſiue vermicularem Officinarum, à ſimilitudine foliorum vermiculos referentium, quod tertium genus ſtatuit: his quartum addit minimum, quod portulaca agreſtis, & Romanis Illecebra dicitur. Matthiolus ex Sedi generibus à Dioſcoride deſcriptis, duo nota eſſe ait, nimirum maius & minus: minoris duo eſſe genera: vnum, de quo Dioſcor. tractat, quod ſcæminam recentiores appellant, alterum marem: tertium diu incognitū tandem Ghini opera & induſtria veluti in lucem prodiſſe. Pro minori, Craſſulam Officinarum ſeu vermicularem, ſiue Sedum minus ſcæminam Fuchſij depinxit: tertium Aizoon minimum, repens, Illecebram minorem, Gallis *Pain d'oïſeau*, Germanis *Rotzentreuble*, ſiue *Maupfeffer*, ideſt, murinum piper, propter acrem exulcerantemq; facultatem. Gramen tertium Plinianum Anguillara, Itali *Granelloſa* & *Graſella*. His addit Aizoon arboreſcens, idq; varium. Sed hæc ex deſcriptionibus dilucidiora ſient. Plinius, Aizoi, inquit, duo genera ſunt: maius in ſcétilibus vaſculis ſeritur, quod aliqui Buphthalmum vocant, alij Zoophthalmū, alij Stergethrū, quòd amatoriis conueniat, alij Hypogeſon, quoniam in ſubgrundiis ferè naſcitur. Sunt qui Ambroſiam potiùs vocant, & qui amerimnon. Itali Sedum magnū, aut oculum, aut digitellum. Alterū minusculum, quod Aithales, alij Trithales, quia ter floreant, alij Chryſothales, alioqui Iſoetes, Itali Sedum, alij Aizoon vtrumq;, quoniā vireat ſemper, aliqui etiam ſemperuium. Aliquantò poſt tertium Aizoi genus nō facit, ſed ait. Huic (minori ſubau.) ſimilis eſt, quam Græci Andrachnen agrian vocant, &c. Galenus quoque duo duntaxat Aizoi genera eſſe dixit. Ac ſanè Dioſcorides, & eum ſecutus Oribaliſius, illecebram non eſſe, ſed videri tantum Aizoi ſpecie eſſe ſcripſerunt, vt eam Aizois ſimilitudinis & affinitatis gratia duntaxat ſubdidiffe videantur. Aizoon maius, vt deſcribit Dioſcorides, caules emittit cubitales, aut etiam maiores, digiti magni craſſitudine, pingues, bonè virentes, incifuras charactæ tichymali modo habentes, folia pingua, pollicis magnitudinē, in ſummo linguae ſpeciem habentia, atque ex ipſis ea quidem quæ proximior à radici ſunt, in terram reſupinata ſint, quæ verò in capite, inter ſeſe coherentia & circulum oculo ſimilem

Lib. 4. c. 84.

Genera.

Lib. 1. c. 75.

Ca. 84. li. 4.

Lib. 25. ca. 5.

Li. 6. ſimpl.

Li. 4. ca. 84.

Forma.

AIZOON Maius, siue Semperuium minus, Dodon



similem circumscribentia. Aizoon minus cauliculos habet ab vna radice multos, plenos: foliis rotundis, pinguibus, paruis, in summo acutis. Emittit & e medio caulem, umbellam & flores pallidos seu luteos sustentem. Sic enim interpretari $\chi\lambda\alpha\rho\alpha$ oportet, non herbidos, vt Ruellius vertit. $\chi\lambda\alpha\rho\alpha$ enim hoc loco, vt alias sæpè, pro $\omega\chi\rho\alpha$ accipitur, id quod etiam ex Serapione constare potest, qui locum hunc Dioscoridis sic traduxit Et habet virgam, in medio longam, circa lōgitudinem palmi, super quam est capitellum, in quo est flos citrinus, subtilis. Videtur, inquit Dioscorides, tertium Semperuii genus esse, quod foliola habet crassiora, ad portulacæ folia accedētia, densa. In qua Diosc. descriptione nihil ambiguum, nihil obscurum dici potest, nisi in dictione $\delta\alpha\sigma\upsilon$, quæ hic, vt plurimis aliis in locis, non pilosum neque hirsutum, sed densum, rigidū & cōpactum significat. Ex aliis verò descriptionibus perspicuum vera hīc Dioscoridis Aizoa depicta esse. Ac primum quidem, omnes Aizoon maius fatentur esse. Secundum, siue minus, id esse, quod Do-

Cap. 310.


donæus Semperuium minus, Fuchsius Sedum minus marè vocat, clare demonstrant ramuli à radice tenui graciles, edentes foliola angustiora, rotundiora, minorā, carnosā, acuta, salicorniæ colore & modo: flosculis aureis, stellatis. Præterea iudē

Cap. 310.

AIZOON Minus, siue Semperuium, Dodonæi.



AIZOON Minus, Math. idem cum proximo.



sunt

AIZOON Minus fœmina, Fuchf.
Crassula minor seu vermicularis.

Pen in Ad.

Locus.

Tempus.
 Temper.
 & Vires.
 Lib. 4. c. 84.



sunt natales, eadem vires, vt dicemus. Alterum item minus, quod idem Fuchsius Aizoon minus fœminam appellat, pro secundo siue minore sedo depinxit Matthiolum. Sæpissimè colligentes id fallit propter natales eosdè, faciemq; adeò minoris sedo similem, vt mirum magis sit contraria pollere facultate. Discernitur tamen foliis rotundis, teretibus, oblongis, magis carnosus, superne retusis, mucronatis instar vermium, è totis ramis pendulis, flosculisq; pallidis, vel albidis. Eius species est minimum repens, hîc quoq; appictu tertium Sedi genus Fuchsij, Illecebra Latinis, Gallis *Pain d'oiseau*, Germanis *Katzenreuble*, pusillis ramulis parietes, saxosaq; moles & colles aridos amplexantibus, gracilibus, repentibus, foliis valde paruis & breuib; carnosus, confertis: floribus aureis, stellatis. Semperuium maius nascitur in montosis & testaceis, supra domicilia etiam reperitur. Minus in petris, parietinis, & maceris, nec non scrobibus opacis. Tertium nascitur in faxis, sicut & minimum repens. Aizoon Maius Iulio & Augusto mensibus floret, reliqua genera

Maior & Iunio. Aizoon maius, auctore Dioscor. vim habet refrigerantem & adstringentem. Folia per se & cum polenta illita conferunt ad erysipelatâ, herpetas, nomas, oculorum inflammationes, ambusta, podagras. Succus verò cum polenta & rosaceo capiti in doloribus infunditur. Datur à phalangio morbis in potu, diarrhoea laborantibus dysentericisque: teretes lumbricos cum vino potus excutit. Subditus in pello muliebres fluxiones sistit. Succus etiam in lippitudine oculorû ex sanguine orta vtiliter inungitur. Minoris folia eandem cum antedicto vim habent. Quod tertium videtur Aizoi genus esse, vim habet calfacientem, acrem, exulcerantem, discutientem strumas, si cum axungia fuerit illitum. Eadem vi prædita est eius species repens, siue illecebra minor, gustu quasi ari aut flammulæ. Plinius cû de Aizois, quæ supra citauimus, scripsisset, subiungit. Omnium harum vis eadem perfrigerare & adstringere. Medentur epiphoris folia imposita vel succus inunctus: purgant enim vlcera oculorum, expletq; & ad cicatricem perducunt, palpebras deglutinant. Eadem capitis doloribus medentur, succo vel folio temporibus illitis. Aduersantur phalangiorum ictibus: aconito verò maius Aizoon præcipuè. A scorpionibus quoque, habentem id, feriri negant: Medetur & aurium dolori. Quæ magna ex parte cum Dioscoride consentiunt,

AIZOON Minimum repens, tertium Dioscoridis.



Lib. 25. c. 15.

consentiunt, nisi cùm omniũ vim refrigerantem & adstringentẽ faciãt, eandẽ etiã tertio generi tribuat, quod cõrraria præditũ esse facultate Dioscorides scripsit. Galenus maioris & minoris duntaxat Aizoi meminit, vt diximus, & vtrũque scribit desiccare quidem leuiter, quandoquidẽ & mediocriter adstringit, omnis alterius vehementis qualitatis expers. Quare in eo plus cãteris abundat essentia aquea: cãterũ non mediocriter refrigerat: est enim ex tertio ordine refrigerantium. Hinc etiã ad erysipelata, & herpetas, & phlegmonas à fluxione natas accõmodatur. Herbarij quidam aliud Aizoon Telephium hĩc quoque depĩctũ nuncupant, quod in saxosis & lapidosis gignitur, radice parua, candida, modicẽ fibrata, folijs humi circa radicem iacentibus, & eam in orbem circũdantibus, vt in Semperuiuo maiore, oblongis, nonnihil incisfis, crassis, hirtis, portulacæ-similibus, in caule paucis, caule nunc singulari, nũc multiplici, dodrantali, flore violæ, candido, semine in siliquis exilibus, sinapi modo. Plantæ sapor initio fatuus, deinde acris vt in Nasturtio. Item aliud, quod montanum cognominant, in editissimis Alpibus proueniens, folijs multis, exiguis, circa radicem humi stratis, paucis, in caule alternatim dispositis, caule tres digitos alto, flore odorato, in medio luteo, rubris & radiatis foliolis stellato, quorũ infima pars capitulo luteo vicina, alba linea notatur. Matthioli

Li. 6. simpl.

AIZOON Telephium, Dalech.*AIZOON Montanum.**AIZOON Arborescens, Matth.*

DDd

duas arborecentes Aizoi species exhibuit, alteram ex Constantinopoli, alteram ex Corcyra. Pena multas eiusdem plantas se vidisse asserit Veronæ, Patavij, Venetiis, & in Hetruriæ hortis. Postea passim in maritimis Sclauoniæ seu Illyrij circa Dyrrachium nasci ex amico intellexit. Demum se in sinus Bristoiensis Anglici Oceani

SEMPERVIVVM Arbo-
rescens alterum, *Matth.*



SEDVM Minimum
arborescens. *Lobellij.*



VERMICULATVS Frutex
maior, *Lobellij.*



Vermicularis, Sive *Illecebra* maior, *Lob.*
sive *Sempervivum* minus alterum, *Dod.*



infulis

infulis vocatis Homs se copiosum auulisse ait, sed in saxosis, nec perinde carnosum aut ramosum, tamen stipite ramisq; fruticans lignosis, duris, multis, lentis: foliis paribus & similibus, vulgare maius Sedum situ & ortu æmulatibus, minùs crassis, inter vulgare Sedum maius, laureolam & tithymalum ambigentibus. Græcum verò, quod & Illyricum, maius multò & speciosius, ramis & cortice, foliorum circinato per summa positu magis laureolam imitantibus, erasioribus, tenerioribus, breuioribus, succulentis, cubitum longis in scapo pedali, & cubitali, laureolæ crasiore. Adiungam hîc ex Dalechamptio Aizoom Dasyphyllum, idest Densifolium, quod in parietibus & muris Viennæ Allobrogum nasci obseruauit, radice breui, capillata, pallida, gracili, in exigua terra & parietum cemento hærescente: ramulis plurimis, quatuor digitos altis, perquam spissè congestis, foliis numerosissimis, crassis,

*SE D V M Minimum
tertium, Lobellij.*



*AIZOON Dasyphyllum,
Dalechampi.*



teretibus, albicantibus, confertissimè stipatis, gustu fatuis cum leui quadam adstrictione: flore in virgulis tenuibus, candido, copioso, semperuiuo medio simili. In Gallia nusquam alibi quàm in eotractu à se visam & repertam meminit. Aliud Sedum minimum tertium depinxit Lobellius, & huic, inquit, omniù logè minimo ex Syria asportato, folia quàm Sedi minoris minora: cauliculi sesquiunciam æquât, in quibus luteoli flores maiores pro plantæ exilitate, saxifragiæ albæ: radix implicata, fibrata. Idem Semperuiuum paruum graphicè depinxit, Crassulam minorem Dodon. Sedum fœminam Fuchsi: tum Semperuiuum minus æstiuû, Semperuiuum minus Dodon. Sedum minus marem Fuchsi: præterea Vermicularem, siue Illecebram maiorem, qualem hîc expressimus, & semperuiuum minimum seu Illecebrâ. Adhæc Sedum arborescens maius, candidis flosculis, & Sedum minimum arborescens vermiculatum, plantulam quam iisdem Syriæ natalibus habuit, fruticosam & densè geniculatam, cõfertisq; foliis & ramulis: flores luteoli, vermicularis acris, vti tota facies. Postremò Vermiculatum fruticem maiore, fortassè Chamæpitym alteram Dioscoridis: cuius est aliqua varietas. Vtrique densi confortiq; ramuli: sed

quæ maior, foliis est albis densissimè conferta, denticularis vermicularis acris, maioribus. Exilior totaq; minor altera, minus crebris foliis, teretibus, oblongis, & flosculis herbaceis Polygoni.

ERVCA MVRALIS,

CAP. XVIII.

Nomen.
Locus.
Forma.



QUAE Eruca muralis ab herbariis nominata est, in parietinis, murorumq; rimis & inter saxa nascitur, radice parua, breui, candida, foliis propè radicem multis, circa eam sparsis, & vndique ambientibus, oblongis, ambitu laciniato, in caule paucis, caule pedali, tereti: flore in surculis gracilibus & breuibus, albo, violæ simili: semine minuto in tenuibus & longis siliquis, sapore principio fatuo, tandem subacri & mordaci.

ASARVM MURI,

CAP. XIX.

Nomen.
Locus.
Forma.



ASARVM muri hanc plantam herbarij vocant, quòd Asarum foliis imitetur, & quòd nusquam alibi quàm in muris gignatur. Ex parietum fissuris profilit, radice crassiuscula, nodosa, è rufo nigrescente, poly-podij ferè colore, in plurimos fibrarum tenuissimos villos diuisa: foliis paucis, Asaro similibus, venosis, longo pediculò subnixis: nec semen, nec florem vidi.

ASTER MONTANVS,

CAP. XX.

Locus.



ASTER montanus luteus in excelsis montibus gignitur, radicibus multis, è candido flauescens, odoratis: caulibus multis, cubitalibus, villosis: foliis circa radicem densis; in caulibus paucis, longis, venosis, in ambitu laciniatis, hirsutis: flore in summis caulibus luteo, anthemidis capitulo simili: foliis stellatim radiato, in pappos abeunte. Est & Asteris lutei genus, herba hîc depicta, Oculus Christi minor herbariis dicta, in fabulosis tumulis & aridis nascens, quâ Lugduno itur Viennam, radice crassiuscula, nigra fibrata, dimidium



ASTER Luteus, alter oculus
Christi minor.



ASTER Montanus
Hirsutus Pena.



dimidium pedem longa: foliis propè radicem multis, per terram sparsis, canis,
lanuginosis, saluizæ similimis, gustu valde amaris, caulibus tribus aut quatuor, vil-
lofis, vix pedem altis, in quibus folia pauca supradictis minora, capitulo

Chamæmeli chrysanthemī, sed paulò ampliore. Pena etiam Asterem hirsutum pinxit, caule & foliis hirsutis, longioribus, Cynoglossi parui nostri paribus & similibus, radice minùs fibrata.

MYAGRVM,

CAP. XXI.

Nomina
Lib. 7.



ΥΑΓΡΟΝ Græcis, & μελάμπυρον, velut & Latinis Myagrum & Melampyrum nominatur. In Paulo duæ plantæ habentur, nomine & oleoso succo affines, Myaron, scilicet, & Myagron: *μυαρόν* quidẽm impurum significat, & sordidum, cuiusmodi est Melampyrum.

Μυαζον autem muscipulam potiùs, siue muscariam, quæ insidentes, siue præteruolantes muscas glutine suo implicat. At Cornarius hoc Pauli loco Myagron vbique legendum censet, & non Miaron, quòd alià non sit herba à Myagro, ordinemq; lectionis hîc perturbatum esse, vt primùm habeatur Myagri semen, deinde interpositis mitulis sequatur Miaros, &c. quæ eadem sit cum Myagro: quare sic restituendum esse ordinem. Myagros, quam alij vocant Melampyrum, herba est sarmentiticia ac pinguis: pinguedo ipsius corporis asperitates explanare videtur. Semen Myagri pingue est, & quod in ipso est oleosum, meatus obducendi facultatẽ habet. Præterea hoc loco, Myagros quã alij Melampyrcnum, falsò legi in Græcis codicibus *μελάμπυρνον* pro *μελάμπυρον* putat, vt ex Dioscoride liquet. Est & hîc obseruandum, Melampyrum istud ab eo diuersum esse de quò alibi diximus. Id autem triticum vaccinum, siue bouinum vulgò dicitur, quod fortassè *μελάμπυρον* Theophrasti & Galeni esse diximus. Est autem Myagrum siue Melampyrum, auctore Dioscoride, herba surculacea, bicubitalis, folia habens rubiæ similia,

Li. 4. c. 112.
Forma.

MYAGRVM, Dodon.

Li. 17. ca. 12.

Li. 3. ca. 127.
Li. 4. ca. 35.



pallida, semen scæno-græco simile, pingue, quo vtuntur ad lucernas, torrefactum ipsum tundentes, & virgis oblinentes. Non eadem omninò Plinius tradit. Myagros herba ferulacea est, foliis similis rubiæ, tripedanea, semen oleosum, quod & fit ex eo. Dioscorides herbam esse *φρυγανώδη* dixit, idest, surculaceam; Plinius *καρθνιώδη*, idest, ferulaceã. Id Dioscoridis Myagrum Ruellius, & eum secuti Dodonæus, atque alij docti herbarij, eam herbam esse putant, quæ Gallis *Cameline*, & *Camemine* dicitur, Germanis *Flachdotter*, & *Leindotter*, nec eam Matthioli sine ratione intrusit. Cauliculos emittit illa rectos, rotundos, sesquicubitales aut maiores, in multos surculos fissos, folia longa, angusta ferè rubiæ, denticulis in ambitu eminentibus. In surculorum summitatibus flosculi sunt lutei, deinde caliculi lini, sed magis compressi, in quibus semen fuluum scæmo aut scæno-græco simile, sed duplò minus & oblongum. Legitur tamen in vulgatis Dioscoridis exemplaribus semen *παραχλω έοικος*, idest, collo simile, quod Ruellius emendauit, le-

gitq; *τρίλχι έοικος*, idest, scæno-græco simile, quod & de toto caliculo accipi potest. Hanc plantam rustici in Angliâ, Bataniâ, Zelandiâ, Lotharingiâ, Leodij aruis ferunt, quamuis & suæ spontis inter segetes inueniatur, melampyrum Græcis, idest, triticum

MYAGRVM Alterum
*minus, Dalecham.**PSEVDOMYAGRVM,*
Matthioli.*MYAGRVM Aliud Thlaspi*
effigie, Lobelij.

enim dulce & gustui gratum. Myagrum alterum & minus hic depictum exhibent herbarij quidam, quod in agris, & nonnunquam in hortis gignitur, radiculis multis, candidis, tenuibus, foliis erythrodani, minoribus, pallentibus: cauliculis multis, pede altioribus, flore in summo cauliculorum vertice copioso, pusillo, purpura-

triticum nigrum ideo dicta. Semen in areis pa-
uitis rura flagris decutunt, & vannis in auram
vento silentem iactant, dum siliquarum recre-
menta vanescant: tum tritabilibus molis subi-
ciunt, versandoque subinde oleum exprimunt,
quo non ad lumina tantum lucernarum, sed &
ciborum quoque condimenta pauperes vtun-
tur, magno huius olei proventu. Hanc ob cau-
sam quidam minus selanum putarunt. Hoc oleo,
inquit Dioscorides, corporis scabritias leui-
gari, atque expoliri constat. Galenus scribit
myagri semen pingue esse: nam, si tundatur,
oleosum quid effundere, quod emplasticam
vim habet. Diuersam ab his facultatem tribuit
Plinius huic oleo, nempe quod medeatur oris
vulneribus eo perunctis. Sunt qui plantam quam
ex Matthiolo hic ostendimus, legitimum Mya-
grum esse contendunt, sed cum folia rubra non
habeat, sed glasti potius, & semen ei sit nastur-
tij, non scenogræci, ab eis dissentit Matthiolus,
& non Myagrum sed Pseudomyagrum appel-
lat. Nascitur passim inter linum & segetes, &
eius semen audivissimè ab auiculis expetitur: est

Lib. 27. c. 12

scente, semine minutulo, pingui & oleoso. Aliud Myagrum ex Lobellio hîc pingendum curauimus, quod iisdem quibus Camelina oritur locis, Anglis & Belgis hortense, folio paruo, Narbonensis Thlaspi parui vel leucoij marini minimi. Flosculi confertim stipati umbellam exprimunt, stellati, lutei, erysimi vel thlaspeos.

FILIPENDULA ALPINA,
CAP. XXII.

Nomen.

Locus.

Forma.

FILIPENDULAM Alpinam vocant herbarij, quam gignunt summa Alpium iuga pascuis, pratis, & vberimo fœni prouentu greges innumeros atque armenta saginantia, atque inde rusticos ditantia. Hæret illa radice crassa, nigra, multifida. Folia ex radice profert longo pediculo nixa, quæ foliolis multis constant, toto ambitu minutissimè incis, ex aduerso sitis vt in Filipendula, quæ causâ nominis fuit. Caulis pede altior, flores


FILIPENDULA
Alpina.



PEDICULARIS Maior,
Alpina.



luteos spicatum ferè congestos in vertice sustinet, quibus dilapsis vascula succedunt oblonga, antirrhini loculis similia, minuto semine plena. Huic affinis est quæ à quibusdam Pedicularis maior vocatur, & in vertice Montis aurei, Gergobix Aruernorum propinqui gignitur, radice foris nigra, napi modo gracilesciente, rugosa, nonnihil furculosa: caule fermè cubitali, virgato, vnico: foliis filicis, in longo pediculo ordine collocatis, per ambitum crenatis, exeunte per caulem alternatim vnoquoque foliorum pediculo: flore pallido, spicatum in summo caule congesto: semine copioso, in latis corticosis vasculis concluso, alyssi modo.



FOLIORVM Galegæ similitudine, herbâ hanc Galegam herbarij vocarunt, montanam autem vt à Galega vulgari discernerent natalium differentia. Nascitur hæc in asperis montibus, non in eorum quidem salebris aut præcipiitiis, sed in ipsis culminibus, si qua vda planities illic occurrat. Radice nititur crassa, nigra, fibris longissimis & tenuissimis capillata, per summa terræ huc illuc oblique vagis. Caulis multos edit pedales, teretes, folia galega, latiora, eminente costa per medium diuisa, minimè in ambitu dissecta, densius congesta: florem in summis caulibus pisi vel genistæ, luteum: siliquas nigras seminibus plenas, lenticulæ similibus. Efficacem esse aiunt contra venena, lumbricos, morbum caducum & pestem, non minùs quàm Galegam alteram.

Nomina

Locus.

Forma.

Vires.

DENTELLARIA, CAP. XXIIII.



VIDAM Dentellariam hanc vocant, quæ in agri Monspeliaci locis aridis gignitur, radice nigra, supernè crassa, paulatim gracilescente, ima parte fibrata, caulibus multis, pedalibus, foliis longis, propè caulem angustis, in summitate latioribus, media costa diuisis, calendulæ ferè similibus, acerrimi gustus & caustici, in singulis caulibus septenis ferè, aut no-


Nomen.

Locus.

Forma.

DENTELLARIA.

DENTELLARIA Altera, Dod.



uenis,

uenis, quamobrem Enneaphyllum Plinij quidam esse putarunt: flore passillo, copioso, valerianæ penè modo, purpureo, in summis ramis. Dentium doloribus medentur folia trita & carpis admota, pustulis enim inde excitatis, veluti in ambustis, humor dolore efficiens reuellitur, vnde Dentellariæ nomen ei positum fuit. Eodem modo febris quartanæ paroxysmis incipientibus tusam ægrorum carpis admouent, vt rigores citiùs desinant, & natura sensu doloris irritata humorem noxium aut vomitionibus, aut sudoribus valentiùs expellat. Vlceratis quoq; eius imposito corporis aliquot partibus, foràsque euocato pustulis ruptis seroso humore, pestis contagium vitari posse quidam affirmant: nempe venenatis succis pestilenti lue corpora nostra afficientibus, ab internis & principibus partibus, corde potissimum, ad exteriora, & ignobilia reuocatis. Huic iungemus Dentariã alteram Dodonæi & Herbariorum, siue Alabastritem alteram (prima Alabastrites explicata est in Libro, De iis quæ flore placent. Cap. De Anemone, trifoliæ Anemones Dodonæi nomine) Coralloidem alteram Cordi, quæ folia habet non Pentaphylli, quemadmodum Dentaria minor Matthioli, in lib. de Vmbrosis explicata, sed fraxim modo digesta, mediæ costæ annexa, oblonga, lata per margines crenata, crebrò ad vnã costam septena: flores candidos, & siliquas Dentariæ minoris Matthioli similes: radices asperas & squamosas.

POLYRRHISOS, CAP. XXV.

Nomina

Locus.

Forma.

Polyrrh. latifolia.

Locus.


Forma.



RADICVM multitudine herbæ huic nomen datum. Polyrrhizon, inquit Plinius, folia habere myrti & radices multas, cui hanc congruere herbarij autumant, quæ asperis gaudet. Radice est multiplini, nigra, caulibus multis, angulosis, palmum altis: foliis myrti paulò obtusioribus, per interualla geminis: flore pallido, semine in oblongis vasculis. Radices tusæ, inquit Plin. dantur in vino contra serpentes: prosunt & quadrupedibus. Polyrrhizon aliam latifoliam vocant herbarij in Alpium obscuris riguiq; vallibus pro-

POLYRRHISOS Plin.

Dalechampij.



POLYRRHISOS Latifolia,

Dalechampij.



uenientem,

uenientem, radiculis multis, tenuibus, ab vno cespite confibratis, candidis, elleboro similibus, circumquaque diffusis, ob quam radicum multitudinem herbarij Polyrhizi nomen indiderunt: caulibus multis ex vna radice prodeuntibus, ferè cubitalibus, foliis smyrnij, siue petroselinij Alexandrini Officinarum, in ambitu dissectis, ad singulos ferè exortus quinis, venosis, in acumen desinentibus: flore candido, violæ simili, longiusculis furculis fulto, quinque foliolis constante. Copiosa reperitur in montibus qui Muræ Allobrogū oppidulo incumbunt, non procul à Gratianopoli. Valere aiunt ad vlcera maligna, & depascentia, pedumque tumores.

ALYSSVM,

CAP. XXVI.



ΑΥΣΣΟΝ Græcis, similiter Alyssum Latinis sic dicitur, quod morsus à cane rabido mirificè iuuet, auctoribus Galeno, Paulo, & Plinio. Varia autem est Alyssi apud auctores historia. Plinius videtur rubiam minorem Alyssum facere: cum enim de erythrodano seu rubia maiore dixisset, subiungit. Distat ab eo qui Alyssum vocatur, foliis tantum, & ramis minoribus. Nomen accepit quod à cane commorsos rabiem sentire non patitur porus ex aceto, adalligatusque. Mirum est quod additur, saniem conspecto omnino frutice eo siccari. Quæ postrema Cornarius ex veteri codice sic emendauit. Mirum est quod additur, insaniam conspecto omnino frutice eo sanari. Alyssum aliud descripsit Aetius his verbis. Alyssum aiunt esse fideritim heracleam appellatam, quæ iuxta vias nascitur vbique, purpureum florem habens, & folia crassiora. Nomen inuenit ex eo quod commorsus à cane rabido mirificè succurrit. Item Galenus de diuerso ab his Alyssis loquitur, conscripta ab Asclepiade medicamenta ad canis rabidi morsus commemorans. Alyssum, inquit, herba est marrubio similis, asperior tamen, & magis aculeata: circa orbiculos florem ad caruleum vergentem profert. Hanc sub canicula aestu colligere oportet, exsiccata cõtundi cribrari & seruari debet, ne dissiletur. Hæc, opinor, Alyssa omnia à Dioscoridis alyssis discepan, sic enim is suum descripsit. Alyssum paruus est frutex, subasper, folia habens rotunda, fructum

Nomina

Lib. 24. c. 11

Lib. 1.


Lib. 2. Ant.

Lib. 3. c. 89

Forma.

ALYSSVM, Dodonæi.

ALYSSVM, Dalechampij.



duplicis

duplicis scuti figura, in quo semen quadantenus latum. Nascitur in montibus, & asperis locis. Huic Dioscoridis Alyssò nulla planta melius quadrare videtur, quàm quæ hîc ex Dodonæo pro alyssò descripta & depicta est, à recentioribus quibusdâ Lunaria maior appellata. Est enim caule recto, rotundo, cubitum alto, superne

ALYSSVM M, Matth.



Pet. Pet. in
Ad.

Alyssum
minus.

Locus.

Forma.

*ALYSSVM Minus,
Dalechampi.*



Aly. triglo.

Locus.

Forma.

Lib. 3. c. 89.


in tres quatuorve furculos sese findente: foliis primum rotundis, deinde longis, incanis, ac nonnihil tomentosis, asperiusculis, radice exili. In furculorum fastigiis hosculi multi lutei nitent, deinde folliculi asperi, candicantes, compressi, in rotunditate oblongi, clypeolorum effigie, quos duplicatos facit membranula diuidens vtrinque seminum seriem duplicem, quæ sunt compressa, leucoij similia, sed maiora. In hortis colitur ab herbariis. Iunio floret, Iulio semen maturum est. Luculentiore figura sic expressimus. Plantam aliam Itali fecerunt Alyssum, vel Alyssi genus, quos secutus Marthiolus libro tertio omissam tadem depinxit. At doctiorum omnium Monspelienisium, apud quos frequens oritur, sententia, thlaspeos generibus adnumeranda est, non Alyssi, cui multo aptius cõuenit, à Dodonæo depicta. Alyssa alia herbarij depingunt, minus videlicet, quod in sabulosis crescit, radice candida, parum fibrata, satis longa, cauliculis multis, rotundis, lanuginosis, supra terram parum extantibus: foliis multis albicantibus, & tanquam cinere conspersis, aizoo minori similibus, si rotunda & non lata forent, gustu fatuis cum paucula adstrictione: flore in summis virgis copioso, luteo, semine lini, minuto, rufo, in loculis scuto similibus, duplicibus, membrana tenui & pellucida distinctis. Alyssum aliud trigonum ob loculorum seminis triquetram figuram nominant, quod nascitur in asperis, lapidosis, & folis diuturna mora æstuosus locis: radice breui, lignosa, parum fibrata, caulibus tribus aut quatuor palmum altis, foliis oblongis, angustis, in ambitu minimè diuisis, per interualla prodeuntibus, flore Aprili emicante: femine rotundo, minuto, papaueri simili in conceptaculis triangularibus, scuto figura similibus, vt & in Alyssò. Aliud Alyssum ostendit Lobelius, Germanicè Echioides, siue facie Molluginis, Aparine Plinij creditum. E' radice geniculata, bicubitalibus, cauliculis asperis, Aparines ritu vicina quæuis arripit: folia bina & terna ex atro virentia, Echij modo hispida, Rubiæ paria, & aliquando maiora, hosculi purpurei violacei, Echij min ores verticillatim Cruciatæ modo à medio caule summe tenus dispositi. Semen in uolucris

uolucris foliaceis sinuosis sesamo simile aut Thlaspi, fuscum, gustanti dulce clauditur. Vniuersa planta gustu Echium æmulatur. Eximias Alyssi vires tradit Dioscorides, his verbis. Alyssi decoctum, inquit, singultus sine febris potu discutit, idem efficit si quis teneat, aut odoretur. Cum melle tritum lentiginis, & maculas

*ALYSSVM Trigonum,
Dalechampij.*



*ALYSSVM Germanicum
Echioides, Lobel.*



sole contractas purgat. Putatur & rabiem canis sanare contusum in edulio, & exhibitum (sunt enim hæc Dioscoridis verba, *δοκεῖ δὲ καὶ λύσσει κυνὸς ἰσθμὸς συγκοπὴν ἐν δόσιν καὶ διορῆν*, quibus significare videtur, Alyssum ipsius canis rabiem sanare, nisi *λύσσει κυνὸς* eam rabiem, quæ ex cane homini inducta sit accipere velimus, vel legatur locus is vt in veteri codice, *δοκεῖ δὲ καὶ λυσσοδινήλους* And.Lac. *ἰσθμὸς*, &c. id est, contusum in cibis exhibitumque, iis, quos rabidus canis momordit, mederi videtur.) Sed & in domo suspensum salutare esse creditur, tum hominibus, tum aliis animalibus, ne à fascino lædantur. Quin & puniceo panniculo alligatum, pecorum morbos abigit. Quod verò de singultu ille, idem Plutarchus scripsit, *τὴν δὲ ἀλυσσον καλεσμένην βοτάνην καὶ λαβόντες εἰς τὴν χεῖρα μόνον, οἱ δὲ καὶ πρὸς βλεφάρους, ἀπαλλάττονται λογμῶς*. Id est, Alyssum herbam manu tenentes solum, alij verò intuentes, singultu liberantur. Galenus dilucidius eius facultates declarat. Nuncupata est Alyssum herba, quòd mirificè iuuat morsos à cane rabido: sed Lib. 3. Sym. & rabienti quoque data sæpè in totum sanauit, atque hoc ex totius substantiæ similitudine efficit, dictumque prius est talem facultatem sola percipi experientia, & planè nulla constare methodo. Quod si quis ad multa experiatur, cognoscet facultatem habere mediocriter siccantem & digerentem, cum hoc vt absterforium nonnihil etiam obtineat. Hac ratione & vitiliginem & ephelem purgat. Lib. 6. sim.

Nomina

Forma.



ΣΚΛΗΠΙΑΣ Græcis, Asclepias Latinis, quibusdam κισσιον, id est, hederula, & κισσοφυλλον, hederæ folium, Herbariis Hirundinaria, Officinis Vincetoxicum, Germanis *Schunualbennuere* appellatur. Asclepias autem ab Aesculapio, qui Ασκληπιός Græcis dicitur, antiquo medicinæ auctore, nominata est: hirundinaria verò à siliquis quas producit, quæ dehiscen-
 tes plumosum semen ostendunt, atq; adeò hirundinis effigiem referunt. Vincetoxicum, vel rectius νεφροξικον, quòd illi insignis aduersus venena vis insit. Asclepias, vt describit Dioscorides, ramulos profert longos, in quibus folia longa, hederæ similia, radices multas, tenues, odoratas, flores grauitè olentes, semen securidacæ.
 Lib. 3. c. 90. Nascitur in montibus. Eadem prorsus Plinius habet. Asclepias folia hederæ habet,
 Lib. 27. c. 5. ramos longos, radices numerosas, tenues, odoratas, floris virus graue, semen securidacæ. Nascitur in montibus. Ex qua descriptione perspicuum est Fuchsum & Dodonæum rectè Vincetoxicum pro Asclepiade depinxisse, illumq; à Matthiolo minis rectè reprehensum. Nam caules fert laues, rotundos, tenues, flexiles, fractu contu-

VINCETOXICVM

sive Asclepias, Fuch.



VINCETOXICVM,

Matthioli.



maces, cubito altiores, in his folia quidem hederæ, rigida, ex atro virentia, sed aliquantò longiora, & quasi supernè mucronata: flores in petiolis exiguos, candicantes, odoris grauis, & ingrati, herba virente, quibus succrescunt siliquæ teretes, oblongæ, quæ dehiscen-
 Lib. 3. c. 90. tes semen cohibent securidacæ simile, id est, rufum & latum, lanugine obuolutum. Radices longæ sunt, rotundæ, innumeris ferè capillamentis fibratæ, odoratæ. His accedit locus natalis, prouenit enim in montibus asperis, altis & arenosis, aut aridis collibus, præsertim Narbonæ, & apud Ligures Taurinos. Præ-
 Lib. 27. c. 5. terea vires consentiunt. Radices cum vino potæ, inquit Diosco. torminibus & venenatorum morsibus auxiliantur, folia imposita ad mammarum & vteri maligna vlcera faciunt. Sic Plinius. Radices torminibus medentur, & cõtra serpentium ictus non solum potu, sed etiam illitu. Galenus ait Dioscoridem de Asclepiade scripsisse
 se verò

se verò nondum eius periculum fecisse. At Paulus scribit calidam siccamq; esse, & tenuis substantia: torminibus in vino potam competere, illitam verò venenatorum moribus, & malignis mammarum ac vteri vitiis succurrere. Sic vincetoxicum amarum est, parum glutinosa eius radix. Folia aliquam præferunt adstrictionem. Recentiores eius radice vsi, primum cum aduersus venena, tum ad vlcera, magnū sibi

Fuch. Ibid.
Penain
Ad.

ASCLEPIAS Nigra,
Dalechampi.



& planta nomen pepererūt, neq; posterī potuerunt postea adduci, quin pro Asclepiade agnoscerent & vterentur. Adhuc eiusdem radice vtuntur magna efficacia ad mensium prouocationem, & ad rabidi canis morsum, eandem in vino maceratam & coctam hydropicis mirè auxiliari tradunt: flores præterea foliaque siccata, mox trita vulneribus vtiliter inspergi aiunt, sordida etiam vlcera purgare, & ad cicatricem perducere, genitaliumque vitiis & rupturis egregiè mederi docent. Ob superioris asclepiadis similitudinem, herbarij hinc appictam Asclepiada nigram vocant, à floris colore. Est enim antedicta toto plantæ habitu similis, viribusque iisdem prædita, solo floris atro colore discrepans. Eadem prorsus, opinor Lobellij est Asclepias altera flore nigro, siue aliud Vincetoxicum, in agri Mospeliensis collibus. Frontignani vicinis, & Belgij hortis, quod à floris pullo colore, non nihil purpurante, minimè albo, vt alterius, nigrum vocatur, cauliculis flexuosis ternum & quaternum cubitorum, proxima quævis fulcræ Periplocæ modo, quam etiam quia refert, Periplocam fecerunt, scandendo ambit: cætera priorī similia, succo pallido turget.

CERINTHE PLINII. CAP. XXVIII.



PLINIUS Cerinthen scribit esse folio candido, incuruo, cubitalem, capite concauo, mellis succum habente, horum floris auidissimas esse apes. Quam herbam conieciarunt docti herbarij esse eam quæ hinc depingitur, in aridis & apricis prouenientem, radice longa & crassa, caulibus multis, rotundis, pedalibus, foliis longis in acutum desinentibus, superne candidis, punctis quasi de industria notatis, inferne villosis, caulem ima sui parte sic ambientibus, vt per rimam in iis diuisis caulis traicere videatur. In surculos caules diuiduntur, qui florem oblongum dactilidi similem, sed minorem, luteum, in cacumine fundunt, quo delapso in vasculis minutum semen continetur, per ambitum crenatis, exstante in medio apice tenuissimo. Pulmonariam & alias plurimas plantas videmus maculis insignes, sed quæ tam crebris & densis, atq; ita distinctis conspersa sit, nullam hæcenus vidi. Parisienses in hortis alunt, ac nominis huius ignari telephium vocant.

Lib. 21. Cap. 1.

Locus.

Forma.

Nomina

Locus.

Forma.



FLORIS puniceo siue ferrugineo colore, & foliorum cum Elleboro albo similitudine, hanc Elleborinem ferrugineam siue puniceam nominarūt herbarij, quam ab Elleborine Dioscoridis plurimū differre non ignorant. Est, inquiunt Pena & Lobellius, recentiorum cal-

ELLEBORINE Ferruginea,
Dalechampij.



Tempus.

Vires.

ceolus Marię, Damafonium nothum Dodonęi de florib. In asperis, sitientibus, & confragolis montium iugis nascitur, radice obliqua polygonati modo carnosā, subrufa, in quam plurimas fibras, huc illuc vagantes diuaticata: foliis Ellebori albi, septem aut octo, latis, venosis, ima sui parte caulem amplectentibus, nec ab eo separatis: caule pedali, flore in caulis vertice vni- co, in quatuor foliola, radiis familia extrinsecus diuiso, quorum duo latiora sunt, duo angustiora, ferruginei coloris. Hęc cauum quidpiam galero aut calathio simile circundant luteum, intrinsecus lineis rubris virgatum. Ex radiorum medio velut ex aperto hiantēque rictu lingua duplex porrigitur, candicans, canaliculata, extrorsum altera, altera introrsum, exili breuīque fulta pediculo, eleganti & planē admiranda floris specie. Maio mense floret. Amari gustus est, & odoris nonnihil grauis. Vulnerariam herbam esse, plagasque recenter illatas sanare aiunt.

THALICTRUM, Dodon.

CAP. XXX.

Nomina

Lib. 4. c. 93.

Forma.

Lib. 27. c. 13.

Lib. 6. sim.

Forma.

Dodo. lib.

1. cap. 77.

Pena in

Aduer.



VOD Græcis θαλίτρον & θαλίτρον nominatur, similiter Latinis Thalictrum & Thalietrum. Id sic descripsit Dioscor. Thalietrum folia coriandro similia habet, sed pinguiora, caulem rutæ crassitudine, in quo folia. Plinius iisdē ferē verbis depinxit. Thalietrū folia coriandri habet, pinguiora paulō, caulem papaueris, nascitur vbique præcipuē in campatribus. In quibus ~~populos~~ legisse videtur, id est, papaueris, ~~pro~~ ~~ωγυλός~~, id est, rutæ. Dioscoridem secutus est Galenus scribens. Thalietrum folia habet coriandro similia, caulem crassitudine rutæ. Sed tam succincta delineatio facit, vt alij aliam herbam pro Thaliētro exhibeāt. Doctiores tamen eam quæ hodie à Chirurgis Sophia dicitur, Germanis *Vulsformen*, Thalietrum esse asserunt, tum propter figuram aptē congruentem, tum propter eximias sanandi vlcera maligna vires. Est enim foliis minutissimē incisis, coriandri, sed tenuioribus,

tenuioribus, aut absinthij Romani albicantibus, caulibus sesquicubitalibus, rotundis, rectis, lignosis, rutaceis, pallidos vel luteos flores in summo proferentibus eructæ, vel sinapi siluestris, nec dissimiles siliquas, sed exiliores, semen exile, rubellum cohibentes. Secus vias, incultis locis, macerisq; frequens est. Iunio mense floret in Septembrē vsq;. Talictum, inquit Dioscorides, vlcera antiqua ad cicatricem perducit. Scribit Galenus vim ei inesse exsiccatōriā citra morsum, quare vlcera inueterata cicatrice obducere. Plinius folia mederi vlceribus ait cum melle. Sic Sophiam tradiderunt Chirurgi practici, qui ætate Guidonis, & Petri Argelata: vixerunt vlce ra antiquata & maligna sanare & glutinare, semen eius cum vino aut aqua chalybeata potum dynteriam. alui & sanguinis fluxiones cohibere. Fuchsius, Tragus, Cordus, perperam Seriphium Germanicum fecere.

Locus.

Tempus.
Ibidem.

Vires &

Temper.

Lib. 6. iim.

libid

Cap. 1.

ATHANASIA LEUCANTHEMOS, CAP. XXXI.



THANASIA leucanthemos in nemoribus & dumetis aridis prouenit, radice plurimis fibris capillata, caule cubitali, & nonnunquam altiore, ramis multis brachiato, foliis Athanasie chrysanthemi, paulo magis dissectis, coriandri ferè incisuris, gustu principio subdulcibus, sed cum diu mansa fuerint, os & fauces incendentibus, pyrethri ferè modo, sed imbecillius: flore in ramorum fastigio radiato, per ambitum candido, intus melino. Hanc plantam Vchnam albam esse Auicennæ quidam volunt: vel, vt legit Bellunensis, Achnam, citrinam volent Athanasiam chrysanthemum, licet interpres Vchnam conuertat matricariam, quam vnus tantum generis & non duplicem agnoscimus, vt propterea interpreti fides minus habenda sit. Caterum huic nostræ plantæ conuenit quod Auicenna scripsit, Vchnam candidam lutea valentiorē esse. Hæc enim vt Athanasie luteæ sapore perquam amarum feruida acrimonia sua longè vincit, sic ab ea odoris gratia superatur. Quare hæc videretur esse Tanacetum nō odorum siluestre Lobellij & Penæ, sponte in Delphinatu propè Valentiam frequens, nullo odore præditum.

Locus.

Lib. 2. c. 73.

AMBROSIA,

CAP. XXXII.



QVEMADMODVM Αμβροσία veteribus Græcis τὸ τῶν θεῶν βρῶμα, id est, deorum cibus dicitur, quod mortales eam non edant, vel quod qui eam ederint immortales euadant, ita eximia fragrantia gratia etiam diuis expetita, ne dum coronamentis, plantæ Ambrosie nomen dedit, vel quod eius in cibis vsus longæuos faciat homines. Hæc, vt scribit Dioscorides, frutex exiguus est, tres palmos altus, ramosus, folia habens circa caulis exortum parua, vt rutæ. At cauliculi seminibus referti sunt, similibus racemulis, qui nunquā florent, odor est vinosus, iucundus, radix tenuis, longitudinis duorum palmorum. Nescitur in Cappadocia in coronas. Plinius eadem tradit. Ambrosia vagi nominis est, & circa alias herbas fluctuantis, fruticem vnū habet, densum, ramosum, tenuem, trium ferè palmorum, tertia parte radice breuiore, foliis rutæ. Circa imum caulem in ramulis semen est, vis dependentibus, odore vinoso, qua de causa Botrys à qui-

Nomina




Lib. 3. c. 112.

Forma

Lib. 27. c. 4.

In cap. 112.
lib. 3.Ambrosia
tenuifolia.

busdam vocatur, ab alijs Artemisia. Coronatur ea Cappadoces: Matthiolus genuinam Ambrosiam quam hic depinximus, esse credit, eadem quæ Ambrosia spontanea strigosiôr Lobellij: alteram tamen quam prima Latinorum commentariorum, editione pro vera expresserat, etiam Ambrosiam facit, vt altera mas, altera fœmina, dici possit, aut certe congeneres plantæ vt ambæ censeantur. Verum posterior non

AMBROSIA Prima, Matth.*AMBROSIA Altera, Matth.**AMBROSIA Hortensis
procerior, Lobellij.**AMBROSIA, Montana.*

Ambrosia,

Ambrosia, sed Artemisia tenuifolia multis videtur esse. Saxosis locis sponte nascitur Ambrosia, nunc non nisi in hortis colitur, in quibus si procerior, quam quæ sponte oritur, fuit, non est quod quis ob id Ambrosiam esse neget, cum planta aridis vel saxosis locis nata, si in hortis colatur, facili incrementum capere, & habitior atque vegetior reddi possit, qualem pictura hæc ostendit, quæ est Ambrosia hortensis campestrem & sponte enatam foliorum magnitudine, longè superantis, odore, sapore, habitu non diversis. Vires Ambrosia à veteribus assignata tam egregiæ appellationi haud respondent. Vim habet, inquit Dioscorides, sustendi ac reprimendi, & illiciti adstringendi humores, qui in aliquam partem illabuntur. Plinius, usus eius ad ea quæ discuti opus est. Verù his verbis Plinius vim repellendi ἀπορροῦσθαι Dioscoridi dictam, in vim discutiendi διαρροῦσθαι appellatam commutauit. Nam & Galenus scribit Ambrosiam illitam vim habere adstringentem & repellentem. His subiungemus plantam quam Ambrosiam montanam Herbarij vocant. Quæ ex obseruatione Dalechampij, in Allobrogum monte Gratianopoli vicino quem Diui Ænardi vocant, in alta & opaca silua gignitur, fruticosa, exili radice, prolixa admodum, lignosa, nigricante: quatuor aut quinque cauliculis, dodrantalibus erectis: foliis Idææ viti aut pruno siluestri similibus, venosis, subrotundis, in ambitu nonnihil serratis, quatuor aut quinque fere simul ex eodem in caulibus loco prodeuntibus: bullis multis absque flore, in caulium summis virgulis racemetim coherentibus, angulosis, subrotundis, prominente è singulis apice, muscarum rostro sine proboscidi simili, saporis acerbi.

Locus.

Forma.

Ibidem.

Li. 6. simpl.

Locus.

Forma.

ANTHYLLIS,

CAP. XXXIII.



ANTHYLLIS,

II. Herbariorum.



ANTHYLLIDES aliquot explicauimus in libro de maritimis plantis, quasdam alii hoc aptiore loco declarabimus. Primum eam quam Anthyllidem secundam vocant herbarij, Monspelienfes Iuam muscatã, in agro Monspelienfi vbique nascentem, radice crassiuscula, modicè fibrata, non admodum longa, candicante, tribus aut quatuor cauliculis, dodrantalibus, minimè furculosis, ex eadem radice surgentibus: foliis Chamæpityos tertiam circum caules densis, in vertice potissimum, oblongis, in ambitu dissectis, sed non Chamæpityos modo in tria foliola fisis: flore purpureo ad foliorum exortum ex interstitiis prodeunte, odorato: semine in vasculis exiguo. Eandè agnouit Pena, & Anthyllidem Chamæpityoidem vocat, quæ in oliuetis, inquit, & aridis aruorum marginibus Narbonæ ac Galloprovinciae fruticat, nec alibi temerè nota. Moschata autem vulgò vocata fuit, quòd odora quidem sit, sed olfactu minimè grata, nec pinum redoleat, verè & odorata chamæpityi cognata, sed rigidioribus furculis, sarmentosis, lignosis, breuioribus, foliis latioribus, longioribus, leuiter incis, copiosis, lanugine obductis: floribus inter hæc maioribus, purpureis, semine hirsuto: radice lignea, gustu amaro, ingrata tota, & nonnihil styptica. Clusius Anthyllidis alterius nomine depinxit. Alia est Anthyllis montana, quæ in vmbrosis montibus nascitur, radice breui, contorta, alba, modicè fibrata, caulibus

ANTHYLLIS

Montana.



ANTHYLLIS Altera

Italarum, Lobellij.



multis, palmum altis, rotundis, foliis densis, per caules alternatim dispositis, longis, linariæ modo, propè caulem trifidis, gustu subsalsis, è quorum medio, flos exit, deinde semen minutulum in rotundis loculis lino similibus, quibus herbaceus apex veluti præfixus insidet. Lobellius pinxit Anthyllidem alteram Italarum Camphoratæ congenerem (de qua in fine libri huius dicemus) stirpem tenuifolia, humilem pinum exprimentem, quam Dioscoridis alterum Anthyllidem Aiugæ foliis & ramulis putabant Itali docti. Sed quum minùs olida sit, Monspeliensium Iuam Moschatam pro secunda Anthyllide retinendam censer. Surculis, foliis, ortu & facie Camphoratam adumbrat: sed exilior tota & summis virgultis, tomentosiss, muscosis flosculis, luteo pallentibus, gustatu præficcis.

LINARIÆ,

CAP. XXXIII.

Locus.

Forma.

Linar. cærulea.

Forma.

Locus.

Tempus.

Vires.

MULTAS Linariæ species herbarij obseruarunt, quarum aliquot hîc depinximus. Prima est Linaria tenuifolia cognominata, quæ in aridis, macris, & per flatis nascitur: radice valde capillata, nigra: caulibus multis, dodrantalibus, rotundis: folio lini, tenuissimo & subtilissimo: saporis subauter: flore copioso: priusquam hiet, rubente: cum apertus est, ex rubro albicante: semine minutulo: in oblongis & corticosis vasculis. Linaria cærulea radicem mittit duram, lignosam, albam: folia proximè radicem multa, burse pastoris similia, laciniata, rariusculè venosa: caulem cubito prociorem, foliis veltitum, longis, Linariæ similibus, angustioribus, nigrioribus, per ambitum minimè incis, quinis sensive ex vno pediculo in caule extante simul prodeuntibus, capillacea tenuitate: ramulis multis, gracilibus: flore copioso, ex cæruleo albicante, in thyrsi modum congesto, quo decedente vascula subsequuntur infernè valde compressa, superne latiora, bifida, vt in Elatine. Gignitur in aridis, squallētibus & apricis. Floret Maio desinente. Totius plantæ sapor amarus est. Ulcera sordida purgat, lumbricos interficit,

*LINARIA Tenuifolia.**LINARIA Carulea, Dalech.**LINARIA Odorata, Dod.**LINARIA Minor, Dalech.*

interficat, obstructions expedit. Linariam odoratam proferat ager Lugduno vicinus foliis similem vulgari. Caterum huius flos ex caruleo candicat, vulgaris subluteus est, & corniculata cauda terminatus, ille minimè: præterea suavissimè olet, quàm obrem odoratam vocauerunt, cum vulgaris flos grauem odorem spiraret. Linariam odoratam etiam pinxerunt Dodonæus & Clusius, quæ singulari est caule, nonnunquam cubitali, in multos tenues ramulos superne diuiso, quos oblonga folia,

folia, lino similia ambiunt, quæ tamen iuxta radicem sunt humi sparsa, longè maiora latioraque, bellidis foliis similia, sed per ambitum serrata, nonnulla etiam per caulem sparsa, altius incisa: flos exiguus, copiosus virgulis seu ramulis spicatum insidet, cæruleus, lauandulæ ferè æmulus extrema parte hamuli instar incurvus

LINOSYRIS Recentiorum, Lobell.



LINARIA Aurea, Tragi.



(quem pictor non satis accuratè expressit) aliquantulum odoratus: semen exiguum, rufum, in valvulis, linariæ similibus, sed minoribus continetur. Radice est singulari, candicante, minimi interdum digiti crassitudine. Sponte prouenit montosis Castellæ locis, lapidoso & arido solo, vbi Aprili floret, & Maio, Iunioq; semen profert. Linaria minor in saxosis & asperis Arbæ fluij propè Geneuam ripis gignitur: radice breui, nigricante, capillata: cauliculis multis, dodrantalibus: folio lini, numerofo: flore purpureo, corniculo simili, phæniceum verticem amplectente, & contegente: semine paruo, in rotundis vasculis, lino similibus, præfixo pilo tenuissimo insignibus, capreolo simili. His addenda ex Lobellio Linosyris recentiorum, quæ sic vocarunt propter similitudinem cum Linariis & Scopariis. Est enim virgis rigidis & foliis Scopariæ aut Oxyridis vulgaris: sed flores in summitatibus luteo fuluo languent, Asteris montani angustifolij vel Crithmi Chrysanthemi situ & positu: parilitate & effigie conyzæ maioris aut minoris. Cauliculi pedem & cubi-

PASSERINA, Linaria folio, Lobellij.



tum æquant. Hanc in collibus Narbonensis Gallia non procul à mari erutam meminit Lobellius: quæ ad Balnea propè Frontignanum itur. Est acris gustati, glutinosa, amaricans, Senæ amulo sapore, ad Thymelæam accedente. Tum Linaria aurea Tragi, Hyssopus umbellifera Dioscor. Guilandino, Helichrysi genus. Prorsus genere eadem Linosyridi videtur: facie siquidem, iisdem foliis & cubitalibus summis alis multifidis cauliculis neutiquam diuersa: sed extrema florum bullata capitula copiosis aureis villis referta, fulgent: radix lignosa, fibrata, semen exiguum. Præterea Passerina Linariæ folio, Linariis ob simile effigiem reddenda: folia etenim Linariæ similia, sed acuatim in capitulis coriandrinis seminibus paribus, summis Chrysocomes similibus, pallidioribus, furculosis pediculis lini flosculi pallentes. Ex agro Monspelienfi oriunda. Hæc Lobellius.

HYPERICVM,

CAP. XXXV.



VÆ planta Græcis *ὑπερικόν, ἀνδρόγαμνον & χαμαίπυτος*, Latinis similiter Hypericum, Androsæmum, & Chamæpitys nominatur, Mauritania *Reiofricon*, & *Reiofaricon*, Italis *Hyperico*, & *Perforata*, Germanis *S. Iohanskraut*, Hispanis *Coraconcillo*, Gallis *Millepertuis*. Androsæmum ob florem, qui digitis confricatus sanguineum emittit liquorem, dixerunt: Chamæpityn verò ab odore feminis resinaceo: Perforatam, & *Millepertuis*, quòd folia soli obuersa innumeris foraminibus scatere, & omni ex parte punctis quibuldam pertusa esse videantur, quod neque à Dioscoride, neque à Plinio annotatum fuit. Hypericum, ut descripsit Dioscorides, frutex est sursulosus, palmi altitudine, folia

Nomina

Lib. 3. c. 153.
Forma.

HYPERICVM, Matth.



habens rutæ similia, florem luteum, (in vulgatis Græcis exemplaribus Leucoij mentio nulla, in Oribasio tamen legitur, *άνθος ἔχον κήληνον, λευκοίφ ὁμοιον*, idest, florem habens luteum, Leucoio similem, quam lectionem Matthiolus approbat. Nam Hypericum floris colore violam luteam proximè refert, vtendumq; voce Græca Leucoij cêset, ne ex albo aliqua suboriatur difficultas, quod fortasse Marcel. Florentino imposuit, qui florem Hyperici album interpretatus est,) qui inter digitos tritus sanguineum succum remittit, ramulos subhirsutos, in rotundo oblongos, magnitudine hordei (inemendati sunt hoc loco vulgati codices Græci, *κλωνάρι ὑποδάσσα, τρομήκη, ἐν τῷ περικερφεῖ, μέγεθος κελθῆς, ἐν ᾧ σπέρμα*, &c. in quibus necessarium deest vox, locū quò semen cōtineatur significans. Quare hanc lectionem minimè secutus Ruellius legisse videtur, *περικέρπια ὑποδάσσα*, vertit enim subhirsuta siliqua, & in rotundo oblonga, hordei magnitudine, semine intus nigro, &c. Cornarius verò sic legit, *κλωνάρι ὑποδάσσα, κερπὸν τρομήκη*, &c. Idest, ramulos subhirsutos, fructum in

rotundo oblongum, hordei magnitudine, &c.) in quo semen nigrum, resinā olens. Nascitur in locis cultis, & asperis. Ex hac Græci codicis emendatione, & præcipuarum huius plantæ notarum declaratione, neminem latere potest, eam Hypericum Dioscoridis esse, quæ hodie à Medicis & Chirurgis maximè celebratur, & vsu quotidiano vsurpatur. Sunt autem notæ maximè duæ, quæ id certò demonstrant:

nempe

Locus.

Li. 26. ca. 8.

Tempus.
Vires.

Lib. 16. c. 8.


Li. 8. simpl.

Ca. 13. li. 3.

nempe cruentus florum contritorum succus, qui odori sunt, pingues, glutinoso cōtactu hærentes, & feminis odor resinaceus, in pericarpis copiosi, amari & ingrati gustanti. Plinius non omninò Discoridi consentit, etiam si de eadem herba agat, his verbis. Eadem præstat Hypericum, quam alij Chamæpityn, alij Conon appellant, oleraceo frutice, tenui, cubitali, rubente, folio rutæ, odore acri, semine in siliqua nigro, maturescente cum hordeo. Hæc Plinius. Hypericum æstate floret, Iulio potissimum & Augusto mensibus. Vim habet ciendi urinā, auctore Dioscoride, & ducendi menses appositum. A tertianis quartanisque cum vino potum liberat. Semen quadraginta diebus potum ischiadicis medetur. Folia cum semine illita sanant ambusta. Natura semini Hyperici spissandi, inquit Plinius, aluum sistit, urinam ciet. Ad calculos vesicæ cum vino bibitur. Galenus verò scribit calefacere & siccare, essentiaq; tenuis esse, adeò ut & menses & urinas prouocet. Sed adhæc totum sumendum esse fructum, non tantum semen. Porro cum foliis viridem illitam ad cicatricem ducere cū alia, tum omnia ambusta. Cæterum si sicca contusa inspergas, humida & putredinosa vlcera sanare. Sunt & qui ischiadicis bibendū exhibeat. Hyperico, ut scribit Matthioli, vis inest referadi, resoluendi, agglutinadi, atque etiam cohibendi. Eporum semen ex vino calculos eiicit, & venenis aduersatur, venenatorumq; moribus resistit, tum idem potum, tum herba ipsa deuorata haustave, tum moribus illita. Aqua stillatitia florecentis herbæ maximè prodesse dicitur comitialibus & resolutis, si iis potanda detur. Datur seminis farina cōmodè cum Polygoni succo ad sanguinis reiectiones. Inest floribus & femini mira facultas ad vulnera omnia sananda, præter ea quæ in capite sunt. Ideoq; oleum in quo diu flores & semine prægnantes siliquæ maceratæ fuerint, diuq; insolatæ, mirificè

HYPERICVM Humistratum, Clusij.Li. 2. Stirp.
Hist. c. 70.*HYPERICVM Tomentosum, Lobellij.*

recentia vulnera sanant: sed id efficacius præstat, si cum laticæ, aut abiegnae lacrymæ oleo misceatur. Idem per se ventri illitum dysentericos iuuat, potum verò cochlearis mensura lubricis necat. Clusius Hyperici genus ostendit, quod multis constat ramulis per terram stratis, numerosis, confertisque foliis eos ambientibus, alteri Hyperico similibus, sed planè tomentosus & incanis: flores sunt secundū ramulos lutei, aliquantulum tamen pallidiores & minores quàm in vulgari, quibus succedunt capitula vulgari similia: radix lignosa

HYPERICVM Syria-
cum, Lobellij.

lignosa & dura: rami etiam ipsi per terram strati radices & fibras agunt. In conuallibus quibusdam non procul à Salamantica crescit, vbi Iulio florent plantæ latè sese diffundentes: item in Valentini regni maritimis, vbi Martio florent. Proculdubio hæc inter Hyperici genera referenda est, cum plurimum illi respondeat: imbecillior tamen, & vulgari magis odora. Lobellius adiecit aliud Hypericum tomentosum, quod prouenit in locis agri Monspeliensis natura vliginosis, sed feruidiore sole exutis, palmo non maius, & humi stratum, foliis item minoribus, & per interualla rarioribus: flore & semine luteolis, pallidioribus. Tota planta cana est & hirsuta, minus odorata, Hyperici sapore, sed imbecilliore. Præterea Hypericum Syriacum & Alexandrinum, cuius folia quadruplò minora sunt quàm nostri Europæi, quæ summis cubitalibus virgultis confertim tanquam in verticulis exeunt. Flores lutei nostri per similes.

ASCYRVM,

CAP. XXXVI.



ΣΚΥΡΟΝ & ασκυροειδές, atque etiam Ανδροκυρον, Latinis similiter Ascyron & Ascyroides. Hæc Hyperici species est, inquit Dioscorides, magnitudine differens, maiores ramos habens, furculosiores, puniceosq; folia tenuia, flores luteos, fructu Hyperico similem, resinacei

Nomina

Li. 3. ca. 150.

Forma.

ASCYRVM, Matth.



odori, qui cum digitis teritur, ipsos sese cruentat: qua de causa Androsæmum vocauere. Plinius parum à Dioscoride discrepans, scribit, Ascyrum & Ascyroides similia sunt inter se & Hyperico, sed maiores habet ramos quod Ascyroides vocatur, ferulaceos, omnino rubentes, capitulis paruis, luteis: semen in caliculis, pusillum, nigrum, resinosum. Comæ trita velut cruentant, qua de causa quidam hanc Androsæmum vocauere. Galenus Ascyron Androsæmi genus facit, ut dicitur. Verum id Ascyron est à Matthiolo cum Hyperico affabre in commentariis expressum, quale & hic depinximus, iam notissimum, amnium & rigorum, riuulorumq; pratensium amans valde, quadratos & rectos viticulos è radice multum fibris sparsa exiles erigens, Hyperici foliis, paulò maioribus, venosis, poros peruios habentibus, & floribus itidem luteis, coccineum cruorem affricanti illinentibus: seminis odore resinaceo sui indice, nares feriente, haud disparis, sed infrequentioris vsus. Facit huius fructus, inquit

Lib. 27. c. 5.

Li. 6. simpl.

Pena in Aduerf.

Lib. 3. c. 54.

Vires.

Lib. 27. c. 5.

Dioscorides, cum hydromelitis heminis duabus potus, ad ischiadas ducit enim recrementa multa. Sed assidue dare oportet donec sanitati restituantur. Idem impositus ambustus prodest. Plinius, usus seminis, inquit, ad ischiadicos, poti duabus drachmis in hydromelitis sextario. Aluū soluit, bilē detrahit. Illinitur & ambustis.

ANDROSÆMVM,

CAP. XXXVII.

Nomina

ΝΑΡΟΣΑΙΜΟΝ quibusdam Dionysias & Ascyrum, Latinis etiam Androsæmum nominatur, quasi humanum sanguinem dixeris, quod sanguineum succum emittat. Ab hyperico ascyroq; differt, ita tradente Dioscoride, quod fruticet ramulis furculosis ac tenuibus, virgis puniceæ coloris, folia habens triplo aut quadruplo maiora quam rutæ, quæ trita vinosum succum remittunt: alas in cacumine pinnatas, circa quas flosculi parui, lutei: semen in calice simile semini papaveris nigri, velut lineis notatum. Coma contrita resinofum odorem reddit. Plinius, Androsæmum, inquit, siue vt alij appellauere, Ascyrū non ab simile est Hyperico, de quo diximus, cauliculis maioribus, densioribusq; & magis rubentibus: folia alba, rutæ figura: semē papaveris nigri. Comæ trita sanguineo succo manant: odor resinofus. Gignitur in vineis medio Autumno effoditur, suspenditurq;. Androsæmum ex Matthiolo hīc pictū damus, quod etiam Lobellius & Pena approbant, in opacis & siluosis proueniens, non modò floribus, sed etiam foliis tritis & expresis muriceum succū reddēs, quo vno

Lib. 3. c. 155.

Forma.

Li. 26. ca. 4.


Locus.

Ca. 155. li. 3.

ANDROSÆMVM,
Matthioli.ANDROSÆMVM, *Dod.*
11. Fuchf.

præ cæteris Androsæmum hoc agnoscendum, & discernendum. Procerius est maiusq; Hyperico, & altero tanto maiora folia habet, sed pauciora, eidem etiam similis flore, & semine procerioribus, cubitalibus, gracilibus, rotundis, rubentibus ramis. Androsæmum aliud ostendunt Dodonæus & Fuchsius, quod Itali Clymenum putant, pleriq; Sicilianā appellant, quod in Sicilia tantū reperiri falso credūt, quidam Clymenū Plinij, Galli *Toutesaine*, quasi Panaces, idest, omniū morborum remedium

ANDROSÆMVM

Aliud, Dodon.

ANDROSÆMVM

Album, Dalechampij.

Caterum in vino austero decocta, vinum ipsum vulnerum grandium glutinatum efficiunt.

remedium. Hæc plâta semper virēs virgas producit vimineas, vt describit Pena, sanguineas, nitentes, rectas, flexiles, nonnihil angulosas, aut secundū longitudinē striatas, Periclymeno similes & eiusdē coloris: folia bina ex interuallis, infernè cæssa, supernè saturatè virētia, etiā Periclymeno similia, nisi q̄ ex geniculis erūpunt, nec vti illa à virgis traiciuntur, quæ non tam sanguineum cruorem vel fundunt, vel affricta illinunt, vt diximus de Androsæmo vero: flores lutei sunt: deinde bacca parua, primū rubræ, deinde nigra, cruore purpureo, & seminibus fuscis, minutis turgida. Radix foris fusca, intus alba, lignosa, fragilis, pedem & sesquipedē longa, gustanti resinosa, lentoris expers: nec tota planta ingrata, nonnihil gummi Elemni, aut trifolij odorati sapit. Moderatè adstringit digerendo, & desiccatur, parua admodum, aut nulla calfactione. Vulnerariis remediis, balsamis, oleis, potionibus commodissima, & vsu multò laudatissima. Auctor est Pena in Angliæ siluis, lucis & nemoribus frequentem esse, Flandris hortensem. Androsæmi semen, vt scribit Dio-

Vires.

scorides, tritum, duabus drachmis potum, biliosa alui excrementa pellit. Ischiadicis maximè sanat, verum post purgationem aquam exorbere oportet. Sed & herba ambusta sanat imposita, & sanguinem sistit. Vulgari codices habent, *ἡ αἷμα ἐπέχῃ*, cum in veteri legatur, *ἡ νομὸς ἐπέχῃ*, idest, vlcera carnem exedentia compescit. Quæ de re fusiùs hæc Plinius.

Li. 26. ca. 4.

Vsus ad purgandam aluum tustæ cum semine, potaq; matutino, vel à cæna, duabus drachmis, in aqua mulsâ, vel vino, vel aqua pura, totius potionis sextario. Trahit bilem, prædest ischiadicis maximè. Sed proxima die capparidis radicem resinâ permixtâ deuorare oportet drachmæ pondere, iterumque quadridui interuallo eadem facere. A purgatione autem ipsa robustiores vinum bibere, infirmiores aquam. Imponitur & podagris & ambustis, & vulneribus, cohibens sanguinem. Androsæmum, inquit Galenus, planta fruticosa, natura duplex.

Li. 6. simpl.

Vnum enim Ascyrum & Ascyroides nuncupatum est species hyperici: alterum verò à quibusdam Dionysias appellatur. Est autem semen eorum purgatorium, florum verò facultas modicè extergens, & desiccans, vt & ambusta curare credantur.

Nomina

Forma.



YPERICO & congeneribus plantis Corin subiunxit Discorides, tanquam similem, atque etiam congenerem, ideòq; ab aliquibus Hypericum nominari scripsit, foliumq; habere Ericæ simile, minus tamen, pinguius ac rubrum. Est autem frutex palmi altitudine, ori gra-

Li. 26. ca. 8.

CORIS, Matthioli.



CORIS Monspelienfis.



Li. 1. ca. 156.

Vires.

Li. 26. ca. 8.

tus, acris & odoratus. Plinius quoq; Corin hyperici genus facit, & similiter ferè describit, his verbis. Est aliud Hypericum, quod alij Corin appellât, folio Tamaricis, & sub ea nascitur, sed pinguioribus foliis & minoribus ac rubètib; odoratum, palmo altius, leniter suaue, aculeatû. Hic Tamaricis folio dixit, pro Ericæ folio. Matthiolus pro Cori plantam hîc pictam exhibuit, scripsitq; Corin non ita Hypericum referre, quemadmodum Ascyrò & Androsæmum: iisq; nudam tantum Dioscoridis historiam subdidit, eamq; plantam sæpius ad se ab herbariis allatam, nasciq; frequentissimam in Italia, nulla adscripta aut figuræ aut virium declaratione. Eam Lobellius descripsit. Matthioli Cori, inquit, flores stellati Ornithogali minores, ex rubore candicantes, quorum apiculi flauent. E' lignosa radice multos spithameos cauliculos & foliola kali aut spergulæ stellatim ex geniculis profert. Gaudet pratis in afflatu maritimo. Aliâ Pena Corin pulchram & valde hilari aspectu depinxit, quam Monspelicam cognominat, quia nusquam nisi Monspelij & Frontignani ad radices Cetij montis, & propè Magalonem reperit. Fruticat hæc ramulis multis, densis, duriusculis, surrectis, rotundis, palmum & sesquipalmum altis, lignosis, cuius foliola densè stipata Ericæ maiori similia sunt, & similiter disposita: flores in summis ramulis purpurei, aut ex purpura cærulei, elegantissimi spectantur: semen vtriculo, mollioribusve alabastris paruis conclusum, rotundum, Tamarici par, glaucum vel pullum, tenuissimis glumis inuolutum, quasi oculi pupilla tutior inde foret. Radix multò sanè maior, longior & crassior, quàm plantæ modo, Anchusæ minoris par & concolor. Tota enim planta rubella visitur, & succo purpureo radices pannos imbuendo commendatur: amaricat, gustu subacri, non inodora. Huius semen potum, inquit Dioscorides, vrinas & menses ducit, auxiliatur commorhis à phalangiis: ischiadicis item & opisthotonicis cum vino potum: ad rigores verò cum pipere. At in opisthotonicis etiam commodè cum oleo illinitur. Plinius aliter de eius viribus scripsit. Vis femini excalectoris, & ideo inflationem facit enterocelis, sed stomacho non inuile, præcipuum

præcipuum ad stranguriam, si exulcerata non sit vesica. Medetur & pleuriticis ex vino potum. In quibus cum hæc sensum rectum non habeant. Et ideò inflationem facit, &c. sic emendat Cornarius ex veteri codice. Et ideò ad inflationem facit, sed stomacho inutile, &c. Eandem Monspelensem Corin depinxit & descripsit Clusius, florereq; ait mense Maio, nonnunquam etiam Martio, siccis quibusdam circa Salamanticam & Monspelium locis, & maritimis Valentia & Gallia Narbonensis. Eandem dudum depingendam curauerat, & breuiter descripserat Dalechampsius. Radice multiplici, lignosa, rubra, caulibus multis, dodratalibus, rubentibus, furculosis: foliis multis, exiguis, Erica specie, gustu amaris. Flores in caulium fastigiis veluti spicati congesti sunt, ex caliculis siue alabastris paruis exeuntes purpurei, venustissimi.

Li.2. Stirp.
Hisp. c.94.

CHAMÆPITYS,

CAP. XXXIX.



QVÆ Græcis χαμαίπυτος, Latinis quoque Chamæpitys, Aiuga, seu Abiga, Plinio auctore, nominatur: inuenitur & Ibiga vocari, quod nomē, Hermolao teste, ferè seruāt hodie. Hinc abiectis duabus literis i, & g, Iba, & ab Aiuga abiectiōne duarū literarū, a, & g, Iua manauit in vulgi appellationem. Officinæ Iuā muscatā appellant, & Iuā arthetica, Arabes Hamefiteos, seu Chamafithius, Itali Chamepitio & Iua, Hispani Pinillo, & Iua arthetica, Germani *Te lenger, ye lieber*, Galli *Iue muscate, & Artetique*. Cæterū Chamæpitys dicta est, idest, humilis siue pumila picea, q; eius folia picea oleant: Abiga verò propter abortus, Plinio & Dioscor. auctoribus, quos, educēdis iis quæ in vtero sunt, excitare solet: vt & Arthetica, siue potius Arthritica, quod ischiadicis, & cæteris articulo- rum doloribus opem ferat. Dioscorides tria Chamæpityos genera ponit. Primam repentem, foliis fedi, alteram maiorem, tertiam marem. Plinius toridem, sed inuer- so ordine. Primam maiorem, alteram breuiorem, tertiam marem. Chamæpitys, vt

Nomina

Li.24. ca.6.

In Coro.

176. lib.3.

Genera.

Lib.3. c.177.

Forma.

CHAMÆPITYS Prior,
Matthioli.



describit Dioscorides, herba est per terram serpens, subcurua, folia minori Aizoo similia habens, multò tamen tenuiora & pinguiora, hoc est, Serapione interprete, quæ habent super se humiditatem tenacem, hirsuta, circa ramos frequentia, odore picea: flores exiguos, luteos, aut candidos: radicem cichorij. Altera cubitalibus est ramis: anchoræ modo incuruis, tenuibus, coma supradictæ simili, flore candido, semine nigro. Olet autem & ipsa piceam. Tertia quæ mas appellatur, herbula est foliis tenuibus, candidis & hirsutis: caule aspero, candido, flosculis luteis: semine secus alas pusillo: piceam & hæc olet. Plinius non adeò cum Dioscoride cōsentiens, hæc scribit. Chamæpitys, Latine Abiga appellatur, diciturq; propter abortus, ab aliis Thus terræ, cubitalibus ramis, flore pinus & odore. Altera breuior & incurua similis. Tertia eodem odore, & ideò nomine quoque, paruulo cauliculo, crassitudine digitali, foliis scabris, exilibus, albis, in petris nascens. Prima Dioscoridis Chamæpitys à Matthiolo depicta, ea est quam hîc primo loco expressimus: tertia, quam secundo:

Cap.179.
simpl.

Li.24. ca.6.

In Advers.

Locus.

mediam maiorem se non nosse fateatur. At Lobellius & Pena primam Matthioli, & Dodonæi non primam, sed marem, siue tertiam Dioscoridis esse statuunt, eam nimirum, quæ compertæ vtilitatis & vulgaris cognitionis ubique provenit. Sabuleta, arida, lapidosaq; vineta & oliueta amat Narbonensis Galliæ, vbi perquæ odor: surculis gracilibus, hirsutis, inflexis, numerosis: pini foliis, vel psyllij, minoribus, incanis, cōfertis, resinosis, exiguis interfertis secus flosculos, melinos, veronica fœmina, sed semine oblongo, tereti, fusco, Germaniæ Galliæ & Angliæ agris sponte peruia, sed paucis in locis: eoque in hortis tantum colitur, ad medicos tamen vsus odore & viribus cultura ignauior: radix fibris duriusculis, lignosis, amaro sapore, medicato, subacri, neutiquam dulci, sed resinaceo, diuq; faucibus hærente, quæ idcirco nonnullis Germanis *Vergifsmynicht*, idest, ne mei obliuiscare, forte dicta fuit, quod etymum dum Matthiolus à Germano Pharmacopœo & Brasauola adductum reprehendit, immeritò facit, nam ipsemet fallitur, cum aliam vocatam

CHAMAEPITYS Tertia,
siue altera *Matth.*



CHAMAEPITYS Prima,
Dioscor. Pena & Lobel.



ye lenger ye leber, id sonantem, quò diutius eò amantius, aut gratius (hoc autem amaræ dulci siue circeæ mericò quadrare diximus) in hanc transfert. Altera Chamæpitys siue tertia Matthioli, & tertia Dodonæi luteolis floribus iisdem Lobellio & Pena auctoribus, prima est Dioscoridis, pinum redolens, minus nota, & paucis obuia locis, tamen odoratior, collibus aridis & aruis editioribus Nicæ Sabaudorum, & Genuæ Ligustrum fruticat. Quineriam eandem vireta nonnulla Belgij studiose colunt: radice fibrata, sonchi, aut dentis leonis, minore. Ramulos ea profert palmum altos, humistratos, foliolis septos, semperuiui minoris, aut potius vermicularis, minus carnosus, sed incanis, & hirsutis, in quibus flosculi in medio albidi. Suauiore spirat hæc odorem, interdum vliginosum, quemadmodum muscus quernus aut cedrinus. Secunda verò Dioscoridis Chamæpitys fortassè est vermiculatus frutex maior, de quo diximus capite de Aizoo. Chamæpitys altera etiam multis dicitur quæ capite proximo Chamædrys altera, & Chamædrys fœmina nominatur

nominatur. Ad harum genus refert Dodonæus plantam, quæ quòd foliorum
solam formam cui imitetur, odore verò destituta sit, Pseudochamaepitym appellat.
Primæ Dodonæi procumbentibus ac tenuibus pediculis foliisque similis est, sed
flosculis differt, qui in hac candidi sunt, & inuertos Lamij flores satis referunt,
ipsis tamen & longiores & patentes. Quaterna inde coherent femina: radix
mediocris crassitudinis. Ex Hispaniis anonymum missam fuisse ait Dodonæus.
Scribit Clusius se in Hispaniis inuenisse pusillam quandam plantam Aiugæ ad-
modum similem, tum cauliculis, tum foliorum trifidorum formâ, hirsutam totam
subalfo gustu, & inodoram, nisi quiddam herbaceum & ingratum redoleret. Flo-
res extremis ramis ex alis prodeunt, Aiugæ similes, sed maiores & albi: femina qua-
terna in singulis caliculis cinerei coloris, maiuscula & rotunda ferè: radix crassiu-
scula, subalbida. Prouenit locis incultis, & æstate floret. Eadem esse videtur quæ
Pseudochamaepitys Dodonæi, aut certè simillima. Chamaepithyos primæ folia, au-

PSEUDOCHEMAEPITYS,
Dodonæi.

AIUGA ADULTERINA
Clusij.



ctore Dioscoride, septem diebus in vino pota regio morbo medentur: quadraginta
verò, ex hydromelite ischiadicos sanant. Dantur peculiariter iocinorosis, vrinæ dif-
ficultatibus, & renum vitii, prosunt etiam torminosi. Ea apud Heracleam Ponti-
cam, perinde atque antidoto contra aconitum vtuntur, bibentes decoctum. Ad an-
tedicta illinitur cum polenta iure decocti macerata. Trita & cum fico pro pilulis
data aluum emollit. Excepta melle, squama æris, & resina, purgat. Apposita cum
melle ducit quæ ab vtero duci solent. (legitur enim Græcè, ἀγὰρ δὲ καὶ ἀπὸ ὑτέρης
προστέθειται σὺν μέλιτι. significant enim ἀπὸ ὑτέρης non solùm menses, sed etiam
fœtus & secundas, quare Abiga ab abigendo partu, & procurando abortu nuncupa-
ta est). Mammarū duritias discutit, vulnera glutinat, herpetas cum melle illita co-
hibet. Secūda & tertia eandem vim obtinent, non tamen adeò efficacem. Eadem fe-
rè Plinius de vsu medico tradit. Prosunt aduersus scorpionum ictus. Item iocinori,
illita cum palmis, aut cotoneis. Renibus & vrinæ decoctum earum cum farina hor-
deacea. Morbo quoq; regio, & vrinæ difficultatibus ex aqua decocta bibuntur. No-

Ibid.
Viresc.
Temper.

Lib. 24. c. 6.

uissima contra serpentes valet cum melle. Sic & apposita vulvas purgat. Sanguinē densatum extrahit pota. Sudores facit perunctis ea, peculiariter renibus vtilis est. Fiunt ex ea & hydropicis pilulæ cum ficu aluum trahētes. Lumborū quoq; dolorē victoriati pondere in vino finit, & tulsim recentem. Mortuos fœtus ex aceto cocta potaq; eicere p̄tinus dicitur. Galenus verò multò distinctiùs, Chamæpitys, inquit, amarū quidem gustu saporē validiorē acri obtinet: effectu verò purgat, abstergitq; viscera, plus quam calefacit. Proinde regio morbo correptis, & omninò quibus facilè iccur obstruitur, bonum est remedium. Quin & menses ducit, tum pota, tum apposita cum melle. Sed & vrinæ mouendæ aptum est medicamentum. Sunt qui etiam eam exhibent ischiadicis, decoctam cum melicrato. Herba porro ipsa viridis magna vulnera conglutinat, & vlcera putrescentia sanat mammarum præterea du ritias discutit. Est enim in siccando ordinis tertij, in calfaciendo verò secundi.

CHAMÆD R Y S,

CAP. XL.

Nomina



ΑΜΑΙ ΔΡΥΣ & χαμαίδρυ Græcè, Latine Trixago siue Trisfago dicitur. Officinæ Græcum nomen retinent, vulgò Quercula minor, & à serratis foliis Serratula appellatur, Arabicè Damedrios, Chamadrios, seu Kemadrius, Italicè Chamedrio, Querciucola & Calamandrina, Germanicè Gamander, lessen Bathengel, Gallicè Germandree, vel Chesnette. Chamædryes autem Græcis dicta est, quasi humilis ac terrestris quercus, quòd scilicet, folia quercus habeat. Dioscorides & alij veteres vnicam faciunt Chamædryn: recentiores verò herbarij plura eius genera. Fuchsius quatuor depinxit: primùm veram Chamædryn, eamque duùm generum, marem scilicet, & fœminam. Deinde Chamædryn vulgarem duùm item generum, marem scilicet, & fœminam. Alij aliter eius genera distinguunt. Chamædryes, vt describit Dioscorides, frutex est parvus palmi altitudine, folia habens parua, & figura & diuisuris quercui similia, amara, florem subpureum, paruum (in veteri codice legitur ἄνθος ὑποτόρφυρον, μικρὸν, καὶ ποικύρον, id est,

Genera.

Cap. 333.

Lib. 3. c. 96.

Forma

CHAMÆD R Y S,

Matthioli.

CHAMÆD R Y S Vulgaris,

mas Fuchsj.




florem

florem purpurascensem, pusillum, amarum. Oribasius legit *ὀνόπριον*, id est, subrum. Ruellius Plinium secutus, vertit, flore paruo, penè purpureo). Nascitur in asperis & petrosis locis. Colligere ipsam oportet semine pregnantem. Breuiter sic Plinius. Chamædrys herba est quæ


Locus.

Lib. 24. c. 35

CHAMÆDRYS femina,
Dodonæi.



CHAMÆDRYS Altera,
Matthioli.



Latinè Triflago dicitur: aliqui eam Chamædropem, alij Teucriū appellauêre. Folia habet magnitudine menthæ, colore & diuisura quercus. Alij ferratam, & ab ea ferram inuentam esse dixêre: flore penè purpureo. Hæc facie verè refert, quæ hîc picta est, radice exigua, surculosa, virgultis numerosis, pedem altis, foliis in ambitu serratis, binis, numerosis, vt quercus, sed profundè minus incisis: floribus purpureis. Hæc Chamædrys minor appellari potest. Nam quæ Antuerpiæ atque alibi in hortis visitur, maior: quod foliis sit maioribus, candidioribus, flore cæcio, pallescente, vbi etiam niues imbrêque spernit, illa cōtrà breui marcescit. His addēda minima, quæ à quibusdam fœmina dicitur, & hoc nomine à Dodonæo pingitur humilis herbula, multis cauliculis, lanuginosis, foliis hirsutis, profundius & ferè decussatim infectis: flosculis purpurascen-
• tibus, circum cauliculos emicantibus: semine in rotundis capsulis, nigro, & rotundo: radice crassa, plurimis fibris capillata. Eadem est quæ à Matthiolo pro Chamædrys altera picta exhibetur. Quibusdam Chamæpithys altera videtur esse, quam floribus & odore quadatenus refert,

Pet. Pe. in
Ad.

Lib. 1. c. 16.

CHAMÆDRYS Vulgaris,
fœmina Fuchsj.



alii

aliis Ocimastrum. Dodonæus in Libro Purgant. Chamæpitym tertiam facit, Lobelius Chamædrym aliam laciniatis foliis, vel potius Chamæpitym alteram, Tragus Chamætyparissum agrestem. Aliam hinc quoque appositam herbarij Chamædryn montanā vocant, à foliorum cum chamædry similitudine, & à natalibus, aliis Leucadem Dioscoridis, ob foliorum eximium candorem. Frutex, aut potius suffrutex

CHAMÆDRYS *Montana,*
Dalechampi.



Lib. 3. c. 69.
Viresc.
Temper.

Lib. 24. c. 15

Lib. 8. sim.

Lib. 9. hist.
cap. 10.

est in editissimorum montium saxosis, cōfrago-
sifq; locis proueniens, pedis aut sesquipedis lon-
gitudine, radice nigra, longa, huc illuc sparsa,
lignosa, caules multos gignente, è nigro rufescē-
tes, rotundos, humi sparsos, folia quercui aut
Chamedryj similia, marginibus valde incisa, su-
perne nigrius viretia, inferne candicantia, den-
sius congesta: flos longo nititur petiolo, albus,
rosæ siluestri aut cistho similis, quinque foliolis
constans, luteis in medio staminibus, eleganti
formosofq; aspectu. Lobellius etiā Chamædryn
montanam duriorē pinxit, Ceruicariam Ges-
neri, quorundam Itatorum *Chioma di Ioue*, sic di-
ctam à floris similitudine, qui è foliolis sericeo
vellere in laram cæsariem tortilibus crinibus
explicatur, in cæteris omnibus huic nostræ pla-
næ similem. Tota planta valde adstringit, vt gu-
stus demonstrat. Chamædrys prima, auctore Dio-
scoride, recens ac viridis in aqua decocta & po-
ta, conuulsis, tussientibus, lienī indurato, vrinæ
difficultatibus, hydropicis inter principia auxi-
liatur. Cit menses, foetusque extrahit, lienem ex
aceto pota minuit. Aduersus venenata cum vi-

no pota & illita efficax est. Trita ad prædicta in pilulas conformatur, cum melle ve-
tera vlcera purgat, cum oleo trita inuncta & illita oculorū caliginem discutit. Eadē
magna ex parte Plinius tradidit. Aduersus serpentium venena pota illitaq; effica-
cissima. Itē stomacho, tussi vetustæ, pituitæ in gula cohærescenti, ruptis, conuulsis,
lateris doloribus. Lienē consumit. Vrinam & menses cit, ob id incipientibus hydro-
picis efficax, manualibus scopis eius in tribus heminis aquæ decoctis vsq; ad tertias.
Sanat & vomicas, & sordida vlcera cum melle, fit & vinū ex ea pectoris vitiis, folio-
rum succus cum oleo caliginem oculorū discutit. Ad splenē ex aceto sumitur. Ga-
lenus qualitates eius & effectus enucleatè declarat, his verbis. Chamædrys vincen-
tem habet qualitatē amarā. Est & quodāmodo acris: quare meritò lienes colliquat
& vrinas ac menses prouocat, crassitudinem humorum incidit, & viscerum obstru-
ctiones purgat. Ponatq; eam quispiā in tertio ordine exalfacientium & desiccant-
ium, plus tamē calefacit quàm discutit. Theophrastus aliā vim foliis, aliam semini
tribuit, his verbis, τῆς ὃ χαμαῖδρυος τὸ μὲν φύλλον πρὸς τὸ βήρμαλα, & πρὸς τραύματα ἐν
ἐλαίῳ τελεσόμενα, πρὸς τε τὰ νεμεύμενα ἔλκει. τὸν δὲ καρπὸν κατὰρσενι χολῇ, ἀγασθὸν δὲ ἐν ὀφθαλ-
μοῖς. πρὸς δὲ τὰ ἀργεῖματα προσάγειν ὃ φύλλον βίψαντα ἐν ἐλαίῳ, ἔχει δὲ τὸ φύλλον οἷα περ
δρυὸς, τὸ δὲ ἀνάστημα τῆς ὀλῆς ὅσον σπιθαμῶν, ἐνδοσμον δὲ καὶ ἡδύ. Id est, Trislaginis folia ad
rupta vulneraq; in oleo trita valēt, & ad depascētia vlcera, semē bilem trahit, & ocu-
lis quoq; vile est, foliū ad albugines tritum in oleo prodest. Hęc Theophra. Chamæ-
dryn montanā ad vētris profusiones, mensiū abundantia, sanguinis effluxiones, vo-
mitiones immodicas Alpini cōmendant, sed ad dysenterias præcipue, huiusq; fron-
dē damas audissimè carpere narrāt in locis huius plantæ feracibus degeneri cōsuetas.

VERO

VERONICA MAXIMA,

CAP. XLI.



H N SEQVANS gignitur quæ maxima Veronica dicitur à nonnullis, ad montium confragosa præcipitia inter ipsa saxa, radice nigra, plurimis fibris capillata, caulibus multis fruticosâ, cubitalibus, foliis quercus, multum crenatis, semper geminis, caulem Chamædryos instar amplexantibus, quam ob causam Chamædryos genus esse quidâ volunt, surculis multis ex alarum sinu prodeuntibus, minime foliosis: flore denso, puniceo, Veronica, exiguo, specioso: semine in loculis latis, duobus simul iunctis, Elatine non dissimilibus.

TEVCRIVM, CAP. XLII.

T EYKPION vel *τέυκρας* à Teucro inuentore, quibusdam ob similitudinem Chamædryos dicta, Latine etiam Teucrium nominatur. Herba, inquit Dioscor. virgata, similis chamædryj, tenuifolia, & ciceri

Nomina

Lib. 3. c. 95.

Forma.

simile folium habens. Ex qua breui & fortassè mutila descriptione, quamvis minùs certa Teucrij notio sit, tamen Chamædryos cognitio ad consimilem herbam accommodata, fecit vt Teucrium legitimum innosceret, quod ob similitudinem, Galli *Grosfe Germandee* vocant, Germani *Groszbengel*, id est, grandem Chamædryn. Locis montosis & aridis fructuat, virgultis multis, rectis, lignosis, foliis planè Chamædryos, sed crassioribus, aliquatò minùs incanis, rugosis & asperis: flores item Chamædryj consimiles sunt, sed purpuræ magis saturæ. De

Locus.

TEVCRIVM Primum,
Matthioli.

Teucro sic Plinius. Inuenit & Teucer eadem ætate Teucrion, quam quidam hemionitin vocant, spargentem iuncos tenues, folia curua, asperis locis nascentem, austero sapore. Nunquâ floret: neq; semen gignit. Medetur lienibus, constatq; sic inuentam. Quum extra super eam proiecta essent, adhæsisse lien, eumque exinanisse: ob id à quibusdam Asplenon vocatur. Narant sues, qui radicem eius edunt, sine splene inueniri. Et mox addit. Quidam ramis hyssopi (Chamædryos Diosco.) surculosam, folio fabæ (Ciceris Diosco.) eodem nomine appellant, & colligi florentem adhuc iubent, adeò florere non dubitant, maximeq; ex Ciliciis, & Pisidiæ montibus laudant (iuxta Gentiadem & Cissadè. Diosc.) In quibus Plinius Hemionitin Dioscoridis priore loco Teucrij nomine describit: & mox Teucriū verum. Viridis cum posca, inquit Dioscorides, aut arida feruescētā pota, vim habet lienē potenter absumendi. Splenicis cum

Lib. 25. c. 5.

Vires &

Temper.

Lib. 3. c. 9.

ficubus

Lib. 26. c. 8. ficubus & aceto illinitur : item serpentium moribus cum aceto solo sine ficubus. Eadē ferē Plinius tradit, his verbis. Lieni medetur Teucris, præcipuē porta arida, & decocta, quātum manus capit, in aceti heminis tribus ad heminam. Illinitur eadem Lib. 8. ſim. cum aceto, aut ſi tolerari non poſſit, ex ficu vel aqua. Teucrium, inquit Galenus, in-

TEUCRIVM Alterum,
Mathioli.



TEUCRIVM Baticum,
Clusij.



cidendi & tenuium partium facultatis est, quare lienes sanant. Ponatque ipsum quispian in tertio exsiccantium, secundo verò exalfacientium ordine. Aliud Teucriū Clusius pinxit, quod Baticum nominat. Interdū ad hominis altitudinem assurgit inquit, interdū humilius est, vnicō stolone, minimi digiti crassitie, cortice candicante obducto, in ramos non admodū frequentes diuiso, ordine quodam ita digestos, vt bini perpetuō sint inter sese oppositi, incani : folia vulgaris Teucrij ferē, maiora, per ambitum nonnihil sinuosa (quod pictor malē expresit) prona parte omnino incana, supina verò ex atro virentia, gustu perquam amaro: flos candidus, labris infernē prominētibus, nulla galea superius imminente, aliquot oblongis staminibus seu villis ex medio flore exilientibus. Perpetuō viret. Montibus Calpe vicinis, & Baticę maritimis, in sepibus, & inter frutices alios se inuenisse ait Clusius: tum etiam Gadibus ea parte, qua nunc insula continenti est coniuncta ponte admirabili. Floret Febuario.

EVFRASIA,

CAP. XLIII.

Nomina



VM Eufrosiæ nomen Græcam testetur originem, videtur sanē à bu-
glossō veterum desumptum esse. Vt enim id in vinum deiectum, vt
loquitur Plinius, animi augeat voluptates, vnde *εὐφροσύνη*, ita etiam il-
la quia oculos iuuat & delectat, *εὐφροσύνη* appellata esse videtur, quam
vocem imperiti linguæ Græcæ deprauantes, in Eufrosiam verterunt, eamq; sic cor-
ruptam Officinæ, vt in plurimis aliis, retinuerunt. Etsi autem Græco & eleganti
nomine donata sit hæc herbula, nihil tamen de ea, quod sciam, apud veteres Græ-
cos &

EVFRASIA, *Matth.*EVFRASIA *Secunda*,
Dodonai & Lobelij.

do visui. Si autē vinum esset nimis forte, temperetur cum aqua fœniculi, & si opus est addatur saccharum necessarium. Hæc Arnaldus. Cui nō omninō assentitur Pena, nec ei vino prorsus fidendum suadet, vt cuius potu tantū trimestri in Heluetia vsum socium & sodalem suum asserat penē ambobus orbatum oculis, & fluxionibus modo nō oppressum: cū duntaxat antea leui cathaphora, & lacrymatium-

cos & Latinos, nempe Dioscoridem, Galenum, Plinium, adde etiam recentiores Aëtium, Paulum, & Actuarium scriptum reperitur: sed à ducentis tantū vel paulo plus annis posteritati Eufrosiæ nomine innotuit, ad oculorum caliginis, & morbos pituitosos peruagatæ commendationis. Vnde Germanis *Angenthrost*, id est, oculorum solarius, dicta fuit: nonnullis hac quoque ratione motis, Ophthalmica, id est, ocularia. Galli, *Eufrose* vocant, Itali *Eufrosia*. Est igitur Eufrosia herba parua, palmi vnus altitudine, cauliculis purpureis, surculosa, foliis multis, exiguis, crispatis, per ambitum serratis, flosculis exiguis, candidis, intus purpureo & luteo colore macularis: radice parua, tenui, fibrata. Apricis collibus & pratis strigosis potissimū gaudet. Iulio & Augusto mensibus floret, tunc colligenda & siccanda. Sapor amaricans calidam & siccam esse perspicue docet. Vtuntur ea tam recente quam exsiccata aduersus omnia mala quæ oculorum claritati officiant. Quare trita & oculis imposita, aut succus eius cum vino instillatus caligines delet, & visus acie restituit. Idem præstat eius exsiccatæ farina, si tribus eius partibus cū vna parte macis commixtis, quotidie manè cochlearis mensura sumatur perse, aut cum saccharo, aut cum vino. Nec solum oculorum aciem, sed etiā memoriā mirifice roborat, amissamque reparat. Arnaldus vinū Eufrosiatum valde commendat, his verbis. Eufrosiæ vinum fit ad oculos, ponendo herbam in musto donec fiat vinum. Cuius vsu oculi senum reiuuenescunt. Aufert hoc impedimenta eorum, & defectū visus in quocunque cuiusvis ætatis homine, præsertim vbi pinguedo & pituita redundant. Est & qui permansit nihil videns per longum tempus, & infra annum eius vsu restitutus est ad visum. Ipsa enim herba calida est & sicca, & habet hoc à proprietate, quod quando pulvis eius comeditur cum ouorum vitellis, idem mirifice præstat, vel quando pulvis idem recipitur cum vino. Et supersunt testes fide digni, qui fecerunt in seipsis, & qui non poterant legere sine oculariis, & legerunt postmodum absque ipsis etiam literam subtiliorem. Et vsus vini Eufrosiati non habet par in proficien-

*Forma.**Locus.**Temper.*
*& Vires.**In lib. de*
*Vinis.**In Aduers.*

culis laboraret. Quare puluere aut decocto citra vinum tutius vtendum. Alia est planta quam nonnulli Euphragiam vocant, minimè tamen Euphragia vera existimanda, pedalis & altior, cauliculis rotundis, surculosis, in quibus folia parua, angusta, longiuscula, sapius deorsum vergentia: flores rubentes: radicem exigua superiori similem. Hac verè Euphragiæ vice minimè vtendum. Descripsit Dodo. pinxit Lobellius, qui Cratægonum secundum quorundam vocat.

SINAPI ALBUM, CAP. XLIIII.

*Locus.
Forma.*



Nomina

*Cap. 245.
hist.*

PTARMICA, Fuchsj.

Lib. 3. c. 20.

Lib. 2. c. 156.

Forma.



IN ASPERIS & saxosis hoc sinapi adulescit, radice dura & solida, candida, brachiata, & nonnihil fibrosa, foliis proximè radicem in orbè sparsis, multis, infectis cichorij modo, adulto caule pereuntibus, & exarescentibus, in caule numerosis, lævibus, crassis & carnosiss, in cuspidè mucronatis, quæ caulem attingunt lunatis, caule cubitali, nonnumquam altiore, rotundo, infernè rubente, in ramulos multos supernè diuiso, flosculis multis scatentes, candidis, quibus succedunt graciles & prælongæ siliquæ, minuto semine grauidæ, acris & feruidi gustus, eleganti specie siliquarum tanquam vallo quodam circa caulem & surculos erectarum. Floret Maio mense. Quidam thlaspeos alij Drabæ genus esse volunt.

PTARMICA, CAP. XLV.

ET SI multis plâis olfactu sternutamentacientibus ptarmices, id est, sternutatoriæ siue sternutamentariæ nomen competere possit, tamè quæ hîc primo loco depicta cernitur, Fuchsj & multorum herbariorum sententia id nomen adepta est, quod acrisuo odore nares feriens sternutamenta irriter. Pyrethrum siluestre à Dodonæo appellata ab acris & feruida facultate, diuq; linguam vellicante Pyrethri modo, quamquam moderatius, à Germanis *Vuilderbertram* vocata. Alij ptarmicas alias proponunt. Sed ptarmicæ descriptionem audiamus ex Dioscoride. Ptarmica, inquit, frutex est paruus ramulis paruis (vetus codex habet non μικρός, id est, paruus: sed λεπτός, id est, tenuis) multis, rotundis, abrotono similibus, circa quos folia multa, oblonga, oleæ similia, in summo veluti chamæmeli capitulum, paruum, rotundum, olfactu acre, sternutamenta ciens, vnde & nomen inuenit. Quæ delineatio plantæ cuius pictura hîc datur, aptè quadrat: nam surculis fruticat exiguis, multis, rotundis, abrotono non dissimilibus, lentè rufescentibus, qui foliis frequentibus, longiusculis, oleæ similibus, angustis, vtrîmque leuiter serratis ambiuntur flore in cacumine Anthemidis propè ad umbellæ modum qui

dum, qui acri suo odore nares feriens sternutamenta elicit. Inuenitur sæpius in al- *Locus.*
tis montibus, & saxosis locis sæpè & in pratis. Floret æstate, radix extremo effodi- *Tempus.*
tur autumnò. Eadem planè est quam Matthiolus Ptarmicæ nomine depinxit, & in
Bohemix hortis passim feri scripsit, è montibus, in quibus nascitur, illuc transla-
tam: eadem enim eius delineatio ab eo ponitur, quæ modò à nobis exposita est,
iidem natales. Hanc quòd acri sit sapore, quidam Pyrethrum vocant, quos secutus *Lib. 3. c. 20.*
Dodonaus, Pyrethri siluestris nomine pinxit & descripsit. Eadem etiam videtur,
quæ pro menthæ Sarracenicæ specie, ex Myconi sententia, à nobis in Horto inter
menthæ genera explicata est. Plantam aliam Ptarmicam Matthiolus appellare vo-
luit, quæ caules tenues habet, folia oleæ, flores umbellatos in cacumine, & capitula
quæ naribus immissa sternutamenta cient. Verùm Dioscoridis Ptarmicam esse ne-

PTARMICA Altera,
Matthioli.



PTARMICA Montana,
Dalechampij.



gat. Ptarmicā montanam herbarij vocant aliud plātæ genus in altissimis & asper-
rimis Allobrogum montibus, sed tamē herbidis prosiliens, radice nigra, in multos
furculos fissā, longa, valde fibrata, odorata, gustu principio amara, deinde acri, cauli
bus multis fruticās, teretibus, lignosis, abrotono similibus, cubitalibus: foliis in cau-
libus, oblongis, oleæ similibus, propè radicē latoribus, plantaginis ferè specie, humi
stratis, capitulis in summo caulium vertice chamemelo similib⁹, odorē validū & acré
spirantibus, qui sternutamenta excitat, flore in ambitu luteo. Ptarmices folia, inquit
Dioscorides, cum floribus illita, sugillata possunt tollere. Flores sternutamēta effi-
cacissimè mouent. Galenus verò, Ptarmices flores, inquit, ciēdæ sternutationis vim
obtinent vnde ei herbæ nomen. Torus autem frutex si contundatur viridis, sugil-
lata, & reliquas ecchymoses digerit. Est enim temperies eius calida & sicca, viridis
etiamnum ordine secundo, siccatæ tertio. Montanæ Ptarmices radicem muliercu-
læ Alpinae ad vteri suffocationes, mensium suppressiones, virginum pallores, ma-
ciem & cachexiam summopere commendant.

Lib. 1. c. 156

Vires.

Lib. 8. sim.

PYRETHRVM FLORE ANTHEMIDIS, CAP. XLVI.

Nomina

Lib. 3. c. 71.



Vic plantæ Germanicè *Bertram*, Gallicè *Pirehre*, aut *Pied d'alexandre* dicta; ob radicis eius feruorem igneum pyrethri nomē dederunt Officinæ, suffragante etiam Dioscoridis descriptione, quæ est huiusmodi. Pyrethrum folia caulemq; emittit vt daucum siluestre, & fœniculum;

PYRETRVM Alterum, Matt.



PYRETRVM, Gesneri.



umbellamque anethi, circinata rotunditatis, radix longa est, pollicis crassitudine, gustu feruidissimo. A qua descriptione solis floribus distat hæc planta, quos non in umbellis Anethi circinatis, sed in medio luteos, foliolis candidis circumdatos, planè chamæmeli, aut bellidis, magnitudine buphthalmi: cauliculos multos, sesquipalmm altos, crassiusculos, foliis multum incis, fœniculi vel anthemidis, stipatos, crassioribus, longioribus: radicē lōgam, rectam, digiti crassitudine, linguam vrentem. Est enim calida siccaq; ad tertium vsque ordinem. Quare eadem præstat quæ Pyrethro Dioscorides & Galenus tribuunt, imò maiore efficacia quàm nonnullæ alię, quibus Pyrethri nomen dederūt quidam herbarij. Huius igitur radix cum melle sumpta, aduersus epilepsiam, apoplexiam, omnes inueteratos & frigidos cerebri morbos valet. Communis pituitæ copiam ex cerebro elicit, vnde Saliuaris à Latinis dicta. Dentium immanes cruciatus sedat, si aceto cocta colluatur. Oleum ex recenti radice eductum mirificū est.

PYRETRVM Verum Matth.



Plantam

Plantam aliam hîc appictam Pyrethri veri nomine ad Dalechampium ex horto suo misit Conradus Gesnerus vir doctissimus & cãdidissimus. Radice nititur longa, simplici, modicè fibrata, pallente, digiti crassitudine, feruidi & ventis gustus: folia anetho similia prodeunt, caulis fœniculaceus, flos in umbella circinata: rotunditatis, vt omninò in nostris Dioscoridis exemplaribus legendum sit, σκιάδιον τροχόειδές, non τριχόειδές, id est, capillacea umbella. Quare nullam prorsus notam desse ad veram Pyrethri delineationem putabat ille. Matthiolum verò, Guilandinus & alij, plantam hîc expressam Pyrethri veri nomine donarunt, cui radices sunt & folia cotulæ fœtidæ, umbellæ ab vno quasi centro multis petiolis innixæ, pectinis veneris ritu, aut Anethi, candidi flosculi, feruido & amaricante gustu. Non tam efficaces vires habet quàm Pyrethrum Officinarium.

FLAMMVLA, CAP. XLVII.



B HERBARIIS dicta est flammula, quòd non secus ac flamma cuti appressa vesicas, crustas, vlceraq; inurat. Huius species duas assignant Herbarij. Prior adminiculis eget quibus fulciatur: altera recta assurgit sine adminiculis. Illa sarmentosos emittit cauliculos, lentos & valde obsequiosos, cortice virente vestitos, folia minora quàm Vitalba incondita, ex vno pediculo còplura, qui capreoli vice vicinis sese alligat. Flores candidi sunt: semina,

Nomina
Forma.

FLAMMVLA, Dodonci.



FLAMMVLA, Matth.



exigua, cohærentia, canescētibus quoq; plumis, sed minoribus & breuioribus exornata: pro radicibus multæ sunt & tenues fibræ. Hanc vulgi Flâmulam, Lobellius & Pena Clematidem alterã vrentem appellant. Nullam esse scribit Pena, quæ tam benè quadret facie & viribus Clematidi alteri Diosco. acri & exulcerãti. Cuti enim affricta non secus ac Flamma vrit. Quin tantæ tenuitatis est eius feruor, vt dum digitis fricantur folia, spiritum vrêtem eminùs præsertim in nares iaculetur, cerebrumq; & sensus repente magnoperè percellat: quia feruor ille non in centro intimsq;e

Vires.

terreis partibus, sed in leuioribus extimis residet. Quare succus & stillatius liquor primus quasi è vino Flâmèus est. In Narbonèsi & Gallica Prouincia sponte in pratis maritimis humi sparsa, tenera & humilis visitur, nisi fruticibus & sepibus innitatur, & aliis pedamentis si quæ nacta sit. In frigidioribus regionibus hortensis est. **Forma.** Flammula altera foliis est amplioribus maioribusque, vitalba similioribus, quam & candidissimis flosculis, & semine plumaceam cristam gerente, in fastigio cauliculorum eminentibus refert. Cauliculi cubito altiores, sine adminiculis stant, sursumque eriguntur. Vere noua promit folia & cauliculos, æstate flores. Scribit Matthiolus, Flammulæ stillatitiam aquam in morbis frigidissimis efficacissimam esse. Sunt, inquit, qui Flammulam quartanariis edendam præbeant, magno, ut ferunt, commodo. Alij eius oleum commendant ischiadicis, articulorum, iliūque doloribus, vrinæ angustis, & renum calculis, in quibus morbis aut calidum inungunt, aut clysteribus infundunt. Id autè præparant hoc modo. Flâmulæ folia tenuissimè concisa, in rosaceum imponunt, quod vitreum vas exceperit, tum per æstatem insolant oburato vase. Datur etiam in cibis hisce morbis affectis, trium drachmarum pondere. De Flammula aquatica, lib. de palustribus, diximus.

PSTLLIVM, CAP. XLVIII.

Nomina

RAECÈ' Πύλλιον, Latine Pulicaris herba dicitur. Nomen græcum in Officinis seruatum, Arabicè *Bazara Chatona*, seu *Bezercothume*, Italicè *Pfyllio*, Germanicè *Pfilienkraut*, Gallicè *L'herbe aux puces*, Hispanicè *Zargatona*. Tam græcam quam Latinam appellationem à pulice, cuius effigiem semen eius refert, sortita est herba, vel, ut nonnullis videtur, quia si viridis in domum inferatur, generari in ea pulices prohibeat. Duo Psyllij genera exhibuit Matthiolus. Vnum vulgare & communis vsus, alterum sarmentosius prolixiusque, fortè Plinianum. Psylliū, auctore Dioscoride, folia coronopo similia habet, hirsuta, longiora, ramos dodrantaes. Tota herba ad fœni graminisve formam accedit. Coma eius à medio caule incipit, capitula bina aut terna in summo, contracta conuolutaue, in quibus semen pulicibus simile, nigrum durumque. In aruis & incultis nascitur. Plinius, Psyllium, inquit, alij cynoides, alij ctystallion, alij sicelion, alij cynomyian appellant, radice tenui, superuacua, sarmentosum, fabæ granis in cacuminibus, foliis canino capiti (cynopi herbæ) non dissimilibus, semine autem pulicis, vnde ei nomen: hoc in baccis. Ipsa herba in vineis inuenitur. Quæ omnia vnà cum nomenclatura vtrique generi aptè conueniunt. Prius enim folia fert incana, hirsuta, longa, angusta, scopariæ vel coronopi æmula, nō tamen corniculata: ramulos rotundos, teneros, crebros in cacuminibus gerentes globulos, compactos, rotundos, oblongos, squamosos, florem ex viridi albicantem: semen nigrum, nitidum, pulicis effigie, colore, & magnitudine: radix est dodrantalıs, subalbicans, multis stipata fibris. Alterum multò sarmentosius est, & copiosioribus refertum foliis, longioribus, angustioribus, densioribus, similiter hirsutis & incanis, atque inter sese implicatis capitula huic sunt alteri similia,

In cap. 65.
lib. 4.**Genera**
Lib. 4. c. 65.**Forma.**

PSTLLIVM, Matth.

Locus.
Lib. 25. c. 11.



similia , sed paulò minora , & numerosiora ,
 in quibus semen alteri simile : radicem habet
 multifidam , & numerosis scatentem fibris.
 Nascitur in campestribus , sed in maritimis
 frequentius. Flores tota ferè æstate ex capitulis
 eius spicatis erumpentes dependent , canino
 capiti haud dissimiles. Semen verò Autumno
 profert. Vires nunc accuratius expendendæ.
 Vis Psyllio refrigeratoria , inquit Dioscorides ,
 cum rosaceo , aceto , aut aqua illitum ,
 articulorum doloribus , paroridibus , tuberculis ,
 œdematis , luxatis , capitisque doloribus prodest.
 Enterocelas puerorum & umbilicos procidentes
 cum aceto illitum sanat. Oportet autem
 acetabuli mensuratum in aqua hemmis
 duabus madere , & ubi aqua concreuerit ,
 illinere : egregiè siquidem refrigerat , & deiectum
 in feruentem aquam , calorem eius reprimat .
 Prodest erysipelatis . Aiunt si viridis domum
 importetur , prohibere ne pulices in ea generentur .
 Tusa cum adipe , sordida & maligna vlcera
 expurgat . Succus eius cum melle ad aures
 fluxione tentatas & vermiculosas conducit .

Locus.
Tempus.

Vires & Temper.
 Li. 4. ca. 67.

Plinius, Vis ei , inquit , ad refrigerandum & discutiendum ingens : semen in vsu.
 Fronti imponitur in dolore , & temporibus ex aceto , aut rosaceo , aut posca .
 Ad cætera illinitur acetabuli mensura sextario aquæ : densat ac contrahit : tunc terere &
 crassitudinem illinere oportet cuicumq; dolori & collectioni , inflammationiq; .
 In quibus Plinij verbis id primùm obseruandum quòd Psyllio vim discutiendi
 inesse scribit , quæ cum percalida fiat , videtur ἀποκρυσσιν , idest , vim repellendi ,
 quæ per frigida fit , vim discutiendi conuertisse , quæ est διαφροσιν . Deinde vulgata
 lectio : ad cætera illinitur acetabuli mensura , &c. nullam sententiam exhibet :
 quare eam sic restituit Cornarius ex Dioscoride . Ad cætera illinitur . Acetabuli
 mensura in sextario aquæ densat se ac contrahit : tunc terere , &c. Est enim hic ferè
 modus , quo etiam vtuntur Officinæ ad extrahendam muccaginem seminis Psyllij
 & fœnigraci . Legunt alij , & fortassis rectius , Ad cætera cum illinitur , acetabuli
 mensura sextario aquæ maceratum densatur , ac contrahitur . Tunc terere , &c.
 Et alibi Plinius , Tenescimo in aqua cum radicibus decoctum medetur . Omnibus articulo-
 rum morbis salutare est huius semen madefactum in aqua , admixtis in hem-
 minam feminis , duobus resinæ colophonix cochlearibus , thuris vno . Galenus
 Psyllij qualitates ita definit , Psyllium semen habet admodum vtile , ex secundo
 refrigerantium ordine , in desiccando verò & humectando medium quodammodo ,
 & symmetrum . Quod Mesues de medulla , seu substantia interiore , calida ,
 sicca ordine quarto , acri admodum scribit , commentitium esse arbitrantur
 viri docti . Quod verò aqua frigida maceratum , & agitatum , esse chologogum ,
 ac ob id febribus biliosis conuenire & inflammationibus thoracis , thoracem
 quoque lenire , & sitim extinguere ait , id muccoso admodum & refrigeranti lu-
 bricantique semini attribuant .

Lib. 25. cap. 11.

Embl 60.
 lib. 4.

Li. 16. c. 10.

Li. 8. simpl.

Cap. 9. li. 4.
 Nomina
 Lib. 4. ca. 9.
 Formæ.



REDIDIT Matthiolus plantam hîc pictam σύμφυτον πέτραιον esse Dioscoridis, Latinis similiter Symphytum petræum, quod nascatur in petris, vocatur & Alum. Ramulos habet, inquit Dioscor. origano similes, tenues, capitula velut thymum (sic enim quædam exemplaria habent, κλώνια δὲ ἔχῃ ὁμοία δελγάνω, λεπτὰ, κεφάλια δὲ ὡς θυμῷ, alia κλώνια δὲ ἔχῃ δελγάνω ἐμπερῇ, λεπτὰ φύλλα, κεφαλὴν ᾗ ὡς θυμῷ. Id est, ramulos habet origano similes, folia tenuia, caput thymi: quam lectionem secutus est Plinius. Alij priorem secuti λεπτὰ κεφάλια coniungunt, nulla foliorum facta mentione: totum lignosum est & odoratum, gustu dulce, saluam ciens: radicem habet longam, subpurpuream, digiti crassitudine. Plinius, Alum, inquit, nos vocamus, Græci Symphytum petræum, simile cunilæ bubulæ, folijs paruis, ramis tribus aut quatuor à radice, cacuminibus thymi, furculosum, odoratum, gustu dulce, saluam ciens, radice longa, rutila.

Lib. 27. c. 6.

SYMPHYTUM Petræum,
 Matthioli.



SYMPHYTUM Petræum,
 Lobellij.



Nascitur in petris, ideo petræum cognominatum. Huic descriptioni plantam apictam nullis prorsus deficientibus notis conuenire Matthiolus ait, quas nec declarat, nec vires, nec aliud quippiam præter natales, & eius pulchritudinem, quæ præsertim cùm floret, maxima cum voluptate ad se contemplandam viatorum oculos allicit. At Pena qui eam vidit in Pœninis alpidis, hodie diui Bernardi, scribit esse floribus purpureis, confertis, speciosis, ericæ maioris spicatis: folijs pusillis chamæpityos, breuioribus, aliquantum hirsutis pilosellæ modo, in furculis pedibus, lignosis, sed inodoram, radice lignea, non purpurea: dulcem non esse gustum plantæ, nec saluam elicere, quæ à Symphyto petræo Dioscoridis multum absunt. Quare alij aliud, atque aliud Symphytum petræum exhibuerunt, ob vim glutinandi & coniungendi potius quam ob figuram & similitudinem. Pena tradit

In Aduers.

Prunellam

CHAMÆMYRSINE

Quorundam, Dalechampij.

Prunellâ, de qua in libro de iis quæ in vmbrosis proueniūt diximus, vulgò à Monspelienſibus Symphytū petræū vocari. Aliud eſt Lob. Symphytum petræū, Veronica recta Herbariorū. Folia Teucrij ſimilia proferit, aut Lyſimachiaæ caruleæ, cui congener etiā cū folio, tum flore.

Cap. 46.

CHAMÆMYRSINE *Quorundam,*
CAP. L.

ALI Chamæmyrsinen, alij Ocimū montanum plantam hanc à foliorum ſimilitudine vocant, quæ in altiffimorum montium ſuperciliis creſcit, radice exigua, candida, inutili: ramulis multis, in orbem humi ſparſis, dodrantalibus, rotundis, folioſis: folio myrtis, ſed minùs acuminato: vel, vt alij volunt, ocimi, paruo: flore inæquali ſerie per ſummos caules exoriente, copioſo, purpureo, ſex foliolis cōſtâre, nitidiſſimi venuſtiſſimiq; coloris: ſemine in loculis minuto lo. Pulcherrima hæc plâta floris ſui purpura ſic viatorū oculos recreat, vt ad colligendū inuitet.

TORMENTILLA CANDIDA, CAP. LI.



HANC plantam Tormentillam candidam herbarij vocant, ob radicem Tormentillæ æmulam, & ob foliorū in aduerſa parte candorē. Ad Penta-phylli genera pertinere veriſimile eſt, vt ex eius deſcriptione perſpicuum fiet. In gelidiſſimorū & altiffimorum montiū pratis herbidiſq; locis prouenit, radicibus multis, nodofis, implicatis, è ruſo nigreſcentibus, fibroſis, multas alas huc illuc ſparſas ad nouā caulium & foliorum procreationem ex ſeſe gignentibus: folijs loti pratensis, minimè diſſectis, interdum quinis, interdum ſeptenis, interdum nouenis, tenui longoque pediculo appendis, ſupina parte virentibus, prona cādidiſ, albæ populi modo: iunceis cauliculis, flore herbaceo, copioſo, muſcarij ritu congeſto, quale viſitur in pede leonis, ſive Alchimilla, ſive ſtellaria vulgò dicta: ſemine minuto ex luteo viridi, ſiliquis aut vaginis exiguis incluſo. Ad ſanguinis eruptiones vndecumq; profluat, huius radicem tritam & potam multum laudant Alpini, narrântque eam, ſi quis vel collo tantum geſtet, ſanguinem è naribus profluentem cohibere. Eadem ſiccata & in farinam tuſa, iuſculiſque inſperſa dyſenteria medetur.

Locus.

TORMENTILLA

Candida, Dalechampij.

Nomina



LITHOSPERMUM


Maius, Matth.

Genera.

Li. 2. ca. 90.

Li. 3. ca. 141.

Forma.



LITHOSPERMUM

Minus, Matth.

Locus.

Li. 27. ca. 11.



Ca. 141. li. 3.


ΙΙΘΣΠΕΡΜΟΝ Græcis, Lithospermum Latinis, Officinis & medicis hodie omnibus Milium Solis, Arabibus *Kulb*, *Cult*, *Colt*, siue *Calab*, Italis *Lithospermo*, Germanis *Meerhirs*, & *Steinsomen*, Gallis *Gremil*, & l'herbe aux perles. Nomen à lapidea feminis duritia accepit.

Neque enim Lithospermum aliud sonat Græcis quàm Lapideum semen. Quum itaque semina tanquam calculos ferat, duritia lapidea, cādore & rotunditate margaritarum, cōmodissima voce Lithospermum dictum est, & Gallis l'herbe aux perles, recentioribus verò non Milium solis, quòd semen id candore & lucis splendore fulgeat nominandum fuit, sed Miliū Soler, auctore Serapione, quod auctoritate *Aben Iuliel*, nascatur in mōtibus Soler. Dioscorides & Plinius vnus duntaxat Lithospermi meminerunt, recentiores duo assignarunt genera, maius & minus. Alij alia addiderunt. Dodonæus tradit Lithospermum aliud esse hortense, aliud agreste. Hortense aliud maius, aliud minus. Lithospermū, auctore Dioscoride, folia habet oleæ humilia, longiora tamen, latiora ac molliora quæ in ima parte sunt, humi iacent: ramulos rectos, tenues, crassitudine iunci acuti solidos, lignosos, in quorum cacuminibus bifidi exortus cauliculorum speciem exhibent, foliis longis, inter quæ paruum semen, rotundum, &c. (Sic Ruellius ex vulgari codice, cū in antiquo legatur, *ἡ χυρὰ φύλλα μικρά, παρ' οἷς πτέρυγα λιθώδες, τροχύλον, λεπτόν, ὀρθὸν μικρὸ ἴσον*. Idest, folia habentes parua, inter quæ semen lapideum, rotundū, tenue, orobolū; exiguo æquale.) Nascitur in asperis & sublimibus locis. Plinius idem graphicè depinxit his verbis. Inter omnes herbas Lithospermo nihil est mirabilius. Aliqui *Ægonychon* vocāt, alij *Diospyron*, alij *Heraclēa*. Herba quincuncialis fere, foliis duplò maioribus quàm ruta, ramulis furculosis, crassitudine iunci: gerit iuxta folia singulas veluti barbulas, & earum in cacuminibus lapillos cādore & rotunditate margaritarum, magnitudine ciceris, duritia verò lapidea Ipsi qua pediculis adhærent, cauernulas habent, & intus semen. Nascitur in Italia, sed laudatissimum in Creta. Nec quicquā inter herbas maiore quidem miraculo aspexi. Tantus est decor velut aurificum arte, alternis inter folia candicantibus margaritis, tam exquisita difficultas lapidis ex herba nascentis. Iacere atque humi serpere auctores tradunt. Ego vultam non hærentem vidi. Matthiolus legitimum Dioscoridis Lithosper

Lithospermum id esse putat quod maius est hîc pictum, Fuchsumq; reprehendit quod pro vero Lithospermo, illud quod Officinæ Lithospermum minus vocant, depinxit. Dodonæus Lithospermū maius depinxit cauliculis, longis, gracilibus, hirsutis, magna ex parte humi instratis, quos longiuscula cingunt folia, nigricantia, Lib. 2. c. 90.

LITHOSPERMVM

Maius, Dodon.



hirsuta, inter quæ & cauliculos caliculi sunt hirsuti, primum ferentes florem cæruleum, deinde semen rotundum, durum, lapideum, maiusculū, Lithospermū verò minus cauliculis rectis, rotundis, lignosis, furculosis, foliis longis, angustis, acuminatis, nigricantibus, minoribus quàm Lithospermi superioris. Inter quæ & cauliculos flosculi oriuntur candidi, tandē semen producēs aspectu pulchrū, rotundū, candidū, durū, lapideū, vnioni simile, minus supradictō. Maximus huius vbiq; in Officinis vsus, maioris rarior, quia minū frequens, minorq; suppetit copia, nec perinde feminis est ferax: verum calculo extendo, lorioq; mouēdo efficacius multō. Floret Iunio & Iulio mēsibus, eoq; tēpore semē etiam profert. Id semen cuius maximus vsus est calidū siccūq; esse ex eius facultatibus coniicitur. Omnia etenim vrinam cientia, Galeno teste, calida & sicca sunt. Vim habet semen, inquit Dioscorides, atterēdi calculos, & ducendi vrinā, si cum vino albo bibatur. Plinius, his lapillis, inquit, drachmæ pondere potis in vino albo, calculos frangi pelliq; cōstat, & stranguriā discuti.

Temper.

Li. 5. simpl.

Li. 3. ca. 141.

Viros.

Li. 27. ca. 11.

LITHOSPERMVM Fuchf.

Minus Dodon.



LITHOSPERMVM

Nigrum, Dalech.



Matthioli

In cap. 141.
lib. 3.

Matthiolus tradit dari vtriusque semen potandum vtiliter diebus multis sesquidrachmâ pondere, addita aspleni semidrachma, & succini scrupulis duobus ex succo plantaginis aut portulacæ aut lactucæ ad gonorrhœam. Item dari magno sanè auxilio minoris Lithospermi seminis drachmas duas ex lacte muliebri potandas, feminis ægrè parturientibus. Quidam herbarij Lithospermum nigrum vocant plantam hic appositam, quæ radices habet breues ac inutiles, caules bicubitales, nodosos, teretes, surculosos, aridos: folia rubiæ, tactu aspera: semen rotundum, nigrum, oleosum & pingue, quod in areis cum tritico simul exteritur, simulq; molitur, & estur nulla capitis offensa. Hoc alij Myagrum Dioscoridis, alij Melampyrum Theophrasti esse autumant. Est præterea aliud Lithospermi genus, quod arundinaceum vocant. Id Monspelij in hortis prouenit ad nihil aliud vtile, quàm quod ex eius lapidosis seminibus coloris varietate formosis, nectuntur mulieribus corollæ ad numerandas preces, quibusdam & monilia. Incolæ vocant lacrymas, herbariorum vulgus Lacrymam Iob: quod rotunditate & nitido splendentèque lacuore ex oculis manantes lacrymas vtcumque imitentur. Gaudet hæc planta solo


LITHOSPERMV M

Arundinaceum, Dalech.



LITHOSPERMV M,

Anchusa facie, Lobelij.



madido & irrigari solito. Quamobrè ad puteos in hortis effossos seritur, vt aquam situlis dum hauriunt, effusam, vel dum olera lauant, radicibus excipiat. Assurgit ad sesquicubiti proceritatem, radice milio simili, foliis arundinaceis, latis, neruosis, tactu rigidis, ad singulos caulium articulos exeuntibus, vt tenuia stamina fructui præfixa, fructumque ipsum inuolucris vice protegant. Quod dictu auditumque mirum est, & huic planta ferè proprium, ante floris exortu fructus formatur & grandescit, absolutusque florem quasi intra se delitescentem & occultum summo vertice promit, candicantem, spicatum congestum. Fructus color per initia herbaceus: cum maturuit, è cinereo purpurascens, iucunda quadam & oculis grata varietate, figura non omninò globosus, sed infernè latiusculus, supernè tantillum cōpressus & fastigiatus, silicis duritia, & lineis quasi virgatus. Semen intus milio Indico simile,

Forma.

simile, rufum, gustu careale, non iniucundo, tunicis multis albis obuolutū, ex quo verisimile est & farinā & panē confici posse, non aliter quā ex milio & panico Indicis. Raræ huius plantæ nullus in medicina traditur vsus ab herbariis. Quidam esse putant Coicem Theophrasti, Arundinis foliis insignem, memoratum cap. 16. lib. 1. Hist. Item aliud Lobellius Lithospermum habet Anchusæ facie, in decliuibus saxosis vallis Ostensis Pedemontium nascens, fruticosis pedalis ramulis hirtis: foliis Lithospermi & floribus Anchusæ aut Echij. aut Buglosi facie, purpurascens, radice lignosa.

CHAMÆPEUCE PLINII, CAP. LIII.

CAMPHORATA minor hæc planta vulgò ab herbariis nominatur, quæ Chamæpeuce Plinij à quibusdam esse creditur. In squallidis & arenosis locis gignitur, radice subnigra, longa, crassa, surculosa: ramis multis, humi circa radicem iacentibus: foliis numerosissimis per cauliculos ex interuallis confertim prodeuntibus, larici similibus, nullo flore, nullo fructu. Chamæpeuce, inquit Plinius, laricis foliis similis lumborum & spinæ doloribus propria est. Chamæpeuce frutex est plurimis à terra assurgens virgis in summitate rubente lanugine obsitis, folia habet sexquinciali longitudine, angusta, gracilia, retroflexis vtrimque laterum extremitatibus & à tergo modicè

Nomina
Locus.
Forma.

CHAMÆPEUCE Plinij,
Camphorata minor, Dalech.

CHAMÆPEUCE,
Cordi.



hirsuta, flaua hyeme virentia: flores veris exitu in summis virgis producit paruos, candidos & foliaceos, corymborum modo coaceruatos, his singuli succedunt parui, aridiq; fructus hordeo minores, in quibus tantillum clauditur semen, radicibus nititur longis, obliquis & fibratis, foris in flauo rubentibus: odorem folia, flores, & fructus grauisimum habent: saporem verò acrem & vehemēter tenuem. Nascitur macris, putridis, viginosisq; locis sub Tedis arboribus. Dioscorides verò flores rosæ ei tribuit, quod fortè perperam legitur. Plinius florum non meminit.

HHh



ORTENSIBVS plantis acri facultate præditis aliquot genera Thlaspeos adiunximus: quædam alia à recentioribus obseruata hoc commodiore loco exponemus. Primum, id genus quod à Dalechampio obseruatum est propè Arcem pini in Sequanis, haud procul à Lugduno Salinario. In aridis nascitur, radice parua, breui, candida, superuacua, in exiles fibras diuisa: foliis octo, nouem, decem paruis, ocimo ferè similibus, nōnihil lacinia-
tis, humi iacentibus, exorientem caulem ambientibus, qui rotundus est, ima parte ruber, superne viridis, dimidium pedem altus, sæpius vnicus & singularis, nonnunquam in ramulos brachiatus, foliis tribus vel quatuor ex interuallis perfoliatæ modo eum singulis vestientibus, non binis simul, vt in aliis multis plantis, eo spatio quod inter caulem & folia est, tanquam ex ala prodeuntibus aliis foliolis & flosculis: floribus violæ minutis, albis, quos capillacei pediculi sustinent: semine in vasculis bifidis, cordis figura, extrorsum velut in umbonem prominentibus, introrsum velut in alueolum cauat, numerofo, lato, velut compresso, acri: foliorum & caulis sapore fatuo principio, mox subamaro, tandem fauces vrente: quare eadem ei vis, quæ & cæteribus Thlaspeos generibus. Huius pictura desideratur. Alterum eiusdem Thlaspi montanum candidum, ad vicum quem incolæ vocant D. Guil-
lielmi deserti, haud procul ab Agnania cœnobio gignitur, in præruptissimo saxo, ramosa furculosaq; planta, radicibus multis, huc illud dispersis, caule procero, in multos ramos diuiso, cortice scabro, è fusco nigrescente: foliis densis, leucoio similibus, sed breuioribus, candicantibus, gustu acribus: flore in summis ramis copioso, pusillo, candido: semine minutulo in latis vasculis Thlaspeos vulgaris modo, acrimonia sua linguam pungente. Tertium Dalechampi Thlaspi montanum minimum in vmbrosis montiū recessibus gignitur, radice quatuor digitos longa,

THLASPI Montanum
Candidum.



THLASPI Montanum,
Minimum, Dalech.




tereti, candida: ramulis permultis ferè humi iacentibus, quibuldam erectis, do-
drantalibus, foliosis: folio minimo, oblongo, ordine disposito vt in Aphaca, gustu
aeri: flore candido, minutulo, in cauliculorum vertice copioso: semine perquam
exiguo, in latis vasculis, acris saporis. Dodonæus quatuor Thlaspeos genera po-
suit. Primum quod à Lobellio quoque depi-
ctum & à Pena descriptum est, foliis longiori-
bus, angustis, mollioribus leuiter laciniatis,
Drabæ, caule multis alis diuiso, gracilibus, len-
tis, obsequiosis, flores Iunio ferentibus, pusillos:
deinde foliacea inuolucra, multa, compressa,
perfectè circinata, superne fissa, quæ semen
continent pusillum, rotundum, oblongum, ni-
gricans, acre, gustu feruens, & quemdam allij,
sinapi aut cepæ saporem exhibens. In maceris
vetustioribus, & aruis Galliæ, Germaniæ, An-
gliæ frequens. Alterum id quod à Matthiolo
primo loco positum est. Tercium cum Fuchsis
minus & angustifoliū, Germanorū *Bysenkraut*.
Foliis est & caulibus minoribus quàm Thlaspi
primum, ramulis multis & gracilibus fruticat,
in quibus flores, fructus, & semina sicut in pri-
mo genere, sed omnia hæc minora habet.
Quartum est Creticum umbellatum, Iberidis
folio, pictum etiam à Lobellio, cuius folia fer-
rata sunt, inquit Pena, vulgaris Iberidis, sed ma-
iora: caulis cubitalis, multos ramulos fundens,
in quorum extremo umbellæ & flores, sambuci

THLASPI Angustifolium,
Dodonæi & Fuchsj.




THLASPI Incanum Mechli-
nienſe, Lobellij.



THLASPI Fruticosum, foliis
Leucoij marini minoris.



palustris similes, ex candido purpurascens Julio & Augusto, deinde semen in corniculis Thlaspeos minoris similibus, acre & gustu feruens. Dodonaus Dramam etiam esse censet, de qua in horto diximus. His addenda quædam alia à Lobellio expressa. Primum Thlaspi incanum Mechliniense, quod finitimo Mechliniæ ruri fruticat, oleæ foliis, multisq; summo diuisis, hirtis ramulis, pedem & sesquipedem longis. Flos albus, & in pericarpis quadamtenus rotundis, summum caulem ambientibus, semē exiguum, minutis cæteris acre. Alterum eius Thlaspi fruticosum est, foliis Leucoij marini minoris. Virgæ numerosæ, sparæ, crebris Leucoij minoribus foliis: flores candidi, copiosi, & semen compressum Thlaspi parui. Radix lignosa, fibrata, in Belgij hortis. Aliud fruticosum spinosum Narbonense, quod non nisi sterilibus cautibus rupibusve propè Nemausum & Montspelum fruticat, dodrantalibus ramulis, multis alis diuisis, nonnihil spinosis & sinuosis Poterij ritu: folia oleæ, pusilla, albida, flores candicant. Semen acre glumis includitur. Item aliud folio est thymbræ, hirsuto, rigido: cauliculos emittit multos, pedales, fruticis specie, è quorum summis flores, albi, & semina in compressis folliculis. Huc adducenda etiam alia à Pena prodita. Ac id primum quod nusquam se



THLASPI Fruticosum
Alterum, Lobellij.



THLASPI Narbonense,
Pena.





vidisse ait, nisi in agro Narbonensi & Monspelienſi, locis squallidis, ſabuloſis, pro-
 pè puſillas anchuſas proveniens. Folia, flores, ſeminaq; ex luteo pallent, & peltæ
 ſuperioris ſunt, ſed penè pergamenæ chartæ inſtar pellucida, tenuia, ſimilitudine,
 ſapore Leucoij: vnde quidam Leucoium marinū putarunt: ramuli ſunt exiles, pal-
 mares, nitidi, foliis albicantibus thymi, non

SINAPI Et Thlaſpi media
Provincialis planta, Pena.



ita numeroſis. Aliud eiſdem puſillum Thlaſ-
 pi propè Monſpel. ad Caſtrum novum cis La-
 dum amnem naſcitur, aridis viarum crepidini-
 bus, ramulos multos ſpargens, rectos, vimineos,
 palmares & ſeſqui palmares, albidos: foliola po-
 lygonati, minora, aut centunculi, aut lauandulæ:
 floſculos albidos, Iberidis aut Thlaſpi Cretici:
 Clypeolos non diſimiles fert, ſed duplò mino-
 res. Tota planta albicat, guſtuq; Thlaſpi aut na-
 ſturtium indicat. Hoc Itali Alyſſon fecere, ſed
 doctiorum iudicio Thlaſpis potiùs adnume-
 randum quàm Alyſſo, cui aptior alia ſtirps in-
 uenta eſt à ſedulis herbariis, quàm in hortis
 alunt. Item aliud eiſdem Thlaſpi eſt id, quod
 montolis ſatis Narbonæ ad Lupi montis radi-
 ces oriſtur, Maio & Iunio flores muſcoſos, um-
 bellisq; confertos, ſuperioris non abſimiles
 edens, ſed albidos; ſemenq; minus multò, ſed
 admodum acre, foliola exiliora, diuiſura na-
 ſturtij horteniſis, per totos cauliculos numero-
 ſos, grandes, è radice non profunda, nec multū
 fibroſa, ſapore acerrimo, Thlaſpeos poſtremam

addo ex eodem Pena nouam plantam, propter communes inter sinapi, buniadem, & Thlaspi figuram ac vires. Prouenit non procul à Mâgdalenæ fano, in excelsissimis illis cautibus Gallicæ prouinciæ, floresq; Augusto promit luteos erysimi, nec siliquas dispares, in gracilibus ramis ad summum & imum, vna è radice digitum crassa, densa, pedem longa: capistrum folia, Thlaspi, aut draba, leuiter laciniata, albida & hirsuta, sapore erysimi aut buniadis barbareæ.

AGERATVM,

CAP. LV.

Locus.
Forma.



AGERATVM secundum & ferulaceum Plinius in pinetis gignitur, ac fruticat, arido macroq; solo, radice nigra, rugosa, contorta, lignosa, dimidij pedis longitudine: folio ferulæ aut fœniculi, statim ab radice copioso, per caulem impari exortu disposito: caulibus multis, angulosis, cubitalibus, ferulaceis: flore aureo, inodoro, senecioni simili, in umbellæ rotunditatem formato, licet ramuli flosculos sustinentes, & in umbellæ orbè cœnutes diuersis caulibus partibus attollantur: pertinaci in floribus aurei coloris fulgore, & gratia, vnde Agerati, idest, non senescentis nomen, gustu subamaris. Odor foliorum, dum teruntur, artemisiâ leptophyllon vulgarem refert. Floret Iunio mēse. Ageratum purpureum, herbariis quibusdam dictū, in nudis ferè cautibus gignitur,

AGERATVM Ferulaceum.

AGERATVM Purpureum.



vbi putris faxi puluisculus subest, vel riuulus aliquis illabitur, aut scaturienti aquæ guttis, vel aspergine rupes madescit: radice breui, capillata, subflaua: foliis paruis, numerosis, circa radicem sparsis, Agerato similibus, gustu subamaris, antrorsum obtusis: ob quam similitudinem Ageratum vocant: cauliculis plurimis per faxi crepidines pendulis, saxumq; auleorum instar. ornantibus, & contegentibus: flore violæ, purpureo, copiosissimo, suauissimè olente, vt vel ea sola dote mirū in modum placeat, tanta scilicet odoris gratia violis non postponenda: semine minuto, in oblongis vasculis. Germani quidam Moschatellam cæruleam vocant. De Agerato multo plura diximus in libro de Umbelliferis.

SYNANCHICA, CAP. LVI.

HERBA hæc in sabuletis & macris locis puenit, radice nigra, lignosa, *Locus.*
 sex digitos longa, fibrata, tenuissimis villis capillata: ramis multis, pedalis, quadratis, infernè rubentibus, geniculatis: foliis multis, lino vel galio similibus, ad geniculorum interstitia nodosque exorientibus, quinis, senisve: flore in summis caulibus, cauliumque ramulis copioso, principio rubro, post candicante: nullus in ea gustanti sapor deprehenditur. Siccat absque morfu. Ad anginas vtilissima est sumpta, & admota, quade causa Synanchi-

SYNANCHICA.

SYNANCHICÆ Species, *Iuncaria*
Salmanticensis, Clusij.



cam nominarunt. Synanchicæ species videtur planta, quam Clusius ait à Salmanticensibus Iuncariam vocari, à iunceorum cauliculorum forma & gracilitate. Tota enim iunceæ est, inquit, sed equiseti modo aspera, & geniculata; foliis vtrinque lini, & frequentibus ramulis ex alarum sinu prodeuntibus, copiosos & paleaceos, candicantesque flores proferentibus, semen deinde exiguum, nigricans: radix tenuis & candida. Tota herba subdulcis est. Prouenit locis arenosis inter vineta secundo à Salmantica lapide. Floret Iulio, semen fert Augusto.

LONCHITIS, CAP. LVII.

LONCHITIS in iis quoque est quæ in asperis & stecis locis prouenit, foliis valde porri similibus, inquit Dioscorides, latioribus, subrubris, plurimis, ad radicem circumfractis, velut terram versus paucis in caule, in quo flores seu pileoli, figura verò commicis personis hiantibus similes, nigri quidem, sed album quidpiam ab ipsis eminet, ex hiatu ad inferius labrum velut ligula: semē simile est lanceæ, triangulare, inuolucris clausum, vnde nomen accepit. Radix similis est dauco. Plinius, Lonchitis, inquit, non, ut plerique existimauerunt, eadem est quæ xiphion, aut phasganion, quamquam cuspidi simi-

Lib. 3. c. 144

Lib. 25. c. 11.

lis semine. Habet enim folia porri, rubentia ad radicem, & plura quàm in caule, capitula comicis personis similia, paruum exerentibus linguam, radicibus prælongis. Nascitur in sitientibus. Sed galericulata ista herba herbariis ignota est, quantumvis diu multumque in montibus & aridis locis eam vestigarint. Herbariorum quidam Lonchitum esse volunt Helleborinen Dodonæi: descriptam cap. 25. lib. 3. à nobis libro de plâtis. Quæ in vmbrosis, &c. Alij, Helleborinen nostram ferrugineam, descriptam supra, cap. 30. Vtriusque flos, sed præcipuè Ferrugineæ, comicæ personæ simile quidpiam ostendit, de altera lonchitidis specie diximus, libro modo citato.

POLEMONIVM, CAP. LVIII.

Nomina
Lib. 4. c. 8.



POLEMONION Græcis & φιλῆταιον, siue φιλῆταϊον, & χιλιόδυναμος à Cappadocibus, auctore Dioscoride, vocatur. Latinis Polemonium, & Polemonia, & Philætaria. Polemonium quidem, quasi in bellis vtile dicas,

Lib. 4. c. 8.

Forma.

adeo vt de eius inuentione sibi vendicanda certatum inter reges sit, quod herba esset chiliodynamis, id est, mille viribus prædita. Ramulos habet, inquit Dioscorides, tenues, pinnatos: folia paulò maiora quàm rutæ, sed oblongiora, ad polygoni aut calaminthæ folia accendentia: In summo velut corymbi sunt, in quibus semen nigrum, radix cubitalis est (πηχυσα: alij παχέα legunt, id est, crassa,) subalbida, similibus struthio. Nascitur in montibus, & asperis locis. Plinius ita depinxit. Polemoniam alij philetariam, à certamine regum inuentionis appellant, Cappadoces autem chiliodynamin: radice crassa, exilibus ramis, quibus in summis corymbi dependent, nigro semine, cæterò rutæ similis. Nascitur in montosis. Sed quænam planta

Locus.

Lib. 25. c. 6.

pro polemonia statuenda sit, dubitatur à multis. Dodonæus duas polemonij species depinxit, prius cauliculis teneris, geniculatis, foliis latiusculis, binis semper in singulis geniculis ex aduerso. In summis caulibus flores oriuntur conferti, candidi, deorsum vergentes: deinde semine nigricans caliculis rotundis concluditur, radix est cædida, læuis, longa. Spumeum papauer vulgò putatur, propter spumeam & sputi similem asperginem, quæ non raro albicans foliorum & geniculorum sinibus insidet, fortassè Melandryò Plinij, lib. 26. cap. 7. inquit Lobellius. Alterum Polemonium cauliculos profert etiam geniculatos, sed longiores: folia in eis longa, ima parte latiora, in angustum desinentia: flores rubellos in vmbellis, ferè valerianæ. Vtrumque locis asperis montosis & saxosis prouenit. Iunio & Iulio mensibus florent. Ocimastrum Valerianthes vocant Pena & Lobellius, aliis Valeriana rubram, Saponariâ alteram & Struthium Vlysses Aldrouandus. Recentiores nonnulli prius, Behen album esse putant, alij Ocymocides Dioscoridis alterum Behen rubrum, quæ ta-

POLEMONIVM,

Dodonæi.

Lib. 4. c. 22.



men cum Behen Serapionis minimè conuenire videntur. Sic enim scribit, Aben Mesuai. Species Behen sunt duæ, scilicet rubri & albi, & sunt ambæ venæ in magnitudine radices pastinacæ paruæ, quarum quædam sunt tortuose, deferuntur ab Armenia, odor eius est bonus, & eis viscositas quædam: & ambæ species sunt calidæ humidæ, & augmentum faciunt in spermate. Polemonium aliud accuratè pingendum curauit

sentio res videri
cum Behen Serapionis
com Cap. 22.

POLEMONII, *Alteræ*
figura.

vnà circinatim collectis, plenis, paribus, ligustri, aut corni fœminæ, succo ianthino vel atro, purpureo inficiente prægnantibus radice proluxa, lignea, implexa & vario flexu sparfa, intus alba, saporis nonnihil acris & amari, euulsu difficili. In Mompeliensi agro ad castrî noui aridos colles, & æstuosas margines oliuetorum,

POLEMONII *Species,*
Dodonæi.**POLEMONIA** *Mompel.*
lasminum luteum.

- Ibid.** & in luci Gramuntij cāpestribus saxosis, quàm plurima. Polemonij radix, teste Dio
Vires. scoride, bibitur in vino contra serpentes, & dysenteriam: & ex aqua aduersus vrinę
 difficultatem, & coxendicum cruciatus. Datur ex aceto drachmę pondere lienosis.
 Eadem scorpionis plagę alligatur. Tradunt eum qui radicem gestauerit, (non vt
 legitur, qui gustauerit, τὸν ἐχόντα,) à scorpione non feriri, eúmque si ictus sit, nihil
Lib. 8. sim. molesti passurum. Dentium dolorem mansa mitigat. Polemonium, inquit Galēnus,
 tenuium partium est, & desiccandi vim habet: quomobrem quidam radicem eius
 cum vino ad ischiadicos, dysenteriam, lienémque induratum potui exhibent.

HOLOSTIVM,

CAP. LIX.

Nomen.

‘ΛΟΣΤΙΟΝ herba, id est, tota ossæ dicta est per antiphrasim, quòd
 nihil duri ossæve habeat: tota enim tenella & graminea est. Parua
 est herba, inquit Dioscorides, tribus aut quatuor digitis eminens su-
Lib. 4. c. 10. pra terrā, foliis & viticulis coronopo aut gramine proximis, adstring-
Forma gentibus, radice valde tenui pili instar, alba (vulgares codices habent λεκκιν τῶς
 ἑλκκιν, quod est albam speciem, qui sensus videtur friuolus. At in veteri legitur, λευκιν,
Locus. ἰώδιν, id est, albam, fibrosam,) longitudine quatuor digitorum. Nascitur in editioris
Lib. 17. c. 10 terræ locis. Plinius, holosteon, inquit, sine duritia est herba, ex aduerso appellata à
 Græcis, sicut fel dulce, tenuis vsque in capillamenti speciem, longitudine quatuor
 digitorum, ceu gramen foliis angustis, astringens gustu. Nascitur in collibus terre-
In cap. 10. nis. Pro qua molli herbula aliam atque aliam herbarij depingunt. Matthiolus etsi
lib. 4. genuinum Holostium nulli dum in Italia notum esse putet, tamen nullam plātam
 se reperisse ait, quæ verum referat, quàm ea quę vulgò à Goritiensibus Serpentina
In cap. 123. vocatur, de qua in Horto egimus, Capite De Coronopo. Est enim herba exigua hu-
lib. 2. mi procumbens, quæ foliis cauliculisque coronopi modo exit, gustu adstringenti-
Pena in bus, radice tenui lignosaque. Nascitur quoque in collibus & sabulosis locis. At hoc
Adu. Matthioli holostiū à multis improbatur, quod eius radix minimè capilli tenuitate

HOLOSTIVM,

Matthioli.



HOLOSTIVM,

Quorundam.



fit, quod vult Dioscorides, imò crassitie lignosa, fusca, minimi digiti crassitudine: reliquæque planta capitulis & semine plantaginis, non mollis aut tenera, sed durior rigidiorque, quàm vt holostio datum sit, folia illi iunca, angusta, crebra, in terram procumbentia. Matthiolus ipse mutata sententia in postrema commentariorum editione Holostium aliud pictum exhibuit, nulla adiecta aut figura aut virium declaratione. Longè diuersam pro legitimo holostio proponit Pena, quæ multò breuioribus & crebrioribus gramineis, vix palmaribus viticulis, & foliis exit, coronopi diuisura, in superiore ambitu ex fusco virentibus, delicatioribus, fermè vt capillarium, sparsis: radix tenuissimis cirris, & capillis pluribus adianti veri; ternos vel quaternos digitos proluxa, pulla, & albicans fuscedine. In Narbonensi prouincia ad Veganiùm, & propè Lugdunum, etiàmque in Alsatia Germaniæ se vidisse ait, saxosis & incultis, sterilibusque collibus. Gustu exsiccata & adstringit, grata satis, & cuiusdam lentoris non immunis. Easdem facultates Dioscorides holostio tribuit. Potest, inquit, si simul coquantur, carnes compingere: bibitur & ad rupta cum vino. Sic & Plinius. Vfus eius ad vulsa, rupta in vino potæ. Vulnèra quoque conglutinat. Nam & carnes coguntur addita. Quæ ex veteri codice sic legit Cornarius. Nam & carnes, cum coquantur

HOLOSTION,*Loniceri.***HOLOSTIVM Salmanticensè; Clusij.**

cauliculi nudi exiliunt, palmum alti, qui à medio ferè ad summum vsque, multis & sese mutuo contingentibus flosculis ex herbaceo candicantibus orati sunt, vt in coronopo, quibus deinde semen plantaginis succedit theculis inclusum: radix est longa

In Aduers.

Ibidem.

Vires.

Lib. 27. c. 10

Embl. 9.

lib. 4.

Lib. 8. sm.

longa tenuis, lignosa. Collibus aridis Salmanticæ vicinis prouenit, maior & candidior iuxta Valentiam Hispaniæ secus vias. Floret illic Maio. Valentia verò Martio & Aprilis initio. Salmanticenses Holoſtium vocant.

CATANANCE *Quorundam,*


CAP. LX.

Nomina

Locus.

Forma.

Vires.



lib. de maritimis plantis.



ERBAM hîc adpictam Catanâcen priorem herbarij quidam esse volunt, coniectura quidem nō aspernanda mori, quòd multè in historia Diotcoridis commemorata nota illi cōueniant. Gignitur in aridis & sabulosis locis, radice tenui, iunceâ, nigra, non altè descendente, foliis crebris, albicantibus, coronopo similibus, cauliculis gracilibus capitula sustinentur quina senave, cyano ferè similia, latiusculis & acerosis laminulis compacta, albicantibus. Flos est puniceus, semen minutulum. Herba totius gustus adstringens. Quare vilem esse aiunt ad cohibendas sanguinis, aliorumq; humorum ex quauis corporis parte eruptiones, ad gargareonis inflammationes, & aphthas, si eius decocto os colluatur, ad maligna tibiæ ulcera. Hanc itaque plantam si pro Catanance agnoscamus, haud verum fuerit ad amatoria tantum expecti, cum experientia docuerit variis hanc morbis prodesse. Catanance alia descripta est à nobis in


STATICE,

CAP. LXI.

Nomen.

Locus.

Forma.



STATICE à præsentissima vi qua pollet, sistendæ sanguineæ & cuiusvis alius fluxionis nominata est hæc herba, à Statice Plinij diuersa, perperam etiam cantabrica eiusdè, Caryophyllus montanus alter nonnullorum. In aridis & petrosis nascitur, quinetiam ex lapidum saxorumq; rimis emergit, vt integram euellere volentibus saxum diffringendum sit. Catanances alterum genus Parisienses herbarij esse putant. Radices agit solidas, crassas, flexiles, nigras, in vetusta planta proximè folia multas, rugosas, nodosas, in vnam grandiozem & ampliorem ex variis partibus coeuntes, folia fert multa, humistrata, lanceolata vulgari similia, angustiora, venosa, crassa, in cauliculis nulla, quos multos emittit, iunceos, rotundos, plerumq; cubitales, glabros, in quorum fastigio capitulum insidet rotundum, alueolis multis pertusum, fauorum cauernis similibus, in quibus flosculi è phæniceo candicantes nitent, quibus delapsis, capitulum velut

lum velut tomento lanuginosum cernitur, & in cellulis illis minutum & exile semen coërcetur. Sapor totius plantæ adstringens, facultas ei ad miraculum vsque deficcâdi, & erumpentium humorum impetum cohibendi siue trita admoueat, siue succus eius bibatur. Dyfenterii succurrit, mensium abundantiam, sanguinis è naribus profluuium sistit, sanguinem excreantibus opitulatur. Denique vulneraria est, & maligna vlcera ad cicatricem perducit.

Locus.

SCORPIOIDES MONTANVM,

CAP. LXII.



SCORPIOIDES montanum herbariis quibusdam dictum in altis & asperis montibus nascitur, radice principio crassiuscula, nigra, in fibras multas & breues se diducente: foliis multis, longis, angustis, lanuginosis, leucoio purpureo similibus, sed margine non incis, caule palmum alto, foliola pauca mittente, flosculis tribus vel quatuor, cæruleis, in exiguum, rotundum, virgatumque capitulum siue corymbum conglobatis. Rara hæc planta est, montiumque solitudinibus inaccessis tantum familiaris.

Forma.

Locus.

TUNICA MINIMA,

CAP. LXIII.



TUNICA minima, aridis locis & murorum suggrundis Tunica minima nascitur, radice candida, in multas partes fissa, valde fibrata, cauliculis quamplurimis, dodrante non altioribus, geniculatis, surculosis, flexilibus: flore paruulo, quinque foliolis constante, ex albo puniceis, ex paruulo allabastro, vt in caryophyllo nostrate prodeuntibus, gustu austero. Holostium quidam esse putant.

Locus.

Forma.

L. 3005
Forma.

IACEA montana in apricis & glareosis montium locis gignitur: radice ferè rotunda, veluti ex foliis in sese cœuntibus coagmentata, fibris multis capillata: foliis statim ab radice multis, erucae modo diuisis, sed laciniis maioribus & latioribus, incanis lanuginosis: caule pedali, capite in eius fastigio, Acano simili, pro reliquo plantæ habitu, crasso, corti-


IACEA, Montana.



Vires.

cosis laminis & vnguibus substructo, Cinaræ instar, sed minimè pungentibus: flore albo: semine oblongo. Floret Aprili mense. Semen Iunio maturefcit. Quidam laceam Acanophoram vocant. Iacea alba in lapidosis & saxosis profilit: radice ferè pedali, contorta, lignosa, extrinsecus propè nigricante, fibrata: foliis parvis, minutim insectis, absinthio marino non dissimilibus, exilioribus, & magis incis: caule cubitali, anguloso, lanuginoso, in multos ramos supernè diuiso, quorum in vertice capitellum exiguis laminulis compactum extat, laceæ nigrae modo, ex quo flos ruber prodit. Sapor in tota planta perquam amarus est. Floret Iunio mense. Ad affectus ventriculi frigidus commendatur, ad hepatis & lienis obstructions, & ad menses prouocandos. Iaceas alias demonstrant Lobellius & Pena. Maiorem folio multum laciniato, in segetibus Gallia & Angliæ potius quàm in pratis nascentem, caules cubito & sesquicubito altiores proferentē, circa quem folia multa multumq; laciniata Hieracij modo

IACEA, Alba.



IACEA Maior, Lobel.



sunt, globulos duplò maiores, turbinatos, ex squamulis compactos gerit, apicibus florum purpureorum obductos Cyani maioris. Radix digitum æquat, lignosa: semen cnici, minus. Cyani floris est congener. Nonnunquam Mechliniæ in hortis, floribus albis & capitulis spinosis visitur, auctore Lobellio. Huic nouam subdit

IACEA, Montana
Narbonensis, Lobell.



IACEA, Maior
Lutea Penn.



IACEA, Incana folio
oleæ, Lobell.



IACEA Humilis, hieracij
folio Penn.



IACEA, *Incana.*

idem Lobellius Iaceam montanam Narbonensem propter aliquam inter se similitudinem. Cautibus & collibus Castrî noui conterminis agri Monspeliensis ab eo reperta cauliculo riget dodrantali & pedem alto, rotundo, folia Iaceæ luteæ & chamæleonis læuis Theophrasti media edente, altera parte incana, glauca, tantillum hirta: flores Iaceæ aut circij, sed minores: radicem sesquipalmarem, gracilem, minus fibratam, gustu cyani amaricat. Addit Lobellius Iaceam pusillam incanam folio oleæ, ptarmicæ specie. Est alteri Stœbe Salamanticæ Clusij per omnia similis capitulis & floribus exotica Syriaca plantula: sed cauliculis minus diuisus, palmaris & sesquipalmaris: folia maiora oleæ, magisque incana, minimè serrata: capitula item habitiora, nitidis argenteis squamis, gustu insipido, minimè amaro. Iaceas aliàs tradidit Pena. Iaceam lutea maiore, quæ in segetibus Monspeliacis reperitur, floribus luteis, venustis, à cartamo siluestri nullo modo distans capitulis, foliis, caulibus, nisi quòd tota asperiuscula est. Altera minor est, serpens, rarior, & fe-

re Narbonensium est, in marginibus satorum nascitur, ad pontem à Monspelio miliari distitum, via qua Frontignanum itur, foliis paruis, hieracij modo laciniatis, minoribus, retusioribus, vnà cum cauliculis dodrantalibus humi stratis: capitula gerit prorsus cyani, carulea, minus obsoleta: flores purpurascences, vel albidos: radix est crassior: semen cæteris non dissimile. Tertia propior est cyano quàm Iaceæ, vtrique tamen non absimilis. Lobellius Ptarmicam vulgarem Herbariorum vocat, propter saporem acriorem, amarum, halitumque tetrum, sternutamenta crebriò extorquentem. A radice duriore multos caules emittit, folia crebra, gnaphalij triplo maiora, leuiter serrata, ab imo multa, ad summa vsque, oblongiora, acutiora, graciliora: capitula ex squamulis albidis compacta, cyani aut Iaceæ, apices villosos, ex purpurascence colore in pallidum languescences. Tota pilosa est, & hirsutia incana. In Narbonensibus vinetis, & non procul à Monspelio nascitur. In hortos etiam translata est.

PHYLLVM,

CAP. LXV.

Nomina

Lib. 3. c. 13.

Genera

Locus.

Forma.

And. Lac.



VM φύλλον nihil aliud quàm folium significet, vix vllam herbæ notionem in animis informat. At ἐλαμόφυλλον, id est, oleæ folium, herbam foliis oleæ similem designat, quæ & vel foliorum eruptionis argumento vel à Musci similitudine, Bryonia dicitur, auctore Dioscoride, qui duo eius genera assignat. Thelygonum, id est, Fœminiparum, & Arrhenogonum, id est Mariparum, & vtrumque describit his verbis. Phyllum, quod Elæophyllum vocant, alij bryoniam (sunt qui βρύον legant, quod musci modo exeat qui βρύον Græcis dicitur) nascitur in petris. Est autem quod thelygonum dicitur, veluti muscus, oleæ folio, viridiore: caule tenui, breui: flore albo: semine papaueris, maiore (vulgares enim codices habent, χαρπὸν μέγιστον, ὡς περ μήκωνος, cum legatur in exemplari veteri, χαρπὸν λεπτόν, μικρόν, id est, fructu tenui atque pusillo.)

Arrhen



Arrhenogonum verò in cæteris quidem prædicto simile est, sed fructu differt. Habet enim fructum racemosum, similem flori oleæ quæ defloruit. Dicitur Arrhenogonum potum masculos partus facere, Thelygonum fœmininos. Hæc de illis narrat Crateuas, sed eorum historiam hæctenus mihi produxisse visum est. Quibus verbis Dioscorides, inquit Pena, non plantas quin sint, qualæve sint in dubium reuocat, sed duntaxat ambigit num sexus optionis compotem quempiam facere possit earum vtravis, nempe maris aut fœminæ, quod Crateuas prodidit, & fabulæ affine esse Theophrastus monuit. Dioscoridis igitur sunt descriptiones non Crateuæ, aut saltem non solius, sed ex aliis quos legerat Dioscorides auctoribus. Plinius ex iisdem mutuatus eadem ferè prodidit his verbis. Phyl-
 lum à Græcis vocatur herba in saxosis montibus nascens: fœmina magis herbaceæ coloris: caule tenui: radice parua: semine rotundo, papaueri simili. Hæc sui sexus facit partus. Mas autem semine tantum differens, quod est incipientis oliuæ. Vtrumque bibitur in vino. Plinius

In Adu.

Lib. 27. c. 12

Lib. 26. c. 15.

nium alio in loco, Arsenogonum & Thelygonum herbarum sunt, inquit, habentes vvas oleæ floribus similes, pallidiores tamen, semen album papaueris modo. Thelygoni potu fœminam concipi narrant. Arsenogonum ab eo semine oleæ, nec alio distat. Huius potu mares generari perhibentur, si credimus. Alij vtrumque ocimo simile tradunt. Arsenogoni autem semen geminum esse, testibus simile. Quibus verbis Plinius partim eadem quæ supra ex Dioscoride, partim diuersa ex Theophrasto genera designare videtur. Sic enim Theophrastus. διὰ καὶ χαλῶσι φύλλον, τὸ μὲν ἀρρηνόγονον, τὸ δὲ θηλυγόνον. ὁμοία δὲ ἀμφω, καὶ μὲν ὁρμητικὸν ἔχοντα ὠκίμους. ὁ δὲ χαρπύς τῷ μὲν θηλυγόνῳ, χαρπύς περ ἐλαίας βρύον: ὡχρότερος ὃ τῷ ἀρρηνόγονῳ, ὅτι περ ἐλαίας ὅπαν ἄρτι φύεται ἐκ τῷ βρύου, διόλου δὲ ὥσπερ ὄρχεος ἀνθρώπων. Id est, Quare Phyl-
 lum aliud mariparum, aliud fœminiparum vocant, similia ambo, & speciem habentia ocimi, fructus fœminipari est instar oleæ florentis musci, tamen pallidior: Maripari verò instar oleæ iam primum ex muscoso flore emergentis, & geminus, testiculorum hominis modo. Hinc suspicantur quidam duarum herbarum eandem & repetitam esse delineationem, quare Dioscoridis caput de phyllo irreptitum esse, alij minimè, sed vtroque phyllo vtramque mercurialem marem & fœminam exprimi. Alij ex diligenti peruestigatione & descriptionum collatione alia phylla adinuenerunt, Phyllumque thelygonum Dioscoridis esse, quod in saxis & rupibus apricis Allobrogum & Sequanorum, non aliter quàm muscus quidam innascitur, per aridam terræ squallidæ crustam: radicibus exilibus, breuib, & artris, serpendo huc illuc se spargens, magnumque tandem spatium occupans: folia densissimè congesta, procul intuentibus nonnihil aizoum æmulantur similiter crassa, non tamen similiter acuminata, sed tanquam in summo re-
 tusa, oleæ similia, magis tamen virentia, in ambitu crenata, & notis candidis ad singulas incisuras signata, quæ humi iacent, & largè terram operiunt: caulis tenuis & plerumque humilis, nonnumquam procerior, vt terram nactus est, vel

Lib. 9. hist. cap. 29.

sicciorē , vel humoris illapsu madidiorem, in tenuibus furculis: florem album, copiosum, violæ similem edit, suauiter olentem. Sapor totius plantæ aquosus est ac dulcis. Sunt qui semperuium montanum appellant. Quidam Lichenem primum Plinij esse arbitrantur, descriptum cap. 4. 26. foliis imis ad radicem latis:

PHYLLUM Thelygonum,
Matthioli.



PHYLLUM Arrhenogonum,
Dalechampi.



PHYLLUM Arrhenogonum
maius, Dalechampi.



caule vno, paruo: longis foliis dependentibus: qui cum melle tritus delet stigmata. Aliud Phyllum Thelygonum ostendit Matthiolus à Cortuso missum, quod genuinum esse putat adstipulantibus notis omnibus. Quibus in locis Thelygonum, in iisdem reperitur & arrhenogonum, musci modo saxis hærens: radice pro plantæ habitu crassiuscula: foliis numerosis, minimis, in ea exiguitate oleæ similibus: flore luteo: fructu simili oleæ, quæ flore euanescente formari tantum incipit, & adhuc minutula est, in summo ferè gemino instar testiculorum hominis. Alterum Arrhenogonum hîc appictum est, quod quidam maius vocant, vt à superiore discernatur, in Sequanis ad Sillij fluij originem, haud procul à cœnobio Balmenfi, in exigua & tenui terræ crusta proueniens, quæ nudos aliqui scopulos contegit: radice longiuscula, candida, paulatim gracilescens, fibrata: virgulas præternes huc illuc in orbem mittente, quibus aizoi modo, folia radiatim ex quibusdam veluti globosis

PHYLLVM *Arrhenogonum*
Thelygonon, Theophrasti.



bosis capitulis prodeuntia, stellæ au oculi figuram referunt, oblonga, carnosa & crassiuscula, rigidis villis eorum margines ambientibus, & in circuitu præfixis, qui tractantium manus blandè pungunt ac vellicant: cauliculis dodrantalibus, nudis, teretibus: flore albo, fructu oleæ nascenti simili, ferè semper gemino, instar testiculorum hominis, semine minutulo. Sapor qualis Aizoi fa tuus & subausterus. Phyllum Theophrasti in aridis Monspelio vicinis agris frequens nascitur, notis ab eo traditis prorsus conuenientibus: fruticosa planta: radicibus multis, fibratis: caulibus cubitalibus, hirsutis: foliis ocimi, lanuginosis, tactu mollibus: semine vel in racemosum pediculum congesto, vel gemino, testiculorum modo, non aliter quàm in mercurialis vtroque genere: grauis tetèrque odor in tota planta nares offendit.

PHYTEUMA,


CAP. LXVI.



T *φύτμα* Græci, sic etiam Latini Phyteuma vocant, fortassè quòd ad amorem, gignendàmque prolem aptum sit, quod ad amatoria conuenire nonnulli scriptum reliquerunt, vt tradit Dioscorides, atque ita describit: Folia habet struthij, minora: copiosum semen,

Li. 4. c. 25.
Forma.

PHYTHEUMA, *Matth.*



perforatum: radicem paruam, tenuem, per summa terræ nitentem. Ex qua breui descriptione difficilè est certi aliquid de vero Phyteumate decernere. Matthiolus scribit quibusdam Herbariis visum fuisse plantam hîc appictam Phyteuma esse: quæ nihil aliud est, quorundam sententia, quàm Campanula siue Ceruicaria Fuchsij, Thrachelium maius, siue Vuularia Dodonæi, de quo & Trachelio minori diximus in libro de plantis, Quæ flore placent. Dodonæus, libro de Floribus, putat Campanulam hortensem à Matthiolo pingi pro Phyteumate. Sunt qui Phyteuma esse volunt plantam tenui radice, gracilibus fibris capillata, saporis & odoris, si teratur, acris & vehementis, caulibus multis, palmum altis: foliis propè radicem in orbem per humum sparsis, betæ primùm nascenti similibus, longioribus, per caules impari situ dispositis, priuatim singulis, non multis in vno pediculo hinc inde ordinatis, vt in Resedis: flore herbaceo, luteis apicibus decoro, in spicam

Cap. 163.
hist.
Li. 2. ca. 20.

densam non coaceruato, sed ex superiore caulium parte exeunte, longis pediculis subnixo: semine in membranosis conceptaculis, amplis, quibus herbacea foliola sex, stellatim diuisa substernuntur: floret Maio. Aliud *Phyteuma* visitur

PHYTEUMA Quorundam,
Dalechampij.



PHYTEUMA Narbonen-
sium, Pena.



hodie, inquit *Pena*, in Gallorum prouinciæ & *Narbonæ* oliuetis propè *Montspe-*
lium, effigie *Valerianæ* minimæ: verùm folia illi in imo infectoriæ luteolæ sunt,
superiora autem diuisura & magnitudine pusillæ *Valerianæ*: plusculi sunt flores
muscosi, albidi, oleæ: semina pusilla, & instar vnionum rotunda. sed paululum
compressa, vestigium parui foraminis impressum habentia; inclusa folliculo *Pli-*
nianæ Resedæ, in cauliculis palmaribus & sesquipalmaribus, reptantibus. Radix
exigua *Valerianæ* minimæ.

RESEDA

RESEDA,

CAP. LVII.

Li. 17. c. 12.

PLINIVS Reseda herbæ meminit his verbis. Circa Ariminum nota est herba, quam Resedam vocant. Discutit collectiones, inflammatio-
nēsq; omnes. Hanc nonnulli Herbarij esse opinati sunt quæ hîc picta est, & Resedam luteam vocant. Radice est fibrata, minimi digiti cras-
situdine, intus lignosa, cortice crasso vestita, & saporis, & odoris, cum teritur, acris
& validi, nasturtij aut raphani modo: caulibus multis, pedalis, angulosis: foliis
eruca ferè instar diuisis: flore spicato, luteo, perquâ exiguo: semine minutulo, co-
piose in membranosis folliculis, angulosis, in extremo ruffis, oclulis & connuen-
tibus, non vt in phyteumate radiatim diductis. Hanc Resedam Pycnocomon
quidam esse putauerunt, conueniente profectò & historia & facultate, si radix ra-
phano similis, exiguum malum figura imitaretur cyclamini modo. Alia est Herba-
riis quibusdam Reseda candida, quam etiam nostro sæculo propè Ariminû rustici

RESEDA Lutea.



RESEDA Candida.



Resedam vocant. Radicis figura, odore, sapore superiori est similis, item caulium
multitudine: folia simpliciora sunt, & simplicius diuisa, in vnoquoque pediculo
plurima: flos in spica densissimè congestus, exiguus, è cinereo candicans: semen
minutulum in vasis oblongis, pariter vt & alterius angulosis, summo vertice
non compressis, sed velut hiantibus & multifidis. Sponte nascitur in agris propè
Ariminum: apud nos in hortis satum semine. Plinius de hac ita scribit. Qui cu-
rantea addunt hæc verba. Reseda morbos Reseda, scîsne scîsne, quis hîc pullos
egerit radices, nec pedes, nec caput habeant. Hæc ter dicunt, totiesque despuunt.
Hæc Plinius. Quæ plena sunt plusquam anili superstitione.

MYCONVS medicus perdoctus plantam hanc misit ex Hispania, & Sucudum Auicennæ appellauit, tum quòd Mauritanii Valentini, qui Gandiæ oppidum incolunt, nomen id ad hæc vsque tempora seruarunt, Sugudum nominantes, tum quòd Gentilis Sucudum, filicem interpretatur, quæ interpretatio huic plantæ maximè conuenit, cuius folia filici matri persimilia sint. Planta est cubiti altitudine, multos & rectos ex radice proferens caules, quadratos, lignosos, geniculatos, qui in ramulos etiam geniculatos & quadratos sparguntur, aliquantulum hirsutos. Ex geniculis folia prodeunt, propè radicem maiora, caulium summitati propiora, minora, serrata, filicis maris æmula.

SVCVDV S *Auicenna,*
Myconi.



Li. 1. Stirp.
His. c. 60.

In caulium fastigijs capitula sunt, ex purpureo carulea, odorata, stœchadis Arabicæ capitula repræsentantia. Radices ei multæ sunt, candidæ, lignosæ: semen minutum, candidum, planum, acerosum, insipidum. Nascitur in incultis, aridis, montosisq; locis. In hortis etiam colitur. Diu floret & in hortis præsertim toto anno. Herba est odorata, sapore cum acrimonia amaro, Græcis fortassè ignota, aut si nota fuerit, altera fuerit stœchadis species, id quod sapor, odor, vires eadem quæ stœchadis, demonstrant. Quam sententiam secutus Clusius Stœchadis alterius nomine pinxit & descripsit. Sucudus calefacit, auctore Auicenna, datur succus eius in potu aduersus dolores. Alphis illinitur, vlcera vetera ad cicatricem perducit, excrescentem carnem pulvis eius absumit, cum aceto podagræ imponitur, ex eo dulcibus, admixtis fiunt eclegmata ad tussim, drachmi, duobus cum hydromelite bibitur ad cardiogmum: item duæ drachmæ cum hydromelite valent ad dysenteriam & difficultatem vrinæ: in pello subditus menstrua ciet. Hæc Auicenna. Quæ omnia plantam hanc præstare posse manifestæ eius qualitates satis probant.

SELAGO PLINII, SIVE CAMPHORATA,

CAP. LXIX.

Li. 24. c. 32.



SIMILIS herbæ Sabine est Selago appellata, inquit Plinius. Hanc contra omnem perniciem habendam prodidit Druidæ Gallorum, & contra omnia oculorum vitia fumum eius prodesse. Hanc Plinij Selaginem quidam esse volunt Ericæ prius genus, alij Hyssopum nemorensem, alij Chamæpeucen, alij Musci terrestris genus descriptum à Trago, nomine Sabine siluestris, de quo tractauimus, libro De plantis quæ in vmbrosis, &c. maior pars herbariorum plantam hanc depictam, quam Monspelienfes Camphoratam vocant, ob similem caphuræ odorem, quem trita vibrat, Selaginem vocat.

Lib. 1. c. 39.

Locus. Arenosis & macris locis gaudet, in pinguibus tamen & humidis procerior fit. **Forma.** dice est crassa, subnigra, caule cubitali, nonnunquam altiore, tereti: ramis multis, propè

SELAGO, Sive Camphorata.



propè radicē longioribus, quā propiores fastigio sunt, brevioribus operis foliis, longis, angustis, Sabinæ aut Tamaricis æmulis: odore cū herba digitis friatur ac rumpitur, Camphoram referente: quam ob causam Camphoratam vocarunt, Officinis non prorsus neglectam, quòd in Martiati operosissimi medicamenti confectionem à Nicolao Myrepsò descriptam admittatur: licet Græcorum Arabumve nullus, quod sciam, vires eius facultatesque tradiderit. Quidam Cneorum nigrum esse volunt.


CONYZA MONTANA,

CAP. LXX.



MYCONVS peritus Medicus & rei herbariæ studiosus, plantam hîc pictam à foliorum florumque forma, odore, sapore Conyza speciem esse iudicauit, & à natalibus montanam cognominauit. Nascitur enim in saxosis, præruptis & montosis, præsertim inter saxorum rimas, radice lignosa, solida, intus candicante, foris nigrescente, minimi digiti crassitudine, gustu aliquantum adstringente, exsucca non minùs quàm suberis cortex. Ex hac stolones multi prodeunt, teretes, villosi, solidi, dodrantales, in quibus folia tenuia, hyssopi vulgaris, sed glutinosa Ledi modo, odore graui & viroso, & hircinum quid olente. In summo cauliculorum sunt flosculi, soncho similes, luteoli, in pappos abeuntes. Gustu subamara est cum leui acrimonia, caput tentans. Floret Augusto maximè.

TRACHE




DE Trachelii aliis in libro de Plantis, Quæ flore placet, tractauimus. Nunc de Trachelio montano, quod in asperrimis montibus gignitur, radice nigra, supernè crassa, in furculos infernè diuisa, fibris paucis capillata: foliis circa radicem multis, eam vndique cingentibus, longis anchusæ modo, hirsutis, caule vnico, paucis foliis vestito, alternatim dispositis: flore & semine reliquis Trachelii, figura coloréque similibus.

DORONICVM, CAP. LXXII.

DORONICVM Arabibus *Haronigi*, *Doronigi*, siue *Durungi*, dicitur. De Doronico vulgari siue Officinarum hîc tractamus. Huius triplex differentia, nò ita magna, imò potius varietas quædam à Pena assignatur, tribus Iconibus à Lobellio expressa. Primæ pusillæ caules teneri, fo-

lia molliuscula, oblonga vti plantaginis, nonnihil ex virente flauentia, perspicue hirsuta pilosellæ modo, siue cucumeris agrestis, sed attrectanti laxia, ambitu rotundo, nonnihil laciniato, & supernè angusto, cucumeri agresti quàm Cyclamino similiore, terna vel quaterna in pediculis enatis ex radice exigua terete, orbiculata, & sensum in angustum desinente, subtus & transuersum quasi squamularum to-

DORONICVM Minus
officinarum, Pena & Lob.

ruli: articulata, scorpionis cadauer & caudam exprimente, multum fibrata. Color illi candidus, sapor dulcis amaricatus, & lentorem multum cum pauxilla adstrictione coniunctum præfert. Caulis sesquipalmmum altus: flores in summo fert luteolos aut pallidos, radiatos, buphthalmi aut mediæ Consolidæ. Frequens nunc hæc in hortis Belgij, & profuse eadem cum Doronico vulgari & minori Officinarum, quod in montibus reperitur, & collibus Pedemontanis, nonnullis etiam Franciæ. Secunda maiorem & multò longiorem radicem profert, multis corticosis squamulis nitentibus, candidis, marmoreis, per transuersum cinctam alam vtrinque vnam squille marinx cancelliue forcipulis non dissimilem, subdulcem gustanti: folia, flores, & caulis maiora paulò & rotundiora. Umbrosis montibus gaudet, non solum Alpini ad meridiem, sed etiam frigidis ad Septentrionem. Huic similis tertia, magnitudine tantum distans à Lobellio ex Dodonæo picta, dudum à nobis & picta & descripta. In umbrosis montium locis gignitur inter saxa & cautes, radice parua, candida,

DORONICVM Brachiata
radice, *Aconitum Pardalian-*
ches, Plinij, & Matth.



DORONICVM Radice
Scorpij figura, Dalech.




candida,geniculis velut articulata,fibris multis
vtrinque donata serpentibus , Scorpium opti-
mè referente, ex cuius inferiore parte alia sub-
nascitur,quæ aliam similem procreat, tanta ra-
dicum in aliis procreandis fecunditate , vt in-
terdum plures duodecim cohæreant:folijs tri-
bus aut quatuor Melanio non dissimilibus,hir-
sutis, tactu mollibus,caule pedali, aliquot folio-
lis vestito : flore Chrysanthemi æmulo , & me-
dio velut disco,& orbiculato ambitu luteo. Ra-
dix tusa & cum axungia suilla mixta , scabiem
sanat, notissimò rusticis remedio. Dodonæus
Aconitum Pardalianches esse censet. Pena &
Lobellius , vt diximus , & multi alij Herbarij
Doronicum, Officinæ quoque passim Doro-
nici vice, huius radicibus in compositionibus
vtuntur. Quod autem Arabes Doronicum di-
cunt, ab illo siue Aconito Pardalianche differt.
Nam Auicenna Doronigi calidum & siccum
in tertio gradu esse scribit, cui etiam assentitur
Serapio, Doronicum calidum & siccum in eo-
dem gradu constituens , à quo temperamento
Doronici vulgaris, siue Aconiti Pardalianchis
radices multum absunt: nulla enim acrimonia,
nulla amaritudo tanta, aut alia qualitas in iis
percipitur , quæ tam calidas esse & siccas de-
monstret, sed dulcis tantum sapor ignauior &
emplasticus, qui eas temperie media, aut ei pro-
ximas esse ostendit: quam ob causam medica-
mentis oculorum anodynis admiscet. Idem
Auicenna Aconito Pardalianchi, quod Stran-
gulatorem Leopardi vocat, seorsum alio in lo-
co suas vires ex Dioscoride & Theophrasto ad-
scribit. Matthiolus Doronicum secundo loco
pictum Aconitum Pardalianches Plinij facit.
Tertium verò Doronicum vulgare à Cortuso
missum Aconitum Pardalianches minus, falsò
Doronicum, ab eodem Cortuso admonitus
Doronicum inter Aconita esse recensendum,
quod certò scirer sapius factò à se periculo fa-
cilè extingui canes, qui huius radices deuora-
uerint: id quod etiam Matthiolus ipse expertus,
confirmat. Quare Doronicum istud tanquam
venenum execratur, & ex Officinis & Pharma-
copoliis omnibus eiiciendum censet. At Pena
Theophrasti, Dioscoridis , Plinij Thelypho-
num, Pardalianchen, Cammorum vnus huius

Li.2.c.209.
Cap.325.
simpl.

Li.2.c.685.

Ca.73.li.4.

plantæ nomina diuersa putat, nec genere differre, sed Cyperorum ritu, magnitu-
dine tantum, situ, & numerosa radicum propagine, vt suprà declarauimus: alioqui
facies, sapor, odor omnibus idem, iidemque ferme natales. Doronico verò vim

GLASTVM Montanum,
Dalechampij.*Locus.*
Forma.

inesse canes interficiendi non negat, sed respondet Aloë saluberrima, & amygdalis amaris vulpes necari etiam Plutarcho auctore: & nulli vnquam pernicioſa fuerunt quæ Doronicum recipiunt Electaria de Gemmis, de Aromatibus, Confectio de moscho dulcis, quibus frequētissimè vtuntur Medici. Qua de re & de Aconito fusiùs differemus in lib. de venenatis.

GLASTVM MONTANVM,
CAP. LXXIII.

GLASTVM montanum in niuosis verticibus montium gignitur, radice crassa, nigra, fibris multis capillata: foliis circa radicem multis, longo, crassoq; pediculo subnixis, venosis, Glasto similibus, sed in summo magis obtusis: caulibus multis, pede altioribus, in quibus folia supradictis angustiora, & acutiora: flos copiosus in cauliũ vertice luteus nitet, oblongi vasculi figura, supernè in cuspides diuisus, prominente ex eius medio sinu, tenui pilo.

MELANIVM MONTANVM, *CAP. LXXIIII.**Locus.*
Forma.

MELANIVM montanum in algidis montium verticibus prouenit, cauliculis multis, exilibus: foliolis multis, humi iacentibus: flore cæruleo, duplò ampliore & maiore quàm in Melanio vulgari, rara quadà & eximia specie, si foliorũ exiguitatè cū inusitata floris magnitudine cõferas.

IASME Montana, *CAP. LXXV.*

PLANTAM hanc Iasmen montanam vocat ob eximiam odoris suauitatem, quæ Iasmini nostri flores æmulatur. In montiũ excelsorum iugis apud Rhætos crescit, radiculis breuibibus, subul- teis, caule tres digitos

alto, hirsuto, nudo, simplici: foliis propè radicem multis, Aizoo ferè similibus, in orbem humi stratis, villosis: summum caulem foliola quatuor vel quinque coronant, è quorum medio flores emicant partim albi, partim puniceï, gratisimum odorem spirantes. Candidum principio florem æstate rubescere compertum est.

*Locus.*
Forma.

PERSICARIA SILIQUATA,
CAP. LXXVI.



N montibus & collibus asperioribus Germaniæ & Sabaudia: gignitur, à Belgis in hortis colitur herba, quam Germani *Sprinkkraut* vocant, quasi erupticem siue salientem, aut subsilientem herbam dicās, propter siliquam quæ teres, gracilis, longa, pendula, chelidoniij, semina parua, rotunda, balsamina: fœminæ claudit, quibus turgēt, simul ac tantillum tangitur, in vultum proximi cuiusque quasi impetu vindicabunda, & se tangi queribunda, excludit. Idcirco, Noli me tangere vulgus Herbariorum vocat. Qua nota & nomine iam diu notissima est. Virgulta, folia, faciēsque ipsa Balsaminem, Mercurialem & Amaranthum exprimunt. Quare cauendum ne quis Mercurialem putet, neque eam in eodē vſus colligat.

Locus.

Forma.

OSTEOCOLLV M HIEROCLIS ET ABSYRTI,
CAP. LXXVII.



OSTEOCOLLV in mœnibus & faxis propè Sedunum Valesiorum caput nascitur, ac dependet, radice candicāte, graminis inſtar geniculata, tenuibus fibris capillata, è geniculis & internodiis exorientibus ramulis permultis, pensilibus, iunci modo læuibus, teretibus, sed geniculis distinctis, cirrosis, tenuiori proceriori; sparto similibus, perpetuò virentibus, nullo folio vestitis: flore in aceruum spicatum cōgesto, è fusco nigricante, ex cauliculorum articulis prodeunte, petiolo subnixo. Quidā Polygonium, alij Talcuition, alij Symphytum vocant. Osteocollon quidem, quòd fracta ossa ferruminat: Symphytum, quod dissectas carnes coalescere: vulgus credat, si coquatur vnā, efficacissima enim glutinandi facultate partium diuortia committere, & separata cogere. Viridem eruunt, vino coquūt, dum superſit liquoris pars tertia. Decocto veterina salinant Hispani, eo medicaminē morbos arcētes, & à vitis quæ

imminent, asserentes: tum etiam si quid intus ruptum esse suspiciātur, ab hac auxilium petentes. Hæc Absyrtus & Hierocles memoriæ prodiderunt.

CVCVLLATA,

CAP. LXXVIII.



VCVLLATA, seu, vt quidam volunt, Crias Apuleij, altissimis & niuosis montibus gaudet: è saxis prosilit, riulo quopiam præterfluente madentibus, radiculis multis, perquam tenuibus, nigris, breuib; foliis propè radicem multis, læuibus, crassis, in ambitu minimè crenatis, nec venosis, betæ nascenti similibus, gustu amaris, priusquàm sese explicent alabastris modo candicantibus, cum sese explicuerunt, lætiùs & nitidiùs virentibus: cauliculis quinque aut sex, teretibus, nudis, subrubentibus, præsertim superiore parte: flore nunc albo, nunc purpureo, vertici caulium velut affixo, in singulis cauliculis vnico, figura quadam rara & eximia, colorisq; iucundissimi: semine minutulo in capitulis paruis, fastigiatis, angulosis. Floret Iunio, etiam antequàm niuib; liquatis montium cacumina detecta appareant. De Criade hæc prodidit Apuleius. Crias nascitur in Lucania: maris albi colorem habet, quatuor rubicundis

ornata cauliculis. Radix pifta & promalagmate imposita, tertio die curat ischia-dicos: eadem trita & imposita locis dolore affectis, quosuis dolores sanat.

SCORZONERA,

CAP. LXXIX.

Nomina



IRCI barbæ congener est herba, quam *Scorzoneram*, aut *Scurzoneram* appellat Hispania, quod Latine Viperinam siue Viperariam, aut Serpentariam sonat: sic dicta, quòd contra venena viperarum ac serpentum efficax habeatur: nam Hispani Viperam *Scurzo* vocant: Noua

Ca. 137. li. 2.

hæc est planta, vt refert Matthi. inuenta primùm in Catalonia Hispaniæ à quodam seruo Aphro, à Ceruero Leridano pretio empto. Cum enim quidam messoris in agro à viperis demorsi fuissent, is qui in Africa plantam istam nouerat, propinato eius succo incolumes seruabat omnes, quòtque demorsi fuissent. Sed nemini plantam ostendebat, ne lucro fraudaretur. Tandem cum vasti homines locum obseruassent ex quo plantā deferebat, illuc profecti eam nacti sunt, inuentis nuper rescissæ herbæ reliquiis. Ea eruta, factoque ipsius periculo euulgata res est, & Scorzoneram appellarunt. Hanc siccam primùm ad se missam fuisse, ait Matthiolum à Ioanne Odorico Medico paulò post viridem, viuentemque se vidisse ad Cæsarem Ferdinandum ex Hispania delatam: non multò post tempore copiosam quoque in Bohemia se comperisse Doctoris Riberæ Medici diligentia, in monte quodam filuoso vliginosoque, non longè à Poggebroth. Folia edit spithamæ longitudine, succissæ æmula, sed longiora, subcandida, carnosæ, acuminata, quæ solo propiora longo pressoque pediculo à radice prodeunt, humiq; accubant, quorum nonnulla leuiter sinuata spectantur. Caulem fert sesquidodrantalem sæpè maiorem, rotundum, geniculatum, in quo folia breuiora angustioraq;: flores aureos, hirci barbæ proximos, vter alterum ab altero vix dignoscas. Hi flaccescentes in papposum mutantur orbem, in quo semen continetur album, longum, hirci barbæ semini

Forma.

femini simile. Radix subest fefquidrantalis, pollicari crafsitudine, raris adnatis fibris, cortice fubnigricante, vegeta, tenera, fractu facilis, fuccofa, alba intus pulpa, lacteo fucco pragnans, dulcis, & guftatu iucunda. Nafcitur in filuis & vliginofis locis atque obfcuris Hifpaniæ. Nafcitur & in Germania, Thuringia, ac

SCORZONERA

Hifpanica, Math.



SCORZONERA

Boemica, Math.



Bohemia in filuis ac montibus humentibus. Flos in Hifpania Maio mense prodit, in Germania feriùs, Iunio, videlicet ac Iulio menfibus. Foliorum aut radicis fuccus datur præfentaneo remedio potandus aduerfus viperarum, cæterorumq; venenatorum animalium ietus: quinetiam ad quofcunque peftiferos morbos.

Tempus.

Deuorata radix quotidie peftilentia contagia arcet, & venenis quibuscumque refiftit. Datur eadem aut eius fuccus vtiliter quoque comitialibus. Item cardiacis, vertiginofis, & animi deliquiis cordisq; tremori obnoxiiis. Commanducata per fe radix triftitiam difcutit, hilaritatẽque conciliat. Lacteus eius fuccus oculorum aciem acuit. Denique tota planta magni eft ad omnia vfus.

Vires.



HISTORIAE

OMNIVM PLANTARVM

LIBER VNDECIMVS,

623

Qui plantas omnes, quæ in Umbrosis, vdis, vliginosis & pinguibus locis proueniunt, exactè & ad vinum representat.

ADIANTVM, CAP. I.



TI FIDEM nostram liberemus, stirpium quæ locis palustribus lacustribusq; proximis gignuntur, nempe vdis vliginosissq; ac pinguibus, item vmbrosis, natura hîc explicanda. Sunt autem quàm plurimæ: quare iis in locis paulò diutius immorari necesse fuerit. Quod si quædam libro superiore reperientur, quæ aptius hîc collocari possent, aut contra, id nemini absurdum, aut mirū videri debet: quod non solum nataliū, sed foliorum aut cuiusvis alterius partis, aut virium, aut quævis alia similitudo, atq; affinitas proximas quasq; sibi adiungat atq; adsciscat. Hîc verò vt in aliis, ab iis quæ notiores sunt, & magis vulgares exordiemur. Primū à celeberrimo illo, & omnibus Officinis nomine potius quàm


ADIANTVM, Math.

Nomina

Lib. 7. c. 13.

Li. 22. c. 21.

In Theria.



re, præterquā in Narbonensi regione, notissimo Capillo veneris, sic etiam à Latinis, Apuleio teste, nominato: qui à Græcis vocatur ἀδίανον, quod & δαίανη, idest, quod in aqua non madescat, vel, vt Theophrastus ait, & δαίανη (ἀνέ) & φύλλον βρεχόμενον, & δαίανη ἐπὶ δαίαν & τὴν νοτίαν ἐπιμαρύν. ὅθεν καὶ ἡ προσσηγορία. Quæ Plinius sic reddidit. Aliud Adianto miraculum: æstate viret, bruma non marcescit: aquas respuit, perfusum merfūmve sicco simile est. Tanta dissociatioprehenditur: vnde & nomen à Græcis. Nicander non ἀδίανον dictum significat, quod in aqua merfūm ac irrigatum, immadidum non permaneat, quasi verò longiore mora in aqua æquè ac aliæ herbæ non madescat: sed quod imbris è cælo descendentis stillicidia foliis eius non insideant.

Ἀρχαῖες τὸ ἀδίανον, ὃ & ὁ μὲρ ποιο βαγένιος

Δεπὶ γὰρ ἐν τῇ πρὸς τοὺς περὶ γένεσιν ἐφελῖ.

Impollutū Adiantū, quod denso imbre cadete.
Destillans tenuis foliis non insidet humor.
Vel quod Fuchsio magis placet, ab interioribus puteorum

puteorum parietibus, & fontium marginibus, quas coronat, dictū est Adiantum, quod nimirum quasi sitiens illorum aquas, quas tamen odit & respuit, quærat. Polytrichon autem, quasi multicomum, quod capillos multos ac densos faciat, eorumque defluvia expleat. Callitrichon verò, quasi pulchricomum, quod capillos tingat, pulchriorisque reddat. Nec alia ratione capillus veneris hæc herba dicta est, quam à speciosis reddendis capillis nec alio nomine Veneris vox adiecta est, quam quod hæc pulchricoma pingatur. Plinius, Adianton quidam Callitrichon vocant, alij polytrichon, utrumque ab effectu, tingit enim capillum: & ad hoc decoquitur in vino cum semine apij, adiecto oleo copiose, ut crispum densumque faciat: defluere autem prohibet. Hæc Plinius. Latine Cincinalis, Terræ capillus, Supercilium terræ, Crinita, Arabibus *Berssegnaſcen*, seu *Bersausan*, *Culbare albir*. Gallicè *Cheueux de venus*, Germanicè *ſrauwenhar*, Hispanicè *Callantrillo de pozo*. Theophrastus scribit esse γένη ἀνθού ἀδιδάκης δύο. τὸ μὲν λευκὸν, τὸ δὲ μέλαν. χηρσίμα δὲ ἀμφοτέρω πρὸς ἐκφυσιν κεφαλῆς ῥιχῶν, ἐν ἐλαφίῳ τελεβόμενα. φύεται δὲ μάλιστα πρὸς ἑὲ ὑψηλῇ. Id est, Giza interprete. Genera adianti duo, candidum, atque nigrum. Ambo ad defluum capillum vtilia, oleo trita. Nascuntur maximè locis humidis. Quæ Plinius conuertere voluisse, sed Theophrasti sensum assecutus non fuisse videtur. Duo, inquit, eius (adianti) genera candidius, & nigrum, breuiusque. Id quod maius est polytrichon: aliud trichomanes vocant. Vtrique ramuli nigro colore nitent, foliis filicis, ex quibus inferiora aspera ac fusca sunt, omnia autem contrariis pediculis densa inter se ex aduerso: radix nulla. Umbrosas petras, parietumque aspergines, ac fontium maximè specus sequitur, & saxa manantia, quod miremur, cum aquas non sentiat. Quibus verbis perspicue declarat Plinius se trichomanes alterum facere adianti genus, scilicet candidum. At Theophrastus cum de vtroque Adianti genere dixisset, eo quem modò citauimus loco, subiicit de trichomane, diuersa planta quæ sequuntur. ὥς δὲ ὄνονταί τινες, καὶ πρὸς τραγυρεῖαν τὸ τελεχόμενες ποιεῖ. ἔχει δὲ τὸν καυλὸν ὁμοίον ἀδιδάκης τῷ μέλανι, φύλλα δὲ μικρὰ σφόδρα, καὶ πικρὰ, καὶ πεφυκότα κατὰ τὸν ἀλλήλων. ῥίζα δὲ ἐκ ὑπέστη. χωρεῖα δὲ φιλᾷ σκιερὰ. Id est, Trichomanes vrinæ stillicidiis confert, caulem similem habet adianto nigro: folia parua admodum & densa, & ex aduerso opposita, radix nulla subest. Opacis locis gaudet. Hic Theophrasto trichomanes Adianti genus non est, sed sui generis planta, præterea cum dicit cauliculos habere adianto nigro similes, apertè demonstrat trichomanes Adiantum candidum non esse. Matthiolus credidit aliquando, Adiantum candidum eam esse plantam, quæ vulgò saluia vita, & ruta muraria vocatur, quæ cum trichomane in petris, parietum ac fontium asperginibus nascitur. Deinde mutata sententia eam paronychiam Dioscor. fecit, de qua re paulò post dicemus. Alij, quorum potior sententia, Adiantum nigrum & album Theophrasti siue Plinij, putant esse duas hæc Adianti differentias, quibus omnes Belgij, Germaniæ, Burgundiæ, Franciæ & Sabaudia Officinæ, non solum hoc tempore, sed omniferè hominum memoria semper nigri & albi Adianti nomine vsi sunt. Iis radix pusilla, capillamentis densis compacta, nigris, rectis: cauliculi iuncei, paulò crassiores & prolixiores quàm trichomani, ex herbido pallentes, aut albicantes: foliola vtriusque & altrinsecus plumatim disita, filicis maris diuisura, & situ, sed multò minora, altera facie virentia, altera in glauco punctulis rubescentibus notata, series geminas habent, sesquipalmum, aut paulò magis alta, quæ nihil planè differunt, nisi quod nigro adianto cauliculi nigricant politiore nitore, foliaque sunt saturatiore virore, albo minùs. Vires prorsus eadem, à doctis quamplurimis multis annis exploratæ ad quotidianas & consuetas poriones, magno commodo, nullo detrimento, ut eos erare hinc perspicuum sit, qui filicis maris species, aut dryopteris esse autumant, cum nihil calidi, aut acris, nedum septicij hæc temperatæ & innoxie capillares habeant. Sed vt

Lib. 22. c. 22

Lib. 7. hist.

cap. 13.

Genera.

Lib. 22. c. 23

In cap. 132.

lib. 4.

Pet. P. in

Ad.

Adiant.

alb. & nig.

Forma.

Adian. Verum. ad verum Dioscoridis Adiantum redeat oratio, id, eodem auctore, pusilla gerit folia, similis coriandri, in summo incisuris diuisa, cauliculi quibus exoriuntur, nigro colore nitent, prætenues, palmum alti : radice superuacua, neque caulem, neque fructum, neque florem profert. Umbrosis & palustribus, circa parietum aspergines, & fontium specus nascitur. Ex qua descriptione liquet, neque saluam vitam, neque Adiantum nigrum, aut album Officinarum, verum esse Dioscoridis Adiantum, sed id quod hîc pinximus. Fibris prætenuibus, capillaribus, nigris nititur, compactis, vnde prodeunt numerosi cauliculi, iunicei, valde tenues, veluti cincinni, palmum aut sesquipalmum alti, sericeo colore & nigro nitentes. Folia anisi vel coriandri diuisura, latiuscula, alterno situ tenuissimis pediculis appensa, tenella, vtrinque lateribus rectis clausa, trianguli speciei, sed superiore ambitu laciniato & circinato. Hoc est verum Dioscoridis Adiantum, nullibi quàm Narbonensi regioni frequentius : saxis riguis, umbrosis, petrosisque locis in cemenis illic montibus finitimis, ac rupium, fontium & puteorum labris vel asperginibus Monspelij, Nemausque, raro alibi in Gallia, Germania, Belgio, Anglia, aut nusquam provenit, quin ne Italiæ quidem multis locis. Quare ex supradictis locis Lugdunum, Lutetiam, Antuerpiam, & in alia celebriora emporia asportatur, caroque à seplasiariis emitur ad Syrupi capilli veneris dicti apparatus. Eundem syrupum Galliæ ditiores & aulici quotannis Monspelij sibi conficiendum curant, indeque adferendum, quo recentiore ac præsentiore vtantur.

Locus.

Vires.

Lib. 4. c. 131.

Mirum enim quantum thoracis affectus, hepatis, renumque iuuat, quas vires cum pluribus aliis insignibus, Dioscorides assignat his verbis. Decoctum herbe potum prodest spirandi difficultati, suspiriosis, lieni, & felle suffusis, & vrinæ difficili, calculos frangit, aluum sistit, serpentium morsibus auxilio est, contra stomachi fluxiones in vino bibitur. Secundas ciet & menstrua, sanguinis reiectiones inhibet. Contra serpentium morsus cruda herba illinitur, alopecias densat, strumas discutit : furfures & manantia capitis vlcera ex lixiuio emendat : defluentes capillos continet cum ladano & myrtino, & susino aut hyssopo (sic enim vulgata habent exemplaria, $\chi\eta\ \sigma\sigma\iota\omega\eta\ \kappa\alpha\iota\ \iota\sigma\sigma\acute{\omega}\pi\omega$, vt & Ruelius conuertit, sed in vetere rectius legitur, $\sigma\sigma\iota\omega\eta\ \kappa\alpha\iota\ \delta\iota\sigma\acute{\omega}\pi\omega$, quod est, susino, aut æsypo) vinoque. Decoctum eius cum lixiuio & vino infusum idem præstat.

Lib. 22. c. 21

Coturnices & gallinaceos pugnaciores facit, in cibos eorum additum. Seritur gratia vtilitatis pecorum circa ouilia. Eadem ferè de Adiantis suis scripsit Plinius. Calculos è corpore mirè pellit, frangitque vtrique nigrum. Qua de causa potius quàm quod in saxis nasceretur, à nostris saxifragum appellatum crediderim. Bibitur è vino quantum terni decerpere digiti. Vrinam cient. Serpentiū & araneorum venenis resistunt. In vino decocti aluum sistunt. Capitis dolores corona ex his sedat. Contra scolopendræ morsus illinuntur, crebrò auferendi, ne pereant: hoc & in alopeciis. Strumas discutiunt, furfurisque in facie, & capitis manantia vlcera. Decoctum ex his prodest suspiriosis & iocinori, & lieni, & felle suffusis, & hydropicis. Stranguriæ illinuntur, & renibus cum absinthio. Secundas cient & menstrua. Sanguinem sistunt ex aceto, aut rubi succo poti. Infantes quoque exulcerati perunguntur ex iis cum rosaceo & vino prius. Folium in vrina pueri impubis, tritum quidem cum aphronitro, & illitum ventri mulierum, ne rugosus fiat, præstare dicitur. Perdices & gallinaceos pugnaciores fieri putant, in cibum eorum additis, pecorique esse vtilissimos. Sed breuius & distinctius de his Galenus. Adiantum in caliditate symmetrum est. Verum desiccatur & extenuatur, & digerit. Etenim caput ex alopecia glabrum capillis conuestit, & strumas & abscessus digerit, lapidesque frangit epotum, & viscosorum crassorumque è pectore pulmonèque excretionibus non mediocriter confert, & ventris profluuium sistit: non tamen vllam manifestam caliditatem affert, sicut nec frigiditatem. Verum posuerit ipsum

Lib. 6. sim.

quispiam

quispiam secundum hanc oppositionem & temperiem in ordine medio. Menses etiam adianti temperiem & vires insignes recenset, inter quas & vim purgatoriam ei tribuit, Græci verò & Plinius nullam. Illius hæc sunt verba. Capillus veneris temperatus est, aut temperato proximus. Constat substantia aquea & terrea, sed tenui modicè; eaque styptica, altera verò superficiaria, calida tenui admodum, ob quam virtus eius facillè resolvitur: quia virtus imbecilla à subiecto imbecillo promptè dissipatur. Hac autem tenuant, obstructa aperiant, digerunt, ventrem laxant, præsertim recentes: sicci enim constringendo fluxum sistunt, bilem verò flammam & pituitam ventre toto & hepate, humoresque crassos quantis imbibitos etiam ex thorace & pulmone screatu educunt, respirationem ob id liberam efficiunt, sanguinem clarum reddunt, & inde colorem commendant, & partium prædictarum dolorem leniunt, obstructionis hepatis ac lienis tollunt. Ob id ictero & morbis omnibus obstructionem sequentibus infusi, præsertim in aqua apij & intybi, aut decocto cicerum nigrorum, aut semiquatuor, aut sero lactis. Cum oleo autem chamamelino strumas delent. Syrupus ex his pleuritidi, peripneumonia prædest. Urinam mouet: decoctum eorum calculum frangit: purgat vterum à partu. Parte verò styptica fluxiones cohibet, sanguinem sistit, ventriculum & ventrem roborat, ne excrementa promptè recipiant, roborat etiam capillorum radices, ob id eorum defluuium sistit: quinetiam partem pilis replet, præsertim cum oleo myrtino, aut oleo ladani, & vino styptico. Idem præstat pulvis eorum vstorum: cinis ipsorum vel decoctum ex vino surfures lotionem abigit, fistulas lacrymantes sanat. Imbecillitatem eorum in purgando corrigunt violæ, cassia fistula, manna, serum lactis, parum sustinent decoctionem. Meliores bene habiti, foliis virentibus: strigosi enim & foliis flauescentibus inutiles. Datur decocti ad aluum subducendam libra vna.

TRICHOMANES, CAP. II.



PIXOMANES Græcè, Latine etiam trichomanes dicitur, & capillaris, à Gaza filicula, Officinis Polytrichum, quod nomen est adianti herbe Dioscoridis, & veterum aliorum testimonio, Gallicè *Polytric*, Germanicè *Villerrat*, & *Abtham*. Trichomanes autem Græci à vi sua vocauerunt, quod rara cute fluentem capillū explet, & subnasci facit. *μακρὸν* enim illi rarum vocant, & *τεχὰ* capillum. Hoc etiam nomine capillarem Latini dixerunt. Nasitur, inquit Dioscorides, iisdem in locis quibus adiantum, filici simile, sed exilius: foliis lenticulæ, tenuibus, acerbis, fusco colore splendentibus.

Nomina

Lib. 4. c. 132.
Locus.

Forma.

Quæ descriptio aperte demonstrat herbam hodie Officinis vbique omnibus polytrichi nomine non minùs vñtatam quàm cognitam, verum esse Dioscoridis & veterum trichomanes, radice parua, fibris nigricantibus comante, à qua penè statim foliati cauliculi iuncea prodeunt, nigri, nitidi, rigidiusculi, gemina vtrinque foliorum serie, quæ rotunda sunt, & lenticulæ figura, ex atro aduersa parte virentia, auersa maculis ferrugineis notata, rutæ murariæ ritu, sine flore, sine semine. Palustribus & vmbrosis locis vberimum, humentibus muris & faxis, & fontium

Locus.

specubus

POLYTRICHUM Aureum
maius (?) minus.

Polytr. Au.
reū. Fuch.
cap. 40.
Dodo. lib.
3. cap. 71.

Nomina

Genera.

Forma.



Locus.

Tempus.

Temper.

Uires

in summo capitula lentis aquaticæ ferè forma, eiusdem cum cauliculis coloris. Minus superiori prorsus simile, nisi quod omnibus partibus est minoribus. Maius nascitur in pratis humidis, & vliginosi, minus in petris ac muris humidis. Mense Iulio vtrumque reperitur. In caliditate & frigiditate symmetra sunt: deficcant tamen, extenuant & digerunt. Decoctum vtriusque in aqua aut lixiuio, capillorum radices firmat, ideoque in alopecia caput glabrum capillis vestit, potum viscosorum crassorumque è thorace pulmonèque excreationibus non mediocriter confert, lapides frangit & vrinas ducit, morbo regio correptis, & lienosis auxiliatur: strumas discutit, denique eadem quæ adiantum præstat. Recentiores vana superstitione ducti multa & incredibilia illis tribuunt. His ob magnam cum capillaribus

ROS SOLIS, Dodon.

Dodo. lib.
3. cap. 71.
Pet. Pen.
in Ad.

Nomina



specubus haud secus atque adiantum, & similiter perpetuò virescit, viribus & sapore quoque illi proximum, quare etiam Galeno & Dioscoride auctoribus, eadem quæ & adiantum præstare posse constat. Herbarij herbulam aliam Polytrichum nominant, quod sanè forma ab eo quod descripsimus alienissimum est, Germani *Gulden vviderthou*, Galli *Politric doré*, à colore aureo, Polytrichum autem à ramulis, qui capillorum instar tenues sunt. Duo eius genera faciunt, vnum maius, alterum minus: neque enim differunt nisi sola magnitudine. Fuchsius Polytricum Apuleij esse scribit, cum tamè idem cum Dioscoridis trichomane videatur esse. Polytrichum aureum maius cauliculos habet valde exiles, haud palmum altos, colore aurum referentes, circumque hos folia multa capillacea,

affinitatem adiungenda herbula, admirandis viribus, multis plantis apud antiquos celeberrimis proculdubio præferenda, quibus fortassè ignota fuit. Ros solis & Rorella herbariis dicitur, Germanis *Sondau*, Gallis *Rousee de soleil*, à mirabili natura nomen adepta, quantumvis diu sol feruidus æstate eam illustret, eius tamen folia semper rore & humiditate madent, eorumque lanugo guttulis aspersa manet. Et quanto sol feruidior, tantò magis humiditatem eius augere & fouere videtur, tantum abest vt exhauriat. Radice est fibrata, foliis rubescentibus, in rotunditate oblongis, hirsutis, cauis, pusilli cochlearis, aut auriscalpij instar, inter quæ proueniunt cauliculi, ternos, quaternosve digitos longi, rubescentes, in summitate inflexi, candidos flosculos gerentes. Sabulosus & vdis scrobibus gaudet, aliquando umbrosis siluis. Totius gustus acris est, subadstringens, non nihil acidus, & acerbus, admodum resiccās. Herbula hæc corpus tabescens roborat, ad falsæ pituitæ decubitus in pulmones efficacissima. Quare eo-

rum vlcera sanat. Aqua ex foliis & flosculis destillata, quæ fulua aureaq; est, propinatur phthisicis, asthmaticis, tussiculosis, aut quouis alio pulmonū vitio laborantibus.

R V T A

RUTA MVRARIA, *Paronychia*, CAP. III.



MEDICIS & pharmacopœis exercitioribus in capillarium numero, & iure quidem habetur, quæ vulgò Salvia vita dicitur, peritioribus muralis siue muraria Ruta, ob quandam foliorum similitudinē, & quod albicet pallido colore Rutaceo, Gallicè *Rue de mur*, & *Sauue* vñ Germanicè *Maurauten*, & *Steinrrauten*, Belgicè *Steinrwyte*, id est, petraea Ruta.

Nomina

SALVIA VITA.



Quibus enim locis verus capillus veneris, aut ceteræ capillares defunt, aut aliundè asportatæ, vieta reddita sunt, Salvia vita vtuntur, certissimo felicissimoq; euentu. Sunt qui ab effectu inter saxifragas recenseant, & ob natales empetron vocent. Radice est nigra, tenera capillata, superuacua: cauliculis siue iuncis tenuibus, non ita dissimilibus adianti, nisi quod atro colore non nitent, tenuibus & breuibus pediculis foliola hærent, quadantenus rutæ hortensis similia, minora tamen & parum crenata, aduersa parte læuia, auersa punctis quibusdam notata. Hæc etiam folia adianti nō parum referunt, sed minora huic, crassiora, & incisuris pluribus atque altioribus: sine caule, sine flore sine semine, vti ceteræ capillares. Verustis parietibus, humentibus, & inter ceterach, polytrichum, ceteraq; capillares, locis saxeis lubens provenit: nec solum Vere & æstate, sed etiam autumnō & hyeme eius copia

Forma.

Locus.

suppetit. Gustum consulentibus eodem quo ceteræ capillares temperamento esse videbitur, quæ re moti periti viri in veri adianti inopia, ad pectoris & pulmonum

Temper.

PARONYCHIA Altera, Matthioli,



vitia, ad hydropes, atque alia ad quæ adiantum valet, vsum eius feliciter accommodant. Preterea vrinam ciet, arenulas & calculos renum pellit, quapropter in saxifragorum generibus habetur. Peculiariter autē valere hanc comperitum est ad puerorum enterocelas. Assenerat enim Matthiolus nonnullos esse sanatos, hausto, tantum huiusce plantæ puluere, continuis quadraginta diebus, quibus collapsa in scrotum intestina apertè cernebantur. Eandem plantam qua de hîc agitur, idem Matthiolus paronychiam Dioscoridis esse credit, à quo multi dissentiant. Paronychia, inquit Dioscorides, exiguus frutex, in petris nascens peplio similis, minor longitudine, maioribus foliis. Sic, inquit Matthiolus, planta ista in saxis gignitur, atque etiam in veterum ædificiorum parietibus, foliis Rutæ adeo similibus, vt Rutæ muralis inde nūcupetur: peplus autem, cui Paronychiæ folia comparat Dioscorides, eodem teste, foliis Rutæ paulo altioribus provenit. Aliam plātam exhibet hîc quoque pictam, quam quidam legitimā Dioscorides Paronychiā faciunt, quorum sen-

Matth. in Cap. 49. lib. 4.

Ibid! Paronych.

Lib. 4. c. 49

Ibid! Forma.

tentiam

Forma.

PARONYCHIA Alfine-
*folia, Lobellij.*Paronych.
Lonic. To.
2. cap. 74.

Nomina

Forma.



nuntur, succulenta, pallida, subrubra: flores albi: semina parua in folliculis Scorpioi-
dis myosotidis non disparibus. Vtraq; exeunte hyeme, Vere primo flosculos edunt:
Vires. deinde minimo æstu marcescunt, vt nusquā toto anno cōpareant. Hæc Pena. Paro-

PARONYCHIA Altera, rutaceo
*folio, Lobellij.**MEDICA SYLVESTRIS*
Altera, Luneta.

Lib. 8. sim.



nychia, inquit
Dioscorides, il-
lita Paronychiis
atq; fauis reme-
dio est. Similiter
Galen⁹ Parony-
chia, inquit, ab
effectu nomi-
nata est, sanant
enim Parony-
chias, & vt re-
fert Dioscor. fa-
uos quoque. Vis
eius est tenuium

parium, & exsiccatioria morfu vacans: talia enim
sint oportet, quæ Paronychias sanant. Porro satis
constat tale esse idoneum ad digerendos affectus
omnes qui digeri postulant: talia enim sunt
quæ cum ex tertio sint ordine excalfacientium
& desiccantium, velut & hoc, essentia insuper
subtilis sint.




ASPLE

ASPLENVM, CAP. IIII.



ΑΣΠΛΗΝΟΝ quod splenē iuuet, Græcis dicitur, & σκολοπένδριον, *Nomina*
& σπλήνιον, & ἡμιόνιον, Theophrasto ἡμιόνιον, & ὡρίαις, non ὡρίαις, ut in
vulgatis codicibus legitur, Latinis similiter Asplenium, & scolopendrium, Gaza Mula, Mauritanis *scolofendrium, sculufendrium*, Officinis *Ceterach* & *Ceterach*, Italis *Aspleno, Scolopendria*, Hispanis *Doradilha*,

ASPLENVM.



Gallis *Ceterac*. Asplenū, inquit Dioscorides, foliis est multis, scolopendræ animali similibus, *Lib. 3. c. 14. Forma.*

ab radice vna prodeuntibus. Nascitur in parietibus, saxifq; siliceis & opacis, nec caulem, nec *Locus.*

florem, nec semen habet, folia filiculari modo diuiduntur, subter flauescencia, hirsuta, supernè viridia. Plinius. Asplenium sunt qui hemionium *Lib. 27. c. 7.*

vocant, foliis trientalibus, multis, radice limosa, cauernosa sicut filicis, candida, hirsuta: nec caulem, nec semen, nec florem habet. Nascitur in petris, parietibusq; opacis, humidis. Laudatissima in Creta. Theophrastus. ἥμιονος φύλλον σκολοπένδριον (sic vulgati codices habent, sed *Lib. 9. hist. cap. 19.*

legendum ex Dioscoride, τῇ σκολοπένδρῃ ῥίζας ὁ λεπτὰς. ὁρῶντα δὲ χωρὶς φαλῆς, καὶ περὶ δὲ. Id est, Hemionum folium habet scolopendræ simile, radices tenues, loca montosa & saxosa amat. Ex qua descriptione, tum ex huius plantæ viribus ad iuuandum splenē efficacissimis, tum ex certissima & appositissima collatione qua Diosco.

eius folia comparat scolopendræ animalculo noxio, tum ex natalibus constat, Arabum *Ceterac* verum esse Dioscoridis & aliorum veterum Asplenium siue scolopèdrium, suscribente etiam peritiorum huiusce temporis herbariorum iudicio, contra maiorum nostrorum tum medicorum, tum pharmacopæorum peruiaciam, qui phyllitum siue linguam ceruinam vulgò dictam, verum scolopendrium esse credebant, eamq; aspleni vice medicamentis immiscebant. Sunt præterea qui contendunt *ceterach* Asplenium non esse, quod eius folia Dioscorid. polypodij foliis conferat, quæ sunt illis planè dissimilia. At is illa scolopendræ, non polypodij similia dixit, sed ἐστὶν ἡμῶν μέν, esse ait, ὡς & τῶν πολυποδίων, id est, incisa vt polypodij folia, quod præcipuè in eo polypodio cernitur, quod in mōtibus prouenit, cuius folia foliis *ceterach* sunt perquam simillima, nisi quod paulò ampliora. Ad hæc Asplenium à scolopendrio diuersum esse aiunt auctoritate Galeni freti, sic scribentis. Nam quæ maiores sunt lienis obstructions vehementiora desiderant, nempe capparis corticem, radices tamaricis, scolopendrium & scillam, & eam quæ idipsum nomine representat Asplenon appellatam. Quibus responder Matiholus deprauatum hunc esse Galeni locum, & præter eius sententiam nimia scioli cuiusdam diligentia, vocem scolopendrium in contextum irrepsisse: quoniam sequentibus libris, in quibus de simpl. medicamentorum quæ nouerat, facultatibus differit, nusquam scolopèdrii, sed Aspleni tantum meminit, aut, quod verius fuerit, scolopendrij aut Aspleni nomine hemionitum intelligit, vt ipsemet testatur, cum recenset pharmaca ab Andromacho conscripta, quæ splenicis opem ferunt, hemionitis à veterum quibusdam Asplenū, ab aliis scolopendrium nominata est. Quare nihil mirum si Galenus illo loco As-

Lib. 5. sim. cap. 12.

In cap. 134. lib. 3.

Lib. 9. cō. pos. phar. loc. cap. 2.

plenum vel scolopendrium pro hemionitide vsurpauerit, cum præsertim hæc vi-
lienem absumendi prædita sit, vt paulò post dicitur. Ceterach quibus locis nascat-
ur diximus. Præstantissimum in Creta, & ibi repertum Vitruuius affirmat, circa
Potereum amnem, qui duas vrbes Gnoson & Cortynam interlabitur, parte quæ ad
Cortynam spectat pecoribus sine liene inuentis, quia herbam eam roderent. Ex al-
tera parte quæ ad Gnoson est, lienem habentibus, quia ibi herba illa non appareat.

Vires.
Lib. 3. c. 134. Tota hyeme viret. Vim habent folia, auctore Dioscoride, in aceto feruescenda, vt per
dies quadraginta pota lienem absument: quibus etiam contritis lienem ex vino
illini oportet. Stranguriæ & regio morbo prodest, singultum sedat, calculos in ve-
sica comminuit. Conceptum adimere creditur per sese, aut cum muli liene appen-
sa. Tradunt noctu silente luna, huius rei gratia effodiendam. Eadè sic breuiter Plin-
ius, tradit. Huius foliorum iure in aceto decoctum per dies quadraginta potio,
lienem absumi aiunt. Et, illinuntur autem, eadem sedante singultus (sic in vulgatis
legitur, emendatiùs in veteribus. Et illinuntur eadem, sedant & singultus). Nò dan-
da sceminis, quoniam sterilitatem facit. Theophrastus. τῆς δὲ ἡμῶν τὸ φύλλον τῆς
γυναικὸς τὸ ἀγόνειν (πρὶν φασὶ subaud.) μὴ γυνᾶς δὲ φασὶ τὴν ὅπλιν τῆς ἡμῶν, καὶ
τῆς θέρμης (alij σπέρματος legunt) χαίρειν ὃ σφιδρα καὶ τὴν ἡμίονον ἀνὰ. χεῖρ δὲ καὶ
πρὸς τὰς ἀσθίνεις, ὡς περ τοῦ κλυμένω. Id est, Hemionij folium mulieribus sterilitatem
adferre aiunt. Miscendum autem esse aliquid vngulæ muli, & pellis eius, siue semi-
nis. Mulas hac herba plurimùm delectari. Vtusus eius ad lienes, vt clymeni. Hic Theo-
phrastus an ad conceptionem impediendam folium hemionij alligari, an potari
velit cum vngula, aut pelle, aut semine muli, non distinxit. Et quod eius rei gratia
tradit Diosco. silente luna effodere oportere, Serapio aliter expressit, nempe opor-
tere ipsum suspendi die aliquo in cuius nocteluna non apparuit. Galenus breuibus
aspleni vires perstrinxit, his verbis. Asplenium tenuium est partium non tam cal-
ida est herba. Hac itaque ratione & lapides frangit, & lienes liquat. Aureus pul-
uis, inquit Matthiolus, qui in Aspleni auersa foliorum parte inuenitur, drachmæ
pondere cum albi succini pulueris semi drachma ex succo portulacæ aut plantagi-
nis potus gonorrhœa laborantes mirificè iuuat. Herbar totius decoctum datur vtiliter potandũ
ad omnes melancholicos affectus, præsertim ad eos qui ex Hispanica lue prouenerint. Alterum
asplenium siue scolopendrium exhibet Tragus, & siluestre appellat, quod in vmbrosis & humi-
dioribus siluis nascitur, radice nigra, villosa, cō-
pacta, ac cespitis instar contexta, è qua supra se-
xaginta aliquando folia, primo exortu linguæ
ceruinæ modo recurua, postea cum se explica-
rint, non tam lata quàm illius, sed adstrictiora,
vtrinque profundis, mediàmque venam, quæ pu-
nicei est coloris, & vicem caulis tenet, attingen-
tibus incisuris diuisa, nequaquam in altum ere-
cta, sed humi procumbentia, vermèmq; per
omnia longum imitantia, exeunt. Iunio mense
appetente alia multa longè angustiora priori-
bus foliis subnascuntur, polypodij instar incisa,
in altum se attollentia, longissimis gallinaceo-
rum pennis simillima, altera parte exiguis & lu-
teis punctulis notata, sicut & polypodij. Au-
tumno accedente hæc, quæ iam diximus, folia,
protinus

Lib. 27. c. 5.

*Lib. 9. hist.
cap. 29.*

Lib. 6. sim.

*In cap. 134.
lib. 3.*

ASPLENIUM, Siluestre.

*Aspl. silue-
stre.
Lib. 1. c. 188.*

Locus.

Forma.



protonus

protinus pereunt, reliqua verò quæ subinde noua erumpunt, humi per totam hyemem illæsa procumbunt. Elegantissima sanè planta, sed quæ non passim occurrit. Vbi tamen inuenitur, ibi magna copia prouenire solet. Dodonæus, vt paulò post indicabimus, Lonchitina asperam esse iudicauit.

HEMIONITIS,

CAP. V.

HEMIONITIS & σπληνιον Græcis, Latinis similiter Hemionitis, *Nomina* quasi mulariam dicas, & Splenium dicitur, ac rectè, vt quidam volunt, quòd eius folium, sicut & Phyllitidis, medicorū Splenia, nimirum oblongas plagulas figura imitetur, folium, inquit Dioscorides, dracunculi emittit, lunatum: radicibus multis cohæret, tenuibus: nunquam flores, neque semen, neque caulem gignit, in petrosis nascitur, austero sapore. *Lib. 3. c. 135. Forma. Locus.*

HEMIONITIS, *Matth.*



Quam descriptionem Leoniceus, Manardus, Ruellius, & eos secutus Fuchsius, ad eam accommodarunt, quæ vulgò lingua ceruina, de qua proximè dicemus, falsò scolopendria dicitur. Verà enim scolopèdriam, siue scolopendrium asplenium esse diximus. Aiunt enim illi folia esse dracunculi, seu ari, instar lunæ corniculantis falcata: etsi enim interdum in altum surgunt, tamen inter initia potissimum incurua, & lunæ crescentis modo falcata sunt: radicibus etiam cohæret multis, exilibus, nunquam florens, neque semen, neque caulem proferens. At recentiores quidam, in quibus sunt Matthiolus, Dodonæus, Anguillara, aliam Hemionitim, eamque veram sese reperisse asserunt, à Dioscoridis historia nihil prorsus dissidètem, quæ Romæ nascitur in quibusdam ruderibus, ædificiorumque ruinis propè magnum amphitheatrum, vnde herbarij eam in suos hortos transtulerunt. *Fuch. c. 111. In cap. 135. lib. 3. Lib. 3. c. 65.* Pena tamen atque alij recentiores etiam dubitant adhuc, num ea quæ ex Matthiolo hîc pingitur Hemionitis, sit specie diuersa à lingua ceruina

vulgò dicta, quod ei perquam affinis & germana videatur: quique in quibusdam Italiæ hortis eandem hanc, sed aliquantum loco latiorè, diuersam cum iudicent, frustra Romæ in ruderibus collapsorum ædificiorum vnà cum multis etiam quæsiisse: tamen Anguillaræ sedulo herbario nihil refragari, qui monuerat plâtam indidem se habuisse, sed adeò obscuris notis distantem, vt perparum aut nihil prorsus differre videretur à vulgari lingua ceruina. Nec enim minùs fibrosam radicem nigricantibus villis, summo cespite hærentibus huic inesse, folia autem auersis exarata decliuibus lineolis, seu obliquis liris, vt in lingua ceruina, basim tamen latiorè habere, & circum pediculum falcatam arcuatamve volubilis modo. Hæc Anguillara. Idem Pena in Anglia occidua ad rupes antrosasque cautes. D. Vincentij vno aut altero miliari ab vrbe Bristoia, vberrimè luxuriantem quandam facie linguæ ceruinæ plantam inuenisse se scribit, cui terna quaternave sunt folia, minora multò, vix enim maxima tres digitos longitudine excedunt, minimè crassa aut rigida, sed mollicella, inter quem & alias plantas capillares, alioqui latas & benè adultas ita exilis nascitur, nec villis à tergo lituris asperata, ad mucronem lateribus

HEMIONITIS,
*Minor Pena.**Locus.**Vires.*Lib. 3. c. 135.
Lib. 6. sim.Ruell. lib. 3.
cap. 68.
Lib. 25. c. 5.

utrinque ad medium sinuatis & reductis, basi latiore sinuata, segmento quasi utrinque interiori recuruo, gustu à lingua ceruina non diuerso. Clusius Hemionitidem peregrinam ostendit, peregrina elegantia, quæ naturæ luxu foliis duplicatis ad basim latioribus falcatas apophyses utrinque, lateribus mucronatas exerit. Modus, ortus & parilitas superioris Hemionitidis hic picta in umbrosis, vdis, saxosis & gelidis crescit. Ex aceto pota, auctore Dioscoride, lienem absumit. Galeno verò Hemionitis simul & adstrictionem & amaritudinem habet, quamobrem cum aceto pota lienosis auxilio est. Nec rectè quibusdam Hemionitis videtur esse quam Plinius Teucrion, quod eam Teucer inuenerit, quidam Hemionium vocant, spargentem iuncos tenues, folia curua, asperis locis nascentem, austero sapore: numquam floret, neque semen gignit. Medetur lienibus, &c. Eadem, inquiunt, Hemionitidi ferè à Dioscoride tributa sunt. Nam quod Plinius iuncos tenues spargentem describit, Dioscorides multiplici & exili radice demonstrauit, quod ille foliis curuis, is foliis dracunculi lunæ modo incuruis delineauit, id est, *μυνοειδὴν*. At si integri sunt hoc loco Plinij codices, teucrium cum Hemionio siue Hemionitide perperam confudit: sunt enim prorsus diuersæ plantæ, ut in teucrio demonstrabitur. Ex vetustis exemplaribus quidam legunt, Inuenit & Teucer eadem ætate Teucrion, & quam quidam Hemionion vocant, &c. Lectione facili & perquam comoda. Alij non Hemionium illic, sed Hermon ex veteribus & emendatioribus libris legendum esse affirmant. Ex quorundam herbariorum sententiâ aliam Hemionitidem hic pingendam curauimus, quæ in Ilua provenit, radicibus multis capillacea tenuitate, breuibus, subnigris: cauliculis pedalem altitudinem vix attingentibus, in folia septem ferè aut nouem diuisis: quorum quaternâ vel sena utrinque caulem pari ordine vestiunt, terna verò in summo caule extantia inferiorum foliorum versum claudunt. Sunt autem ea omnia longa, angusta, in ambitu nonnihil crenata, obliquis incisuris vtraque parte distincta, quas per medium folium procedens & eminens costa separat.

HEMIONITIS Altera,
Dalechampi.*Vires.*

Vis ei eadem quæ alteri hemionitidi: flos nullus, nullum semen, atque adeo ne auctam quidem foliorum partem subflauis puluisculis contegit, qui in aliis id genus plantis cernitur.


*PHYLLITIS,**CAP. VI.**Nomina*

Lib. 3. c. 104.

Forma.

UAE Græcè *φυλλίτις* quasi foliosam dicas, ut quæ caulibus, floribus, seminibus expers, nihil nisi folia aut foliosus cespes appareat, Latine quoque Phyllitis nominatur. Officinis Lingua ceruina, perperam scolopendria, ut proxime diximus, Gallicè *Langue de cerf*, Germanicè *Hirschung*. Phyllitidem describit Dioscorides foliis esse rumici similibus, longioribus, & viridioribus,

PHYLLITIS.

PHYLLITIS, *Laciniata*,
Clusij.

brata prodeuntia, eiusdem læuoris & viroris interna parte, at externa nullis aut rarissimis transversis lineis notata, & extrema parte multipliciter dissecta. Hanc in Cantabria non procul à monte D. Adriani nuncupato, qua per eius specum & fornicem transitus est in Hispaniam, locis umbrosis in rupibus se obseruasse ait, raram tamen inter plerasque alias vulgares, Folia Phyllitidis, inquit Dioscorides, in vino

dioribus, senis aut septenis, rectis, quæ parte anteriore læuia cernuntur, à tergo autem penfiles quasi vermiculos ostendunt. In umbrosis & opacis horrorum locis emicat, gustu acerbo, neque caulem, neque florem, neque semen profert. Quas notas omnes, qui propius inspexerit, minimè ambiget Phyllitida eam esse quæ lingua ceruina & scolopédria vulgò nuncupatur. Primùm umbrosis, opacis, humentibusq; locis prouenit, fontium & puteorum parietibus, veterum aliorum parietum & siluarum vdis, deinde foliis est vulgaris lapathi, maioribus, longioribus, viridioribus, rectis, senis, septenis, aliquando pluribus, è radice multis capillamentis fibrata, nigricante, adianti simili, anteriore parte læuibus & virentibus, à tergo multas transversas lineolas seu liras extantes, subrubentes habentibus, ab ima & latiore parte secus mediū neruum digestas, ad summum vsque quâ in mucronem desinunt, lapathi vulgaris aut linguae similem, vnde ei linguae ceruinæ nomen Officinæ indiderunt, quæ lineolæ, vt Dioscorides ait, penfiles vermiculos referunt. Adhæc gustu est acerbo, subastringente, exsiccante, non ingrato. Denique caule, flore, semine caret. Quod si eiusmodi plantæ quædam reperiantur, quæ multò plura senis septenisve folia emittant, ne id quidem Dioscoridi repugnat. Nam ab vna radice non multò plura quàm Dioscorides ait, folia eriguntur, sed à multis coniunctis, quas si separe non plura senis septenisve prodire conspicias. Quare à Leoniceni, Manardi, Ruellij, Fuchsij sententia, qui Phyllitida linguam ceruinâ non esse, sed hemionitida cõtendunt, plerique omnes docti herbarij dissentiunt. Hemionitis enim etsi caule, flore, semine careat: folia tamen lapathi minimè habet, sed dracunculi, curua, & lunæ crescentis ritu falcata. Deinde alia reperta est Hemionitis, legitimâ ac veram notis omnibus referens, vt superiore capite declarauimus. Non omittenda hic est propter elegantiam Phyllitis Clusij, quæ sola foliorum forma à vulgari differt, alioqui per omnia similis: sunt verò ea palmari longitudine, sena aut septena, ex radice multis nigris capillamentis fi-

Locus.

Marth in
Cap. 104.
lib 3.Lib. 3, c. 104
Vires.

110.8. sim.

Matthiol.
in cap. 104.
lib. 3.

pota serpentium moribus aduerfantur, quadrupedibus per os infusa auxilio sunt: & si dysenteria aut resoluta alius excercet, potui datur. Eadem breuiter sic Galenus. Phyllitis cum qualitatibus sit acerba, non absurdè diarrhoeas & dysenterias pota iuuat. Phyllitida vulgus vsurpauit ad lienis affectus, quibus prodesse experimento constat. Nec desunt qui eiusdem stillatitia aqua vtantur ad cordis affectus, & contra singultum. Eandem gargarissandam quoque præbent ad prolapsum columellam. Refrigerat iocinoris & ventriculi ardores siccorum foliorum farina eadem aqua excepta & illita. Eadem quoque aqua os colluendum præcipiunt ad palati desquamations, & cruentas gingiuas.

LONCHITIS,

CAP. VII.

Nomina

Genera.

Lonchitis
asper.
In cap. 145.
lib. 3.

Forma.



ONCHITIS Latine dicitur vt Græcè *λογχίτις* à seminis triangula figura cuspidi lanceolæve mucroni simili, id nomen sortita. Dioscoridi duplex est. De priore, in libro de Plantis quæ in asperis, &c. tractabimus. Altera verò Lonchitis *τραχέια*, id est, aspera dicta, quam Dioscorides tradit foliis esse scolopendrij, sed asperioribus, maioribusque, ac multò magis diuisis, ex Matthiolo hic proponitur, quod folio sit scolopendrij proximo, longiore tamen & magis diuiso, & ad polypodij formam potiùs accedente, spithamæ longitudine, vtrinque disparibus incisuris dissecto, te-

LONCHITIS Aspera

maior, Matthioli.



LONCHITIS Aspera

minor, Matthioli.



nuibus aculeatisque denticulis serrato, & vbique aspero, vnde illi nomen. Caulem nullum profert, neque flores, neque semen, polypodij & aspleni ritu, quorum imaginem refert. Radice nititur multiplici, tenui, subrubente sicuti Phyllitis. In Italix locis quibusdam nascitur humectis & viginosis. Duo eius genera depinxit Matthiolus. Vnum maius, quod à Luca Ghino, minus quod à

Iacob.

Locus.

Genera.

Ibid



Lonchitis Aspera Illuensis.



Iacob. Anto. Cortuso nactus est. Præterea Pseudolonchitin asperam, quæ est Lonchitis aspera Maranthæ. Cauliculus est spithameis, nitidis, fuscis, rigidis, foliis Adianti Pliniani, sed gemino situ, filicis fœminæ ritu, crassioribus multò, altera parte virentibus, altera Aspleni modo rubiginis. Radix pusilla, capillamentis crebris fibrata. Aliam Lonchitin asperam exhibet Dodon. & à quibusdam Longinam & Calabrinam nominari ait, ab aliis recentioribus Asplenium magnum & siluestre, Germanicè *Spicant*, & *Milzkraut*, filicibus similem, memoratam supra ex Trago, & luculentè descriptam, cap. De Aspleno. Lonchitis aspera alia in Ilua crescit, radice numerosâ, foliis multis, dimidio pede longioribus, è rufo subnigris, in alia foliola diuisis, nostrati Aspleno similia, supernè viridia, infernè rufa & puluerulèta lamine obducta, saporis austeri, qualis in aspleno deprehèditur: quapropter ea iuuari lienosos quidam affirmât. Lõchitidis primæ radix, auctore Diosc. ex vino pota vrinâ ciet. Lõchitis aspera

Lõchi. asp.
 Dod. lib. 3.
 cap. 66.
Nomina
Forma.

Locus.
 Lõch. Illu.
Forma.

Vires.
 Lib. 3. c. 145.

Li. 7. simpl.

vulneribus mirū in modū prodest, in eisq; inflàmationes excitari nō patitur. Pota ex aceto lienē absūmit. De vtraq; etiā sic scribit Galē. Lõchitidis eius videlicet quæ semē habet triāgulare, figura lanceæ simile, radix potissimū quodammodo similis est radici dauci: proinde vrinâ ciet. Porro eius q̄ scolopēdrij similia habet folia, ea ad glutināda vulnera vtilia sunt viridia: sed sicca cū aceto pota lienes induratos sanāt.

Nomina



RAECIS *πίλες* & *πίλεον*, Latinis Filix nominatur, Arabibus *Sarax* & *Sarachs*, Italis *Felce*, Germanis *Vualdifarn*, Hispanis *Helechoyerua*, Gallis *Feugiere*, & *Feuchiere*. Officinæ Latino nomine vtuntur *πίλες* autem & *πίλεον* à Græcis dicitur ab alis auium, quarum speciem in ramulis disposita eius folia referunt: pennatus enim & pennatis foliis frutex Filix est. Dicitur & Plinio auctore Blechnon: quanquam alij non *βλήχρον*, sed *βλάχρον* dicant. Nicander *βλήθρον* appellat hoc versiculo.

Li. 27. ca. 9.

In Theria.


Εν δὲ πρὸς λυχνίδεως βλήθρον περιβάλλει χάρσιν.

Genera.

Vbi Scholiastes *βλήθρον* interpretatur *πίλεδα*, & *βλάχρον*, idest, Filicem. A qua Latinis Filecta, vt à carice carecta nominantur, & Filicones à veteribus pro malis & inutilibus accipiebantur. Filix duplex est Dioscoridi, Theophrasto, Galeno, Plinio, *πίλες* simpliciter dicta, quæ Latinis Filix mas nominatur, *Feugiere masle*, & Filix fœmina, quæ *γῆλυπιλες*, & *νυμφαία* *πίλες*, *Feugiere femelle*, vtraque quamuis sterilis planta vulgarissimæ cognitionis. Filici folia sine caule, sine fructu, sine flore, ex vno pediculo cubitali longitudine exeunt, multifida, alarū auium

Forma.
Diosc. li. 4.
cap. 178.

FILIX Mas, Math.



FILIX fœmina, Math.



Locus.

modo expassa, subgravi odore: radice per summa cespitum nigra, oblonga, adnata siue propagines multas fundente, subadstringente gustu. Nascitur in montibus vmbrosis & saxosis. Filix fœmina foliis est superioris Filicis, quæ non vno, vt illa, pediculo nitantur, sed furculos siue ramulos multos & altiores habentia: radicibus longis, pluribus, obliquis, quæ ex nigro in luteum flauescunt: aliquæ etiãmnum rubræ inueniuntur. Plinius sic ferè descripsit. Filicis duo genera, nec florem habent nec semen. Pterin Græci vocant, alij Blechnon: cuius ex vna radice complures exeunt Filices, (Dioscorides dixit *ρίζων πάλθος ἔχον ἐκφύσας*, idest, multas habere radículas adnatas, bina etiã cubita excedentes longitudine, non graues odore, (Dioscoridifolium est *ὑποδυσώδες*, idest, odore nonnihil graui.) Ex vetustis quidam

Lib. 27. c. 9.

quidam legunt, subgravi odore, hanc marem existimant. Alterum genus The-
lypterin Græci vocant, alij Nymphæam Pterin. Est autem non singularis atque
fruticosa (depravata hic sunt exemplaria, in quibus legitur, Est autem singularis,
atque non fruticosa) breuior, molliorque & densior, foliis ad radicē canaliculata.
Vtriusque radice sues pinguescunt. Folia vtriusque lateribus pinnata. Vnde no-
men Græci imposuere. Radices vtriusque longæ in obliquum, nigrae. Dioscoridi fœ-
minæ radix è nigro flavescit, & interdū rubra est) præcipuè cum inaruerē. Siccari
autem eas sole oportet. Nascuntur ubique, sed maximè frigido solo. Hæ descri-
ptiones Filices nostras adamussim delineant, atque euidenter distinguunt. Mas-
enim statim ab radice multis compacta appendicibus, crebros emittit & proli-
xos bicubitales, vel proceriores non caules, sed pediculos, pennatim foliosos.
Fœmina verò sæpius vnum, interdum aliquot promit caules, ferè à medio in mul-
tos diuisum, pennatim etiam foliosos ramos, & radice est minore: quod discrimen
Theophrastus expresit his verbis. Διαφέρει δὲ τῆς ὡσεὶδος ἡ γλῦπις, τῷ τὴν μὲν
φύλλον ἔχει μονόκωλον (fortasse μονόμορον, vt in Dioscoride legitur) ὅτι δὲ μεγάλην,
καὶ μακράν, καὶ μέλαιναν. Id est, Differt fœmina Filix à mascula, quòd folium hæc ha-
beat ex vno membro siue pediculo, & radicem magnam, & longam, & nigram.
Sed de semine Filicis ambigitur. Quamuis enim Theophrastus, Discor. Galenus,
Plinius eam ἀγερποι esse affirmauerint, id est, sterilem & sine semine: quin etiam
medici Arabes & Persæ ad magicas vanitates nati, huius seminis nō meminerint,
tamen non solum Agyrtae vulgi ignorantiæ ad questum impudenter illudentes, sed
etiam neoterici quidam, qui se naturalium rerum indagatores profitentur, Filicē
semen ferè asseuerant, auersis foliis inhærens, sed adeò minutum, vt visum ferè
fallat: legiq; abscisis propè radicem foliis, & in domo suspensis, substrato linteolo,
aut papyro, circa finem Iunij: hoc enim ferè tempore maturefcere. Alij vna solsti-
tiali nocte florere, eademq; hora cū defloruit, maturum semen in terram cadere:
ideoq; nisi quispiā tunc affuerit, nec videri florem, nec colligi semen posse. Agyrtae
cuncta illa fieri & obseruari natali nocte D. Ioānis Baptista nugantur. Quæ com-
mentitia sunt & supersticiosa. Verum tamen rudimentum quoddā seminis edunt
puluerulentæ foliorum Filicis simbriciæ & rugosæ: ac istas atomos admodum exi-
les tenuissimis veluti araneorum filis de summo earum ramo pendentes, passim
Filicis fœminæ semen esse dictitant, & plebi persuadere conantur. Filicem locis
asperis nimis frequentem, & humentibus locis, atque in agrorum marginibus vi-
demus. Fœminam in siluis & montibus. Aprili mense folia erumpunt, Septembri
marcescūt. Filicis radix, auctore Dioscor. latos lūbricos excutit sumpta drachmis
quatuor ex aqua mulsā: melius si cum scammonia, aut veratri nigri totidem obo-
lis detur: sed qui sumunt, alia præsumpsisse debent. Laborantes lienis incremento
recreat. Radix & pota & illita cum axungia vulneribus sagitta arundinea factis est
auxilio: cuius rei probatio talis est. Peribit Filix quam per ambitum lata copiosior
arundo coronet: contrā euanescent abibit arundo, quam obsæpiens multa Filix in
orbem cinxerit. Qui postremus locus in vulgatis Græcis ita mutilis est, vt verba
aliquot desiderentur, ita restituenda, ἐν τῷ πολὺς καὶ ἄλγος ὅ ἐλαγχον σεφανῶν, ἀφανί-
ζεσθαι ἐλαγχον: καὶ ἐνθα πολὺ ἐλαγχον τὸν καὶ ἄλγος σεφανῶν ἀφανίσει καὶ ἄλγος. Filicis fœ-
minæ radices latum lumbricum expellunt, cum melle in eclegmate sumptæ: potæ
cū vino drachmis tribus rotundum lumbricum eiiciunt: datæ fœminis sterilita-
tem faciunt, & prægnantibus abortum, si supergradientur (sic enim conuertenda
Græca, καὶ ἔγκυος διασείη, ἐπὶ τῷ ὥσπερ. Lacuna tamen legit ex vetere codice, καὶ ἔγκυος
λασείη, ἐπὶ τῷ ὥσπερ: id est, & si prægnans sumperit abortum facit) farina humidis vlce-
ribus & cicatrici repugnantibus inspargitur. lumentorum ceruicibus medetur.
Folia recentia in oleribus cocta manduntur, vt ventrem emolliant. Plinius eadem

Lib. 9. hist.
cap. 20.

Pet. Pen. in
Ad.

Locus.

Tempus.
Li. 4. c. 17.
Vires.

Li. 27. c. 9.

magna

magna ex parte habet. Vſus radicis in trimatu tantum neque ante, neque poſtea: pellunt interaneorum animalia, ex his tæniis cum melle (ſic rectè vetus codex habet, vulgati falſò tineas) cætera ex vino dulci triduo potæ: vtraque ſtomacho inutiliſſima: Aluum ſoluit, primò bilem trahens, mox aquam: melius tæniis cum ſcammonij pari pondere. Radix eius duorum obolorum pondere ex aqua, poſt vnus diei abſtinentiam bibitur, melle præguſtato contra rheumatifmos. Neutra danda fœminis: quoniam grauidis abortum, cæteris ſterilitatem facit: farina earum vlceribus tertris inſpargitur, iumentorum quoque ceruicibus: folia cimicem necant, ſerpentem non recipiunt. Ideò ſubſterni vtile eſt in locis ſuſpectis: vſtæ etiam fugant nidore. Hæc Plinius: quorum nonnulla partim ex Dioſcoride, partim ex

Lib.9. hiſt.
cap.20.

Theophrasto mutuatus eſt ſic ſcribente: ἡ ὅ γινύσκειται χηΐσιμον πρὸς τὰς ἐλμυνθας, τὰς τε παλιὰς, καὶ τὰς λεπτὰς πρὸς μὲν τὰς παλιὰς ἀναδύοι μὲν μύλι, πρὸς δὲ τὰς λεπτὰς ἐν οἴνῳ γλυκεῖ μετ' ἀλφίτων διδομένη. γυναικὶ δὲ ἐάν γε διοθῇ, ἐάν μὴ ἐγκύμονι, ἐκβάλλειν φασὶν. ἐάν δὲ μὴ, τὸ ὅσον ἀτεκνον γίνασθαι. Ideſt, vtilis Filix fœmina contra latos ventris lumbricos, & contra tenues: contra latos quidem cum melle, contra tenues verò ex vino dulci cum polenta. Quinetiam ſi mulieri detur, grauidis quidem abortum, ſimpliciter autem fœminis ſterilitatem facere dicitur. Theophras. & Plinius Filicis fœminæ cibo potivæ fœminas ſterileſcere, grauidas abortum facere tradunt: neuter autem ſi grauida ſupergrediatur abortum fieri tradit. Quorum auctoritas locum Dioſcoridis ſupra citatum, rectè à Lacuna emendatum eſſe conſtat.

Ibid. ca.22.

Scribit item Theophrastus: ἡ ὅ τῆς παλαιοῦς ῥίζα μόνον, τῷ χηλῶ γλυκεῖ ρυφίος. ἐλμυνθα δὲ παλιὰς ἐκβάλλει, σπέρμα δὲ ἐκείνης, ὅδὲ σπένει. (nempe lacteum ſuccum medicatum, & catharticum, vulnere & incifura ſtillantem, qualem mittit ſcammonium, cuius proximè antea meminerat, & cum quo Filicem aliqua ex parte conſert.) τέμνειται δὲ ὁρασίῳ μελοπάρῳ φασὶν. Ideſt, filicis radix ſucco dulci & acerbo ſimul eſt. Latum lumbricum pellit: ſemen non habet, neque lacteum ſuccum: ferunt tempeſtiam Autumno ſecari: Quod verò de diſidio inter filicem & arundinem

Lib.18. c.6.

Dioſcorides tradit, legitur etiam apud Plinium his verbis. Filix biennio moritur, ſi frondem agere non patiaris. Id efficaciffimè contingit germinantis ramis baculo decuſſis. Succus enim ex ipſa deſluens necat radices. Aiunt & circa ſolſtitium euulſas, non renaſci, nec arundine ſectas, aut exaratas arundine vomeri impoſita. Similiter & arundinem exarari filice vomeri impoſita. Repetit idem alio in loco.

Lib.24. c.17.

Arundinis radix contrita & impoſita filicis ſtirpem corpore extrahit: item arundinem filicis radix. Sed hoc prior ipſo Celfus tradidit. Peſſima ex ſurculis, inquit, arundo eſt, quia aſpera eſt, eademq; offenſa etiam in filice eſt. Sed vſu cognitum eſt vtramque aduerſus alteram medicamentum eſſe, ſi contrita ſuperimpoſita eſt.

Lib.5. ca.6.

Extirpandæ verò & prorfus abolendæ filicis rationem aliam Theophrastus docet, his verbis: χηΐ ἡ κόπρος χηΐσιμος, ἔ μόνον τοῖς περὶ τὸν σῆτον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις, πλὴν παλαιοῖς. τῶν μὲν δὲ φθεῖραν φασὶν ἐπιβαλλομένην. ἀπὸ πάντων δὲ καὶ ἡ παλαιοῦς καὶ ἐπικκοιμμένων τῶν ποσειδων. Ideſt, ſtercoratio vtilis non ſolùm frumentis, verùm etiam aliis herbis, præterquàm filici eſt: hanc enim ſimo ſuperiniecto interire affirmant: interire

Lib.8. hiſt.
cap.8.

& pecore incumbente. Galenus breuiter Filicum vires ſic declarat. Filix radicem habet maximè vtilem: latum enim lumbricum interficit, ſi quis eam quatuor drachmis cum melicrato ebibat. Ad eundem modum partum vium quidem necare, mortuum autem eiicere mirum non eſt. Eſt enim amara paulùm habens adſtrictionis. Quamobrem vlceribus impoſita vim habet valenter deſiccandj, non tamen mordax eſt. Similem ei vim habet thelypteris. Armoricos, & Neuſtriorum vltimos, qui vaſtas ſilvas colunt, in frugum inopia, è radice Filicis panem conficere notum eſt, eiufdémque cineribus nitri loco iniectis, ſaxa liquare, & vitrea vaſa fingere, colore viridi, & ſubobſcuro, quibus vinum album, dulce turbidum potare

Li.8. ſimpl.

Andes,

Andes, Vnelli, Cenomani gratissimum habent. Recentiores herbarij plantas alias filicis nomine donarunt. Imprimis eam quæ Filix aquatica, & Osmunda, siue Osmunda regalis, à regiis & præclaris viribus nuncupatur, à nonnullis filiquastrum, à Chemistis Lunaria maior, à Gallis *Osmunde*, siue *Feugiere aquatique*, à Germanis *Vuattervorn*. Filicibus supradictis similis est, nisi quod folia crenata non habet:

FILIX Aquatica, Dodon.



caulem emittit triangulum, rectum, tenue, cubitalem, interdum bicubitalem, quem folia vtrinque æquis interuallis alarum ritu expassa stipant, sicuti in polypodio incisa. In caulium, & ramulorum, ex caulium lateribus prodeuntium vertice, granula rotunda, aspera, seminum speciem ostendentia. Radix magna, crassa, ex multis radiculis implexis compacta, in cuius medio albū quidpiam inest, quod cor Osmundæ vocant. Hanc Pseudolonchitidem asperam vocat Matthiolus, eoque nomine depingit. Locis humidis, vmbrosis, & nemoribus gaudet. Aprili mense folia sicut aliarum filicum erumpunt, hyeme incunte pereunt, viuaci tamen radice in terra manente. Calida primo gradu, sicca secundo, non nihil acris, odoris non ingrati. Radices ad contusā, rupta, luxata: item ad hernias perutiles esse constat experientia certissima. Quinetiam colicis & spleneticis plurimum conferunt. Tragus aliud Filicis maioris genus exhibet, quæ & forma & colore reliquas omnes antecellit. Osmundā vocat Lobellius, cum

Forma.
Dod. lib. 3.
cap. 61.

In cap. 145.
lib. 3.

Locus.

Tempus.

Temper.

Vires.

Per. Pen. in
Aduersf.

FILIX Florescens, Tragi.



FILIX Arborea, Tragi.



tamen

tamen ab *Osmunda* superiore differat. Habet enim caules longos, viri proceritate attingentes, virides planè radicē crassā, nigram & pilosā. Folia in utroque caulis latere pinnata, & incisuris distincta instar foliorum polypodij: florem fert in vertice candidum, copiosum, qui circa diem sacrum D. Ioannis Baptistæ nullo post se relicto semine decidit. Raro, inquit Tragus, hoc filicis genus reperitur, nec multis cognitum est. In *Vasgoiæ* altissimis siluis propè Circulum arcem ducis *Bipontini* provenit. Ea fortasse *Dryophonon* Plinij fuerit. *Dryophonon*, inquit, similis *dryopteridi* herba est, cauliculis tenuibus, cubitalibus, circumdatis vtrinq; foliis, pollicari amplitudine, qualia *oxymyrsines*, sed candidioribus mollioribusq; flore candido sambuci. Idem Tragus duo alia Filicis genera exhibet. Vnum quod in veterum & cætorum roborum caudicibus nascitur, folio Filicis, multò tamen minore incisura diuisum, caule non altiore polypodio, sed multò tenuiore. Passim non occurrit, sed in altissimis tantum montibus. Alterum est *Filix nuda* seu *saxatilis*, folio orbata, caulem proferens digitum longum, multiplicem & copiosum, vna è radice, eaq; capillata, sicut & *ruta muraria*, in cacumine binis vel

Locus.

Li. 27. ca. 9.

Li. 1. ca. 183.

Forma.

Li. 1. ca. 184.

FILIX Saxatilis,
Tragi.



CHAMÆFILIX Marina
Anglica, Lobellij.



ternis corniculis, aut si mauis incuruis quasi setis, quæ purpureis aliquando notantur punctis, cōspicuum. Gustu & odore cum filice vulgari cōuenit: cæcis saxis prorumpit. Capilli veneris, seu polytrichi *Apuleij* genus esse existimat Tragus, nempe eius quod ramulosos habet quasi setas porcinas. Hic *Chamæfilicem* marinam Anglicam ponemus, quam non nisi saxorum rupiumve interueniis aut petrosis asperginibus *Cornubiæ* innatam reperit ad maris alluuiiones. E' pusilla multis implexa cirris pullis & compacta radice, foliola emittit binum ternumve vnciarum numerosa, rigida, carnosa, ex atro virentia, lucida, filicis maris diuisura, ortu, positu, & gustu, lituris etiam aduersa parte extantibus, ferrugineis, quorum pediculi & medius nervus sericeo nitore ex fusco lucent. Hæc Lobellius.

D R T O P

HÆc Filicis species à foliorum figura & loco natali *Asplenium* Græcis dicitur, Latinis Filix querna, & Filix quercus, Gallis *Fougere de cheſne*, Germanis *Eickenſarn*. Dryopteris, vt deſcribit Dioſcorides, filici ſimilis eſt, multò minore foliorum incifura, radicibus inuicem implexis, hiriſutis, gultu acerbis, in dulcedinem vergentibus. Naſcitur in veterũ quercuum muſeo. Ex hac deſcriptione hanc protulit Dryopterida Matthiolus, quæ filicem

Nomina


Li. 4. ca. 181.

Forma.

Locus.

Ca. 181. li. 4.

DRYOPTERIS, Matth.



DRYOPTERIS Alba,
 Dodonai.



foliis optimè refert. Naſcitur etiam, inquit, in humenti ſolo inter vepres circa quercuum caudices, ſeq; in Goritienſi agro multis locis inueniſſe extra quercuum caudices affirmat, nullis repugnantibus notis. Sunt qui aliam Dryopterin, eamq; veram ſic pingunt ac deſcribunt. Folia huic polypodij proſuſ, aut filicis ſceminæ, minora tamen multò, non minoribus laciniiſ, tenuiora, & teneriora, in iuncis exilibus pedem altis, pennatim & aduerſo ſitu exorientia, auerſa parte notulis aſperſa, non extantibus, rubiginofiſ, ſed candidiſ appictiſ, ſerie gemina ſecus foliorũ neruulum medium. Radix longa, variè inſlexa, humi decurrens, fuſca, ſubhiriſuta, & villiſ fibrata, polypodij (niſi multò gracilior eſſet) ita ſimiliſ, vt aliquando minùſ peritoſ pharmacopœoſ in periculoſum errorem induxerit, miſcentes hanc decoctiſ polypodij radicis vice. Dodonæuſ Dryopterideſ duas pinxit ac deſcripſit, hanc candidam, illam nigram. Candida filici mari haud abſimiliſ, ſed multò minor, palmũ non excedens, caule, flore, ſemine orbata: folia candida, tenera, multũ ſciſſa, creniſ toto ambitu denſioribus & minutioribus quàm in filice mare, à tergo punctiſ notata: radix ſpiſſa, nigricanſ, ex radiculiſ multiſ & implexiſ compacta. Nigræ Dryopteridi foliorum pediculi nigricant, item folia, ſuperioris minora & breuiora, non tam crebriſ incifuriſ, cetera ſimilia, & auerſa parte notiſ paruiſ ſignata, tota hyeme virentia. Vtraq; Adiantum eſt officinarum album & nigrũ, quibuſ adianto vero deſtitutæ, innoxie, ſaltem nigra vtuntur, ac fortaiſſè adiantum album & nigrũ Pliniũ, vt in vero adiãto diximus. Vmbroſiſ viiſ circa quercuum radiceſ, non tamè ubiq; proueniũt. Dalechampiuſ verã hanc Dryopterida exhibet, quæ in editiſimiſ montibuſ naſcitur ad quercuum muſcoſaſ radiceſ, foriſ per terram vaganteſ, radice capillata fibris denſiſ, valde tenuibuſ, inter ſeſe implexiſ, ſubatriſ, guſtu adſtringentibuſ cum paucula dulcedine,

Lib. 3. c. 63.

Forma.

Locus.

DROPTERIS

Nigra, Dodon.

Li. 4. c. 181.
Vires.

DROPTERIS, Dalech.



Lib. 17. c. 9.

quæ cum aliqua andiu mensæ fuerint, percipitur: foliis multis, obliquis, virentibus, & herbaceum virorem constanter seruantibus, etiam dudum collecta planta, vnico pediculo adnexis, altius incisus, pennarum ritu explicatis, superne læuibus & glabris, inferne exiguis & sublateis punctis, & quasi vermiculis puluerulentis & asperis maculata: sine caule, sine flore, sine semine, nisi quis (vt vulgò multi de filice nugatur) sessiles & peniles in aduersa foliorum parte quasi vermiculos, dum flauis adhuc hærent florem esse putet, cum nigricantes decidunt, fructum ac semen. Dioscorides Dryopteridis facultates tradit, his verbis. Ἀνὴρ ἐπιπλοσθεὶς λαβὴν τὸν τοῦ πλάγος, τευχὸς ψιλοῦ. Δεῖ δὲ ἀποψῆν (alij ἀποψῆν legunt) τὸ πρῶτον μὲν ὁ ἰατρίκων τὸν χροῖον, καὶ νεαρόν ἐπιπλοσθεῖν. Hæc interpretes Plinium potiùs secuti, quàm verba & sensum Dioscoridis, malè conuertunt. Sic enim Ruellius. Psilothrum est cum radicibus trita: illinitur enim primùm vsque dum sudorem euocet, mōx sudor abluitur, & recens imponitur. Sic verò Cornarius. Hæc vnà cum radicibus trita im-

posita pilos abolet. Oportet autem postquā corpus exudauit, priorem deradere, & rursus recentem imponere. Plinius verò hoc modo. Dryopteris filici similis, in arboribus nascitur, tenui foliorum subdulcium incisura, radice hirsuta: vis ei caustica est, idèò psilothrū est radix tusa. Illinitur enim vsque dum sudores euocet: iterumque & tertio, vt ne sudor abluatur. Primùm foliis dulcedinem quandam is tribuit, Dioscorides verò non folia, sed radices in dulcedinem vergere scribit: deinde πλάσ διασείας, idest, densas & crebras, Plinius hirsutas dixit, præterea radicem tusam psilothrum esse, Dioscorides verò herbam ipsam cum radice tusam. Adhæc adhibendi psilothri modum videtur nō rectè expressisse, vertit enim, ἰμμάζειν, sudorem euocare, cū scribit, illinendam esse radicem, vsque dum sudores euocet, &c. cū ἰμμάζειν sit humectare & mollire, vt Dioscorides intelligat corporis partem depilandam aquæ tepidæ fotu priùs humectandam esse, quod est ἰμμάζειν, deinde pilum deradendum, si ἀποψῆν legas, vel auellendum, si

ἀποψῆν, quod huic loco optimè conuenit, quoniam efficacior est vis psilothri profundius subeuntis auulso pilo, vt potè via magis patefacta, & postremo recentem Dryopteridem, non radicem solum, sed cum ea herbam ipsam cataplasmatibus, aut emplastri modo imponendam. Sic igitur Dioscoridis locus conuertendus. Dryopteris cum radicibus trita & imposita pilos abolet. Oportet autem cū pars pilosa aqua humectata fuerit, primùm eam deradere, vel pilum auellere, deinde recentem Dryopteridem cataplasmatibus modo imponere. Quibus verbis

Dioscorides

Dioscorides, id quod plerumque facit, non solum Dryopteridis depilatoriam vim, sed vtendi quoque modum declarare voluit. Siue enim psilothrum, idest, medicamentum quod pilos detrahit, caustica & septica vi id efficiat, quod prius est psilothi genus: siue insigniter & extreme frigida, aut à totius substantiæ proprietate, quod alterum genus est, capillum renasci prohibens, primum oportet vt cutis tepentis aquæ fotu rarefcat, & relaxetur, deinde pili auellantur, vel deradantur nouacula, aut septico causticove aliquo detrahantur: quod hodie Turcæ illitu sui Rhufna faciunt, tum alterum psilothrum parti imponatur, ne pili renascantur, quem ordinem hic docet Dioscorides. Vult enim prius $\chi\alpha\lambda\kappa\epsilon\ \acute{\alpha}\nu\epsilon\lambda\lambda\epsilon\iota\tau\alpha\iota$, deinde pilos $\acute{\alpha}\nu\tau\iota\sigma\tau\alpha\iota$, postremò $\nu\epsilon\alpha\rho\acute{\alpha}\nu\ \delta\iota\upsilon\sigma\tau\alpha\iota\ \epsilon\iota\sigma\delta\alpha\iota\ \epsilon\pi\iota\tau\iota\lambda\gamma\acute{o}\sigma\iota\nu$. Galen. itidem scribit Dryopteridem gustu mixtam qualitatem præ se ferre, dulcem, acrem, amarā, in radice verò etiam acerbam: facultatem habere septicā, proinde etiam pilis glabram cutem efficere. Dantur, inquit Matthiolus, Dryopteridis radices in puluerem contritæ, & cum furfuribus mixtæ, addito salis & furfuris momento equis deuorandæ aduersus intestinorum vermes: namque potenter illos expellunt & interimunt.

Li. 6. simpl.

Ca. 18. li. 4.

POLYPODIUM,

CAP. X.

PΟΛΥΠΟΔΙΟΝ Græcè, Polypodium & Filicula Latinè, Catoñi felicula, nisi mendosi sint codices, Gallicè *Polipode*, Germanicè *Engelsfusz*, & *Baunsarn*, Italis *Polipodio*, Arabibus *Bisberg*, *Aiberg*, *Bessaigi*, Officinæ Græcum nomen retinuerunt. Polypodij nomen à radice quæ cirros & acetabula polyporum modo habet, inditum est, filiculæ verò à foliorum cum filice similitudine. Polypodium palmi est altitudine, simile filici, subhirsutum, incisum, non tamen adeo tenui diuisura: radix subest pilosa, cirros veluti Polypus habens, crassitudine minimi digiti, derafa intus viridis est, austera gustu & subdulcis. Nascitur in muscosis petris, & in vetustis caudicibus quercuum. Hæc Dioscorides. Eadem ferè Plinius tradit. Polypodium, quod nostri filiculam vocant, similis est filici. Radix est in vñ, pilosa, coloris intus herbacei, crassitudine digiti minimi, acetabulis cauernosa, ceu polyporum cirri, subdulcis, in petris nascens, aut sub arboribus vetustis. Hic altera radices qualitas à Plinio omissa est, nempe adstringēs. Adde etiam folia aversa parte fuluis maculis notata esse. Ex his notius est quàm vt probatione egeat, Polypodium nostrum, id esse de quo veteres scriplere, quo frequentissimè hodie, præsertim querno, in dilutis & decoctis medicis vtuntur. Matthiolus duo eius assignat genera. Vnum id de quo disseruimus, quod omnibus notum est, & quod ubiq; frequens prouenit. Alterum non nisi paucis cognitum, inquit, folio aspleni, sed longiore, viridiore, magisq; per ambitum laciniato, radice priori simili, sed paulò graciliore. Hoc plurimum nascitur in montium siluis. Sed dissimilitudo ista ex loci non speciei diuersitate pendet: loco enim macilen-


Nomina
Cap. 158.

Forma.

Locus.

Li. 4. c. 180.
Li. 26. ca. 8.


Genera.
In cap. 180.
lib. 4.



tiore natum, gracilius & strigosius, lætiore amplius & vegetum magis. Sic etiam quibusdam opacis nemoribus folio est adultiore. Non sunt tamen ista specie diuerfa. Sic & Ilua thyrreni maris insula Polypodium gignit ab aliis diuersum, sicut & alias quasdam raras plantas veluti Lonchitin asperam, & hemionitin, de

POLYPODIUM Secundum,

Matthioli.



POLYPODIUM

Iluense.



- Form. l.* quibus dixi mus. Polypodium Iluense in faxis nascitur, radice vsq̃ in aliis generibus velur polyporum cirris nodosa, fibrata. caulibus pedalis, è rufo nigrescentibus, læuibus, interpe hirsutis: foliis oblongis, pinnatis, inæquali situ in caule dispositis, altera parte virentibus, altera puluisculo obfctis, gustu subdulcibus, & nonnihil austeris, nullo flore, nullo semine. Ad eadem valere aiunt, ad quæ alterum Polypodium, nisi quod magis siccet, ob natalium ariditatem, tum soli natura, tum maris afflatu, maiorem. Quid autem Polypodium præstare possit, declarat Dioscorides, his verbis. Radix purgandi vim habet. Coquitur cum gallina, aut piscibus, aut betæ, aut malua ad purgationem. Aridæ farina aquæ mulsæ insparfa detrahit bilem & pituitam. Trita efficaciter luxatis illinitur, & aduersus rimas, quæ inter digitos fiunt. Plinius eadem, sed paulò plura tradit. Exprimitur succus aqua madesactæ: & ipsa minuta concisa inspergitur oleri, vel betæ, vel maluæ, vel fassamento, vel cum pulicula: coquitur ad aluum, vel in febris leuiter soluendam. Detrahit bilem & pituitam: stomachum offendit. Aridæ farina indita naribus, polypum consumit. Florem & semen non fert. Quæ autem hoc loco non habet, alibi recenset. Radix Polypodij illita luxatis medetur. Et alio in loco. Digitorum in pedibus rimis Polypodij radix prodest. Sic enim ex vetere codice emendat Cornarius, cum in vulgatis legatur, cubitorum ac pedum rimis, &c. In Dioscoride tamen rimæ εν μεσσοδίοις, & ad pedum, & ad manuum digitos referri possunt. Theophrastus, ἡ δὲ πολυπόδιος διαστία, καὶ ἔχει καὶ κοτυληδόνας, ὥστερ αἱ τῆς πολυπόδος πλεονεχίαι. καθάπερ δὲ κάτω, καὶ περὶ ἀνὰ τις, ὡς φασι, ἐμφύει πολυπόδιν. καὶ δὲ φύλλον
- Uires.*
Li. 4. c. 180.
- Lib. 26. c. 8.
- Li. 26. c. 12.
Cap. 11.
Embl. 164.
lib. 4.
- Lib. 9. hist.
cap. 14.

φύλλον ὁμοιον πτερίδι τῇ μεγάλῃ, καὶ φύλλον ἐν ταῖς πέτραις, Idelt, Gaza interprete, Filicula verò hirsuta, & acetabulis cauernosa, ceu polyporum cirri: purgare inferius apta est: ubi quis eam contigerit polypum innasci affirmant. Folium filicis magnæ proximum est. Sententia vna in tanto auctore tam absurda necessario efficit vt locum deprauatum esse dicamus. Quid enim à ratione magis alienum quàm contingere Polypodium, vt polypus, idest, morbus narium, siue polypus piscis innascatur. Quare legendum τῆς φασὶν ἐκ ἐμφύσεως, & πτερίδι, hinc non significat contingere, sed pro amuleto appendere, adalligare, vt sit is verborum Theophrasti sensus. Polypodij radix hirsuta est, & acetabula habet, veluti polyporum cirri. Purgat deorsum: & si quis adalliget aut appendat, polypum innasci negant. Folium habet simile filici magnæ. In petris nascitur. Galenus breuiter Polypodij facultates sic declarat. Polypodium dulcem simul & austeram habet vincentem qualitatem, vt facultatis sit admodum quidem deficcantis, citra morsum tamen. Mesues easdem fusiùs explicat. Polypodium quòd lapidibus innascitur humiditate excrementosa, cruda, flatulenta, ventriculum ad nauseam euertente abundat: præstantius quòd arboribus, præsertim glandiferis innascitur, præcipuè quòd magnum est, recens, solidum, nodosum, foris ex nigro rubescens, colore intus herbaceo, vt pistacium, sapore dulci, austero, tandem subamaro, non nihil aromatico. Dioscoridi calidum est tertio gradu, siccum secundo. Humores crassos, lentos terget, digerit, siccatur, bilem atram & pituitam vel crassam, vel lentam, purgat, etiam à iuncturis. Affectibus ob hæc melancholicis prodest, vt quartanis, præsertim cum mulsâ, epithymo, sale indo: colico etiam dolori, & splenis duritie quouis modo vsurpatum. Contra rimas quæ inter digitos sunt tritum illinitur: corpora enim extenuat & siccatur. Ne verò ventriculum ad nauseam euertat, vtque citius vacuet, datur ex mulsâ vel aqua hordei, vel decocto vuarum passerarum, vel ex iusculo gallorum & gallinarum, vt suasit Hamech, coctum, vel sero lactis. Bibitur vtilissimè mixtis feminibus odoribus, vel aliis aromaticis, vt Dauco, aniso fœniculo, zingibere, vel simili, animam & facultatem ventriculi naturalem corroborante. Longam satis coctionem sustinet. Datur à drachmis duabus ad aureos quatuor. Quod Mesues Polypodium magnum alij præfert, Dioscorides & Plinius crassitudine minimi digiti esse aiunt. Quod scribit Dioscoridi calidum esse tertio gradu, siccum secundo, id falsum est. Bilem enim, inquit ille, & pituitam trahit sine graduum mentione, quorum nec meminit Galenus. Auicennæ calidum est secundo gradu, siccum tertio. Paulo Ægin. Polypodij radix læuis mulsæ inspersa, aut cum ea contrita, eundem quem colocynthis effectum præstat. Præterea quod ille ait Polypodium corpora extenuare, & ventriculum ad nauseam euertere, item Plinio stomachum ab eo offendi, negat Auerroës, qui censet Polypodium securum esse medicamentum, & epithymo præstantius, cui assentitur Marnardus asserens Polypodium imbecilliter & leniter purgare: quare corpora extenuare non posse, idemq; per se exhibitum nullam stomacho inferre iniuriam. In eadem est sententia Actuarius. Filicula bilem & maxime atram, ac pituitam ducit. Dantur purgatæ radices semis scrupuli affusa aqua mulsâ: purgat quoque mediocriter & citra molestiam, in gallinaceo iure, & in ptisanæ cremore cocta radix. Hæc Actuarius. Quantum ad dosim attinet, vncia vna nostratis vacuat parum & sine molestia.

Cornar.
Embl. 164.

Li. 8. simpl.

Li. 2. medi.
purg.

Li. 2. c. 542.

Li. 5. meth.

ALSINE,

CAP. XI.

Nomina



ΑΣΙΝΗ Græcè & μυωώρις, Latine etiam Alfine, & auricula muris, & recentioribus quibusdam Hippia dicitur, vulgò Morfus gallinæ, inde Gallis *Morgeline*, quòd gallinis & auiculis cibo grata sit, exq; caueis inclusæ, ac cibum fastidientes herba ista recreentur, Germanis

ALSINE, Matthioli.

Vogelkraut, Italis *Senione*, *Pizza gallina*, & *Panarina*, quòd iunioribus anseribus gratum sit pabulum. Alfine autem quòd lucos, quæ Græci ἄλσιν vocât, vmbrosâq; loca & nemorosa amet. Auricula muris, quòd muris auribus folia similia habeat, siue ob magnam admodum cum vera Myosotide foliorum similitudinem. Quâvis Dioscorides, Galenus, Plinius vnus tantum Alfines mentionem fecerint, tamen recentiores multò plura eius adinuenerunt genera. Dodonæus quatuor, maiorem scilicet Alfinem, mediam, minorem, & marinam. Fuchsius tria, maiorem mediam & minorem. Alij maximam seu maiorem aliam addiderunt: Præterea vernam, nodosam, muscosam. Alfine, vt breuiter describit Dioscor. herba est similis helinxæ, sed humilior, foliis longioribus, vel, vt quidam, nō absque ratione, legunt, minoribus, (μικροφυλλότερα non μακροφυλλότερα,) & non hirsuta, quod Plinius ostendit, cum minorem esse testatur. Cum teritur odorē cucumeris reddit. Vmbrosis locis, lucisque gaudet: vnde illi nomen. Ita



Genera.



Lib. 1. c. 34.

Cap. 7. hist.

Forma.

Locus.

ALSINE Maior,
Dodonæi.ALSINE Media, siue minor
Dodonæi maior Fuchsj.

ALSINE Minor sine minima, Dodon.*ALSINE, Maxima.*

Plinius, planè ex Dioscoridis sententia. Alfine quam quidam myosotida appellant, nascitur in lucis, vnde & Alfine dicta est. Incipit à media hyeme, arefcit æstate media: cum proreperit, muscutorum aures imitatur foliis. Sed aliam docebimus esse, quæ iustius myosotis vocetur. Hæc eadem erat quæ helxine, nisi minor nihilque hirsuta esset. Nascitur in hortis & maxime in parietibus, cum teritur, odorem cucumeris reddit. Quæ primo loco hîc picta datur, Matthioli sententia Alfine est Dioscoridis, & aliorum veterû. Cauliculis serpit rotundis, geniculatis: foliis circa singula genicula ex aduerso collocatis, helxines, multò minoribus, nõ hirsutis, cum teruntur herbaceum cucumeris odorem, non illam peponis maturi iucunditatem subolentibus: flore exiguo, candido, foris herbaceo, stellato: semine exiguo in siliquulis rotundis, oblongis. Hæc Alfine est media Dodon. maior

In cap. 82. lib. 4.

Fuchsi, cuius folia cum videret multò minora helxines, id est, parietariæ foliis, Dioscoridem (non rectè) censet illa helxines, quæ cissampelos alio nomine dicitur, foliis comparasse. Alfine maior Dodon. plurimos ramulos rotundos, geniculatos, rectos, non humi repêtes, vt prior, edit, ex singulis geniculis bina folia sibi ipsi aduersa, satis ampla, aliquando duorum digitorum ferè latitudine, helxines, id est, parietariæ foliis haud dissimilia, longiora, minus hirsuta. In cauliculorum fastigio inter folia exeunt petioli cum capitulis exiguis, quæ in flosculos exiguos, & incisos dehiscunt, quibus dilapsis reperias siliquulas longiusculas & rotundas, in quibus semen.

Lib. I. c. 34. Cap. 7. hist.

Tota herba ad parietariæ faciem satis accedit. Sunt enim in ista cauliculi æquè pellucidi, circa genicula rubescentes, folia eiusdem ferè amplitudinis. Ex quibus effci vult Dodon. genuinam hanc esse Dioscoridis Alfinem, scribentis eam helxinem ferè, ni humilior esset, foliis longioribus & non hirsuta. Tertia Dodon. Alfine

Alfin. maior. Dodon. Forma.

quæ minor est, & dicitur, ab ea quæ primo loco descripta depictaque est, quam mediam Dodonæi esse diximus, parum differt, sed omnibus suis partibus multò minor est, ita vt cauliculi capillari sint tenuitate, folia haud maiora foliis thymi, cætera supradictæ similis. In umbrosis & humidis locis proueniunt, & in sepius & dumetis cum cæteris herbis. Aliorum herbariorû Alfine maior, sine maxima, radice est superne crassiuscula, paulatim gracilescens innumeris fibris capillata: caulibus multis, pedalibus, foliis Alfinis primæ, per interualla sæpè quaternis, interdum singulis, interdum binis, ramulis multis, breuib, copiosum florem producentibus, antequam hiet oblongo & acuminato capitulo inclusum, cum apertus est, candidum, exiguum, radiatum, sex foliolis constantem, ac totidem filis tenuissi-

Alfin. minor Dodon.

Forma.

Locus. mis. In opacis gignitur. Alfine verna appellata in agris humentibus & vitibus crescit, radícula breui, exili, candida: foliis cæterarum Alfinarum similibus, læuibus, è viridi pallentibus, circa radicem multis, terræ instratis, cauliculis multis, tres digi-

ALSINE, Verna.



Alfin. Muscosa.

ALSINE, Nodosa.



tos altis nodosis, foliis binis ex singulis articulis prodeuntibus, cauliculum amplectentibus, interdum quaternis, interdum senis in singulis cauliculis: flosculis albis, quinque foliolis constantibus, Alfinis reliquis similibus, saporis aquosi & fatui. Nondum prorsus exacta hyeme Februario mense floret, appetete Vere, alia media æstate, quamobrem Alfinem vernam herbarij nuncuparunt. Alfine nodosa in agro Monspeliensi plurima gignitur, radice simplici, longa, parum capillata, ex candido flauescente: foliis propè terram multis, longiusculis, angustis, Alfines haud multum dissimilibus: caulibus multis, pedalibus: flore albo, ex quinque foliolis composito: semine in nodosis striatisq; globulis multis, sese ordine consequentibus, & quasi verucula transfixis, peculiari omnino figura. Alfine muscosa in truncis putrii arborum muscosis, in vdis aspergine parietibus, & aliis opacis humidisque locis profilit, radice tenui, breui, capillata, ramulis multis, per humum sparsis, à terra modicè sese attollentibus: foliis parvulis, exilibus, capillari tenuitate, densis: flore albo, semine in loculis oblongis. Alfine villosa in lapidosis gignitur, radice parua, breui, candida, in fibras tenues fissa: foliis Alfines, caulem per interualla æquis spatiis alarum modo amplectentibus, hirsutis, vnde ei cognomen: caulibus multis, pedalibus, lanugine quadam obductis: flore albo, decem foliolis constante, Bellidi non absimili. Floret maio mense. Alfine purpurea in agris pinguibus propè Monspeliū nascitur, radice tenui sublutea: caulibus multis: foliis Alfines, paulò amplioribus, læuibus, pari ordine caulem vtrinque amplectentibus: flore purpureo, quinque foliolis constante: semine in caliculis membranosis, oblongis, infernè gracilibus, supernè crassioribus. Alfine lutea in umbrosis abietum siluis, & niuosis montium cacuminibus nascitur, radice multis fibris capillata, caulibus multis humi iacentibus, rotundis, ima parte subrubentibus: foliis Alfine vulgari similibus, crassioribus, lætiùs virentibus, ordine dispositis, gustu amaris: flore pusillo, luteo, ex quinque foliolis composito: semine minutulo, in caliculis rotundis: floret Iunio. Aliam tradit Alfinem Clusius, quam Corniculatam nominat. Palmaris herbula est, vnico caule, in ramulos aliquot fisso, geniculato, tenero, hirsuto vt in Alfine vulgari: folia alfines paulò oblongiora, hirsuta etiam, inter sese opposita, & ex interuallis gemina: alarum cauis insident pusilli flores candicantes, quibus

ALSINE, *Muscosa.*



quibus succedūt cornicula membranæ & transparentia, gallinaceorum calcarium forma, quæ lento quodam conspersâ humore tangētibzprehenduntur: semen in illis exiguum, cum maturuit nigrum: radix inutilis & annua. Tota insipida est. Inter segetes agro Salmanticensi frequens, vbi Maio floret, & semen perficit, fortassè Nigellastri genus. Alsine, auctore Dioscoride, refrigerandi altringendique vim habet, oculorum inflammationibus cum polenta illita conuenit. Succus eius aurium doloribus instillatus prodest. In vniuersum eadem quæ helxine potest. Vñus eius, inquit Plinius, ad collectiones inflammationesque, & ad eadem omnia quæ helxine, sed inñrmĩus Epiphoris peculiariter illinitur: item verendis, vlceribzque cum farina hordeacea. Succus eius auribus infunditur. De quibus apertĩus Galenus. Alsine aut myo-

Lib. 4. c. 82.
Vires.


Lib. 27. c. 4.

Lib. 6. sim.

ALSINE, *Purpurea.*



ALSINE, *Lutea.*



fota facultatem helxines obtinet, nempe refrigerantem & humectantem. Est enim essentia aquæ, frigida: quare & citra adstrictionem refrigerat. Quocirca ad feruentes phlegmonas & mediocria erysipelata competit. In quibus Galenus apertè Dioscoridi contradicit scribenti Alsinem *διωγαμὴν ἔχουσαν ψυχρὴν, & σπαστικὴν*, id est, vim habere refrigerantem & adstringentem. Sed vocem *σπαστικὴν* pro qua non absurdè quidam legunt *ἐρεχτικὴν*, temerè, & præter Dioscoridis mentem in contextum insertam fuisse, perspicuum est ex iis, qui ex Dioscoride & Galeno plantarum historiam & facultates excrisperunt, qui eam vocem non habent.

Sic

Lib. 15.

ALSINE Corniculata,


Lib. 7.

Clusij.

Cap. 7. hist.

Dodo. lib.
1. cap. 34.

Nomina



Lib. 25. c. 13.

ron à fleurs rouges & bleues, Germanis *Gauch hegil*, quasi salus fatuorum : quod nomen fortè à Germanis inditum est, quòd Anagallis in limine vestibuli suspensa contra maleficiorum introitum pollere credita sit. Plinius corchoron à quibusdam appellari tradidit : Et corchori vox habetur etiam inter nothas Dioscoridi adiectas. Sed anid de corchoro Theophrasti sit accipiendum iure dubitari potest, & an is corchorus sit Anagallis. Is enim corchorum inter olera quæ cruda coctâue eduntur recenset his verbis. ἐν οἷς καὶ παρομοιαζόμενος ἐστὶ διὰ τὴν ὁμοιότητα κόρχορος, ἔχων τὸ φύλλον ἀκραιφνέως. Id est, In quibus & corchorus est, ob amaritudinem in pro- uerbium translatus, folio ocimi figura. Est & apud Græcos frequens prouerbium, καὶ κόρχορος ἐν λαχοῖσις. Id est, Etiam corchorus inter olera, dici solitum in homines nullius pretij, qui tamen in numero aliquo studeant haberi, ut corchorus genus oleris vilissimi habeatur, quod Plinius inter herbas in cibis vulgares numerat, supra citatum Theophrasti locum exprimens. Dioscorides duo anagallidis genera esse tradit, quæ tantum flore distant. Nam quæ cæruleo flore est, scemina dicitur, mas quæ phœniceo. Totidem genera herbarij omnes constituunt, & norunt ex Dioscoridis descriptione, quæ est huiusmodi. Anagallides frutices sunt parui, in terra iacentes, folia in quadrangulis canaliculis pusilla habentes, & subrotunda, ad helxines folia accedentia : semen rotundum. Eadem Plinius

ANAGALLIS, Mas.

Lib. 7. hist
cap. 7.

Lib. 2. cap. 115.

Lib. 2. c. 174

Genera

Forma.
Ibidem.

Lib. 25. c. 13.

Sic enim Oribasius. Alsine essentia est aquæ & frigida, quare citra adstrictionem refrigerat. Paul. Alsine vim habet helxinæ similem, quæ refrigerat humectâtque, &c. Eisdem facultates Aëtius assignat. Eisdem quoque herbis, quas Morfus gallinæ vulgò nominant, nostri temporis herbarij tribuunt, quod scilicet ad feruentes inflammationes, ac erysipelata prosint. Omnes enim, ut dictum est, refrigerant atque humectant. Hinc est, inquit Fuchsius, quod minorem aliqui Germanorum *feberkraut* vocent, quia scilicet febribus accommoda & utilis sit. Alsinæ præsertim mediæ & minoris decoctum in aqua cum sale scabiosarum manuum singulare est remedium, si frequenter eo proluantur.

ANAGALLIS, CAP. XII.




ΑΝΑΓΑΛΛΙΣ Græcè, vt & Anagallis Latine, Officinis inusitata, non morfus gallinæ, vt vult Matthiolus, qui est alsine, Gallis *Mou-ron* à fleurs rouges & bleues, Germanis *Gauch hegil*, quasi salus fatuorum : quod nomen fortè à Germanis inditum est, quòd Anagallis in limine vestibuli suspensa contra maleficiorum introitum pollere credita sit. Plinius corchoron à quibusdam appellari tradidit : Et corchori vox habetur etiam inter nothas Dioscoridi adiectas. Sed anid de corchoro Theophrasti sit accipiendum iure dubitari potest, & an is corchorus sit Anagallis. Is enim corchorum inter olera quæ cruda coctâue eduntur recenset his verbis. ἐν οἷς καὶ παρομοιαζόμενος ἐστὶ διὰ τὴν ὁμοιότητα κόρχορος, ἔχων τὸ φύλλον ἀκραιφνέως. Id est, In quibus & corchorus est, ob amaritudinem in pro- uerbium translatus, folio ocimi figura. Est & apud Græcos frequens prouerbium, καὶ κόρχορος ἐν λαχοῖσις. Id est, Etiam corchorus inter olera, dici solitum in homines nullius pretij, qui tamen in numero aliquo studeant haberi, ut corchorus genus oleris vilissimi habeatur, quod Plinius inter herbas in cibis vulgares numerat, supra citatum Theophrasti locum exprimens. Dioscorides duo anagallidis genera esse tradit, quæ tantum flore distant. Nam quæ cæruleo flore est, scemina dicitur, mas quæ phœniceo. Totidem genera herbarij omnes constituunt, & norunt ex Dioscoridis descriptione, quæ est huiusmodi. Anagallides frutices sunt parui, in terra iacentes, folia in quadrangulis canaliculis pusilla habentes, & subrotunda, ad helxines folia accedentia : semen rotundum. Eadem Plinius

ninus

ANAGALLIS, *Fœmina.*



ANAGALLIS *Lutea*,
Lobellij.



nus scribit. Anagallida aliqui corchoron vocât. Duo genera eius. Mas, flore phœniceo: fœmina cœruleo, non altiores palmo, frutice tenero, foliis pusillis, rotundis, in terra iacentibus. Nascentur in hortis & aquosis. Prior floret cœrulea. Hic vtrique Anagallis nostra passim fruticat teneris cauliculis, quadrangulis, geniculatis, per humum sparsis, & foliis Alsines media, rotundioribus, supernè viridibus, & minutis punctis nigricantibus signatis: floribus copiosis, in hac phœniceis, in illa cœruleis: semine pusillo, circinato in pericarpis. Vliginosis locis latior provenit. In arvis tamen, vineis, & secus vias etiam reperitur. Floret mense Maio vsque in Autumnum, & per æstatem vtriuscq; provenit maximus, potissimum mense Augusto. Pena luteam Anagallidè esse scripsit, visu pulchram & raram transmarinis regionibus, crebram in Angliæ nemoribus, locisq; opacis. Mense Iunio & Iulio flores promit luteos: umbrosis gaudet, cætera mari & fœmina similis. Vtrique Anagallis Dioscoridis, vim habet mitigandæ, inflammationè arcet, furculos extrahit, vlcera serpentia compescit. Succus earum gargarizatus pituitam capitis purgat, & naribus infusus, dentium dolores sedat, si in contrariam aurem iniiciatur. Argema cum melle Attico purgat, & oculorum caligines iuuat. Prodest & à vipera commorsis cum vino potus: item nephriticis & hepaticis. Additur in vetere codice *ἡ δὲ ὑδροπικρὴς*, id est, & hydropicis. Postremò, Dioscorides ex aliorum historiis recenset; Anagallidem quæ cœruleum habet florem, prolapsam sedem reprimere, quæ verò phœniceum illitu euocare: Quorum sententia Anagallides nō solum flore, sed & effectū differrent. Eundem vsum medicum docet Plinius, his verbis. Vtrinque succus caliginem oculorum discutit cum melle, & ex ictu cruorem, & argema, rubētis magis, cum Attico melle inunctus. Pupillas dilatat: & ideo hoc inungitur ante, quibus paracentesis fit. Iumentorum quoque oculis medetur. Succus caput purgat per nares infusus, ita vt deinde vino colluantur. Bibitur & cōtra angues succi drach-

Locus.

Tempus.

Li. 2. c. 174

Vires.

Lib. 25. c. 15.

*Lib. 26. c. 7.
Ibid. cap. 8.*

Lib. 6. simi.

ma in vino. Mirum quod pecora fœminam vitant. At si decepta similitudine (flore enim tantum distant) degustauere, statim eam quæ Asyla appellatur, in remedio quaerunt: ea à nostris ferus oculus vocatur. Et, Iocinori Anagallides mirè prosunt. Et, Aluum purgat Anagallis ex aqua mulsâ. Rursus, Anagallis cœrulea procidentia sedis retroagit, è diuerso rubens prorritat. Sed de his multò clariùs & distinctiùs Galenus locutus est. Anagallis vtrique tam ea quæ cœruleum habet florem, quàm ea quæ

caquæ purpureum. admodum extergentis sunt facultatis. Habent verò quandam etiam calorem attractorium, ita vt & infixos corpori aculeos extrahant. Succus earum ex naribus purgat eadem de causa. In summa autem desiccandi vim habent citra mordacitatem, quamobrem & vulnera glutinant, & putrida adiuuant. Hæc Galenus, ex quibus colligere licet errare eos, qui anagallidas frigidas & humiditas esse statuunt, cum sint calidæ siccæq; ac detergentis facultatis, ita vt mulieres quæ asperiores ac decolores à natura cutem acceperint, ad læuorem nitoremq; vultus harum succo vtantur. Paulus in compositionem ex corallio podagricam, recipit anagallidis russeum florem habentis, quam vocant corallium, vnciam. S. his verbis. *Αναγαλλίδος τῆς τὸ ρόυσσιον ἄνθος ἐχούσης, ἣν καλεῖσι κοράλλιον Γο.* S. Hic russeum Latina voce puniceum vocat colore, & anagallidem corallium ex colore floris puniceo. Sunt tamen qui ex vetustissimorum exemplarium fide. *κολλάριον* legendum esse censent, & ipsam compositionem *διὰ κολλάριου* inscriptam esse, non *κοράλλις*, vt nomē collarij ex glutinandi vi anagallidum accepisse intelligatur. Minimè tamen absurda fuerit vulgata lectio.

ELATINE,

CAP. XIII.

Nomina
Lib. 4. c. 6.
Forma.



T Græcis *ελάνη*, ita Latinis Elatine, Arabibus Athin, quam describit Dioscorides foliis esse helxines, minoribus, rotundioribus, pilosis, vel, vt alij, densis: tenuibus & dodrantalibus ramulis, quinis senisve, à radice foliolis: vel, vt alij, à radice prodeuntibus, foliorum plenis, gustu acerbis. Nascitur in segetibus & cultis. Eadē Plinius habet. Elatine folia habet helxinæ, pusilla, rotunda, semipedalibus ramulis quinis senisve, à radice statim foliosis. Nascitur in segetibus. Orbasius in Dioscoride φύλλα μακρότερα pro μικρότερα legit. Scribit enim, Elatine folia habet helxinæ similia, sed longiora, rotundiora, hirsuta: ramos tenues, &c. Quenam verò ex tot nostratibus plantis pro genuina Elatine habenda sit, inter herbarios controuersia est. Matthioli eos reprehendit, qui

Li. 27. ca. 9.

Lib. II.

In cap. 36.
1 ib. 4.

ELATINE Prior, Dodon.

ELATINE, Matthioli.



numulariam

nummulariâ quam vocant, item eos qui pimpinellam Elatinem esse cēsent. Etenim nummulariæ folia pilosa non sunt, neque in segetibus, neque in cultis prouenit, sed in scrobium marginibus, præsertim vlgine madentibus. Pimpinella verò multò plures senis ramulos edit, in terram procumbentes, folia toto ambitu laciniata.

ELATINE Altera,
Dodon.



ELATINE Polychides,
Dalechampij.



Ruellius Elatinem vulgò campestre rapistrum vocari scribit, cuius sententia Matthiolo minime placet. Idem Ruellius eorum refellit opinionem, qui pilosellam Elatinem esse putant, reclamantibus aperte natalibus, totaque facie. Matthiolus penultima editione ingenuè faretur se plantam, quæ veram Elatinem referat non vidisse, picturam tamen exhibet plantæ hirsutæ, cuius folia notulis signata sunt, & ad foliorum helxines cissampeli figuram accedunt. Postrema editione eandem depinxit Patauius, à Jacobo Antio. Cortuso ad se missam, cui nihil deesse ait, quod desiderari possit. Eam tamen nec describit, nec vires explicat. Hic oritur quæstio, cum folia elatines foliis helxines comparat Dioscorides, helxine cissampelos accipienda, an helxine parietaria vulgò dicta? Serapio Elatinē volubilis minoris speciem constituens, eiusque foliis Elatines folia similia esse scribens, helxinem cissampelon intelligere videtur. Pauli interpres helxinem parietariam. Elatine, inquit, herba est parietariæ similis. At verò probabile est Dioscoridē similes plantas similibus coniungere solitum, & Elatinem helxinæ cissampelo subiicientem, huic illius folia comparasse. Dodonæus Elatines generæ duo describit & depingit. Vnā quæ à quibusdam Morfus gallinæ nuncupatur, similiter à Germanis *Hunerbsz*, & à Belgis *Handerbeet*, id est, morfus gallinæ. Alteram quæ à Germanis *Hunerferb*, à Belgis *Handererne*, id est, hereditas gallinæ. Prior elatine cauliculis multis fructicat, hirsutis, auriculæ muris modo: foliis subrotundis, asperis & hirsutis, sæpius parum incisis: cætera æfinæ non multum dissimilibus, flores cæruleos aut purpureos edit, deinde parua capitula, in quibus semen includitur. Hanc Fuchsius nomine *Alfines* mediæ depinxit. Morsum Gallinæ folio hederulæ vocat Lobellius. Altera Elatine similes priori cauliculos edit, sed longiora folia, angustiora, toto ambitu crenata: flores cæruleos semen in binis folliculis iunctis: radicem fibratam. Vtraque locis umbrosis, incultis, secus vias & in agrorum marginibus frequēs. Maio men-

Lib. 3. c. 94.

Cap. 41.

Lib. 7.

Lib. 1. c. 37.
Genera.


Forma.

Lib. 7. hist.

Locus.

Tempus.
Pena in
Aduer.

se & Iunio florent. Recentiorum quidam, iisdemque periti, & admodum in hac scientia exercitati, veram ac legitimam antiquorum Elatinem viribus & figura consentientibus eam esse credunt, quæ à Germanis præsertim à Fuchsio *Veronica* scemi-

*ELATINE, Triphyllus.**LAPPVLA Rusti. Elatine Tragi.**VERONICA Famina,
Fuchsj.**Elatine tri
phyl.**Lib. 1. c. 64.
Lappula
Rusti. elati
ne Tragi.*

na vocitatur, mirificè ad cruenta, ac vetera vul-
nera & vlcera sananda, scabiem deniq; , & om-
nia cutis vitia commendata, de qua diximus li-
bro de Palustribus, cap. 35. Neutram verò illa-
rum quas proposuit Dodonæus, Elatinen Dio-
scoridis esse contédunt, quod prior, figura plu-
rimùm distat ab helxine: posterior, nec foliis sit
villosis, nec helxine similibus: veriùs Elatinen
dici posse, quàm is pro myosotide secunda de-
pinxit, de qua hoc libro tractauimus. Caterùm
secundæ Dodonæi Elatines herba hîc depicta
congener est: foliis tamen discrepat maioribus,
crebriùs, profundiusque incisis, vnde ei cogno-
mentum, circa caules densioribus. Nascitur in
aridis & sabulosis. Habetur & alia Elatine à
quibusdam herbariis, quæ dicitur triphyllus,
squallidis & sabulosis gaudens, radice gracili,
quatuor digitos longa, candicante, modicè fi-
brata, foliis paruis, simul ternis, vt in loco: quam
ob causam triphyllon cognominarunt: flore
pusillo cæruleo, per ramulos sparso: semine mi-
nuto in loculis Elatarum modo, tâquam ge-
minis. Trago Elatinè est frutex exiguus qui in
agris frumentariis nascitur, surculosus, senecioni non dissimilis, folio non prorsus
rotundo, at minori, foliis parietariæ exiguæ, aspero, ita vt vestibus facîle adhære-
scat, lanuginoso, cærulei coloris, lithospermi instar, flosculos gerit cæruleos, qui
tandem in echinos lappaceos vestibibus adhærentes abeunt, quod & semen eius est,
coriandrum

coriandrum magnitudine æquant. Quæ ex causâ Germani quidam *Klettenkraut*, id est, lappaceam herbam nominant. Vim habent Elatines folia, auctore Dioscoride, cum polenta illata, inflammatos, & fluxione infestatos oculos iuuandi. Ipsa herba cocta & absorpta dysenteriam sistit. Plinius eadem prorsus tradidit. Elatine gustu acerba, & ideo oculorum fluxionibus efficax, foliis cum polenta tritis & impositis, subdito linteo. Eadem cum lini semine cocta sorbitionis vsu dysenteria liberat, quorum effectuum rationem breuiter docet Galenus, cum scribit. Elatine modicè tum refrigerat, tum adstringit.

Ibidem.
Vires.
Li. 27. ca. 9.

Lib. 6. sim.

HELXINE,

CAP. XIIII.

HΞΙΝΗ & περδίκιον Græcè, Latine etiam Helxine, Perdicium, Vrceolaris, herba muralis, & Partheniū Celso dicitur, aliis sideritis, aliis heraclea, Officinis parietaria, Gallis *Paritoire* & *Parietaire*, Germanis *Tagwändach*, *Glaskkraut*, Italis *Parietaria* & *Vitriola*, Hispanis *yerna del muro*. Dicta autem est Helxine, quòd aspera foliorum hirsutis, asperoq; semine tenaci nexu vestimentis obuiis adhæreat. Perdicium, quòd perdicæ ea libenter vescantur. Vrceolaris, quòd detergendis vrceolis vasisq; vitreis efficax sit. Muralis & Parietaria, quòd muros ac parietes natales locos sibi elegerit. Nominari autem parthenium non solum Celsus, verum etiam Galenus & Plinius ex Celso testantur. Sed animaduertendum est Plinium huius nominis homonymia deceptum, duas herbas diuersissimas in vnam cōfundere, nimirum parthenium Dioscoridis, & Helxinen hanc nostram siue parietariam. Sic enim ille Celsum citans. Parthenium alij leucanthemum, alij amaracon vocant. Celsus apud nos perdicium & muralium, &c. Quæ de parthenio Diosco. intelligenda. Nam herba muralis, siue perdicium à Celso quidem parthenium dicitur, sed nō hoc de quo hīc Plinius, & Dioscorides lib. 3. tractant: verum id de quo infra Dioscorides, & Plinius ipse his verbis. Helxinē aliqui perdicium vocant: quoniam perdicæ ea præcipuè vescantur, alij sideritim, nonnulli parthenium, &c. Helxinen depingit Dioscorides cauliculis esse tenuibus, subrubris: foliis similibus mercuriali, hirsutis: circa caules velut seminibus paruis, asperis, vestes apprehendentibus, nascique in sepibus & parietibus. Plinius. Helxine folia habet mistæ similitudinis plantagini & marrubio: cauliculos densos, leuiter rubentes: semina in capitibus lappaceis adhærentia vestibus: vnde & Helxinen dictam volunt. Hæc Dioscoridis descriptioni planè respondent, nisi quòd marrubio non mercuriali, vt Dioscorides, folia comparat, quamquam facili lapsu vox vna alteri substitui potuit. Hæc Helxine nostra est parietaria, vsu frequentissima, notissimæque omnibus tum facie, tum natalibus, tum foliis & semine vestibus adhærente, fruticosa enim est, cubitalis, cauliculis tenuibus, leuiter rubescentibus, teneris, succulentis, foliis mercurialis herbæ, aut amaranthi, hirsutis, non crenatis: flosculis minutissimis, pallentibus, aut purpureis: semine perquam exili, nigro, tunica aspera operto, obuias quasque vestes arripiente, radice subrubra, fibris capillata. Nascitur in sepibus, muris, maceriis, parietibus & vinetis. In hortis etiam plantata ita prouenit, vt inde vix exigi possit.

Nomina
Lib. 2. c. 33.

Lib. 3. c. 18.

Lib. 21. c. 30.

Lib. 4. c. 81.
Lib. 22. c. 17

Ibid.

Forma.

Lib. 22. c. 17

Locus.

Tempus. Iulio mense potissimum floret : folia vim habent refrigerantem, & adstringentem, auctore Dioscoride, quare imposita sanant ignes sacros, condylomata, ambusta, panos incipientes, omnem inflammationem ac tumores. Succus eius cerussa admixta illitus erysipelata & herpetas sanat, & podagras cerato cyprino, aut adipe hircino exceptus, prodest & tussi diuturnæ succus cyathi mensura haustus. Tonillis quoque inflammatis vtiliter gargarizatur & illinitur, aurium dolori cum rosaceo instillatus prodest. Helxine inficit lanas, inquit Plinius, sanat ignes sacros & tumores collectionesque omnes. Adusta & panos succus eius cum plimythio, ignes sacros & vlcera quæ serpunt (in vulgaris exemplaribus verba hæc, (& tumores collectionesque) perperam leguntur ex priore versu repetita) & guttura insipientia turgescere. Item veterem tussim cyatho hausto, & omnia (in ore tumida, sic enim legendum,) sicut tonsillas: Et aurium dolores cum rosaceo (eadem exemplaria habent varices cum rosaceo, nullo sensu. Helxine enim cum rosaceo in varices nihil agere potest, nec eius facultatis meminerunt Dioscorides, neque Galenus. Vetus codex arietes vocem habet, sed itidem corruptam, & nihil indicantem. Quare locum sic vt posuimus Cornarius emendauit ex Dioscoride sic scribente. *καὶ ὠταλίαν συν ῥοδίνῳ ἐγγεόμενον ὠφέλει.*) Imponitur & podagris cum caprino seuo, (hircino Dioscorides,) cerâque cypria. Hic cera cypria more suo dixit Plinius, pro cerato cyprino. Galenus. Helxine, inquit, quam alij perdicium nominant, alij parthenium, alij sideritin, alij heracleam, vim habet abstergendi, & leuiter adstringendi cum subfrigida humiditate. Quamobrem phlegmonas omnes in initio & vsque ad vigorem, maximè calidas sanat. Quinetiam incipientibus phygetlis cataplasmatibus ritu illinitur. Tum etiam ad aurium dolores phlegmonosos succus eius mediocriter profuerit. Gargarizandum nonnulli exhibent ad paristhmian. Sunt verò medici qui diuturna tussi vexatis exhibuerunt. Certè euidens extergendi experimentum præbet in vasis vitreis. Aëtius. Facit ad alopecias & impetigines herba ipsa per se assiduè affricata. Aperit & hæmorrhoidas sedis, & fistulas sanat, & sinus occludit cum modico sale trita, & cataplasmatibus modo imposita. Ex his intelligere licet multos helxine abuti, qui eam in frigidis vitiis pro fomento vsurpant, cum refrigerandi constringendique vi prædita sit. Caterùm cum adstringendi facultas ei quoque insit (est enim gustu nitroso, bliteo, & superficie abstergente) potest etiam calculosis, & iis qui difficultate vrinæ laborant exhiberi. Succus enim eius trium vnciarum pondere haustus, auctore Matthiolo, suppressam vrinam mirè prouocat, eadèque super tegula calefacta, vinòque cretico irrorata, & pubi illita, calculosis & vrinæ difficultate laborantibus mirè auxiliatur, potissimum, inquit Fuchsius, si aliquid quod maiorem abstergendi vim habeat, admisceatur. Sic Aëtius hæmorrhoidas aperire tradit, si cum sale cui detergendi vis inest, trita apponatur. Multi hodiè vsus est in enematis ad ventris & vteri dolores paratis, & ad balnea absterfioni accommoda. Eiusdem vis magna est ad recentia vulnera sananda. Si enim recens semicontusa vulneri alligetur, tertioque die soluatur, non erit opus alo vti medicamento. Succus in ore detentus densum dolores mulcet. Stillatitia eius aqua faciem abstergit, & nitorem addit.

V R T I C A, C A P. XV.



ΚΑΛΥΦΗ & κνίδη Græcis, Vrtica Latinis nuncupatur, Arabibus *Nomitræ* *Huniure*, *Vraichlatum*, *Angiara*, Gallis *Ortie*, Italis *Ortica*, Hispanis *Ortiga*, Germanis *Nessel*. Officinæ latino nomine vtuntur. Acalyphe, auctore Athenæo, καὶ ἐνφημισμὸν τῆς ἀνιφραδέσεως ἀνιμασται. & γὰρ παρὰ τὰ ἐπὶ καὶ ἀπαλὴ τῇ ἀφῇ. βραχέστα δὲ καὶ ἀνδρὺς. Id est, acalyphe bono omine per antiphrasim nominata est, neq; enim tactu suavis & mollis, sed aspera & iniucunda, vel ὅτι & καλὸν αὐτῆς ἀπ' ἐλάτῃς, id est, quod iniucundo sit tactu: pruriginē enim ciet. Cnide autē, quod vellicet, pungat, & suo morfu sensum laceffet, à verbo κνίζειν, quod pungere ac vellicare significat. Vrtica ab vrendo, quod pruritur pustulâque igni similes exciter. *Lib. 4. c. 89. Genera.*

V R T I C A I. *Marth.*

Dioscorides duo Vrticæ genera esse ait. Vnam, quæ siluestrior est, asperior, latioribus & nigrioribus foliis, semine lini semini simili, sed minore. Alteram non æquē asperam minuto semine. Plinio differentiæ plures. Ex omnibus his generibus, inquit, Vrtica maximè noscitur, acetabulis in flore purpuream lanuginem fundentibus, sæpè altior binis cubitis. Plures eius differentiæ, silvestris, quam fœminam vocant, mitior. Et in silvestri quæ dicitur Cania (Cornarius legit canina,) acrior, caule quoque mordaci, fimbriatis foliis. Quæ verò etiam odorem fundit herculæa vocatur. Semen omnibus copiosum, nigrum. Mirum sine vllis spinarum aculeis lanuginem ipsam esse noxiam, & tactu tantum leui pruriturum pustulâque confestim adusto similes existere. *Lib. 21. c. 15.*

V R T I C A II. *Marth.*

Notum est & remedium olei. Sed mordacitas non protinùs cum herba ipsa gignitur: nec nisi folibus roborata. Incipiens quidem ipsa nasci vere, non ingrato, multis etiam religioso in cibo est, ad pellendos totius anni morbos. Siluestrium quoque radix omnem carnem teneriorem facit simul cocta. Recentiores alia adiecerunt genera, de quibus ordine dicitur. Vrtica prima Dioscoridis est quæ silvestris & mas, & Romana dicitur, non ob natales: est enim calidioribus regionibus vt Hispaniæ, Narbonæ, Italiæ frequentior & vulgatio, sed propter seminis maioris maiorem efficaciam, caulibus rotundis, cauis, flexuosis, asperis & hirsutis: foliis longis, asperis, mordacibus, vrentibusque, altius quàm cæteræ Vrticæ incisus, inter quæ & caulem è petiolis paruis pèdent pilulæ villosæ echinum referentes, plenè semine fusco, compresso, lubrico, lini, sed rotundiore & minore. Rara in septentrionalibus regionibus, nisi ab herbariis in hortis colatur. Secūda Vrtica communis, *Forma* *Vrtica. 2. canina.*

VRTICA, *Oligophyllos*.

Locus.

Vrtica.
Hercu.

Forma.

Lib. I. cap. I.
Vrtica oli-
goph.
Ibid.

Forma.



vrtica fœmina, Vrtica maior, supradicta æqualis caulium proceritate atque asperitate, interdum etiam procerior, foliis hirsutis, punctoriæ vstionis dolorem inurentibus, nigrioribus, interdum rubescens, non tam altè ferratis: semine in filamentis racemosis deorsum vergentibus, milio simili, sed minore, subrufo: radice longa, gracili, lutea, huc illic serpente. Maximo importunòque prouentu hac cõmuni vrtica tota scaturit Europa. Vrtica tertia minor, Canina Plinij, acrior, similis planè maiori cõmuni, sed minoribus foliis, & viridioribus, & caule breuiore, rotundo, hirsuto, magis mordaci & vrente vi: semine crassiusculo: radice breuiore. Formosissima ea est Vrtica, quæ in siluis ac dumetis nascitur, caule & herba vulgari cõsimilis, grauissimi odoris, attamen grati quemadmodum & melissa, purpureis floribus circa caulem vsque ad summum vestita, instar spicæ vel ocimi. Semen huius quoque in folliculis continetur teres, nigrum, minutius semine rapi, per omnia ocimi semen referens. Herculeam Vrticam Plinij Tragus esse arbitratur. Inter magnas & vrentes Vrticas ponitur à Trago ea quæ à

foliorum paucitate meritò oligophyllos dicenda est, radicibus longis, in sese contortis & implicatis, humi serpentibus, coloris crocei. Aduentante Vere quotannis nouas cymas emittit, vnde nonnunquam vna de radice quini, seni, aliquandò plures, interim & pauciores asperrimi, lanuginosi ac quadrati caules prodeunt, quorum alij asperrimis & spadiceis, alij nigrioribus, & vndiq; instar ferræ incisis foliis vestiuntur. Semen cauli inter folia expansis fibris adnascitur, quod bi autumnii tempore

tempore maturuerit, & extritum fuerit albidum esse, & ad figuram milij (licet minus illo sit) accedere apparet. Hæc Vrtica vehementer adurit, sua sponte affatim luxurians, agricolis vt & cateræ omnes vrentes maximè inuisa. Sed Vrtica id vnicum vitium multis aliis commodis pensant. Folia enim imposita cum sale canis morsus sanant, inquit Dioscorides, gangrenas, carcinomata, sordida vlcera & cacoethe item luxata, tubercula, parotidas, panos, abscessus. Eadem lienosis cum cerato imponuntur. Faciunt & ad sanguinis è naribus eruptiones folia cum succo trita indita. Menses cient trita cum myrrha subdita. Vterum prolapsum restitunt folia recentia admota. Semen ex passo potum ad venerem concitat, & vterum aperit. Idem cum melle delinctu orthopnoæ, pleuritidi & peripneumoniæ prodest. Educit & quæ in thorace hærent. Admiscetur quoque erodentibus medicamentis. At folia cum conchis cocta aluum emolliunt, vrinas mouent, inflationes discutiunt. Verum cum pisanâ cocta quæ in thorace hærent educit. Decoctum foliorum cum modica myrrha menses mouet. Succus gargarizatus vnam inflammationem reprimat. Sic enim conuertenda hæc Græca: ὁ δὲ χυλὸς ἀναγρῆται. ζδωμος τ' ἐλάφι κλονίδα φλεγμαίνουσαν: non quemadmodum vertit Ruellius, Inflammatione turgentem gargarizatus succus exprimit. Nam reprimere est vnam ipsam, humorisque illapsos repellere ad loca vnde fluxere, id quod expedit in partis illius inflammatione. At exprimere contra est ad externa premere, quod est maximè noxium partibus inflammatione tentatis. Plinius Vrticæ vires & vsum medicum exponit planè ex Dioscoridis sententia, sed fusiùs; vt Dioscoridi intelligendo non parùm lucis adferat. Vrtica, inquit, quid esse inuisius potest? At illa præter oleum quod in Ægypto ex ea fieri diximus, vel plurimis scatet remediis. Semen eius cicuta contrarium esse Nicander affirmat: item fungis, & argento viuo. Apollodorus & salamandris cum iure decoctæ testudinis. Item aduersari hyoscyamo, & serpentibus, & scorpionibus. Tum illa ipsa amaritudo mordax vnas in ore, proidentemque vuluas, & infantium sedes tactu resiliare cogit: lethargicos expergiscit factis cruribus, magisque fronte. Eadem canis morsibus addito sale miscetur. Sanguinem trita naribus indita sistit, & magis radice carcinomata, & sordida vlcera sale admixto: item luxata sanat & panos, parotidas, carnesque ab ossibus recedentes. Semen potum cum sapa vuluas strangulantes aperit, & profluvia narium: sistit impositum. Vomitiones in aqua multa sumptum à cœna faciles præstat, duobus obolis: vno autem in vino potu lassitudines recreat. Vuluæ vitis tostum, acetabuli mensura: potum in sapa resistit stomachi inflationibus. Orthopnoicis prodest cum melle, & thoracem purgat, eodem eclegmate. Et lateri medetur cum semine lini: addunt hyssopum & piperis aliquid: illinitur lieni. Difficilem ventrem tostum cibo emollit. Hippocrates vuluâ purgari potu eo pronunciat. Dolore leuari tosto acetabuli mensura cum dulci potu, & imposito cum succo maluæ. Intestinorum animalia pellit cum hydromelite & sale. Defluuia capitis semine illito cohonestari. Articularibus morbis & podagricis plurimi cum oleo vetere, aut folia cum vrsino adipe trita imponunt. Ad eadem radix tusa cum aceto non minus utilis: item lieni. Et cocta in vino discutit panos, cum axungia vetere, salsa: eadem psilothrum est sicca. Condidit laudes eius Phanius Physicus, vtilissimam cibis coctam conditamve professus, arteriæ, tussi, ventris, destillationi, stomacho, panis, parotidibus, pernionibus: cum oleo sudorem, coctam cum conchyliis cietæ aluum, cum pisanâ pectus purgare, mulierumque menses: cum sale vlcera quæ serpunt cohibere. Succus quoque in vsum est. Expressus illitusque fronti sanguinem narium sistit: potus vrinam ciet, calculos rumpit: vnam gargarizatus reprimat. Semen colligi melsibus oportet. Alexandrinum maximè laudatur. Ad omnia hæc & mitiores quidem teneræque efficaces, sed præcipuè siluestris illa in vino pota, quæ &

Vires.
Li. 4. ca. 89.

And. Lacu.

Li. 22. ca. 13.

Li. 6. simpl.

amplius, lepras in facie tollit. Si quadrupes initum non admittant, Vrtica naturam fricandam monstrant. Galenus euidentiùs & vires & effectus Vrticæ tradit, tanquam de vno genere loquens. Vrticæ herbæ & semen & folia, (nam hæc potissimum sunt vsui) admodum digerentis sunt facultatis, adeò vt & phymata & parotidas sanent. Sed & quiddam flatuosum obtinent, quo & venerem extiment, maximè si cum passo semen bibatur. Porro quòd non vehementer excalfaciat, sed multum tenuium sit partium, testimonio est crassorum viscosorumque humorum ex pectore pulmoneq;eductio, tum quòd partes quas contigerit, pruriant. Porro flatuosum eius cuius esse particeps dicta est, dum concoquitur, nascitur. Non enim actu flatuosa est, sed facultate. Ventrem autem subducit modicè, ipsa duntaxat absterfione, ac veluti titillatione, non purgatione. Et gangrenosa, & cancrofa, & in totum quæ exsiccare citra mordacitatem postulant, ea conuenienter sanat, nimirum cum subtilium sit partium, & temperatura sicca, non tamen tantum habens caliditatis vt mordicet.

LAMIVM,

CAP. XVI.

Nomina
Lib. 21. c. 15.
& 22. 14.



RTICA iners & mortua, vulgò Archangelica, Plinij Lamium esse putatur. Sic enim ille cum de Vrtica tractasset, quæ innoxia, inquit, morsu carens Lamium vocatur. Gallis *Ortie morte*, Germanis *Todtnessel*, siue *Taubnessel*. iners & mortua cognominata est, quòd foliis sit non mordacibus neque pungentibus, & mitissima. Archangelica ab eximiis viribus. Lamium fortassè à florum figura, veluti cucullo laruatam Lamiam quandam representante. Itali *Milzatellam*, & *Herbam de la Milza* vocant, ab insigni

LAMIVM, Fuch.

Genera.

Forma.

Locus.

Temper.

Li. 22. c. 14

Vires.



eius aduersus splenis obstructionem & duritiem efficacia, qui splen illis *Milza* nominatur. Ea duplex est, florum colore distans: alia enim albo, alia luteo constat. Est & alia Vrtica mortua, de qua mòx. Lamium siue Archangelica flore albo, foliis est vrticæ vrentis similibus, fimbriatis, candidioribus, lanugine nequaquàm mordaci: caule quadrato: floribus oblongioribus, maioribus, fabæ, per foliorum interualla quasi cucullis, aut galeis apertis, siue ansis inflexis, caules amplexantibus, minùs graueolentibus, albidis, seu pallentibus, radice fibrata. Passim circa sepes & semitas nascitur. Est Lobellio Galeopsis Matthioli proximo capiti depicta. Lamium luteum à superiore differre non videtur, nisi proceriore caule, numerosiore, hirsutior folio: flore pereleganti luteo, non dissimili. In siluosis & opacis potius reperitur. Dalechampio est Galeopsis lutea proximo capite picta. Maio potissimum mense floribus abundat, & tota ferè æstate. Calidum siccumque est Lamium, vt & cætera vrticæ genera, id quod ex gustu & facultatibus eius deprehenditur. Plinius cum vires & facultates vrticæ fusiùs exposuisset, subiungit. Ea quoque quam Lamium inter genera earum appellauimus, mitissima, & foliis non mordentibus, medetur cum mica salis contulis, incusisq; inustis & strumis, tumoribus

tumoribus, podagris, vulneribus. Album habet in medio folio, quod ignibus facris medetur. Quidam è nostris tempore discreuere genera. Autumnalis radice alligata in tertianis, ita vt ægri nuncupentur, cum eruitur illa radix, & dicatur quæ, & cui, & quorum filio eximatur, liberari morbo tradiderunt. Hoc idem contra quartanas pollere. Iidem radice vrticæ addito sale infixa corpori extrahi: foliis cum axungia strumas discuti, vel si suppurauerint, erodi, compleriq̃. Recentiores vrtica mortua vtuntur sistendo ruentis à naribus sanguinis impetu, imæ ceruici vel scapulis alligando: nam inde sperant in aduersum trahi cruoris manantis impetum. Vlceribus denique, putredinibus, & fistulis mirificè conferre ac mederi tradunt: & vtrumq; Lamium non dissimilibus viribus, sed luteum multò efficacioribus esse ad vulnera, vlcera, & tumores.

GALIOPSIS,

CAP. XVII.

ΓΑΛΙΟΨΙΣ vel γαλιόψις, & γαλεόβολος Græcis, Latinis etiam Galeopsis, vel Galeopsis, vrtica labeo, Vrtica fœtida, Gallis *Ortie puante*. Dicitur autem Galeopsis si cum, i, scribatur à florum effigie Galeata, quod eius flores galeæ aspectum referant. At quoniam inusitatum fuit Græcis præsertim veteribus, Latina nomina cum Græcis componere, γαλιόψις potius per scribendum erit, vt & multa exemplaria habent, & Plinius ita legendum testatur, qui galeopsin hanc herbam nominat: à florum figura mustellæ faciem & rictum quadamtenus exprimente. Id quod etiam videtur innuere τῆς γαλεόβουλῆς nomen, id est, mustellæ fœtidæ: quo & quæ nam sit herba indicatur, nulla videlicet descriptioni aptiore quàm vrtica mortua fœtida. Nam Galeopsis, vt scribit Dioscorides, quam aliqui Galeobdolon nominant. Totus frutex cum caule & foliis vrticæ similis est, sed folia læuiora sunt, & dum teruntur valdè grauem odorem reddunt: flores tenues, purpurei coloris. Nascitur in sepibus & circa vias, & ædificiorum areas vbique. Sic Plinius, ita vt ex Dioscoride transcripsisse videatur. Galeopsis, aut vt alij Galeobdolon, vel galion, caulem & folia habet vrticæ, læuiora, & quæ grauem odorem trita reddunt: flore purpureo. Nascitur circa sepes ac semitas vbique. Sic vrtica fœtida, vrticam aut fœtidum marrubium foliis ac caule refert. Floribus ea purpureis, exilibus, oblongis galericulis, aliquantum mustellina effigie expressis visitur. Deinde iuxta sepes, rudera & vias oritur passim. Hæc à Lobellio sic picta est Galeopsis siue Vrtica non mordax Lamium Anguillæræ, Purpurea Galeopsis, Heraclea Plinii Tragi: quamquam ab Heraclea Tragi hac prorsus differre videatur. Quæ verò perperam Herbariis, Matthiolo, Lacunæ Galeopsis dicitur, Lobellio est Lamium siue Archangelica flore albo superiori capite explicata. Scrophularia verò maior, quæ opinione Fuchsij & Dodonæi galiopsis est, Vrticæ minùs afsimilatur, multò minus fœtet, in locis riguis & viginosis, siluosis, & ab ædificiis multùm disitis nascitur. Radicem habet magnam, albam, strumosam, adeò notatu dignam, vt hanc indictam minimè præterisset Dioscorides. Præterea galiopsis folia, caules, succus, & semen vim habent dissipandi

Nomina

Lib. 4. c. 90.
Forma.

Locus.
Li. 27. ca. 9.

Vires.



est, Vrticæ minùs afsimilatur, multò minus fœtet, in locis riguis & viginosis, siluosis, & ab ædificiis multùm disitis nascitur. Radicem habet magnam, albam, strumosam, adeò notatu dignam, vt hanc indictam minimè præterisset Dioscorides. Præterea galiopsis folia, caules, succus, & semen vim habent dissipandi

duritias

duritias, carcinomata, strumas, parotidas, panos. Oportet autem cum aceto bis die imponere, & cataplasma tepidum facere. Sed & decoctum ipsius vtiliter in fomentum affunditur: facit etiam ad nomas, gangrænas & putredines cum sale imposita. Quas insignes facultates non solum antiqui, sed etiam posteriores & docti medici experti sunt, & literis mandarunt, qui vrticæ mortuæ & foetidæ nomen indiderunt, quæ nota facile dignoscitur à congeneri lamio & perquâ simili.

GALEOPSIS Purpurea,

Lobellij.



GALEOPSIS Lutea,

Dalechamp.



Lib. 27. c. 9.

Eadem vires Plinius ex Dioscoridē videtur descripsisse, his verbis. Folia caulesq; duritias & carcinomata sanant ex aceto trita & imposita. Item strumas, panos, & parotidas discutiunt. Ex vsu est & decoctæ succo fouere. Putrescentia quoque & gangrænas sanat cum sale. Hic minimè prætermittenda Galeopsis lutea herbariorum, quam descripsit & depinxit Dalechampius. In asperrimis montibus provenit, radice fibrata, nigricante, inutiles, caulibus multis, cubitalibus, angulosis: foliis vrticæ, amplis, imo caule minoribus, medio latioribus, graue quidpiam subolentibus, tactu minimè asperis, villosis, florē in caulis vertice interuallis paribus exeunte, luteo, duobus foliis constante, quorum inferius falcato sinu in capacem aluum extuberat, superius autem operculi modo impositum cōteggit, pallidis staminibus in medio subrectis: semen, flore delapso, in herbaceis calicibus veluti fixum hæret. Inuenitur frequens hæc planta in montis Æguebelletij summo iugo, quâ Lugduno Cameriacum itur. Est & copiosa Galeopsis rubra in dumetis nostris opacis, huic cætera similis, flore tantum rubro diuersa. Vtrumque hoc genus à Lamio Plinij & inodoro & foetido plurimum distat. Pena & Lobellius Lamium fecere à Lamio siue Archangelica specie non differens, flore albo, ut superiore capite delaratum est.

CARDIA

RECENTIORES rei herbariæ studiosi, huic herbæ (vetere eius nomine nondum comperto) Cardiacæ nomen dederunt, ab eximiis viribus aduersus cordis affectus. Galli *Agripaume* vocant, & *Creneuse*, à crenatis foliis, Germani *Hertz gspan*, siue *Hertz gspan*. Dodonæus Sideritis primam speciem esse existimat. Alij marrubij genus. Caulem emittit quadratum, geniculatum, nigrum, folia ferè vrticæ, aut marrubij, latiora, nigriora, longioribus, crebrioribus, & altioribus multò incisuris, per interualla in caulex singulis geniculis prodeuntia: flores purpureos, vrticæ fecidæ non dissimiles, sed minores, verticillatim caulem ambientes, odore quadatenus marrubium referentes: radicem luteam, intortam, capillamentis fibratam. Palsim in ruderibus, circa sepes nascitur. Cùm amara admodum sit, calidam secundo ordine, siccam tertio esse constat. Recentiores rectè contra cordis palpitationem, conuulsionem & resolutionem conducere tradunt. Decoctis cordi amicis vtiliter miscent. Potest enim cùm amara sit, sua caliditate & siccitate crassos humores qui in venis & aliis partibus, neruosis potissimum sunt, incidere, extenuare, discutere. Hac etiam ratione morbo comitiali confert, vrinas mouet, menstrua educit, pectus à pituita detergit, obstructions aperit, quas frigida causa induxerit, lumbricos necat: in puluerem contrita, & cochlearis mensura ex vino hausta difficilè parientibus mirum in modum opitulatur. Imposita vulnera ferruminat.

Nomina

Lib.1. c.87.

Pet.Pen.in
Aduersf.

Forma.

CARDIACA, Matth.



Locus.

Temper.

Fuchf. cap.
148. histor.Matthi. in
ca. 90. li. 4.

CHELIDONIUM MAIUS,

CAP. XIX.

XEΛΙΔΟΝΙΟΝ μέγα Græcis, Chelidonium maius, & Hirundinaria maior Latinis, Officinis Celidonia, Arabibus *Kauroch*, *Callidunium*, *Chilodomontoma*, & *Memiram*, Gallis *Chelidoine*, & *grande Esclaire*, Italis *Celidonia*, Germanis *Scheluurtz*, & *Schlekraut*, Hispanis *Celiduenha*, & *Ierua de las golandrinas*. Chelidonio autem siue Hirundinariæ auis hirundo, quæ Græcis χελιδὼν dicitur, nomen dedit, vel, ut auctor est Plinius, quòd hanc primùm auis illa monstrauit, & ea oculis pullorum in nido restituit visum, ut quidam volunt, etiam erutis oculis: vel quòd flores aduentu hirundinum, discessu marcescunt, quòd de minore verè dicitur. Quam Græci nominis vim ignorantes imperiti quidam, præsertim Chymistæ, non Chelidonium, sed cæli donum vocitant. Ac ea falsâ nominis præstantia freti, ex hac herba quandam quintam esse fieri prædicant, non modò ad vanas illas chymicæ metallorum medicationes accommodatam, sed ad tuendam etiam hominum sanitatem, morbosque plurimos profligandos vtilem. Genera eius duo. Chelidonium maius & minus: de minore diximus. Maius caulem emittit cubitalem & maiorem, gracilem, adnata, foliis plena habentem: folia ranunculo similia, teneriora tamen, & colore sub cæsis, iuxtaq; singula folia florem leucoio similem. Succus illi croceus, acris, mordax, cum aliqua amaritudine, & odoris grauitate: radix supernè singularis, infernè

Nomina

Lib.25. c.8.

Genera.

Forma.

CHELIDONIVM

Mainus, Matth.*Locus.**Tempus.**Temper.**Li.2. c.76.*

fernè autem plures. Fructus cornuti papaueris instar tenuis, longus veluti comis, hæc tamen verba duo, tanquam superuacua, quidã delent: in quo exigua semina sunt, papaueris semine maiora. Hæc Dioscoridis delineatio Chelidonio huic nostro planè conuenit. Est enim fruticosa herba cubitali altitudine: cauliculis rotundis, lanuginosis, teneris, furculosis: foliis rannunculi, siue aquilegiæ tenuioribus, magis incisis, & magis angulosis, aduersâ parte cæsiis, auersâ incanis: floribus in furculorũ summitate venustis, luteis, leucoio similibus: semine papaueris exiguo, pallido, quod in corniculis seu filiquis longis, exilibus includitur. Vulnerata succũ croceum emittit, gustum vellicantem: radix superiore parte vna, inferiore multis luteis fibris capillata. In locis opacis, parietinis, hortorum scrobiumque marginibus passim obuia. Mense Aprili florere incipit, atque adedò toto deinceps Vere & æstate floret. Tertij ordinis est in calfaciendo & desiccando. Succus eius mixtus melli, inquit Dioscorides, & in æneo vase prunis decoctus, contra oculo-

rum caliginem prodest. Exprimitur succus ex foliis, radicibus, & floribus ineunte æstate, siccatũrque in umbra, & in pastillos conformatur. Radix cum aniso & vino albo pota, impositaq; etiam cum vino, regio morbo, serpentibusque vlceribus medetur: manducata autem dentium dolorem sedat. Eadem Plinius tradit. Florentibus succus exprimitur, & in æneo vase cum melle Attico leniter cinere feruenti decoquitur, singulari remedio contra caligines oculorum. Vtuntur & per se succo in collyriis, quæ Chelidonia appellantur. Galenus enucleatius eadem docet. Chelidonium extergentis admodum & calidæ facultatis est: sed & succus eius ad acuendum visum commodus est, utique in quibus crassum quiddam in pupilla colligitur, digestionem atque discussionem indigens. Vbi sunt radice eius quidam ad auriginem ab obstructione iocinoris proficiscentem, in vino albo potui exhibentes cum aniso. Similiter mansa confert dentium doloribus. Herba in calceis delata, inquit Matthiolus, si nudis pedibus contingatur, ictericos sanare creditur. Eadem mammis mulierum admota mensium abundantiam sistit. Tusa herba vnà cum radice & oleo chamæmelino seruefacta, & umbilico illita, tormina ventris, & vteri dolores tollit. Totius plantæ puluis vulnera vlceraq; sanat. Succus ad oculorum maculas, argema, nubeculas, & cicatrices plurimum præstat: verum cum acerrimus sit, adhibendus non est, nisi iis additis quæ eius acrimoniam retundunt, cuiusmodi est lac muliebre. Idem cauis dentibus inditus eos frangit & eiicit. Cadunt quoque verruæ & arescunt, si frequenter eo illinantur. Quod Plinius & Dioscorides in capitis calce scripserunt hirundines pullis Chelidonio visum restituere, etiam erutis oculis, Celsus fabulosum esse scribit: id enim sponte natura per se fieri. Eius hæc sunt verba. Extrinsecus verò interdum si oculum ictus lædit, ut sanguis in eo suffundatur, nihil commodius est quam sanguine vel columbæ, vel palumbi, vel hirundinis inungere. Neque id sine causa fit, quem horum acies extrinsecus læsa interposito tempore in antiquum statum redeat, celerrimeq; hirundinis. Vnde etiam locus fabulæ factus est, per parentes id herba restitui,

*Li.2. ca.8.**Li.8. simpl.**In cap. 176. lib.2.**Li. & ca.6.*

restitui, quòd per se sanescit. Id quod ab Aristotele Celsus mutuatus est, qui lib. de animal. ortu, inter aues quæ cæcos pullos excludunt, recenset etiam hirundines, quarum si quis, dum adhuc iuvenes sunt, oculos pungat, rursus sanantur: dum enim fiunt, nondum perfecti: sic corrumpuntur: quare rursus nascuntur, & producantur. Id enim significant Aristotelis ipsius verba: Τὸν χελιδόνων ἐάν τις ἐτί νέων δ' ὄλων ἐκκενθήσῃ τὰ ὀμμάτια, πάλιν ὑγιαίνουν. γινομένην γὰρ, ἀλλ' ὃ γεγεννημένων φθερείρε. διόπερ φύονται, καὶ βλαστάνουσιν ἐξ ἀρχῆς.

EUPATORIUM,

CAP. XX.

Nomina

Lib. 4. c. 37.
Forma.

Li. 25. ca. 6.

Li. 2. c. 172.

EΥΠΑΤΟΡΙΟΝ vel ἡπατόριον Græcis, Latinis Eupatoriū, siue Hepatorium, Arabibus *Casul*, *Casli*, seu *Gasel*, Officinis Agrimonia, Gallicis *Eupatoire*, & *Agrimoine*, Germanis *Odermenig*, & *Bruchwurtz*. Eupatorium verò ab Eupatore rege, qui illud primus inuenit nominatum esse volunt. Hepatorium autem, quòd iecori potissimùm medeatur. Eupatorium, describente Dioscoride, herba est fruticosa. (vel melius furculosa, φρυγανώδης: non enim fruticat quæ vno tantùm scapo surgit,) vnum efferens scapum, tenuem, lignosum, rectum, nigrum, hirsutum, cubitalem, aut etiam maiorem: folia ex interuallis fissa in partes maximè quinque, aut etiam plures, quinquefolij aut cannabis potius folijs similia. Sunt & ipsa subnigra, & ferræ modo in extremitatibus diuisa (legendum Græcè *περινοφθῶς ἐν εἰς μὴ μύνα*, non *περινοφθῶς*, idest, ilicis modo incisa: quamquam, si sic legatur, non mutatur sententia, sunt enim ilicis folia ferræ instar incisa:) semen à medio caule enascitur subhirsutum, deorsum mutans, vt etiam siccatum vestibus inhæreat. Similiter Plinius. Eupatoria quoque, inquit, regiam auctoritatem habet, caulis lignosi, nigricantis, hirsuti, cubitalis, aliquando & amplioris: folijs per interualla quinquefolij, aut cannabis, per extremitates incisis quinquepartitò, nigris & ipsis, plumosissq; radice superuacua. Ex hac delineatione notisq; omnibus planè cõstat nostratem Agrimoniã, verum esse Dioscoridis Eupatorium. Præterea nomen argemone in agrimoniam detortum idem testatur, quod argemonen errantes quidam Eupatorium esse arbitrabantur, vt in fine capituli scribit Dioscorides: quo loco tamen codices Græci corrupti sunt: *ἐνιοὶ τούτην ἀρρεμισίαν, ἐκάλειον, πλεονεθύνες*: non enim legendum est *ἀρρεμισίαν*, sed *ἀργεμιόνην*. Hanc enim aliam esse quàm Eupatorium iam dixerat. *ἐνιοὶ πιδονῶν τὴν ἀργεμιόνην διπαλέον ὀνομάζουσιν*. Idest, Sunt qui errore ducti argemonen Eupatorium nominant. Vires etiam agrimonie cõsentiunt multò magis, & multò plures quàm quas Dioscorides enarrauit. Verum tamen attentiores Herbarij in Dioscoridis & Plinij historia non abs re dubitant, & hærent quònam pacto in Agrimonia folium obseruari possit, vt monstrat historia, Cannabi vel Pentaphyllo simile, & pariter vt in vtraq; illa planta, in quinque partes, vel etiam plures diffusum, cum Agrimonie folium vnicum sit, & porrectum simpliciter, nisi fortè existimandum sit, in Græcia plantam hanc folia mittere illo modo diuisa, vt multarū speciei figuramq;

EUPATORIUM
Verum, Matth.



Pena in
Aduers.

videmus loci diuersitate mutari. Planta hæc est vulgaris notitiæ, frequentissimi vsus & commodi, fruticosa, cubitum & sesquicubitum alta, caulem producens sæpissimè vnicum, durum, lignosum, tenuem, rectum, striatum, angulosum, hirsutum, subpurpureum, cuius ramulis folia quasi pediculo innixa foliorum vlmariæ, aut potentillæ, aut rosæ effigie, hirsuta, non nihil incana: flores à medio caule ad summum vsque exigui, lutei, stellati, pentaphylli minores, vbi seminum series lapposa hirsutâque pannis hærens, quos vel tactos mordicus tenet: medulla intus alba, sapore non ingrata, vti nec tota planta: radix crassa, satis longa, fusco rubore, dura. Huius legitimi Eupatorii vice pharmacopœi ferè omnes in decoctis suis, & medicamentorum cõpositionibus Eupatorium illud cannabinum siuè potiùs pseudo-eupatorium vsurpant: de quo iam diximus. Alij quòd plantas istas distinguere non norint, alij vel quòd pseudo-eupatorio suo maiores inesse vires experientia compererint, vel quod etsi agrimoniam verum Dioscorides Eupatorium esse non ignorent, tamen à consueto errore deduci nolint. Agrimonia in satorum & viarum marginibus, & circa sepes, & in pratis provenit. Æstate floret, Autumno semen maturum est. Maio mense colligenda est & siccanda, quæ in medicos vsus asseruatur. Huius folia, auctore Dioscoride, cum adipe suillo vetere trita & imposita vlcera difficilè, cicatricem contrahentia sanant. Herba & semen in vino pota dysentericis, iocinorosis, serpētium moribus auxiliatur. Idem de semine Plinius. Semen dysentericis in vino potum auxiliatur vnicè. Galenus μεθοδικολέως easdem facultates exponit. Eupatorium herba ipsa tenuium partium, incidendi, extergendique facultatem citra manifestam caliditatem obtinet. Quare obstructions iecoris expurgat. Inest itidem ei & adstrictio quædam, per quã robur visceri addit. Radix exsiccatur, & moderatè adstringit: quare externis & internis affectibus perutilis: pota enim viscerum, hepatis præsertim tonum restituit, intemperiem ferè omnem corrigit, obstructions aperit. Praterèa decoctum dilutùmve eius colore limpidò vini gilui placet. Serapio in iis recenset, quæ primo ordine calida siccâque sunt.

Locus.

Tempus.

Lib. 4. c. 37.

Vires.

Li. 25. ca. 6.

Li. 6. simpl.

Pet. Pen. in
Ad.

Cap. 77.

BALLOTE,

CAP. XXI.

Nomina



ΑΛΛΩΤΗ & μέλαν πρᾶσον Græcis, Latinis Ballote, Officinis Marrubium nigrum, Marrubiastrum, Prasium fœtidum, Gallis *Marrube noir*, & *Marrube puant*, Italis *Marrobiastro*, & *Marrobio bastardo*, Germanis *Sehuartz Andorn*, Hispanis *Marroio negro*. Marrubium à foliorum similitudine, nigrum à colore, qui ad colorem fuscum magis vergit quàm in Marrubio, dicta est Ballote: Prasium fœtidum ab odore graui, & fœtore. Ballote caules edit quadrângulos, nigros, subhirsutos, ex vna radice plures: folia marrubio similia, sed maiora, rotundiora, hirsuta, vel, vt alij, densa, (Orbassius addit μέλας, idest, nigra: nec abs re, quod alteri eius nomini bellè conueniat, quòdque ita descripsit Plinius, Ballotefolij est marrubij, maioribus, & nigrioribus,) per intervalla in caule disposita, similia apiastro, graeolentia, vnde etiam apiastrum vocauerunt. Flores in rosâ speciem caules ambiunt. Plinius similiter depingit. Ballote alio nomine Μέλαν πρᾶσον Græci vocant, herbam fruticosa, angulosis caulibus, nigris, hirsutis: foliis veltientibus maioribus quàm porri & nigrioribus, graeolentibus. Sed quod μέλαν πρᾶσον pro μέλαν πρᾶσιον legit, & φύλλα πρᾶσιον μείζονα foliis maioribus quàm porri conuertit, ita vt Prasium, idest, marrubium in πρᾶσιον, idest, in porrum sæpius commutatur, in hoc, vocum similitudine deceptus, vehementer errat. Ex his veram Balloten hîc depictam esse cõstat, quod illa sit fruticosa herba, quadrangulis caulibus assurgens, nigris, hirsutis ferè. Folio marrubij, sed maiore, piloso,

Forma.

Lib. II.

Lib. 27. c. 8.

Ibidem.



sepes, ædificiorum areas, semitas, rudera, nascens: solo gracili & macro: radice candida, fibris quâ plurimis tenuissimis capillata: cauliculis multis fruticans, quadrangulis, palmum altis: foliis subrotundis, priori Ballote similibus, lætius virentibus, minùs crassis, rugosis, grauiter olentibus, per interualla in caule dispositis, & orbiculatim eam circundantibus: floribus purpureis, verticillato ambitu caulem coro-

piloso, cingente caulem per interualla, odore graui: floribus purpureis, verticillatim caulem circumplectentibus. Nascitur vmbrosis in locis, propè sepes, cœmeteria, vias & domos. Floret in fine Iulij mensis & initio Iulij, quo tempore commodè carpi potest. Amara & acris est, ideò calfacit in secundo ordine iam cōpleto, aut tertio remisso: desiccatur autem in tertio. Huius folia, inquit Dioscorides cum sale trita canis moribus medètur. Feruenti cinere flaccescunt, vt condylomata reprimât: sordida vlcera cum melle purgant. Quæ Plinius iisdem ferè verbis retulit. Vis eius efficax aduersus canis morsus ex sale foliis tritis impositis: item ad condylomata, coctis cinere, in folio oleris. Purgat & sordida vlcera cum melle. Galenus Ballotes ne meminit quidè in simpl. medicamen. censu. Sed Paulus acrem & absterforiæ facultatis esse ait. Vnde cum sale impositam ad canis morsus prodesse, non rabiosi, sed eius qui aliàs momordit, vt idè alibi testatur. Est alia doctis herbariis dicta Ballote minor, seu crispa, circa

Locus.
Tempus.
Temper.

Li 3. ca. 100.
Vires.

Lib. 27. c. 8.

Lib. 7.

Lib. 5. ca. 4.

BALLOTE Crispa.

BALLOTE Crispa maior.



nantibus: semine in oblongis caliculis, minutulo. Ante hyemem exactā appetente Vere floret, longè tempestivius quàm Ballote maior. Quidam Coronopum vocauerunt. Est altera Ballote crispa maior, alioqui valde similis, quæ in locis cultis propè horrorū areas & semitas nascitur, radice cādida, plurimis fibris villosa, breui: caulibus multis, quadratis, dodrantalibus, ramosis, foliis rotundis, laciniatis, venusta incisurarum specie, orbiculatim caulem ex interuallo circumdantibus: flore copioso, verticillatim inter folia prodeunte, puniceo, exiguo: semen in oblongis caliculis minutulum continetur. Floret Febuario. Quidam etiam Coronopum nominarunt.

PLANTAGO,

CAP. XXII.

Nomina



ΠΝΟΓΛΩΣΣΟΝ Græcis, Arnoglossum & Plantago Latinis, Arabibus *Lifen*, aut *Lesan alhamel*, Italis *Piantagine*, Hetruscis *Centinberia* corrupto ex quinqueneruia vocabulo, Germanis *Uuegerich*, Hispanis *Lhanten*, *Tamehagē*, Gallis *Plantain*. Officinæ nomen Latinū Plantaginis retinuerunt. Arnoglossum quòd folia eius agnina linguæ simillima sint, appellarunt Græci, Latini autem Plantaginem ducto à planta vocabulo. Sunt qui à similitudine neruorum, quibus quasi costis in dorso per longitudinem folia distincta sunt, Polyneuron vocant. Duo Plantaginis genera, inquit Dioscor. maior & minor. Totidem genera Plinius agnoscit. Recentiores herbarij plura fecerunt, Plantaginem mediam, Plantaginem roseam, Plantaginem aquaticam, de qua diximus, Plantaginem marinam. Matthiolus Plantaginem maiorem eam esse scribit, cuius folia septem fibris tanquā neruis distinguuntur, quā ob id Græci ἐπλ᾽ πλ᾽ ὄρον, idest, septineruiam nuncuparunt: mediam in cuius foliis quinque apparent costæ, πέντε πλ᾽ ὄρον, idest, quinqueneruiam ab iisdem appellatam. Officinæ quoniam folium arctius definit in acumen, & velut in lanceæ mucronem fastigiatur, Lanceo-

Genera.

Li. 2. ca. 119.
Lib. 25. c. 8.
Lib. de pal.
cap. 40.
In cap. 119.
lib. 2.

PLANTAGO Vulgaris latifolia, Matthioli.



PLANTAGO Maior, Matthioli.



latam

latam, vulgus Lanceolam nominat. Minimam verò, cuius folia, quæ leuiter hirsuta sunt, tres tantum nervos habent, quamobrem *τρίνερυια*, id est, trineruia dici potest. Verumtamen iconibus postremæ editionis Arnoglossa nominibus aliis distincta. Plantaginem enim mediam pinxit septineruiam foliis latissimis, cauliculis

PLANTAGO Minor,
Longa Matth.



PLANTAGO Minor,
Dodonæi.



longis, à medio floribus spicatis, caudas muriū referentibus. Hæc est Plantago vulgaris latifolia. Deinde Plantaginem maiorē, & septineruiam foliis similiter latis, cauliculis longioribus, in quibus flores vertici propiores. Tertiā Plantaginem longam, quam quinqueneruiam & Lanceolatam appellari diximus. Dodonæus Arnoglossa exhibet: Maius, medium, de quo in Cynoglossis, minus, & marinum. Alij aliter ex foliorum magnitudine & modo Plantaginum varietates & appellationes, distinxerunt. Plantago maior amplior & lætior latis constat foliis, oleracei, generis (Ruellius sic conuertit *λαχανώδες*, quod alij potius vertendum censent betæ similis: sæpè etenim Attici *λαχανον* pro betæ vsurpant: quare Dioscor. eo vocabulo maiorem Plantaginem betæ similem esse indicauit, vt reuera illi maximè assimilatur, cum in exprimenda similitudine speciatim loqui non generatim conueniat.) Caulis in hac est angulosus, subruher, cubitali altitudine, à medio ad summum vsque tenui semine circumdatus, radices subsunt teneræ, hirsutæ, candidæ, digiti crassitudine. Plantago minor folia habet angustiora, minora, molliora, leuiora & tenuiora: cauliculos ad terrā inclinatōs, flores pallidos, semen in summis cauliculis. His descriptionibus Plantago nostra maior latifolia, & minor pulchrè respondent. Pro minore Matthiolus eam, opinor, pingit, quam longam vocat. Dodonæus quinqueneruiam, cuius folia angustiora, rigidiora, quibusdam raris per ambitū denticulis, mucronata: radix rotundior, breuior, pluribus capillamentis depacta: cauliculi angulosi, iuncea: flores albi, stipati in glomerosis & breuioribus spicis. Est & plantago incana, Lobellij & Penæ, cui folia incana superficie pubet, rigidiora, crassiora, & in ambitum humi, nervulis magis extantibus refracta: radix crassior, longior, minusq; fibrata: rectoribus, altioribus cauliculis, floribus breuioribus, sed magis sparsis & speciosis, albis, caudatis. Iunio & Iulio defluentibus. Præterea Plantago quædam in hortis ad voluptatem colitur, cui omnia Plantaginis maioris similia præterquā cauliculus summus, eleganti ambitu, foliolis multis, sibi equali

Li. i. ca. 61.

Forma.

Lib. 2. c. 61.

PLANTAGO *Rosea, Penn.*

Locus.

Li. 2. ca. 119.
Vires.PLANTAGO *Rosea, Lob.*

Lib. 25. c. 8.

collo. suspensa ad strumas discutiendas vruntur. Verba Plinij totam hanc rem, & Dioscoridem ipsum declarant. Celebrant & Themison medicus vulgarem herbam Plantaginem, tanquam inuētor, volumine de ea edito. Duo eius genera, minor angustioribus foliis & nigrioribus, linguæ pecorum simillimis, caule anguloso, in terram inclinato, in pratis nascens. Altera maior foliis laterū modo inclusa,

serie mutuò incumbentibus, atq; sensim in fastigiū coeuntibus, vbi quasi imbricatim squamatimve sese decussantia folia umbellam elegantem, quasi florem constituunt herbidum, vt in quadam specie primulae veris cernere licet. Semen ē medio foliorum interstitio exilit, sed priori simile. Ab hac Plantago alia à Lobellio picta, distat sola panicula spicatim sparsa, onusta innumera fœtura he. baceorum flosculorum racematim coherentium, in Belgicis hortis. De Plantagine marina alibi dicendum. Plantago maior nascitur in cœnosis, sepibus & humidis locis. Minor itidem circa aggere, sepes, prata, & lacunosa loca. Herba & flores æstatis initio, Maio & Iunio mensibus, semen Augusto carpitur. Vim habent folia, auctore Dioscoride, exsiccatem atque adstringentem, ideo ad omnia vlcera maligna, elephantica, quæ humore scatent, & sordida conferunt. Eruptiones sanguinis, nomas, carbunculos, herpetas, epinyctidasq; cohibent. Vl. era vetera & inæqualia cicatrice obducunt, chironia sanant, sinus glutinant. Morsibus canis, ambustis, inflammationibus, parotidibus, panis profunt. Strumis & ægilopiis cum sale illita conferunt. Oulus cum aceto coctum & sale dysentericis & cœliacis sumptū subuenit. Datur & in locum betæ cum lenticula coctum. In leucophlegmatia post aridas epulas in medio herba decocta datur. Comitialibus & asthmaticis data proficit. Foliorum succus oris vlcera continua collutione purgat. Cum creta cimolia & cerusa erysipelatis medetur: fistulas infusus sanat. Aurium doloribus & lippitudinibus succus instillatus, & collyriis additus prodest: gingiuis sanguinolentis, & sanguinem reiicientibus potus confert: dysentericis clystere infunditur: bibitur contra tabem. Aduersus vteri strangulationes in lana apponitur. Item vuluæ fluxiones & sanguinis excreationes sistit. Radix decocta collutione & manducata dentium dolores sedat. Eadē cū foliis in passo ad vesicæ renūq; vlcera præbetur. Ferunt tres radices, cū tribus vini cyathis, & pari aqua potas, tertianis auxiliari, & quatuor quartanis. Sunt qui radice ē

quæ

quæ quia septena sunt, quidam eam heptapleuron vocauêre, sic *πλεῦρας* vertit Plinius, re non satis explicata: aptius erat, folio tanquã costis distincto, quæ quia septenæ sunt, &c. Huius & caulis cubitalis est, & angulosus (sic ex vetere codice legit Cornarius nō, napi similis, vt in vulgatis habetur) Nascitur in humidis multò efficacior. Vis mira in siccâdo densândoq; corpore, cauterij vicem obtinēs. Nulla res æquè sistit fluxiones, quas Græci rheumatismos vocât. Alias eius facultates & multò plures idē Plinius variis locis tradit. Stomachũ corroborat plátago per se sumpta in cibo cum lente, alicæ ve forbitione. Strumis medetur. Semen eius in vino tritum, vel ipsa ex aceto cocta, aut alica ex succo eius sumpta, dysentericis datur. Lichenis sædo malo medetur trita. Vitia sedis & attritus celerrimè sanat. Ex aqua mulsã duabus horis antè accessionem pota duabus drachmis, tertianas leuiores facit, vel succus radiceis madefactæ, vel tusa, vel ipsa radix trita in aqua ferro calefacta. Quidã ternas radices in tribus cyathis aquæ dederunt. Idē in quaternis quaternas fecerunt. Hydropicos sanat in cibo, cum prius panē siccum comederint, sine potu: folia podagras refrigerant, & in primò impetu podagræ rubentis, hoc est, calidè conueniunt. Oris vlcera succus emêdat, & folia radiceq; cōmanducata, vel si rheumatismo laboret os. Vitio reiectionis sanguinis idē medetur, phthismi sanat si bibatur, & ipsa decocta in vino cum sale & oleo à somno matutino refrigerat. Luxatis dolores & tumores tollunt folia tusa, addito sale modico, fistulis infusus succus auxilio est. Sanguinis profluuiũ sistit semen, si ore reiiciatur, siue aluo fluat, siue fœminarum vtero. Succus vomentibus sanguinè datur. Contusis, euersis omnibus modis ipsa sumitur. Medetur omnium generũ vlceribus, peculiariter fœminarũ, senum & infantium igne mollita, melior & cum cerato. Sed vt eas vires habeat plátago, quas Dioscor. & Plin. ipsi tribuunt, tēperamētum eius mixtũ facit, quod declarat Galen. his verbis. Plátago mixtè est tēperaturè, habet enim quiddã aqueum frigidũ, & austerum quiddã, id quod terreũ est, siccum, frigidum. Itaq; refrigerat simul & desiccatur, & in vtroq; secũdi excessus à mediis est. Porro medicamenta quæ cum hoc quod refrigerant vnà etiã adstringunt, ea & ad vlcerarebellia omnia, & ad fluxiones & putredines conueniunt, ac proinde & ad dysenterias. Nam & sanguinis profluuiũ sistit, & si quid aduratur refrigerant: tum sinus quoq; glutinant, & alia vlcera recetia simul & vetera. In omnibus ferè id genus medicamētis primas tenet, aut certè nulli secunda est plantago idq; tēperaturè symmetria & cōuenientia, siccitatē enim obtinet morsus expertè, & frigiditatē quæ nondũ obstupefaciat: & fructus & radix similes sunt facultatis, nisi q̃ tum siccioris, tum minùs frigidæ. Sed & semē subtilium est partium: radices verò crassiorum, atq; herbæ folia exsiccata subtilium partium existunt, & minùs frigidæ facultatis: nēpe diffatè ex eis ac digesto excremēto aqueo. Hac ratione & radicibus vtuntur ad dentiũ dolores, tum mandentes, tum collusionibus incoquentes. Prætereà ad iocinoris & renum obstructions nō has tantũ adhibēt; sed folia quoq; & multò magis femina. Hæc enim omnia quandam in se abstergerendi facultatē obtinēt, quam & in tota herba viridi inesse satis coniici potest, verũ ab humiditatis copia deuinci. Insignes alias eiusdem facultates neoterici prædicāt, maioris & minoris semen tritum ouoq; exceptum, & calente regula inassatum, dysentericos iuuare frequenter deuoratum. Succus ex rosaceo fronti adhibitus capitis dolores à causã calida ortos mulcet. Datur quoque vtiliter ad cruēnta sputa cum armenia bolo, aut hæmatite lapide. Idem eum millefolij succo mixtus cruēntam vrinam reddentibus mirificè medetur potus, præsertim addita philonij persici drachma. Illinitur quoque rectè erysipelatis cum aceto & solani sedique succo. Stillatitia plantaginis aqua cum æquali aceti acerrimi portione sanguinem è naribus fluentem cohibet, si linteola in ea madefacta pedum plantis, manuum volis, & iocinori applicentur.

Embl. 112.
lib. 2.

Lib. 6. sim.

Marth. in
c. 119. lib. 2.

Nomina **G**ENTIANH Græcis, Latinis & Officinis omnibus Gentiana, Germanis *Entzian* & *Bitterwurtz*, Gallis *Gentiane*. Sic à Gentio Illyriorum Rege, qui in bello primus eius vires reperit dictam fuisse testantur Dioscorides & Plinius. Alij, inquit Apuleius, Aloen Gallicam, alij Narcen, alij Chironium, alij Cyminalem vocant, folia Gentianæ iuxta radicem erumpunt, iuglandi aut plantagini similia, subrubentia: quæ verò à medio caule, præsertim autem cacumine prodeunt, breuiora sunt & angustiora, vno verbo, minora. Est enim apud Dioscoridem legendum: τὰ δὲ ἐν μέσῳ τοῦ καυλῷ καὶ μάλιστα τὰ καὶ ὄψρον κείμενα, μικρότερα. Caulis illi magnus, lævis digiti crassitudine, binum cubitorum, interdum hominis altitudine, geniculis intersectus, ex maioribus interuallis folia profert. Flores lutei, primum calicibus cōclusi, postea intumescētes explicantur, semen in calicibus habet latum, læue, acerosum, ad spōdylij semē accedens, radicem longam, similem aristolochiæ longæ, crassam, amaram, intus flauam. Plinius Dioscoridis descriptionem non omnino expressit his verbis. Gētianam inuenit Gentius Rex Illyriorum, ubiq; nascentem, in Illyrio tamen præstātissimam, folio fraxini, sed magnitudine lactucæ: caule tenero, pollicis crassitudine, cauo & inani, ex interuallis foliato, triū aliquando cubitorum: radice lenta, subnigra, sine



Lib. 25. c. 7.

Locus.**Tempus.****Temper.**

Lib. 2. c. 288

Lib. 3. ca. 3.

Vires.

Lib. 25. c. 7.

Ibid. cap. 8.

Ibid. cap. 12.

Lib. 26. c. 14

odore, aquosis montibus sub alpinis plurima. Vfus in radice & succo. Nasctur in altissimis montium cacuminibus, in locis vmbrosis & aquosis, elleboro albo foliis ac natalibus adeo affinis, vt parum exercitatum eminens fallat. Floret æstate, Iunio potissimum mense: dein Iulio semen producit. Auicenna Gentianam calidam esse scribit ordine tertio, siccam secundo. Radix calfacientem & adstringentem vim habet, vt tradit Diosco. Venenatorum morsibus succurrit duarum drachmarum pōdere cum pipere, ruta, & vino pota. Succus drachma laterum doloribus, ex alto cadentibus, ruptis & conuulsis opitulatur. Hepaticis, stomachicis pota cum aqua subuenit. Radix collyrii modo subdita partus eiicit. Vulneraria est imposita vt lycium: vulneribus sinuatim depascentibus potissimum succus medetur: oculis in inflammatione laborantibus illinitur: cum meconio collyriis acibus miscetur succus. Apud Dioscoridem μετὰ loco ἀντι, legēdum esse res ipsa monstrat. Non enim medicamentum frigidissimi loco substituitur, quod calidum & siccū est: radix vitilignes absterget. Plinius hæc quidem breuiter. Radicis natura est excalfactoria, sed prægnantibus non bibenda. Reliqua verò à Diosco. tradita sparsim idem Plinius habet. Gentiana præcipuè aduersus angues, duabus drachmis cum pipere & ruta, vini cyathis sex, siue viridis, siue sicca. Et, Adiungunt & Gentianæ succum, quem collyriis acrioribus cum meconio miscent. Item, Illinitur autem gentiana vlceribus quæ serpunt, radice tusa vel decocta in aqua ad mellis crassitudinem, vel succo: vulneribus ex ea factum lycium. Sic enim habent vulgari codices, & sic locus intelligi potest. Sicut lycium ex sua planta expressum, ita succus ex Gentiana velut lycium expressus vulneribus imponitur, quod dilucidius Dioscorides expressit. ἐστὶ δὲ καὶ σαυμαστικὴ ἐπὶ

τιθεμένη

τιθεμένη ὡς τὸ λυκίον. Aliis in locis. Tanta huic vis est, vt iumentis etiam non tussientibus modo, sed ilia quoque trahentibus auxilietur pota. Stomachum corroborat ex aqua pota, farina eius ex aqua tepida fabæ magnitudine pota, interaneorum vitiis occurrit. Radix trita vel decocta, à ruptis, conuulsis, & ex alto deiectis potatur. Galenus omnem vim Gentianæ radici ex amaritudine attribuit. Gentianæ radix, inquit, multū est efficax, cū opus extenuatione, abstersione, purgatione, obstructionis liberatione. Nec mirū si hæc possit, cū impense amara sit. Hęc Galenus. Gentianæ radix vrinam & menses ciet, aduersus scorpionū ictus cæteris antidotis præstat. Eius aqua stillatitia febres ab infarctu tum viscerū, tum nasorum excitatas mirificè sanat. Alui lumbricos necat, maculas in facie quascunq; deterget, si ea frequentius abluantur. Eadem radix in vinum immissa ad lassitudinem discutiendam, & appetitum excitandum commendatur. Putredinis hostis est infestissima, & veneni mors. Pesti adeò remedium præfens, vt non modò homini, sed etiam brutis incolumitatem tueatur, & amissam instauret.

Lib. 6. sim.

Marth. in cap. 3. lib. 3.

Pet. Pen. in Adu.

CRVCIATA,

CAP. XXIIII.

FACIE & facultatibus adeò affinis est Gentianæ hæc planta, vt docti **Nomina** Gentianæ speciem faciant, quare Gentiana minor à quibusdam dicitur, vulgò Cruciata, prisco nomine nondum comperto. Sic autem nūcupatam quidam existimant, quòd radix secundū longitudinem tripartitò aut quadripartitò fissā sit, sed foliis cruciatim cauli incumbētibus nominis

CRVCIATA sue Gentiana
minor, Matth.

CRVCIATA sue Gentiana
minima, Matth.



etymum potius debetur, Gallicè *Croisette*, Germanicè *Madelgeer*, nominatur. Caule **Forma.** est rotundo, dodrantali, ac etiam maiore, in summo rubescente, paribus ferè interuallis ab imò ad summum geniculis intersecto, à quorum singulis alis bina prodeunt folia, crassa, angusta & oblonga, vulgaris saponaria æmula, & gentianæ foliolis in summo caule erumpētibus similia: flores purpurei vel cærulei diluti in summitate circum

Locus. circum caulem in orbem ex cauliculis herbacei coloris exeunt. Radix alba, longa, amarissima, locis aliquot ab utroque latere crucis instar perforata. Multa & passim oritur locis incultis, sed non ita arduis ut Gentiana: floret Iulio mense. Ex summa amaritudine calidam & siccam esse colligere licet, & viribus Gentianæ proximis præditam. Recentiores magnum eius contra pestilentia venena usum esse affirmant: item ea quæ in thorace hærent educere, posse hausto foliorum aut radices decocto, aut sumpta eius siccata farina. Menses mouet, comitialibus prodest. Vino in quo inferbuerit vulnera & vlcera maligna lauasse & fouisse prodest, aut puluerem in ea iniicere: deterget enim & glutinat. Est alia Cruciatæ, minor cognominata, quæ ad Rubiæ & Aparines similitudinem quadatenus accedit, sed mollis & hirsuta herba, cauliculi tenelli, quadrangulares, geniculati, folia è singulis internodiis quaterna, decussata, breuiora, sed latiora ferè quàm Aparines. Flores exigui verticillati in cauliculos ambiunt, dilutè lutei: radices subsunt perquam tenues. Iuxta fossas, riuulos, & quandoque agrorum margines, inter fentes, à Maio ad finem usque æstatis reperitur, & cum flore. Matthiolus addit Cruciatam minimam.

VNIFOLIUM,

CAP. XXV.

*Nomina**Forma.*

OLIO etiam plantaginis est vnifolium, Germanis *Einblat* dictum, Gallis *Unfeuille*. Quare *μονόφυλλον* possumus appellare. Gramen est Parnasi Cordi & Loniceri. Foliū vnum per initia ab imo promit. Deinde semine iam perfecto in cauliculo rotundo & tenero, duo prodeunt

VNIFOLIUM.

*Locus.**Tempus.**Temper.**& Vires.*

folia priori similia, sed minora, plantaginis figura, & neruulis striata, superne acutiora, alterum superiore est loco: flores supereminet albi, galij odori: deinde acini parui, rotundi, pallidi initio, dum maturuerunt rubentes, gustu amaro & ingrato, radix gracilis & geniculata, transuersim euagatur. Vmbrosis lucis & nemoribus frequens. Maio mense floret. Temperie est calida siccaque. Recentiorum quorundam sententia vnifolij radix aduersus pestem, & omne genus veneni singulare est remedium, hausta statim initio pulueris eius semidrachma cum vino generoso aut aceto, aut utroque, ita ut cum æger hauserit in lecto sudet. Folia cum radice recentibus vulneribus admouisse prodest, quod ea ab inflammatione & suppuratione tueantur.

BIFOLIUM SIVE OPHRYS

Plinij. CAP. XXVI.

*Nomina**Lib. 26. c. 15*

RTV, folio quoque, plantagini simile est Germanorum *Zwyblat*, id est, bifolium à geminis foliis, Gallicè *Double feuille*, à nonnullis ob foliorum cum plantagine similitudinem, & quòd locis humentibus familiaris sit, Damalonium creditum: à quibusdam Gramen Parnasi, à Dodonæo Pseudorchis bifolium, ab aliis perfoliata species, ab aliis Elleborine, ab aliis, & rectius quidem, Ophrys Plinij: non quòd fucandorum supercilliorum facultate, hanc plantam præditam esse comperit sit, sed à binis foliis. Caule est rotundo, laui, duo duntaxat proferente folia, vtrinque vnum ex aduerso, plantagini

Forma.

OPHRYS.



tagini maiori similia, viridantia, secundum longitudinem fibris distincta, à medio ferè caule ad summum vsque caliculi vtrinque multi sunt, & in his velut linguæ dissectæ, nuntantes flosculi, ex pallido siue ex flauo herbacei, quos etiam muscis, siue paruulis volucris plumis exutis comparare possis, nec non testiculorum quorundam floribus. Radix subest tenuis, cum adnascentibus radiculis multis, oblongis & odoratis. In montibus, pratis vdis & frigidioribus frequens nascitur. Maio & Iunio mensibus floret, dein statim euanescit, quare hoc potissimum tempore colligenda. Gustanti glutinosa esse apparet, & quodammodo dulcis, ideò calidam & siccam esse coniicere licet. Cùm igitur facultate non sit adstringente, damasonium esse nequit, tamen ad fracturas & vulnera conglutinanda hac herba recentiores vtuntur. Capillum denigrat Ophrys herba, inquit Plinius, denticulato oleri similis, foliis duobus: quidam hoc loco censent legendum, lenticulato, betam exponentes, quam ideò sic dictam volunt, quòd ea sèpissime cum lenticula vscerentur olim, cibum eiusmodi τευτλον φάειν nominantes.

Locus.

Tempus.

Temper.

Fuch. c. 213.

Pet. Pen.

in Ad.

Lib. 26, c. 15.

CYNOGLOSSVM,

CAP. XXVII.



T arnoglossò ab agnina, ita Cynoglossò à canina lingua nomen dererunt antiqui. Græcis igitur κυνγλωσσον & κυνγλωσσος dicitur, Latinis Cynoglossum & canina lingua, Officinis Cynoglossa, & lingua canis, Gallis *Langue de chien*, Germanis *Hundzzung*. Quænam autem ex aliquot plantis, quas ad caninæ linguæ speciem natura effinxit, verum sit & facie & viribus Cynoglossum, magna est inter herbarios contentio, cùm ne veteres quidem in huius herbæ delineatione consentiant.

Nomina

CYNOGLOSSVM,

Quorundam.



Dioscorides enim Cynoglossò caulem admittit, quem Plinius eidem tribuit. Sic igitur describit Dioscorides. Cynoglossum folia plantagini latifolia similia habet, sed angustiora, minora, & lanuginosa, caulem non habet, & humi sternitur. Plinius verò. Iungitur & Cynoglossos caninas imitans linguas, topiariis operibus gratissima. Aiunt, quæ tres thyrsos feminis emittat, eius radicem potam ex aqua ad tertianas prodesse, quæ quatuor ad quartanas. Est alia similis ei quæ fert lappas minutas. Eius radix pota ex aqua ranis & serpentibus aduersatur. Recentiores ad vires attenti, & ad eos effectus quos catapodia de Cynoglossa inscripta pollicentur, aliud atque aliud Cynoglossum ostendunt. Nonnulli plantam eam, quæ Plantago media à Dodonæo nominatur, ab aliis plantago villosa seu sessilis, quæ plantagini maiori seu latifolia similis est, nisi quòd folia habet angustiora, minora, parùm hirsuta, caules quoque hirsutos in summo spicas proferentes

Li. 4, c. 124.

Li. 25, ca. 3.

Lib. 1, c. 61.

Forma.

proferentes breuiores quàm in maiore plantagine : flores ex albo purpureos : radicem candidam & longiorem. Locus humidis & herbidis, secusque vias nascitur, frigido siccoque est temperamento ad tertium vsque ordinem. Est aliud Monspe-

Locus.

Temper.

Cynogloss.

Monspe.

Per. Pen. in

Adu.

Forma.

CYNOGLOSSVM Pusillum,

Narbonense.



Locus.

Vires.

CYNOGLOSSVM Vulgare floridum
Matthiæ secundum Plinij.



lianensium vulgare Cynoglossum, cui folia sunt mollia, leuia, lanugine pauca, ad tactum minimè aspera, mollitie & effigie linguæ caninæ, vel glasti, nonnihil venosa, albicantia, plantagine latifolia arctiora : caulis rotundus, incanus, in alas diuisus, quibus flores punicei, angusti folij buglosi, paruum semen lappulis hirsutis vel clypeolis contentum, vestibus, vt agrimonie & caucalidis pertinaciùs hærens. Pinguibus & sabulosis locis provenit, sed hîc pusillum, & vix sesquipalmm aut pedem excedens, alibi pinguibus & humentibus aruis multò procerius. Quantum ad caulem & flores attingit, nullos fert nonnullis annis, præcipuè umbra salinea aut vicinis sepibus opacatum, aliis annis, & aliis in locis caulem & flores & semen promit. Si vires considerentur, nulla est quæ potiores aut conuenientiores habeat, & quæ omnes quos pollicetur certiores quàm hæc effectus præstet. Ambustis siquidem opitulari vel mulierculæ sciunt, refrigerandi scilicet manifestâ qualitate & siccante, dolorémque leniente, & maiorem affluxû prohibente, præsertim cum axungia liquefacta, feruidave instillata : eadem alopecii, ab acri & erodente humore capillis defluentibus, confert. Præterea emollit aluum visua malactica & mucrofa vino incocta quod eius frigiditatem retundit. Radix symphyti est magnitudine, muccore & colore, odore penè saporifero, maximi hodie vsus ad acres & te-

CYNOGLOSSVM M,
Matthioli.




nues

nues fluxiones : magis tamen spissat quàm refrigerat. Quare catapotis ad acrem & tenuem fluxionem sistendâ Trallianus immiscet, quæ recipiunt myrrhæ drach. Lib. 2. c. 4. mas septem, hyoscyami, opij singulorum drachmas quatuor, corticis radice Cynoglossi herbæ drach. quatuor & semiss. Ea similiter descripsit Mesues ad catar- rhum, coryzam, tussim, aliosq; his succedentes affectus, addita croci drach. vna &

CYNOGLOSS. Vulgare Matth.

Lycpſis Lacunæ.



LYCOPSIS Anglica,

Lobellij.



semisse. Matthiolas legitimum & Dioscoridis Cynoglossum quod neque cau- lem, neque flores, neque semen gignit, se adinuenisse putat, sæpius à se tum visum, tum lectum Romæ post Adriani molem in sabulosis quibusdâ locis enatum, quod à vulgari Cynoglossio quo pæssim Officinæ vtûtur, longissimè distat : quippe quod in radiantis Solis morem folia fert suppinguia, tenui lanugine albicantia, humi stra- ta, caule perpetuò viduum. At Penæ & Lobellio hæc planta non Cynoglossum sed Lycopsis, vel degener anchusa Æginetæ esse videtur, non perpetuo caule ca- rens, verum toto quidem anno caulem florémque nullum edens, sed vno & inter- dum altero anno post, æstate caulem sesquicubitalem gignens, rotundum, hirsu- tis alis multis diuisum, iuxta quas & folia erumpunt ex interuallis, florésque echij fimbriati, diluta purpura, exili stamine : semen borraginis, minus nigrum : radix crassior digito rufescit lignosa, parùm aut nihil atrestantem insiciens. Huic iun- git Lobellius Lycopsin alteram Anglicam, quæ via qua Bathonia & Bristolia Lon- dinum itur, per messes multa & læta visitur, hilari aspectu, floribus tantùm distans, quos non secus foliorum & alarum interualla, sed in summis caulibus habet saturati- ore purpura.

In cap. 124. lib. 4.

QVINQUEFOLIUM, CAP. XXVIII.

QUINTAPHYLLON Græcis, Quinquefolium Latinis & Officinis & **Nomina** Pentaphyllum, Gallis *Quintefueille*, Germanis *funffingerkraut*. Nomen à nu- mero foliorum habet : in vnoquoque enim pediculo quinque esse depre- henduntur. Dioscorides vnicum Quinquefolij genus posuit. Ab herbariis aliis **Genera.**

Lib. 4. c. 38.

QUINQUEF. Luteum,
maius.

Ibidem.
Quinque-
fol. luteum
maius.
Forma



Lib. 9. hist.
cap. 14.

QUINQUEF. Luteum,
minus.



Lib. 25. c. 9.

Quinque-
folium lu-
teum minus.
Forma

quod obscurum est & ambiguum, quæ enim fraga gignit herba, alia à Quinquifolio est, nec quina in singulis pediculis, sed terna folia habet. Quinquifolium luteum minus superiori persimile est foliis, per terram serpendi modo, caulibus, floribus, nisi quod multo minus est, nec ita facile cauliculis terræ hærentibus propagatur, folia

tria, ab aliis quatuor, vel quinque animaduversa sunt genera, florum colore & foliis distantia. Quinquifolium, ita describente Dioscoride, ramulos fert festucarum similitudine graciles, dorantales, & in iis semen: folia mentharum similia, in singulis pediculis quina, raro plura, in ambitu serrata: florem ex candido pallescentem, auri æmulum: radicem subrubram, oblongam el-leboro nigro crassior. Quibus verbis Dioscoridem Quinquifolium maius luteum delineasse perspicuum est. Etenim ex vna radice oblonga & subrubra ramulos emittit tenues & festucaceos, sese quâ solum subierint propagantes, in singulis folia quina, in ambitu serrata modo crenata, mentharum similia: flores luteos vel aureos, in quina folia diuisos, qui cum depereunt in parua veluti mora vertuntur, fragis similia, in quibus semen. His accedunt natales, & insignis adstringendi facultas, de quibus mox dicemus. Præterea radix quadrata cum arida facta fuerit, quod verissimè obseruatum est à Theophrasto sic scribente. ἡ δὲ τῆς πενταφύλλου, ἢ πενταπέτης (καλεῖται γὰρ ἀμφοτέρως) ὀρυζομένη ἐρυθρὰ, ξηραίνουμένη ὃ μέλαινα γίνεται, καὶ τετραγώνος. ἔχει δὲ τὸ μὲν φύλλον ὥσπερ ὀναρον, μικρὸν δὲ καὶ τὴν χροίαν ὁμοίον. καὶ ἀνέεται καὶ φθίνει ἅμα τῷ ἀμπελώ. πάντε δὲ πέντε τὰ φύλλα. διό τ' ἡ προσωροία. καλεῖται δὲ ἐπὶ γῆς ἡσι λεπτοῦς, καὶ κνήμας ἔχει πυκνάς. Id est, Radix Quinquifolij siue quinque peti (nam hoc etiam nomine appellatur) cum effoditur rubra est, arida verò nigrescit, & quadrata fit. Folium habet Arbuti ὀνάρος paruum, colore illi simile, augetur & desinit vna cum vite, folia omnia quina, vnde ei nomen, caules emittit super terram, tenues, & crebris internodiis constat. His similia Plinius tradidit. Quinquifolium nulli ignotum est, quod etiam fraga gignendo commendetur. Græci vocant Pentapetes, siue Chamæzelon, vel, ut alij, chamæmelum, siue pentaphyllum. Quum effoditur rubram radicem habet. Hæc inarescens nigrescit, & angulosa fit. Nomen à numero foliorum habet. Et ipsa herba incipit & desinit cum vite. Adhibetur & purgadis domibus. Hæc ex Theophrasto conuersa esse constat, præter illud quod Quinquifolium fraga gignendo commendari dicit,



folia ferentibus minora, quàm terram spectant, albicantia. Quinquefoliū candidum magnitudine ferè par Pentaphyllo luteo maiori, cauliculis repentibus, teneris, gracilibus, & foliis in quinque diuisis simile, nisi quòd caules hirsuti sunt, folia longa, antèrius duntaxat crenata, flores candidi sunt: radix non simplex, sed adnata & ra-

Forma.

PENTAPHYLLVM Album,
 Matthioli.

PENTAPHYLLVM
 Rubrum, { Dodonæi.



diculas multas habens huc illuc vagantes. Quinquefolio rubro Pentaphyllis aliis haud abfimili, præfertim luteo maiori folia quinq; partita, toto ambitu crenata, infernè candicantia, supernè nigricantia: caulis palmum vnum aut pedem altus,

PENTAPHYLLVM *Flore albo & rubro, Lobellij.*



PENTAPHYLLVM *Supinum, Tormentillæ facie, Lobellij.*

Locus.

Tempus.
Lib. 4. c. 38.
Vires.



colore fusco aut rubescente, geniculatus, lævis, in cuius summo flores sæpiùs bini, saturato rubore: deinde veluti mora parua, rotunda, fragorum instar rubescentia, sed duriora, in quibus semen includitur: radix tenera huc illuc dispergitur. Sunt apud Penam & Lobellium duo alia Pentaphylli genera. Maius flore subluteo, interdum albo, & rubro. Caulibus rectis, firmis, pedalibus & cubitalibus, in quibus folia quinq; partita, sed altioribus & crebris incisuris, Geranij robertiani vel Alceæ modo: floribus candidis, interdum purpureis, radice foris nigricante intus rubescente, digitum lata, palmum longa & sesquipalmū. In Narbonēsis Saenæ pingui solo, Iunio & Iulio flores edit candidos, in Apennino Italiæ purpureos. Aliud Pentaphylli generi facie cognatum est: medium enim est inter Tormentillam, Pentaphyllum, & Potentillam. Flosculos ex luteo pallentes, summa folia, caducos cauliculos, & radicem Pentaphylli habet, sed folia ima ex atro virentia in longo pediculo aptantur, Argentinæ siue potentillæ amulatione: fructus autem fragariæ sterilis simillimus. Hæc Lobellius. Pentaphyllum nascitur in riguis, inquit Dioscorides, & in aquariis ductibus. Sic Pentaphylla nostra locis opacis & decliuibus proueniunt, & aquosis, præcipuè rubrum, quod solum in scrobium marginibus, & scrobibus ipsis, & stagnantibus aquis reperitur. Florent Maio & Iunio potissimum mensibus. Quinquefolium plurimis polere remediis scribit Diosco. Radicis decoctum ad tertias, si ore contineatur dentium dolores sedat: putredines in ore si collatur sistit: arteriæ asperitates si gargarizetur emendat. Contra alui profluvia & dysenterias auxiliatur: item articulorum & coxendicū dolores potum sanat. Cocta radix in aceto, & illita herpetas cohibet. Strumas discutit, duritias, œdemata, aneurysmata, abscessus, erysipelata, pterygia digitorum, cōdylomata, scabiēsque sanat. Teneræ radices succus cōtra iocinoris & pulmonis affectiones, & venena prodest. Folia cum hydromelite aut vino diluto, aut exiguo pipere contra febrium circuitus bibuntur, in quartana quidem quartanū ramulorum folia, in tertiana verò ternū, in quotidiana vnus. Tricenis diebus

pota

pora comitialibus auxiliantur. Foliorum succus per dies aliquot trium cyathorum mensura potus celeriter morbum regium sanat. Vulnera quoq; & fistulas cum sale & melle sanant: intestinorum ramice laborantibus succurrunt. Quinquefoliū sanguinis profluvia sistit potum & illitum. Plinius eadem quæ Dioscorides variis locis tradit. Quinquefolium strumis medetur, inquit, & pectoris vitiis. Idē ischia- dicis bibitur & imponitur: panos sanat, impositum articulis vtilissimū, fistulis quæ in omni parte serpunt auxilio est cum sale & melle, phalangio aduersatur, lichenas emendat. Succus de quinquefolio potus ciathis tribus anginae medetur. Idem ioc- nitoris & pulmonis vitiis, sanguinemque reicientibus, cuiusq; sanguinis vitio in- tus occurrit. Multi supra omnia laudant ad deploratos dysentericos Quinquefoliū decoctis in lacte radicibus & potis. Idem decoctum ad tertias in vino ictericis dari atq; illini vtilissimum est. Eius folia ex aqua comiliales sanant. Item contrita ex vi- no sumpta triginta diebus in betonicae farinae pondo denariorum tredecim cum aceri scillitici cyatho, comitialibus morbis liberant. Celerrimè succus regio morbo medetur tribus cyathis cum sale & melle potus. Quinquefolij folia quidam terna tertianis dedere, quaterna quartanis, plura cæteris, omnibus obolis tribus cum pi- pere ex aqua mulla. Galenus Pentaphylli radicem scribit desiccare vehementer, minimum verò acrem esse, ob id multo esse vsui, velut alia quoq; omnia, quæ cum sint tenyium partium, citra morsum desiccant. Est enim hæc radix, inquit, desicca- toria ex tertio ordine minimum habens euidentis caliditatis. Idem Quinquefolij radicem in vino coctam dentium dolores leuare tradit.

Li. 8. simpl.

Li. 4. c. st. Pena & Lobel.

Lib. 5. med. local. ita g.

TORMENTILLA,

CAP. XXXIX.



ΠΤΑΦΥΛΛΟΝ Græcè, Septifolium Latine, vulgò Tormentilla nominatur, Gallicè *Tormétille*, Germanicè *Rocheilwurtz*, & *tormétill*. Hepta- phyllum à septenario foliorum numero, Tormentilla verò quia tor- mentum cruciatumve dentium frivissimum placat, atq; venenatarum

Nomina

TORMENTILLA.



quarundam rerum compesci furorem crucian- tem. Quinos, senos, octonosve ramulos, graci- les, rotundos, humi repentes & subrubentes ex vna radice profert: folia parua, quina, sæpius se- ptena, in singulis pediculis crenata, quinquefolij minoris lutei similia, flosculos luteos, radicem crassam, bistortæ similē, modicè intortā, atq; in- tus rubrā, foris nigricantē. Ex hac descriptione cōstat falli eos, qui Tormentillam Dioscoridis pentaphyllum esse putant: hoc enim quina ta- n- tum, illa septena sæpius folia fert, hoc radice m oblongam, rectam, elleboro nigro crassiore, illa breuem, cōpactam, intortam, bistortē ferè instar. Propiùs ad Chrysogonum Dioscoridis accedere videtur, quod densè fruticat, quernis foliis, flore coronarij verbasci: radix vt rapum extuberat, intus ruberrima, foris nigra. Tormē- tilla nemoribus opacis, montosis etiam, siccis macilentisq; locis gaudet. Serò & æstatē flo- ret. Desiccatoriā esse tertio ordine, nullatenus tamen manifesta caliditate participare vires ef- fectusque demonstrant: nam vulnera glutinat,

Forma.

Lib. 4. c. st. Pena & Lobel.

Locus.

Tempus.

farina herbæ vel radicis cum succo plantaginis pota vrinæ incontīnētiā supprimit. Eadem insparſa vulſtera ad cicatricē perducit, cum oui albo ſubaſta, & ſiglinodecoſta datur cholericis, foliorum ſuccus deploratis fiſtulis inſtillatur, neque non oculis ad diſcutiendas maculas. Ad putreſcentiā oris vlcera herba & radix cōmanducata, & ore retenta valent. Herpetas, ſtrumas, duritiās, tumores, aneuryſmata ſanat. Denique eaſdem quas quinquēfolium facultates habet. Quare venenis reſiſtit, dyſenterias & omnes ſanguinis eruptiones compeſcit. Radicum pulvis cauis dentium inditus cum aluminis & pyrethri momento, non modò dolorem ſedat, ſed fluxiones cohibet. Heptaphyllo herba trita, inquit Apuleius, & cum oleo mixta pedēs perunges: id tertio die dolorem tollit.

S A N I C U L A,

C A P. XXX.



VETERVM nullo deſcripta, ſed à recentioribus inuenta quemadmodum & multæ aliæ vulnerariæ herbæ, cenſetur herba hæc, cui à potiore medici munere, nempe ſanandi, nomen ſaniculæ datum: ſanat enim vulnèra. Germanis *Sanniker*, Gallis *Sanicle* dicitur, à nonnullis Diapenſia. Matthiolus hanc quartum pentaphylli genus facit, minimè ex aliorū etiam peritorum herbariorum ſententia. Sed

Nomina
In cap. 38.
lib. 4.

Genera.

S A N I C U L A, Mas.



Cap. 260.
lib. 4.

Forma.

cū herbis aliquot Saniculæ nomen poſitum ſit, hîc de duabus duntaxat tractabimus, quarum vna eſt, quæ propriè Sanicula, & Sanicula mas nominatur, altera quæ cū forma & facultate ad veram Saniculam, quæ mas dicitur, proximè accederet, Saniculæ ſcœmina à Fuchſio, & aliis herbariis nominata eſt. Sanicula mas folia fert vitis aut apij, rotunda, in quinque partes diſſecta, altiore diuiſura, ſimbriata, ex atro virentia, leuia, numeroſa, ſingula è ſingulis pediculis purpureſcentibus, ex radice prodeuntibus, ex qua & caules folia ſuperantes, glabri, teneri, graciles in quorum verticibus rotunda capitula, floribus albis reſerta, deinde ſemen hiriſutum & aſperum: radix fibrata ellebori nigri modo, foris nigra, intus alba. Sanicula ſcœmina cauliculos emittit teneros, glabros, flexiles, in quibus folia quinquepartita, parum crenata, geranij columbini aut ſaniculæ incifura, aſpera, nigricantia, in quibus ſummis flores in umbella congeſti, candidi, aut cærulei diluti: ſemen ſtriatum, oblongum: radix

quamplurimis libris longis, nigris conſtat, ex vno nexu appenſis, ellebori nigri radici planè ſimilis: Quare nonnulli, in quibus eſt Dodonæus, elleborum nigrum eſſe voluerunt. Cordus Aſtrantium nigram appellat. Sanicula mas naſcitur in ſiluis vdis, & umbroſis locis ſeptentrionalium regionum magis quàm calidiorum, copioſiſſima & notiſſima Angliæ & Germaniæ, à quibuſdam etiam in hortis colitur. Sanicula ſcœmina umbroſis quoque, montioſis, ſed celſioribus & Alpinis delectatur. Iunio & Iulio menſibus florent. Sanicula mas adſtringit ſimul & amara eſt, vt hoc nomine caſticatoriam & exſiccatoriam eſſe nulli dubium ſit. Statuunt autem calidam & ſiccā eſſe ordine ſecundo Dodonæus ſiccā ordine tertio, & adſtringentem eſſe ſcribit. Saniculam vulnèribus conferre mirificè experientia compertum

Lib. 3. c. 26.
Locus.

Pena in
Adu.
Tempus.
Temper.
Virg.
Ibid.

SANICVLA Femina, Fuchf.



compertum est: quare Gallis, inquit Ruellius, Li. 2. c. 147.
in adagium venit vulgò iactatum, eos non
egere chirurgo, qui Saniculam habuerint.
Germani chirurgi ad interna vulnèra, enterocelas & fistulas maxime vtuntur, eius puluerem vel decoctum potui exhibentes. Vis est eius eximia ad internorum excrementorum commotionem inhibendam, sistendamq; ne in partes imbecilliores corruant. Tumores enim reprimere decoctam herbam, aut impostam, aut eius succum illitum tam in hominè quàm in pecudibus constat: neque aliud præsentius est auxilium, cum ad pulmones vel fauces vitium decumbit, foliis & radice in aqua melle addito coctis, & potui datis, malignis & putridis oris, gingiuarum, & faucium vlceribus collutione & gargarizatu medetur. Denique omnia, quæ symphytum, præstat etiam Sanicula: potissimum verò sanguinis spurto dysenteria, renumque vitis medetur decocta in aqua vel vino & pota.

CORTVSA,

CAP. XXXI.



ATHIOLYS herbam quandam eximiis viribus insignem celebrat, Ca. 17. li. 4.
quam Cortusam ab inuentore Cortuso Parritio Patauino nominauit. Lobellius Veronensium Caryophyllatum flore Saniculæ vrsinæ. Prouenit hæc foliis ferè vitis, sed minoribus, subrotundis, atque sub-

CORTVSA, Matthioli.



asperis, adstringente quadamtenus sapore, in longis pediculis. Caules edit tenues, rectos, foliis nullis vestitos, qui in camine magno naturæ artificio flores gerunt extima parte purpureos, intima aureo fulgore splendent, aureisq; staminibus intus repletos. Est etiam quæ violaceos, & quæ candidos flores ferat, sed prima frequentior. Radicibus nititur numerosis, tenuibus, prolixis. Nasctur vmbrosis locis, nunquã à Sole illustratis, cretaceo & albicante solo. Nusquam ab inuentore Cortuso visa est præterquam in agro Vincentino, in eo tantum tractu, quem vulgò appellant *Valle Stagna*. Totâ plantâ dum recens est gratissimum odorem spirat, mellis fauis similem, sed multò gratiorem, qui in sicca euanescit. Experientia compertum est valere hanc plantam ad mulcendos neruorum & articularum dolores, à quacumque causâ exortos. Nam ipsius floribus in amygdalino oleo recente ac rosaceo, quod completum vocant, pari pondere commixtis ac diu insolaris, fit ad hoc

Forma.

Locus.

Vires.

medicamentum præstantissimum, si egelidum illinatur. Nec dubium quin tota planta adstringere, ac roborare, & vulnera vlceraque sanare possit. Ea recentiores vtuntur pota ad thoracis vulnera interna. Eius succum admixta ærugine cuniculosus contumacibusque vlceribus vtiliter iniiciunt: olfactu spiritus recreat, frigidum cerebrum roborat. Epota prodest cœliacis, dysentericis, feminarumque profluuiis, & cruenta expuentibus. Tam intus sumpta, quam foris illita enterocelis auxilio est. Quæ omnia efficit temperamento exaltante & exsiccante, quod radices perspicue indicant, vtpotè quæ gustu odorata adstringentesque sint: His nimirum facultatibus attenuare, discutere & adstringere, atque roborare valet.

Temper.

CONSOLIDA SARRACENICA,

CAP. XXXII

Nomina



VILGAREM ac tritam Herbariorum nostri temporis appellationem secuti cum nullum à veteribus huic impositum nomen esse videatur, Consolidam siue Solidaginem Sarracenicam nominamus. Consolidam quidem siue Solidaginem à coniungendis, siue claudendis vulnerum, labris (Chirurgi barbari Consolidare dicunt.) Sarracenicam verò quòd Sarraceni & Turcæ quamuis barbari, opinione magnæ peritiæ in medicamentis, præsertim vulnerariis, apud nos aliquando essent assecuti. Dicitur & Herba fortis, Gallicè *Consoulde*, & *Consolide Sarrazine*, Germanicè *Heidinschundkraut*. Ex radice multis & crassioribus fibris capillata caulem erigit rectum, rotundum, rubescentem, cauum, trium aut quatuor cubitorum altitudine, circa quem folia longa, foliis salicis similia, aut amygdali, leuiter crenata: flores in summo pallidi, qui in auras euanescent. In locis vdis & depressis, siluis vmbrosis & humentibus, & in

Forma.

Locus.

SOLIDAGO Sarracenica,
Fuchsij.



SOLIDAGO Sarracenica
Lobellij.



montosis

montosis vlginosis fruticat. Siccat tercio propè gradu. Gustu amara est & adstringens. Potui datur cæterarum Consolidarum modo: tam internis vulneribus & vlceribus medetur, quàm externis, imposita cum vnguentis, oleis, emplastris. Decoctum eius in aqua hepatis dissoluto tonum reddit, id ipsum & vesicam fellis obstructione liberat. Quare ad icterum febrèscue diuturnas vtile, & ad incipientem hydropem. Eiusdem decoctum gingivarum, gutturis, & oris vlcera & foetorem sanat. Aliud genus Sarracenica Solidaginis ponit Tragus, quod nascitur in asperis & lapidosis agrorum limitibus, radice, caule, & foliis quæ habet, cinerea Balfaminæ acutæ, idest, methastro per omnia simile. Floret Iulio & Augusto mensibus. Flosculi lutei è rotundis vasculis erumpunt. Mirificè sanandis vulneribus, si decocto herbæ colluatur, prodest. Est etiã Consolidà Sarracenica maior ab Herbariis dicta, quæ in locis vdis & vmbrosis provenit, radice valde fibrata: caule bicubitali, terete: foliis per intervalla singulatim è caule prodeuntibus, latis, crassis, per ambitù crenatis, venosis, in acutum desinèntibus: flore senecioni ferè simili, luteo, in pappos abeunte, saporis amari & adstringentis. Consolidam aliam auream nemorum protulit Pena ex Aureliæ Gallicæ siluosis densissimis, quæ folia habet betæ nigræ aut Limonij, ex atro virentia, carnosa, aliquantum hirsuta, crassa, venosa, herbæ Auræ

Temper.
& Vires.

CONSOLIDATA Sarracenica,
tertia Tragi.



CONSOLIDATA Sarracenica,
maior.



CONSOLIDATA Aurea
nemorum, Pena.



Narbonen

Narbonensium similia, cauliculos amplectentia binos aut ternos, in quorū summitate flores sunt radiati, Calendulæ similes & concolores, scitè pectinatim confertis & commissis foliolis antequàm dehiscant, eleganti spectaculo. Radix multis capillamentis sparſa per summum cespitem Bellidis modo, saporis Cōsolidæ mediæ tantillum acrimoniæ prodentis, aut herbæ Auræ, cuius etiā vires, & aromaticum quid æmulatur. Conuenit, inquit Lobellius, cum Alismate Matthioli, & Chrysanthemo latifolio Dodonæi. In Frisia secus Zutphon & Hackfort frequentissima. De Consolidis aliis diximus, in libro de Palustribus.

VIRGA AVREA,

CAP. XXXIII.

Nomina

Forma.

Locus.

Tempus.

Vires &

Temper.




ST & hoc nomen recentiorum Herbariorum inuentum, veluti fortassè & herba ipsa, apud vulnerarios tantoperè celebris, Gallicè *Verge d'or*. Initio folia per terram spargit, longa, latiuscula, perſicæ foliis latiora, tenuia, tantillum crenata, costi hortensis modo, multò angustiora, inter quæ prodit caulis tenuis, gracilis, leuiter rubescens, cubitalis & sesquicubitalis, foliis similibus vestitus, sed minoribus, qui circa summum in multos ramulos finditur, confertim floribus luteis siue aureis ornatos, tandem in auras euanescentibus, Consolidæ Sarracenicæ modo: radice fusca, fibrata. Nemorosis & saltuosis opacis Germaniæ, Galliæ, Angliæ copiosissimè prouenit. Augusto mense floret. Vis eius adstringendo efficax, sed siccando multò efficacior. Chirurgi iis fœliciter exhibent, quibus intrò inflicta sunt vulnera, & ad fistulas. Est enim glutinandis vulneribus, & vlceribus tam externis quàm internis, atque sanguini sistendo efficacissima. Arnaldus hanc summoperè laudauit ad vrinam ciendam & ad calculos exterendos. Pota alui fluxiones cohibet, & clysteribus infusâ. Eius decocto sanantur oris vlcera, firmaniturq; dentes. Item gargarizata anginam & cū mellæ inflammationem arcet, & faucium morbis medetur. Verbasci genus quidam

VIRGA Aurea, Matth.




VIRGA Aurea, Dodon.



HERBA Aurea, Pena
& Lobellij.

DOREA, Sive herba Aurea
Narbonensium, Pena.



VIRGA Aurea altera, Lobel.



esse volunt. Aliis est Leucophragis Plinij, & Herba scripta Anguillara, à conspersis quibusdam notulis locis, nonnullis potissimum conspicuis. Huic attexenda Herba Aurea Narbonensium, vulgò l'Herbe doree, foliis Limonij aut Lapathi, flore luteo tripolij. Radix ei parua pro plantæ magnitudine, radici ellebori albi par, capillamentis & fibris, & toto habitu similis: caulis rectus, procerus, circa quem, vt & à radice, numerosa exeunt folia, longa, crassa, rigida in imo angusta, in medio palmæ latitudinem æquantia, intensæ viriditatis, extantibus in eis transversis & purpurascensibus nervis: flores sunt in summo caule in ramulos diuiso senetionis aut tripolij marini in pappos abeunt. Sapor, odor radici & foliis aromaticus & medicatus, Angelicæ siluestris, & nonnihil nitroso gustu minime acri. Plurimū hac vtuntur vulnerarij, & eam plurimi faciunt Medici quidam. Quæ coniectura ceteris congruentibus notis, magis persuadet esse Theophrasti Chironium, Lapatho simile, aut certe vnum

eorum quæ ad Theophrastum Plinius retulit, vt Pharnaceum. Galloprovinciæ & Narbonæ annis non admodum rapidis, & iisdem natalibus quibus Limoniū gaudet: vnde in hortis Belgij & Angliæ trāsata fuit. Hæc Pena Priori Virgæ aureæ similis est Virga aurea altera Lobellij serrato foliolo, & tantopere illi effigie totoq; habitu conuenit, vt neutram ab altera discernere queas, nisi magnitudine & foliorum

& foliorum diuifura: affurgit enim procerioribus duplò caulibus, maioribus, magis ferratis foliis. Belgis hortensis est, Italoq; semine orta putatur.

HERBA TRINITATIS,

CAP. XXXIIII.

Nomina



RAECIS & Mauritanis incognita videtur fuisse hæc quæ hodie ab Herbariis Hepatica, quòd hepaticos iuuat, & Herba trinitatis à foliorum figura nominata est, & Hepaticū Trifolium, Gallis *Hepatique*.

Forma.

Folia fert ampla, in tria diuisa, trifolij acetosi foliis haud abfimilia, sed maiora, longis pediculis appensa, auersa parte Cyclamini modo subpurpurea, aduersa albis quibusdam maculis respersa. Cauliculos emittit tenues, in singulorum verticibus primo statim vere flos emicat caruleus, è quò capitulum exoritur echinata specie, in quo semen oblongum, subcaruleo colore. Radicibus nititur numerosis, tenuibus, nigris vel subrubentibus. Locis prouenit vliginosis, & inter fruteta: gaudet enim opacis. Probatum maximè à recentioribus medicis ad vulnera glutinanda tam foris illita, quàm intus sumpta: item ad enterocelas, in quem vsum puluerem dimidij cochlearis mensura ex vino austero propinant. Tota planta decoquitur in vino eodem ad columellæ fauciumq; inflammationes. Refrigerat enim

Locus.

HERBA Trinitatis,
Matthioli.HEPATICA Polyanthes,
Lobellij.

siccatur & roboratur. Quare aduersus intemperies calidas, & inflammationes hepatis & febrium calores perutilis. Huius flores colore variant, aliàs carulei purpurei & quandoque niui. Nonnunquam etiam folia maiora maculis notulisve variegata spectantur. Alia Hepatica Polyanthes cognominata à Lobellio exhibetur, floribus in purpureo caruleis multiplicibus stipata peregrina elegantia. Alioqui folia, radix superiori haud abfimilia. Hæc Lobellius.

GERA

GERANIVM, CAP. XXXV.

GERANIVM EPANION Græcis, Latinis similiter Geranium, Gruina & Gruinalis aptissima similitudine nominatur, quòd in eius vertice fastigia confurgant nutantia capitulis Gruum cum rostellis similia, in quibus semen occluditur. Diuersæ species diuersa fortitæ sunt nomina. Dioscorides duo duntaxat tradit Geranij genera: sed cum multis Europæ regionibus tres quatuorve alia differentia, Dioscoridi, & fortassè priscis aliis ignota copiosè proveniant: quibus ob rostrata semina rostrati capitis gruini referencia effigiem, herbarij meritò geranij nomē indiderint, de omnibus hîc dicemus. Ac primùm de iis duobus quæ à Dioscoride prodita sunt, non ut reliqua passim obuia. Primum, inquit, folium habet anemonæ simile, fissum, longius, radicem subrotundam (alia exemplaria & Oribasius habet *τρογύλον*, idest, rotundam) dulcem, quæ editur. Hoc Geranium Ruellius esse putat, quod Acus pastoris, Acus muscata, Rostrum ciconiæ, & Rostrum gruis hodiè Officinis & Herbariis dicitur, Gallicè *Bec de cicogne*. & *Bec de grue*, Germanicè *Storkenschnabel*. In eadē sunt sententiâ Fuchs. Dodon. Sed cum huic radix mali modo rotunda non sit aut subrotunda, nec folia anemones, alij aliud atque aliud exhibent. Matthioli quidem ubique Ruellij sententiam insectatur, scribitq; primum Dioscoridis Geranium in Ananiæ vallis agro & passim ferè provenire, foliis anemones modo laciniatis, floribus in purpura albicantibus, è quibus gruum capitula prodeunt, radice alba, ferè rotunda ac dulci. Verumtamen prima Latinorum commentariorum editione, Geranij primi pictura nullū aliud exprimere videtur, quàm Acum pastoris, siue Muscatam, Ruellij, Fuchsij, Dodonæi Geranium primum. Postremis verò editionibus posita nihilominus superiore Geranij primi descriptione, aliquantò post longè aliud Geranium describit ac depingit his verbis. Primum Dioscoridis Geranium folia gerit anemones, longioribus tamen diuisuris, in vnoquoque folio senis. Caulem mittit ab ipsa radice rectū, tenuem, geniculatum: flores è geniculis in caule prodeunt punicei vnà cum foliis, rosarum ferè figura, sed longè minores, qui quinque tantum foliis constant, è quibus rostellâ oriuntur, inferna parte lunata. Radice rotunda nititur, nuce pontica maiore, subnigricante, & dulci sapore prædita. nascitur incultis locis. Copiosum in Dalmatia provenit. Cui delineationi

Nomina

Li. 3. ca. 114.

Genera.

Geran. I.
Dioscor.

Forma.

Li. 3. ca. 62.

Ca. 76. hist.
Lib. 1. ca. 31.

In cap. 114.
lib. 3.

GERANIVM I. Matth.



GERANIVM I. quorundam, Dalechampij.



GERANIVM II. Diosc.

III. Matth. Pes Columbinus.

Pena in
Aduerf.GERANIVM Tubero-
sum, Dodon.Geran. II.
Diosc.
Ibidem.
Pet. Pen. in
Ad.

Ca. II. li. 3.

pictura quam apponit, prorsus respondet. Alij id pro Geranio primo Dioscoridis habēt quod in maritimis, circa Tolonem & Antipolim Galloprovinciæ oppida nascitur, radice rotunda, pruni aut exigui mali magnitudine, intus candida, cortice crasso vestita, è nigro rufescente, plurimis villis & tenuissimis capillata, ex radice capite prodeuntibus, longiusculis, rufis: foliis aquilegiæ, minoribus, longo & gracili pediculo nixis: caule dodrantali, foliolis tribus media parte cincto, cætera nudo: flore puniceo, elegantissimo, foliolis multis radiato, apicibus intus nigris. Pena bulbosum & paruum Geranium primum Dioscor. describit radice pallida, subliuida, rotunda, sapore insipido, insulso & vesco: foliis in longis petiolis ab vno centro quinque partitis, diuisura Geranij Robertiani: floribus non ita intense purpureis: rostellis multis, Oeniponti à se visum, rarum in Gallia & Italia. Geranium primum radice tuberosa aliter depinxit Dodonæus, & vt opinor, fidelius quàm Matthiolus. Folia huius vt ranunculi, in multas finduntur lacinias: ad anemones folia accedunt, maiora tamen, & profundioribus incisuris dissecta: cauliculi tenues, ramosi, in quibus flores quinque: foliorum, exiguas rosas mentientes, diluti ruboris, oblongum, tenuem, acuminatumq; instar rostri gruis fructum post se relinquentes, vnde nomen: radix crassa, rotunda, & tuberosa non absque fibris nonnullis. Geranium alterum Dioscoridis cauliculos habet tenues, lanuginosos duorum palmorum altitudine, folia malvæ similia, & in summis alis eminentias quasdam rursus spectantes, veluti gruum capita vnà cum rostris, aut dentes caninos. Geranium istud secundum Dioscoridis, Fuchsij, Dodonæi & aliorum sententia, idest quod Geraniū columbinū, & Pedem columbinū vulgus vocat, Galli *Pied de pigeon*. Germani *Tanberfusz*. Nam caules tenues, rubentes, à radice statim lanuginosiq; obtinet, folia malvæ minoris, candidiora, vel fanicula, circinata, senis octonisve incisuris laciniata, flaccida: flosculos subpurpureos, capitella gruini capitis modo rostrata, radicem tenuem & oblongam. Matthiolus non dubitat

Geranium secundum Dioscoridis eam esse herbam, quæ Pes columbinus vocatur, quod nullis prorsus reclamantibus notis hæc illi respondeat: eamq; pro secundo Geranio, prima commentariorum editione depinxit. Idem in postremis editionibus initio confirmat, deinde hæc subiungit. Aliam ab his (primo scilicet Geranio & Pede

*GERANIVM Aliud,
secundum, Matth.*



*GERANIVM Tertium
Plinij, Acus muscata.*



cigogne. Folia etenim fert myrrhidis aut cicutæ, minoribus tamen diuisuris, humi iacentia, quæ senescencia rubescunt: cauliculos multos, breues, rotundos, graciles, teneros, subpurpureos, hirsutos, præsertim cum adulti sunt: flosculos in summo venustos, purpureos, stellæ figura, deinde capitula gruum aut ciconiarum

& Pede columbino.) Geranij plantam vidimus in multis hortis ac viridariis satam, foliis rotundis, secundi Geranij modo per ambitum laciniatis, maluam magnitudine æquantibus, fructu gruinis capitulis simili. Hanc herbariorum nonnulli Momordicam nuncupât quemadmodum & balsaminam: alij eodem nomine vocant, eamque cæteris præferunt in potionibus ad interna vulnera glutinanda. Hæc mea quidem sententia, inquit, magis respondet alteri Dioscoridis Geranio, ut quæ foliis ad maluam propiù accedat. Quare & hanc magis eandem esse cum illo putauerim. Verumtamen haud eam inficias quin Pes columbinus idem sit geranium: sed id quis rectiùs fortè geranium minus dixerit. Paulò post geranium illud secundum aliud à Pede columbino ita describit. Secundum foliis est maluæ minoribus, ped culis tenuibus, longis & subrubentibus appensis: caulibus gracilibus, flexilibus, rotundis: floribus puniceis, ex quibus acuminati apices oriuntur gruinis capitibus similes. Radicem habet tenuem, palmarem & fibrosam. Nascitur secus itinera, locis incultis, ac etiam in hortis. Idq; secundi geranij nomine appinxit, quod prima eorumdem commettariorum editione pro tertio posuerat. Duobus Græcorum geraniis Plinius tertium Latinorum geranium videtur addere, his verbis. Geranium aliqui Myrrhin, alij Myrrhica appellant, similis est cicutæ, foliis minutoribus & caule breuiore, rotundo, saporis & odoris iucundi. Nostri sic eam tradunt. Græci foliis candidioribus paulò quàm maluæ, caulibus tenuibus, pilosis, ramosam ex interuallis, binum cubitorum. & in his folia, inter quæ in cacuminibus folia sunt gruû. Alterum genus foliis anemones, diuisuris longioribus, radice mali modo rotunda, dulci. Geranium Latinorû etsi myrrhis, Plinio auctore, à quibusdam nominetur, tamen à Dioscoridis myrrhide differt, cuius historiam Plinius etiam alio loco tradidit. Sed Matthiolus cum quibusdam aliis rectè cæset esse, id quod à Fuchsio & Dodonæo pro primo Dioscoridis geranio positum fuisse diximus, & rostrum ciconiæ, Acû pastoris & Muscatam appellatum, Gallis *Bec de*

Li. 26. ca. 11.
G. ran. 3.
Plin. j.

Li. 24 c. 16.

Forma.

HERBA Roberti. Geranij
IIII. genus, Maith.

Ca. 14. li. 3.
Gera. IIII.
Herba Roberti.

Forma.
Fuchf. cap.
76. Histor.
Pet. Pen. in
Aduerf.



GRVINALIS, Dodon.

Geran. V.
Gruinalis.

Forma.



Gera. VI.
Hamatod.
Forma.

Li. 4. ca. 32.

Gera. VII.
Batrach.

terna quaternave simul cum rostellis, longitudine acus: vnde Acus pastoris nomen, & muscatæ ab odore iucundo, vt ait Plinius, cicutariæ vera aut myrrhydis: radix est digitum longa, rotunda, candida, dulcis. Id pro tertio Geranio pinxit Matthiolus in postremis commentar. editionibus. Huius Geranij species, eodẽ Matthiolo auctore, est herba geraniis etiam adnumerata, quæ à caulium, foliorum & florum rubro colore primùm Ruberta dicta est, deinde Herba Roberti, Herba Robertiana, & Geraniũ Robertianũ haud dubiẽ à superstitione aliqua Diui, qua superior ætas mirificè imbuta fuit, Gallicè *l'Herbe Robert*, Germanicè *Ruprechtskranz*. Cauliculos spargit multos, graciles, hirsutos, purpurascens, vel phœniceos, geniculatos: folia chærophylli vulgaris aut coriandri, siue pentaphylli, aut artemisiæ diuisura, sed profundiore, subhirsuta: flores multi in summo quinque foliolis constant, purpurei, circinati, qui defluentes rostratos mucrones aut acus ex latiore basi in rectum desinentes relinquunt, in quibus veluti siliquis paruis subhirsutis & subasperis pusillum semen includitur. Radix ex flauo viret. Hanc Matthiolus postremis commentar. editionibus quinti Geranij, Fuchsius & Dodonæus tertij nomine depinxerunt. Robertianæ species est quæ gruinalis & geranium gruinalis à Dodonæo nominatur. Germanicè *Kramchalfz*, cauliculis hirsutis, rubentibus: floribus purpureis, capitellis gruini capitis instar rostratis, superiori similis. Floribus maioribus duntaxat differt, & foliorum altioribus incisuris. Radix eius est intus candida, foris sublutea. Fuchsius & Dodonæo quartum est geranij genus. Tertia item Robertiana cauliculis multis, teneris, nonnihil hirsutis, foliis altiùs insectis, floribus purpureis, capitellis gruini capitis formam referentibus, secunda Robertianæ similis est, præterquam quod huius tertiæ caules proceriores sunt & longiores, folia maiora, flores item maiores, roseo colore & ambitu: radix sanguineo intus & foris colore, à quo geranium hæmatodes à quibusdam, & à Germanis *Blutwurtz*: radix sanguinea, aut à mirifica eius in sistendo sanguinis profluvio facultate. Periti quidam herbarij hanc tertiam censent esse Dioscoridis Achilleam sideritum, tum quia descriptioni quadret, tum quia præter planè ea quæ Dioscorides eidem reddidit. Anguillara Panax Heracleum. Dodonæus quintum, Fuchsius sextum geranij genus faciunt. Aliud geranij genus quintum Fuchsi, sextum Dodonæi, quartum Matthioli in postremis commentar. editionibus, Batrachoides & magnum à foliorum figura & magni



GERANIVM *Fuscum,*
Lobellij.



& magnitudine, cæruleum à florum colore dicitur, à Germanis *Gottes gnad*, id est, gratia Dei, ab insigni in sanandis vulneribus effectu. Caulis similiter habet longos, rubentes, hirsutos, ramosos, aculeatos, qui copiosi à radice propagantur, & variè inclinantur atque huc & illuc procumbunt: folia cæteris maiora, rotunda, fissa, per amplius, multisq; diuisuris, ex pediculis glabris, pluribus ab uno caulium internodio ortis: flores cæruleos vel violaceos, qui cum deciderint gruina, vt in cæteris, prodeunt capitula cum rostellis crassioribus quàm superiorum, in summitate triplici apice coronæ instar fisis, nonnihil inflexis, cum iam præ ætate marcidi deorsum nutant flores: radicem cæteris crassiorem, longiorem, robustioremq; multis radiculis fibratam, colore rufescente, lignosâ intus materie. Lobellius tradit alterum esse Geranium Batrachoidi cognatum, quod prolixiore serpit radice, flexibus variis in obliquum & cespitem summo sparsâ, rufescente, subtus fibrata, geniculata & odorata, digiti parui crassitudine. Folia Saniculæ rotundiora, aut Geranij Batrachoidis, albida, nonnihil incana, pediculi & flosculi purpurei violacei, alterius minores. Angliæ & Belgij hortis inquilina. Huic Geranio longius radicato & Saniculæ figura, simile est geraniû fuscû ab eodẽ Lobellio descriptû his ferè verbis. Folia illi quâ Geranio supradictõ maiora, maculis fuscis pullisve nigricantia. Ineunte æstate pereleganti flore liuido purpurascente, medio

diora, aut Geranij Batrachoidis, albida, nonnihil incana, pediculi & flosculi purpurei violacei, alterius minores. Angliæ & Belgij hortis inquilina. Huic Geranio longius radicato & Saniculæ figura, simile est geraniû fuscû ab eodẽ Lobellio descriptû his ferè verbis. Folia illi quâ Geranio supradictõ maiora, maculis fuscis pullisve nigricantia. Ineunte æstate pereleganti flore liuido purpurascente, medio

GERANIVM *Batrachoides*
alterum longius radicatum, Lob.

GERANIVM IIII.
Matthioli.



GERANIVM VI.
Matthioli.



Locus.

ris siue mofcata in ruderibus, circa sepēs, secus itinera, saxoso & extenuato solo. Geranium Robertianum in umbrosis locis & dumetis, in ruderibus parietinis, & fuggundiis tectorum, deniq; in segetibus & aruis. Secunda Robertiana in agrorum limitibus & iuxta sepēs. Tertia, locis montosis & saxosis. *Batrachoides*
in pratis

candicante, reflexo, cauliculis pedalibus, multis, exilibus, alis donatis fruticat, & propagines fundit e radice oblonga. In hortis Belgij viget. Hæc Lobellius. Matthiolus in postremis commentar. editionibus sextum idq; novum geranij genus cæteris addidisse se putat, foliis *althææ* proximis. Sed cum in eodem commentario plantam hanc in hortis sibi visam, & herbariis quibusdam momordicam nuncupatam dixisset, & pro secundo Geranio Dioscoridis pinxisset, ad eiusdem commentarii finem tanquam rerum incertus vel oblitus, eandem, quasi alterius generis planta foret, ut Calzolarij donū, pro sexto Geranio describit & appingit. Folia illi *althææ* proxima, caules multi, læti, hirsuti, geniculati: flores parvi, rubentes balautij seu cytini figura, e quibus grœna prodeunt capita, rostro ut in cæteris acuminato. Radix sesquidodratalis, digiti crassitudine, quæ humo tenus rubescit. Hæc Matthiolus. Geraniū hoc vocant Pena & Lobellius *μαλακοδὲς*. Geranium columbinum cultis & incultis passim inodorum provenit. Acus pasto-

in pratis. Acus pastoris inter initia veris Aprili mense floret. Pes columbinus, Robertiana prima, & secunda Maio mense florent. Geranium hæmatodes & Batrachoides Iunio & Iulio mensibus. Geranij primi radix, auctore Dioscoride, pota in vino, vteri inflationes dissolvit. Eadem radix, tradente Plinio, reficientibus se ab imbecillitate vtilissima. Bibitur contra phthisim drachma in vino cyathis tribus bis die. Item contra inflationes, quæ & cruda idem præstat. Succus radices auribus medetur. Opisthotonicis semē, drachmis quatuor, cum pipere & myrrha potum. Rursus, Radix è geranio peculiariter secundis, inflationibusque vulvarum conueniens. Geranium secundum inutile esse scribit Dioscorides. Galenus vtrumque omisit. Paulus verò Dioscoridem secutus eadem planè de vtroque tradidit. Sed si secundum Dioscoridis geranium sit pes columbinus, posterior ætas quotidiana experientia in sanandis vulneribus ac fistuliseius ac reliquorum etiam mirum esse effectum comperit. Quare eas herbas his ipsis in potu mirificè conferre tradunt. Antiquus quoque herbarius prædictorum geraniorum folia, magnam vim obtinere in glutinandis vulneribus, & articulorum doloribus leniendis tradit. Peculiariter pedem columbinum balneis perutilem asserunt practici: ad ventris tormina vtilissimum esse certum est. Acus moschatae radicem mouendi vrinam facultatem habere ait herbarius ille: ideòque calculosis, stranguria & difficultate vrinæ laborantibus prodesse. Robertiana vulneribus perefficax, quod docet sapor adstringēs, non ingarti odoris, ad mamillarum, pudendorūmq; vlcera sananda mirificè conducit. Nullum ad sanguinem vndecumque emanantem compescendum præstantius Geranij genus, quàm tertia Robertiana, ob id sanguinaria radix dicta. Geraniū batrachoides dictū adeò vulneribus efficax est, vt inde Gratiæ Dei nomē inuenerit.

Tempus.

Lib. 3. c. 114.

Vires.

Lib. 26. c. 11.

Ibid. cap. 15.

Fuch. c. 76.

Pena in Ad.

STELLARIA, CAP. XXXVI.



Æc vulgò ab herbariis Leonto podium, id est, Pes leonis, & Planta leonis, à foliis instar leonini pedis latis, & rotundis, nominatur: minime verò est Dioscoridis Leontopodiū, id quod ex descriptione constat. Dicitur & Alchymilla, quòd Alchymistarum præconiis celebra-

Nomina

STELLARIA.



ta sit, Drosiū à Cordo, & à Germanis chirurgis Sanicula maior, quod sit illi, tum facie, tum viribus admodum affinis. Stellaria etiam à foliorum expansorum & florum figura, Gallicè *Pied de Lion*, Germanicè *Synan, Louentapen, & grofz Sanikel*. Folia huic ex pediculis hirsutis qui statim à radice exeunt rotunda, lata, senis pluriusve angulis quasi plicis distincta, serrata, antequam erumpant vnà sæctæ, & conuoluta, diapsisæ haud absimilia, sed multò minus altè incisa, seu malux, virentia, polita, duriora, inter quæ cauliculi exeunt, hirsuti, sesquipalium & pedem alti, albi, rotundi, in quorum verticibus flosculi stellati, ex herbido lutei racematim cogeruntur: in siliquulis herbidis semen luteum, exile, portulacæ vel papaueris, radix est crassa, digitum longa, foris nigra, fibrata umbrosa, montosa, & rigua editiora, vt prata amat. Maio mense erumpit, Iunij initio floret: folia & radix adstrictione vehementi participant, atque adeò efficcant, minus calida quàm fanicula, quare vulneribus, si inflammationis suspitio desit, ad-

Forma.

Locus.

Tempus.

Temper.

Vires.

modum opportuna, non solum externis, sed etiam interioribus, atque etiam sinuosis ulceribus. Eam ob causam Germani Chirurghi miris eam laudibus celebrant, & potionibus vulnerariis admiscunt, decocto eius omnia vulnera lauant, linteam quoque in eo madefactum imponunt. Mulierum mammas impenſe laxas linteam decocto eius intinctum & impositum duras solidasq; efficit, præferim hypocistide, equisetis, alumine, & rosas siccis admixtis. Arida pulvis in suo ipsius decocto aut stillatitia aqua sumptus, ramices intestinorum in pueris potissimum sanat, tanta eius in glutinando vis est. Datur idem pulvis ex vino, aut iure, cochlearis mensura, quindecim aut viginti diebus iis quibus adempta sit concipiendi facultas, à nimia veteri humiditate, ob quam injectum semen contineri non potest. Stillatitia aqua pota, tum in vuluam injecta, alba mulierum profluvia mirifice sistit, adeo ut eius quoque diutina iniectione corrupta ab incorrupta vix dignosci possit constrictis valde locis, quod tum citius, tum efficacius præstatur, si decocto eius semina infideant.

BETONICA, CAP. XXXVII.

Nomina



Ἐξ ὧν Græcè, Betonica, Vetonica & ferratula Latine: Officina Betonica nomen retinuerunt. Dicitur etiam ψυχρόσπον, quoniam frigidis in locis reperitur. κέσπον autem à floribus spicata & mucronata acutius veruculum, seu, ut apud Plinium in vulgaribus exemplaribus legitur, viriculus præferente, sic enim ille cestrum interpretatur. Encausto, inquit, pingendi duo fuisse antiquitus genera, cera, & in ebore cestro, id est, viriculo. Et paulo superius dixerat. Penicillo pinxit, & cestro in ebore. Suidas quoque cestron dixit genus esse teli bello perfico inuenti. Sophocles etiam cestron dixit prostimulo siue stylo.

Lib. 35. ca. 11.

Lib. 25. c. 8.

Lib. 7. sim.

Lib. 5. de san.

Betonica, eodem Plinio auctore, ab inuentoribus Vetonibus Hispania populis, Arabicè *Chastara*, Gallicè *Betoine*, & *Betoesne*, Germanicè *Braunbetonik*. Galenus uno loco cestrum & Psychotrophon Romanis Betonica dici scripsit. Alibi tamen cestrum à Betonica distinguere videtur, & cestrum quod apud Gallos nascitur, sarxiphagum vocari ait. Verba eius hæc sunt.

ἐπεμβαλλεται δὲ τὸ ὄνιον πρὸς στέλνον, καὶ μὴ νοὶ ἀρκεῖ τοῦτο τοῖς ἀρθεῖταις. ἐπὶ δὲ τῶν λιθιῶν, & τῆς βετονικῆς τὸ πὸς μὴνυται, καὶ κέσπου τοῦ παρὰ τοῖς κέλαις γενναμένου. καλῶσι δὲ τὴν βοζάνην ταύτην σαρκίφαγον. Id est,

Lib. 4. c. 30.

Lib. 7.

Genera.

Coniicitur autem in vinum petroselinum, atque id solum articularibus satisfaciat: iis verò qui calculo laborant, aliquid Betonica & cestri quod in Galliis nascitur. Vocant autem herbam eam sarxiphagon. Apud Aëtium quoque locus hic trans-

Lib. 4. c. 1.

Forma.

scriptus ita legitur ἐπὶ δὲ τῶν λιθιῶν καὶ βετονικῆς μὴνυται, καὶ κέσπου τὸ τῆς καλῶμενης σαρκίφαγον. Ex quibus colligitur non solum Latinorum Betonicam, sed etiam Galorum Sarxiphagō, Cestron nominatum fuisse. Paulus perspicue duplicem Betonicam statuit: Vnam ramulis exilibus, pulegio similibus, sed tenuioribus, & prope modum, si gustes, nullam qualitatem referentibus, nascentem potissimum petrosidis locis, qua in renum medicinis vtuntur. Alteram Romanorum betonicam, quam Dioscorides nominat cestrum, alij psychostrophum, eo quod frigidis locis gaudet, quæ nihil simile cum prædicta habet, præter vires, & facultatem, &c. Hæc Betonica, ut describit Dioscorides, herba est caulem ferens tenuem, cubiti altitudine aut etiam maiorem, quadrangularem: folia longa, mollia, quernis similia, per ambitum fissila, odorata, ad radicem maiora. In summis caulibus semen est, thymbra modo spicatis. nam apud Dioscoridem ἐσαχνομένον. sub. καυλῶν, legendum est, non ἐσαχνομένον. sub. σπέρμα: radices subsunt tenues velut ellebori. De eadem sic breuiter

Lib. 25. c. 8.

Plinius. Verones in Hispania (inuenerunt) eam quæ Betonica dicitur in Gallia, in Italia autem ferratula, à Græcis Cestrum & psychotrophum, ante cunctas laudatissima. Exit anguloso caule, cubitorum duum, à radice spargens folia, ferè lapathi,

BETONICA.



thi, serrata, semine in summis caulibus, spicatis, thymbræ modo flore purpureo: sic prorsus legendum. Hæc est omnium consensu Betonica illius omnibus notissima delineatio, frequentissimi hodiè in medicina, & maximè varij vsus foliis longiusculis & latiusculis, ex atro virentibus, serratis, odoratis, inter quæ caulis erigitur, quadrangulus, rectus, pedalis, & cubitalis, asper, in summo ferens breuem spicam, floribus odoratis confertam, elegantibus, purpureis, deinde semen longum, nigrum, angulosum, radix albicat, multas spargens fibras ellebori nigri modo. Nasquitur in pratis, siluis, montosis, frigidis & opacis locis. Maio & Iunio mensibus floribus abundat. Calida & sicca est in primo ordine completo, aut in medio secundi, folia, vt tradit Dioscorides, carpuntur & siccantur plurimos ad vsus. Radices cum hydromelite pota pituitosam vomitionem prouocant, folia dantur ruptis, conuulsis, vuluæ affectionibus, & eiusdem strangulationibus drachmæ vnius pōdere, cum hydromelite. Ternæ in vini sextariis duobus

Locus.

Tempus.

Temper.

Lib. 4. c. 1.

Vires.

contra serpentium morsus ebibuntur. Herba ipsa illita venenatis moribus prodest, aduersus etiam venena drachma in vino pota conuenit. Hanc si quis præsumpserit, letale haustum venenum nihil nocebit. Vrinam cit, aluum subducit, medetur comitialibus, & furiosis cum aqua pota. Iocinoris & lienis vitiis drachmæ pondere cum aceto mulso pota succurrit. Concoctionem adiuuat, si quis à cœna eam fabæ magnitudine cum melle cocto deuorauerit. Eodem modo & acida ruētātibus propinatur, stomachicis eam manducare, & succum deuorare proderit, si postea dilutum vinum sorbeatur. Datur sanguinem excreantibus trium obolorum pondere, cum diluti vini egelidi cyatho vno ischiadicis, renum & vesicæ doloribus ex aqua: hydropicis autem binis drachmis, febrientibus cum hydromelite, non febrientibus cum mulso. Regio morbo laborantes recreat, menses ducit drachmæ pondere cum vino pota. Aluum purgant drachmæ quatuor cum hydromelitis cyathis decem pota cum melle tabidis, purulentis auxiliatur: folia cum inaruerint trita iētīli vase recunduntur. Easdem vires, & quasdam alias eidem Plinius assignat, his verbis, folia siccantur in farinam plurimos ad vsus, fit vinum ex ea & acetum stomacho, & claritati oculorum, tantumque gloriæ habet vt domus in qua fata sit, tuta existimetur à piaculis omnibus. Et aliquantò post. Moribus imponitur Betonica præcipue: cui vis tanta perhibetur, vt inclusæ circulo eius serpentes, ipsæ sese intorremant flagellando. Datur & ad ictus semen eius denarij pondere, cum tribus cyathis vini: vel farina drachmis tribus cū sextario aquæ, farina & imponitur. Obolis tribus in aqua contra purulentas, contraq; cruētās excreationes facit, faciles præstat vomitiones radix eius, ellebori modo, quatuor drachmis in passo aut mulso. Ischiadicos dolores & spinæ leuat eiusdē farina ex aqua mulsa. Aluu soluit drachmis quatuor, in hydromelitis cyathis nouem. Paraly sin sanare dicitur. Eadem torpentibus membris prodest. Ad lateris & pectoris dolores farina eius bibitur. Galenus vim habere incidendi scripsit, vt gustus indicat. Amariuscula enim est, & subacris herba, id quod ostendit particulatim edita eius actio. Nam consistentes in renibus calculos rumpit, pulmonem, pectus, & iecur expurgat, abstergitque: menses quoq;

Lib. 25. c. 8.

Ibidem.

Variis in locis.

Lib. 7. sim.

ciet,

ciet; & comitialibus prodest, tum rupta conuulſaque curat, & in omnibus bestiarum morſibus vlceri illita auxiliatur, postremò acidum ruſtantibus & ischiadicis pota auxilio est. Multò plures easque perexcellentes eius dotes celebrant alij herbarij, vt Apuleius. Scripsit & de iis proprium libellum Antonius Muſa clarissimus Augusti Cæsaris medicus, in quo hæc de ea memoriæ prodidit. Herba Betonica nascitur in pratis, & montibus mundis & opacis, circa frutices. Animas hominum & corpora custodit, & nocturnas ambulationes à maleficiis, & periculis. Loca sacra & busta à visis metuendis tuetur, & defendit: denique res omnino sancta est. Cestron vocatur, & Psychotrophon, siquidem frigidis reperitur in locis, radicibus tenuibus, thyrso pariter tenui, cubiti altitudinem excedente, quadrangulo, folia profert quercus, odorata: semen in summitate thyrsi spicati thymbræ modo. Pollet vniuersa planta dotibus ferè innumeris quandoquidem tusa, capitisque vulneribus illita, ea mira celeritate conglutinat. Præstat id tamen efficacius, si tertio quoque die iterum atque iterum imponatur. Aiunt præterea tam valentis esse facultatis, vt ossa quoque fracta extrahat. Radicum ex aqua decoctum ad tertias, fotu, oculorum doloribus medetur, quod item præstant contrita folia, & fronti superimposita. Succus à foliis per se tritis expressus, aut prius aqua maceratis, aurium dolores mulcet, si addito rosaceo in aures egelidus instilletur. Idem drachmæ pondere haustus in aqua calida cyathis quatuor sanguinem illum per inferna trahit, cuius redundantia caligines oculis offundit, quò fit vt etiam visum acuant comesta folia. Eadem cum salis momento contusa, naribusque immissa sanguinem inde fluentem sistit. Betonice decoctum ex vetere vino, aut ex aceto dentium dolores finit, si eo os sæpius colluatur. Herba ipsa ex tepete aqua pota suspensioſis & anhelosis maximè proficit, folia melle excepta tabidos iuuant, præsertim qui purulenta extulsiunt. Eadem tribus diebus continuis deuorata drach. quatuor pondere, aut ex frigida aqua cyathis quatuor ebibita ventriculi dolores mulcet, iocinoris verò, si ex calida hauriatur. Ex vino decocta lienis vitii medetur. Sanat & renū vitia ex mulſo bibita duarum drach. pondere: ex vino autē vetere trium drach. pondere, additis piperis granis septem & viginti: ad lateris lumborumque dolores vtilissimè bibitur. In duobus aqua calide cyathis sumpta, alui & intestinorum tormina remouet, si tamen à crudis non fiant succis, foliorum quatuor drachmis in aqua mulſæ cyathis octo epotis; commodè citatur aluus, sananturque iis ex vino sumptis coli inflammatione vexati. Betonica in eclegmate ex melle sumpta nouā diebus tussim sedat. Pota in aqua calida cyathis quatuor duarum drachmarum pondere, addita plantaginis drachma, febres quotidianas expellit, quod tamen in accessionibus tantum fieri debet. Idem præstat etiam in tertianis, si cum pari pulegio assumatur. Sanat ipſo quoque ordine etiam quartanas in quatuor aqua calida cyathis hausta, quatuor drachmarum pondere: addita mellis vncia calculi franguntur. Betonica ex tepete aqua feliciter bibitur hydropicis. Pariendi celeritatem adfert, vterique cruciatus à frigidityte conceptos mulcet, si ex calida aqua, aut mulſo duarum drachm. pondere propinetur. Contrita folia & illita præcisos glutinant neruos, & resolutos iuuant. Eadē trium drachmarum pōdere ex caprillo lacte sumpta tribus diebus, sanguinem ore reiectum cohibent: pari vini veteris mēſura, medentur ruptis, & ab alto deuolutis. Præsumpta, ebrietatem arceat. Ex vino frequenter hausta ictericos sanat: suillo adipi admista carbunculos curat. Pota ex aceto mulſo vnius drachmæ pondere viatoribus longo itinere defatigatis vires mirificè reficit: fastidia abstergit, & stomachicos recreat. Aduersatur venenis, & serpentium, & venenosorum, rabidorumque: quorumcumque animalium morſibus, non modò intus sumpta, sed etiam extra emplastri modo imposita. Cuniculosa sinuosaque sanat vlcera cum sale indita. Ex vino hausta menses ciet. Potu dolores podagricos lenit, præsertim radicum decoctum

potum, idemq; præstant cōtrita folia imposita. Hac Anton. Musa. In hac herba id observandum, radicem facultates longè dispare à foliorum & florum viribus, ut potè quæ multum stomacho orique ingrata, nauseam, rugitus, vomitumq; cieant, folia contrà odora, aromatica, & grato sapore nonnihil roborante, cibo & medicamento naturæ amica.

BISTORTA, CAP. XXXVIII.

BERBARI & Officinæ Bistortam appellant & Serpentariam, Galli *Nomina* *Bistorte*, Germani *Natterwurtz*. Bistortam quidem, quòd radice sit serpentis iacentis modo in se cōtracta & intorta: serpentariā verò, quòd ubi primum è terra erumpit, linguæ serpentis tenui pelle vestita formam obtinet. Sed diligenter cauendum ne hæc serpentaria cum Græcorum *Δρακονίς*, Latinorum Dracunculo siue serpentaria confundatur, quòd hæc ab illa forma & viribus plurimum discrepet. Quo verò peculiari nomine à veteribus Græcis medicis & latinis appellata sit Bistorta, inter herbarios nondum constat. Quidam

BISTORTA, Math.



BISTORTA, Maior.



Britanicā Dioscoridis ex foliorum similitudine & viribus iisdem esse contendunt. Lib. 4. c. 2. Quod si qui *μελάντερα* καὶ *Δασύτερα* folia obiiciant, aiunt illi, *μελάντερα* saturatiore esse colore, & quasi purpura nigricante, ut in viola martia, quam idem *μέλαναν* vocat, folia aduersa parte, idq; significari: *Δασύτερα* verò non hîc pilosiora intelligi oportere, sed rigidiora, densiora, & firmiora. Quod addunt radicem britanicæ *λεπτήν* esse, respondent alij Dioscoridem aut minoris Bistortæ radicem intellexisse, quæ non admodum crassa est, aut locum hunc à quopiam rei ignaro temerè immutatum, qui cùm radicem breuem legisset, *παχὴν* in *λεπτήν* mutauit: quia quæ sunt breues radices, sæpius sint etiam tenues, breuem verò esse videre licet cum lapatho aut minoribus collatam. Duo sunt herbariis & Officinis Bistortæ genera *Genera*. *Fuch. cap. 296.* Vnum, Bistorta maior, & serpentaria scemina, quibusdam Colubrina. Alterum Bistorta minor, seu Bistorta mas. Adiciunt quidam Bistortam minimam. Bistortæ maiori folia sunt longa, rumicis acuti simillima, *Forma*. aliquantò

aliquantò minora, non tam læuia, sed rigidiora & parùm rugata, ambitu paululùm sinuata, auersa parte cæsa, aduersa ex atro virètia: cauliculi teneri, glabri, tenues, pedales aut cubitales, rotundi, in summo spicati cum floribus purpureis, semine anguloso, fusco: radix longa, intorta, foris nigra & fibrata, intus rufescens, sapore glandis, nimirùm perquã austero, & adstringẽte. Huic minor & minima planè similis, nisi quòd hisce folia angustiora, læuiora, radix breuior, minórque, ac magis in sese conuoluta, & contorta, sine vllis fibris, foris fusca, intus ex atro rubescens, eodem quo maior sapore. Nascuntur locis montosis, vmbrosis & humidis. Florent mense

Locus.

Tempus.

Temper.

Vires.

Fuch. cap.

296.

Pet. Pen. in

Adu.

retinent, vomitum biliosum reprimunt, dysenteriam sanant. Efficacissima ad vlcera serpentia, & ad fungosa polyporum in naribus & palato interiore flagella absumenda aqua earum stillatitia, quæ etiam ad hepaticam sanguineamque resudationem plurimùm pollet epota.

CENTAVRIVM,

CAP. XXXIX.

Nomina

Genera.

CENTAVTÏPION Græcè, La tinè similiter Centaurium, Arabicè *Kanturion*, in Officinis Centaurea nominatur. Dioscorides, Galenus, Præteriq; omnes præci medici centaurij genera duo statuerunt, effigie & natura multùm diuersa. *κενταύριον τὸ μέγα*, Centaurium magnum, ab aliquibus dicitur, teste Apuleio, Maronion, Nession, Pelethronia, Limnites, Hemeroten, *αἵμα ἡρακλέους*, id est, sanguis Herculis, Polybidion & Vnesira, Arabicè *Kanturion Kibir*, siue *Sacurion habre*, in quibusdam Officinis non sine errore Raponticum. Alterum *κενταύριον τὸ μικρόν*, Latine Centaurium paruum, Limnesion & Limnæum, Libadion Plinio, febrifuga, fel terræ, multiradix, Arabibus *Kanturion sege & segir*, seu *kanturion sages*, Officinis Centaurea minor, Gallis *petite centauree*, & *siel de terre*, Germanis *klein Tansend*, Italis *Centaurea minore*, *Hetrusius Biondella*, quòd detergere, & fluos reddere ex lixiuio mulierũ capillos possit. Dictum est Cētaurium, teste Plinio, quòd eo Chiron Centaurus curatus sit cūm Herculis excepti hospitio tractantiarma, sagitta excidisset in pedem, quare aliqui Chironium vocant. Limnesiũ & Limnæum, quòd secundùm aquarum scatebras & paludes, quas Græci *λίμνας* vocant, nascatur, sic enim Dioscorides scribit. *κενταύριον τὸ μικρόν* (additur in vetere codice *κὶ λεπτόν*) *ὅτινες λιμναίων χαλᾶσιν, ἐπεὶ δὲ ἐν ἐνίοις φιλεῖ τὸ πᾶς*. Id est, Centaurium paruum & tenue, quòd nōnulli Limnæum vocant, quoniam humida loca amat. Ruellius,

Lib. 25. c. 6.

Lib. 25. c. 6.

Lib. 3. c. 7.

Lib. 25. c. 6.

Ibid.

Cornar.

Embl. 7.

lib. 3.

Ibidem.

Lib. 25. c. 6.

Cap. 1. lib. 9.

hist. & cap.

9. lib. eiusdem.

Centaurium limnesium aliqui vocauẽre, &c. Quæ cūm Plinius conuertisse videatur his verbis. Est alterum Cētaurium cognomine lepton minutis foliis, quòd aliqui libadion vocant, quoniam secundũ fontes nascitur, &c. pro limnesium & limnæum (quamquam hæc vox tolerabilior quàm Limnesium) libadion vox in Dioscoride reponenda videtur, quòd circa *λιβάδας*, id est, locos irriguos nascatur. Fel terræ propter summam quam habet amaritudinem: febrifuga, quòd febres pellat è corpore. Præterea Plinius Exacon Gallis dici Centaurium minus scribit, quoniam omnia mala medicamēta potum è corpore exigat per aluum, quæ vox Exacon an rectè legatur dubitari potest, & an Gallica sit, & non supposita ab aliquo ad Græcam formã ab *ἐξάγειν* efficta, his enim verbis sententiam Dioscoridis hanc expressisse videtur. *ἀφελήσῃσα δὲ καὶ πωνομένη ἄγει καὶ κοιλίαν χαλᾶσιν καὶ παχέα*. Id est, Decocta autem & pota, biliosa ac crassa per aluum ducit. His Plinius tertiam Centaurij speciem subiungit ex Theophrasto, quæ centauris & triorchis appellatur. Verba eius hæc sunt. Tertia est Centauris cognomine triorchis, qui eam secar rarum est vt non vulneret sese. Hęc succum sanguineum mittit. Theophrastus defendi eam impugnariq;

pugnariq; colligētes tradit à triorche accipitrū genere, à quo & nomē accepit. Imperiti cōfundunt hęc omnia, & primo generi assignāt. Sed Plin. ex suo, ipſius iudicio hanc tertiā speciē excogitavit contra Græcorū omnium sentētiā, qui, vt diximus, maius & minus duntaxat Centauriū, agnoscut. Et Theophr. de Cētauride nō vt de tertia aliqua specie scripsit, sed simpliciter centauridē nominavit, non triorchen, sic enim ait. φυλάτεια δὲ καὶ τὴν κενταυρίδα τέμνοντα, ῥορχην, ὥπως ἀΐστος ἀπέλθῃ. Quæ malè cōuertisse Gaza videtur his verbis, febrifugā quoq; secātes accipitrē tritigerū nuncupatū cauere, vt sine vulnere possint discedere. Videtur enim cētaurida Centaurium minus accepisse, quod febrifugam appellari diximus, cū aperte Plinius hanc ab illo distinguat. Postremò Plinius alios reprehendens qui succum sanguineū, & cetera primo generi assignāt, ipsemet errat. Primū enim genus succū sanguineum emittit, subrubente succo plena radice, vt Dioscorides scribit. Herbarij recentiores centaurij minoris duo genera faciunt, quæ foliorum duntaxat incisura differunt. Id quod ferratis est foliis Dodonæus depinxit, quo vireta Belgica

Cor. Emb.
7. lib. 3.

Lib. 9. hist.
cap. 9.

CENTAVRIVM, Maius.



abundant. Præterea centaurij lutei duo alia genera. Centaurium magnum describit Dioscorides foliis iuglandis, oblongis, colore viridibus vt in brassica, in ambitu ferratis, caule seu lapathi, duorum aut etiam trium cubitorum, qui à radice multas propagines habet, in quibus capita sunt papaueri similia, in ambitu oblonga, flos est cæruleus, semen cnico simile, ceu laneis quibusdam floribus inuolutum, radix crassa, solida, grauis, bipedalis, succi plena, acris cum quadam adstrictione ac dulcedine, subrubra. Codices quidam vetusti habent, ὁμοίος ὅ καὶ ὄχυλός ἐρυθρός, id est, similiter autē & succus rubet. Hanc Dioscoridis descriptionē declarauit Plinius his verbis. Folia sunt lata & oblōga, ferrata in ambitu, densa ab radice: caules ternū cubitorum, geniculati. In his capita ceu papauerū. Radix vasta, rubescens, tenera, fragiliq;, ad bina cubita, madida succo, amara cum quadam dulcedine (amaritudo, Cētaurij minoris radici potius cōuenit,) est enim alterius radix ex Diosc. δεμεία μὲν ποσὴς φύλλεως καὶ γλυκὴ τητος, id est, acris cum

Forma.
Lib. 3. c. 6.

Lib. 25. c. 6.

quadam adstrictione & dulcedine.) Nascitur in collibus pingui solo. Laudatissima in Arcadia, Elide, Messenia, Pholoë, & Lyceo, atq; in Alpibus, pluribūq; aliis locis. Dioscorides scribit amare solum pingue & apricum, ac siluas & colles. Copiosissima est in Lycia & Peloponēso, in Arcadia, Elide & Messenia, pluribūq; locis circa pholoen, Lyciam & smyrnam. Herbarij multi diligēter hodie colūt in hortis. Hoc Centaurium nihil aliud est quàm insignis illa planta cuius vastam radicē patres nostri rhaponticum esse crediderunt. Florer Maio & Iunio mensibus, Iulio semen profert. Alterum Centaurij maioris genus Clusius ostendit, quod folia habet oblonga. Armoraciæ similia, & ad Glasti foliorum similitudinem accedentia, non in particulas diuisa, vt vulgare maius, sed per ambitum duntaxat serrata, intenso virore & amariusculo sapore. Caules inter folia prodeūt cubitales aut ampliores, rotundi, in summo bifidi aut trifidi, scabra capita sustinentes, alterius Centaurij maioris æmula, & florem villosū, sed colore candicante, deinde semen Cnico ferē simile, seu potius alterius maioris. Radix crassa admodū, dura & longa, densa cor-

Locus.

Tempus.

CENTAVRIVM Maius
alterum, Clusij.



Temper.

Lib. 3. c. 6.
Vires.

tice tegitur, foris nigro, intus flavescente, succumque croceum refudante, qui cum quodam amaro aromaticus est. Supra Olyssiponem, lapidosi iuxta Tagum collibus duntaxat inuenit Clusius, vbi Lusitani Tagi accolæ Rapontis vocant. In Belgio peregrinum est. Dodonæus in Historia stirpium Rhæ, in Purgantium Historia Centaurium alterum magnum vocat. Calidum id succumque est ad tertium usque ordinem, simul & adstringens. Radix eius conuenit ruptis, inquit Dioscorides, conuulsis, pleuriticis, spirandi difficultati, tussi antiquæ, sanguinem spuētibus, non febrilentibus cum vino, febrilentibus cum aqua, ita ut radicis duæ drachmæ trita, similiter ad tormina & vteri dolores. Ducit etiam menses & fœtus, in collyrij formam derafa, & vtero apposita. Eadē succus præstat. Vulneribus prodest, humida quidem contusa, arida verò prius madefacta, atque ita contusa coniungit enim ipsa & glutinat. Quin & carnes dum coquuntur inter se committit, si quis ipsam contusam simul coquat. In Lycia succum ex ipsa exprimunt, quo pro lycio vtuntur. Quæ sequuntur quædam Dioscori exemplaria non habent. ἐνλήθη δὲ πανάκεια, ἐπεὶ διὴ πάντες τῆτα φλεγµαίνοντα πάθη παύει, καὶ χρυσµατα πολλῶν. Id est, Est autem vocata panacea, quod sanat omnes inflammatos affectus, ac vulnerum contusiones. Quibus Ruellius de suo quædam addit. Cognominata est, inquit, & panacea, quoniam medetur omnium morbis, vbi aliqua inflammatio timetur omninoque multis morbis opifera est. Illita vulnerum labra consolidat. ἡ φρεγγυρία τε παύει ἐν ἐνέµασι, καὶ λιγυῶντας, σωάγειαι δὲ τοῦτο ἡλὶς µέλαντος ἀνατέλλειν ὄρα ἀγνῆ, ὅτε πληρουῖται ἅπαντα. Quæ sic Ruellius. Stillicidia vrinæ calculosque sanat iniectione. Legeda præcipitur cum in eo sol est, ut emergat, hora pura, dum luce sideris erumpentis vniuersa complètur. Alij sic interpretati sunt. Legitur matutinis sole ad ortum spectante, hora diei pura, cum omnia complètur. Sic verò Andr. Lacuna. Colligitur autem hæc ad exortum solis, purissimo vere aduentante, quo tempore vniuersa cōplentur. Plinius centaurij huius maioris facultates easdem recenset, sed diuersis in locis. Vis in vulneribus tanta, ut cohærescere carnes etiam tradant, si coquantur simul. In vsu radix tantum duabus drachmis bibenda, quibus dicitur, si febris sit, in aqua trita, cæteris in vino, medetur omnium morbis decocta succus. Alij ouium legunt non omnium. Et medetur serpentium ictui centaurij maioris radix drachma in vini albi cyathis tribus. Eadem vuluæ doloribus potu fortius, prodest. Derafa verò & apposita extrahit partus emortuos: sanguinem reiicientibus medetur, stomacho & dyspnæa eiegmate, pleuriticis & peripneumonice bibitur, maiori centaurio tormina discutiuntur. Ruptis conuulsisque & ex alto deiectis datur. Vlcera quæ cacoëthe vocantur sanat in sparsum vel illitum. Oculorum aciem centaurio maiore putant adiuuari, si addita aqua foueantur. Galenus ex Centaurij contrariis in gustu qualitatibus contrarios eiusdem effectus colligit his verbis. Centaurij magni radix sicut gustu contrarias qualitates, ita in vsu contrarios effectus præstat. Gustu itaque acris simul adstringensque apparet cum leicula dulcedine. At in actionibus, acrimonia quidem caliditatis opera ostendit menses prouocans, & fœtum mortuum detrahens, viuumque corrumpens atque eiiciens. Ad-

strictio

Lib. 25. c. 6.

Lib. 25. c. 8.

Lib. 26. c. 15
6. 7. 8. 13. 14.

Lib. 25. c. 12.

Lib. 7. sim.

strictio verò opera crassæ terrenæq; frigiditatis cùm vlcera glutinet, & sanguinem reiicientibus proffit. Exhibentur autē eius drachmæ duæ febrientibus quidem cum aqua, non febrientibus cum vino. Porro secundum omniū simul qualitatum actionem ruptis, conuulsis, dyspnœæ inueteratæ tussi cōuenit. Nec enim in talibus euacuare solum quod præter naturam est, oportet, sed partem quoque euacuatam roborare. Vacuationi itaq; accommoda est acrimonia, vtique cùm non sola sit ac purra, sed aut dulcedini iuncta, aut certè non prorsum amaritudini. Siquidem vehemētiam hanc atque violentiam mixta illi temperata quædam substātia cuiusmodi est dulcis, non obtinebit. Porro ad ea quæ euacuata sunt, roboranda, contrahendæque, adstrictione est opus. Eadem quæ radix & succus ipsius efficit. Arabes, vt *Mesues*, Auicennas, Alcanzi vires maioris & minoris centaurij ferè contrarias cōfuderunt, vt dicemus. Datur Centaurij maioris radix, auctore Matthiolo, hydropicis, ictericis, & iocinorosis, tum vino macerata, tum in puluerem trita. Eiusdem recentis succus vnciæ pondere haustus, ac etiam vulneri illitus auxiliatur à serpente demorsis.

In cōm. c. 6
lib. 3.

CENTAVRIVM, Minus.



Centaurium minus hyperico aut origano simile est, caule anguloso, palmum excedente, flores è puniceo colore ad purpureum inclinantes, ad lychnidis similitudinem: folia parua, prælonga velut ruta: semen simile tritico: radix parua leuis, inutilis, gustu amara. Huic descriptioni multum lucis adfert Plinius his verbis. Est alterum Centaurium cognomine lepton, minutis foliis, quod aliqui libadion vocant, quoniam secundū fontes nascitur, origano simile, angustioribus & longioribus foliis: anguloso caule, palmum alto, fruticante: flore lychnidis: radice tenui & superuacua, succo efficax. Hoc Cētaurium nostri fel terre vocant propter amaritudinem summā. Id verū legitimūq; esse quod in Officinis passim vsurpatur, notius est quā vt probatione egeat. Propter lacus & rigua loca crescit auctoribus Diosco. & Plinio. Apuleio verò in solidis & pinguibus quoque locis. Floret æstate & Autumno, quo maximè tempore, quia semine prægnans est, colligitur. Herba recens contusa, inquit Dioscorides, & imposita vulnera glutinat, vetera vlcera purgat, & ad cicatricem perducit. Decocto & potu (legendum enim *πρωμὲν* non *καταπρωμὲν*, id est, si deuoretur) biliosa ac crassa per aluum ducit. Dococtum ipsius conuenientissime ischiadicis infunditur, sanguinem ducēs & dolorem leuans. Succus ad ocularia medicamenta vtilis est, purgans cum melle quæ pupillis tenebras offundunt. Idem subditus menses & fœtus extrahit. Epotus autem peculiariter neruorum affectibus prodest. Horum quædam Plinius tradit sparsim. Purgat aluum succus Cētaurij minoris drachma in hemina aquæ cum exiguo salis, & aceti, bilēmq; detrahit. Eiusdem succus potu totūque menses ciet. Articulis succus ex Cētaurio minore prodest, idem neruis vtilissimus. Succo eiusdem cum melle culices, nubeculas, obscuritatem discuti, cicatrices extenuari putant. Sed succi exprimendi modum Plinius nec rectè, nec perfectè tradidit. Quidam, inquit, caules concisos madefaciunt diebus xvij. atque ita exprimunt. Dioscorides contrā dilucidè & integrè non huius solum, sed omnium succorum extrahendorum rationem exponit. Galenus distinctiūs Centaurij minoris temperamentum & vires persequi-

Forma.

Lib. 25. c. 6.

Locus.

Tempus.

Vires &

Temper.

Lib. 3. ca. 7.

Lib. 26. c. 8.

15. 11.

Lib. 25. c. 12.

Lib. 7. sim.

tur his verbis. Centaurij minoris radix planè inefficax est, sed caulis eius extremus & folia potius quæ illic inhaerent, & flores vtiliora sunt. Vincit in eis qualitas amara, pallulum habens & adstrictionis, atque ob eiusmodi temperamentum, admodum exsiccatorium est medicamè, expers mordacitatis. Vlcera itaq; magnæ herbæ ipsius recentis illitu glutinantur, & vetusta, quæque ægræ ad cicatricem perducere queunt, cicatrice eodem modo ventibus obducuntur. Arefacta verò glutinatoriis & desiccatoriis miscetur medicamētis, iis scilicet quæ sinus & fistulas sanare possunt, veteresque durities emollire, tum vlcus maligna & cacoethe curare. Miscetur etiam iis quæ rheumaticis affectibus medentur, In quibus ea medicamenta præstantissima sunt, quæ vehementer desiccantia cum quadam adstrictione nullam habent mordacitatem. Decoctum herbæ quidam ischiadicis infundunt, ceu biliosa & crassa ducens: nam & talia purgant, quamquam cum adeo vehementer operabitur ut cruenta euacuet, tunc plus proderit. Succus porrò eius cum similibus sit facultatis, hoc est exsiccatoriæ & absterforiæ, &c. iam comprehensa pulchrè præstare potest: & cum melle oculis illinitur, menscæque acætum euocat. Sunt qui ipsum præbeant & iis quibus nervi affecti sunt, ut euacuet & desiccet innoxie quæ impleta sunt: quippe quum iocinoris quoque obstructiones optimè expediat, bonumque sit lienis indurati remedium foris impositum, nec secus si quis bibere sustineat. Extat liber de virtute centaureæ Galeno falso inscriptus, in quo permultæ & permagnæ eius facultates enarrantur. Mesues, ut diximus, temperamētum vtriusque Centaurij & facultates confundit, & vtrumque purgare pituitam crudam, & bilem scribit, sed minus magis, cui soli vis hæc à Dioscoride, Galeno Paulo tribuitur, nō etiam magno: sanguinem quidem vacuare, si clystere in ischiade iniicitur, Galenus minori tribuit. Datur Centaurij minoris decoctum vtiliter potadum tertiana febre laborantibus, quod bilem per inferna deiiciat, unde febrifugæ nomen. Idem aut succus iocinoris & lienis obstructiones ac durities tollit. Alui lumbricos pellit drachmæ pondere ex melle potus, tum vmbilico illitus. Herbæ comarq; decoctum lentigines, varos, al-

CENTAVRIVM,

Luteum prius.

Forma.



Locus.

phos, & cætera cutis vitia exteriora adhibitu, instillatur succus verniculosis auribus, quineriam illinitur cõtra papulas, & manantia capitis vlcera. Centaurium luteum radice nititur exigua, fibris crispis, tenuibus, candidis capillata. Caulis ei est sesquipalmum altus, rotundus, viridis, sed albo quodam veluti puluisculo pubescens, qui digitorum affricu facile deraditur: folia ex interuallis bina, aut potius vnicum binis apicibus vtrinque donatum, crassa, carnosæ, centaury minoris similia, latiora, non ita venosa, concauo alarum sinu lacunosa, & dispaci modo velut alueum efficientia, quo ros imberve contineri possit. Ex alueolorum medio furculi assurgunt nunc plures, nunc pauciores qui florem sustinent aureum, foliolis octo constantem. In asperis & saxosis gignitur. Tota planta gustu est amaro. Huic simile est caulibus foliisque Centaurium aliud luteum, hoc discrepans quod nullos furculos edat ut superius, quibus flores insideant, sed in summo caulis fastigio florem singularem mittit chrysanthemo similem. Iisdem in locis reperitur, eodemque est gustu. Est & Centaurium nothum in humidis Alpium vallibus proueniens, radice crassa, nigra, lignosa, huc illuc sparsa, intus alba, gustu amaro: caulibus multis, cubito altioribus, densa



densa lanugine obsitis, angulosis: foliis cannabis, vtrinque dissectis, in vno pediculo villosa & ferè cubitali multis, ordine collocatis, numero semper imparibus, ut ferè tredecim aut quindecim singulis sint pediculis, qua pediculi florem sustinentes è caule prodeunt, ipsum caulem vtrinque amplectentibus, & illic in longum & angustum diuisis, floris capitulo, scabiosæ vulgari simili, hirsutis erectisque squamis compacto, flore luteo.

FUMARIA,

CAP. XL.

FΑΨΙΝΟΣ Græcis, καπνιον & καπνίτης, Latinis Fumaria, potest & fumus & fumida dici, Arabibus Scheitergi, Officinis Fumus terræ, Gallis Fumeterre, Germanis Erantrauch. Dicitur Fumaria à flore Dioscoride, Galeno, Plinio, quòd eius succus oculis inditus veluti Fumus lacrymas moueat. Dioscorides vnus duntaxat, Plinius duorum Fumariæ generum meminit. Herbarij recentiores ad Fumariæ genus tres alias species referunt. Fumaria tradente Dioscoride, herbula est fruticosa, coriandro similis, valde tenera, foliis candidioribus, cineracei coloris, vndique numerosis, flore purpureo. Ea est Fumaria hodie multo vsu, & restibili fertilitate omnibus notissima, quadratis furculis, fruticosis, foliis plurimis, mollibus, teneris, ex viridi in cinereum pallorem languentibus, crebris incisuris: flosculis purpurascens, interdum albidis, interdum rubellis: semine minuto admodum, rotundo, virente ex fusco, radice singulari, paucissimis fibris. Nascitur in segetibus, hortis, vineis, sepibus & maceriis, aliisque locis incultis ac pinguibus. Plinius duas herbas capni nomine proponit. Capnos prima, inquit, quam pedes gallinaceos vocant, nascens in parietinis & sepibus, ramis tenuissimis sparsisque: flore purpureo, viridis, succo caliginem discutit. Itaque in medicamenta oculorum additur. Similis & nomine & effectu, sed alia est capnos, fruticosa, prætenera, foliis coriandri, cineracei coloris, flore purpureo, nascitur in hortis & segetibus hordeaceis, claritatem facit inunctis oculis, delacrymationemque

Nomina

Genera.

Lib. 4. cap. 15.
 Forma.

Li. 25. ca. 15.

Cap. 2. Pl.
Lib. 6. c. 15.
Forma

Tempus.

Ibid.

In cap. 11.
lib. 4.

Pena in
Ad.



FUMARIA Phragmites,
Dodonai.

Fumaria
lutea.

Forma.
Matth. in
cap. 109.
lib. 4.



Locus.

In cap. 109.
lib. 4.

cea fumus, vnde nomen accepit. Posterior vulgaris nostra & Dioscoridis, Galeni, Pauli, Fumaria est. Prior ex Dodon. sententia hinc depingitur quæ multis ramulis fruticat, teneris, in quibus folia numerosa, incisa, colore, sapore, & quadatenus forma alteri fumariæ similia, prætenera, viticulis & capreolis herba ipsa sepibus & vicinis plantis pertinaciter adheret: flosculi eius candidi, caruleo colore non nihil distincti: in siliquis parvis semen: radix singularis, longitudine digitali. Vere primo vt & nostra vulgaris prodit, Maio & Iunio utraq; floret & carpitur. Hæc capnos, inquit Dodon. Plinij imitatione, *Pied de geline* dici potest. Hermolaus *χελιδον φραγμαίτην* nominat. Certe Hermolaus in Corollariis hanc capnon Plinij Chelidonium phragmitem vocari ab Actio scripsit, ad exanitiones partium in iocinore curuarum vtilem dictam, vt putat: quoniam succo discutit caliginem vt chelidonium, & ob id in medicameta oculorum additur, vt in collyrium Marciani eam Chelidoniā capnitida cognominantis. Aliis Fumaria lutea siue mōtana, Illyriorum Splith, capnos seu chelidonium phragmites Actij creditur, quibusdā Galeni Corydalis. Crescit hæc planta foliis chelidoniij maioris, vel Fumariæ bulbosæ, sed minoribus multò, glaucis cineritiis, pluribus, sesquipalmaribus: cauliculis exilibus & pedalibus: floribus luteis, stellatis, chelidoniij minoris: radicibus numerosis, tenuibus, latis sparsis, subalbicantibus: semine rotundo, depresso, abro virente in corniculis Fumariæ bulbosæ, vel chelidoniij maioris, minoribus multo, cui admodum similis facie & colore est. Vnde rectè conicere videntur nonnulli, vt diximus, esse capnon chelidoniā Actij. In calidiorum regionum montibus Illyriæ, Dalmatiæ, Hetruriæ & Narbonæ provenit. Seriùs quàm Fumaria nostra, nempe Iulio & Augusto floret. Matthiolus cum legerit in nothis simplicium appellationib⁹ Dioscoridi ascriptis capnon quibusdā corydalion dici, & cum Galenus de Galerita scribens quæ Corydōs Græcè dicta valde colicis cōfert, herbæ meminerit quæ corydalis appellatur, magnæ quoque aduersus colicum dolorem utilitatis, quam facultatem Capno vulgari alibi minimè tribuit, suspicatus est aliam capni speciem hinc corydalim intelligi, nimirum Splith Illyricam capno congenerem, quam colicis valde prodesse sese expertum esse affirmat. Sed anceps valde & infirma est hæc ratio. Etenim nostras etiam Fumaria non instrenuè colicis opitularur, digerèdo ac discutiendo viscidam pituitam, eamq; è renibus eliciendo, quæ non



non rarò colici doloris speciem efficit. Quare aliis potiùs Corydalis videtur esse Fumaria bulbosa, ab effigie alaudæ auiculæ, cuius capitis galericulatum verticem emulantur flores cristati, turbinatæq; cornicula. Mollis in vniuersum planta est, quæ vere primo vnà cum chelidonio exoritur, & Maio, vel ad summum Iunio contabescit: tenellis subalbidisque foliis coriandro vel ranunculo primi generis proximis, laetore casio & diuisura ad Fumariæ folia accedentibus, maioribus tamen floribus purpureis, & aliquando albis, radice tuberosa, inferiore parte sessili, superiore monticuli instar elata, intus caua, nigro exteriori cortice, buxæ interiùs pulpa, odore aristolochiæ, gustu amara, semine pellucido in corniculis. In vmbrosis, decliuibus, & nemorosis saltibus frigidioribus nascitur. Martio & Aprili mensis floret. Hanc plantam herbarij quidam aristolochiam rotundam esse prodiderunt, eandemque etiam tanquam veram rotundam vsurparunt. Fuchsius minimè genuinam esse aristolochiam rotundam scribit, sed Plinij pistolochiam, ab illa multum differentem, vt scribit Matthiolus. Nam Plinianæ pistolochiæ radix, tuberosa & inanis non est, sed clematide tenuior, densis capillamentis, iunci plenioris crassitudine. Quare rectiùs veriùsque, inquit Matthiolus, dicenda Plinij Fumariæ genus alterum, quod his depingitur verbis. Alia est capnos fruticosa, prætenera, &c. At hanc Dioscoridis Fumariam & nostram vulgarem esse testatur hæc Plinij delineatio ex Dioscoride ita expressa, vt eius descriptionis verba totidè Latinis verbis perspicuè reddiderit. Addit Matthiolus eandem esse de qua locus sit Aetius in curatione obstructi iocinoris, vbi chelidoni capni meminit, quod vna cum chelidonio primum erumpit, hirundinum aduentu. Contra doctis aliis scriptoribus placere diximus Fumariam luteam siue môtanam & Splith Illyricam Aetij potiùs esse capnon chelidonium. Diuersum ab his omnis Fumariæ speciem pictam Doct. Myconus misit, & sic ferè delineauit, Eius folia sæpius humi sternuntur cinerea, multum ad Fumariam accedentia, maximè quæ in imo

Pen. in
 Aduers.
 Fumaria
 Bulbosa.
Forma.
 Matth. in
 cap. 4. lib. 3.

Locus.
Tempus.

Ca. 31. hist.

Li. 25. ca. 17.

Lib. 19. c. 2.

sunt: nam quæ in caulibus visuntur, tenuiora & fœnicularia sunt. Cauliculos profert multos, quadratos, cauos, geniculatos, surculosos, palmum altos, in quibus folia tenuia admodum, vt diximus. In horum fastigiis flores multi congesti sunt, Fumariæ similes, singulis candido, purpureo, luteo variegatis: radicem tenuem, candidam non profundam. Floret Aprili mense. Totius plantæ sapor subamarus est cum leui acrimonia. Cùm forma & ferè qualitatibus à Fumariâ non distet, Fumariæ genus ille putat esse, quamuis ab ea amaritudine vincatur, & hæc illam acrimonia superet. Vulgus etiam Fumariam vocat. Pæsîm in vinetis segetibusque pullulat. Eandem Clusius depinxit & descripsit Capni tenuifoliæ nomine. Inueniri ait in plerisque Hispaniæ regionibus in agrorum limitibus, & iuxta vias, nonnullisque Narbonensis Galliæ locis, præsertim supra Arelatem. Quidam in Hispania Sideritim tertiam sine ratione facere voluerunt. Vulgò à nonnullis *Palomilla*, & *Palomina* dicitur, quemadmodum Fumaria communis. Huic iungen-

Lib. Stirp.
Hispan. ca.
46.

FUMARIÆ Species.
Myconi.



CAPNOS Fabacea radice,
Penæ & Lobellij.



da Capnos alba latifolia, à Lobellio tradita Splith album quorundam. Floribus albis, & latioribus foliis in segetibus Cornubiæ, & siluosis agrorum marginibus Brabantiæ provenit: capreolis sepes arripit. Nec omittenda Capnos alia fabacea radice, cui singularis radix, & Fumariæ bulbosa radici Penæ par, sed minor, sine vlla cavitare. In Belgio, Germania, Sabaudia, vti Geneuæ, aruorum quorundam margines & sepes hac scatent. Nunc singularum vires declarandæ. Fumariæ succus, auctore Dioscoride, acris est, visum acuit, lacrymas ducit, vnde nomen habet. Illitus cum gummi euulsos palpebrarum pilos renasci non finit. Herba ipsa cum cibo accepta vrinas ducit biliosas. Eadem planè de posteriore sua Fumaria Plinius habet. Claritatem facit inunctis oculis, delacrymationemque ceu fumus. vnde nomen accepit. Eadem euulsas palpebras renasci prohibet. Et alio in loco. Capnon herbam, inquit, qui edère, bilem per vrinam reddunt. Galenus non alias ei qualita

Li. 4. c. 106.

Vires &

Temper.

Li. 25. ca. 13.

Lib. 26. c. 7.

CAPNOS *Alba*
latifolia, Lobellij.

ei qualitates viresque assignat his verbis. Acris simul & amara: qualitatē est particeps, neque tamen planē expers est acerbæ: quamobrē vrinam multam, biliosamq; prouocat, sanātque iocinoris obstructions & debilitates. Succus eius oculorum aciem acuit non parum trahens lacrymarum, velut ipse fumus: nam hinc ei appellatio indita. Plebeius quidam ea vti solebat ad stomachum roborandum, vnāq; ventrem lubricandum: siquidem herbam primum desiccata[m] condebat: cū[m] verò vti volebat, subductionis quidem gratia, melicrato aspergebat, roborandi verò causā vino diluto. Arabes verò multò plures easque insignes doses ei tribuerunt. Mesues, Fumaria inquit, in superficie calida est, in profundo frigidior, non absolute frigida cum quibusdam, sicca ordine secundo. Ab illa autem substantia calida (quæ semini maior inest) & amara & subacris, purgatoria, attenuans, obstructa aperiens. A frigida autem styptica constringendo ventriculū, hepar, & cætera viscera laxiora & molliora roborat. Quapropter ad actionem nullo externo

Li.7. simpl.

Li.2. simpl.
cap.14.

eget auxilio, cum per se purget ac roboret. Purgat verò bilem & vltos humores etiam ex venis: clarum ob id & purum efficit sanguinem. Quare mirè prodest morbis omnibus hos humores sequentibus, lepræ, scabiei, pruritus, impetigini, serpigini, & similibus cutis vitiis. Quia autem obstructa liberat, morbos omnes inde natos sanat, vt febres biliosas, putridas. Herba est innocens, quia tamen magna ubiq; copia luxuriat, vilescit. Florē est nunc subalbo, nunc cinericio, nunc pallido violaceo. Optima est viridis, tenera, foliis teneris, planis, non crispis, flore subviolaceo. Herba & succus eius veris initio sunt efficacissima: semen veris exitu. Quoniam verò imbecillius purgat, fortior euadet cum myrobolanis, senna, fero lactis vuis passis exacinatis, & illarum melle. Succus datur ab vncia dimidia ad vncias duas: pulvis à drachmis tribus ad drachmas quinque: decoctum ab vncijs decem ad vncias quindecim. Auicēnas frigidam esse primo gradu, siccam secundo statuit, & reliqua quæ Mesues, attribuit. Fumariæ luteæ siue Splith sapor ferme qualis vulgaris Fumariæ, efficacius tamen ea videtur crassos humores tenuare, & incisos per lotium educere, vnde laus magna ad hydropen: robur etiam addit visceribus, reliquæque præstat quæ Mesues de Fumaria vulgari tradit. Aetius, præclare, inquit, obstructione liberat simulq; firmitatē tum hepatis, tum stomacho addit Capnium, quod & chelidoniæ nomen inuenit, succo eius expresso, & desiccato: reponitur autem in pastillos coactus, & semel quidem exhibitus dolorem omnem tollit, ter autem datus in totum ab affectione liberat, præterquam quod & firmitatem visceribus addit. Decoctum quoque huius herbæ potatum similem vim habet, etiam si valde febri citent ægri: aliquando herba ipsa efficcatur, contusaq; & cribrata cochlearis mensura exhibetur.

Pet. Pen. in
Ad.

Lib. 10. c. 2.

Nomen.

Forma.



OCTIS Herbariis Denticulata hæc dicitur à radice velut è dentibus paruis coagmentata, paulatim gracilescere, albicantibus fibris capillata: ab hac cauliculi multi profluiti dodrantes, in quibus folia apij, siue potius fumarie luteæ, siue bulbosæ, in ambitu minimè

DENTICVLATA.

Locus.

Cap. 9. li. 4.



DENTARIA Maior,
Matthioli.

Ibidem.



ferrata. Flos non in folia explicatur ranunculi modo, sed vt in pimpinella, in capitula angulosa conglobatur, ex viridi subluteus: singulis capitulis quini ferè sunt flosculi, siue septeni, gustu amaro & subacri. Ad fontium scaturigines, riuulosq; prata rigantes, & in vmbrosis sepibus nascitur cù ranunculo nemorensi primo vere, statimq; perit. Sunt qui alabastritem vocent, ob radicis ferè pellucidæ ac nitentis splendorem, & candorem alabaistro similem: alij Moschatellam pratensem. Alia est à nonnullis Dentaria maior appellata, auctore Matthiolo, à quibusdam ἀφύλλος, quòd sine foliis proveniat. Nascitur in opacis siluis aut aliis vmbrosis locis. Germinat primo statim vere. Caules profert dodrantes, teneros, fragiles, succosos, orobanches æmulos, in quibus à medio ad summum flores exeunt in purpura albicantes, & hirsuti, foliolis eiusdem ferè coloris in latere concomitantibus: è floribus caliculi oriuntur, in quibus paruum concluditur semen pauperis modo. Radice nititur albicante, magna, succosa, fragili, ex compactili squamarum congerie, miro sanè naturæ artificio constans, gustu acerbo cum quadam amaritudine. Cordi Amblatum videtur esse. Aliam tradit Matthiolus Dentariam minorem, quæ Germanis Sanicula vocatur, & inter symphyti genera recensetur. Folia habet pentaphylli, maiora, radicem candidam, admirando naturæ artificio ex nodulis quibusdam & incisuris constructam, dentium speciem quandam representantibus. Dodonæus easdem plantas aliter depinxit & descripsit. Priori cauliculum dodrantalem tribuit, folia cannabæ aut Pentaphylli, quinque vni hærentia pediculo, oblonga, lata, in ambitu ferrata: flosculos leucois similes colore, ex puniceo subpurpureos: filiquas etiam quales leucois, in quibus semina: radice oblongam, inæqualem, multis crassis exasperatâ squamis. Alterius Dentariæ folia non Pentaphylli, sed fraxini modo digesta, costam habentia mediam cui annectuntur. Sunt verò ea oblonga, lata & in ambitu crenata, crebrò ad vnam costam septena: flores candido, filiquas prioris

priori similes : radices quoque asperas & squamosas, sed quàm prioris minùs. Dodonæus peregrinas esse ait, & ad Leucoij genera referri posse. Matthiolus inter symphyta ac solidagines utrâmq; reponit. Alia Dentellaria à quibusdam nominata hîc exhibetur, à Dalechâpio collecta in vertice montis per quem Geneua

DENTARIA Minor,
Matthioli.



DENTELLARIA Rubra,
Dalechampi.



DENTELLARIA Rondel.



LEPIDIVM Annuum, Lob.



itur ad Sequanos, proximè Pagum quem Incolæ vocant *Saint Sorgue*, quasi Diuum Sergium. Serpit inter saxa & silices, radice sic eminentibus articulorum vertebri compacta, vt ex coniunctis dentibus contexta videatur, mirabili naturæ in ea struenda artificio, vnde Dentellariæ nomen: caule læui, pede altiore, foliis eius plantæ quam Saniculam fœminam Fuchsius appellat: flore violæ, copioso, rubente, pulchro aspectu, semen in oblongis siliquis. Dentariam aliam Pena pinxit, Rondeletij & Narbonensium, quæ passim, inquit, propè sepes & sata in agro Romano & Monspelienfi fruticat, radice longiusculâ: fibrata, caule, bicubitali, surculoso, foliis imis maioribus, cauli incumbentibus. Martidis draba' ve ritu: floribus purpureis dilutis, extremo caulis ambitui confertim aggestis, quibus defluentibus semina gemmeis, villosis & hirsutis, & aliquantulum tenacibus folliculis includuntur, nigra. Tota planta gustu est acerrimo, & vrentis facultatis, quæ tantoperè pollet, vt aliquâdiu manu detenta, volæ manus vibicem inurat liuidum. Quare viri quidam docti Molibdænam esse Plinij opinati sunt, aut Lepidium Æginetæ. Vulgus studioforum Dentariam putabat vocatam à Rondeletio: qui hac, vt pyrethris, aut similibus vrentibus utebatur ad sauos dentium cruciatus mitigandos. Aliam tamen nouimus in agri Mōspeliensi aridis locis satis frequentē, quæ etiam vulgò Dentellaria vocabatur, de qua diximus in lib. De plantis, quæ in asperis nascuntur. Herba est alia quæ à simili cum figura tum ortu foliorum, Dentellariæ Mōspeliacive Lepidij cauli incumbentium Herbarijs Lepidium dicitur. Caulis bicubitalis, multifidus: flores albi, & semen foliaceis Thlaspi inuolucris clausum, acre gustu: radix fibrata. In Belgio hortense, hyeme virens, foliis Lepidio maioribus. Hæc Lobellius.

VERBASCVM,

CAP. XLII.

Nomina



Λ Ο Μ Ο Σ Græcis & τὸ δῆμος Galeno auctore, Verbascum Latinis dicitur, Officinis Tapsus barbatus, Apuleio Lyncitis & Pycnitis, nonnullis Candela regis, Candalaria, & Lanaria, Gallis *Bouillon*, Germanis *Uuilkraut*, Ita-

VERBASCVM I. Math.

lis *Verbascum*, & vulgò *Tasso Barbasso* Phlomon autem dixerunt Græci ἀπὸ τῆς φλογὸς à flamma, quod eius foliis & caulibus in laternis pro elychniis vterentur. Candelariam quoque recentiores nominarunt, quod caulibus adipe, seuo, vel pingui aliquo illitis nonnulli pro candelis siue funalibus vtantur, Officinæ Tapsum, aut potius taxū, quia toxiacis aduersetur, barbarum à densa lanugine. Dioscorides & Galenus quatuor Verbasci genera assignarunt. Verbascum album marem, *Bouillon blanc malle*, Verbascum album fœminam, *Bouillon blanc femelle*, Verbascum nigrum, *Bouillon noir*, Verbascum siluestre, *Bouillon sauvage*. Plinius à Dioscoride dissentiens tria duntaxat posuit. Verbascum album marem, nigrum fœminam, tertium siluestre, anxiam illam generū distinctionem superuacuum ratus. Distingui genera hæc penè superuacuum est, inquit, cum sint omnia eiusdem effectus. Recentiores herbarij alia repperunt genera, quæ ordine hîc picta sunt. Verbascum album fœmina, folia habet brasicae

Li. 4. ca. 99.
Li. 8. simpl.
Genera.

Li. 25. c. 10.

Forma.



brassicæ similia, hirsutiora, multò latiora, & alba: caulem cubitalem aut etiam ma-
 iorem, album, subhirsutum: flores albos, ἢ ὑπαρχοῦς, id est, ex luteo pallescentes, siue,
 vt legit Oribasius, ὑπόχλωρα, id est, subuirides: semen nigrum, radicem nigram, gu-
 stu acerbam, crassitudine digiti. Verbasum mas, λακόρυλλον Græcis dictum à fo-

Diosc. li. 4.
 cap. 29.

VERBASCUM II.

Matthioli.



VERBASCUM III.

Matthioli.



liorum candore, oblongius est, folia alba & angustiora habet, caulem quoque tenuiorem. Verbasum nigrum, albo prorsus simile est, latiora tamen & nigriora folia habet. Siluestre, virgas producit altas & lignosas, siue arborea specie, folia saluix similia: ramos habet circa virgas, velut marrubium: florem luteum, auri specie. Sic enim exprimenda Dioscoridis verba, vt in vulgatis exemplaribus leguntur: quæ in vetere codice aliter legi affirmat Andr. Lac. Γίνεται δὲ ἢ λεγομένη ἀρχαία βάλανος ὑψηλῆς φέρουσα, καὶ διὰ τὴν ὀσμὴν τὴν φύλλα δὲ ἐλεμισφάκων ὅμοια ἔχει, κύκλῳ περὶ τὰς βάλανους, ὡς περὶ τὰς σκισίων. Quod est, Nascitur etiam & Verbasum agreste, altas ferens virgas & lignosas: folia saluix similia circa ipsas in orbem, vt marrubium: quæ lectio doctis multis summoperè placet. De his breuius & indistinctius Plinius scribit his verbis. Verbasum Græci Phlomon vocant. Genera habet primaduo. Album, in quo mas intelligitur, alterum nigrum, in quo fœmina. Tertium genus non nisi in siluis inuenitur. Sunt folia brassicæ, latiora, pilosa: caulis erectus cubitali

Li. 25. ca. 10.

VERBASCUM Nigrum Saluisfolium, Lobell.



VERBASCVM IIII.

silvestre, Matth.

Lib. I. c. 79.
Verbasc. al-
bum fem.
flor. aureo.

Cap. 316.
hisor.

Ibidem.
Verbascū
nigr. Dod.

lia maiora habeat, flores luteos rosam parvam referentes, erectis è medio stamini-
bus rubris. Id propter similitudinem cum supradictis non appinximus, pro Ver-
basco nigro Fuchsius descripsit & depinxit: quemadmodum pro silvestri id quod
Dodonæus pro nigro Verbasco posuit. Folio id est amplo, scabro, nigro, tactu

VERBASCVM *Femina,*
Lobellij.



VERBASCVM *Album femina,*
flore albo. Dodon. & Fuchf.



aspero

VERBASCVM Album
mas, Fuchf. & Dod. flore luteo.



aspero, grauis odoris, flore luteo, cæteris simili, sed minore, similibus item caulibus & radice. Siluestre verò Dodonæus tam caulibus quàm foliis saluiam referre scribit, ramulos multos habere quadrangulos, lignosos, binos semper ex aduerso, ex eodem geniculo prodeuntes, folia læuia & candicantia, foliorum saluiæ emula, sed maiora & læuiora: ramulorum fastigia flores lutei verticillatim ambiunt, vt in marrubio. Longe diuersum ab his Verbasum depinxit Matthiolum foliis laciniatis: cuius folia, inquit, cornuti papaueris faciem exprimunt. Ideo nihil mirum si Dioscorides eius papaueris folia, Verbasci foliis compararit. Lobellius aliud Verbasum siluestre ostendit, foliis saluiæ tenuifoliæ: item Verbasum siluestre saluiæ folio, exoticum, foliis rotundioribus, candidioribus, densioribusq; minùs tamen lanugine canis, sed saluiæ emula concretionem, alioqui lignosa fibratâque radice, caule & facie non ita dissimilibus: iisdem gaudet Syriæ natalibus, quibus phlomos Syriaca, de qua mox, flores ille non vidit, quia marcidit. Verbasum album & nigrum

Verbasum
silue. Dod.

Ca. 99. li. 4.
Verbasum
laciniatum.

in campestribus, aggeribus agrorum, & secus vias prouenit. Siluestre in campestribus potissimum siccis & lapidosis. Verbasca Iulio & Augusto mensibus potissimum florent: siluestre etiam serius. Radix Verbasci albi & nigri, ita tradente Dioscoride, adstringit, vnde alui profluuii laborantibus tali ludicri magnitudine

Locus.

Tempus.
Vires.

VERBASCVM Siluestre,
Dodonai.



VERBASCVM Siluestre folio
Saluiæ tenuifolia, Lobel.



*VERBASCUM Siluestre
exoticum, Lobelij.*



Li. 25, ca. 10.

*VERBASCUM Laci-
niatum, Matthioli.*



Li. 8, simpl.

In cap 99.
lib. 4.

omnia Verbasci genera omnibus ferè sedis vitiis mirificè subuenire : adstringunt enim & exsiccant. Quamobrem seminis & florū puluis additis chamæmeli floribus, & laricis resina, procidentem sedem suffitu cohibet, & tinesimum, præsertim dysentericis, tollit. Verbasci fœminæ folia inter lapides cōtusa, si equi claudicantis ex clauorum

cum vino vtiliter bibenda datur. Decoctum ruptis, conuulsis, contusis & antiqua tussi auxiliatur. Dentium dolorem collutione mitigat. Verbasum cui flos aureus, capillos tingit (sic in vulgaris exemplaribus, ὁ δὲ χρυσοῦδης τὰ ἄλν, in vetere autem, τὴν δὲ χρυσοῦδης τὰ ἄλν, idest, aurei Verbasci flores capillos tingunt) & vbicumque positum fuerit, blattas in se colligit. Cocta folia in aqua ad œdemara, & oculorum inflammationes illinuntur, & ad syderata vlcera cū melle aut vino, cum aceto autem vulnera sanant. Contra scorpionum ictus auxilio sunt. Siluestris folia ambustis igni sunt cataplasmata. Aiunt fœminæ folia caricis interposita à corruptione eas immunes seruare. Plinius multis Verbascorum vires explicat his verbis. Aiunt in foliis eius quam fœminam diximus, ficus omnino non putrescere. Contra scorpiones bibitur radix cum ruta ex aqua, magna amaritudine, Galeno tamen acerbata est, sed effectū pari. Et variis in locis. Verbasum priuatim tonsillis in aqua potum medetur. Tribus obolis bibitur Verbasum cuius flos aureus est, contra omnia pectoris vitia, tussim, & purulentis etiam non tussientibus modo, sed ilia trahentibus auxiliatur potu. Lateris & pectoris dolores verbasum cum ruta ex aqua sedat: panos sanat cum sua radice tussim, vino aspersum, & ita cinere calfactum, vt imponatur calidum. Semen ex vino decoctum & cōtritum luxatis medetur, dolorem & tumorem tollēs. Radicis medulla collyrij tenuitate in fistulam additur. Cōtusis, euerfis, & si febris sit, potatur in aqua verbasum, cuius flos auro similis est. Folia ex aceto imponuntur in strumis. Semine ac foliis decoctis ac tritis omnia corpori infixā extrahuntur. De quibus breuiter sic Galenus. Radix priorum duorū acerbata gustu est, & fluxionis effectibus prodest, sed & ad dentium dolorem quidam eam colluunt. Attamē folia digerendi vim habent: sic & aliorum folia, maximè eius quod aurei coloris flores habet, qui etiam capillos flauos reddunt. Omnium enim folia siccandi, & modicè detergendi vim habent. Experientia cōstat, inquit Marthiolus,

ex clauorum

ex clauorum noxa, vngulæ prius excauata imponatur, mirum dictum quam breui tempore is liber euadit. Radicis eiusdem succus antequam caulem proferat, duarum drachmarum pondere ex vino cretico haustus ipsa accessionis hora, vt Arnaldus refert, quartanam fugat, cum hoc tamen quod tribus aut quatuor iteratis vicibus

PHLOMIS Lychnitis,
Martholi.



PHLOMIS Lychnitis,
Pena.



hauriatur. Succus tam florum quam foliorum asperis verrucis illitus, eas facile delet, etsi lacuibus nihil profit. Idem facit sicca radice farina. Dantur flores commodissime in puluerem triti, contra ventris tormina, & colicos dolores. Folia & summitates eius quod minoribus est foliis, in aqua decoctæ vel illitæ, podagricis auxiliantur. Scillatitia florum aqua oculis iniecta destillationes cohibet, eadem illita faciei ruborem tollit, quam Arabes guttam rosaceam vocant, præsertim addito caphuræ momento. Illinitur eadem ad erysipelata, ambusta igni, serpigines, vitilgines, impetigines, & cætera cutis vitia. Verbasci flores vna cum oui vitello, mica panis & foliis illiti, optime faciunt ad cohibendas hæmorrhoidas. Idem præstant eiusdem folia suffuta ex molari lapide accenso. Phlomis phlomidis, idest, verbascis verbascula subiungit Dioscorides. De duabus alibi dicitur, de tertia hîc dicendum, quæ Lychnitis appellatur & thryallis, quod propius ad verbasca accedat. Folia terna aut quaterna, aut etiam plura habet, hirsuta, crassa,

Phlomidis.

Lychnitis.
Folia.
Diosc. ibid.

VERBASCULVM
Quorundam.



Ca. 97. li. 4.

pinguia. Vtilis est ad ellychnia in lucernis : vnde Lychnitidis ei nomen : ex Matthiolo hic pictam damus. Aliam ostendit Pena, quæ plerisq; agri Narbonensis collibus glareosis Monspelio vicinis fruticat, rara alibi in Italia & Gallia, perameno aspectu florum luteorum fabæ, caulem verticillatim ambientium, vt in Marrubio secundum foliorum exortus, pallidis staminibus. Folia sunt scabra, crassa, densa, lanugine, incana, tactu aspera, Saluix angustifoliæ foliis angustiora, sed longiora, & ad ellychnia valde accommoda. Clusius aliam profert, cui folia sunt scabra, crassa, Saluix tenuifoliæ similia, oblongiora tamen & angustiora, candicantia, inferiore parte densa, lanugine omnino cana: cauliculi dodrantes, quadranguli, hirsuti & candicantes: e quorum geniculis folia bina, oblonga, superioribus similia, inter sese opposita nascuntur, & in caulis fastigio breuiora, & sede latiuscula: flores lannij circa extremos cauliculos verticillatim ex densa lanugine & veluti villis pallidis prodeunt lutei coloris, coma plerumq; inflexa & nutante: radix nigricans & lignosa. Oritur in collibus siccisque & petrosis locis per totam Hispaniam, Lusitaniam, Narbonensem Galliam. Floret Maio & Iunio, semine subruffum, verbasco siluestri ferè simile profert. Monspelienfes Verbasum siluestre vocant, Castellani *Candilera*, Granatenfes *Menchera*. His interserit Lobellius Lychnitin alterâ Syriacam,

PHLOMIS Lychnitis, Clus.

PHLOMOS Lychnitis altera
Syriaca, Lobellij.VERBASCVLVM
Minimum.

nouam

novam plantam nec minus speciosam, à superiore diffidentem florum ortu & modo: sunt enim Lychnidis siluestris, vel Chalcedonica, coloris flauis: foliis item angustis, & virgultis quadratis tomento crasso incanis, & radice lignea. Verbasculis annumerant quidam plantam quam nomine Veronica scemina descripsit & depinxit Fuchsius, ite Lonicerus, quæ per terram serpit caule lanuginoso, foliis rotundis instar herbarum quæ centimorbia & numularia hodie vocatur, in ambitu minimè incis: floribus in luteo purpureis, semine in vasculis rotundis, radice tenui. Dodonæus hanc nomine heliotropij minoris exhibuit. Aliud hic pictum est, quod Minimum dicitur: In sepibus ac dumis provenit, radice nigricante, lignosa, breui, nodosa, fibris albis, crassiusculis capillata, caryophyllata modo, gustu adstringente: caule vnicò, cubito altiore, rotundo, inferne rubente, fungoso, non nihil villoso: foliis paucis, non pluribus ferè quam septem aut nouè in caule alternatim dispositis, violæ propemodum similibus, longioribus, per ambitum crenatis, aversa parte lanuginosis, saporis adstringentis, & subamari: flore in caulis vertice senetionis, luteo, copioso, in pappos auolante. Floret tardissimè Septembri circa æquinoctium ad initium vsque Octobris.

In Epico.

BLATTARIA,

CAP. XLIII.



ST herba inquit Plinius, similis verbasco, quæ sæpe fallit pro ea capta, foliis minus candidis, cauliculis pluribus, flore luteo. Hæc abiecta Blattas in se contrahit, ideoque Romæ Blattariam vocant. Hæc Plinius. Eundem verò effectum Dioscorides illi verbasci gene-

Lib. 25. c. 9.

BLATTARIA, Matth.



ri assignauit, quod floribus aureis descripsit. Quæ res multis persuasit Blattariam Plinij & verbascum illud Dioscoridis, cui flores sunt aurei, vnam & eandem plantam esse. Fuchsius & Dodonæus pro Blattaria proponunt eam, quæ hic picta est, quæ Germanis *Schabenkraut*, Gallicis *Herbe aux mites*, *Herbe vermineuse* & *Blattaire* nominatur. Foliis est viridantibus, minimè hirsutis, nec candidis, crenatis, per humum sparsis, ex quorum medio duo trësve emergunt caules venustis floribus, aureis interdum & purpureis, ornati, verbasco simillimis: semen folliculis inclusum, minus quam verbasci: radix brevis & lignosa. Nasçitur iuxta aquas & fluminum ripas. Floret Iunio & Iulio mensibus. Vehemens amaritudo eius satis docet calidam & siccam esse, quare qui ea vti voluerit, eadem quæ alia amara in corpore nostro efficiet. Sed cum calida siccaque sit, & vehementer amara gustanti, qua vi nisi arcana & occulta Blattas allicit: num potius abigit?

Lib. 4. c. 99.

Cap. 66. lib. 1. c. 3. Blattar. Fuch. & Dodon. Nomina

Forma.

Locus.

Tempus.

Temper.

Vires.

AETHIOPIS,

CAP. XLIIII.



T Græcè *αἰθίωπις*, ita Latine Aethiopsis dicitur, quod nomen herbarum dedere magicæ vanitates, quod ea herba, inquit Plinius, amnes ac stagna siccentur coniectu, tactu clausa omnia aperiantur, tamen verisimilius est quod optima ex Aethiopia adueretur, sic dictam esse, vel quod fuliginosa & veluti cinere aspersa sit. *ἄσπις* enim fuligo est, siue fauilla adusta. Verbasco folia similia habet, sed valde hirsuta, & densa, in orbem circa radice imum: caulem quadrangulum, crassum, & scabrum, similem apiastro aut arctio, multis alis

Nomina Pena in Adu. Lib. 26. c. 4

Forma. Dios. lib. 4. cap. 100.

AETHIOPIS.

Locus.

Lib. 27. prae-
far.

Li. 24. c. 17.

Pena in
Adu.

Vires.

Li. 4. c. 100.

Lib. 7. c. 4.

Lib. 7.

concauum: semen erui magnitudine geminum in vno conceptaculo: radices ab eodem cespite multas, longas, crassas, gustu glutinosas. Hæ siccatæ, nigrae ac duræ fiunt, cornibus similes. Plurima nascitur in Messenia, ac Ida. Eadem prorsus habet Plinius, vt ex Dioscoride trāsscriptis se videatur. Aethiopidem herbam, inquit, ab exusto syderibus axe rerum natura ostendit. Et aliquanto post. Aethiopsis, folia habet phlomo similia, magna & multa, & hirsuta à radice: caulem quadrangulum scabrum, similem arctio, multis concoaum alis: semen eruo simile, candidum, geminum: radices numerosas, longas, plenas, molles, glutinosas gustu. Sicca nigrescunt indurescuntque, vt cornua possint videri. Præter Aethiopiā nascuntur & in Ida monte Troadis, & in Messenia. Rursus alio in loco tradit. Aethiopida in Meroe nasci, ob id & Meroida appellari, folio lactuca, hydropicis vtilissimam è mulso potam. Hanc diu ignotam ex Græcis & Illyricis montibus maritimis allatam, iam satis vulgatam alunt horti multi Italiæ, Galliæ, Germaniæ, thapso barbato admodum similem, magis tamen incanis foliis, mollioribus, delicatiore & longiore lanugine, vt in dictamno. Cretensi, eorumdem vndatim laciniatis oris, circa imum caulem accubantibus, & ipsum ambientibus quadratum, hirsutum, binum pedum, & sesquicubitalem, multas alas habentem, quem verticillatim flores ambiunt, scelares, aut hormini, sed candidi, & semen non dissimile. Radix verbasco cognata. Huius radix, auctore Dioscor. cocta & pota, ischiadicis, pleuritidis, sanguinis sputo, arteriæ asperitati auxiliatur, sumitur etiam cum melle in eclegmate. Plinius eadem ferè tradit. Radices medentur vuluis potæ in vino albo, ischiadicis, pleuritidis, faucibus scabris decocta, potui dantur. Sed quæ ex Aethiopia veniunt, eximie atque illico profunt. Atque hæc recta & veteris codicis lectio est. Hanc herbam Galenus in simplicium catalogum non retulit. Paulus verò ex Dioscoride hæc exscripsit. Aethiopsis similia verbasco folia habet. Radicis decoctum, potui datur ischiadicis, pleuritidis, & sanguinem reicientibus, & arteriæ asperitates cum melle lenit.

ARCTIVM,

CAP. XLV.

Nomina

Lib. 4. c. 101

Forma.

Lib. 27. c. 5.

Locus.



"PKTION siue ἀρκτοῦρον Græcis, Latinis similiter Arctium vocatum, affine etiam est verbasco foliis, vt scribit Dioscorides, nisi quòd hirsutiora & rotundiora habet: radicem teneram, dulcem, albam: caulem mollem, longum: semen cumino paruo simile. Quam Dioscoridis descriptionem planè expressit Plinius his verbis. Arctiū aliqui arcturum vocant. Similis est verbasco foliis, nisi quod hirsutiora sunt: caule longo, molli: semine cymini. Nascitur in petrosis, radice tenera, alba, dulci. Plātam, quæ hîc depingitur, arctium esse putant docti herbarij, quæ nascitur in asperis montibus Allobrogum, radice crassa, longa, tenera, candida: foliis multis verbasco similibus, auersa parte candidis & valde lanuginosis, aduersa viridioribus, & minùs villosis, venosis: caule molli, & in hac, quæ hîc pingitur breui, densa lanugine pubescente: flos luteus in capite

ARCTION, *Quorundam.*ARCTION *Dodon.ex*
Codice Casareo.

capite niret, crasso, scolymo simili non tamē aculeato, squamis compacto, qui tandem in pappos auolat: semen oblongum cymino non dissimile. Quidam in Dioscoride legunt *καυλού δὲ μαλακού, μακρόν, καρπὸν δὲ μακρόν κυμίνῳ ὅμοιον*. vt voces *μακρόν* & *μακρόν* locis permutata fuisse videātur, & ita legit Marcellus. Præterea quid paruum cyminum Dioscorides hîc appellet, non satis constat, nisi fortasse siluestre intelligat. Vulgatam tamen Dioscoridis lectionem secuti sunt Galenus, Plinius, & Oribasius. Verbasco foliis simile est, quod Arctiū dicitur, lanuginosis videlicet ac hirsutis, sed tamen hirsutioribus ac rotundioribus (Plinius hirsutiora tantummodo esse tradit:) caulis longus & mollis: semine vt parui Cymini: radice tenera, alba, dulcisque, vt auctor Dioscorides. Et hac quidem forma depingitur Arction in vetusto Casareæ bibliothecæ Codice: foliis videlicet latis, ambitu crenatis: caule tenero erecto: capitulis aliquot in fastigio mollibus ac lanuginosis, vt primi Cymini sylvestris. Nasci ait Plinius in petrosis. *Ἀρκτίον* Græcè: Latine similiter Arction: item & *Ἀρκτούρον* & Arcturon appellant: Ab vrsō nomen habet, qui Græcis *ἄρκτος* dicitur. Allucinantur qui Arction idem cum Arceo siue Personata faciunt, multò verò magis, qui & cum Vngula caballina confundunt. Inter Vngulam enim caballinam, quæ Græci *Βήχιον*, & Action Plurimum est descrimini. Facultatis autem Arction est admodum tenuisū partium, vt Gal. ait, & ob id exsiccantis, extergentis tamen modicè. Decoquitur in vino (inquit Plinius lib. 27. cap. 5.) radix ad dentium dolorem, ita vt ore contineatur decoctum. Bibitur & propter Ischiada & Stranguriam è vino. Ambustis & Pernionibus imponitur: fouetur eadem cum radice semine trito in vino. Arctij radix & semen in vino decocta, dentium dolorem mitigant, si decoctum ore contineatur. Ambusta & perniones eodem decoctum fouentur. Bibitur item ad coxendicum dolores & stranguriam è vino. Eadē Plinius tradit. Radix decoquitur in vino ad dentium dolorem, ita vt contineatur ore decoctum. Bibitur & propter ischiada & stranguriam è vino. Ambustis imponitur & pernionibus, fouentur eadem cum radice semine trito è vino. Et tursus. Ambusta sanantur plantagine, arctio, ita vt cicatrix fallat, folia eius in aqua decocta & contrita illinuntur. Galenus idem confirmat his verbis. Arctium quod verbasco est simile, radice tenera, candida, dulci, caule oblongo & molli, semine cymino simili, facultatis est admodum tenuium partium, & ob id exsiccantis, extergentisque, tamen modicè, quamobrem radix ac semen cocta in vino quadam

Vires.

Lib. 27. c. 5.

Lib. 26. c. 12.

Lib. 6. sim.

quadantenus dolores dentium mitigant. Porrò ambusta & pernioles non harum modo decoctum affusum, sed & caules teneriores sanare possunt.

C A C A L I A,

C A P. XLVI.

Nomina
Corna.
Emb. 106.



ΑΚΑΛΙΑ & ΛΕΟΝΤΙΚΗ Græcis, similiter Latinis Cacalia & Leontice. Gale. in simpl. medicamentorū numero Cacaliā non recenset, sed Cacanū eam appellare videtur, prætermiſſa Cacaliæ voce, quod tamē facere nō solet in variis plantarū nomenclaturis, utpote qui vnā atq; alterā semper adiiciat. Quod autē Cacanū, legendum sit in Galeno, & non Cancanū, vt in vulgatis exēplarib⁹ legitur, ex

Paulo perspicuū est, qui apertē λεγνον habet, de quo eadē planē tradit quæ Galen. & eadē prorsus vterque quæ Dioscorides de Cacalia, ita vt Paulus qui post Cacanum scribit Cacaliā vi-

C A C A L I A.



Lib. 3. c. 46.
& 7. c. 106.

Lib. 4. c. 118
Forma.

Locus.

ribus & vsu Cacanō similem esse, eandem omnino dicere debuisset videatur, cum Galenus eandem fecerit, vt dicitur. Ex iisdem intelligi licet bacanum pro Cacanō mendose legi locis aliquot apud Paulum, quibus medicamenti hepatici ex Cacanō meminit. Cacalia, ita describente Dioscoride, folia fert alba, bene magna, caulis ē medio ipſorum prodit rectus, albus, qui florem habet quercui aut oleæ similem. Nascitur in montibus. Ex qua delineatione Dalechāpius Cacaliā esse quæ hīc pingitur opinatus est, in summis excelſorum montium iugis prouenientem, radicibus multis, candidis, implicatis, crassiori cuidam velut caudici circumpositis, fatuis & gustatu lentis tragacanthi modo: caule cubitali, recto, lanugine candicante: foliis multis, latis, amplis, crassis, subrotundis, in ambitu crenatis, longo crassoque pediculo nixis, venosis, auersa parte candida lanugine hirsutis:

flore copioso, puniceo, in pappos abeunte. In florū vmbilico granum rotundum prominet niueum, margaritæ simile, cui rectē Plinius comparauit, quod excusso flore nudum nitidūque dependet. Cacaliæ radix, inquit Dioscorides, in vino macerata vt tragacantha, & per se ipsam delincta, aut manducata, tusses & arteriæ asperitates sanat. At grana quæ postquam defloruit, enascuntur, trita, cerato excepta & illita, faciē extendunt, & à rugis cōseruant. Quibus vide num similia de cacano scripserit Galen. vt eadē dicenda sit planta quæ cacalia. Cacani radix facultatem habet mordacitatis expertem, & modicē exciccantem, essentiam crassā, & emplasticā. Quapropter macerata vino sicut tragacantha, & linctā asperitates arteriæ sanat: nec minus si quis eam mandat, succus eius defluens prodest arteriæ similiter vt glycyrriza, quæ solum transcripsit Paulus. Eadem etiam & quædam alia de Cacalia tradit Plinius. Cacalia siue Leonticē vocatur, semen margaritis minutis simile, dependens inter folia grandia, in montibus ferē. Huius grana quindecim in oleo macerātur, atq; ita aduerso capillo caput vngitur. Et rursus. Radix Cacaliæ cōmanducata, & in vino madefacta, nō tussī tantum, sed & faucibus prodest. Et alio in loco. Cacaliæ grana mixta ceræ liquidę extēdunt cutem in facie erugantq;. Loco verò supra citato non intelligendum semen inter folia grandia folia dependere, hoc enim falsum est, sed caulem in cuius surculis & adnatis semen dependet, ex grandīū foliorum congerie sese attollere.

Lib. 25. c. 111.

Lib. 4. c. 118
Vires.

Lib. 7. sim.

Lib. 7.
Lib. 25. c. 111.

Lib. 26. c. 6.
Ibid. cap. 15.

KΑΜΑΪΚΙΣΣΟΣ Latinè etiam Chamæcissus, id est, humilis siue pusilla hederæ. Sed quænam sit planta quæ verè Chamæcissus Dioscoridis dici possit, inter herbarios ambigitur. Sunt qui hederam terrestrem Officinis dictam Chamæcissum esse volunt, effigie, viribus, vulgari appellatione consentientibus, quæ de re paulò post dicemus. Alij horum reiecta sententiâ, Chamæcissum esse contendunt eam quam pro consolida media Matthioli & Fuchsij exhibuere, bene cõuenientibus notis omnibus quæ Dioscorides Chamæcisso assignat. Ea, inquit, folia habet hederis similia, longiora tamen, & tenuiora, multa: ramulos palmi altitudine quinque aut sex, à terra foliis plenos: flores violæ similes, minores tamen, & gustui valde amarus. Radix tenuis, alba, inutilis est. Nascitur in locis cultis. Sic, ut à natalibus incipiamus, quæ hîc picta est. In cultis gignitur, scilicet in agrorum marginibus & aggeribus, radice candida, tenui, inutili, quaternos & interdum plures cauliculos mittit, dodrantales, foliosos: folia circa cauliculorum verticem hederæ folia prorsus referentia, prope radicem longiora, & utrobique tenuiora, subhirsuta, quod Dioscorides non habet flores violæ similes, (sic enim conuertere λευκία, non violæ albæ speciatim: nam etsi leucoij nomine viola albæ significetur, tamen pro lutea, & cæreulea, & purpurea solet usurpari) minores (non candidiores ac tenuiores, ut vertit Ruellius, nam hæc in Græcis non legimus, quæ habent ἀνθη λευκοῖς ὄμοια, μικρότερα καὶ ταινρά & cætera.) è candido cæreuleos

Inc. 9. lib. 4. c. 146. hist.

Forma.

CHAMÆCISSES,
Quorundam.

quod Dioscorides omisit, amarissimos. Quod si his vires suffragentur, & quemadmodum Chamæcissi Dioscoridis folia ischiadicis utilissima sunt, trium obolorum pondere in tribus cyathis aquæ ad dies quadraginta aut quinquaginta pota, & eadè morbum regiû purgant eodem modo pota sex aut septè dies, ita si ea quæ hîc exhibetur, facultates habeat ad iocinorosos, lienosos, ischiadicos sanandos insignes, magnum fuerit tuendæ illorum opinionis argumentum. Plinius aliter de Chamæcisso quàm Dioscorides scripsisse videtur, ut hanc cum alia cõfuderit, aut de diuersa herba scripserit. Sic enim ille. Est & rigens hederæ quæ sine adminiculo stat sola omnium generum, ob id vocata orthocissos. E' diuerso numquam nisi humi repens Chamæcissos. Rursus. Iidè (Græci) Chamæcissum appellant hederam nõ attollentem se à terra. Et hæc cõtusa in vino acetabuli mësura, lienî medetur: folia ambustis cû axungia. At hunc Chamæcissi vsum Dioscorides nõ tradit. Et alio in loco. Chamæcissos spirata est tritici modò, ramulis quinis ferè foliosa: quum floret existimari potest alba violæ, radice tenui. Bibunt ischiadici folia tribus obolis in vini cyathis duobus septè diebus, admodum amara potione. Quæ non in totum, sed aliqua ex parte tantum cum his quæ Dioscorides tradit, cõsentiunt. Item Plinius alibi etiam tertii cyclami non sibi demonstratam esse dicit cognomine Chamæcissum, vno omnino folio, &c. Dioscoridi Galenus assentitur his verbis. Chamæcissi flos cum sit admodum

Vires.
Dios. lib. 4.
cap. 121.

Lib. 16. c. 34

Lib. 24. c. 10

Ibid. ca. 15.

Lib. 25. c. 9.

Lib. 8. sim.

PRUNEL

Nomina



AVD compertum adhuc est, quòd nomen huic herbæ à veteribus tum Græcis tum Latinis positum fuerit, quare vulgarem medicorum & herbariorum nomenclaturam secuti, Prunellam siue Brunellam, siue còsolidam minorem hîc vocamus. Germani *Braunnellam*, & *Gotttheyl*, Galli *l'herbe au charpentier*. Sunt qui symphytum petræum esse credant, quorum opinio peritioribus parum probatur. Solidago minor quam Germani Prunellam vocant, inquit Matthiolus, caulibus exit quadrangulis, hirsutis, spithamæ longitudine: foliis oblongis, in extremo acuminatis, menthæ proximis, ac etiam subasperis, flores gerit in caulium, ramusculorumque fastigiis spicatos, purpurascens, & quandòque candidos. Radix subest parua, prolixior, fibrata. Nascitur in pratis & siluis opacis. Maio & Iunio mensibus floret. Calidam siccamque esse scribit Fuchsius, quòd gustu glutinosa sit, & modicè amara. Dodonæus sicca quidem esse, sed caliditate & frigiditate temperatam, seu modicè frigidam. Vulneraria est herba, nam vbi vulnera glutinare, adstringere, & reprimere sit opus, scelericiter hanc vsurpant. Succum eius cum aceto & rosaceo mixtum, vehementes capitis dolores sedare, recentiores vno consensu tradunt, si tempora eo inungantur, aphthas & oris vlcera, fauciumque vitia succus eius sanat. Iisdem viribus quibus Bugla & cochlearia

PRUNELLA Siue Consolida minor, *Math.*

In cap. 9.
lib. 4.

Forma.

Locus.

Tempus.

Cap. 237.
hilt.

Lib. 1. c. 88.

Temper.

Vires.

Math. ibi.

Fuch. &
Dodo. ibi.



pollet, inquit Lobellius, sed efficacius siccatur, adstringit, cohibet & reprimat.

MALACOCISSOS,

CAP. XLIX.

Nomina



ΜΑΛΑΚΟΚΙΣΣΟΝ in Geoponicis legimus, quæ Latinis est mollis hederæ. Eam periti herbarij quidam esse opinantur, quæ hederæ terrestris & terræ corona Latinis & Officinis nominatur, quòd ramulos suos per terram spargens, folioso veluti ferto eam coronare videatur, Gallis *Lierre terrestre*, Germanis *Gundelrebe*, vel potius *Grundrebe*, hoc est humi repens viticula. Qui hanc legitimam esse Dioscor. chamæcissum esse contendunt, præter vulgarem hederæ terrestris nomenclaturam: eius etiam vires easdem esse cum iis quas Dioscorides chamæcisso attribuit, medicorum crebro experimento testatum esse volunt, utpote quæ amarore & cæteris qualitatibus ad obstructions, & ad arthriticos dolores plurimum sint efficaces. Quantum ad figuram attinet, iis qui folia chamæcissi ex Dioscoride *μακρότερα* id est, longiora obiciunt, respondent vnus literæ mutatione *μικρότερα*, id est, minora esse, ut folia hederæ terrestris, foliis hederæ quidem similia sint, sed rotundiora, atque adeò minora & tenuiora. Et hîc lapsus in Dioscoridis exemplaribus frequens est, id quod aliquoties annotauimus. Ut ut res hæc habeat, planta hæc ex eadem radice fibrata, cauliculos multos per terram repentes emittit, quadrangulos, teneros, in quibus folia quadentenus rotunda, scabra, vbiq; crenata grauis odoris, gustu amara, minora, rotundiora, teneriora, foliis hederæ inter quæ flores emicant gustu amari, cærulei, qui color etiã leuciorum

Pena in
Adu.

Dodo. lib.

3 cap. 50.

Forma.

leuciorum est, vel purpurei. Vbiq̃ ferè, sed præcipuè opacis & vdis locis crescit. *Locus.* Martio statim erumpit, & floret in magnam vsq̃ æstatis partem, sæpiùsque toto *Tempus.* anno viriditatem suam conseruat Calidam siccamq̃ esse præsertim florum amari- *Temper.* tudo insignis demonstrat. Quare ad discutiendas obstructions iocinoris & lienis, *Uires*

HEDERA TERRESTRIS

Malacocissos, Matth.



MALACOCISSOS Ex

piçtura, Dodon.



& ad purgandũ icterum præcipuè valet, & ad coxendicium, & ad alios arthriticos dolores suppressos, menses euocat, vrinam mouet: manibus confricata & contrita, *Fuch. Ibid.* auribusq̃ immissa, earum sonitus & obtusum auditum sanat. Contra pestem etiam tradunt efficacem esse, id quod equites quoque sciunt, hi enim quoties fibula dicta pestis equum corripuerit, hac contrà eandem herba magna efficacia vtuntur. *Lib. 2. c. 87.* Folia hederæ terretis, auctore Trago, exulcerationi vitiisq̃ colli & faucium gargarifatu conducunt. Idem decoctum scabiei atque oris & muliebrium locorum vitiis, medetur. Succus eiusdem fistulis, aliisq̃ id genus malis purgandis maximè prodest.

ELLEBORINE.

CAP. L.



ΕΠΙΠΑΚΤΙΣ & Έλληβορένη Græcis, similiter Latinis Epipactis & *Nomina* *Lib. 4. c. 104* Elleborine dicitur. Dioscorides breuissimè de epipactide tractans, non

quia similis esset aut facie aut viribus Elleboro albo vel nigro Elleborinem dictam fuisse ait, vt quæ nam sit hodie herba quæ genuina Elleborine dici possit iudicare perdifficile sit, sed quia Elleboro albo misceretur, & iisdem locis nasceretur, vt etiam Theophrastus auctor est, de Elleboro albo scribens *Lib. 9. hist. cap. 11.* his verbis. *μίσγεται δὲ πρὸς τὴν πόσιν ὅπως ἐνεμέσῃ, τὸ τῆς ἑλληβορένης σπέρμα, τοῦτο δὲ ἐστὶν ποάριον.* Id est, Miscetur autem potioni, vt vomitus bene succedat, Elleborines semen. Hæc herbula quædam est. Verùm Dioscorides *θαμνίσκον μικρὸν* vocat, id est, fruticulus paruum, exigua foliola habentem, sed *θαμνίσκος* voce sæpe is abutitur, quemadmodum & Plinius abuti potuit, hanc modo fruticem, modo herbam paruum appellans. In Asia & Græcia, inquit, nascuntur frutices, epipactis quam alij *Lib. 13. c. 20.*

ELLEBORINE, *Matth.*

Lib. 27. 9.

In cap. 104
lib. 4.ELLEBORINE,
Dodonai.

Lib. 3. c. 25.

Forma.

Locus.

Tempus.

Temper.

et Vires.

Li. 4. c. 104.

Nomina



Elleborinen vocant, parvis foliis, quæ pota contra venena profunt, sicut erices contra serpentes. Et rursus. Epipactis ab aliis Elleborine vocatur, parua herba, exiguis foliis, iocinoris vitiis utilisima, & contra venena pota. Recentiores herbarij nominis similitudine adducti, existimantēque Elleborinen Elleboro facie similem herbam esse, hi Elleboro albo, illi nigro similem herbam commenti sunt. Quare si Epipactis Elleborine dicta est, inquit Matthiolum, quod cum Elleboro nigro similitudinem habeat, ea nobis epipactis erit, quæ nascitur in Goritiensi agro, quam epipactida appellare libuit, non quod Dioscoridis Elleborine sit, sed quod Elleborum nigrum quadantenus representet foliis, floribus, atque etiam radicibus.

Alpinam Elleborinen Saniculæ & Ellebori nigri facie vocant Pena & Lobellius. Iisdem motis, umbrosis, sed altioribus & Alpini gaudet. Radice est fibris multis, ex vno nexu appensis donata, ex qua eriguntur pediculi teneri, glabri, flexiles, in quorum summitatibus folia quin-

que partita, parum crenata, Geranij columbini, aut Saniculæ diuisura: flores radiati, ex senis foliolis, gustu non ingrato, sed acriore. Quia radicem habet Elleboro nigro simillimam, Elleborum nigrum esse voluerunt. Quæ ex Dodonæo hîc picta est, Elleborum album refert, nisi quod omnibus partibus minor est. Caule est recto, foliis virgatis, Ellebori albi aut plantaginis folia referentibus, sed minoribus, flores ex caule pendent albi, in medio caui, notis luteis & purpureis, miro modo variegati, in siliquis crassiusculis semen veluti sabulum continetur. Radices huc illuc sparsæ, succulentæ, denso, ortice gustu amaro. Pratis vliginosis, locisque umbrosis & opacis gaudet. Iunio & Iulio mensibus floret. Calida siccaque est temperatura. Elleborine, auctore Dioscoride, iocinoris vitiis utilis est, & contra venena pota.

HERBA PARIS,

CAP. LI.



ERBA Paris recentiorum, & Vualupina, siue vua versa, Gallis *Raisin de renard*, Germanis *Vuolfsbeer*, Lobellio & Penæ solanum tetraphyllum dicitur, quod herba

sit quaternis foliis, cyclamino aut cucumeri haud absimilibus, credidit Fuchsius aconitum esse pardalianches Dioscoridis. At cum notæ sint hodie alię & veræ aconiti differentię, nec huic herbæ vlla venenata insit facultas, imo contra venena præstantissima ex ea parentur remedia, certum est à pardalianche longe diuersam esse. Solanum est monocoon Gesnero, aconitum monococcon Cordo, aternon

atticus

HERBA PARIS.



atticus Trago. Caule est vnico, rotundo, læui, gracili, palmum aut sesquipalmum alto, à cuius plusquam medio quaterna exoriuntur folia, decussatim aut ex aduerso sita, crucis instar, nigricantia, rotunda, oblonga, tenuia, sanguineæ simillima: totidem in caulis summitate, eodem situ, sed minima & longiuscula circa florem ex luteo herbaceum, è cuius medio purpureus vinosusque extat globulus, acino vuar similis, in quo semen album, minutum: radix longa, gracilis huc illuc summo cespitè spargitur. Siluas umbrosas & frigidiusculas septentrionales amat. Aprili mense floret, Maio semen maturat. Baptista Sardus scripsit nouisse se quosdam, quorum aliqui morborum diuturnitate, alij verò veneficiis semistulti facti erant, hoc tantum Herbari paridis semine, ad vigesimum vsque diem in puluerem hausto drachmæ pondere, pristinae sanitati omnino restitutos fuisse. Refrigerat insigniter, quare arsenici vim reprimat.

Locus.
Tempus.
Vires.

LUNARIA MINOR,

CAP. LII.



ETERIBVS ignota, aut certe nullo ab his nomine donata hæc à recentioribus Lunaria & Lunaria minor, & Lunaria racemosa dicta, à foliis lunæ crescentis modo falcatis, Gallis *Petite lunaire*, Germanis *Monkraut*. Serpit humi vnico vtrinque folio profundius diuiso, crassiusculo, vel foliis multis superne rotundis, inferne falcatis, quibus scolopendrium verum refert. è medio cauliculus exit, palmaris, ferens in summo racemosum florem ambrosiæ, aut botridis, & quadantenus ophioglossi similem, radix fibris multis constat. In scrobium marginibus & aggeribus vligine madentibus & secus vias plerumque nascitur. Maio & Iunio mensibus reperitur, deinde dèperit. Gustu sicca est admodum & adstringens, quare frigida siccaque est temperatura, ophioglossi vt quodammodo aspectu, ita facultate similis, vel efficaciori, ad vulnera optimè glutinanda, vlcera cicatrice obducenda, luxata coniungenda. Constat etiam experientia ad suppressendos menses, & ad album muliebre profluuium, mirifice hanc herbam conferre. Quidam Tragicum secundum Dioscoridis esse putant, in montibus & præcipitiis nascens, folio Scolopendrij, radice tenui, candida, Raphano sylvestri simili, quæ cruda & cocta dysentericis prodest. Constat certe folia grauiter olere inclinante ætate, vnde nomen inditum putat Dioscorides. Alia est ab herbariis Luna-

Nomina
Forma.

LUNARIA Minor,
Matth.



Locus.
Tempus.
Temper.
Vires.


Lunar. alia

Forma. ria minor nominata, siue cærulea à florum colore, & Lunaria Magorum Arabum, radice multiplici, fibrata, longiuscula, sublutea, amara, odorata, foliis multis parvis, rotundis, crassis, asaro similibus, longiusculo pediculo nixis: cauliculis surrectis, lævibus, nudis: flore violæ in caelis fastigio nitente, cæruleo, venusto, in quinque foliola diuiso, quæ extrema parte radiatim velut in exilia stamina finduntur: semine in siliquis oblongis, in tenue filum desinen-

*LVNARIA Alia minor
cærulea, Dalech.*



*LVNARIA Lutea,
Dalecham.*



Locus.
Tempus.

tibus. In niuosis montibus prouenit, etiam sub niue ipsa, ita vt niue liquata, statim exurgat. Floret mense Aprili & Maio. Quibusdam placet hanc esse Asclepiadem legendum, quæ apud Dioscoridem, *φύλλα μικρά* (non *μακρά*) *κισσῶς ὁμοία*: notis reliquis bene conuenientibus. Præterea, alia est Lunaria minor siue lutea, à Monspelienfibus nominata, quæ in pratorum & humidorum agrorum marginibus profilit, radice ferè simplici, modice fibrata, candida: caulibus tribus aut quatuor, sesquipedalibus parum aut nihil foliosis: foliis circa radicem multis, crassis, longis, per oras laciniatis, hirsutis, punctis albicantibus maculosis, gustu valde adstringentibus: flore luteo, tribus tantum foliolis constante: semine exiguo in latis vasculis Lunariæ modo, per caules sparsis, Ancyliis Romanorum non dissimilibus, velut ex rotundis discis duobus compositis, è quorum medio tenuis pilus eminet. Pena thlaspi paruum hieracifolium vocat.



ABARIA, crassula, & crassula maior, & faba crassa vulgo, Germanorū *Vundkraut*, Gallorum *Orpin*, seu *grasse*, & seu *esparisse*, Telephium Dioscoridis peritis multis esse videtur, Latinis etiam Telephium dictum. Fabaria & faba crassa, à foliorum fabæ similitudine & crassitudine. Telephium verò quod vlceribus malignis & deploratis, quibus Telephus Mysi Rex ab Achille vulneratus consenuit, quæ ob id etiam telephia vocantur, auxilietur. Cauliculum profert rotundum, spissum, fragilem, foliis vestitum crassis, carnosiss, succo plenis, portulacæ hortensii haud absimilibus: flores elegantes in vertice albos, vel luteos, vel purpureos in umbellis drabæ, radix alba est, carnosâ, tuberosâ, cōpacta. Hanc plantam Dioscorides etiam delineasse videtur his verbis. Telephium herba & caule & foliis portulacæ similis est, alas binas in singulis foliorum geniculis inhærentes habet, à radice seni septenive ramuli prodeunt, cæruleis, crassis, viscosiss, carnosiss foliis refertis: flores illi sunt lutei aut albi. Quæ Plinius transulisse videtur. scribens, Telephium portulacæ similis est, & caule, & foliis. Rami à radice septeni Octonive fruticant, foliis crassis, carnosiss. Hæc Plinius. Nasctur, inquit Dioscorides, in vineis, & locis cultis, vere. Sic crassula in vineis, cultis incultis, humidis, siluosis, & passim alibi abundat. Vere statim profilit, Iulio & Augusto mensibus floret. Præter

Nomina.

Forma.

Lib. 2. c. 181

Lib. 2. c. 13.

Locus.


Tempus.

TELEPHIVM Floribus
purpureis, Lobellij.



FABARIA Matth. & Fuch.

TELEPHIVM Purpureis, Fuch.



Telephium, quod flores albos profert & luteos, ex Fuchſio Telephiū quod purpurafcentibus floribus emicat, hic pictum damus, quod ad differētiā ſuperioris, Telephium purpurafcens appellauit. Præter flores qui in primo candidi ſunt, in hoc autem purpurafcentes, foliorum etiam colore differunt, qui in candido viridis &

TELEPHIVM *Hiſpanicum, Cluſij.*

Lib. 2. ſtirp.
Hiſp. c. 25.



Lib. 1. c. 26.
Temper.
& Vires.

TELEPHIVM *Minus
ſemper virens, Lobell.*

Lib. 8. ſim.



Pena in
Ad.

herbaſcēs eſt, in purpurafcente paulò pallidior. Cætera omnia in his ſimilia apparent folia potiſſimum, quæ fabacea proriſus ſunt, niſi quod pinguiora & craſſiora. Huic Lobellij Telephiū floribus purpureis appinximus. Aliud Telephiū Hiſpanicū Cluſius deſcripſit, quod habet duos aut tres pluriſve caules, ex radice prodeuntes, cubitales, ſucculētos, procumbentes, in quibus folia ex interuallis bina ſemper inter ſe oppoſita, vt in myrto, craſſa & ſucci plena, quemadmodum Craſſula maior, ſed maiora, & magis carnoſa: ſlos in extremis ramis quaſi umbellatim naſcitur, quemadmodum in craſſula, pallidus: radices illi plurimæ, glanduloſæ, craſſulæ radicibus ſimiles. Viua admodum eſt, adeò vt rami eius in terram depaſti, ſtatim radices agant. Naſcitur in Hiſpania, vmbroſis quibuſdam, frigidioribuſque locis. Telephium vocant Hiſpani, Cluſio craſſulæ genus potiſſimum videtur, quandoquidem cærulea folia non habet, ſed ex herbaſceo pallentia, portulacæ ſatiuæ latioris triplo aut quadruplo maiora. Præterea Lobellius Telephium aliud pinxit minus repens, ſemper vires, folio rotūdiore, flore rubro, radice fibroſa, cauliculis cepæ craſſioribus. Dodonæus craſſulam refrigerare tertio ordine, & iuſdem viribus ſemperuium præditam eſſe ſcripſit. Dioſcorides verò folia ſenis horis illita, albas vitilignes ſanare, ſed oportere poſtea hordeacea farina illinere locum. Quinetiam albos tollere cum aceto in ſole inuncta, ſed cum inaruerint, abſterguntur. Galenus verò Telephium exſiccandi & detergendi facultate eſſe, non tamen inſigniter calida. Verum in hoc forſan primi eſſe ordinis, deſiccare autem ſecundo ordine intenſo, aut certè principio tertij. Quare ad putrida vlcera conuenire, & leucas & albos cum aceto ſanare. Cum igitur craſſula detergentis exſiccantiſque facultatis minimè particeps ſit, foliaque ferat portulacæ maiora, eorū ſententiam reiiciendam eſſe cēſet Matthiolus, qui Telephium eſſe putant, quamuis illa notis multis Telephium referat. At qui medicamentorum experientiam profitentur, reſpondent craſſulam multis viribus pollere, & plura præſtare quàm quæ Dioſcorides Telephio tribuit. Præterea caliditas illi non

non deest, neque siccitas tanta, quantam Galenus & Paulus tradiderunt: nempe caliditas primi ordinis, quæ gustu vix percipitur: siccitas, cuiusmodi in semperuiuo: abstusio, qualis inest farinæ fabarum & portulacæ, quæ videtur potius lenire glutinoso succo, cum primo appulsu linguam tangit. Adhæc non solum calfacientibus, exsiccantibus & detergentibus, telephia vlcera curantur, sed etiam porionibus, pultibus, fomentis ex crassula paratis, ad acrimoniam saniei erodentis, & opus naturæ impediens rotundendam, ac cacochymiam corrigendam intus & foris. Plinius quantum ad usum contra vitiliginem attinet, à Dioscoride dissentit: scribit enim. Illinitur lentigini, & cum inaruit, deteritur. Illinitur & vitiligini ternis ferè mensibus, senis horis noctis aut diei: postea farina hordeacea illinitur. Medetur & vulneribus & fistulis.

Li. 27. ca. 13.

AVRICVLA MVRIS, CAP. LIIII.

MΥΟΣ ὠτὶς vel μυὸς ὠτὶς & μυὸς ὠτῖον Græcis, Latinis Auricula muris, *Nomina*
Gallis Oreille de souris, Italis Orecchia di topo, Germanis Mensegorlin. Diosc.
vnus myosotidos meminit. Recetiores plura fecerunt genera, omnia *Genera.*
à foliorum figura auri murinæ simili. Auricula muris, ita describente
Diosc. caules emittit ab vna radice plures, infernè subrubetes, cauos: folia oblōga, *Li. 2. c. 179.*
angusta, dorso elato, nigricantia, ex interuallis gemina, in acutum desinentia: te- *Forma.*
nues cauliculi ex alarum sinu nascuntur, in quibus flosculi parui, cærulei, velut
anagallidis: radix digitali est crassitudine: cum multis adnatis. Similiter descripta
est à Plinio his verbis. Myosota siue Myosotis lævis herba, caulibus pluribus ab
vna radice, aliquatenus rubentibus, concauis ab imo: foliis angustis, oblongis, *Li. 27. c. 12.*
dorso acuto, nigris, per interualla assidue geminatis: & tenuibus cauliculis ex alis
prodeuntibus, flore cæruleo: radix digitali crassitudine, multis capillamentis

AVRICVLA Muris,
Matthioli.



AVRICVLA Muris,
altera, Dodon.



In cap. 179.
lib. 2.

Locus.

Tempus.

Lib. 1. ca. 35.

Auricula

muris 2.

Forma.

fibrata. Quæ omnia aptissimè competunt in eam, quæ hîc ex Matthiolo appingitur. In pratis, agris, hortis, secus vias, & pæssim ferè copiosa, mense Maio floret. Dodonæus alteram pinxit, quæ plerisque Auricula muris videtur. Est autem humilis herba, quæq; sæpius per terram serpit, lanugine delicata mollique onusta, cæterum alfinæ mediæ satis similis: multos enim ab vna radice cauliculos profert, ima parte rubescens: folia longa, aspera, & hirsuta, Aures murinas apprime referentia: flosculos albos, siliquas longiufculas velut alsine: radicem fibratam. Hanc periti quidam herbarij veram Dioscoridis Elatinen esse suspicantur satis congruente historia. Nascitur enim in cultis & segetibus, ramulos quinos senosve emittit è radice dodrantes, foliis plenos, gustu adstringentibus, helxinæ similibus, hirsutis, rotundioribus. His tertiam adidcit, sed non depingit, idem Dodonæus, quæ per terram minimè serpit, sed recta inter cæteras herbas accrescit, aliis similis caulibus & foliis, sed maior & candidior, lanugine operta, ad tactû glutinosa, & perinde digitis hærente, ac si melle rigata foret. Flores ex capitulis prodeunt vt in superiore, semen in siliquulis concluditur. Hæc est Ocimoides minus albû, à nobis in Horto descriptum ac depictum. Istæ duæ quibusdam vt diximus, Auriculæ muris species esse censentur, aliis potius alsines. Est præterea Myosotis parua Dalechampii.

Ibidem.

MYOSOTIS Parua,
Dalechampii.



Myos. parua, Dalec.

Forma.

Tempus.

Temper.

Li. 2. c. 179.

Li. 7 simpl.

Li. 27. c. 12.

scoride, Desiccatur ordine secundo, inquit Galenus, cæterum nullam euidentem caliditatem habet. A quibus dissentit Plinius, qui cum iisdem planè verbis quibus Dioscorides Auriculam muris delineasset, vis ei septica, inquit, & exulceratrix, ideoque ægilopas sanat.

VERONICA MAS,

CAP. LV.

Nomina



ELEBERRIMA est apud recentiores herba quæ Veronica mas ab illis dicta est, Græcis & Latinis scriptoribus fortassis incognita, Gallicis *Veronique malle*, Germanis *Ereubreis*, & *Grundheyl*, ob mirificam sanandi vlcera ac vulnera facultatem. Dodonæus Betonicam Pauli vocat. Herba est per terram serpens cauliculis dodrantalibus, gracilibus, purpurescentibus, villosis: foliis longiufculis nigricantibus, parum hirsutis, serratis: flosculi in summitate diluti purpurei sunt: semen in loculis minutum: radix tenuis, fibrata, brevis. In marginibus agrorum & siluarum provenit. Iunio & Iulio mensibus, floribus & semine abundat. Veronicam maiorem Septentrion alium marem Fuchs. & Dodon. Lobellius vocat. Amaritudinem quandam & vehementem adstrictionem

Lib. 1. c. 17,

Forma.

Locus,

Tempus.

Temper.



VERONICA Recta
 minima, Lobelij.



les, sed densiores como siorésque spicati, corniculis, crebris succedentibus. Hac Lobellius.

adstrictionem gustu præ se fert, vt hinc calidam siccâmq; esse coniicere liceat. Mirificè ad cruenta & vetera vlcera, & vulnera sananda confert. Scabiei & omnibus cutis vitiiis medetur. Tumores in quacunque corporis parte fuerint, potissimum autem in ceruice, discutere potest. Recetiores eius vsum summopere commendant in febribus pestilentialibus, propinantes siccæ puluerem drachmarum duarum pondere cum theriace drachma ex vino meraco, ea tamen lege vt statim sudent ægri. Eadem datur potanda ex sua ipsius stillatitia aqua vtiliter contra tussim & vitia omnia pectoris & pulmonis : nam tabidos & suppuratos iuuat. Præterea aperit iocinoris & lienis obstructiones, vterum, renes & vesicam expurgat. Lobellius Veronicam marem, Matthioli Veronicam rectam appellat, foliis & flore in surrectis pedalis cauliculis, aliis non dissimilibus, sed maioribus amœrioribûsque. Huic appingit Veronicam rectam minimam, quæ vix vniâ & sesquiunciam æquat, foliis Veronicæ nostratis, aliquanto minoribus. Flosculi non dissimilis, sed densiores como siorésque spicati, corniculis, crebris succedentibus. Hac

Vires.

Nomina
Dod. lib. 1.
cap. 78.
Forma.



ERMANORVM *Leffelkraut*, & Belgarum *Lepelkraut*, idest, Herba Cochlearis huius herba cochlearia nomen fecit, Gallicè *L'Hobe aux cuilliers*, à foliorum caua rotunditate, cochlearis connexam intimamq; superficiem exprimente. Hæc foliis est latiusculis, crassis, umbilicatis, & nonnihil cauis, parui cochlearis more, ambitu interdum angulosis, oxalidis rotunda ferè similibus, sed nec tenera sunt, nec candicantia, imo duriuscula, & ex fusco viridantia: cauliculi quadatenus angulosi, palmares aut pedales: flosculi candidi, semen parvum, rubescens in siliquulis: radix tenuis, fibrata, albicans, gustu acri. In Frisia & Holandia, frequentissima secus sepes & in pratis. Aprili & Maio mensibus floret, per æstatem semen fert. Calida siccaque est herba, gustu acri, nasturtij, aut Sij cardamines. Quare sunt hodie eruditissimi herbarij qui Britannicam Plinij esse censent, quod iisdem locis reperiatur, iisdemq; viribus prædita esse comperiatur, quas Cæsaris milites, trans Rhenum promotis castris, aduersus Stomacacem edocti, à Frisii colonis experti sunt, ut ex eodem Plinio fusiùs alibi diximus. Verùm cum hæc Plinianæ descriptioni minimè conueniat, & sint multæ, ut nasturtia, & Sium cardamine eidem persimiles gustu, nec facie multum dissimiles, ad eadem viles, nullum inde certum sumi potest argumentum, quo Britannicam hanc esse probare quis possit. Quidam, inquit Dodonæus, hanc telephium Græcorum esse putant. Cochlearia in aqua decocta frequenti collutione, contra putrida oris vlcera, & cætera eius vitia summo perè efficax est. Singulari etiam remedio est aduersus oris affectum, quem Plinius Stomacacem, Marcellus Oscedinem, Holandi Frisique *Scierburch* nominant. Quod cum frequens experientia comprobaret, magno est apud Holados & Frisios in vsu, & commendatione. Isti congener est vel similis, quæ Cochlearia Anglica à Pena & Lobellio dicitur, flore, semine, & sapore, sed foliis non tam umbilicatis, aut in Cochlear efformatis, potiùs Atriplicem aut Lapathum paruum referentibus, vnciam latis, & in sesquiuncie aut vnciarum duarum longitudinem porrectis, crassis, densis, succulentis, gustu & colore superioris Cochleariæ: radice maiore. Æque ut superior laudatur ad Stomacacem. In anglia ad

COCHLEARIA, Dodon.

Locus.
Tempus.
Temper.
Pena in
Aduers.



COCHLEARIA Britanica, Lob.

Lib. ca. 178.
Vires.
Dod. lib. 1.



Tamesis fluenta, & qua Londinum præterlapsus est, & in Bristoia: sinu Occidui Oceani provenit.



Vix affirmare quis possit, fueritne veteribus cognita descriptaq; hæc herba, quæ Perfoliatum & Perfoliata hodie vocatur, quòd caulis singula eius folia perforet, & penetret, Gallis *Persefeuille*, Germanis *Durchwachs*. Ambigitur hodie à nonnullis sit ne Dioscoridis *Cacalia*. Eiusdem cotyledon à nonnullis crederetur, nisi radix obstarèt, quæ oliuæ instar rotunda non est. Perfoliata caulem mittit rotundum, gracilem, ramulis multis & tenuibus fruticantem, folia singula Perforantibus rotunda, in acutum tamen desinentia, caua, tenera, læuia, colore ex glauco virentia: flores in ramulorum fastigijs parui, inter foliola radiatim sita ex aureo pallidi: semen fuscum, radix vnica, candicans, fibrata. Inter segetes, in pratis, agrorum marginibus prouenit, & à Chirurgis in hortis colitur. Iulio & Augusto mēsis florèt, deinde semina producit. Amara modicè est, & adstringens, ex quo intelligere licet, calidam siccamq; esse. Decoctum eius in aqua aut vino, vulneribus medetur: quinetiam herbæ ipsius folia recentia trita, & imposita, cera aut quopiam alio curandis vulneribus vtili vn-

Nomina

Dod.lib.ii.
cap.93.

Fuchscap.
242.

Forma.

Locus.

Tempus.

Temper.

& Vires.

PERFOLIATA,

PERFOLIATA Longifolia,

Dodonæi.

Dalechampij.



guento excepta, ramices puerorum sanant. Eadem herba trita & cum farina vinoq; admota, prominentias vmbilici infantium reprimat. Plurimus huius apud Chirurgos vsus. Perfoliata alia longifolia cognominata, in cōuallibus altissimorū Iure cacuminum densis, vmbrosisq; siluarum solitudinibus, hominis proceritate crescit, radice nigra, crassa, dura, ex quibusdam tuberculis fibras mittente: caule simplici in virgas minimè diuiso, folijs oblongis, caulem amplectentibus, non autem vt in altera & vulgari per medium traducentibus, crassis, gustu amaris, flore è rubro nigrescente, non coronæ modo, vt in altero genere, caulis verticem ambiēte, sed ex eius fastigio prodeunte pediculis subuecto.

COTY.

Nomina

Forma.

Matthi. in
ca. 38. li. 4.
Dod. lib. 1.
cap. 25.

Locus.

Vires.

Lib. 4. c. 88.

Li. 25. ca. 13.



ΟΤΥΛΗΔΩΝ ἑτέρα & κυμβάλιον, Latine etiam Cotyledon altera & Cymbalium, & Vmbilicus veneris alter, & Acetabulum alterum, Gallis *Le petit nombril de Venus*. Folia habet vmbilico primo latiora, pingua, densa circa radicem, veluti oculum medium describentia, quemadmodum Aizoon maius, gustu adstringentia, cauliculum tenuem, & in ipso flores & semina hyperico similia, radicem verò maiorem. Quæ hîc picta est,

COTYLEDON II.

Matthioli.



COTYLEDON III.

Dalechampi.



à doctis herbariis creditur esse verus ille vmbilicus Veneris alter, foliis latioribus, crassis, ferè rotundis, in orbè circa caulem latius sparsis, vt in Aizoon maiore: caulis medius eminet tener, flosculos ferens. Montosis locis crescit, & in hortis colitur ab herbariis. Facit ad eadem, ad quæ etiam semperuium, inquit Dioscorides. Quæ in re ab eo dissentit Plinius, alioqui in delineatione magna ex parte consentiens, his verbis. Est aliud genus eiusdem (Cotyledonis) sordidis foliis, latioribus, densioribusq; circa radicem velut oculum cingentibus, asperriimi gustus, longiore caule, sed pergracili. Vfus eius ad eadem, quæ iridis. Sic omnia exemplaria habent, quæ tamen ex Dioscoride emendanda videntur, & iridis voci aizoi vox substituenda, quæ cum rursus sequatur, eam videtur aliquis perperam mutasse: est enim iris calida siccâq; facultate, Cotyledon altera refrigerante & humectante. Præterea folia τῷ γάσδι τρυφοντα vertit asperriimi gustus pro

CYMBALARIA,

Matthioli.



astringentis

astringentis gustus: & folia sordida dixit, perinde ac si *συπαρά* pro *λιπαρά* legisset. Herbarij quidam Cotyledonem aliam siue Cymbalium diuersum à superiore depingunt: radice fibris multis nigrisque capillata, foliis multis, crassis, pinguibus, longo pediculo nixis, circa radicem in orbem circumiectis, & tanquam rotundū oculi ambitum describentibus, venosis, in ambitu crenatis: caule palmum alto, villoso, tenui: flore hyperici, candido. Umbrosis & opacis siluarum recessibus, & latebris gaudet. Refrigerat & humectat vt aizoum. Saxifragiæ maiori, seu albæ persimilis est, non tamen eadem: differt enim viribus potissimum, & radicibus. Est apud Insubres vulgaris herba, quæ cum Cymbalaria vocetur, à Cymbalio videtur illis nomen duxisse, verusque esse veneris umbilicus alter. Venetiis Patavij, & vicinis pagis passim ex parietinis & maceris comæ modo dependet, cauliculis numerosis, tenuibus, lentis, tenerrimis, capillaceis, pedalibus & sesquipedalibus, è quibus folia prodeunt hederacea, laciniata, mollia, læuia, logis tenuibusque petiolis nixa: flosculi ex luteo virentes, qui è tenuissimis quoque pediculis emergentes, clauicularum modo sese implicant. Illic Pharmacopœi veri umbilici Veneris penuria & ignoratione hac herba vtuntur, iisdemq; pollere facultatibus existimant. Valere eam ad alba vteri profluvia Matthiolus affirmat, si ipsa recens sæpius in acetariis deuoretur, vt Itali solent, prima mensa.

Cotyled.
tercia.
Forma.Locus.
Temper.Cymbalaria Marth.
in cap. 33.
lib. 4.
Pet. Pen. in
Ad.
Forma.Vires.
Ibidem.

MVSCVS,

CAP. LIX.

B PYON & *μωσχον* Græcis appellatur, qui Muscus Latinis, Arabibus *Axneq*, & *Vfneq*, Gallis *Mouffe*, Italis *Mosco*, Germanis *Moos*, Sphagnō etiam Plinius vocat, item Ætius Sphagnum & Hypnum. Multiplex est Muscus: Arboreus, terrestris, saxatilis, marinus. De arboreo & terrestri hic tractabimus. Est autem Muscus præsertim arboreus, nihil aliud quàm villi, seu foliola incana minutius & profundius incisa, nascentia, & pendentia ex arboribus sine radice, sine flore, sine semine. In cedro arbore, inquit Dioscorides, populo alba & quercu inuenitur. Optimum est cedrinum, proximum populneū,

Nomina
Lib. 12. c. 23.
Lib. 1.

Genera.

Forma.

Lib. 1. c. 20.

Lib. 12. c. 23.

MVSCVS Arboreus.

MVSCVS 1. Terrestris,
Tragi.

cia maximè probatur, alij Bryon vocant; secundum locum obtinet Cyprius, tertium phœnicus. Fertur & in Ægypto nasci: quin & in Gallia non dubitauerint. Sunt enim hoc nomine etiam arborum villi, quales in Græcia videmus, sed odore præstantes. Laus prima candidissimis atque altissimis, secunda rutilis, nulla nigris. Et in insulis petrisque nati improbantur, omnesque quibus palmarum atque non suus odor inest. Galenus his addit Muscū, qui in picca arbore reperitur. Nascitur etiam in abiete, & aliis arboribus. Cæterum in eo genere quod in Italia provenit, inquit Matthioli, is nobilior & odoratior videtur, qui in larice nascitur: quare & viribus fortasse præstantior erit. Tragus aliud Musci genus facit, idē, vulgatissimum in pratis & hortis nascens, villosū, sed reliquis generibus gracilius & tenuius, ex luteo viride. Idem & recentiores alij, Muscū quoque terrestrem appellant plantam quæ longis viticulis repit, numerosissimis foliis obsitis, funiculos esse diceres, qui sæpe ad septem & octo vlnarum longitudinem protenduntur: multis vtrinque adnatis ramulis, similibus foliolis obseptis, ut picæ arboris summitates esse videantur. A Lobellio Muscus clauatus dicitur, Pes leoninus, perpe-

Li. 7. simpl.

In cap. 20. lib. 1.

Lib. 4. ca. 2. Musc. terrest. r. 1.

Forma.

Musc. terrestris. 2.

Trag. lib. 1.

cap. 189.

Forma.

MUSCVS Terrestris II.



MUSCVS Terrestris III.



ram Chamæpeuce à Cordo. Tota planta ad tactum sicca est & subaspera, colore ex viridi pallecente. Serpit humi & inter saxa Musco scatentia, nititurque; radicibus per intervalla multis, capillaribus quæ ex viticulis obsequiosis prodeunt, ut in hedera, quibus sese propagat, & gyros necit, spirasque an fractuosas multas. Iunio verò emittit ex ramusculorum fastigiis iulos ferè corylaceos, subflavo colore. Nascitur in silvis, sabulosis & inuiis locis, præsertim inter muscosos lapides. Terrestri huic Musco Tragus herbulam subiungit, quæ æstate & hyeme virens omnino satiuā sabinā refert, odore omni destituta, gustu planè amara, Musci terrestris superioris instar, luteos in cacumine iulos ferēs, qui & ipsi nullo post se relicto fructu, protinus pereunt. Quidā Plinij Selaginē esse volūt Sabine similē, Gallorū Druidis summopere laudatā cōtra omnia vitia oculorū, & omnem perniciem. Musco terrestri non absurdè subiungetur herba Græcis Latinisque veteribus forte ignota, quibusdam

Locus.

Musc. terrestris. 3.

Lib. 1. c. 189.

Forma.

Lycopod.

Dodon.

MVSCVS *Alius terrestris*
Lycopodium, Dodon.



MVSCVS *Fœniculaceus.*



MVSCVS *Terrestris denticulatus, Lobellij.*




quibusdam Officinis pro spica celtica non sine graui errore vsurpata, vulgi appellatione secutus Dodonæus *λυκοπώδιον* nominat, idest, Pedem lupinum, Gallicè *Pied de loup*, vel *Patte de loup*, Germanicè *Beerlap*, *Gurtelkraut*, & Musci quintum genus facit. Viticulis per humum serpit, foliolis veluti pilis densis admodum vestitis, radiculis in quibusdam partibus terræ infixis, & inhærentibus. Ex his enascuntur aliæ in tres quatuorve particulas fissæ, in apices candidos desinentes, lupinos vngues satis aptè referentes, producentisque cauliculos rectos, tenues, candicantes; rarioribus pilis hirtos, tenues veluti spicas ferentes, foliolis plenas, quæ flosculis candidis similes sunt. Vdis locis, & siluis vmbrosis, crescit. Muscum alium fœniculaceum vocant herbarij, quem gignunt arbores in frigidissimo Allobrogum tractu, locis asperissimis, & maxime saxosis educatæ, præsertim quercus & fagi. Nasçitur is non alterius Musci arborei modo, sed sparsim in variis arborum partibus, trunco, ramis furculis, fruticatque singulis priuatim quasi plantis: plurimi ex vna tanquam radice nigra ramuli prodeunt, duos digitos alti, exiles, in tenuissimos villos fœniculo similes diuisi. candidi, iucundum quidpiam olentes, vasculis multis lacunatis, inanibus, ramulorum vertici affixis, in ambitu hirsutis, quæ ad seminis conceptaculum natura formasse videtur, vt in Androsace, licet vacua perpetuo sint. Quasdam alias Musci varietates tradidit Lobellius. Quædam enim denticulis, & viticulis paruis sarmentosis pinnatis, compressis, arguta naturæ solertia elaborata, rependo, serpendoque innumeris flexibus implicatur. Huic alia non dissimilis ortu & modo, sed ramuli toti densissimis foliorum quasi denticulis compressis, vel squamulis. Illecebræ multò minoribus, attrectatu sericeis cõferti sunt. Est Clusij Muscus terrestris, repēs, Lusitanicus. Herbula, inquit, dodrantalibus aut interdum pedalibus repens, viticulis filo tenuioribus, numerosis, vtrinque adnatis ramulis in obliquo expansis & capillaribus, terræ inhærentibus quibusdam suis fibris. Tota integitur numerosissimis foliolis, siue squamulis potiùs tenuissimis, pulcherrima serie digestis, dilutione & pallefcète virore, & tactu mollibus quidam, sed veluti siccis, gustu adstringente, cum

Lib.3 ca.71.

Locus.
Musc. fœn.

Forma.

MUSCVS Terrestris denticulatus,
alter *Muscus terrestris repēs*, Clus.



Vires.

Lib. 1. c. 20.

Li. 6. simpl.

Cap. 93.

MUSCVS Scoparius, Lob.



Teag. lib. 1.

Cap. 89.

quadam tamen grata dulcedine. Nusquam hoc Musci genus se conspexisse ait Clusius, quàm in aggeribus vmbrosis oliuetorum, ad Colibriam vibem Lusitania, trans flumen Mádego, Latinis Munda nuncupatum. Lobellius Sommerfeti Angliæ sterilibus montibus (Mendip vernacule) vbi plumbū effoditur, nusquam magna provenit copia, in aggeribus & faxis. Est & Lobellij alius Muscus Scoparius cognominatus, Muscicorum & viorum Belgij & Frisiæ Orientalis sectator, multis dodrantalibus, pedalibus, atque etiam amplioribus ramulis, purpura aurea nitentibus, innumero cirrorum tenuium sobole comosis, è quibus singulis oriuntur capitula Lini, Ericæ aut Selaginis minora. Hæc Lobellius. Muscus arboreus vim habet adstringendi, vt tradit Dioscorides. Facit ad vteri affectus in decoctis ad infessus. Sic & Galenus. Vim habet adstringentem, inquit, inualidam: nec enim multum est frigidum, sed propinquum ferè mediis: quia videlicet & digerendi, & emolliendi facultatis est particeps, maxime quod in cedrinis lignis reperitur. Scribit Serapio, vinum epotum in quo diebus aliquot Muscus is maderit, altum somnum inducere, ventriculum roborare, vomitiones compescere, & aluum sistere. Muscus, inquit Auicenna, vtiliter cordis medicamentis inseritur, quod odoris fragrantia defectus animi iuuat. Muscus terrestris ad calculi affectus maxime commendatur: nam si vino incoquatur, eo epoto, renum calculi franguntur, pellunturque certissimo experimento. Nonnulli etiam aquam ex eo destillant ad eandem affectionem. Idem contusus & ex aqua decoctus, inflammationes & dolores, à calida causa exortos, mulcet: quare à multis vsurpatur ad podagram à calore prouenientem. In vinum vappescens pendulus impositus, breui restituit. Tantum autem Musci accipiendum, quantum vas ipsum siue paruum, siue magnum postulare videbitur.

PULMONARIA,

CAP. LX.

Nomina

Genera.

Forma.

Matth. in

ca. 43. lib. 4.

Prod. lib. 3.

cap. 71.



Vt pulmonaria nomen audit, statim aliquā cum pulmonibus similitudinem, vel insignem quādam ad iuuandos pulmones facultatem animo concipit. Plantas tres huius nominis describemus. Prima est quæ Gallis *l'Herbe aux pommons*, Germanis *Lingenkraut* nominatur. Lichen herbæ quadatenus similis, in quercuum aliarumq; siluestrium arborum caudicibus



PVLMONARIA
Maior.



dumis collium, nonnunquam & in nemoribus, solo pingui, radice longa, nigra, modice fibrata: caulibus multis ex radice ima prodeuntibus, ferè cubitalibus, ro-

caudicibus nascitur opacis præsertim siluis, aridior, ambitu latiore, supernè virefcens, infernè pallens, maculis frequentibus ita conspersa, vt effigiem pulmonis præbeat, quæ causâ nominis fuit. Vtuntur hac quidâ magis fortasse nomine quàm viriû experientia inducti ad tabem, pulmonum vlcera, & cruenta sputa. Nec defunt qui eam commendent ad vulnera sananda, ad pudendorum vlcera, & ad utrûmque muliebri profluuium. Præterea dysentericis eam exhibent, & biliosa vomentibus. Sunt quoque qui ea vtuntur ad suspiriosos, asthmaticos cum glycyrrhizæ succo, hyssopo, helenij radice, & scillino oxymelite. Vallet ad ouium & cæterorû quadrupedum tussim, & respirandi difficultatem: quomobrem pastores eam tundunt, morbosisq; ouibus mane cum sale propinant. Huic multum dissimilis est recentiori-

Pulmon.
maior.

Nomina
Forma.

bus herbariis & medicis dicta Pulmonaria, siue pulmonalis, Gallis l'Herbe aux poumons, & l'Herbe de cœur, folio buglosi, latiusculo, hirsuto, nigricante, maculis lacteis, & quibusdam nigris asperso, quibusdam in regionibus sine maculis: inter hæc cauliculi erumpunt molliores, gustu oleraceo, palmares & sesquipalmares, qui in vertice flores ferunt purpureos, & capitula in quibus nigra semina: radix longa, crassa, viscida, fibrata nigricat, gustu ingrato. Montosis, humidis opacis gaudet. Primo vere floret, mox: semen eius maturum est. Huic plantæ herbarij magnas vires tribuunt ad pulmonis vlcera sananda. Qua in re & sanguinis reiectione mirabili successu exhiberi prædicant, si decoquatur ad medias, deturq; decoctum potandum addito saccharo, vel si succus ex ea expressus in serapiû cum saccharo coquatur. Iusculis miscent folia mulierculæ, aut tusa cum ouis in placentas formant, & ad pulmonis vitia, cordisque affectus conferre prædicant. Pulmonariam minorem herbarij quidam plantam hanc vocant, alij Echium primum Plinij. Gignitur in sepibus &

Locus.
Mathi. in
ca. 48. li. 4.
Vires.

Pulmo.
minor.

Li. 25. ca. 9.
Locus.

PVLMONARIA Minor,

Dalechampij.

PVLMONARIA Gallorum:

sive Auricula muris maior, Tragi.



tundis, hirsutis, & subasperis: foliis per interualla ex caulibus exortis, longis, mucronatis, senis aut septenis in singulis caulibus, nec ferè pluribus: flore in caulium vertice coacervato, priusquam recludatur ex caruleo rubenre, cum apertus est prorsus purpureo, pulmonariæ simillimo. Alia est Pulmonaria Gallorum, quæ quamvis eo nomine donata sit, propior tamen videtur in tubaceo generi, inquit Pena, flore luteo Hieracij, in parietibus & dirutis musco obstitis, Lugduni & Mospelij, tenello cauliculo, intubaceo, palmari & sesquipalmari, gracili, è radice exiliore, betonica, non nihil fibrata. Scribit Lobellius esse Auriculam maiorem Tragi. Eius tamen icon villos nullos repræsentat, quos habet pictura Tragi, qui tradit folia humi sparsa iacere, singula Auriculam muris alpini, seu leporis exprimere, pilosa, & leuiter per ambitum incisa.

CAUDA MVRIS,

CAP. LXI.

Nomina

Dod lib.i.

cap.63.

Pet. Pen in

Aduer.

Forma.



RECENTIORIBVS perappositè *μυόσπος* vocatur hæc herba, Latine Cauda muris, Gallicè *Queue de souris*, Germanis *Tausent korn*. Humilis est herba, foliis angustis, gramineis, pollicem & sesqui pollicem altis, rigidis, gustu plantaginis: inter quæ è radice proueniunt cauliculi tenues, hosculis albicantibus, palmariis, breui marcescentibus vestiti, qui in falcatum mucronem desinunt: teretem, oblongum, muris caudæ haud absimilem, in quo semina exigua, nigricantia. Pinguibus agris & pratis gaudet. Aprili mense floret: Maio semen maturum est. Refrigerat, nec multum à plantagine viribus differt. Gustu plantaginis esse scribit Pena, Lobellius legit gustu hydropiperis.

Locus.

Tempus

Vires.

RVBIA,


CAP. LXII.



ΡΥΘΡΟΔΑΝΟΝ Græcè, quod etiam Erythrodanum & Rubia Latinè, *Pawe* & *fucalsabagin* Arabicè, *Erythrodano*, & *Rubbia* Italicè, *ferberroet* Germanicè, *Ruua* Hispanicè, *Garance* Gallicè, Officinis Rubia cinctorum. A rubore radices quo lanæ & coria tinguntur: factum est

Nomina

RUBIA SATIVA.



RVBIA, Siluestris.



illi Græcum Latinumque nomen. Dioscoridi & aliis duo sunt rubiæ genera. Vna sativa est, altera agrestis. Satiuæ caules sunt quadranguli, longi, asperi, aparinae caulibus similes, sed per omnia maiores & robustiores, folia per intervalla in singulis geniculis stellarum modo in orbem circumiacentia: flores in caulium verticibus, ex pallido lutei: fructus rotundus per initia viridis, mox ruber, postea cum maturuit, niger: radix longa, tenuis, rubra. Agrestis illi similis est, sed minor, & minus aspera tota, folia minora, numerosiora, genicula crebriora stellatim ambientia: flosculi candicant. Sic Plinius etiam describit. Sunt etiam duo genera, non nisi sordido nota vulgo, quum quæstu multo polleant. Imprimis Rubia tingendis lanis & coriis necessaria. Laudatissima Italica, & maximè suburbana, etsi omnes penè provinciæ scapeant ea. Sponte provenit, feriturque similitudine eruiiæ. Verum spinosus ei caulis, ac geniculatus est, sic enim legendum ex vetusto codice, quinis circa articulos in orbem foliis, semen eius rubrum est. Pingui fertilique solo feritur, multis regionibus, magni provenit & quæstus gratia. Siluestris ubique ferè provenit sponte in agris, & in sepibus. Floret vtrâque ætate, cuiusque tum etiam radix effoditur. Rubiam minimam addit Lobelius, quam in rupibus Vincentij non procul Bristolio Angliæ enatam legit, foliis est Herniariæ paribus mucronatis, posito rubiæ, cauliculis repentibus, sesquiunciam altis, in quibus flosculi luteoli. Radix exilis rubra, corallio concolor. Pinxit etiam Rubiam læuem Taurinensium, cui Asperulæ ritu summis cauliculis, flores cædidi, stellati, verticillatim prodeunt. Folia quaternis decussatim posita, cacubalo Plinij paria, Solano tetraphyllo minora, in cauliculis sesquipedalibus, & bicubitalibus, ex intervallis geniculatis. Frequens hæc in Pedemontium collibus Taurino finitimis. Quot in medicina usus habet rubia, tradit Dioscor. his verbis. Radix urinam ciet, quamobrem morbo regio laborantibus, cum aqua mulsæ, auxiliatur. Itè ischiadicis, & resolutis. Ducit urinam multam & crassam, nonnumquam etiam

Genera.

Forma.

Rubia siluestris.

Lib. 19. c. 3.

Lib. 3. c. 143.

Vires.

Lib. 24. C. 11 sanguinē, bibentes quidē quotidie lauari oportet, & excrementorum quæ redduntur differētiā spectare. Aduersus venenatorū morsus succū cum foliis bibere prodest. Semē exoymelite potū, lienē absumit. Apposita radix fœtus, menses, & secundas educit. Albas vitiliginēs ex aceto illita sanat. Plinius his multū lucis adfert de medico eiusdem vſu scribens. Alia res Erythrodanum, quam aliqui Ereuthodanum vocant nos Rubiam, qua tinguntur lanæ, pellēsque perficiuntur. In medicina vrinam ciet, regium morbum sanat ex aqua mulsa, & lichenas ex aceto illita, & ischiadicos & paralyticos, ita vt bibentes lauentur quotidie. Radix semēque trahunt menses,

R V B I A Minima,
Lobelij.



R V B I A Lævis Taurinensium,
Lobelij.



aluum sistunt, & collectiones discutiunt. Contra serpentes rami cum foliis imponuntur. Folia & capillum inficiunt. Inuenio apud quosdam morbum regium sanari hoc frutice, etiā si adalligatus spectetur tātum. In hoc duntaxat Plinius à Dioscoride dissidet, quod contra serpentes ramos cum foliis imponi scripsit. Dioscorides contra venenatorum morsus succum cum foliis bibi, vt videatur, in Dioscor. non legisse *θηροδμήκοις τε βοηθεί ὁ χυλὸς μὲ τῶν φύλλων ποιεῖς*, sed *θηροδμήκοις τε βοηθεί χυλὸς μὲ τῶν φύλλων ἐπιτίθεις*. Rubiæ radix, inquit Galenus, acerbæ est, & gustu amara. Itaque quæcumque agere dictæ sunt vbi eiusmodi coerint qualitates, ea omnia in hac radice luculenter conspicies: quippe cum & lienem & iecur expurget, & vrinas crassas, multasque moueat. Quin & menses ciet, & medicocriter, quæ extersionem postulant, extergit, quare vitiliginēs albas, cum aceto illita iuuat. Sunt qui eam ischiadicis & resolutis, in potu cum melicrato exhibeant.

A P A R I N E,

C A P. LXIII.

Nomina



ALDE affinis est erythrodano quæ *ἀπαρίνη* Græcis dicitur & *φιλόανθρωπος*, Gallis *Grateron*, Italis *Speronella*, Germanis *Klebkraut*. *φιλόανθρωπος* hominis amans, quod caulium foliorumque asperitate prætereuntium vestes apprehendat, perinde ac si comitatis & humanitatis gratia retinere vellet. *ὀμφαλόχαρτος* ab vmbilici similitudine, quam semē eius in medio caui refert.

APARINE.



refert. Ex quo intelligere licet in Galeni, Pauli, Aetij, Plinij exemplaribus *ἀμφαλόχαρπον*: in edo-
dose legi, pro *ἀμφαλόχαρπον*, vt rectè legimus in
Dioscoride. Aparine, inquit ille, ramos habet *Forma.*
multos, paruos, quadrangulos, asperos: folia ex *Lib. 3. c. 88.*
interuallis in orbē circumposita vt in erythro-
dano: flores albos, semen durum, album, rotun-
dum, à medio vmbilici modo leuiter concauū.
Herba ipsa vestibus adhærescit. Ab his diuersa
non sunt quæ Plinius de eadē prodidit, his ver-
bis. Aparinen aliqui omphacocarpū (ompha-
locarpum legendū esse diximus) alij philathro-
pon vocant, ramosam, hirsutam, quinis senisve
in orbem circa ramos foliis per interualla. Semē
rotundum, durum, cōcauum, subdulce. Nasctur *Locus.*
in frumentario agro, aut hortis pratisve, asperi-
tate etiam vestium tenaci. Hac est omnium cō-
sensu nostra Aparine, quæ, vt Theophratus scri-
bit, nascitur præsertim inter lentes, nobis passim
circa sepes, dumos, macerias, & in hortis. Tota
æstate floret & semen producit. Calida siccæq;
est temperatura. Succus huius, inquit Dioscori-
des, ex semine, caulibus & foliis expressus, phalangij & vipere morsibus auxiliatur:
si bibatur cum vino, aurium dolores infusus succus sanat. Herba ipsa axungia trita
excepta, strumas discutit. Eadem ferè Plinius habet. Efficax cōtra serpentes semine
ex vino poto drachma, & contra phalangia. Sanguinis abundantiam ex vulneribus
reprimūt folia imposita. Succus aurib⁹ infunditur. Galeno verò modice extergit &
desiccatur, habetq; nō nihil subtiliū partiū. Huius succū, inquit Matth. valde cōmen-
dant aliqui ad recētia vulnera glutinanda, & ad papillarū rimas. Stillaritia eius aqua
datur vtiliter potanda dysentericis, sicca farina vulnera glutinat, & vlcera sanat.

Tempus.

Temper.

Vires.

Lib. 15. c. 5.

Lib. 6. sim.

In cap. 88.

lib. 3.

SPERGULA.

CAP. LXIIII.



DODONÆO & alijs Spergula di-
citur ad imitationē Spurry Belga-
rum & Anglorū, hanc herbam sic
nominantium, Officinis, & fortas-
sis antiquis incognitā. Cauliculos edit rotundos,
graciles, geniculatos, palmum altos, crebrioribus
quàm in aparine, circa ipsa genicula, foliis angu-
stioribus, stellæ modo radiatis, galij foliis simili-
bus, in summis cauliculis flosculi multi candidi
spectantur, & caliculi siue capitula sicut in lino,
in quibus semen nigricans continetur, radix gra-
cilis est, digitum longa. Vmbrosis locis gaudet,
feritur etiam in agris. Maio & Iunio mensibus
floret. Saginadis bubus & vaccis vtilissima. Qua-
de causâ Brabanti hac vere agros cōserunt, quod
eius pabulo mirificè vaccas saginari, lactisq; co-
piam augeri longa experientia compertum ha-
beant. Semen vomitu pituitosos humores edu-
cere

Nomina

Lib. 1. c. 37.

Forma.

Dodo. ibi.

Pena in

Adu.

Locus.

Tempus.

Vires.

cere plerique referunt, inquit Dodonæus: estur tamen à Gallinis & columbis, & hoc pastu oua plura & citius excludere creduntur.

LINARIA,

CAP. LXV.

Nomina

Fuch. cap.
2. 6 hist.
Dodo. lib.
1. cap 33.
Pet. Pen. in
Adu.

Forma.

LINARIA Officinis dicta, quod caule & foliis linum referat, à nonnullis Vrinalis, & Vrinaria, nominatur à vi diuretica, à qua etiā *ὄσφυρις* dicta. Vrina enim Græcis est *ὄρως*, *ὄρρος* & *ὕρως* & *ὄρρον* & *συρῶ* traho. quare cum linaria insigni facultate ducendi vrinas prædita quemadmodum *ὄσφυρις*, eique figura maxime similis sit, minimè dubitandum est, quin illa vera sit Dioscoridis *ὄσφυρις*, quæ ut tradit Dioscorides, fruticulus est niger, tenues habens virgas, agrè fragiles, in quibus foliola terna quaternæ, aut quina, aut se-

OSTRIS, Linaria.**Locus.****Tempus.****Temper.****& Vires**

Lib 4 c. 138.
Lib. 27. c. 12.

Cor. Emb.
124. lib. 4.

Lib. 8. sim.

Fuch. cap.
206.

Esula lactescit, sine lacte Linaria crescit.

Flores in summis caulibus elegantes, lutei, à fronte latiusculi clausi; os ranæ imitantes, cauda angusta & inflexa, ut in consolida regali: semen quoque in siliquulis rotundis, inclusum nigricat tantisper dum maturescit, postquam maturuerit, rubescit, senescentes quoque ramuli nigrorem in ruborè vertunt. Passim locis incultis, circa sepes,


& in agrorum marginibus. Floret potissimum Iunio & Augusto mensibus. Amara est: quare qualida, vim inesse vrinas mouendi scribunt herbarij, & stranguriæ renumq; ac vesicæ obstructionibus, singulari esse remedio, quibus facultatibus prædictam esse *ὄσφυridem* veteres testantur. Decoctum enim eius potum, inquit Dioscorides, morbo regio laborantibus auxiliatur. Plinius Smegmata mulieribus faciunt ex his radicum decoctum potum sanat arquatos. Eædem, priusquam maturescat semen, concisæ, & sole siccæ, aluum sistunt, post maturitatem verò collectæ, & in sorbitione decoctæ, rheumatismis ventris medentur, & per se trita ex aqua cælesti, bibuntur. Dioscorides radicum non meminit, quibus tum alia tum illud attribuit, quod Dioscor. toti frutici. Sed & smegmata mulieribus fieri ex ramulis Dioscorides prorsus omisit. *ὄσφυρις* herbæ, inquit Galen. ex qua fiunt & coremata, amara inest qualitas, & obstructiones impediendi faculas, quare & in iccore consistentes adiuvat obstructiones. Quæ autem hîc Galenus, & eum secuti Paulus & Aetius *κορηματὰ* vocant, alij scopas interpretantur, à verbo *κορεῖν*, quod cum non solum verrere significet, sed etiam *κοσμεῖν* & *καλλωπισθεῖν*, id est, ornare siue purgare & venustare, alij *κορηματὰ* intelligunt *κοσμητὰ*. Suida & Phauorino auctoribus, id est,

id est, comptoria, & venustantia faciē medicamenta, è quorum sanè numero Osyris est, quæ cum amara sit, extergere etiam, faciei potissimum maculas potest, vt illi *κορημα* dixerint, quæ Plinius sinegmata dixit. Ex eo autem quod ex Osyride *κορημα* id est, scopas fieri illi scripserint, colligunt nonnulli reiecta Linaria veram Osy-

Scoparia.


LINARIA Magna, Belueder.

SCOPARIA, Belueder.



LINARIA Valentina, Clusj.

Forma



ridem Italarum esse *Beluedere*, quod ad verendum sit aptior, quòd foliis crescat lini similibus amplioribus numerosiorib⁹: caule singulati, anguloso, cubito maiore, surculis plurimis fructicante: flore exiguo, rubro, semine minutulo, rotundo, è cinereo nigrescente: radicibus numerosis, densis, cappillaceis, nigricantibus. Qui formosarum plantarum aspectu delectantur, hanc serunt, & adultam alunt in ædiū fenestris, densa eius coma vmbra captantes, & nitido virore oculos recreantes, ob foliorum venustatem Itali *Beluedere* nominarunt. In aridis potius quàm pinguib⁹ luxuriat, tamē voluptatis gratia pridem colicēpit etiam in hortis nostris. Seritur & à multis ad scopas ex ea cōficiendas, vnde Scoparia à quibusdā nominata est. Quòd si eam propius inspicias, videbis folia esse longiora quàm Linaria, numerosiora, non amara, qualem tamē Galenus & Pāulus voluerunt esse Osyridem, nec iotericis ac hydropicis perutile, vt est Linaria. Quòd si ex Osyride *κορημα* id est, scopas fieri voluit Galenus, non protinus hæc scopis accommodatissima, Osyris fuerit, cum

Lib. stirp.
Hispa. 2.
cap. 32.

cum sint plurimi alij frutices, ex quibus scopæ optimæ parari possunt, qui tamen Osyrides non sunt. A Clusio Linaria alia exhibetur quam Valentinam vocat. Circa Valentiam, inquit, in pratis & locis umbrosis. Lunariæ genus crescit, vulgari multò lætius & crassius, ternos quaternosque caules ab vna radice proferens, singulares, pedales, interdum ampliores, quos folia centaurij minoris ambiunt, inferiore parte iuxta terram terno ordine disposita plerumque, superiore verò parte sparsim & nullo ordine: extremis ramis veluti spicam profert, florum luteorum Linariæ vulgari similitum, quibus tamen rectus lanuginosus est, cauda verò seu corniculum purpurascens coloris, hos sequuntur capitula, exiguis loculis similia: radice est singulari, alba. Floret Martio. Hanc appellauit Linariam, non à foliorum similitudine, quæ non conueniunt, sed quod eius flores vulgari forma similes, & eiusdem ferè sint temperamenti. Nam præmansa manifestam acrimoniam cum aliquo amarore coniunctam exerit.

VERBENACA, CAP. LXVII.

Nomina



ΕΠΙΣΤΕΠΕΩΝ Græcis, Latinis Verbena & Verbenaca, herba sagminalis, Columbaris, Columbaria, seu Columbina, ferraria, herbariis & officinis Verbena, Gallis *Verueine*, Italis *Berbenà*, *Verminacola*, Germanis

Lib. 4. c. 55.

Eisenkraut & *Eiseinhart*, id est, ferraria à ferri duritia. Peristereon auctore Dioscoride, quod columbæ in ea libenter versentur. Verbena quasi herbena teste Donato. vel potius quod ea verrendis Iouis aris vterentur, aliisque pacis & bellicue ritibus, vnde sagminalis nomen. Plinius. Sagmina in remediis publicis fuere, & in sacris legationibusque Verbenæ, certè utròque nomine idem significatur, hoc est gramen ex arce cum sua terra euulsum: hoc semper & legati vsi cum ad hos-

In And.
Terent.

Lib. 22. c. 2.

stes, clarigatumque mitterentur, id est, res raptas clare repetitum. Vnus itaque Verbenarius vocabatur. Dioscorides herbas duas περυσπεώνος nomine, quamquã diuersis capitibus comprehendit. Vnam, quæ iam dicta est: alteram quæ ἐπερβόλον nominatur, Latinè sacra herba, compositaque voce hierabotane, & Verbenaca teste Plinio, sacra quidem herba, quod ea olim apud Romanos domus pur-

Lib. 4. c. 55.
& 56.

gabantur, familiæ lustrabantur, Iouis mensa ad sacrificium & epulas verrebatur, & facialis in sacris legationibus illa coronabatur, vel, vt Dioscorides inquit, quod in expiationibus suspensa & illigata mire utilis sit. Herbarij hanc περυσπεώναν ὑπαιον,

Genera.

Lib. 25. c. 9.

id est, Verbenacam supinam, quod semper humi supinè procumbat, illam superiorem περυσπεώναν ὀρθιον, id est, Verbenacam rectam nominarunt, quod rectis ramulis semper assurgat, cum contra hæc supina siue strata & humilis potius dicenda sit, illa veriùs recta, quod rectis ramulis & pluribus adolescat. Plinius à sexu duo genera constituit, marem, rectam, vt aiunt sceminam supinam vocans. Verba hæc sunt. Nulla Romanæ nobilitatis plus habet quàm hierabotane, aliqui peristereona, nostri Verbenacam vocant. Hæc est quam legatos ferre ad hostes indicauimus, hæc Iouis mensa verritur, domus purgantur, lustranturque. Genera eius duo sunt, foliosa, quam sceminam putant: mas, rarioribus foliis. Ramuli vtriùsque plures, tenues, cubitales, angulosi: folia minora quàm quercus angustioraque, diuisuris maioribus, colos glaucus, radix longa, tenuis. Nascitur vbique in planis aquosis. Quidam non distinguunt, sed vnum omnino genus faciunt: quoniam utrâque eisdem effectus habet. Hæc Plinius. Fuchsius duo Verbenacæ ponit genera, Verbenacam rectam siue marem, Verbenacam supinam siue sceminam. Dodonæus etiam rectam & supinam, sed hanc duplicem, marem scilicet & sceminam. Matthiolus cum duo itidem genera posuisset, supinam, vulgarem Verbenacam, & legitimam Dioscoridis ἐπερβόλον esse affirmat, rectam verò quæ per-

Lib. 25. c. 9.

Cap. 225.
hist.

Lib. 1. c. 84.

In cap. 55.
& 56. lib. 4.

istitereon

ristereon prior est Dioscoridis, quæq; vnico tantum caule, & vnica radice constat: nusquam se vidisse ingenuè fatetur, quæ notis omnibus legitimam referat, etsi nō desint qui eam esse velint quam inter sideritidas primo loco depinxit. At quum hæc ab vna radice plures edat caules, etiam sesquicubitales, folia haud subalbican-

VERBENACA vulgaris
Math.



VERBENACA Recta
sive mas, Fuchsj.



in marrubio, denique cum nihil habeat Verbenacis simile, eorum sententiæ minimè subscribit. Idem ait à se obseruasse iis in locis quæ Verbenacæ plurimum sunt feraces, quasdam plantas, quæ caules rectos edere, quasdam humi ferè procumbere, vt hinc fortasse differentiam sumpsérint ij, qui Verbenacam in rectâ & supinam diuiserunt, Plinio quoque his suffragante, qui à quibusdam hanc non distingui, vnumque omnino genus esse scripsit, quoniam vtrâque eodem effectus habeat, Id quod est à Dioscoridis sententia alienissimum, qui alteram ab altera figura, natalibus, nomenclatura, facultatibus distinxit, vt facile perspicitur qui vtriusque historiam diligentius expenderit, his verbis explicatam. Peristereon siue Verbenaca nascitur in aquosis locis. Ex eo nominata esse videtur, quod columbæ in ea libenter versentur. Herba est palmi altitudine, aut etiam maior: folia incisa sub albida è caule prodeunt: singulari plerumque ramo, ac radice reperitur. Sacra herba quam peristereona vocant, virgas emittit cubitales aut etiam maiores, angulosas, circa quas folia sunt ex interuallis, similia quernis, sed angustiora & minora, per ambitum incisa, subglaucâ, radicem habet oblongam, tenuem: flores purpureos, tenues. Hæc igitur ramulos multos producit, cubitales aut maiores, folia subglaucâ. Illi dodrantalis est & vnus è singulari radice caulis, folia *ὑπερβοχæ*, natales aquatici. Iam verò si vires ab auctoribus traditas perscruteris, eas diuersas esse comperies. Peristereonis folia cum rosaceo aut adipe suillo recenti imposita, inquit Dioscorides, vteri dolorem eximant. Herba cum aceto imposita erysipelata reprimat, putredines coerces, vulnera glutinat, & vetera cum melle ad cicatricem perducit. Hæc autem efficere siccando & adstringendo auctor est Galenus, scribens, peristereon vim habere adeò desiccantem, vt vulnera glutinet, assentiente etiam Paulo his verbis. Peristereon adeò desiccatur & adstringit, vt vulnera glutinet, & sanguinis profluium sistat. At communis Verbenacæ siue Sacræ herbæ folia, & radix pota cum vino, aduersus ser-

Dios. lib. 4.
cap. 55.

Locus.

Forma.

Dios. libid.
cap. 56.

Vires &

Temper.

Lib. 4. c. 55.

Lib. 3. sim.

Lib. 7.

pentes valent. Eadem drachmæ pondere cum thuris obolis tribus in vini veteris, hemina quadragenis diebus ieiunis bibuntur, contra regium morbum. Veteres tumores & inflammationes imposita mitigant, & sordida ulcera purgant. Tota in vino decocta, tonsillarum crustas abrumpit: oris nomas gargarissatu sistit. Aiunt si aqua spargatur triclinium qua maduerit, latiores compotores fieri. Datur in tertiana bibendum tertium à terra geniculum cum circumpositis foliis, in quartana quartum. Hæc igitur Verbenaca siue sacra herba non modo cœdemata antiqua & tumores non sistit, vt illa, & mitigat, sed & tonsillarum crustas abrumpit & exsiccat, nimirum calfaciente vi, qua etiam capitis dolores chronicos discutere ex frigiditate & crassis humoribus tradidit Galenus, his verbis. Omnium verò longe maximè discutit, & perfectè corroborat, Verbenaca recta, maximè viridis, imò & arida cum radicibus, & simul cum serpillio oleo incocta. Coniicienda etiam ad ea crocodiliadis, maximè iuxta aquas nascentis radix. Quin & ipsam per se Verbenacam si oleo incoxeris, oleoque inde rigaueris, omni capitis dolori antiquo, ex frigiditate aut ex crassis humoribus oborto mede-

Lib. 2. com
po. ph. loca

HERBA SACRA *Quorundam,*
Dalechampj.

VERBENACA *Recta,*
Dodonæi.



Sacra her-
ba alia.

Forma.

ris. Herbarij quidam pro Sacra herba aliam exhibent, quæ in nemoribus & siluis provenit, radice tenui, longa, multifida: caulibus ternis, aut quaternis, angulosis: foliis per intervalla vtrinque æqualiter dispositis; quercui similibus, minoribus, pariter incis, ex quorum alis pediculi nonnumquam exeunt terna gerentes folia minora: flos ruber, candicans, ad tres vel quatuor superiores foliorum sinus, emicat ex calice virente oblongior, amœnus, Lamij lutei, semen in oblongo loculo affixum, vt in Ormino. Hanc pro Melissophyllo Fuchsj Lobellius pinxit, sed fallitur, opinor, nam Fuchsius pro Melissophyllo ostendit Calamintham monatanam præstantiorem eiusdem Lobellij, quemadmodum in Libro de Odoratis cap. De Melissa monuimus. Verbenaca recta Dodonæi caule est recto, pedali & maiore, ramulis multis fruticante, in quibus flosculi cærulei: folia viridantia, crenata,

Lib. 1. c. 84.

Forma.

crenata, & quadantenus incisa: radix brevis, multum fibrata. Ea videtur esse Verbenaca supina siue fœmina à Fuchſio depic̃ta. Verbenaca supina mas & Hierabotane eiusdem Dodonæi cauliculos fert teneros, hirsutos, angulosos, humi repentes, pedem longos, atque eo longiores: folia quadantenus rotunda, in am-

Cap. 225.
hist.

Sacra her.
mas Dod.

Forma.


HIERABOTANE Mas,
Dodonæi.



HIERABOTANE Fœmina,
Dodonæi.



VERBENACA Supina &
tenuifolia, Clusij.



bitu crenata, quercus aut chamædryos foliis similia, his maiora, illis minima: flores elegantes, caruleos in ramulis: folliculos latiusculos, radicem fibratam. Fuchſius hanc nomine chamædryos vulgaris fœminæ depinxit. Altera Dodonæi Verbenaca supina, siue Hierabotane fœmina, superiorem valde refert cauliculis, foliis, floribus, sed huius cauliculi rotundiores, folia paulò minora, ramuli plures ex vna radice, flores magis coaceruati. Fuchſius pro chamædryo vulgari mare depinxit. Clusio alia est *ἱερὰ βοτάνη* id est, Sacra herba, & *περὶ σφεδῶν ὑπὸ ἰσίοις* id est, Verbenaca supina, cui quaterni aut quini sunt cauliculi, angulosi siue quadranguli, vti in vulgari Verbenaca, tenuiores tamen, supini & in terram procumbentes: folia vulgari colore similia, & ex viridi cæſia, sed magis incisa & multifida: flos in summis virgis vulgari similis ex caruleo purpureus, minor tamen: semen idem: radix tenuis & vulgari similis. Agro Salmaticensi frequens, & quibusdam aliis Castellæ locis, vbi minor & exsucca: & decliuibus fluminumque ripis,

Cap. 333. hi.
Sacra her.
fœmina
Dodon.
Forma.

Ibidem.
Lib. 2. stir.
Hispa. c. 45

præsertim verè ad flumen Thormini quod Salmanticam, & Albam vrbes alluit, vbi maior & vegetior. Florebat istic Iulio & Augusto : deinde semen ferebat. Eiusdem est cum vulgari, temperamenti, quare ad eadem utilis, & aliquanto forte efficacior.

CIRCAEA,

CAP. LXVIII.

Nomina

Pena in
Ad.

Lib. 3. c. 117.

Forma.



ΙΡΚΑΙΑ & *Supragia*. Græcis, Circaea & Dircaea Latinis dicitur.

Circaea fortasse quadam cum mandragora virium similitudine : nam mandragoras Circaea nominata fuit, & forsan vtriusque ad amatoria vsus, id quod de mandragora Dioscorides scripsit. Circaea, inquit idem, tolla habet hortensi solano similia, propagines multas, flores nigros, mul-

CIRCAEA, Dalech.

Locus.

Lib. 27. c. 8.

Pena in
Adu.

Vires.

Lib. 3. c. 117.

Lib. 27. c. 8.

Lib. 7.

Lib. 7. sim.

CIRCAEA, Dalech. Germanis *Gelenger ioleber*, de quo alio in loco. Circaea radix minarum quatuor pondere tusa, inquit Dioscorides, & diem & noctem macerata in vini dulcis heminis sex, & triduum pota vterum expurgat. Semen in sorbitionibus sumptum, lac attrahit. Plinius. Diluitur in vino, bibiturque ad dolorem vulvæ, & vitia. Macerari oportet in sextariis tribus quadrantem radicis tusa, per noctem & diem. Detrahit eadem potio & secundas. Semine lac minuitur in vino, aut multa aqua poro. Sed in hoc is à Dioscoride dissentit, quod quadrantem radicis tusa macerari iubet, Dioscorides quatuor minarum pondus, quod fortasse etiam æquo maius est. Quod verò semen lac minuere dixit, planè contrarium est ei quod Dioscorides habet. γάλα χαλασπά, lac attrahit, hoc est γάλα γεννά vt Paulus ait. Et Galenus ex Dioscoride scribit semen Circaea in sorbitione exhibitum ad lactis generationem conducere. Quidam Plinij locum hunc sic legunt, semine lac movet, vino aut multa aqua pota.

HERBA

HERBA MORA,

CAP. LXIX.



H TALIS plantam istam herbam moram *Forma.* vocant, quæ secus vias nascitur, folio absinthij, tenuiore, nigriore: flore in summis ramis & caulibus exiguo, luteo, copioso, folia trita & imposita vlceribus inueteratis *Vires.* mirificè mederi aiunt.

CHAMAEROPS, CAP. LXX.

CHAMAEROPS hæc videtur esse, quæ in *Forma.* siluosis gignitur, radice crassa & multiplici, caulibus multis & cubitalibus, foliis myrti circa caulem geminis: flore copioso, & foliorum sinibus nascente, semine in oblongis vasculis. Eosdem effectus lateris doloribus habet Chamaerops, inquit Plinius myrtes circa *Lib. 6. c. 2.* caulem geminis foliis, capitulis Græculæ rosæ ex vino pota.

ANTIRRHINUM, CAP. LXXI.

CHAMAEROPS,
Plinij.



AΝΤΙΡΡΙΝΟΝ & ΑΝΔΕΡΡΙΝΟΝ, Græcis, Theophrasto etiam ἀντιρρίνον, nisi locus mendosus sit, Latinis similiter Antirrhinum, Cynoccephalis Apuleij, Germanis *Orant,* Gallis *Mouron violet,* cuius insignis nota, nempe narium vituli similitudo quam semen refert, fecit ut hæc herba innotuerit. Sed cum aliquot sint plantæ *Nomina* quarum semina aut potus caliculi seu capitula quibus semina includuntur, vitulinam faciem aut quid simile expriment, herbarij diuersa fecerunt antirrhina. Matthiolus scribit se quatuor obseruasse antirrhini genera, quibus omnibus capita nascuntur, quæ semen minutum continent, vitulinis admodum similia, quæ non nisi magnitudine differunt: Dodonæus duo, vnum maius alterum minus. Et sanè varia est *Genera.* apud veteres antirrhini historia. Theophrastus aparinæ simile facit, Dioscorides anagallidi, quædam eius exēplaria lychnidi, vnde lychnis siluestris nuncupetur, Plinius lino, nisi mendosi sint codices. *Lib. 9. hist. cap. 22.* Antirrhinum, inquit Dioscorides, alij anarrhinum, quidam lychnida siluestrem vocant. Herba est caule & foliis anagallidi similis, flores sunt purpurei, similes leucoio, minores tamē, ideoque siluestris lychnis *Forma.*

nominata est, semen fert vituli narium simile, ruseum aspectu. Græca enim exemplaria habent ῥόδιον ἰσίδιον, quod ab interpretibus omnibus omissum fuit. Est autem ῥόδιον idem quod ruseum & russum Latina voce Græcis vsurpata. Sic Paulus anagallidem ῥόδιον ἀνθος ῥύσσον dixit. Plinius, Antirrhinum vocatur siue anarrhinum, *Lib. 7. c. 11.* *Lib. 25. c. 10.*

ANTIRRHINVM,
Math.Lib. 9. hist.
cap. 12.Antirrh.
mag. Dod.
lib. 2 c. 27.

Forma.

bina semper ex aduerso vt in Anagallide. Circa summos ramulos flores spectantur longiusculi, & parte anteriore lati oris, ramæ figura, linariæ floribus non multum dissimiles, sed maiores, & pediculos carentes, in pallido lutei, quibus suboriuntur calices longi & rotundi, caput, oculos, nares, denique hiatum oris vitulini expri-

ANTIRRHINIMA II.


Math.



siue lychnis agria, similis lino, radice nulla, flore hyacinthi, semine vituli narium. Ex hoc perunctos venustiores fieri, nec vlllo malo medicamento ledi posse, aut veneno, si quis in brachiali habeat, arbitrantur magi. Similiter ea quam Eupleam vocant, traduntque ea perunctos commendatioris esse famæ. Theophrastus, *Ἐὐκλείαν γὰρ φασὶν ἀεὶ ποιεῖν ὁ ἀντὶ ῥῖνον χαλόμενον. τοῦτο δὲ ὅμοιον ἐστὶ τῇ ἀπαρὶνῇ ῥίζᾳ διὰ ἃ ἔχ' ὑπερσιν. ὁ δὲ καρπὸς ὥσπερ μόχθος ῥίνας ἔχει. τὸν δὲ ἀπὸ τῆς ἀλειφόμενον ἐὺ διοξείν.* Id est, Aiunt Antirrhinum gloriam perpetuo parere, id aparinæ simile est, radicem non habet: semen vituli naribus simile, eo perunctos gloriam consequi. Qui locus à Plinio conuersus est, & corruptus, quoniā mendose Euplea pro Euclea legitur, & *Ἐὐκλείαν* non herbam facit Theophrastus, sed Antirrhinum ad *Ἐὐκλείαν* conducere ait, & eo perunctos *ἐὺ διοξείν*, Dioscorides *ἐπὶ ἡχαρίν ποιεῖν*, quod Plinius dixit venustiores fieri. Antirrhinum magnum Dodon. cauliculos fert rectos, rotundos, ramosos, folia nigricantia, longiuscula & latiuscula, à foliis anagallidis non multum distantia,

ANTIRRHINVM III.

Math.




mentes,

Matthioli.

ANTIRRHINUM

Magnum, Dodon.



mentes, quibus semen concluditur. Est & aliud magnum Antirrhinum, foliis longis & angustis, osyridis ferè similibus, floribus roseis, aliquando candidis, cætera præcedenti simile. Antirrhinum paruum eiusdem, caput simiæ quorûdam,

ANTIRRHINUM
 paruum, Dod. siue Orontium.



cauliculos habet tenues, teneros, non ita ramosos: folia longa, angusta: inter hæc & cauliculos flosculi oriuntur rubri, superioris similes, multò tamen minores, deinde capitula rotunda, membranacea, vituli aut simiæ caluariæ prorsus similia, quæ semen continent. Quartum est Antirrhinum Matthioli. Istud Archigenis ὀρνθίων esse multis creditur, cuius meminit Galenus, pharmaca recensens ab Archigenæ ad ictericos conscripta. Herbam orontium, inquit, coquito, & cum decocto lauato, & decoctum confestim viride reddes. Qui locus Cornario diu suspectus fuit, donec tandem in eam opinionem venerit, orontium herbam nullam aliam esse quàm origanum, & fortasse etiam ὀρνθίων pro ὀρνθίων esse legendum. Antirrhinum vtrumque in cultis & incultis nascitur, colitur etiam in hortis. Magnum Iulio & Augusto mensibus, paruum Iulio floret. Narrant id appensum, inquit Dioscorides, veneficii aduersari. Galenus similis esse cum bubonio facultatis scribit. Auctor est Matthiolus illini Antirrhini folia, flores etiam & semen cum

Antirrh.
 paruum,
 Dod. ibid.
 Forma.

Lib. 9. ph.
 local. ca. 9.

In cõmen.

Locus.

Tempus.
 Vires.

Li. 4. c. 12. 8.
 Li. 6. simpl.
 In cap. 12. 8.
 lib. 4.

Antir. Tra.
Lib. I. c. 118.

rosaceo & melle ad vteri praefocationes, & mensium difficultates. Herbam scorpiionibus adeo contrariam esse, ut illico ea visa torpescant, eandem fronti alligatam praestare ad delendas oculorum albugines. Tragus pro Antirrhino Reseda speciem depinxit & descripsit, his verbis. Id incultis, areis, limitibus agrorum, &

ANTIRRHINUM,

Tragi.



Temper.

esse temperaturæ iudicat Tragus. Quidam herbarij herbam istam phyteum esse volunt.

LEONTOPODIUM,

[CAP. LXXII.]

Nomina



In Coroll.
132. lib. 4.

Li. 4. c. 126.

Forma.

T. 2. c. 49.
Li. 3. cap. 10.

LEONTOΠΟΔΙΟΝ Græcis, similiter Latinis Leontopodium dicitur, & pes Leoninus, propter villosam foliorum & florum effigiem: crus pedi annexum aliquatenus referentem, & κήμος, Cimos ut inter Dioscoridis supposititia habetur. Sic autem videtur appellari auctore Hermolao, ex floris siue calicis figura, quoniam pyxidula Athenis ita nominabatur, per quam suffragia in subiectum vasculum quod cadiscum vocabant, demitti consueuerant. Duum digitorum herbula est, inquit Dioscorides, folia ferens angusta, longitudine ternum quaternumve digitorum, hirsuta, ad radicem lanosiora, & subalbida. In summis caulibus capitula sunt velut perforata, in quibus flores nigri: semen autem eius vix conspici potest ob circumfusum ipsi lanuginem: radix subest parua. Leontopodium istud non est herba quæ vulgo herbariorum Pes Leonis, Planta & Pata Leonis, Alchimilla & stellaria dicitur, sed auctore Lonicero quæ hinc depicta est, quam Ruellius, inquit, vulgo cruciatam vocari putat, diuersam tamen ab eacruciata de qua diximus. Humi dicit eam serpere, digitali longitudine, folio angusto, longo ternos ferè digitos, hirsuto, ab radice lanoso, & canescere: in cauliculorum cacuminibus capitula tanquam pertusa, in quibus flosculi dehiscunt nigricantes: semen spissa ocululorum lanugine, ut vix conspici queat, radice exili. Aliud Leontopodium exhibuit Matth. herbula duum ternumve digitorum, fo-

LEONTOPODIUM

Loniceri.



rum, foliis angustis, hirsutis, aversa parte canescentibus, iis præsertim quæ circa radicem sunt: capitulis in summo caule quasi foraminibus distinctis, floribus nigricantibus, semine densa, lanugine obuoluto. Ex Baldo monte misit Calzolarius. Idem opinor pinxit Lobellius, nonnihil tamen diuersum videtur, qui paruum Leontopodium adiecit, effigie totoq; habitu superiori simile, singulari dodratali cauliculo, & folio Gnaphalii montani, densa lanugine incauis: flosculis summo caule in luteo pallentibus, Gnaphalii montani, exili ligneaq; radice. Hæc Lobellius. Aiunt hanc ad amatoria philtrea commodam esse, inquit Dioscorides. Eam ob causam Cemos Plinij Leontopodium Dioscoridis esse creditur à doctis: sic enim ille. Eadem ex causa & Cemos silebitur nobis. Dixerat autem antea catanancem describi superuacuum esse, quum sit eius vsus ad amatoria tantum. Eadem fortasse de causa neque Galenus, neque posteriores eius meminerunt. Affirmat Marcellus Vergilius vidisse se antiquissimos & optimos Græcorum Codices, in quibus nō Leontopodium, sed Camos huius capitis titulus erat. Et habere se vetustissimū

Vires.

Li. 27. ca. 8.

Longobardis literis scriptum Latinum Dioscoridem, in quo pariter non Leontopodiū, sed Camos est, eadem vniuersa prorsus historia. Sola in Græcis & Latinis tituli capitis, & plantæ appellationis diuersitas est, magno argumento non

LEONTOPODIUM,

Matthioli,



LEONTOPODIUM

paruum, Lobel.



differre

PSEVDOLEONTO-
podium, Matthioli.

Li. 16. ca. 8.

Ibid. ca. 14.

Ibid. ca. 11.



differre Leontopodium à Camo, nisi sola appellatione. Ac ut idem sit Cemos Plinii & Leontopodium Dioscoridis, certè Leontopodium huius ab illius Leontopodio plurimum distat. Sic enim scribit Plinius. Leontopodium alij Leuceoron, alij Doripetron, alij Thorybetron vocant. Cuius radix aluum sistit, purgátque bilem in aquam mulsam, addito pondere denariorum duùm. Nascitur in campestri & gracili solo. Semen eius potum lymphatica fomina facere dicitur. Et rursus. Leontopodij semen tritum in aqua, & cum polenta illitum, spicula sagittarum extrahit. Et alio in loco. Omnia corpori infixæ extrahunt, folia tussilaginis, daucum, semen Leontopodij tritum in aqua cum polenta. A superioribus differt planta quam ex Matthiolo hîc exhibemus, passim in Bohemia proveniens, quæ etsi longiore sit caule, omnes tamen Leontopodij notashabet, inquit Matthiolus. Ideo Pseudoleontopodium appellat. Lobellio est Chrysocome Germanica, Heliochrysos silvestris Trago.

CHAMÆMELVM SILVESTRE, CAP. LXXIII.

Nomina



NŒMIS vulgaris siue silvestris, & χαμαίμελον vulgare siue silvestre dicitur ab herbariis, ut discernatur ab Anthemide vera & quæ fertur in hortis. Vulgo & Officinis Camomilla, Gallis *Camomille vulgaire*, Germanis *Chamill* & *Chamillen*. Eius genera aliquot ab herbariis

Genera.

CHAMÆMELVM Sil-
vestre, Matth. siue Anthemis.

Lib. 2. cap. 30.

Forma.

Cotula fœ-
tida.


Nomina

Forma.

obseruata sunt, quorum tria hîc ponemus ex Dodon. Primum Chamæmelum vulgare siue silvestre albû, cauliculis tenuibus, duris, lentis, foliolis teneris, minutim incis: floribus in singulorum summitatibus, luteis in medio, foris foliolis candidis in orbem adjacentibus, veri hortensis Chamæmeli leucantheri prorsus similibus, odoris iucundi, non tamen adeo suauiter, neque adeo vehementer fragrantis atque in hortensi Chamæmelo. Secundum genus est quæ hodie herbariis & Officinis Cotula fœtida nominatur, Thuscis Cauta, vnde diminutivum Cautula, tandem corrupta voce Cotula, fœtida autem à graui eius odore, quibusdam Camomilla fœtida, & Græcè *κωκώθεμος*, & *κωκοζών*, id est, Camomilla canina, Germanis *Krottendill*. Cauliculis est crassioribus, viridibus, succosis, teneris: foliis latioribus & viridioribus quam Chamæmeli vulgaris: floribus illi valde similibus, nisi quod media depressiora sunt & latiora. Tota herba insuauiter ingratoq; est odore, gustu amaricante. Hanc partheniū esse

CHAMAEMELVM

Silueſtre, Dodon.



Experientia tamen docuit aduerſus colicum dolorem, & renum calculum plurimum valere, lotium ciere, eodem modo quo chamamelum hortenſe uſurparum. Quod ex eo oleum conficitur, dolores omnes, attrita, contractiones, duritias ſanat, non aliter quam oleum ex chamamelo hortēſi paratum, eoque vtilius

COTVLA Fetida,

Dodonai.



eſſe Leptophyllum doctiores cenſent, cuius meminit Hippocrates, & de præputio puſtulas thymiæ deducere ſcribit. Tertium genus Cotula non fœtida vocatur, & Camomilla fatua, & Camomilla ſeu Cotula inodora, cauliculis gracilibus, teneris, lentis, multis ex vna radice prodeuntibus: ſoliis longioribus, maioribus, & candidioribus quam chamameli vulgaris, inodoriſ: radice craſſa, multum fibrata, quæ hyeme non deperit, ſed quotannis regerminat. Hanc pro buphthalmo depinxit ac deſcripſit Fuchſius. Hæc tria genera in agris luxuriant, iuxta ſemitas, & in hortorum ſepibus. Iunio menſe totaque æſtate florent. Chamamelum vulgare ad calidum & humidum vergit, & à chamameli veri temperamento parum differt. Cotulam fœtidam calidam ſiccâque eſſe, odor ſaporque demonſtrant. Cotula inodora moderate calida eſt, & ad chamameli vulgaris temperaturam quadamtenus accedit. Quemadmodum autem chamamelum vulgare temperie, ita facultatibus & viribus ſimile eſt, niſi quod illius imbecilliores ſunt, nec adeo efficaciæ.

Lib de Vicerib.
Cotula nō fœtida.

Nomina

Forma.

Cap. ſz.
hiſtor.

Locus.

Tempus.

Temper.

COTVLA Non fœtida,

Buphthalmum Fuchſij.



febrie

febricitantium enematis immiscetur. Cotula fœtida vtero prolapsa, aut in alteram partem conuerso mirè succurrit, si eius decocto ægrotae pedes lauentur: item vteri præfocationi si aut edenda, aut odoranda præbeatur, in hoc muliebri malo castorij viribus proxima.

CEPÆA,

CAP. LXXIIII.

Nomina

Lib. 3. c. 150.

Forma.

Vires.



ΚΗΠΑΪΑ sic Latinis Cepæa dicitur. Portulacæ similis est, inquit Dioscorides, sed nigriora habet folia, & radicem tenuem. Folia in vino pota vrinæ stillicidio & scabiola vesicæ auxiliantur: maximè autem hoc faciunt, si eam decocto asparagi myacanthini bibantur. Eadem ferè Plinius tradit, sed locus in vulgatis exemplaribus corruptus est, sic enim

Li. 26. ca. 8.

CEPÆA, Matthioli.

Embl. 151.

lib. 2.



Lib. 5. c. 22.

habet. Vel magis cepæa similis portulacæ: quæ ex veteris codicis vestigiis sic emendat Cornarius. Vesicæ malis medetur cepæa, similis portulacæ, nigriore radice, sed inutili, nascens in litoribus arenosis, gustu amara. In vino cum asparagi radice vesicæ plurimū prodest. Plantam hinc positam Matthiolus cepæam esse asseuerat, Venetiis ad se missam, nulla tamen adscripta nota vel figura, vel facultatum, vel locorum, vt Cepæa Dioscoridis adamussim conuenire probet. Dodonæus pro Cepæa anagallidem aquaticam seu Germanorum *Becabugam* exhibuit. Aliis videtur Cepæa nihil aliud esse quàm hortensis portulacæ species, id quod vel *κνπαλα* testatur & eadem hortensis portulacæ figura, vna aut altera nota radicis & coloris foliorum additis. Præterea eadem quæ satiuæ portulacæ facultates. Lobellius accuratius Cepæam pinxit, & descripsit. Teretibus pedibus & sesquipedalibus, numerosis, reptantibus surculis fruticat, Semperuiui minoris stellatis flosculis albis confertis. Foliola minora, portulacæ agrestis, angustiora & longiora, tenera, carnosa, succo prægnantia. Radix exilis. In Belgij viretis luxuriat, Patauio delata. Hæc Lobellius.

nera, carnosa, succo prægnantia. Radix exilis. In Belgij viretis luxuriat, Patauio delata. Hæc Lobellius.

ASTRAGALVS,

CAP. LXXV.

Li. 4. ca. 57.

Forma.



ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΣ Latinè etiā Astragalus: paruus est, inquit Dioscorides, à terra frutex, folijs & ramis ciceri similis: flores sunt purpurei, parui, radix rotunda, raphani modo grandis, propagines habens solidas, nigras, duras veluti cornua, inter se implicatas, gustu adstringentes. Nascitur in locis ventosis, vmbrosis & niuosis: multa in Phæneo Arcadiæ, (ita legunt Galenus, Paulus, Oribasius, Plinius, vt corrupta sint Dioscoridis exemplaria, in quibus pro ἐν φαινεῷ legitur ἐν μεμυρίδι τῆς ἀρχαίας.) Radix in vino pota aluum sistit, vrinam mouet: facit & ad vetera vlcera, arida inspersa: sanguinem supprimit. Difficile tunditur propter soliditatem. Hæc Dioscorides. Galeno frutex est paruus, radices habens adstrictorias: quam obrem etiam ex numero est non instrenuè desiccantium: vlcera vetera glutinat, aluum fluidam sistit, si quis in vino decoctam radicem bibat. Plurimus huius prouentus est in Phæneo Arcadiæ. Eadem Paulus

& Oribasius

Locus.

Vires.

Li. 6. simpl.

& Oribasius habent, Galenum secuti. Plinius aliter quidem describit, sed easdem vires attribuit his verbis. Astragalus folia habet longa, incisuris multis, obliquis circa radicem: caules tres aut quatuor foliorum plenos: florem hyacinthi, radices villosas, implicatas, rubras, præduras. Nascitur in petrosis apricis, & iisdem niualibus, sicut Phæneo Arcadiæ. Vis ei ad spissanda corpora: aluum sistit radix in vino pota, quo fit ut moveat urinam percussio liquore, sicut pleraq; quæ aluum sistunt: sanant & dysentericos in vino rubro tusa. Difficile autem tunditur. Eadem gingivarum suppurationi utilisissima est: foris colligitur exitu Autumni, cum folia amiserit. Siccatur in umbra. Pro Astragalo plantam hanc appictam Matthiolus olim proposuit, quæ frequens nascitur in agro Tridentino, in vallis Ananiæ montibus, folio ciceris maiore, floribus purpureis, radice raphani æmula, adnatis appendicibus firmis, nigris, præduris, inter sese implicatis, & gustu adstringentibus. In ultimis verò editionibus planta diligentius inspecta, cum quædam in ea desiderari perspexisset, quæ Astragali sunt propria, sententiam retractavit. Herba ij quidam Astragalum purpureum esse statuunt hanc expressum, qui in Iuræ montis saxosis collibus provenit, radice gradi, crassa, nigra, lignosa, longa, furculosa: caulibus multis, lanuginosis, humi repentibus: foliis ciceris siluestris, in vno pediculo multis ordine collocatis, villosis, gustu adstringentibus: flore ex albo purpurascēte, velut in capitulis coaceruato: semine in siliquis. Pena Astragali descriptionem, nisi apud Dioscoridem corrupta foret, videri ait aptissimè quadrare ei plantæ quam Germani *Aker*, *Rychel*, & *Grund rychel*, id est, Balanum terrestrem vocant, Galli *Gland de terre*, Sequani *Des Tarnotes*. Spargit humi tres quatuorve ramulos in imo rubellos, ciceris aut pisi folio & clauiculis donatos, quibus, si adsint, proximas quasque plantas amplectitur: flores item purpurei pisi sunt, & in siliquis parvis exiguum semen: radices verò oblongæ, oliuarum vel glandium instar, foris nigris, intus albidæ, multis quasi traiectæ vel appensæ veluti funiculis, variæ inuicem implexis, & latè fuis. Germaniæ, Angliæ, Normaniæ siluosis opacis iuxta sepēs, Narbonæ, Italiæ, cæterisque æstuosius regionibus, non nisi in arduis & niuosis eruitur. Sapor illis subdulcis, glandis, aut castanæ adstringēs. Siccæ multum durefcunt. Hanc in libro de Bulbosis pinximus ex Dodonæo Chamæbala-ni nomine. Primū Dioscoridis descriptionem

ASTRAGALVS

Matthioli.



In cap. 57. lib. 4.

Astragalus purpur.

Forma.

ASTRAGALVS

Purpureus.



Y Y y

vitiosam esse diximus, quæ in memphi Arcadiæ pro in Phæneo nasci dicitur. Deinde Plinius paulum diuersam descriptionem tradit. Adhæc Galenus & Paulus scripsere Astragalum paruum esse fruticem: ἄστρον & τὰς ῥίζας adstringentes, quæ i plures, nec raphani meminerunt. Quare ubi in Dioscoride habetur ἄστρον ῥάφανος, legendum fortasse ὡσπερ βάλανος, id est veluti glans. Clusius plantam aliam elegantem & à nemine fortasse ex recentioribus cognitam depinxit, quam si facultates non refragarentur, legitimū Astragalum esse cēset, quod eius descriptioni plurimis notis conueniat. Cubitales & ampliores sunt illi caules, minimi ferè digiti crassitudine, pentagoni siue angulosi, duri, subrubentes, & lanuginosi: folia lanuginosa & incana, in longa costa ex aduerso semper inter se opposita, uti in vicia & cicere, gustu primū adstringente, deinde feruido: flores copiosi, lupini aut fabæ, secundum obliquos pediculos ex alarum sinu prodeūtes, ordine digesti, albi omnino, sed antequam aperiuntur: ex luteo foris nigricantes. Fructum ferè dicitur in siliquis faselo minori Dodonæi similem, qui gustatus fauces, os, & linguam inflammatione torqueat: radix pro stirpis magnitudine amplissima, brachiali interdum crassitie, palmari longitudine, deinde in duos aut tres ramos sese

Li. 2. Stirp.
Hispan. c. 86.

ASTRAGALVS

Forte, Clusij.



ASTRAGALVS

Syriacus, Lobellij.



findens, foris nigra, rugosa, intus candida, dura & lignosa, ingrato sapore, quæ arefacta, cornu duritie superat. Primū eam in collibus quibusdam supra Vlyssiponē, quos Tagus alluit, inter vepres se obseruasse, Clusius ait, deinde frequentiore siluosis locis nō procul Hispali. Lusitani *Alfabeca* vocant, Bæitici *Garauancillos*, quasi Cicere exiguū dicas. Videtur ea quam Amatus Lusitanus Apocynon facit, & Lusitanis *Atramoços de can*, hoc est Lupinos caninos vocari ait. Perelegantē aliam leguminosam plantam Lobellio debemus, quæ Astragalis sanè cōgener est. Etenim foliorum & cauliculorum similitudine, & implexu radicum proreptantiū Astragalon refert. Sed florum densō exortu congestorum decore, effigie, elegantia, magnitudine & rubore ornatur amœnissimo. Ex Alepo Syriæ hanc plantam primū nactus est, postea in Vrceis pensilibus Brancionis ex Italo semine natam vidit.

ASTER



CVLVS Christi dicitur ab herbariis, qui à quibuscūq; lutei asteris genus habetur. In agris pinguibus Monspeliaci soli prouenit, radice crassa, fibrata: caule sesquipedali, anguloso, ramoso, nigricante: foliis longis, angustis, lapathio hortensi vtcūque similibus: flore aureo in squamosis capitulis micante, ramulorum verticem occupantibus, substrata foliorum nouenūm ferè aut denūm ambientium corona, vt in Astere: quā ob causam

Nomina

Forma.

OCVLVS Christi.

BELLIS Lutea, Dalechamp.



Asterem luteum nuncuparunt. Aliud Asteris lutei genus, pratis, vdisq; locis gaudet. Quorundam sententia hæc est Bellis lutea: alij oculum Christi vocant. Radice nititur valde fibrata, nigra: caules multos emittit, cubitales, foliis vestitos paucis, longis, acuminatis, venosis, in ambitu, nec serratis, nec insectis. Flos caulium verticibus insidet aureus, chrysanthemo similis.

Bellis lutea.

Forma.

HELIOTROPIVM,

CAP. LXXVII.



TSI multæ sint stirpes quæ Heliotropiæ & Helioscopiæ meritò dici possunt, quòd ad Solem semper conuertantur, & cum eo circumagantur, tamè hîc particulatim de Dioscoridis Heliotropio dicemus, quod vt Græcis ἡλιοτρόπιον, & σκορπιούρον, ita Latinis Heliotropium & Verrucaria nominatur, Gazæ Solaris recentioribus Herba cancri, Gallis *Tournefol*, & l'Herbe au chancre, Germanis *Greesterwy*. Heliotropium verò quod, vt Dioscorides ait, folia vna cum solis inclinatione circumagantur, vel quod auctore Theophrasto, solstitio tantum floreat. Ἐπεὶ δὲ, inquit, τὰς ἀνθήσας βλέψάντων ἀκολουθεῖται τοῖς ἀγρίοις, οἷον τὸ ἡλιοτρόπιον καὶ γλῆμμοι, καὶ ὁ σκόλυμος (ἅμα καὶ ταῖς τροπαῖς καὶ ἔτος.) Quæ cum mendosa sint in vulgaris exemplaribus, ex Gazæ conuersione sic emendanda videntur. Ἐπεὶ δὲ ἡ ἀνθεῖς, ἢ βλέψαντις, ὡς ἀκολουθεῖται τοῖς ἄλλοις. Idest. Quæ verò ita floret vel germinat, vt alia sequatur, velut Heliotropiū & Carduus, nam id quoq; solstitio floret. Et aliquāto ante Heliotropiū in iis numerat, quæ particulatim & diu

Nomina

Lib. 4. c. 186.
 Lib. 7. hist.
 cap. 14.

florent his verbis. Τύτων διένια καὶ μέρος, ὡς περ ἐλέχθη καὶ περὶ τῶν ὀκίμων. Διὸ δὲ πολλὰ χεῖρον ἀνθεῖ καὶ θάπερ ἄλλα τε πολλὰ, καὶ δὲ ἡλιοτροπίον, καὶ δὲ κιχώριον. Id est, Quædam particulatim florent, vt de Ocimo diximus: quare diutius florent sicut alia multa, & Heliotropium & Cichorium. Scorpiuron vocarunt à floris effigie: instar caudæ

Genera.

Ibidem.

Li. 2. c. 21.

HELIOTROPIVM

Maius, Matthioli.

Li. 4. c. 18.

Forma.

Locus.

Heliotro.

minus.

Forma.

Li. 12. c. 11.



Scorpionis inflexi: à tollendis verrucis, Verrucariam. Eius genera duo assignat Dioscorides, maius & minus. Plinius duo itidem genera: vnum Tricoccum, alterum Heliotropium. Sed Tricoccum cum maiore Heliotropio Dioscoridis, confundere videtur, vt dicemus. Dioscorides vero omissum tricoccū, videtur sub Heliotropio minore cōprehendisse. Heliotropiū maius vt describit Dioscorides, folia habet ocimi, sed hirsutiora, candidiora (Græcè tamen legitur μελάντερα, nigriora, & ita Oribasius habet) & maiora: ramulos à radice ternos, quater-nos, quinosve, & in his alas multas: in cacuminibus florem albam, subfuluum (legitur enim in vulgatis ὑπο σφύρον, in vetere ὑπο σόρφυρον, id est subpurpureum) incuruum veluti scorpionis cauda: radix est tenuis & inutilis. Nascitur in asperis locis. Heliotropium minus folia habet similia antedicto, sed rotundiora: semen rotundum, depēdens vt pensiles verrucæ. Nascitur in locis palustribus & iuxta stagna. Plinius. Heliotropij miraculum sæpius diximus cum sole se circumagentis etiam nubilo die: tantus

HELIOTROPIVM

Alterum, Matth.



HELIOTROPIVM

Minus, Matth.



fideris


sideris amor est. Noctu velut desiderio contrahit caruleum florem. Genera eius duo. Tricoccum & Heliotropium: hoc altius, quamquã vtrũq; semipedalem altitudinem non excedat, ab ima radice ramosum: semen in folliculo melsibus colligitur. Nascitur non nisi in pingui solo, cultoque; maxime, tricoccum ubique. Et paulò post. Alterum genus quod tricoccum appellauimus, & alio nomine Scorpiron vocatur, foliis non solum minoribus, sed etiam in terram vergentibus. Semen ei est effigie scorpionis caudæ: quare ei nomẽ. Heliotropij magni fasciculus, vt scribit Dioscor. cum aqua coctus ac potus, pituitam & bilem per aluũ ducit. Vtile est & ic̃tis à scorpione cum vino potum & impositum. Adalligatur ad conceptus accendos. Tradunt feminis grana quatuor cum vino pota hora vna ante accessiõẽ, quartanas finire, tria verò, tertianas. Illitum semen formicantes verrucas pensilẽsq; & thymos, & epinyctidas exsiccat. Folia podagris & luxatis, & pueris striasi, idest, partium, circa cerebrum & membranas eius inflammatione laborantibus, vtiliter imponũtur. Menses cient, fetus ducunt trita apposita. Minoris vero Heliotropij vires hæ sunt ex eodem. Herba cum semine addito nitro, hyssopo & nasturtio ex aqua pota, latas tinea & teretes expellit. Tollit & pensiles verrucas cum sale illita. Plinius genera confundit, & vni tribuit quod Dioscorides ad alterum refert. Sic enim ille. Si decoquantur, inuenio cibus placere. Et in lacte iucundius aluum molire. Et si decocti succus bibatur, efficacissime exinaniri. Maioris succus excapitur æstate hora sexta: miscetur cum vino, sic firmior. Capitis dolores sedat rosaceo admixto. Verrucas cum sale tollit succus è folio: vnde nostri Verrucariam herbam appellauere, aliis cognominari effectibus digniorem. Et paulò post de tricocco.

Ibidem.
Vires.

Ibid. c. 186.

Li. 22. c. 22.

*VERRUCARIA Alia
Minor.*



Vis ad omnia venenata & phalangia, & cõtra scorpiones præcipuẽ illita, non feriuntur habentes. Et si terram furculo Heliotropij circumscribat aliquis, negant scorpiones egredi. Imposita verò herba, aut inde omnino respersum protinus mori. Seminis grana quatuor pota quartanis prodesse dicũtur, tria verò tertianis, & c. Galenus Heliotropium in simpliciu medicamentorum catalogo præteriit. Paulus Heliotropium magnum, inquit, quod & scorpiron vocat, calidam & siccam, & extergentẽ facultatem habet. Deinde cætera ex Dioscoride transcribit. Heliotropiũ aliud minus, siue Verrucaria minor, est quorumdã sententia quæ hĩc appicta est. Nascitur in quibusdã pinguibus & humidis locis Mõspeliaci agri, ramulis, folio, flore, fructũque maiori similibus, tamen si minoribus, nisi quod furculorũ supremæ parti, in exiles virgulas attenuatæ, fructus ordine collocatus, insidet. Ad eadẽ valet ad quæ & Myrmecias maior. Clusius Heliotropij maioris genus pinxit, quod χαμαίχουδον, vel χαμαίπεδες iure dici potest. Heliotropium supinũ ille vo-

Li. 7. simpl.
Lib. 7.

Forma.

cat. Maiori Heliotropio perquam simile est, minus tamen. Etenim ramulos fert graciliores, multis alis concauos, aliquantum lanuginosos, humi stratos: folia maiori cum sapore, tum colore & forma similia, minora tamen, & ocimi foliis proxima: extremi ramuli scorpionis caudæ modo etiam incuruantur, eisque ordine insident, vt in maiore, flosculi candidi, quibus succedit semen, non quadrifariam

HELIOTROPIVM Humi sparsum, Clusij.

duataxat: radix parua, foris nigricans: hyeme perit, & semine deciduo singulis annis renascitur. In marginibus quorūdam agrorum, præsertim, vbi melopepones feri solent, Salmantica reperitur. Floret sub finem Iulij, & Augusto, quo mense & interdum Septembri semen perficit. Vt eiusdem cum maiore est temperamenti, ita eisdem pollere viribus verisimile est. Idem Clusius Heliotropium minus Tricoccum pictum dedit, quod vnico assurgit caule, pedali, multis ramis brachiato: folia superiori haud similia, sed ad Xanthij nonnihil, solani verò somnifici folia plurimum accedunt, mollia & candicantia: flos exiguus, racematim compactus,

*HELIOTROPIVM**Tricoccum, Clusij.*

luteolus, inutilis, quippe qui sine semine perit, vt in quibusdam aliis plantis, quæ non ex floribus semina sua proferunt: ex alarum tamen cauis dependent è longis pediculis, & foliis quasi occultantur sine flore enatæ siliquæ triangulæ, vt tithymalorum, sed asperiusculæ, scabræ & nigricantes, in quibus semen cinerei coloris. Hæ siliquæ pannis affricatæ viuacî viridique inficiunt colore, qui mox in caruleum elegantemque mutetur colorem: radix inutilis & minime viuax. Salmanticenci agro frequentissimam esse hanc plantam ait Clusius, multisque aliis Hispaniæ locis. Nascitur & copiose in Narbonensi Gallia. Iulio & Augusto floret: deinde semē ad maturitatē perducit. Hoc Plinij Heliotropion Tricoccū Galli vernacula lingua *Tournesol* appellant, heliotropiis proculdubio adnumerandū, tametsi à Dioscor. videatur præteritū, inquit Pena, aut minoris heliotropij descriptione cōprehensum, vt diximus. Semina eius Tricocca capsula tithymali aut chamælatæ proxima includuntur, sed scabræ, ex viridi nigricatæ, affricatæ; pānis aut chartis, vi-

rorē viuacē impartiūtur, qui mox in caruleū hilare & purpureū mutatur: quæ magno quaestu colligunt rustici Lunellæ, Malsiliargues, aliisque Narbonæ tractibus, in oliuetis, vbi plurima maturaque sunt septēbri, quæ vendūt insectoribus. Romani agri vinetis etiā familiaria, Belgis, Frācis, Germanis, Anglis in hortis coluntur. Pānosæ laciniæ quæ in Officinis nomine *Tournesol* veniunt, ad gelatinas aliāque medicamēta coloranda, pereleganti purpura huius succo vinoque remisto creduntur imbutæ.

SCORPIOIDES, CAP. LXXVIII.

Sicut Scorpioides Græcis, ita Scorpioides Latinis dicitur, Plinio Scorpius. Herbula est, inquit Dioscorides, folia habens pauca, semina caudæ scorpionum similia. Ita Plinius. Ex argumento nomen accepit Scorpius herba: semen enim habet ad similitudinē caudæ scorpionis, folia pauca. Quæ brevis apud veteres delineatio fecit, ut aliam atque aliam

Nomina
Lib. 22. c. 15.
Lib. 4. c. 18.
Forma
Lib. 22. c. 15.

SCORPIOIDES, Dodonæi.



SCORPIOIDES, Matth.



herbam pro Scorpioide herbarij exhibeant. Dodonæi Scorpioides herbula hæc est humilis, palmi altitudinem non excedens, cauliculis tenuibus, in quibus quina senave folia angusta: flosculi lutei: semina aspera & hirsuta, terna quaternave coherrentia, nodis distincta, & inflexa instar caudæ scorpionis. Lobellius Scorpioides repens bupleuri folio vocat. Matthioli Scorpioides aliud depinxit, quod siliquata fert cornicula, scorpionis caudæ instar reflexa, & articulis distincta: docti quidam telephij genus esse non sine magna ratione suspiciunt: est enim folio portulacæ, flore luteo, gustu & facultatibus non multum diversis. Monspelienfibus cum satis tum viretis Lattensis portæ admodum familiare, non est colutea Scorpioides de qua diximus. Scorpioides, inquit Dioscorides, impositum ictis à scorpione summopere auxiliatur, Plinius. Scorpius valet & aduersus animal nominis sui. Galenus verò excalfacere ordine tertio, desiccare secundo scribit.

Lib. 1. c. 42.

In cap. 187
lib. 4.

Ibidem.
Vires.

Lib. 22. c. 15.
Lib. 8. sim.

TRIPHYLLOM,

CAP. LXXIX.

DE Triphyllis quibusdam in Agro diximus, nunc de aliis quæ vdis locis gaudent, primum de eo quod τριφυλλον ἐν χορδοκροτείσις γεννώμενον dicitur, Latine Trifolium pratense, Gallice *Trefle des pres* & *Triolet*, Germanice *Vuysenklær*. Caulem gerit rotundum, tenerum, ramulos exiles, folia quadantenus rotunda, terna semper in vno pediculo, flores in summo ferè purpureos, velut in breuem spicam coagmentatos, deinde semen rotundum in paruulis siliquis, radicem longam & fibratam. Trifolium pratense alterum, supe-

Nomina


Forma

Trif. prat.


Forma

Locus. riori proximum est, nisi quod cauliculos paulò asperiores & hirsutiores habet, folia
Vires. longiora & angustiora, in quorum medio nonnumquam macula alba apparet, cre-
Fuch. cap. scentis lunæ figura : flores candidos, cætera superiori similes. Scatent iis prata ferè
 315. h. ft. omnia. Maio & Iunio mensibus florent. Adstrictioræ cuiusdam qualitatis sensum

TRIFOLIUM Pratense,
I. Matth.



TRIFOLIUM Pratense
alterum, Matth.



TRIFOLIUM Luteum mini-
mum Pena, & Lobellij.



Forma

in gustu præ se ferunt, non tamen multum admodum, vt nihilominus sint tenuium partium & exsiccatoria, quãdoquidè etiam exigua quasi acrimonia prædita videantur. Quare haud dubie mediocriter concoquendi & exsiccandi vim habent, vt non temerè quidam ex recentioribus herbariis tradant trifolia hæc albo mulierum profluvio mirificè conferre. Eadem etiam inflammationibus imposita, eas cõcoquant, & ad maturationem perducunt. Est Trifolium luteum omnium minimum, & non ita ubiq; obuium, inquit Pena, gracilibus pusillis, cauliculis reptantibus, iunceis folio terno, aliquatùm crenato, luteolis floribus in orbem compactis. In pratis & cultis reperitur. Antuerpiano agro frequentissimum esse ait Lobellius. Est trifoliis adnumeranda planta, quæ à vulgaribus herbariis panis cuculi vocatur, vel quod cuculus auis ea vescatur, vel quia hac erumpente, cuculus vocem suam edere incipiat, & Alleluya, in Officinis Trifolium acetosum ab acido sapore, à Plinio Oxys eandem ob causam, Gallicè *Pain de Cocu*, Germanicè *Saurerkler*. Cauliculos siue potius



tius longos pediculos ab radice fundit per multos, quorum singuli in summitate terna folia sustinent perinde atque Trifolium, cordis figura, & in pediculū fungi modo plerūque reflexa, mollia, acido gustu. Flores edit albicantes, in quinque diuisos apices, stellæ figura, qui peculiares pediculos habent ex eadem radice enatos, singuliq; singulos flores sustinent. Radicem habet subrusam, veluti squamis contactam, quæ nucamenti speciem referunt. Opacis locis maximè prouenit, & in siluis. Aprili & Maio mensibus floret. Obseruasse autem sese scribit Fuchsius, atque adeo multorum experientia cognitum, quod eius herba copiosi flores crebras illius anni pluias, & aquarum inundationes certo portendunt, pauci contra siccitatem. Tota planta auctore Matthiolo, refrigerat oxalidis modo. Quare deuorata, sitim & ventriculi ardores extinguit, iecur refrigerat & cor corroborat. Stillaritia huius aqua datur vtiliter potanda acuta febre laborantibus, sed multò magis præstat succus ex saccharo potus. Illinitur idem per se

Locus.

In cap. 106.

lib. 3.

Vire. &

Temper.

OXYS LVTEA CORNICVLATA

Repens, Oxys lutea, Clusj.



erysipelatis & inflā-
 matis locis: osque eo
 colluitur, cū lingua,
 palatum, faucisq; ca-
 lida fluxione labo-
 rant. De ea hæc Pli-
 nius. Oxys folia ter-
 na habet. Datur ad
 stomachum dissolu-
 tum. Edunt & qui
 euterocelen habent.
 Diuersum ab his Tri-
 folium pratense pro-
 tulit Clusius, quod
 non

Lib. 27. c. 12

Lib. 2. stirp.
 Hispan. cap.
 89.



prodeunt, sustinentes capitula flosculorum elegantissima purpura rubentium, quibus succedunt membranei folliculi, & in his semen exiguum, subrufum: radix vti vulgaris trifolij. Tota æstate floret. Hispani *Trebol de prados*, & simpliciter etiam *Trebol* quemadmodum alia omnia Trifolij genera vocant. Oxys alia à superiore & eius veluti genus allusio ostenditur, ramulis dodrantalibus, interdum longioribus, gracilibus, rotundis, rubentibus, per terram repentibus, & ad singula internodia radices proferentibus, nouisq; inde surculos & ramulos: folia illi Oxys vulgaris, terna in singulis petiolis, sed minora & pallidius virentia, sapore acido, quæ sub vesperam aut imminente imbre complicantur, & veluti umbonem quandam faciunt: flores in oblongis petiolis terni aut quaterni simul nascuntur, quinque foliolis stellatim decussatis conspicui, vulgari minores, lutei: oblongiora deinde mucronataque capitula, semine exiguo, rufo plena: radix tenuis & capillata. Umbrosis quibusdam circa Hispalim locis nascitur, atque etiam Monspelij, Hec Clusius.

BETONICA AQUATICA,
CAP. LXXX.

Nomina

Forma.

Locus.



BETONICA Aquatica Septentrionalium, quibusdam Clymenum Dioscoridis, Scrophularia secunda Dodonæi lib. 1. Hist. stirp. non picta quidem sed descripta Terebintharia Dillij, à Terebenthinæ dote similis Ocimastrum alterum Tragi, Belgis *Breckscuym cruyt*, & *S. Antuenis cruyt*, id est, S. Antonij Herba, Anglis *U-watter Betony*. Caulem edit quadratum, fuscum, bicubitalem, geniculatum, cauum, rectum & crassum, folia ex viridi nigricantia, ambitu, figura & crenis Betonicæ, aut Scrophulariæ, sed maiora: alis nonnullis in summo, floribus nigricantibus purpureis, pusillis cassides emulantibus: seminibus pusillis in lagenulis pusillis Blattariæ, aut digitalis purpureæ: radice fusca, multum fibrata. Amat, quemadmodum Betonica, umbrosâ & frigida, sed magis humida, vt margines fossarum qui hac scatent in Nortmannia & Anglia. Hanc summopere celebrauit Vigonus Chirurgus:

SERRATVLA, CAP. LXXXI.



ST & alia à Betonica quæ Serra-
 tula dicitur, à foliis minutim fer-
 ratas. Caule constat purpurascen-
 te, tenui, & in multos ramulos diuiso:
 folia habet antequam in caulem euadat, beto-
 nicæ similia, toto ambitu tenuiter serrata, sed
 cum caulem protulit, faciem immutantia: nam
 exortis multò profundioribus incisuris, maio-
 ris Phu similia fiunt: quæ verò in caule sunt,
 multò minora & breuiora visuntur: flores in
 ramulorum summitatibus, ex squamosis ca-
 pitulis purpurei. In siluosis Bohemiæ & pratis
 nasci scripsit Matthiolus. Pena etiam in ne-
 morosis & decliuibus Pedemontis & Septen-
 trionalium Nortmanniæ & Angliæ. Ad vul-
 nera & enterocelas commendatur.

Nomina

Forma.

Locus.

Vires.

CLYMENV M MINVS,
 CAP. LXXXII.

CLYMENV Minus,
 Dalechampij.



LYMENV minus ab Herbariis
 dicitur planta hæc, quæ in humi-
 dis, riguis & opacis gignitur, radi-
 ce geniculata, modicè crassa, in
 plures fibras diuisa, caulibus tribus aut qua-
 tuor, pede altioribus, quadrangulis, foliis
 Clymeni maioris, angustioribus, venosis,
 grauiter olentibus, austeri saporis: flore in
 pallido purpurascen- te, superne spicato, be-
 tonicæ modo, infra cacumen foliis binis, ve-
 luti alis vtrinq; erumpentibus.

ALOPECVRVS MONTANA,
 CAP. LXXXIII.



ANC. plantam, Alopecurum mō-
 tanam vocant herbarij, à fructus
 villosi quadam similitudine: cum
 eius animalis cauda. Nascitur in
 altorum montium opacis cōuallibus, arborum
 frequentia vmbrosis, & illapsu aquarum vdis:
 radice nigra, tuberosa, fibrata: caulibus multis,
 cubitalibus, rotundis, ima parte vestitis, corti-
 cis quibusdam extantibus, veluti laciniis, par-
 tim viren

ALOPECURI, Genus.

CHRYSANTHEMUM
Latifolium, Dodonæi.

tim virentibus, partim è nigro rufis densius cõ-
gestis, desinentibus in cuspidem: foliis betoni-
cæ, rotundioribus, breuioribus, latoribus, ve-
nosis, quæ medius neruus protenditur, nigris, ad
extremam oræ marginē valde crenatis, magnis
interuallis per caules prodeuntibus, geminis, ex
aduerso positis: in caulium vertice ex gemino-
rum foliorum tanquam ala caput exoritur, ob-
longum, metæ figura, innumeris villis hispídū,
densissimè stipatis, candicantibus, eleganti prorsus
huius congeriei figura, emicanti omni ex
parte illa pilorum cæsaræ: quorum situs, ordo,
& densitas, vtcúmque Vulpinæ caudæ speciem
æmulatur, vnde nomen impositum est: quæ fa-
cultate prædita sit, & ad quas ægritudines va-
leat, nobis compertum nondum est.

CHRYSANTHEMUM Latifolium,
CAP. LXXXIIII.

LATIFOLIUM Chrysanthemū mox
à radice folia promit oblōga, lata,
virentia, superiore parte aliquātū-
lum aspera, inferiore verò lauiora,
dilutiūque colorata, inter quæ scapi exeunt te-
nues, cubitales, aliquantulum hirsuti, duobus
aut tribus geniculis articulati, à quorum singu-
lis bina contra se posita folia, atque subinde pe-
diculi exeunt, in quorum fastigijs ampli orbi-
culati flores, Bupthalmi aut Chrysanthemi æ-
muli, sed maiores coloratioreſq; , & medio Di-
ſco, & circumambiētibus foliolis, luteo resplen-
dentes colore, quorum medius discus tandem
in pappos vanescens, oblonga, tenuia, nigrican-
tiaq; semina mittit, radix fibrosa est. In Germa-
niæ incultis ac syluosis locis frequēter reperi-
tur. Iunio mense in hortis Belgij cum flore con-
spici potest: sequenti mense semen cum pappis
à vento rapitur. Germanis *U-valdiblum* dicitur.
Sunt qui Alisma Dioscoridis esse velint: Sed vbi
Plantaginis similia sunt folia, & caulis? Alimati
siquidem, quod Damasonium etiam dicitur,
Plantaginis similia sunt folia, & caulis thyrsi
similis, quæ huic nō adsunt. Chrysanthemum
idcirco Latifolium citiùs appellandum, quàm
temerè Alismatis nomen ei tribuendum.



HISTORIAE OMNIVM PLANTARVM

LIBER DVODECIMVS,

(642)

*In quo omnes planta, quæ ad Mare & in ipso Mari
nascuntur, ad vinum depinguntur.*

PLANTAGO MARITIMA, CAP. I.



PLANTAGO Maritima.



E PLANTARVM quæ in aquis ipsis proueniunt, ac earum quæ locis aquosis, & sui natura, aut quauis alia de causâ vdis ac vliginosis gaudent, historia, satis multa fortasse dixerimus, si ad illas de quibus iam tractauimus, has quæ ad mare, vel in ipso etiam mari nascuntur adiunxerimus, ab iis more nostro exordientes, quæ frequentius illic sunt obuix, atque eam ob causam multis notiores. Maritimas verò plantas omnes nobis cognitæ breui hac tractatione non complectimur, quòd harum quædam aut consecutionis

ordine, aut tanta affinitate aliis minimè maritimis ita coniunctæ sunt, vt ab iis disijungi minimè possint, vt cum cathartice non possumus non empetron, alypon, scammonium, peplium recensere. Inter olera cum brassicis hortensibus & siluestri, brassica, atriplex, portulaca, marinæ sedem occuparunt: umbelliferis crithmum, bulbosis pseudomoly, spinosis, Tragus Marthioli, hippophaes, hippophaestum, eryngium sese sociarunt. De plantagine marina primùm dicam, quæ Græcis Ἀρνόγλωσσον θαλάσσιον, Gallis *Plantain de mer* nominari potest. Radice est crassiuscula, fibrata, ex qua folia crebra, longa, angusta, spissa proueniunt, porraceis tum colore, tum consistentia similia: cauliculi palmum alti à medio sui floribus & semine spicatis, plantagini vulgarissimæ notionis simillima. Litoribus Narbonæ, Angliæ, Zelandiæ frequens.

Nomina

Dodo. lib.
1. cap 61.
Pet. Pen. in
Adu.

Forma.

Locus.

Forma.

Leuc.mar.
minus.

Forma.

LEUCOIVM Mariti-
mum, minus.

LEUCOIVM maritimum maius, in litoribus mediterraneis Narbonensis provinciae frequens, folia longa, angusta, humi spargit, ad cichorii vel erucæ modum diuisa, crassa, albida, paria hortensis, sed magis lanuginosa, & gustu aciora, florem puniceum edit leucoiis similem, semine minutum in siliquis. Iisdem in locis Leucoium multò minus prouenit, radice parua, breui, cãdida, foliis multis humi procumbentibus, Leucoio purpureo similibus, minoribus, angustioribus: caule humilis, flore puniceo: semine paruo in siliquis. Niuea lanugine tota planta operta est, vehemẽtiore acrimonia linguam vellicante. Est Hesperis Theophrasti quibusdam. Aliud Leucoium marinum latifolium protulit Lobellius, non ita diuersis foliis, sed latioribus, rigidioribus, hirsutioribus, flores exerceo purpurascunt in palmaribus & sesquipalmaribus cauliculis. Semen in siliquis minoribus multo Leucoij lutei.

LEUCOIVM Marinum alterum,
latifolium, Lobellij.

CISTVS



LYCHNIS Marina
Anglica, Pena.



FLORIS specie dicitur Cistus frutex hîc, in maritimis proueniens, cubitalis, nonnumquam altior, densis, numerosisque radicibus, caulibus multis, furculosis, cortice ex rufo rubente, foliis longis, in ambitu laciniatis, acuminatis, supernè obscuriùs virentibus, infernè candicantibus, & parùm lanuginosis, flore Cisti, rosæve siluestris, albo, vel ex albo purpurascente.

LYCHNIS MARINA,
CAP. IIII.



LYCHNIDEM marinam Anglicam pictam dedit Pena, in aggeribus maritimis Vectis insulæ Angliæ, totóque illo tractu frequentem. Herbula est ab ima radice multis foliis cincta, crassis, minoribus & angustioribus quàm portulacæ marinæ, caules creberrimi, flexiles, humi fusi, cubitales & sesquicubitales, in quorû summo caliculus albus ocimastri aut Lychnidis est, cui herent flosculi candidi, perquam elegantes, ocimastri non dissimiles, apiculis intus nigris. Semen in folliculis fuscum, Lychnidis aut ocimastri. Salso est gustu non tamen insuauis, esutenera, non nisi inter silices & brassicas marinas qua ferme vendæ alluant, nascitur. Floret mense Iunio, Iulio, Augusto & Septembri.

ANDROSACES, CAP. V.




ATINIS Androsaces vt Græcis *Nomen.* ἀνδρόσακες dicitur, forte, vt putare quis possit ὑδροσακες, ab vrina & hydropicorum aquis educendis. Herba est, inquit Dioscorides, alba (legendum *Lid. 3. c. 133.* in Dioscoride λευκή pro λεπτή), Oribasio & Plinio auctoribus) tenui ramulo, amara, sine foliis, folliculum in capite habens, quo semen cõtinetur. *Forma.* Nascitur in Syria in maritimis locis. Plinius *Lib. 11. Lib. 27. cap. 4.* accuratius hâc historiam quàm quamuis aliam ex Dioscoride, vel alio herbario exscripsisse videtur, his verbis. Androsaces herba est alba, amara, sine foliis, folliculos in cirris habens, & in his semen. Nascitur in maritimis Syriæ maximè. Verum Androsaces Pisis à doctissimo Ghino ad se missum Matthiolus in commentariis depinxit. Ghino doctissimi herbarij assentiuntur. Sed in illis commentariis quadruplo maior

quam viua planta fit, depicta est, per pusilla etenim & perelegans est planta, vmbilicata, è fundo in ipsa aqua, ideo à Dioscoride proximè nymphæas descripta, non in aëre crescens & viuens, sapius chamæ conchæ quæ humi obuoluta sit, dorso striato innascens, pediculis, cirrisve glabris, nitidis, exilibus, crebris, rectis, binos pollices altis, singulis singulos clypeolos medio cetro sustinentibus, circumatum vmbilicum vrachis appensis referentibus: quam ob causam Monspelienfes vmbilicum marinum nominarunt. Viret primum in aqua exsqualido cinereoq; postea eiectū vndis, & litore exceptum, albescit, gustu subfalso, & amaro. In illis vmbilicis quos θαλάμια vocat Dioscorides, Plinius folliculos, semen vix vnquā reperias, qui

ANDROSACES.

Forma.



Lib. 3. c. 133.

cum petiolorū siue simpliciu & sine vlllo capitulo summitati inhareant, videtur Plinius legisse in Dioscoride, vel in eo auctore ex quo vterque transcripsit, θαλάμιον non ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, sed ἀπὸ τῆς κεφαλῆς, id est, folliculum pro capitulo. Vim habet hæc herba, inquit Dioscorides, duarum drachmarum pondere in vino pota, vt vrinas multas in hydropicis educat, sed & herbæ decoctum & semen potum

ANDROSACES Alterum, Matthioli.

Lib. 27. c. 4.



Lib. 6. sim.

idem facit (legitur tamen in vetere codice, καὶ τὸ ἀφέψημα διὰ τῆς πύας, καὶ ὁ χαρπὶς ἀνίσταται μετ' ὅντων πινόμενος, τὸ αὐτὸ ποιεῖ. Id est, Ipsius etiam herbæ decoctum, semenq; abunde potum cum, vino eundem effectum præstant) Imponitur etiam vtiliter podagricis. Eadem planè Plinius habet. Datur hydropicis drachmis duabus tusa, aut decocta in aqua, vel aceto, vel vino: vehementer enim vrinas ciet. Datur & podagricis, illiniturq;. Idem effectus est & seminis. Galenus, Androsaces, inquit, humida & acris est herba, potest autem siccata & pota tum ipsa tum semine eius vrinas abunde ciere, & discutere, ac siccare. Sed Paulus & Oribasius pro voce ὑγρὰ, id est, humida, habent πικρὰ, id est, amara, quo modo etiam Dioscor. & Plinius descripsere, re ipsa etiam id comprobante, est enim plantula siccior actu & tactu quàm calidior, & multum diu retica, vt in Galeno πικρὰ quoque legendum esse videatur & non ὑγρὰ, nisi ὑγρὴν recentem intel-

ligat, eamq; τῇ ξηρανθείσῃ, id est, siccata opponat. Matthiolus in iisdem commentariis aliam plantam à superiore longè diuersam à Cortuso missam pro Androsace altero exhibuit, quæ minimè androsaces, sed morsus gallinæ, vel asines potius species est, non ex Syria, sed ex vetere quadam macerie decerpta.

CNEORVM,

CNEORVM de multis dici plantis testis est Plinius, qui thymelæam Cneorum à quibusdam appellari scripsit. Et alio in loco Cneorium casiam ab Hygino vocari, & mox, Cneori duo genera sunt, inquit, nigri atque candidi, hoc & odoratum, ramosa ambo, florent post æquinoctium Autumni. Quæ ex Theophrasto trāsata sunt, de Cneoro à thymelæa longè diuerso hæc scribete. *Διὺ δ' ἐΐδιη τ' ἔκ κινεάρας. ὁ μὲν γὰρ λευκός, ὁ δὲ μέλας. ἔχει δὲ ὁ μὲν λευκός τ' φύλλον διερχομένους, πρὸς ῥήκας, ὁμοιογενέων ἴσους τινὰ τῇ ἐλαίᾳ, ὁ δὲ μέλας οἶον ἢ μυρύνῃ, σαρκώδεις. ἐπὶ γένος δὲ μάλλον ὁ λευκός. ἔστι δὲ ὁ σμῶδιος, ὁ δὲ μέλας ἔννοσμος. τὴν δὲ ῥίζαν τὴν εἰς βάθος ἀμφοῦν μεγάλην ἔχουσι, καὶ ἀκρέμονας πολλὰς τ' παχέας, καὶ ξυλῶδες ἀπ' αὐτῆς τῆς γῆς ἢ μικρὸν ἀνωχρῖζομένους. ξυλωδὲς ἀτὴν δὲ γλίσχρον δὲ σφόδρα. διὸ τὸ χροῖον αὐτῶν πρὸς τ' ἡλιαν ἔστιν, καὶ πρὸς τὸν ἥλιον, ὥσπερ τῶν οἰσῶν. βλαστάνει δὲ καὶ ἀνέγει μετ' ἰσημερίαν μεσοπαρανήν, καὶ ἀνέγει πολὺν χρόνον.* Quæ sic cōuertit Gaza, Cneoron casia interpretatus. Casia quoq; duo genera: alia enim cādida, alia nigra. Candidæ folium modo cutis oblongum, figura quodāmodo oleagineo simile: nigra, quale tamarici, carnosum. Cādida magis se humi spargit, odorataq; est: nigra odore caret. Radix ambabus quæ altè descendit, grādis, ramique permulti, crassi, furculosiq; ab ipsa protinus Tellure aut paulò superius sparsi, lenti admodum constant, quamobrem hisce ad colligandum iunci modo vtuntur. Germinant florētque post æquinoctium autumni, & multum denique temporis florent. Quæ sic emendatiùs legi possunt. Cneori genera duo. Vnum album, alterum nigrum. Albo folium est cutaceum, oblongum, figura oleæ quodammodo simile, nigro quale tamaricis, carnosum. Album supra terrā minùs se attollit, & parum quid olet, nigrum valde odoratum est (vt legatur, ὁ δὲ μέλας ἔννοσμος, nō vt legit Gaza ἄσμος) radix vtriùsque in profundum descendit magna: rami multi, breues & lignosi, qui à terra vel paulò supra diuiduntur, lenti admodū (nam Græcè legendum βραχεῖς καὶ ξυλῶδες. ἀπ' αὐτῆς τῆς γῆς, ἢ μικρὸν ἀνωχρῖζομένους, γλίσχρους σφόδρα, &c. voce ξυλωδὲς ἀτὴν expuncta, quam etiam omisit Gaza) Quam ob causam hisce ad colligandum & comprehendendum (πρὸς λαμβάνειν, non πρὸς λαμβάνειν, vt in vulgatis legitur) vtuntur vitilium modo ὥσπερ τῶν οἰσῶν, non τῶν χρῖνων. Germinant florētq; post æquinoctium autumnale, multoque tempore florent. Hæc à Theophrasto tradita Cneori albi delineatio plāta hīc appicta quadrat, quorundam herbariorum sententia. Locis lapidiosis & saxosis maritimis prouenit, radice grandi in profundū subeunte, folio argenteo, cutis modo crasso, oblongo, angusto, oleæ simili, interdum longiore. In ramos multos, breues, lignosos statim ab ipsa terra diuiditur, eosq; valde flexiles, quamobrem ad ligandum & nectēdum iis vti licet, amerinae modo. Germinat & floret post æquinoctiū autumnale, floriscq; prouentū in multos dies prorogat, flos autem in summo ramorū vertice velut in corymbos acervatus emicat, semen nigrū, crassum, in folliculo tāquam gluma reconditū. Matthiolus plantam aliam se obseruasse ait in Bohemiæ siluis, cuius iconem hīc expressimus,

Nomina
Lib. 13. c. 27.
Lib. 1. c. 9.

Lib. 6. hist.
cap. 2.

(CNEORUM Album,
Dalechampi.)



Locus.

Forma.

In ramos multos, breues, lignosos statim ab ipsa terra diuiditur, eosq; valde flexiles, quamobrem ad ligandum & nectēdum iis vti licet, amerinae modo. Germinat & floret post æquinoctiū autumnale, floriscq; prouentū in multos dies prorogat, flos autem in summo ramorū vertice velut in corymbos acervatus emicat, semen nigrū, crassum, in folliculo tāquam gluma reconditū. Matthiolus plantam aliam se obseruasse ait in Bohemiæ siluis, cuius iconem hīc expressimus,

CNEORVM Album,
Matthioli.

Lib.2.c.33o



CNEORVM Nigrum,
Myconi.

Cneorum
nigrum.

Nomina

Lib.2.4.c.11.

Lib.1.c.189.



quæ omnibus notis Cneorum candidū referat, quia cutaneum illi folium est, oblongum, rami flexiles, lenti, furculosi, ab ipsa protinus terra aut paulò superius emergentes, & per humum sese diffundentes: flores in furculorū cacuminibus purpurei, odorati testiculi odore: radix altè descendens, non tenuis. Sed vere floret. Franciscus Myconus medicus Barcinonensis, rei herbariæ studiosissimus, istud Matthioli Cneorum albū fructicem esse ait, quem in Pyrenæis montibus frequētem observauit, ab incolis Gauechs nuncupatum, notis omnibus Matthiolus non meminit ei adstipulantibus, dempto fructu, qui in hoc frutice rubet, cuius Cneorū tamen esse non arbitratur, sed Auicennæ alteram oleandri speciem, quam siluestrem vocat. Siluestris, inquit, folia sunt sicut folia portulacæ (vel alcannæ vt Bellunēsis) sed sunt strictiora, & eius thyrsi sunt longi, expansi super terram, & apud folia sunt spinæ, & nascitur in domibus desertis. Hæc Auicenna. Quæ si quis, inquit Myconus, cum Matthioli Cneoro modo descripto cōferat, oleandrum siluestrem Auicennæ esse comperiet. Præterea nascitur in desertis locis, & summis montium iugis, foliis myrti maioris, acutis, quæ non multum à foliis portulacæ vel alcannæ distant: item per terram frequēter serpit, aut non multum attollitur. Ad hæc flore, forma, colore, odore ad oleandrum vulgarem accedit. Est verò id notatu dignū, quod observauit Myconus à nullis animatibus, fructicem hunc attingi aut arradi. Et cum mille huiusmodi plantas foliis & floribus onustas viderit, nullam vnquam reperire potuisse asserit, in qua præcisum aut arrosū aliquid fuisset. Sed nigrū Cneorū multò est ignotius. Quidam id non sine probabili coniectura herbam eam esse suspicātur, quæ herbariis præsertim Monspelienfibus Cāphorata maior nominatur, quòd radice magna altè descendit, vt è terra prodiit, statim in ramos finditur, vitilium modo lentos, folio est carnosò, tamarici simili, validum spirat odorem, qualis ferè est caphuræ, vnde & Caphurata nomen. Quæ omnia in Cneoro nigro Theophrastus adnotauit. Alij selaginem Plinij esse volunt, alij ericæ prius genus, alij hyssopum nemorensem, alij musci ter-

restris genus depictū à Trago, cuius alibi meminimus. Lib. quæ in Vmbros. cap. 59. & lib. quæ in Asperis cap. 71. Frācisus Myconus plantam aliam Pala marina vulgo dictam, à Barcinonensibus ad nos misit pro Cneoro nigro depictam, vt videtis, & descriptam his ferè verbis. Frutex est duorum cubitorum altitudine cum multum adoleuit,

adoleunt, caule rotundo, flexili, aliquantum aspero, & fere nodoso, qualis in Aizoo foliis detractis cernitur, ramulis multis similiter nodosis brachiato, in quibus folia minuta, perpetuò virentia, quæ quò fruticis summitati propiora, eò minora conspiciuntur, vt quæ in summitate sunt cupressi foliis similia sint, paulò tamen latiora: omnia nonnihil crassa sunt, carnosæ, incana, caulem complectentia. Flores in viridi lutei: radices crassæ, digitales, lignosæ, albo cortice vestitæ, satis in terram descendentes. Torus frutex & maximè cortex manu tritus, grauis est odoris: sed vigente canicula folia, si confricentur, zibeti odorem quadamtenus spirant. Barcinone nascitur locis arenosis, & maritimis, aut non multum à mari distantibus. Floret Autumno, & floris prouentum ad Maium vsque producit, foliis aliis deciduibus, aliis renascentibus. Foliorum sapor cum lentore subadstringit. Foru huius herbæ hæmorrhoidum inflammationem sedari asserunt: quod & suffitu

Li. 24. ca. 11.

CNEORVM Aliud Theophrasti, Matthioli.



præstatur. Hanc plantam Cneori descriptioni à Theophrasto traditæ optimè quadrare putat Myconus. Ea esse videtur quam libro de catharticis nomine Sesamoidis minoris depinximus. Clusius Sanam vndam secundam fecit. Anguillara Lauandulam vulgò vocatam Cneorum album esse arbitratæ: nigrum verò rosmarinum coronarium à Theophrasto nusquam memoratas plantas, quamuis tota Ieloponneso & Hellade, vtrâque copiosa gignatur. Eius opinionem pluribus refellit Matthiolus, quod Cneorum vtrûmque floret post æquinoctium Autumni, rosmarinum bis anno, nempe post æquinoctium vernal, & ante æquinoctium Autumni. Lauandula æstate tantum. Præterea vtriq; Cneoro Theophrasti radix est grandis, altè descendens, Lauandula & rosmarino minimè, cum per summa ferè cespitem mediocres radices fundant, & ob id frigoris impatientes plantæ. Ad hæc vtriûsque Cneori rami lenti flexilésque sunt, & ad ligandum apti, cuiusmodi non sunt lauandulæ, nec rosmarini. Idem Matthiolus in postrema commentariorum Latinorum editione

In cōmen.
ca. 12. lib. 4.

scribit, Cneorum Theophrasti Roma ad se missum nullis deficientibus notis: sed eas nec describit, nec addit sit ne candidum, an nigrum Theophrasti Cneorum, quod hîc expressimus.

In cap. 167.
lib. 4.

Locus.


Forma.

Nomina
Lib. 4. c. 49.
Forma.

CATANANCE, Dodon.

Locus.

Li. 4. c. 129.



Li. 27. ca. 8.

nancem Thesſaliam herbam qualis ſit, à uobis deſcribi ſuperuacuum eſt, quum ſit eius uſus ad amatoria tantum. Illud non abs re eſt dixiſſe, ad detegendas magicas vanitates, electam ad hunc uſum coniectura, quoniam areſcens contraheret ſe ad ſpeciem vnguium milui exanimati.



PN MARITIMIS creſcit hoc Conyza genus, quod à foliorum longitudine macrophyllum cognominarunt, radice ſicca duraque, caule dodrantali, ſurculoſo, foliis in eo multis, longis inſtar plantaginis anguſtifoliae, aut etiam anguſtioribus, guſtu fatuis ſimul & nonnihil amaris: flore luteo in luteis corymbis, ſurculorum vertici inſidentibus, qui in pappos tandem abit.

CATANANCE, DODON.
CAP. VIII.

KATANANKH Græcorum, & Latinorum Catanance, quaſi coactrici, à vi & neceſſitate adingenti ad amorem, Dodonæi ſententia valde atinis hæc eſt: foliis anguſtis, longis, gramineis, ſed minoribus, quæ areſcentia in terram recuruantur: cauliculos fert teneros, graciles, breues, in quibus ſcoſculi & ſiliquæ rotundæ, tenues, longiuſculæ, ſemine ruſcente reſertæ. Eiſdem generis eſt altera, quæ non rotundas ſiliquas ſed compreſſas & latiuſculas habet, cætera ſuperiori ſimillima. Hæc in litoribus marinis reperitur, illa etiã quâdôque in agris. Videtur, inquit idem Dodon. prior eſſe Catanances ſpecies à Dioſcoride deſcripta, quæ folia Coronopi habet longa, radicem iunci modo prætenuem, capitula ſena ſeptenave, in quibus erui ſemen ineſt: areſcens in terram ſectitur, & milui exanimati vnguibus ſimilis euadit. Eruum ſilueſtre Dodonæus in frument. Hiſtoria. Lobellius & alij Herbarij faciunt. Vt res habeat, hanc noſſe minimè neceſſe eſt, fatiuſque eſt de hac amatoriis tantum illecebris dicata ſilere, quàm diligentius de ea inquirere, ſicuti Plinius conſuluit, & Dioſcorides non vires, ſed alienam duntaxat hiſtoriam citat, nec Galenus poſteriorẽsque medici de hac quicquã tradiderunt, eadem fortè ratione ducti qua Plinius, qui de ea hæc literis mandauit. Cata-

TRIBVLVS MARINVS. CAP. IX.

TRIBVLVM Marinum plantam hanc quidam vocant, alij pastinacā marinam, alij Hippophaes Dioscoridis esse contendunt. In sabulosis & maritimis nascitur, radice crassa, molli, cortice rugoso & subatro cōtecta, saporis amari, caulibus multis, angulosis, latè dispersis: foliis longis, oleæ similibus, verum angustioribus & longioribus, qualia floribus sub-

Nomina
Li. 4. c. 156.
Locus.
Forma.

TRIBVLVS Marinus
quorundam.



strata cernuntur, albis, spinosis, spinarum aculeis, sicuti & caulis, angulosis: flore corymbis hederæ non dissimili, ac veluti racemoso, minusculo, candido, leuiusculè rubente. Quæ ferè omnia Hippophaes historiæ respondere videntur: sic enim Dioscorides illud descripsit. Hippophaes nascitur in maritimis & arenosis locis. Frutex est furculosus, densus, vndiq; amplus, folia habens longa, ad oleæ folia accedentia, sed angustiora, tenuiora, & inter ea spinas siccas candicantes, angulosas, inter se distantes: flores corymbis hederæ similes, & racematim inter se coherentes, sed minores, & molles, & cum candore punicei ex parte coloris: radix crassa, mollis, succi plena, gustu amara. At huic Dioscorides non folia spinosa, sed præter folia, spinas siccas, albas, angulosas tribuit. Præterea eius succo vim purgandi biliosa, aquosa ac pituitosa deorsum, quod de superioris succo neminem adhuc experientia comprobasse arbitror. Quare sit ne hæc Dioscoridis hippophaes, lectoribus, & maritimis locis vicinis, diligentius disquirendum relinquimus.

Li. 4. c. 156.

MVSCVS MARINVS, CAP. X.

BΥΨΩΝ *ῥαλασσιον*, Latinis Muscus marinus vocatur, *Thahabel*, siue *Thaleb* Arabibus, Gallis *Mouffe de mer*, Germanis *Mermies*. Nascitur, inquit Dioscorides, in lapidibus & testis iuxta mare, capillaceus, gracilis, sine caule. Plinius eundem Muscum ita describit, vt in quibusdam à Dioscoride dissentiat. Bryon marinum, inquit, herba sine dubitatione est, lactucæ foliis similis, rugosa, veluti contracta, sine caule, ab vna radice (nō ab ima, vt in vulgatis codicibus habetur) exeuntibus foliis. Nascitur in scopulis maximè testisq; terra comprehensis. Idem alio in loco. Aliud genus fruticum Bryon vocatur, folio lactucæ, rugosiore tantum iam hoc interius nascens. Plinius itaque Muscū herbam & fruticem facit, ipsiq; lactucæ folia attribuit. Dioscorides pilos pro foliis: dicit enim esse *τεχιδες*, quod fortassis Plinius *ῥαλασσιον* legit, & lactucæ folio conuertit, in cæteris notis, præsertim in viribus consentiens, nisi fortè Muscum marinum cum Fuco marino, siue alga Theophrasti confuderit, de qua mox dicemus. Plinio veterē codicem suffragari scribit Andr. Lacuria, in quo *ῥαλασσιον* legitur, etsi Muscus marinus, inquit Lacuria, capillorum quā lactucæ maiorem similitudinem referat. Matthiolus eorum probat sententiam qui Muscum marinum veterum plantam eam esse censent, quæ hodie Corallina vocatur, & ab iis frequentius reperitur, qui corallia piscantur, coralliis, sicuti scopulis, & piscium testis,

Nomina
Li. 4. c. 94.
Locus.
Forma.
Li. 27. ca. 8.

Li. 13. c. 25.

Cornar.
Embl. 84.
lib. 4.

In cap. 94.
lib. 4.

MVSCVS Marinus Plinij,
Matthioli.

MVSCVS Marinus, *sive*
Corallina, Dodon.



Lib. 3. ca. 71.

MVSCVS Marinus vulga-
tissimus, *Muscus marinus can-*
didus Coralloides.



scriptæ. Lobellius appellat Bryon lactuæ foliis Plinij, Muscum Intybaceum crispum marinum, fuci primam speciem Dioscor. Lactucam marinam herbariorum. Idem Lobellius Muscum vulgatissimum exhibuit, intybaceum, cristatis oris, fruticosum, surculosum: item Muscum candidum, Coralloidem, squamulis lorica-
tum. Muscus marinus multum adstringit, ut scribit Dioscorides, facit ad inflammationes & podagras quæ adstrictione opus habent: nam in excusis omnibus
legitur,



testis eodem modo quo Muscus arboribus in-
nascens cæteris ea præfertur quæ coralliis (vnde
ei corallina nomen) inhæret: quæ saxis, secun-
do loco probatur, colore rubescente: cinerea
improbatur. In eadē est sententia Dodonæus,
qui Corallinam Officinarum pro Musco ma-
rino pinxit, & descripsit. Constantinus accur-
tius ista perscrutatus perspicuè demonstravit
Bryon thalassion sive Muscum marinum Co-
rallinam non esse quam depinxit Matthiolus.
Fruticosa enim planta & surculosa est Coralli-
na: Muscus verò marinus herbula capillacea,
& veluti villosa instar Musci arborum: conge-
ner siquidem huic est, & forma non tantum
nomine similis: albicante autem colore est aut
rufescente, non autem herbaceo, aliquando
etiam glauco: scopulis qui mari alluuntur con-
crescit, radice nulla notabili, & sæpe osteorū,
gammatorum aut mytulorum testis atque
operculis cum inueterauerint, adhærescere
firmiter obductus conspicitur: cum exaruit, fa-
cile confringitur, & friabilis est, quod è diuer-
so in fucis marinis accidit. Corallina autem
frutex est, & genus fuci marini, de quo proxi-
mo capite tractabimus. Matthiolus Musci ma-
rini à Plinio descripti, effigiem hanc pictam
dedit, eique perbellè notis omnibus respon-
dere scribit. Dodonæus *Βρύον θαλάσσιον* Theo-
phraستي esse putat, viderique primam speciem
esse fuci marini sive Algæ, à Dioscoride de-
scriptæ.

legitur, τὰς φύκας θεωμύνας: tamen Ruellius vertit quæ refrigerare opus sit: perinde ac si φύκας legisset pro φύκας, vt & Plinius legisse videtur, qui eandem omnino vires huic Musco tribuit. Præcipua siccandi ei spissandiq; vis, inquit, & collectiones omnes inflammationesq; cohibendi, præcipuè podagræ, & quicquid refrigerare opus sit. Ab eadem sententia minimè alienus est Galenus, scribens Muscum marinum ex terrea & aquea essentia compositum esse, vtrâque frigida: in gustu enim adstringere, & calidis quibusvis impositum, refrigerare & adiuuare.

PHYCUS MARINUS,

CAP. XI.



ΥΚΟΣ θαλάσσιον, Latine Fucus siue Phucus marinus & Alga, vt etiam in Theophrasto rectè Gaza vertit, quicquid dicat Plinius non habere linguam aliam nomen, quod Græci vocant Phycos, quoniam Alga herbarum magis vocabulum sit, Phycos autem frutex. Nam ipsemet alibi Phycos algâ conuertit & Fucum marinum, vt ostendimus. In Oceano Normanico Bray, aut Brac vocatur, à voce Græca βρύον. Dioscorides tria Fuci marini genera ponit. Fucus marinus, inquit, nascitur partim latus, partim oblongus, & puniceus, partim albus, qui in Creta ad terram nascitur, valde floridus, & nõ putrescens. Plinius de eadem re scribens, tria quoque genera facit. Præcipuè verò liberat, eo malo Phycos thalassion, id est Phucus marinus, lactucæ similis, qui conchylis subternitur, nõ podagræ modo, sed omnibus articulorum morbis impositis priusquam arefiat. Tria autem genera eius, latum: & alterum longius quadamtenus rubens: tertium crispis foliis, quo in Creta vestes tingunt: omnia eiusdem vsus. Nicander ea & aduersus serpentes in vino dedit. Hæc ita ferè etiam Dioscorides tradit, nisi quod Plinius lactucæ folia huic, veluti etiam musco marino attribuit, & similiter conchyliorû testis interni dicit. Idem Plinius. Non habet lingua alia nomē, inquit, quod Græci vocant Phycos: quoniam alga herbarum magis vocabulum intelligitur, hic autem est frutex: folia lata, colore viridi gignit, quod quidam Prason vocant, alij Zoster. Alterum genus eiusdem capillaceo folio, simile fœniculo, in saxis nascitur: superius in vadis, haud procul litore: verè vtrûmq; & interit Autumno. Circa Cretam insulam nato in petris, purpuras quoque inficiunt, laudatissima à parte Aquilonis, aut cum spogiis. Tertium est gramine simile, radice geniculata, & caule qualiter calami. Aliud genus fruticum Bryon vocatur, folio lactucæ, rugosiore tamen, iam hoc interius nascens. Et alio in loco. Et Algam, inquit, maris theriacæ esse Nicander tradit. Plura eius genera vt diximus, longo folio, & latiore, rubente, aliâque crispo. Laudatissima quæ in Creta insula, iuxta terram in petris nascitur, tingendis etiam lanis ita colorem alligans, vt elui postea non possit: è vino iubet eam dari. Nicander autem quem Dioscorides & Plinius citant, in Theriacis aduersus Trygonis venenum inter cetera remedia Algam marinam rubentem numerat hoc versu.

Ἡ δὲ καὶ φοινίσσον δὴ καὶ ἑσάλλειο φύκος.

Sed ad Plinium reuertamur. Is indistinctè & inconstanter Fuci marini genera tradidit, vt faciliè perspiciet qui locos supra citatos, item cum quem capite de Musco marino protulimus, inter se conferet. Præterea aperte Phycos thalassion algam vertit, quod tamen alibi in alia lingua nomen habere negat, modoq; herbam vocat, modo fruticem. Adde quod βρύον, id est Muscum, & φύκος cõfundit. Quæ omnia ex Theophrasto transcripsit, qui tamen multò clarius & diffusius eadem explicauit, non tria duntaxat, sed quinque Fuci marini genera assignans, his verbis.

Τὸ δὲ φύκος τὸ μὲν ἔστι παλαιὸν φυλόν, τέλειον ποῦδες ἔχον, ὃ δὴ καὶ παλαιὸν καὶ λέγουσι τίνες, οἱ δὲ ζωοῦρα. ῥίξαν δὲ ἔχει διαστάντες ἔξωθεν, ἀνωθεν δὲ λεπτεῖα (legendum ex conuerfione Gazæ ἔσωθεν, siue ἐνωθεν δὲ λεπτεῖαν) μακρὰν δὲ ἐπὶ καὶς καὶ ὀπαχύν, π. ρ. β.

Nomina
Lib. 13. c. 25.

Lib. 4. c. 95.
Forma.

Lib. 26. c. 10.

Lib. 13. c. 25.

Lib. 32. c. 6.

Lib. 27. c. 10.

Lib. 4. hist.
cap. 7.

παρόμοιαν τοῖς κρομμυγηθοῖς. τὸ δὲ τευχόφυλλον ὡς περὶ μάραθρον, ὃ ποῶδες, ὃ δ' ἐξωχρον, ὃ δ' ἔχον χυλὸν, ἀλλ' ὀρθὸν ὡς ἐν αὐτῷ. φύει δὲ τὸ ἐπὶ τῶν ὀσρέων, καὶ ἐπὶ τῶν λιθῶν, ὃ ὡς περὶ γάτερον πρὸς τῇ γῇ (mendosa pro ἐπὶ τῇ γῇ) πρὸς γὰρ ὃ ἄμφω, καὶ τὸ μὲν τευχόφυλλον πρὸς αὐτῇ γῇ, πολλῶς δὲ ὡς περὶ ἐπιπλύξιν μόνον ὑπὸ τῆς θαλάττης. γάτερον δὲ ἀνὼτερον, γίνετο δὲ ἐν μὲν τῇ ἔξω, τῇ περὶ ἡρακλειᾶς τῆς ἡλίας, θαυμαστὸν τι τὸ μέγεθος, ὡς φασι, τὸ δὲ πάλαιος μετρίον ὡς παλαιῶν. φέρεται δὲ τὸ εἰς τὴν ἔσω θάλατταν τῷ ῥῶ τῇ ἔξωθεν. χαλῶσι δὲ αὐτὸ παρὰ ὄν, ἐν αὐτῇ δὲ ἐν τισὶ τόποις ὡς ἐπ' ἀνάω τῶ ὀμφαλῷ. λέγει δὲ ἐπέτφον εἶναι, καὶ φύεται μὲν τῇ ἔξω ἡρακλειᾶς, ἀκμάζει δὲ τῇ γέρει, τῇ μεσπορῶν δὲ φθίνει. καὶ δὲ τὸν χαλῶνα ἀπόλλυται δὲ ἐκ τῆς ἰσχυρίας. ἵπταυται δὲ καὶ ἄλλα φυόμενα χερῶν καὶ ἀμαυρότερα γίνεσθαι τῇ χαλῶνι. ταῦτα μὲν ἐν οἷον πρὸς γὰρ, περὶ γὰρ τὴν θάλατταν. τὸ δὲ πάλαιος φύκος οἱ ἀσπογῆς ἀνακολληθεῖσιν πελαγίον, καὶ ἐν κρήνῃ δὲ φύει, πρὸς τῇ γῇ ἐπὶ τῶν πέτρων, πάλαιος, καὶ χαλῶν. ἢ βάπτισις μόνον τὰς παινίας, ἀλλὰ καὶ ἑρα καὶ ἡμάτια, καὶ ὡς ἂν πρὸς φάρος ἢ βαφῇ, πολὺ χαλῶν ἢ χροῖα τῆς πορφύρας. γίνετο δὲ ἐν τῇ πορσεῶν καὶ πάλαιος τὸ χαλῶν (ἢ χροῖα subaud. non χαλῶν, vt in excusis legitur) ὡς περὶ ἀσπογῆς τὸ ἀλλὰ τοιαῦτα. ἄλλο γὰρ ἐστὶν ὅμοιον τῇ ἀρρωστῇ (perperam codices vulgati habent, ἀλλὰ γὰρ ἐστὶν ὅμοια) τὸ καὶ δὲ φύλλον παρὰ πλῆσιν ἔχει, τὸν ῥίζαν γοναῖωδῃ, τὸ πεφυκῆναι πωγίαν ὡς περὶ ἢ (non τῇ) τῆς ἀρρωστῆος. ἔχει δὲ τὸ χαλῶν χαλῶν καὶ γάτερον ἢ ἀρρωστῇ, μεγέθει δὲ ἑλαττον πολὺ τῶ φύκος. ἄλλο δὲ βύρον (sic Plinius & Gaza legunt: quare mendosa sunt exemplaria quæ βύτρον habent.) οὐ φύλλον ἔχει ποῶδες τῇ χροῖα, πάλαιος δὲ ἐκ ἀνὼμοιων τοῖς τριδακύναις, πάλιν ρυσιωδέσπερον, καὶ ὡς περὶ στυπασμένον. χαλῶν δὲ ἐκ ἔχει, ἀλλ' ἀπὸ μᾶς ἀρχῆς πάλαιος τὰ τοιαῦτα, καὶ πάλιν ἀπ' ἄλλης. φύει δὲ ἐπὶ τῶν λιθῶν τὰ τοιαῦτα πρὸς τῇ γῇ, καὶ τῶν ὀσρέων, καὶ τὰ μὲν ἐλάττω χροῖα ταῦτ' ἐστὶν. Id est Gaza interprete. Nam Alga quoddam genus folio lato (addendum ex Græco τετανοφδές, id est distento, pro quo fortasse legendum ταμνοφδές, id est tæniæ modo exprorectum) colore herbido est, quod (παρὰ ὄν) porrum quidam appellant, alij (ζωστῆρα) cingulum, radice hirta extrinsecus, squamata intrinsecus, longa admodum crassa; plene, cepigethyis non absimili (melius, longa modice & bene crassa, crommygethyis, &c.) Aliud folio crinito, terræ ipsi adhærens, fereq; à mari tantum alluitur, alterum altius degit. Hic multa omisit Gaza ex Græco sic reponenda. Aliud folio capillaceo sceniculi modo, colore nec herbaceo, nec valde pallido, caule caret, sed per seipsum quodammodo subrigitur: ostreorum testis innascitur & saxi, non quemadmodum alterum, zostæ scilicet, in terra ipsa defixum. Terræ quidem siue litori vicinū utrumque, sed capillaceum terræ siue litori ita propinquum est, vt à mari alluatur tantum, alterum à litore longius distat. Sic pergit Gaza. Nascitur quidem in mari externo circa Herculis columnas, mira magnitudine, latitudineq; vt ferunt, amplius quam vt manu apprehendi possit. Fertur hoc ad mare internum fluxu extrinsecus, porrumq; id appellant: annum esse, &c. Quæ fidelius sic verti possunt. Nascitur quidem fucus sceniculaceus circa Herculis columnas in externo Oceano, mira proceritate, maiorēque latitudine quàm palmæ vnus: ad internum verò siue mediterraneum mare externi siue Oceani influxu defertur: porrum id vocāt. Ibidem & aliis quibusdam in locis tam altè surgit, vt hominum umbilicum magnitudine superet. Annum esse aiunt (vertit Gaza,) & nasci vere deficiente, vigere æstate, minui (languescere fortè melius) Autumno, interire atque decidere Hyeme. Quin & reliqua omnia nascentia deteriora, obscurioraq; (flaccidiora melius) hyeme fieri. Hæc itaque ceu terrena circa mare deprehenduntur (vel potius, Hæc igitur circa mare propelitus seu terram crescunt) Alga verò proueniens in alto, quam spongiarū pelagicam deferunt, in Creta insula iuxta terram super saxa, plurimā optimaq; prouenit, qua non solum vittas, sed etiam lanas vestesq; inficiunt, & quādiu recens infectio sit, color longè purpure præstat. Gignitur parte Aquilonia tum copiosior, tum melior, vt etiam spongiæ, reliquaq; similia. Sunt alia graminī

graminibus proxima, &c. Dilucidius sic reddi possunt. Alga verò marina quam spongiarij vrinantes referunt ex alto, in Creta quoque iuxta terram, super saxa, plurima optimaq; provenit, qua non solum vittas, sed etiam lanas vestesque inficiunt, & quamdiu recens tinctura sit, color longè est præstantior purpura. Gignitur parte Aquilonia tum copiosior, tum melior, vt etiam spongiarum, reliquaque similia. Est alius fucus gramini similis, quippe folio simili, radice geniculata, lōga, obliquè adhærente modo graminis, & caule calamaceo (arundinaceo) vt gramen, magnitudine alga multò minora (minor.) Est aliud Bryon dictum, folio coloris herbidum, amplo, nec lactucis dissimili, rugosiore tamen, & velut contracto, caret

*FUCVS Capillaceus, siue
Corallina.*



*CORALLINA Britan-
nica, Pena.*



caule: sed ab vno initio plura folia huiusmodi exeunt, & rursus ab alio. Nascitur super lapides fictiliæque iuxta terrâ. Et minora quidem hæc ferme traduntur. Hac oratione, vt diximus, luculenter Theophrastus quinque Fuci marini genera declarauit: Zostera siue Proson capillaceum, siue fœniculaceum, Tinctorium spongiariorum, siue Pelagicum, Gramineum, Lactucaceum. Præterea ex eodem facillè est intelligere Plinium non rectè scripsisse Fucum zostera & capillaceum vere nasci, & inter ire Autumno, cum de capillaceo solo scribat Theophrastus, vere desinente prodire, & non Autumno, sed hyeme perire. Zoster idem quod ζών, id est cingulum, siue baltheus, vbi vis in litore maris Nortmannici visitur, lōgitudine vlnæ, aut etiã maiore, quamuis abruptus, digiti crassitudine, & trium digitorum latitudine, coriaceis mulionum baltheis similis, ambitu, præsertim cū inariorio, sic crispus, vt laciniatus videatur. Nortmannici Oceani litus hac algæ specie vitiosum grauèmq; odorem spirante etiam si longius absis, constratum fere est. Fucum capillaceum siue fœniculaceum qui saxis & ostreorum testis innascitur, nostram Corallinam esse doctiores censent: vt enim ille, ita hæc frutex est, folio capillaceo, fœniculo simili, similiter saxis & ostreorum testis innascitur. Longe aliam Corallinam Britannicam exhibuit Pena, scribēs se in Angliæ litore mediterraneo insulæ Portlandiæ, ex aduerso Nortmanniæ inter fluitantes Algas reperisse plantæ quoddam rudimētum, cuius si spectes & attrēctes furculos palmares, & sesquipalmares, pustulatos, molles, flexiles, spongiam prorsus dicas, cui etiam cōcolor est, & viuere putes: sin habitum & ortū ramis brachiatis, corallinis affiniorem dicas: vnde quidam coniecerūt esse Plocamon Ididos, de quo sic Plinius. Circa Troglodytarum insulas fruticem vocari in alto Ididos Plocamon, Corallio similem, sine foliis, præcisum, mutato colore in

Li. 13. ca. 25.

Fucus Zooster.

Locus.

Forma.

Fucus capillaceus.

Locus.

Forma.

Li. 13. c. 24.

CONFERVÆ Marinae
genus, Lobel.

Fucus tin-
ctor.
Locus.



nigrum, durefcere, cū cadat frangi. Hæc Plinius. Ea tamē, inquit Lobellius, videtur eſſe Antipathes Dioſcoridis, de quo capite proximo. Fucus quem *αβύλιον* vocat Theophrastus, quem etiam Tinctoriū nominare poſſumus, in ſcopulis & petris naſcitur, vnde auulſum vrinantes ſpongiarij referunt, folijs etiā eſt tenuibus, ſceniculo ſimilibus, rubris, ſic tamen vt quædam intermixta ſpectentur adhuc albicantia. Huic ſimilis eſt, fortasſe idem Muſcus marinus, folijs Abrotoni maris, Lobellij, folliculis non diſſimilibus, ſed nonnunquā triplo maioribus, radicem Aſphodeli æquantibus, colore quadātenuſ rubentibus, vel ferrugineis. Fucus alius gramineus

dici poteſt, quod folio ſit graminis ſiue arundinis minoris, ſed æqualiter lato, ac molliore, nec mucronato, vel acuto, quale eſt agroſtis, pollicari latitudine, vlnæ longitudine, vndis innatæ, figura ligulæ, aut tæniæ vittatæ. In vadis naſcitur, vt & Zoſter. Hæc eſt alga quā ruſtici litoribus eiectam & diſperſam æſtate, vt ſceniſcæces (hoc enim ſcœnū eſt marinum, & Monſpeliçſium vulgus Paleam marinam vocat) raſtellis accumulanti, & in cæpo expoſitā furcillis verſant quoad perareſcat: deinde probè ſiccata ſcœni inſtar in metas conſtruunt, aut important in ſcœnilia vel palearia: eaq; ſunt quæ tum præparant pecorum & boum hybernæ ſtabulationi ſtramenta. Ex eo qui hinc cōficiuntur ſimo, agros nimia defrugatione emaciatos, & exinanitos ſtercorant, lato ſcœgētū proventu. Hac pocula & cætera vaſa vitrea qui procul aſportare volunt, inuoluunt & circūtegunt, ne mutuo collifu confringantur. Eadem ſiccata ruſtici tomenti loco culcitras ſuas infarciunt: Quæ olim conſimiliter cognita ipſius cōmoditas in farciendis centonibus in caſtris locum habuit,

Lib. 10. c. 2.

Lib. 5. c. 97.

quod intelligitur ex Vitruuio de teſtudinis conſtructione hæc ſcribente. Circū tabulata collocentur crates ex tenuibus virgis creberrimè textis, maximeq; recentibus percrūdīs coriis duplicibus conſutis, ſarctis Alga, aut paleis in aceto maceratis circa tegatur machina tota. Hæc Algula eſt, cui Dioſcorides in odore corallia cōparat, vi mox dicemus, cū ait: *ἐτι δὲ ὁσμὴν βρωδὴν καὶ φυκίοις ἐμμερῇ ἔχον*. de qua etiam intelligit Nicander cū ſcribit: *βρύα λεπτὰ πολυφύλλοιο θαλάσσης*. qui etiam

F V C V S, ſiue Alga
Tinctoriæ.

ſcitè admodū dixit *φυκιδίας ἔγυδς*, algosās, id eſt litora. Huic iungendus Fucus ferulaceus Lobellij, ſic dictus ob folia ferulacea, minutius diuiſa. Scapum emittit pedalem, in quo Coralina candida ſæpius innaiſcitur. Hæc Lobellius. Quintum Algæ ſiue Fuci marini genus Lactucaceū, in litore aut vadis ſicuti ſuperiora prouenit, ſed ſcopulis & ſaxis inhæret, folijs lactucæ latis, criſpis, ſiue rugoſis, virentibus, ex vno principio multis, nullo caule. Hanc Algam pro Muſco altero piſtam eſſe à Matthiolo poſtremis Commentar. editionibus ſupra diximus, à Dodonæo *βρύον θαλάσσιον* Theophrasti appellari viderique primam ſpeciem eſſe Fuci marini,

Fucus lact.

Forma.

In cap. 94.
lib. 4.

Lib. 3. ca. 71.


Lib. 12. c. 35.



ſiue Algæ à Dioſcoridæ deſcriptæ. Aetius Lactucam marinam vocat de curatione eorum ſcribens, qui obtuenum fluxionem articulari morbo laborant. Et quoque, inquit, quæ in mari naſcuntur plerūque talia ſunt, vt potè quæ Lactucæ appellantur. Sunt autem germina lata, & oblonga, ac viridiora, tenuia, & ſubrugofa, ac veluti

*FVCVS, siue Alga marina
graminea.*

*FVCVS, seu Alga marina,
Lobellij.*



FVCVS Ferulaceus, Lobellij.



*FVCVS, Siue Alga
Intybacea.*



gerandi, inquit Dioscorides, vtilem in cataplasmatibus non podagræ modo, sed etiam inflammationibus: verum iis humidis vti oportet priusquam siccentur. Nicander Puniceum aduersus bestias venenatas valere dicit, eo versu quem supra citauimus. Et Galenus, Fucus, inquit, humens adhuc & vires ex mari exemptus, desiccatur & refrigerat ordine secundo: habet enim quiddam modicè acerbum. And. Lacuna scribit in veteri Dioscoridis codice pro $\psi\upsilon\lambda\lambda\epsilon\gamma\eta$ legi $\tau\upsilon\pi\lambda\epsilon\gamma\eta$, id est adstringentem pro refrigerantem, eamque lectionem rationi esse consentaneam, quod herbarum omnes marinæ ob saluginem insitam, non tam refrigerare quam adstringere cogereque videantur. Fucum

veluti cōduplicata, ad litora maris per fluctus eiecta: præstantiores autè fiunt cum posca decocta. Viridia itè, quæ in Fucis siue Alga tinctoria ad radices sita sunt. Hæc de Fuci marini generibus. Nunc vires eorum explicandæ. Omnia vim habent refri-

Temper.

& Vires.

Lib. 4. c. 95.

Li. 8. simpl.

capillaceum siue fœniculaceum, id est, Officinarum Corallinam recentiores ad necandos lumbricos maximopere commendant, cæterisque medicamentis præferunt, quod eos non modo interficiat, sed etiam eodem die expellat, magna sæpe spectantium admiratione: qua virtute muscum aut Fucum marinum pollere veterum nullus, quod sciam, memoriæ prodidit.

CORALLII FRUTEX, CAP. XII.

Nomina

Lib. 5. c. 97.

Genera.

Li. 5. ca. 97.

Forma.

Lib. 5. c. 97.

Embl. 103.

Lib. 5.

CΟΡΑΛΛΙΟΝ, Latine Corallium similiter, dicitur frutex marinus, cuius natura non ita omnibus est perspecta, ut ipsum vulgò est notissimum. Aliqui *Νηρόδενδρον* vocant, inquit Dioscor. quasi lapideam arborem dixeris, Arabes *Bassad*, *Mergen*, *Besd*, siue *Morgian*, Galli *Coral*, Itali & Hispani *Corallo*, Germani *Coraln*. Genera eius rubens, candidum, nigrum. Candidi tamen neque Dioscorides, neque Plinius meminere, nisi hoc fuerit quod Dioscorides ex quorundam interpretatione colore pallidum dixit, & ut vitiosum improbavit. Corallium, inquit idem Dioscor. planta marina videtur esse, durari autem cum ex alto extracta fuerit, extra mare posita, & tingitur, siue compingitur tanquam à circumfuso nobis aëre: quibus verbis expressa sunt hæc Dioscoridis Græca. *Κοράλλιον λευκὸν καὶ μὲν εἶναι φύλον ἐνάλιον. τέρβον τοις ἰατρὶς ἀλλ' ὅταν ἐκτὸν βυθὸς ἐλκῃ, ἔξωθεν γινώμενον, καὶ βαπτύμενον ἢ τοι πηγνύμενον ὡς περὶ τὸ πικρὸν χυμὸς ἡμῶν ἀερος.* In quibus voces duas deesse putat Cornarius, ὡδαὶ σίδηρος, ut sit legendum, ἔξωθεν γινώμενον & βαπτύμενον, ἢ τοι πηγνύμενον ὡς περὶ ὡδαὶ σίδηρος ὑπὸ τῷ πικρῷ χυμῷ, &c.

CORALLII Frutex.



Ibidem.

quæ sic conuertit, & extra mare posita, ut quæ à circumfuso nobis aëre velut ferrum ab aqua tingitur, siue compingitur. Cuius emendationis occasionem illi dedit, opinor, vox *βαπτύμενον*. Cum enim *βάπτειν* tingere, intingere, immergere significet, inde suspicatus est Dioscoridem intelligere Corallium in aquis molle, inde extractum, ab ambiente aëre statim solidari, quemadmodum ferrum igni emollitum in aquam immersum, statim durefcere. Et certe vox *βαπτύμενον* à Ruellio omiſſa est, qui sic locum hunc conuertit. Corallium marinum esse fruticem constat, qui alto extractus, duratur statim atque emergit, tanquam offuso aëre protinus cōcreſcat. Idem Dioscorides locum, delectum, odorem & effigiem Corallij sic describit. Plurimum inuenitur ad Syracusas, in promontorio, cui pachyno nomen est. Optimum est, colore rubēs, & colore simile antherico, aut sandyci saturatæ, quodq; facile teritur, æquabileque est toto concremento: præterea quod odore est musci marini, & simili algulæ siue Fuci marini. Ad hæc quod ramo-

sissimum est, & forma cinnamomum fruticem refert: quod verò concremento lapidosum est, scrupulosum (sic Ruellius interpretatur *τῇ χροῖ, ψωρὸν*, id est scabrum, Plinium opinor imitatus, qui scabrosum conuertisse videtur. Cornarius legit *ὡχρὸν*, cum nullus color, inquit, *ψωρὸς* dictus, vertitq; colore pallidum) cauernosumq; ac inane vitiosum esse putandum est, Plinius de eodē ita tractat. Quantum apud nos Indicis margaritis precium est, tantum apud Indos Corallio: namq; ista persuasio

Lib. 31. c. 2.


persuasione gentium constant. Gignitur quidem & in rubro mari, sed nigrius: item in Persico vocatur *Iacc*. Laudatissimum in Gallico sinu, circa Stœchadas insulas, & in Siculo, circa Heliam ac Drepanum (Cornarius Æolias pro Heliam emendat) Nascitur & apud Grauiscas, & ante Neapolim Campaniæ, maximèque rubēs, sed molle, & ideo vtilissimum Erythris (vox Erythris planè supposititia est, & delenda, eodem Cornario auctore) forma est ei fruticis, color viridis. Baccæ eius candidæ sub aqua ac molles: exemptæ confestim durantur & rubescunt, quasi (legendum qua, eodem emendatore) corna satiua specie atque magnitudine. Aiunt tactu protinus lapidescere, si viuat. Itaque occupari euelliq; retibus, aut acri ferramento præcidi. Hac de causa curallium vocitatum interpretantur: probatissimum quàm maximè rubens, & quàm ramosissimum, nec scabrosum, aut lapideum, vel rursus inane aut concavum. Auctoritas baccarum eius, non minùs Indorum viris quoque pretiosa est, quàm seminis nostris vniones indici. Aruspices eorum vateq; imprimis religiosum, id gestamen amoliendis periculis arbitrantur. Itaque & decore & religione gaudent. Priusquam hoc innotesceret, Galli gladios, scuta, galeas, adornabant eo. Nunc tanta penuria est vendibili merce, vt perquã rarò cernatur in hoc orbe. Hæc Plinius de Corallio: quod in mari Ligustico circa Stœchadas Malsilienses insulas nasci Solinus etiam testatur: atque hodie quoque nascitur, ac in mari Siculo ac Tyrreno magna copia, cum Plinius de eius penuria conqueratur. Quod verò is de baccis tradit, falsum esse aiunt, quod nullæ omnino in Corallio baccæ nascantur, sed ex ramis eius ab artificibus torno & lima effingantur pro materia, & vt quibusvis visum fuerit in vsum aliquem efformare. Ad hæc Corallia cum ex mari extrahuntur, muscosa sunt vndiquaq; nec rubent: deinde artificibus tradita ita poliuntur, vt natescant & rubeant. Præterea quod dixit Plinius, quod euellatur retibus, aut acri ferramento præcidatur dictum esse Corallium, id intelligendum dici Corallium, quasi curallium, ἀπὸ τῆς κερᾶς, vel quasi τῆς κερᾶς ἐλασθῶν, id est tonsura & præfectione captum: nec aliter Theophrastus quàm curallium appellat, à radendo, scilicet. Certe Corallium in mari ex succo lapidescente concrecere, & priusquam extrahatur sub aquis, molle esse, ac virescere, cum extractum est, aliàs rubere, aliàs niueo candore albescere, aliàs atrum esse constat. Iisdem in locis candidū reperitur, non tam cōpactum, neque tam ponderosum, quàm rubrum, sed leuius ac raram, & spōgiarum modo inane, sub iisdem Thyrrheni maris vndis euellitur. Appingitur etiam à Lobellio Coraloides, siue Corallij albi varietas, stipite longè crassiore, brachium æquante, & materia magis fungosa, multis acetabulis insculpta, aut inscripta. Vniuersa planta pedem vnum longa est, vixque curbitum proceritate superat. Is verò Corallij frutex quem depictum proponimus saxo adhuc inhaerentem, altera sui parte & furculosiore candicabat, minutisque foraminibus pertusus erat, altera in pauciores virgulas diuisa rubebat, & tubercula quædam, veluti baccas tuberosas ferebat, cornis satiuis non dissimiles. Quare immerito reprehenditur Plinius, quod huic frutici baccas tribuerit, vt aliis arboribus

CORALLIVM Album
& rubrum, Lobel.




CORALLOIDES, Sive

Corallij albi varietas.



ANTIPATHES, Sive

Corallium nigrum.



Ibidem. suos fructus. Quod verò Antipathes vocant, inquit Dioscorides, Corallium esse putandum est, specie solum differens. Est autem colore nigro, arboris figura, ramosum magis. Tale se Neapoli vidisse affirmat Matthiolus, ebum colore referens: plantam eius aliam postea sibi dono datam, propè radices brachij ferè crassitudine, à medio trunco in ramos sese diffundentem, rem quidem raram, & aspectu pulcherrimam. Masilia inter Corallia occurrit, insigni læuore perpolitum, colore nigerrimo. Deinceps de Corallij vsu & viribus dicendum. Coralliū adstringit & refrigerat moderatè, auctore Dioscoride, reprimi extuberantia, & cicatrices in oculis exterit: replet etiam caua (redundant hîc voces duæ καὶ ἐλκὺς ex præcedente versu repetitæ Cornarij sententia. Ruellius eas retinet: vertit enim, vlcerum caua & cicatrices explet.) Ad sanguinis reiectiones maximè efficax est, & in vrinæ difficultate conuenit. Splenem quoque liquat cum aqua potum. Antipathes eandem vim habet. Hæc Dioscorides. Candidum creditur longè magis quàm rubrum refrigerare. Plinius de eiusdem vsu partim etiam hodie vulgò nota, partim eadem quæ Dioscorides habet. Surculi, inquit, infantia adalligati, tutelam habere creduntur, contraq; torminum, ac vesicæ & calculorum mala in puluerem igne redacti, potique cum aqua auxiliantur. Simili modo ex vino poti, aut si febris sit, ex aqua somnum adferunt. Ignibus diu repugnant. Sed eodem medicamine sæpius potu tradunt, lienem quoque absumi sanguinem reiicientibus, excreatibusve mendentur. Cinis eorum miscetur oculorū medicamentis: spissat enim ac refrigerat: vlcerū caua explet, cicatrices extenuat. Hæc Plinius. Coralliū, inquit Matthiolus, comitialibus commodè adalligatur, hauriendūque præbetur. Ædes, vt aiunt, à fulminum iniuria tuetur: mensium abundantiam cohibet, dentes cōmotos firmat, desquamatas gingiuas emendat, oris vlcera sanat: potu dysentericos iuuat, seminis profluuiū in viris, in fœminis alba vteri profluuia reprimat. Recèsetur ab Auicenna inter ea quæ cordi hilaritatē adferūt. Corallij Galenus in lib. simpl. medica. non meminit, sed lib. 7. de compos. medicam. local. multa describit medicamenta ad incipientem phthisim, ad hæmopticos, ad suppuratos, quæ Corallium recipiunt.

KALI



AVRITANI plantas quasdam Kali & Alkali vocant, ex quibus vltis sal fit, Salkali ab iisdem dictum. Tres huiusmodi cōgeneres & maritimas recenset Pena, quæ crithmum, inquit, representare quibusdam videri possent, nulla tamen antiquis videtur nota fuisse aut descripta:

KALI Magnus, Pena.



KALI Mains, Pena.



tātum abest vt Salkali, quod vocāt, ex vna istarum vsta, & quod magis mirum est, fusa fieri nouerint, vix tacituri si sciuissent. Quare vt nomen, sic & plātam ipsam, & modum salis istius parandi videmur Græcis recētoribus, aut philosophis Arabicis, Chymistis & Hyalurgis debere. Prima species hīc picta notior est in maritimis Gallia Narbonensis, vbi tum sponte, tum sata campos maritimos frequenti caulium rubentium operit purpura, fruticat caule cubitali & sesquicubitali, carnosio, portulacæ concolori, foliis densis, angustis, semperuiui medij siue minoris, teretifolij duplo lōgioribus, acutioribus, inter quæ semina limacæ pusillum vel spiram imitantia, colore fusca, folliculis maluæ seminis ritu occlusa. Hanc dudum sic depinximus. Minus obuia hæc Septentrionalibus, imo nuspiam ferè. Istius copia per initia Autumni coaceruatur metæ instar, super scrobe cui ligna insunt decussatim instructa, quibus accēsis herba vritur, & biquatur, & in profundum scrobis defluit, vbi cogitur in glebam coloris nigricantis vel cinerei, quod Kali & Alkali sicuti & herbam nominant, Galli *Soude*, ad vitrum confluendum, quod in Italiam & Septentrionem ex Gallia Narbonensi & Aquitania defertur. Vrit non secus ac Causticum. Eosdē ad vsus sedulo colligunt maritimi coloni Narbonenses secundam hīc pictam, iisdem natalibus, sed folijs & caulibus minoribus multo, minusque carnosis, angustioribus, nec ita rubentibus, sed ex pallido virentibus, vnde vulgo *blanchette* quasi Kali album vocatur. Semen exiguum, nigrum, vriticæ aut acetosæ. Non solum calidioribus regionibus, sed etiam ad Septentrionem, Angliæ, Normanniæ, Belgio familiaris. Multo frequentissima est in quibuscumque maritimis oris tū Oceani tum mediterranei maris, quæ Salicornia vulgo vocatur, siue Kali geniculatum, sed effigie multum diuersa, & cuius folia videntur esse teneri turiones ramulorum. Sunt enim è radice fibrosiore permulti cauliculi cubitales, recti, densius geniculati, extremis quasi folijs crassiss, pinguibus, carnosiss, teretibus, per




SALICORNIA, siue
Kali, *Matthioli.*



crebra genicula insertis, & pyxidatim quasi par-
uorum alabastrorum instrar, quadā equiseti si-
militudine, & cornua recta, obtusius mucrona-
ta imitantibus, gustu non insulso, nec tempera-
mento aut vsu à ceteris dispari, sed vbique ne-
glecta. Semen nullum profert. Dodonæus tria
Kali assignat genera. Primum est, secunda An-
thyllis, secundū, Tragus Dioscoridis, Tertium,
Salicornia, cuius picturam dat ab ea quam hîc
ex Pena expressimus, plurimum distantem.
Amatus Lusitanus scribit omnem cinerem qui
ex Syria aduehitur ad conficiendum saponem,
& vitrum, ex herba anthyllide combusta fieri,
hodièque multos ignorare cinerem istum Al-
kali esse: omnes istas herbas abstergendi vires
habere, ac stigmata & maculas faciei delere.
Quod ex istis dum vruntur, liquatur & tâquam
plumbum fluit, cum refrigeratum est, concre-
scere, & veluti cineres conglobatos esse, quos
etiam Alumen Catinum vocant, ex quo vitra
conficiuntur. Hos si quis an veri sint experiri
voluerit, in ignem coniiciat: quod si eliquan-
tur ac ebullierint, verum Kali esse dicet, sin mi-
nus, contra. Ex horum cinerum lixiuio sal Alkali cõfici, & ex vitri materia fluit &
cogitur, axungia vitri hodie nuncupatur, Gallicè *Sein de verre*. Matthiolus duas
Kali species tum sua deliniatione, tum pictura, in vnam cõfundit, scilicet Kali ma-
gnum sedi minoris folio, Gallis *Soude* nuncupatum, & id quo de hîc agitur, quod
falicornia vel Kali geniculatum nominatur. Pictura hîc videtur, delineatio eius est
eiusmodi.

Lib. I. c. 76.

Enarr. 150.
in lib. 3.
Diosco.



In cap. 112.
lib. 2.

eiusmodi. Cum primum, inquit, è terra emergit, folium est tereti forma, minori scde non abfimile, atque deinde crescens caule erecto, geniculato, non multo post tempore in digitalem ferme longitudinem attollitur, cum verò amplius adoleuerit, è geniculis folia mittit pingua ac crassa, in medio caua, & ex lata origine mucronata, vbi denique planta adulta senescit, folia in caulium cacuminibus longe minora exilioraque conspiciuntur colore rufo: ex quorum ortu pilula prodeunt rotunda ac parua, quibus exile semen includitur. Caules habet pingues & rufos. Hæc Matthiolus.

CRITHMI SPECIES, Matthioli.

CAP. XIII.

LIS subiungenda tertia Crithmi species à Matthiolo tradita, quæ in maritimis prouenit, & ab vna radice multos emittit caules rectos, circa quos folia habentur, per interualla tamen plura ex vna origine acruatim prodeuntia, longiuscula, crassa, & falso etiam gustu, sub horum exortu peculiare quoddam erumpit folium, cæteris duplo longius, vnde prope caulis cauitatem pediculus exit, è quo sex, septemve folia breuiora prodeunt, vt eius appicta effigies ostendit, flores fert in cacumine orbiculatos villososque, colore pallido. Radice nititur longa, tereti, non sine adnatis. Hæc est ex Matthiolo huius herbæ delineatio, quæ nihil prorsus cum Dioscoridis Crithmo similitudinis habet. Crithmum enim foliis fruticat pinguibus, longioribus & latioribus

In cap. 122.
lib. 2.
Forma

CRITHMI SPECIES
Tertia, Matth.CRITHMUM Chrysanthemum,
Dodonæi.

quàm portulacæ, falsis, floribus candidis, &c. Quare alij herbarij minimè Crithmum esse censent. Lobellius litoreum Chrysanthemum appellat, Asterem Atticum marinum. Crithmum Chrysanthemum Dodonaus exhibet huic simile, si non idem, sed flore quantum ex Micone perspicere licet, differens: habet enim in cacumine ramulorum florem Chrysanthemi æmulum, & medio videlicet disco, & orbiculato ambitu luteum, & Crithmum verò tertium Matthiolus scribit habere orbiculatum, villosumque, colore pallido.

ANTHYLLIS, CAP. XV.

Nomina

Genera.

Diosf. lib. 3.
cap. 136.

Forma.



Ἄνθυλλον Græcis dicitur, & Latinis Anthyllis, Plinio Anthyllion quam alij Anticellion vocant, inquit. Videtur autem ἀνθυλλίς ἀπὸ τῆς ἀνθίσιν dicta, nempe à floreſcendo, quasi florida, à lanugine cæna qua pubet: vel à flosculorum elegantium copia. Anthyllidis genera duo sunt Dioscoridi, Plinio, Galeno. Quædam enim folia lenti similia habet, ramulos palmi altitudine, rectos, folia mollia, radicem tenuem, & parvam. Nascitur in salſuginosis locis & apricis, gustanti subſalſuginosa. Altera foliis & ramulis chamæpityi similis est, hirsutioribus tamen, breuioribus & asperioribus, flos est purpureus, vehementer grauis odoris, radix velut cichorij. Plinius in paucis à Dioscoride diffentit: Est & herba anthyllion, inquit, quam alij anticellion vocant, duorum generum, foliis & ramis lenticulæ similis, palmi altitudine, sabulosis, apricis nascens, subſalsa gustanti. Altera chamæpithyi similis breuior & hirsutior, purpurei floris, odoris grauis. Hic sabulosis dixit, quod Dioscorides ὑπαλμύρις, id est, salſuginosis. Anthyllidem priorem hîc depictam Dodonæus esse putat, à lente foliis & caule parum distantem, nisi candidior, mollior, & minor esset. Caulis est pedis altitudine, albus, tangenti suavis, folia explicata, mollia & alba, minora & densiora quam in lente flosculi: in caulis summitate congesti, palliduli aut lutei: semen in paruis filiquis: radix tenuis & lignosa. Perquam affinis est aut eadem hîc appicta Medica

Lib. 21. c. 29

Lib. a. c. 7.

ANTHYLLIS Prior,
Dodonæi.ANTHYLLIS Altera,
Dodonæi.

marina à quibusdā dicta. Anthyllis altera Dodonæi à recetioribus quibusdā Borda dicta Kali species, vt multi existimant, quinos, senos, pluresve ramulos emittit, graciles, per humū repentes, foliolis vestitos, angustis, densis, inter quæ & ramulos flosculi emergunt purpurei, deinde semen, radix gracilis est, digitali lōgitudine. Tota succo plena est, eoq; ſalſo. Salſuginosis sabulosisq; locis & litoribus marinis Zelandiæ frequens. Iunio mēſe floret: Iulio semen maturum est. Desiccatur, & vulneribus glutinandis

Locus.

glutinandis est utilis. Anthyllides alias Pena exhibuit : primam quæ in Angliæ insulis australibus, ea præsertim quæ Portlandia vocatur, litore Nortmanniæ obuerso plurima & pusilla prouenit in sabuletis & arenosis vadis depressis & apricis, ramulis palmum trësve uncias longis, angulosis, pallentibus, foliis lenticulam vel alfinem minorem referentibus, flosculi cauliculis summis insunt ex buxæ herbacei, dentatim stellati sedis minoris Iunio & Iulio : semen tithymali in perexiguus & triquetris thecis alit, radix prolixior est, exilis, geniculata, sabulo altè infossa soldanelæ modo. Tota salsa est, gustanti amaricat, & parum quiddam calfacientis indicat. Alteram quæ in maritimis agri Nitrobrigum ad vicum Peraus dictum, & Latera passim reptat vti superior, ramulis compluribus, sesqui palmariibus, foliolis al-

*ANTHYLLIS Portlandia
lenticolia, Pena.*



*ANTHYLLIS Marina Narbonens.
Alfines folio, Pena.*



ANTHYLLIS Valentina, Clusij.



finæ, aut potius lenticulæ, sed per intervalla quædam, quasi circum genicula exortis, numerosis: copiosis item flosculis, in summo aggregatis, muscosis, albidis, floridum quasi nomen Anthyllidis ostendantibus & testatibus, seminis etiâ pusilli feracissimis,

gustu amaricante, subfalso, nitroso, calidiusculo. Tertiam quæ iisdem locis maritimis repit, cæteris multò falsior, foliis & facie est herniariæ aut chamæfycæ, flosculis pusillis subter foliola ex albo purpurascētibus: semina in florum calyculis quàm clinopodij

clinopodij min oribus multò ocluduntur. Tota gustu salso, acidulo, lactei succi expers & exuccas, nec proinde Chamæscæ statuenda, vt quidam prodiderunt. Ad hanc accedit, aut eadem est Anthyllis Valentina à Clusio descripta & picta, quæ cauliculos multos ex vna radice profert, dodrantales, ramosos, humi stratos, subrubentes: foliola Lentis exigua, seu potius Chamæscæ, salso gustu, & plerùmque cum suis ramis veluti quadam salugine respersa: flores inter ipsa folia pusilli, quatuor foliolis constantes, ex albo purpurascens: radix singularis, nigricans. Tota chamæscæ adeò similis est, vt primo aspectu Chamæscen putarit, lacte tamen caret. Hanc nusquam se vidisse meminit, quàm ad fossas vrbs Valentia in Hispania. Illic Anthyllidem D. Placa vocabat, & ad primum genus à Dioscoride descriptum referebat: cui Clusius non assentitur. Etsi enim reuera inter Anthyllidas recensenda sit, prima tamen esse non potest quæ rectis ramulis assurgit, cum hæc repentes habeat ramulos, totaque facie Chamæscem propemodum referat. Hæc auctore Lobellio, consimili facie cum Herniaria & Chamæscæ in vineis & oliuetis Boutonetum versus, & Castrum nouum fusè humi spargitur, cauliculis palmariibus & dodrantalibus, flosculi ex albo purpurascunt, quatuor foliis conflati. Hanc olim cum aliis Chamæscen alteram putauit, sed non lactescit, gustu salso, præscico. Anthyllides, vt scribit Dioscorides, potæ drachmis quatuor vrinæ difficultati, & nephriticis plurimum auxiliantur. Tritæ vuluæ pituitas emolliunt cum rosaceo & lacte imposta (Sic Ruelius ex mendoso codice vertit. Legendum verò ἐκμαλῆσσαι φλεγμονὰς ἐν ὑστέρα λεῖται, id est, tusa emolliunt vteri phlegmonas, &c. Quæ lectio rationi magis consentanea est. nam pituita expurgantur, phlegmonæ emolliuntur) vulneribus medentur. Quæ chamæpityi similis est, præter alia etiam comitiales sanat cum aceto mulso pota. Plinius ampliorem eius vsum medicum descripsit, & nonnihil à Dioscoride dissentit. Prior Anthyllis, inquit, vuluis aptissima, & ex rosaceo & lacte imposta etiam vulneribus. Bibitur in stranguria, renumque doloribus tribus drachmis. Altera bibitur in duritia vuluarum, & in torminibus, & in comitali morbo, cum melle & aceto quatuor drachmis. Repetit eadem alio in loco. Anthyllion est lenti simillima, quæ in vino vesicas vitii liberat, sanguinem sistit. Altera est Anthyllis chamæpityos similis, &c. Scribit & idem Anthyllides duas esse vuluis vtilissimas, torminibus, & more secundarum in vino potas. Dioscoridi Galenus assentitur. Anthyllis, inquit, duplex est, sed vtrâque modice desiccata, vt & vlcera glutinet. Cæterum altera chamæpityi similis quadantenus subtiliorum est partium, adeò vt & comitialibus competat. Quin & ipsa magis quam altera extergere potest.

ANTHYLLIS Marina
altera Narbonens. Pena.



Lid. 4. c. 136.

Lacur.

Lib. 21. c. 29

Li. 26. c. 8.

Lib. 26. vlt.

Lib. 6. sim.



FOLIORVM similitudine & odore hæc ab herbariis Eruca vel Artemisia cinerea nuncupata est, quæ in maritimis Corcicæ prope Aiacæam gignitur, radice modicè fibrata, crassâ, caule sesquipedali, anguloso, lanugine candida, & molli contacto: foliis Erucæ siluestris, aut Artemisicæ minoris profundius incisîs, auersâ parte candicantibus, aduersâ cinereis, lanuginosis, densis: flore in vertice caulium, & ad superiorum foliorum exortum velut racematim congesto, spissâ lanugine, incano, nigris punctis maculoso, odore & sapore Artemisicæ, cui similes vires habere putatur.

Nomina

Locus.

Forma.

CINERARIA, CAP. XVII.



TOTIVS plantæ colore cinereo vocata Cineraria, in maritimis prouenit, procera, surculosa, & ramis multis fruticante, lignosis, duris,

Nomen.

Locus.

Forma.

folio Artemisicæ, sed crassiore & ampliore: flore luteo, senecioni simili, copioso, virgulis insidente, in quas caulis fastigium diuiditur. Qui procul hanc plantâ aspexerit è Cinereo candicantem, & tanquam lanugine opertam, eam cinere totam conuersam de industria obductamq; iudicauerit, non iniucundo spectaculo, quare Cinerariæ nomen ei ab herbariis inditum est. Vnicum eius ramulum depinximus, Pena plâtam integram, rariorem, & littorum marinorum indigenâ, maiorem fru-

CINERARIA.

IACOBÆA Maritima, Pena.



BBB

IACOBÆA Marina,
Dodonæi.



ricosiorémq; senecione, pluribus virgis duris, & foliis maioribus, profundiusq; incisís & sinuatis vt Artemisiæ rigidioribus, crassioribus, cinereo tomento obductis, vti & reliquæ partes. Flores sunt melini, Iacobææ senecionis pappis diffluentes. Exsiccat valde, digerit, & inodora est, sed platarum maxima pars quæ in littore maris, aut non ita procul crescunt & aluntur, eum ferè colorem contrahunt, siue falsi vaporis afflatu quem mare allidit, siue alimenti falsugine id fiat: pereunte, non solum languescere colore illo cum in hortos translata coluntur, vt in absinthio feriphio marinove obseruare licet, quod in littore maris albicat, in hortis educatum mutato colore, herbaceo virore pallet. Alius est Senetio marinus quorundam, Iacobæa marina Dodonæi, quæ & Artemisia marina à nonnullis dicitur, Iacobæa maiori quādamtenus similis est, sed huic cauliculi non rubent: foliis est minoribus, cādidioribus, profundius & minutius infectis, flores etiam similes, tamen pallidiores: radix est longa, fibrata, serpitque furculos multos producens. Locis mari proximis crescit.

ASTERIAS SIVE STELLARIA,

CAP. XVIII.

Nomina

Lib. 22. c. 17

Locus.

Forma.



ASTERIAS siue Stellaria nomen est multis plantis commune. Hoc enim nomine donantur Bubonium, Coronopus, Alchimilla, Cardui genus Theophrasti Myachantha, perdicij quoque alterum genus à Plinio Astericum quasi stellare nominatum. Præter omnes alias sua est Monspelienfis Asterias siue Stellaria hîc depicta herbula, haud procul à mari in falsis sabuletis proueniens, radice superuacua, pilo vix crassiore: caule dodrantali, tribus aut quatuor exiguis ramulis furculoso: foliis galij, breuioribus & angustioribus, stellatim per interualla caulem ambientibus, vt in aparine: flore rubro, minimo, in stellulis hirsutis micante. Siue foliorum ordinem, siue florem intuearis, vbique stellarum effigies occurrit. Quapropter Asteriam siue Stellariam nuncuparunt.

S P E R G

SPERGULA MARINA,

CAP. XIX.

CASSIA Ligneæ,
Maritima.

SIMILITUDO quæ huic herbæ est cum Spargula vulgari locis umbrosis, incul-
tis, atque etiam aliquando cultis na-
scente, fecit vt Spargula marina dice-
retur, quòd in maritimis proueniat, hoc illi dis-
similis, quod ad caulium articulos pauciora, bre-
uiora, & candidiora folia ferat, quodque gustu sal-
so sit, vt cæteræ plantæ quæ marinam aquam pro-
liciunt.

Nomen.]

Locus.

Forma.

CASSIA LIGNEA MARITIMA,

CAP. XX.



CASSIAM ligneam herbarij plantam istam vocant, cuius nominis causa mihi adhuc est incognita. In maritimis crescit, radicibus copiosis, densis: caulibus multis ex vna radice prodeuntibus, surculosis, lentis, fractuque contumacibus, virgatis: foliis lenticulæ numerosis, per surculos inæqualiter dispositis, gustu adstringentibus. In ramulorum & surculorum verticibus fructus exiguus eminet, oblongus, niger, umbilicatus, ita gustu adstringens, vt acerbitatis nonnihil habeat. Quidam genistæ marinæ genus esse putant, licet filiquas nullas edat.

Nomen.

Locus.

Forma.



ERYTHRODANVM Marinum,

CAP. XXI.



ASIMILITUDINE etiam erythrodanum marinū nominatur, quod in litoribus arenosis gignitur, radice prælonga, è rufo rubescen-
te, lignosa, surculosa: ramulis multis in orbem humi stratis: foliis rubiæ minoris, ex in-
teruallis ramulos verticillatim ambientibus, rigidis: flore pusillo, herbaceo, ex foliorum aceruo prodeunte, filis tenuissimis subnixo.

Nomen.

Locus.

Forma.

ERYTHRODANVM

Marinum, Dalech.

POLYGONVM MARINVM,

CAP. XXII.

Nomen.

Locus.

Forma.

POLYGONVM *Marinum*
prius, Dalecham.

MARINVM Polygonum ab herbariis planta hæc vocatur, quòd rami vt in Polygono alio per terram spargantur, folijsque Polygonum vbiuis nascens imitetur. In littoribus & locis quæ maris fluctus alluit, gignitur, radice è rubro nigricante, crassa, lignosa, paucissimis fibris capillatata, sensim gracilescente: caulibus multis, humi stratis, in orbem diffusis: foliis densis, nigricantibus, interuallo dispari caules ambiètibz, Polygono affinis, sed myrto proximioribus, singulorum foliorum exortum membranofus cortex & candicans cõtegit, quasi decidui aut renascẽtis foliis folliculosa squama. Semen nõdum mihi visum. Aliud Polygonum in maritimis fruticat, radice lignosa, nigricãte, modicè fibrata, caulibus multis, vno & altero cubito procerioribz, cortice subrubro vestitis, ramosis: foliis admodũ densis, ramos & furculos operientibus, Polygono mari similibus nõnihil angustioribus & longioribus, gustu in maritimis

POLYGONVM *Marinum*
alterum, Dalecham.

Lib. 27. c. 12. falso, alioqui adstringẽte. Herbarij quidam Polygonum siluestre à Plinio descriptũ esse putant. Quartũ genus, inquit, siluestre appellatur, penè arboris modo frutex, radice lignosa, stirpe cedri rubicundo: ramis sparti binũ palmorum, nigris geniculorum ternis quaternisve articulis, fuere qui Aizoum marinum vocauerint.

GNAPH



GNAPHALII nomine plantas aliquot donarunt herbarij, ob densam lanuginem qua operata sunt earum folia, cuiusmodi hæc est quæ in li-
toreis sabuletis provenit, radice lignosa, subatra, crassiuscula: cauli-
bus multis, palmum altis, foliis satis densis, gracilibus, longis, angu-
stis, acuminatis, rarissimarini ferè aspectu, incanis. In caulium singulorum vertici-
bus capitula emicant squamatim compacta, turbinata: flos luteus, in pappos abit
prolixos, densos, pictorum penicillis similes. Num hæc impia herba Plinij po-
tius fuerit? Sic enim ille. Herba impia vocatur incana, rarissimarini aspectu, thyrsi
modo vestita, atque capitata: inde alij ramuli exurgūt sua capitella gerentes: ob id
Impiam appellauere, quoniã liberi super parentem excellant. Alij potius ita appel-
latam, quod nullũ animal eam attingat, existimauere. Est aliud Gnaphalij genus in

Nomen.

Locus.

Forma.

Lib. 24. c. 19

GNAPHALIVM Marinum,

Dalechampi.



GNAPHALIVM Marinum

Tomentosum.



maritimis quoque proveniens, tomentosum ab herbariis cognominatũ à densio-
re lanugine qua totum obsitum est, vt si qua alia plãta, certè hæc Gnaphalij nomi-
ne sit dignissima. Radice nititur crassa, longa, lignosa, sæpius exesa: caules edit mul-
tos, sesquipedales, foliis circũtectos mollissimis, albis, rutaceis, verũ paulò amplio-
ribus, cana lanugine contectis, gustu adstringenti: flores in summis caulibus con-
gestos, luteos, corymborum specie. Ad dysenteriam vtiliter folia trita ex austero
vinò bibuntur.

Forma.

Vires.

TRAGVS SIVE SCORPIO MARITIMVS,

CAP. XXIIII.



TRAGVM & scorpionem de multis plantis dici ex Plinio intelligere
licet scribente, In totum spina est asparagus, scorio, nullum enim fo-
lium habet, quod de scorpione Theophrasti accipiendum, qui Nepa
Latine à Gaza dicitur. Et alio in loco. Tragon & Asia fert (vulgati

Nomina

Lib. 21. c. 15.

Lib. 6. hist.

cap. 1.

Lib. 17. c. 21.

codices Tragion habēt) siue scorpionem, veprem sine foliis, racemis rubentibus ad medicinę vsum. Et rursus. Est & alia herba Tragos, quam aliqui scorpionem vocāt, semipedem alta, fruticosa, sine foliis, pusillis racemis rubentibus, grano tritici, acuto cacumine, & ipsa in maritimis nascēs. Quib⁹ in locis de Trago loquitur de quo

Lib. 22. c. 15. *TRAGVS siue Scorpium maritimus, Dalechampij.*



Lib. 15. c. 10.

Lib. 9. hist. c. p. 19.

Cap. 86.


Cap. 46.

Lib. 4. c. 46.

TRAGON, Marthioli & Lobelio.

Locus.

Forma.



Lib. 4. c. 46

hic agimus. Item, Ex argumento nomē accepit Scorpium herba. Semen enim habet ad similitudinem caudæ Scorpionis, folia pauca. Est & alia eiusdem nominis affectusq; sine foliis, asperagi caule, in cacumine aculeum habens, & inde nomen. Vbi prioris Scorpij nomine heliotropium magnum intelligit, quod tamen Dioscorides non Scorpium, sed Scorpium vocat, & florem habere ad similitudinem caudæ Scorpionis, non semen scribit, ut ipsius etiam rei inspectio demonstrat. Postremò Thelyphonon etiam Scorpium vocat. Thelyphonon, inquit, ab aliis scorpium vocatur, propter similitudinem radices, &c. Quod de Theophrasto mutuatus est. Est & Tragos cerealis, de quo Dioscorides lib. 2. Hic verò de Trago tractamus maritimo, de quo idem lib. 4. quem aliqui, inquit, Scorpium vocant. Dicitur autem Tragos ut & cerealis ille, non ab hirci aut odore, aut aliqua alia similitudine, sed ἀπό τῆς τρογῶν, id est, à comedendo, unde & trogonon vocari testatur Dioscorides, id est, edule, unde etiam τρογῶνιζα. Latinis Bellaria dicta, Gallis *Dragee*. Est autem Tragus verus pridem à Dalechampio cognitus, & amicis communicatus, atque ita descriptus antequam recentiorū vllus de eo quicquam literis mandasset. Herba maritima in arenosis tumulis & litoribus gignitur, fluctu maris allidi & obrui salitis, radice crassa, lignosa, longa, cortice fusco vestita: foliis nullis, ramulis quamplurimis, palmo altioribus, genistæ modo læuibus, & gracilibus, instar equiseti geniculatis, cacumine pungentibus, adnatis multis, vertice quoq; subulæ instar tractantium manus perfodientibus: flore minutulo, candido, in oblongum sertum coaceruato: semine grano tritici magnitudine pari, anguloso, principio rufescente, postea nigrescente, in singulis loculis herbaceis gemino, pediculo ad ramulorū alas subnixis, gustu adstringente. Quæ omnino cum Dioscoridis delineatione conueniunt. Tragus, inquit, nascitur maximè iuxta mare, frutex parvus, per terram oblongus, non magnus, palmi altitudine, aut maior, foliis caret. Verum in ramis adherent veluti acini parui, rufi, magnitudine tritici, cacumine acuti, multi, gustu valde adstringentes. Plinius iis quos

supra

supra citauimus locis similiter ferè depingit, nisi quod veprem esse ait, & rubètes racemos edere, cum veteres, nec sentibus nec vepribus adnumerarint, licet extremo cacumine pungat, nec rubentem fructum ferat, sed *πυρρὸν*, id est rufum. Huius fructus acini nimirum decem, inquit Dioscorides, in vino poti, cœliacis & fœminis fluxione vuluæ laborantibus auxiliantur. Quidam ipsos tundunt, & pastillos ex ipsis fingunt, quos reponunt, & sic vtuntur. Plinius ramorum cacuminibus, quod Dioscorides acinis, tribuit scribens. Huius ramorum decem aut duodecim cacumina trita ex vino pota, cœliacis, dysentericis, sanguinem excreantibus, mensium abundantia auxiliantur. Matthiolus Tragum hunc maritimum, siue Scorpium Dioscoridis eundem cum scorpio facit, de quo hæc Theophrastus. Ergo aculeatorum alia ex toto aculei sunt, ceu corruda & scorpium (nepam reddidit Gaza) hæc enim nullum præter aculeum folium habent. Similiter de eodem scorpio Plinium loquentem, citat duobus locis, videlicet. Est & herba Tragos quam aliqui scorpium, &c. Et spinosarum multæ species, &c. Cum hic de scorpio Theophrasti intelligendus sit, ille de hoc Dioscoridis scorpio, siue Trago longe diuerso. Tragus autem quem Matthiolus depinxit, (de quo in lib. De Spinosis) Dioscoridis Tragus non est, sed Kali spinosum propius ad eam speciem accedens, quam crithmum alterum faciunt: est enim surculenta herba, nullos acinos rufos habet, tritico pares, supernè acutos, numerosos, magnopere adstringentes: quæ omnia Dioscoridis Trago insunt, quem sine foliis & spinis ille descripsit. At Tragon Matthioli folia Aizoi carnosâ habet, spinis horrida, astrictionem penitus nullam. Hoc sic expressit Lobellius, figura à Matthioli pictura & satis diuersa.

Vires.
Ibidem.

Li. 27. ca. 13.

In cap. 46.
ca. 4.
Lib. hist. 6.
lib. 1.

Li. 27. c. 13.
Lib. 21. c. 16.
Lib. 6. hist.
cap. 11.

TRIPOLIVM DODON. CAP. XXV.



ΤΡΙΠΟΛΙΟΝ Græcis, similiter Tripolium Latinis, Serapioni *Turbith* dicitur, non illud quidem Mesues & Auicennæ *Turbith*, sed aliud quod ab illo plurimum distat. Vulgare eius nomen nullum, quod sciam, nisi quod nonnulli *Camomille bleue*, vel *Marguerite bleue*,

c. 330. s. m. p.

TRIPOLIVM, Dodon.



non recte vocant, cum neque in chamæmeli, neque in bellidum generibus sit: ferunt autem vocatum Tripolium, quod flores ter die colorem mutet. Hic ex Dodonæo depingitur, & describitur ab eodem foliis longis, latis, viridibus, læuibus & lubricis, glasti foliorum effigie, inter quæ caulis erigitur rotundus, sesquipedalis & maior, similibus foliis vestitus, nisi minora essent, circa summum in multos ramulos fissus, in quo flores venusti, purpurei antequam dehiscant, hiantes verò lutueam intus coronam ostentant, foliolis cæruleis eam ambientibus, effigie chamæmeli floribus similes: quibus depereuntibus succedit semen hirsutū, candidum, quod in auras abicit: radix longa est, crassa, crassiusculo cortice amicta. In littoribus maris mediterranei & Oceani copiosè prouenit, quæ æstus maris reciprocos sæpe alluit, vt aliquando aquis obruatur, aliquando in sicco hæreat. In Zelandia magna copia inuenitur. Tripolium vulgare, & Tripoliū littoreū vocat Lobellius & Pena. Iulio & Augusto mensibus

Lib. 3. ca. 33.
Forma.

Locus.

Tempus.

TRIPOLIVM Vulgare,
Lobellij.

Li. 4. c. 30.

Vires.

Li. 26. c. 7.

Li. 21. c. 7.

TRIPOLIVM Minus,
Lobellij.

Lib. 9. hist.
cap. 21.

Li. 13. c. 10.

Cornar.
Embl. 17.
lib. 4.

floret. Quæ omnia satis apte Dioscor. Tripolio congruunt, sic scribentis. Tripoliū nascitur in maritimis locis, quos alluit mare, & refluit, neq; in sicco, neque in mari. Folia habet, satidi similia, crassiora tamē, caulem palmi altitudine, superne diuisum. Narrant huius florem ter die colorem mutare, mane album, meridie purpureum, vespere Phœniceum. Radix alba est, odorata, calidi gustus. Hæc pota in vino drachmarum duarum pondere, per aluum aquam ducit, & vrinas. Secatur etiam in alexipharmaca. Plinius, Tripolium, inquit, in maritimis nascitur faxis, vbi allidit vnda, neque in mari, neque in sicco, folio satis crassiore, caule palmo alto, in mucrone diuiso: radice alba, odorata, crassa, calidi gustus. Datur hepaticis in farre decocta. Hæc herba eadem videtur quibusdam quæ polium, de qua suo loco diximus. Hęc Plinius. Qui sanē & ipse ex iis est qui polium cum Tripolio cōfundunt. Quod enim Theophrastus de Tripolio, id Plinius de polio scripsit, Musæum & Hesiodum citans his verbis, Saliuncā vestibus interponi gratissimum, sicut apud Græcos polium herbam, incltytam Musæi & Hesiodi laudibus, ad omnia vtilem prædicantium, superq; cætera ad famam etiam ac dignitates prorsusq; miram, si modo, vt tradūt, folia eius mane candida, meridie purpurea, sole occidente cærulea aspiciuntur. Duo genera eius, campestre maius, silvestre quod minus est. Quidam Teuthrion vocant. Folia canis hominis similia à radice protinus, nunquam palmo altiora. Theophrastus verò. Καὶ ὡς δὴ φασι, inquit, τὸ περιόλου καὶ ἡσίοδον καὶ μυσάειον, εἰς τῶν πρῶτα παρὰ τοῦ χρόνου εἶναι. διὰ καὶ ὀρύττειν αὐτὸ νύκτωρ, σκηνην πηξάμενοι. Id est, Et, vt aiunt, Tripolium Hesiodo & Musæo auctoribus, ad omnē rem seriam peragendam vtile: quare id effodiunt noctu tabernaculo structo. Sic apertè Plinius poliū pro Tripolio conuertit. Gaza tamen Plinium fortasse secutus polium etiam reddidit. Quod autem Plinius adiicit, superq; cætera ad famam etiam ac dignitates, &c. Et quod rursus aliquāto post ad idem poliū refert, Polio, inquit, Musæus & Hesiodus perungi iubent dignationis gratia, gloriæq; audios polium tractare, colere.

Id, inquam, male inteliectum, neque ad polium pertinens ex Theophrasto peruerit, vt declarāt ipsius Theophrasti verba, quæ modo citata proxime consequuntur. Καὶ τὰ πρὸς τῆς ἀλγείας διὰ καὶ ὀδοξίας ὁμαλίας καὶ μάλλον. ἀλγείαν γάρ φασιν ἀεὶ ποιεῖν ὁ ἀνθρώπων, &c. Qui locus vt rectius inte-

licet Theophrastum de æno-
thera

theracuius radices è vino datæ mores mitiores hilariorésque efficiunt locutum, subiungere. Non videtur autem hoc absurdum. Nam velut assumptio quædã fit eius quod vinosam vim habet. Verum stolidiora illa & magis incredibilia (legendum enim *Ουνθέσσει καὶ ἀπιθανόσσει*) & amuleta, & omnino alexipharmaca, & quæ corporibus, & quæ domibus adhibentur: & vt aiunt, Tripoliũ ex Hesiodi & Musæi sententia, ad omnem rem grauẽ aggrediendam vtile esse. Quare etiam noctu rentorio fixo ipsum effodiunt. Sed & ea quæ ad bonam famam, ac existimationem pertinent similiter, & adhuc magis. Bonam enim famam dicunt facere antirrhinum, &c. Præterea foliorum polij colorem ter die mutari scribit Plinius, quod de Tripolij floribus tradidit Dioscorides. Tripolij breuissimè meminit Galenus his verbis. Tripolij radix gustanti acris est, & facultate calida in tertio excessu. Hec ille. Recentiorum quidam aiunt huius herbæ folia vulneribus omnibus perutilia esse: eorũque succum instillatum, aut ipsa contusa & imposita, ea conglutinare. Aliud Tripolium Lobellius pinxit, ad Padi ostia proueniens, longè minus Monspeliaco, minorem Conysam folio, radice, & flore vix æquans.

Li. 8. simpl.



GRAMEN, OXYAGROSTIS MARI, CAP. XXVI.



RAMEN hoc in maritimis prouenit, radice longa, rufa, geniculata, lignosa: foliis graminis, circa radicem multis: caule pedali, iunceo, laxo, tereti, enodi, foliis nudo, corticoso, ac squamoso capite, ex luteo rufescente, foliolis duobus vtrinq; subiectis, & veluti cornua prominentibus. Est & graminis marini species secundo loco picta, Oxyagrostis marina meritò dicenda: in maritimis enim crescit, radice non geniculata, vt in superiore

Locus.

Forma.

GRAMEN Maritimum,
Dalechampij.OXYAGROSTIS Maritima,
Dalechampij.

Gramine, sed fibris multis capillata: caule pedali, surculofo, nodoso, foliis ad singulos nodos geminis prodeuntibus, longis, angustis, graminis similibus, atrociter prætereuntes pungentibus.

XYRIS

Forma.



INTER permulta & varia purgamenta quæ in littora fluctus eiciunt, planta hæc sæpius reperitur, quam Xyrim marinam vocant herbarij. Radice est longa, crassa, geniculata, cortice rufo obducta, multum fibrata: caule pedali, foliis vndiq; aggestis aperto, longis, virgatis, in cacumine mucronatis. In caulis fastigio tres quatuorve siliquæ prominent, & ipsæ rufescentes, angulosæ, seminibus farctæ velut compressu dilatatis, rufa membrana contextis, perspicua tamē vtrinq; macula in medio nigra, cum manduntur lignosis & duris, gustu subadstringentibus.

CICHORIVM BULBOSVM.
(CAP. XXVIII.

ST & hæc planta maritima, quæ à foliorum effigie & à radice Bulbosa Cichorium bulbosum iure dicitur, in arena maris proueniens,

radice bulbosa, articularum veluti in cingulis distincta, superiore & inferiore parte exilibus fibris villosa, oblongum, geniculatum, & crassiusculum caulem ex se emitte, terræ instratum, quamplurimis, ac valde exilibus fibris ex geniculorum nodis huc illuc se spargentibus, & arenis se infigentibus: foliis Cichorij in ambi-

CICHORIVM Bulbosum,
Dalechampi.

tu dissectis, paucis, lacte manantibus, gustu non insuavi, flore luteo, hieracio simili in pappos abeunte. Quidam perdicium esse suspicantur à Theophrasto memoratum his verbis.


Καὶ τὸ περδικιον καλεῖσθαι, καὶ τὸ τῆτο παχέας τε καὶ παλῆας ἔχει τὰς ρίζας, ἢ φύλλα. καλεῖται δὲ τὸ περδικιον, διὰ τὸ τὰς περδικας ἐγκυλίαις ἢ ὀρύττειν.

Id est, Et perdicium. Etenim id crassas & multas habet radices, aut folia: vocatur autem perdicium, quod perdicæ ad id se volutent, & id effodiant. De quo Theophrasti perdicio (hoc enim nomine diuersi auctores diuersas plantas nuncuparunt) statim post Cichorium vulgare loquitur Plinius. Cichoriū & similia circa terrā folia habent, germinantibus ab radice post Vergilias. Perdicium & aliæ gentes quàm Ægyptij edunt: nomen dedit auis id maximè eruens. Crassas plurimāsque habet radices. Quæ ex Theophrasto Plinium conuertisse perspicuum est, nisi quòd ab Ægyptiis, aut ab aliis gentibus edi Theophrastus non scripsit. Sic nostrū istud Cichorium crassas habet radices, nempe bulbosas, & non solum plurimas, vt ait Plinius, sed & folia, vt scribit Theophrastus, si quis radículas innumeras ex caulibus humi iacentis nodis prodeuntes intelligat.

Lib. i. hist.
cap. ii.

Lib. i. ca. 17.

NASTURTIVM MARITIVM, CAP. XXIX.



THLASPI Maritimum,
Dalechampi.

NASTURTIVM marinum in sabulosis maritimis provenit, radice candicante, multiplici, caule pedali, folio Nasturtij hortensis, acri: flore purpureo, copioso, semine in loculis hastæ auspici similibus, rara mirabilisque figura, & huic plantæ penè dixerim peculiari.

THLASPI MARITIVM,
CAP. XXX.

THLASPI marinum idq; minimū in maritimis profilit, radice lignosa, longiuscula, in surculos diuisa, candida: caulibus multis, dodrantalibus, simplicibus, foliosis: foliis multis, exiguis, angustis, longis: flore in summis caulibus copioso: semine flauo, lato, thlaspi simili, acri in loculis turbinatis concluso.

CHAMÆMELVM Maritimum,
CAP. XXXI.



MLITORIBVS & arenis maritimis gignitur, radice nigra, crassiuscula, in fibras multas diuisa: caulibus multis, humi sparsis: foliis cotulæ grandioris, in caulibus vtrinque dispari situ dispositis: flore leucanthemi. Quidam cotulam marinam vocant.

CHAMÆPVCÆ Maritima,
CAP. XXXII.

PIN MARITIMIS quoque nascitur, radice crassa, oblique exposita, tota inferiore sui parte radicularum multas mittente, carnosas, superiore verò caules multos propè radicem, velut tubis in sese mutuo fascis coagmentatos, surculosos, foliis piceæ aut asparagi, disparibus intervallis ex caule prodeuntibus, vno coalitis, & tanquam in penicilli comam congestis: flore paruo, purpureo, ex surculorum alis emergente. Sunt qui asparagi marini speciem esse contendunt.



ERVCA MARITIMA, CAP. XXXIII

Nomina

Forma.



PLANTAM hanc Doct. Myconus Erucam marinam vocat, quod sapore Erucam æmuletur, & nō nisi in maritimis nascatur. Cathalani etiam *Rucas de mar*, id est, Erucam marinam, appellāt. Ad cubitalem altitudinem attollitur, folia habet crassā, lævia, laciniata, ad senecio-

ERVCA Maritima.



Locus.

Vires.

nis folia accedentia, pinguis, succosa, humi repentia, infernè quandōque rubescencia: ex quorum medio cauliculi tres, quandōque plures prodeunt, ab imo rubescences, rotundi, striati, furculosi, læves, solidi, modo recti, modo humi iacentes: in quorum verticibus flosculi emicāt purpurascences, raphani floribus similes: semen in siliquis triquetris concluditur minutum: radices longæ, tenues, candidæ, intus lignosæ, per summa arenæ sparsæ, gustu aliquantum acres. Nascitur in arenosis maritimis, vt diximus, floret Aprili & Maio. Foliorum, caulis, denique totius plantæ sapor acris est, cum quadam amaritudine, & medius inter Erucam & sinapi. Hæc fere Myconus. Qui præterea scripsit se frequenti experimento observasse & comperit habere, aquam huius plantæ stillaritiā tepidam, quatuor unciarum pondere mane potam, colicis doloribus, nephriticis, calculosis, mirè conferre. Eadem planè, vel certè similis huic est planta quæ à Lobellio & Pena Cakile Serapion

CAKILE Serapionis, Lobel.

PARTHENIVM Mar-
ritimum minimum.

Serapionis Erucæ folio, napi flore, vulgo Erucæ marina dicitur, quia non nisi in littoribus maritimis, aut inde in hortos translata reperitur: plurima autem prope Venetias & Magalonam, foliis laciniatis, diuisura crebra senetionem, vel Erucam, nisi crassiora, & candidiora essent, referens. Flores autem purpureos iuxta caulium ramulos sparsos, magnitudine & similitudine napi habet: semen oblongum, mucronatum, fungosum, ex singulis floribus secundum caulem binos, sibiq; mutuo apicum duntaxat cohaesu iunctos, gustu Erucæ aut napi, falso: radicem lignosam. Strenuè purgare asserit Anguillara.

PARTHENIVM Maritimum.

CAP. XXXIIII.



MARITIMUM & minimum Parthenium sue Cotulam exhibuit Pena: quæ ad Cestij Narbonensis radices non procul à piscatorum attegiis oritur, & cichorio bulbofo lubens associatur. Exilibus palmaribus cauliculis humi sternitur, quibus folia insunt Caphthalmi vulgaris paria, diuisura bellidis maioris, carnosa, odore feriente, putidulo, cotulæ vulgaris, floribus non ita dissimilibus. Vires autem nec inferiores, nec dispares. Permultæ sunt aliæ plantæ maris accolæ, vt diximus, sed aliis eiusdem generis ita affines, vt ab iis disjungi, ac diuelli commodè non possint. Quare non hac, sed eadem cum illis tractatione comprehenduntur.

IVNCVS MARINVS,

CAP. XXXV.




IVNCVS marinus gramineus Pseudolchænanthum etiam dicitur, quod specie, magnitudine, culmo, colore vero schænantho similis sit, adeo vt illius congenerem esse quidam dixerint. Sed viribus quàm maximè differunt. Præ-

terea luncus marinus foliis est gramineis, flore multum dissimili, nimirum specioso, papposo, densè congesto in vulpinam caudam quincuncialem & sex uncias longam, sericeo argenteo ve nitore alopecuri ritu fastigiato. In Adriaticis littoribus frequens occurrit, & aliis mediterraneis, vt in litore mediterraneo

MARINVS Gramineus
Iuncus, Lobell.



PASTINACA marina Pen.
 & Lob. *Crithmum* l. l. Matth.



agri Monspelienſis pone aquas marinas. Hæc ex Lobellio. Maritimum alium depinxit Pena, qui tantum in littoribus, & arenosis Narbonæ & Galloprovinciæ reperitur, vix ſeſquipalmum & pedem æquans, foliis multis, tenuibus, candicantibus, anguſtis, & caule ſeſquipalmari duplo longioribus, lentis, ſparſis, inflexis, è radice nigra, ſimpliciore cyperi longi modo, geniculata, longius ſerpente, multis fibris capillata, ſapore grato. In ſummo caule foliola plurimum terna conſpiciuntur, tres pollices longa, ſlos globosus, lunceis ſeminibus glu- mofis ſtipatis, aſperiuſculus, ex fulco & purpureo pallidulus, ampelopraſi magnitudine & figura.

PASTINACA MARINA,

CAP. XXXVI.



RITHMVM ſecundum Matthiolum facit plantam hîc appictam, à Cortuſo miſſam, quæ ſœniculo marino, Crithmo primo eiufdem, ferè ſimilis eſt, niſi foliis eſſet anguſtioribus, & cacumine mucronatis, atque pungentibus, ſalſo & acuto ſapore: caulibus magis ſuccoſis, vègetioribùſque, in quorum cacumine ramuli exeunt bini, terni, quaterni, ſinguli ſingulas umbellas ferentes. albis floſculis reſertas, è quibus ſemen oritur ſœniculo quadamtenus ſimile, ſpinulis obſitum: cui ſimilem quoque radicem proferat. Dodonæus, qui etiam ſœniculum marinum Crithmum primum eſſe arbitrat, hanc plantam Crithmum ſecundum ſtatuit, & Crithmum ſpinoſum vocat. Rectius, opinor, Pena & Lobellius Paſtinacam marinam, quia in maritimis ſabuletis Narbonenſis Provinciæ, inter cryngia naſcitur, cuius radices erutas plebecula eſitat, & Paſtinacam marinam vocat: ſunt enim prorsus eodem ſapore, nec longè à figura abſunt. De tertio Chrithmi genere à Matthiolo tradito diximus hoc libro.

LENT

LENTICVLA Marina Serapionis, CAP. XXXVII.




ERAPIO Lenticulæ marinæ memin'it, quam ex Lobellio hîc repræsentamus. Tyrreni maris & Adriatici indigena est, inquit, foliis angustis Osyridis scopariæ dictæ, in flexilibus loricatis petiolis sesquipalmaribus refertis & onustis, copiosis baccis, vacuis, mēbranacois,

Cap. 235.
simp.

LENTICVLA marina Serapionis,
& Vua marina quorundam.

LENTICVLA marina
ferratis foliis, Lobell.



teretibus, lenticulis similibus & paribus, vnde ei nomen. Est huic persimilis & eadem, nisi latiora & breuiora, nonnihil ambitu ferrata essent folia.

EX SVRCVLIS ARBORVM CONCHÆ ANATIFERÆ, CAP. XXXVIII.



VLTA à veteribus Historicis literis mandata fuere, falsi suspecta, imo fabulosa & risu digna credita, quæ tandem à verò non abhorre co-
gimur fateri, à natura magis stupenda miracula nobis ob oculos po-
nente. Quid enim admirabilius quam ex putridis nauium lignis, aut
ex arborum stipitibus surculisve in litus proiectis, & maris alluionibus perpe-
tuò irrigatis conchas, & ex iis aues generari? At id verissimum esse non solum te-
stantur Septentrionalium rerum Historici, sed etiam harum rerum studiosi & cu-
riosi viri, qui viderunt non solum in Scotia, vt illi narrant, aut Orcadibus maris
Caledonij Arctici, olim à Romanis classe deuictis, sed etiam in Anglia, & Gallia
Britannia. Scribunt Pena & Lobellius se ad Tamesim amnem, qua Londinum
præterfluit, conchas pediculo rugoso, crassiore, è nauis annosæ carina auulsas ha-
bere. Sunt ex conchæ pusillæ, circinatæ ferè rotunditatis, foris albidæ, lucidæ, le-
ues, tenuitatēque testæ ouaceæ fragilem, biforem Mytuli modo præferentes,

EX *Surculis Arborum Conchas
Anatiferæ.*

nuci Amygdalæ compressæ pares. Pendula autem hæ erant foris ad imum ventricosæ nauium carinæ, cui musco & limo semiputridæ innati erant, quasi fungi pediculi, quos fere vrachum vmbilici parui dixisses, cuius extremum, fructuum ritu inferebatur latiusculæ basi conchæ, quasi vitam alimoniamq; inde suggerent auiculæ, quarum auicularum rudimenta è summa parte conchæ hiantis conspiciuntur. Pediculos istos ferunt Historici, primum è vermiculis concreari, quod non potuerunt illi scire, neque adhuc credere. Præterea certò asserunt, easdem conchas elegantissimè efformatas è surculis arborum temerè quæ maris æstus aluit, proiectarum enasci. Earû conchas quæ humi & in sicco manent, emori. Ex iis quæ in maris alluionibus rapiuntur, aues excludi, & in Anatem, aut ei congenerem auem adolescere. Has Angli, & Britanni Galli *Barnacles* vocant, Scoti *Clakis*, qui his auiculis abundant, & capiuntur dum per brumam gelu concreuerunt paludes. Sapiat nobis hesitantibus, inquit Lobellius Anatem, aut Anferem siluestrem.

LIGNA LAPIDEA,

CAP. XXXIX.



EST & id permirum, sed verum, quod & vidi, & tradunt Pena & Lobellius, esse amnes & riuiulos in quibus mersi pali lignei, ridicæ, contive, aliquot mensibus lapidescunt, imo fere in ferri naturam abeunt, eadem perstante superficie, situ striarum, & fibrarum ductu pristino: & quas eminus assulas ligni diceres, attrectando & lapidi illidendo, dicas esse lapidem ferri metallo immixtum, soliditate, grauitate, duritie, & duratione lapidea, nec flammis obnoxia.

PHALLVS HOLLADICVS,
CAP. XL.

PHALLVS, in maritimis Hollandiæ, ac Zelandiæ arenosis gignitur, hominis pudendo suo præputio contexto adeò similis, vt inde nomen sit tributum. Siue integrum, & parti-

bus adhuc suis constantem, ac compactum, minimè diuisis, siue in partes è quibus componitur, iam discissum inspiciamus, ad verendorum hominis figuram sic accedit, vt in eo generando lusisse natura videatur lasciuus, succo in arenis frigidis

siccis


ficcísque reperto, è quo penem hominis fingere meditata sit, afflatu etiam maris fortassis adiuta, cuius vim maximè genitalem esse periti rerum naturalium omnes testantur, & suis Poëta fabulis indicant, τὴν ἀναδυομένην ἀπὸ δῖτης versibus celebrantes, nempe Venerem è maris fluctibus exorientem, ac emergentem. Posteriore parte velut inter duas prominulas nates, cauum patet: (malo enim cum podice comparare, quàm cum muliebri vulua.) In id cauum, tanquam in Scroti fundum, tenue filum subit, bifidum, quo tanquam radice, in arenoso solo defigitur. Quod terræ proximum est, Bulgæ figura, inferiora Phalli operit, extremaq; ora lacinia- ta, in apices extantes diducta, vndique illum amplectitur, rugosi Scroti quadam imagine. Bulga detracta subest aliud inuolucrum, tanquam elytroides tunica in hominis testiculis. Superiore angustius, ac minus, Phallum circundans orbe sim-

PHALLVS Batavicus
integer.

PHALLI Batavici
separate partes.



plici linea circumeunte, non tamen continuato, sed interrupto rima, quæ veluti duorum testium interuallum, ac interstitium ostendit. In tuberculum subrotundum id desinit, radici vicinum, cui radix inseritur. Inde penis in longum porrigitur, mentulæ specie, punctis quibusdam notatus, in summo, sub præputio, pertusus, rotundo foramine, quod in extremo hominis veretro fissuram imitatur, qua vrina profluit. Munit summum illud fastigium, & vestit præputium, (sic enim aptissimè vocari potest,) vndique circumuolutum, cutis plicatis modo. Extrema parte præputij, carnosus osculi rotundus, velut apex eminet, fistulosus, pelle circum crispata, humani præputij corrugato fini similis. Raræ huius & admirabilis plantæ exactiorem & ampliorem historiam tradidit, vulgato de eius forma libello, Belgæ quidam, vir huius tractationis studiosissimus, ac imprimis diligens.





HISTORIAE

OMNIVM PLANTARVM

LIBER DECIMVS-
TERTIVS,

In quo omnes plantæ, quæ non nisi aliis innixæ scandunt, describuntur.

VITIS, CAP. I.



TIRPIVM quidem plurimarum erecta est ad cœlum natura, nostræ perfectionis æmula, cœli appetens, longe quàm nos scèlicius, qui frustra spectamus ipsum, nec nisi terram sapimus, vt ait Scaliger, tamen nonnullæ sunt natura tam imbecilles & caducæ, vt nisi radicis & pedamentis fulciantur, vel nisi pergulis, sepi- bus, arboribus, fruticibus adnascantur, aut prope ista ferantur, vel iis veluti adminiculis nixæ attollantur, & adolescant, per humum repentes aut aridæ & exu- cæ permaneant, imperfectæque frutificent, aut breui

emorian- tur. Quæ res differentiam perspicuam parit, quæ stirpes istæ ab aliis se- cernuntur, quæ nullius fulcri ope sese attollunt, adolescunt, vigent, florent, & fructus perfectos edunt. In illorum genere vitis habetur, quæ sursum versùs serpit, omnibus tum facie, tum liquore suauissimo quem fundit, notissima. Eam hîc intel- ligimus quæ Græcis ἀμπέλος οἰνοπόπος, & ἀμπέλος ἡμερος, Latinis Vitis vinifera, & lati- ua seu culta nominatur, Arabibus *Harin*, *karin* seu *karni*, Italîs *Vite vinifera*, Germa- nis *Vuciureb*, Gallis *Vigne*. Dicitur autem ἀμπέλος quasi ἐμπηλος, vinea, quia πηλος olim vinum significabat. Vitis verò à vino, vel, vt scribit Ruellius, quoniam inuite- tur ad vuas pariendas. Innumera vitium reperiuntur genera. Quare singula perse- qui superuacaneum fuerit: quandoquidem varietatem accipiunt multiplicem à soli conditione, morèque, & solis ab æquatore inclinatione. Si quis tamen illa dis- quirere desiderat, rei rusticæ scriptores Pliniûmque legat, qui profecto non omnia, sed maximè insignia persecutus est: quippe quæ totidem pene sunt, inquit, quot agri. Hoc tantum dicam, vites quædam esse simplices in prouinciis quibusdam, quæ per se sine vlllo pedamento, vt ait Plinius, artus suos colligunt, & breuitate crassitudinem pascunt: alias arbutinas, quæ Græcis ἀναδεδιδράδες, & δεδιδράδες dicuntur, ipsa verò arbuta quibus maritatæ fulciuntur, eisdem nominantur vocî- bus. In Campaniæ agro, vt ait Plinius, populis nubunt, maritâsque complexæ, atq; per ramos earû procacibus brachiis geniculato cursu scandentes, cacumina æquant, in tantum sublimis, vt vindemiator authoratus rogum ac tumulum excipiat. A ra- dice vitis caudex vnus contortus exit, qui in ramos frequentes scinditur. Multi- plici cortice vestitur, rimoso, membranaceo, flagellis longe latèque vagantibus, sarmentorum foliis latis, multifidis, platani aut aceris diuifura, & per extremum

Nomina

Genera

Lib. 14. c. 2.
& 3.

Lib. 14. c. 2.

Ibidem.

Forma

VITIS Vinifera.

Lib. 14. c. 1.

Vires &
Tempor.
Lib. 5. c. 1.

ferratis, quæ ex longo pediculo pendula lasciuiunt: floribus fructum ambientibus, lanuginosis. Vua compluribus acuiis acervata, seminibus tunica clausis. Acini numerosi, qui magnitudine, colore, saporibus multiplicantur in vino, hic purpureo lucentes colore, illic fulgentes roseo, nitentesque viridi. Candidæ enim vites nigræque vulgares. Tument verò mammarum modo Bumasti, ut scribit Plinius: prælongis dactyli porriguntur acinis. Est & alia naturæ lasciua, ut prægrandibus adhæreant pergulis parui, mites, & suauitate certantes, Leptoragas vocant. Vini omnes in vniuersum facultates ex Dioscoride, Plinio, Galeno, commemorare superuacaneum & tædio plenum foret. Quare aliarum vitis partium vsum medicum exponemus. Vitis vinifera folia capriolique trita & illita, inquit Dioscorides, capitis dolores stomachique inflammationes & ardorem cum polenta mitigant, folia etiam per se imposita, ut pote quæ refrigerant & adstringunt. Succus ex ipsis potus dysentericis, sanguinem expuentibus,

stomachicis, & citra laborantibus mulieribus prodest. Madefacti in aqua capredi & poti eadem efficiunt. Lachryma verò eius quæ veluti gummi in eius caudicibus concrevit, pota cum vino calculos pellit. Illita lichenas, scabies & lepras sanat. Oportet autem locum nitro antea confricasse. Eadem cum oleo frequenter inuncta pilos denudat: potissimum aquosus humor, qui ex incensis viridibus sarmentis exudat. Hic etiam myrmecias inunctus eiicit. Cinis sarmentorum & vinaceorum circa sedem quæ antea ablata amputatæ sint codylomata & thymia, cum aceto illitus sanat. Confert luxatis & viperarum moribus, lienis inflammationibus cum rosaceo & ruta & aceto illitus. Plinius ea ex Dioscoride referens, in paucis ab eo dissentit, folia vitium, inquit, & pampini capitis dolores, inflammationesque corporum mitigant cum polenta, folia per se ardore stomachi ex aqua frigida: cum farina verò hordei articulares morbos. Pampini triti & impositi, tumorem omnem siccant. Succus eorum dysentericis infusus medetur. Lachryma vitium, quæ veluti gammi est, lepras & lichenas, & pforas nitro ante præparatas, sanat. Eadem cum oleo sæpius pilis illitis, psilothri effectum habet, maximèque aqua, quam virides accensæ vites exudant: qua & verrucæ tolluntur. Pampini sanguinem excreantibus, & mulierum à conceptu defectioni diluti potu profunt. Cortex vitium & folia arida vulnerum sanguinem sistunt, ipsumque vulnus conglutinant. Vitis albæ viridis tuxæ succo & thuræ, impetigines tolluntur. Cinis sarmentorum vitiumque & vinaceorum condylomatis & sedis vitiis medetur ex aceto: item luxatis & ambustis, & lienis tumori, cum rosaceo & ruta & aceto. Item igni sacro ex vino citra oleum aspergitur: & intertrigines & pilos absumit. Dant & bibendum cinerem sarmentorum ad lienis remedia aceto cõspersum, ita ut bini cyathi in tepida aqua bibantur, utque qui biberit in lienem iaceat. Claviculæ ipsæ quibus repunt vites, tritæ ex aqua potæ, sistunt vomitionum consuetudinem. Cinis vitium cum axungia vetere, contra tumores proficit, fistulas purgat, mox & persanat: item & nervorum dolores frigore ortos, contractionesque: contusas verò partes cum oleo: carnes excrecentes in ossibus cum aceto & nitro: scorpionum & canum plagas cum oleo.

Lib. 13.
proem.

oleo. Corticis per se cinis combustis pilos reddit. Quas mulieres Dioscorides *κισσώσας* dixit, Plinius mulierum à conceptu defectionem interpretatur. Id malum *κίτξ* dicitur, quod vitium auctore Paulo, accidere cōsuevit: tertio à conceptu mense potissimum, varia & à natura aliena mulieribus appetētibus, veluti carbonēs extinctos, cretam cimoliam, aliāque complura, ob vitiosa quæ in ventriculi tunicis continentur excrementa. Plinius Malaciam stomachi vocauit. Præterea cinerem vinaceorum dixit *τέφραν τῶν στέμφυλλων*. Sunt enim *στέμφυλα* Galeno auctore, *ἡ στερὰ λείψανα τῆς στέφυλλης, ἐπεὶ δὲ ἐν τοῖς ληνοῖς ἐκτλῆθῃ πάς ὁ χυλὸς ἀλλῶν. ἡ καὶ ἀντὶ σωπιγέασιν ἐν τοῖς τοῖς ἀνθρώποις, σφίγγοντες τε καὶ πηλιδύοντες ἰσχυρῶς, ὀνομάζονται τε φύγα ἀλλοῦ τῆτο, ὅπερ ἔγωγε στέμφυλον ἐκάλεσα. τὴν δὲ στέμφυλα ποροσηγοῖαν ἐπιφέρεισιν ἀλλοὶ τῶν κλημάδων ἐκπεφυκότες ῥιζώματι τῶν βλαστῶν*. Id est, Sunt enim stemphyla id est vinacea, solidæ vuæ reliquiæ, quum in torculari succus ipsius omnis prorsus expressus fuerit, quas etiam homines in dolis componunt, stipantes ipsas valde atque constringentes: appellāntque id ipsum *τρήγα*, id est, sæccem, quod ego *στέμφυλον*, id est, vinaceos appellauim. Nomine autem *στέμφυλα* id est, vinaceorum, acinorum radicem quæ ex palmitē enascitur, appellant. Plinius samenta vuarum in quibus acini fuere nuncupauit: Columella, pedem & Scipionem acinorum: fructus verò vitis facultates hæ sunt ex Dioscoride. Vua (Græci *σταφυλήν* à Staphylo liberi patris filio appellant) recens quæuis aluum turbat, & stomachum inflat. Minus horum participes quæ aliquandiu decerptæ pependit, quod in ea copia humoris exaruerit. Stomacho accommodata est, appetentiāque cibi excitat, & imbecillis conuenit. Quæ autem in vinaceis aut vinario vase seruata sunt, ori & stomacho grata sunt. Aluum sistunt, vesicam tamen & caput tentant. Profunt sanguinem expuentibus. Similes iis sunt quæ in mustum coniectæ sunt. Sapa verò aut musto condita stomachum magis infestant. Reponuntur & cælesti cum aqua, prius passæ factæ, minúsque vinosæ fiunt, siticulosi, ardentibus & longis febribus vtilēs. Vinacci eorum reconditi inflammatis, duris, turgentibusque mammis cum sale illinuntur. Vinaceorum decoctum dysentericis, cæliacis, & fluxui muliebri infusum confert. Ad infesiones quoque ac clysmata assumitur. Nuclei acinorum adstringunt, stomacho grati. Testi autem & triti, & pro farina illiti, dysentericis, cæliacis, & stomacho resolutis profunt. Plinius de iisdem eadem ferè tradit. Recentes vuæ stomachum & spiritum inflant, aluumq; turbant: itaque in febre damnantur, vti- que largiores. Grauedinem enim capitis, morbumque lethargicum faciunt. Innocentiores quæ decerptæ diu pependere: qua ventilatione etiam vtilēs fiunt stomacho agrisque: Nam & refrigerant leuiter, & fastidium auferunt. Quæ autem in vino dulci condita fuere, caput tentant (Alij legunt, Quæ in vino aut dulci condita fuere &c.) Proximæ pensilibus palea seruata. Nam in vinaceis seruata & caput, & vesicam, & stomachum infestant. Sistunt tamē aluum, sanguinem excreantibus vtilissimæ. Quæ verò in musto fuere, peiorem vim etiam habent, quàm quæ in vinaceis. Sapa quoque stomacho inutiles facit: saluberrimas putant medici in cælesti aqua seruatas, etiam si minimè iucundas: sed voluptatem earum in stomachi ardore sentiri, & in amaritudine iecoris, fellisque vomitione in choleris, hydropicis cum ardore febrium agrotantibus (Alias, fellisque vomitione, & in choleris, ac hydropicis cum ardore febrium. At in ollis &c.) At in olla seruata & os & stomachum & audiatem excitant (in alijs exemplaribus scriptum est, & in os & stomachum audiatem &c.) Paulò tamen grauiorēs existimantur fieri vinaceorum halitu. Vuæ florem in cibis si edere gallinacei, vuas non attingunt. Samenta earum in quibus acini fuere, adstringendi vim habent, efficaciora ex ollis. Nuclei acinorum eandem vim obtinent. Hī sunt qui in vino capitis dolorem faciunt. Tosti tritique stomacho vtilēs sunt. Inspergitur farina eorum, polentæ modo,

Lib. 28. c. 7.

Lib. 2. Ali.

Lib. 3. c. 1.

Lib. 23. c. 1.

potioni,

potioni, dysentericis, cœliacis, & dissolutis stomacho. Decocto etiam eorum fovere psoras & pruritum utile est. Vinacei per se minus capiti aut vesicæ nocent quàm nuclei: mammarum inflammationi triti cum sale utiles. Decoctum eorum veteres dysentericos & cœliacos iuuat, & potione, & fotu. Hoc Plinius à Dioscoride diffidet, quod in ollis seruatas stomachum infestare dixit, Dioscorides *ευστομάχους*, id est, stomacho gratas. Interim varij seruandarum vuarum modi ab utrôque indicantur, quos & declarat Galenus his verbis. In vinacea ollas nouas uis refertas condunt, operculis exactè obturantes, ne alicunde diffilentur, & qua operculum cum olla committitur, pice illinunt, perspiratus omnes obstruentes. Huiusmodi vua ventriculum dissolutum roborans, hominibus cibum fastidientibus appetentiam excitat, non tamen per alium subsides: & si sumpta largius fuerit, caput ferit. Quæ in musto conditur, magis adhuc quam hæc caput infestat. Pensilis verò nihil prorsus caput lædit, ventrem autem nec sistit, nec ad deiectionem irritat. Sic Dioscorides *κρεμασθεῖς* habet, & Plinius pēfiles, & *ἄς ἐκ τῶν τεμνύλων, καὶ ἐκ τῶν βρύων*. Plinius primum in vinaceis, deinde in ollis seruatas appellat, addens has grauiores existimari vinaceorum halitu, vt in ollis seruatas easdem esse ostenderet, quæ & in vinaceis seruantur. Vinacea autem vocat *τέμνυλα*, id est, vuarum expressarum reliquias, vt ex Galeno exposuimus: in ollis conditas & seruatas Cœlius Aurelianus

Lib. 2. Ali. Ollares nuncupat, in palea, Palears. Hunc modum seruandarum vuarum Plinius sic declarat. Durant aliæ per hyemem, pensili concameratæ nodo. Aliæ in sua tantum continentur anima, ollis fictilibus, & insuper doliis inclusæ, stipatæ vinaceis circumsudantibus. Hic tamen annotat Hermolaus in codicibus vetustis legi foliis

Lib. 14. c. 1. non doliis ex Plinij ipsius auctoritate sic scribentis. Liguria maritima Alpibus oroxima vuas sole siccatas iunci foliis inuoluit, cadisq; conditas gypso includit. Hoc idem Græci platani foliis, aut vitis ipsius, aut fici, vno die in vmbra siccatis, atq; in cado vinaceis interpositis. Sunt & alij seruandarum vuarum modi præter hos tres, quorum Dioscorides & Plinius meminere. Nam & sapa aut passo condiebantur, & in aqua pluuiâ componebantur. Est & id annotandum à Plinio sarmēta vitium in quibus acini fuere *τέμνυλα* dici, & nucleos acinorū, *γυαρε* Dioscoridi, Latinis vinacea, rursus vinaceos *τέμνυλα*, quorum decoctum dysentericos & cœliacos iuuare tantum dixit, Dioscorides addit *καὶ ροιχῆς*, subaudiendo *γυναικας*, Ruellius fœminas fluxione vuluæ laborantes interpretatus est, nec id absurde, iis enim vinaceorum decoctum aptissimum est remedium. Cornarius tamen *ροιχῆς* legit, & *ροιχῆς* *ἔ παθη* intelligit, quæ & fluidas alui affectiones conuertit, quod & cōfirmare videtur

Lib. 6. sim. Galenus scribens. Vinacea secundo ordine siccant, refrigerant primo. Substantia eorum crassa est, & terrea, quod gustus indicat: nam omnibus ventris cum profluuiio iunctis affectibus cōferunt. Est & Vua quæ Græcis *παφῖς* & *ἀπαφῖς* vocatur, passa

Lib. 14. c. 1. latinis. A patientia nomen acinis datur passis, inquit Plinius. Aliis placet passum esse quod in rugas est contractum, vnde vua passa dicta, quod sit rugis implicita, cum in sole suspensa fuerit, vt passa frons, & caperata, rugis exasperata. Sic myrtus nigra Catoni in vmbra perarefcit, dum erit passa. Vuæ passæ facultates hæ sunt ex Dioscoride. Vua passa alba adstringentior est. Prodest caro earum esitata arteriæ, tussi, renibus, & vesicæ. Item dysenterici, si per se cum vinaceis edatur, & cum milij & hordei farina, & ouo commixta, cum melle in sartagine fricta. Valet & ad pituitam è capite detrahendam per se, & cum pipere commanducata. Sedat testium inflammationes, imposita cum farina fabacea, & cumino. Epinyctidas, carbunculos, fauos, & putredines circa articulos, & gangrænas, sine vinaceis trita & cum ruta imposita, sanat. Podagræ conuenienter cum panacis succo illinitur: mobiles vngues illita celerius extrahit. A quibus non discrepat Plinius nisi in paucis duntaxat. Vua passa quam Astaphida vocant, stomachum, ventrem, interanea tentaret, nisi

pro remedio in ipsiſ aciniſ nucleis eſſentiis exemptis veſicæ vtilis habetur, & tuſſi alba vtilior. Vtilis & arteriſ & renibuſ, ſicut ex hiſ paſſum, priuatim & ſerpētibuſ, contra hæmorrhoida potens. Teſtium inflammationi cum farina cumini aut coriãdri imponuntur: item carbunculiſ, articularibuſ morbiſ, ſiue nucleis tritæ cum ruta: fouere ante vino vlcera oportet. Sanant epinyctidaſ, & ceria, & dyſenteriam cum nucleis. Et in oleo coctæ gangræniſ illinuntur cum cortice raphani, & melle. Podagriſ & vnguium mobilibuſ cum panace, & per ſe ad purgandum oſ, caputque, cum pipere commandantur. Vitiſ ſatiuæ facultas, inquit Galenuſ, ad ſimiliſ eſt agreſtiſ, ſed ad omnia imbecillior. De eadem Symeon Sethi ex eodem fuiſiſ hæc prodidit. Vuæ pluſ nutriunt reliquiſ operiſ, miniſ tamen ſiciſ: neque mali ſucci ſunt, ſi maturæ fuerint exquisitæ. Tamen hiſ non robuſta nec denſa, ſed laxa & flaccida caro gignitur. Maximum quidem horum bonum, inquit Galenuſ, quod celeriter ſubeunt, atque adeo ſi retinentur, lædunt: neque enim tunc probè concoquuntur, ſed crudum gignunt humorem, qui non facile in ſanguinem tranſmutetur. Nucleorum natura ſicca, & quodammodo adſtringens eſt. Pertranſeunt igitur omnia inteſtina non alterati. Penſileſ verò vuæ neque ſiſtunt ventrem, neque proritant, cæteriſ autem faciliuſ concoquuntur. Neque vuarum parua eſt in dulcedine, & aſteritate, & acore & aciditate differentia. Dulceſ quidè calidiorem habent ſuccum, aſteræ verò & acidæ frigidum. Aluum ſubducunt dulceſ, & maximè quando humidæ fuerint. Omnium itaque tutiſſimuſ uſuſ eſt quando carnoſæ fuerint, & maturæ, & mediocriter quiſ ipſaſ ſumat. Vuæ albæ magiſ ſubducunt aluum quàm nigræ. Omneſ autem ciborum appetentiam excitant, & ventrem. Conuenit, cum eduntur, membranam & nucleos expuere, quod difficulter conſiciantur. Quæ immaturæ ſunt, ventrem ſiſtunt, at ſtomacho bonæ. Caliditatem à ſua bile orant, ſedant, miniſ verò nutriunt. Oportet autem non ſolum vuas, ſed etiam omneſ fructuſ molli cortice præditiſ ante reliquos cibos apponere. Vua paſſa, auctore Galeno, ſatiua quidem concoquendi, adſtringendi, & leuiter digerendi facultate prædita eſt. At agreſtiſ vehementer acrem obtinet, adeo vt ex capite purget, abſtergâtque valenter. Itaque ad pſoram accommoda eſt: ſed & vrendi vim habet. Idem vini uſum medicum breuiter perſtringit hiſ verbis. Vinum ex ſecundo eſt ordine excalſfacientium: ſed quod admodum vetuſ eſt, ex tertio: ſicut muſtum quod vocant, ex primo. Caliditati eiſ proportionè reſpondet ſiccitas. Vina vetuſta neruoſ lædunt, inquit Dioſcorideſ, & reliqua ſenſuum inſtrumenta: gultu tamen iucundiora ſunt. Quare ab iſ qui partem aliquam internam debilem habent, cauenda ſunt. Attamen in ſecunda valetudine paucum, aqua dilutum innoxie ſumitur. Nonum inflat, agrè concoquitur, grauia ſomnia inducit, vrinam ciet. Aetate medium utrâque vitia effugit. Quare ad victuſ ſanorum ægrorũque uſurpatur. De eodem & hæc Pliniuſ tradit. Vino aluntur vires, ſanguis colôſque hominum. Et mox, Vino modico nerui iuantur, copioſiore læduntur, ſic & oculi. Stomachus recreatur, appetentia ciborum inuitatur, triſtitia & cura hebetatur, vrina & algor expellitur, ſomnuſ conciliatur. Præterea vomitioneſ ſiſtit, collectioneſ extra lanis humidis impoſitiſ, mitigat. Aſclepiadeſ vtilitatem vini æquari vix Deorum potentia poſſe pronuntiauit. Et alibi, Vino natura eſt hauſto accedendi calore viſcera intuſ, foriſ infuſo refrigerandi. Nec alienum fuerit cõmemorare hoc loco, quod Androcydeſ ſapientia claruſ ad Alexandrum magnuſ ſcripſit, intemperantiam eiſ cohibens. Vinuſ potaturuſ Rex, memento te bibere ſanguinem terræ. Sicut cicuta homini venenum eſt, ſic cicutæ vinuſ. Quibuſ præceptiſ ſi ille obtemperafſet, proſectò amicuſ in temulentia non interemiſſet. Prorùſ vt iure dici poſſit, neque viribuſ corporiſ vtiliuſ aliud, neque aliud voluptatibuſ pernicioſiuſ, ſi moduſ abſit. Sunt in regno Menin oppidiſ Syriæ nobiliſſimæ magnitudinistum

Lib. 6. ſim.

Lib. 6. ſim.

Lib. 5.

Lib. 5. c. 7.

Lib. 13. c. 1.

Lib. 14. c. 5.

tum acini, tum racemi, quos ipsi lingua patria priuatim vocant *Alzibib*: nam generi commune est nomen *Haneb*, nos à succo vuam. Illius vocis imitatione suas grandiores vuas corrupto vocabulo Prouinciales dicunt *Augibim*. Sunt & vuæ quædam ἀπύρνοι, id est, sine nucleis, quæ *Corinthiæ* vulgo vocantur, in Italicis & Pedemontanis hortis. Effigie nihil planè differunt à communibus: sed algidioris cœli impatiētes, gracilitate tantum racemorum, & exilitate acinorum superantur, qui piperina aut sambucina tantum æquant. In Madera quoque vuæ sunt sine granis vllis. Theophrastus auctor est ad Elephantinis & circa Memphim vites perpetua fronde virere, tamen si annuas tantum proferant vuas. Vites quidem & triferas esse Plinius tradit, quas ob id insanas vocant: quoniam in iis alia maturefcunt, alia turgescunt, alia florent. Varro auctor est vitē fuisse Smyrnæ apud mare biferam.

Lib. 16. c. 27

LABRUSCA,

CAP. III.

Nomen.



RAECIS ἀμπέλος ἀγρία, Latinis Vitis siluestris, & Labrusca propriè dicitur, Gallis *Vigne sauvage*, Italis *Lambrusca*, Germanis *Vuildeuueinreb*. Labruscam dici putant, quod in marginibus terræ ceu labris quibusdam nascatur. Sed ne quem hominymia in errorem inducat, admonendus est lector aliam esse plantam quæ ἀμπέλος ἀγρία Græcis, Latinis vitis silue-

Forma

et Genera.

Lib. 5. c. 2.

stris nominata est, de qua proxime dicitur. Labrusca viti satiuæ sarmentis, foliis & capreolis similis, Dioscoridi duplex est. Altera vuam ad maturitatem non perducit, sed ad florē tantum vsq;: oenanthem verò quam vocant, gignit: altera quæ fructū perficit, sed partios acinos habet, nigros, & astringentes. Oenanthē, ut idem paulo post inquit, vitis siluestris quæ fructum fert, flos est. Sic enim restitui debet uterq; locus ille vitiosus. Recondi oportet in fictili non picato cum collecta est, & subie-

Lib. 12. c. 28

cto linteo in umbra siccata. Optima est in Syria, Cilicia, & Phœnice. Plinius huius Oenanthē historiam fusius exponit his verbis. Eodem & Oenanthē pertinet. Est autem vitis Labruscæ vuæ. Colligitur cum floret, id est, cum optime olet. Siccatur in umbra substrato linteo, atq; in cados conditur. Præcipua ex Parapotamia, secunda ab Anthiochia, atq; Laodicea Syriæ, tertia ex montibus Medicis. Hæc vtilior medicinæ. Quidā omnibus iis præferunt eam, quæ in Cypro insula nascitur. Nam quæ in Africa sit ad medicos tantum pertinet, vocaturque Massaris. Omnis autem ex alba labrusca præstantior, quàm è nigra. Labruscæ folia, caules, & capreoli auctore Dioscoride, vim habent viti satiuæ similem, quemadmodum contra Galenus dixit, vitis satiuæ vires siluestris viribus similes esse. Quæ verba ad vitem siluestrē, de qua proxime dixerat, referenda non sunt, ut mox dicemus, sed ad labruscam.

Vires.

Lib. 5. c. 2.

Oenanthē autem eodem Dioscoride auctore, vim habet adstringēdi. Quare pota stomacho vtilis est. Ciet vrinam, aluum sistit, & sanguinis sputum. Sicca verò imposita contra fastidia & acorem stomachi efficax est. Capitis doloribus tam viridis quàm sicca ex aceto & rosaceo infunditur. Cataplasma ex ea fit, cum melle, croco, rosaceo & myrrha trita ad inflammationes arcendas in cruentis vulneribus, oris vlceribus, incipientibus ægilopis, & pudendorum nomis. Pessis miscetur ad sistendum sanguinem. Illinitur & contra oculorum fluxiones & æstuantem stomachum cum polentæ polline & vino. Vsta verò intesta ad prunas, facit ad ocularia medicamenta. Reduuias & pterygia, & abscedentes gingiuas cruentasque cum melle sanat. Eundem vsum medicum Plinius exponit his verbis, quæ multum lucis Dioscoridi afferunt. Omphacio cohæret oenanthē, quam vires siluestrēs ferunt, dicta à nobis in vnguenti ratione. Laudatissima in Syria, maximè circa Antiochiæ & Laodiceæ montes, & ex alba vite. Refrigerat, adstringit, vulneribus inspergitur, stomacho illinitur. Vtilis vrinæ, iocinori, capitis doloribus, dysentericis, cœliacis, chole-

Lib. 5. c. 5.

Lib. 23. c. 1.

ricis.

ricis. Contra fastidia obolo ex aceto pota. Siccat manantes capitis eruptiones, efficacissima ad vitia quæ sunt in humidis: ideoque & oris ulceribus, & verendis ac scidi. Cum melle & croco aluum sistit. Genarum scabiem, vel, ut in manuscripto legitur, scabritiem, emendat, oculorumque lacrymationes: ex vino stomachi dissolutionem: ex aqua frigida pota sanguinis excreationem. Cinis eius ad collyria, & ad ulcera purganda, & paronychias & pterygia probatur. Vritur in furno donec panis percoquatur. Massæ odoribus tantum gignitur.

VITIS SILVESTRIS, CAP. III.



Vitis silvestris Græcis ἀμπέλως ἀγρία nominatur ut & labrusca, quamvis hæc ab illa plurimum discrepet. Est enim labrusca viti viniferæ tam similis, ut solo cultu differat, At vitis silvestris sarmenta quidem vitis modo producit longa, ut describit Dioscorides, sed aspera, cortice in rimas dehiscente: folia hortensi solano similia, sed latiora & longiora: florem velut capillos muscosos: fructum parvis vuis similem, cum maturuit, rubentem, rotunda acinorum figura. De eadem vite hæc Plinius, Labrusca quoque cœnanthen fert, satis dictam. Quæ à Græcis ἀμπέλως ἀγρία nominatur, spissis & candicantibus foliis, geniculata, rimoso cortice, fert vuas rubentes cocci modo &c. Quibus verbis labruscam quæ etiam ἀμπέλως ἀγρία vocatur, cum vite silvestri confundere videtur, nisi ita contextum distinguamus, ut verba hæc, Quæ à Græcis ἀμπέλως ἀγρία nominatur & cetera, ad præcedentia non referantur, sicuti reuera referri non debent, sed ea velut à nouo principio legamus, ut de duabus stirpibus Plinium hîc loqui accipiamus. priore labrusca, altera vite silvestri, quæ etiam ἀμπέλως ἀγρία appellatur. Idem alibi vitem silvestrem aliam esse à labrusca prodidit his verbis. Probatur & vitis silvestris alia quam labrusca, & ipsa hederæ modo arborem scandens. Matthiolus pro vite silvestri herbâ pingit ab Herbariis Dulcamaroni & Solanum lignosum nuncupatam Eam Theophrasti μὴ λωθρον esse Dalechampius & quidam alij periti esse coniiciunt, cuius fructus solano similis est. Sed cum repugnet florum figura, quod muscosi non sint, nec capillacei, verum racematim coherentes, ex Oribasio non βρυῶνεις, id est, muscosos, sed βορυσῶνεις id est, racemosos legendum arbitratur. Præterea cum hæc planta rimoso cortice non sit, vocem φλοιόραγωνιζα in Dioscoride expungendam esse, quod in Oribasio non legatur. Quæ omnia refelli possunt. Primum quod vel diuersum à nostro Oribasium nactus est, vel βρυῶνεις flores legit non βορυσῶνεις. Sic enim ex Dioscoride vitem agrestem delineauit. Vitis agrestis sarmenta vitis viniferæ modo longa emittit, lignosa, aspera: folia hortensi solano similia, longiora tamen, & latiora: florem habet ut capillos muscosos: fructum fert exiguis vuis similem, cum maturuit rubrum. Rotunda est acinorum figura. Deinde tantum abest ut vox φλοιόραγωνιζα in Dioscoride delenda sit, ut Oribasij descriptioni adscribenda sit potius: quoniam vitem silvestrem rimoso cortice esse scripserit Plinius, item Serapio Dioscoridis verba transscribens. Planta est cuius rami longe protenduntur, similes palmitibus vitis viniferæ, cuius lignum est grossum, & cortex separabilis ab eo, & cetera. Hîc tamen monendi sunt studiosi Serapionem eo loco, & Auicennam vitem hanc silvestrem cum labrusca siue vite silvestri turpiter confudisse. Dodonæus vitem silvestrem depingit, & describit eam quam Matthiolus pro vite nigra proposuit, alij pro cyclamino altera. Dalechapius diuersam ab his, Vitem silvestrem statuit, eam nimirum quæ hîc picta est, Vitalba nominata, Gallis *Vierne*, Germanis *Lynen* vel *Lenen*, quibusdam *Vualdreden*, quam Matthiolus Clematidem tertiam facit, Dodonæus Clematidis alterius speciem tertiam, Fuchsius Vitem nigram. Nam ea sarmenta vitis modo prælonga emittit, aspera, lignosa,

Nomina

Forma.

Lib. 4. c. 175

Lib. 23. c. 11

Lib. 6. c. 40

Lib. 3. hist. cap. 8.

Lib. 11.

cap. 35. sim.

Lib. 2. c. 734

Lib. 3. hist. cap. 47.

Lib. 4. c. 177

Lib. 2. c. 7.

Lib. 4. c. 48.

Cap. 35. hist.

VITIS Siluestris, Dalechampiij.
Clematis III. Matth.

In Aduers.



rimoso cortice: folium solani hortensis, longius
 latius: florem cādidum, odoratum, capillaceum,
 qui in muscosos villos & incuruos, auium pin-
 nulīs similes tandem abit, semen rubrum, race-
 matim congestū obregentes, & exornantes cri-
 starum modo, quæ galeis militum præfiguntur.
 Denique nihil est quod viti siluestri Dioscori-
 dis non quadret aptissimè. Idem sentit Pena scri-
 bens Viornam vocatam Gallis, nusquam non
 frequentem & notam (forte quia viarum sepes
 ornatur) nulli aptius quàm viti siluestri conueni-
 re. Sarmēta quippe ei ceteris clematidibus pro-
 lixiora, duriora, crassiora, rugosiora, labruscæ
 vel viniferæ vitis colorī similia, folia etiam
 sunt solani hortensis, & maiora, & singulis cla-
 uiculis quina, quibus lubens obrepit arboribus,
 atque hederæ modo editiora fulcra scādit. Sed
 interdū ambitu superne serrato, ternis aut qua-
 ternis dentibus, vt in solano nōnulla videntur,
 quæ laciniata pedem anserinum, atriplicis spe-
 ciem, tam bellè referunt, vix vt discernātur sint
 ne solani, an triplicis. Flores radiati, pusilli, con-
 ferti, numerosi, albidī, muscosi, & stamineis api-

culis ornati, odorī, Maio & Iunio, capillaceo tomento cinguntur carptæ lanuginis
 albidæ, laxis, quæ etiam in multam hyemem durat, foliis amissis. Acini etiā com-
 plures confertim stipantur ab vno pediculo apti, rotundi, rubentes ex fusco, com-
 pressi tamen. Quare docti nonnulli vbi περιερες τὸ χῆμα τῶν κόκκων legitur, id est,
 sphaerica figura acinorum seu grauiorum, πλατυερες leuiuscula immutatione &
 commodiore sensu legi volunt, id est, rotundam sed compressam figuram. Plini-
 us. Idem staphisagriam Vuam Taminiam quibusdam falso vocatam fuisse ait
 tamen alio in loco scribit, Nascuntur enim in sanguine ipso hominis animalia
 exesura corpus. Resistitur vuæ taminiae succo, aut veratri, cum oleo perun-
 ctis corporibus. Taminia quoque in aceto decocta etiā vestes eorū radio liberat: quæ
 de Staphide agria Galenus & ipsemet alibi tradidere, vt in hac re parum sibi con-
 stare Plinius videatur, certe Cornelius Celsus Vuam Taminiam καρδίνα ἀρχλαῖν à Græ-
 cis nominari aperte dicit. Vitē siluestrē Atragenam esse Theophrasti docti her-
 barij esse putant. Sic enim ille. Ἀετον μὲν ἐκ τῆς ἀβαγένης χαλασμένης ὑπὸ τινῶν. τοῦτο δὲ
 ἐστὶ τὸ δένδρον ὁμοίον τῇ ἀμπέλῳ, καὶ τῇ ὀνάνηϊ τῇ ἀρχλαῖ. ὥσπερ ἐκείνη καὶ τὸ ἀναβαίνει πρὸς
 τὰ δένδρα. Id est, Igniarium optimum à quibusdam fit ex Atragena. Arbor est viti si-
 milis & labruscæ, & illarum modo arbores scandit. Idem autor cap. vlt. lib. 3.
 histo. Similacis asperæ fructum cum vitis Syluestris (τῆς καρπυλῆς ἀρχλαῖς,) & Melo-
 thri vuā comparat. Vitis siluestris radix feruefacta in aqua, auctore Dioscoride, &
 cum vini aqua marina diluti cyathis duobus pota, purgat aquosa. Sic enim Græca
 in vulgaribus exemplaribus deprauata, sunt restituenda. ταύτης ἡ ρίζα ἀποζωοθεῖται
 ἐν ὕδατι, καὶ πινομένη μετ' οἶνον τεθαλασσωμένην, καὶ μεθ' ὕδατος πινομένην καὶ πρὸς ὕδατος. Id est, ferue-
 facta in vino marinam aquam admixtā habente, & cum aquæ cyathis duobus po-
 ta, & cætera. Sed prior lectio melior, quam approbat Plinius, vt dicemus, itē Sera-
 pio his verbis. Radix huius vitis quando coquitur in aqua, & bibitur cum duobus
 cyathis vini quod fit cum aqua marina, laxat per vētrem humores aquosos. Datur

& hydropicis, inquit Dioscorides. Vuae eius maculas cutis in facie à sole cōtractas, & omnes alias expurgant. Recentes eius ramuli muria condiuntur in cibum. Plinius, Vitis sylvestris vuae cutem in facie mulierum purgant, & variis coxendicū & lumborum vitiis tusa cum foliis & succo profunt. Radix decocta in aqua, pota in vini Coi cyathis duobus, humorē alui ciet: ideo hydropicis datur. In quibus perperam legimus in vulgatis exemplaribus, & variis coxendicum, pro & varos. Coxendicum & cætera. Eadē repetit Plinius alio in loco. Ampelas agria vocatur herba foliis duris, cineracei coloris, de qua nos satis diximus, viticulis longis, callofis, rubentibus. Flos qualis eius quā Iouis flāmam appellauimus in violis: fert semen punici mali simile acinis. Radix eius decocta in aquæ cyathis ternis, additis vini Coi cyathis duobus, aluum soluit leuiter: ideoque hydropicis datur. Vuluae vitia & cutis in facie mulierum emendat (Idem mendum locum hunc occupauit: legendum enim ex herba ipsius natura, Varos & vitia cutis in facie & cætera, pro quib⁹ Dioscorides ἐφελκῆς χαλκόν, πέντε σπιλον) Ischiadicos quoq; vti hac herba prodest tusa cum foliis, & illita cum succo suo. Hanc tamen Plinij descriptionē perspicaciores herbarij conuenire putant non viti sylvestri, de qua hoc loco tractamus, sed eiusdem autoris Salicastro, quod cap. 1. 23. Viti sylvestri dixit esse simile, eosdēque vsus habere. Huius enim plantæ cæruleus flos similis est Aquilegiæ flori, quā Theophrasto vocatam fuisse Iouis florem plerūque omnes credunt, vitis autem sylvestris de qua hīc nos agimus, sicut reliquarum omnium, flos albus est. Theophrastus has etiam vires huic plantæ tribuit. *θερμαντικὸν δὲ καὶ διρμυὶ καὶ τῆς ἀμπέλης τῆς ἀγρίας ἡρίζα. διὰ τὴν εἰς ψίλωθρον χεῖρσιμον, καὶ ἐφελκίδας ἐπάγειν* (lege ἀπάγειν) τῶν ὅτι καὶ περὶ ψιλῶσι χαλκὸν δένδρα (inepte δένδρα pro δέρματι legit Theodorus secutus vulgatos codices) τέμνειται δὲ πᾶσιν ὕδραν, ὁπώρας ὁ μάστιγα. Id est, Theodoro interprete. Radix quoque vitis sylvestris calfactoria, acrisque est: quamobrem ad psilothri vsum idonea, & vitia cutis in facie emēdat, Fructu eius defoliare arbores solent (Vertēdum, fructu eius depilant coria) Succiditur omni tempore, sed præcipuē Autumno. Vitis sylvestris racemi, inquit Galenus, cutem extergendi vim habēt, vt ephelctis & nauos, & id genus omnia in extima cute vitia curare possint. Sed & adstrictionem quandam extrema germina obtinent, quæ & sale condiuntur.


VITIS ALBA,

CAP. II.



ΑΜΠΕΛΟΣ λεγὺν Græcis, *βρυωνία* & *ψίλωθρον*, Latinis Vitis alba, & Nomina
Bryonia, & Bryonias Columellæ, & Psilothrū, Officinis & Herbariis
similiter Bryonia dicitur. Vulgus Viticellā nominat, Mauritani *fesire*,
Alfese fessera seu *Alfescera*, *Hezargiesan*, & *Hezarchasan*, Itali *Vite Bianca*,
& *Zucca saluatica*, Germani *Stickwurtz*, Hispani *Nuxa* & *Anorca*, Galli *Couleuree*. Vitis
alba dicta est, non q̄ vitis sit, sed q̄ ei similis. Sic etiam Viticella Psilothrū quod ex
eius acinis coria depilari ac confici possint. *βρυωνία* verò δὲ *βρύω* forte, quod est pul-
lulo, atque adeo extollo & exalto, quod in vicinos frutices scandens se extollat, atq;
late pullulet. Hanc sic descripsit Dioscorides. Sarmenta, folia, capreolos sariuæ viti
similia habet, hirsutiora tamē omnia. Propinquis fruticibus se implicat capreolis
apprehendens, fructum fert racemosum, rubentem, quo coria depilant. Radix est
alba, crassa, magna, quam omisit Dioscorides, aut certe qui Dioscoridem transcrip-
serunt ante verba illa, *καὶ τῆς οἱ ἀσπράργοι*, vt ex radice exeuntes asparagus intelli-
gamus, sicuti Plinius habet. Vitis alba est, inquit, quam Græci Ampeloleucen, alij
Ophiostaphylon, alij Melothron, alij Psilothrum, alij Archezostin, alij Cedrostin,
alij Madon appellant. Huius sarmenta longis & exilibus internodiis geniculata
scandunt, folia pampinosa, ad magnitudinem hederæ, diuiduntur vt vitium. Radix

BRYNIA *sive vitis*
alba, Matth.



In c. 176.
lib. 4.

L. 0. 10.

alba, grâdis, raphano similis initio: ex ea caules asparagi similitudine exeunt. Hanc vulgi & Officinarum Bryoniam esse nullus inficiatur, quæ multas à radice teneras, graciles, & hirsutas viticulas emittit, quæ sese attollentes per sepes & fruteta, obuia quæq; scandunt, & suis capreolis quos multos habent, amplectuntur, folia vitis, aut balsaminæ magis incana, hirsutiora, asperiora, in quaternas aut quinas altiores incisuras fissâ: flores pallidiores, stellati, multi simul aggesti: fructus acinos solani hortensis vel asparagorum magnitudinem æquant, succulenti, acriores vti tota planta, primum virides, per maturitatē rubētes, quandoq; nigri, vt annotavit Matthiolum, qui tales acinos in Vngaria & Bohemia copiosos se vidisse ait, quod iis in locis nulla sit Bryonia cuius fructus rubescat. Semen in acinis delitescit, subrotundum ac parum acuminatum. Radix luculentæ est magnitudinis, tenera, raphani colore & concretionem, ima parte diuarricata, succosa intus pulpa. Passim in sepibus ac fenticetis nascitur, vicinos quosque frutices scādens, vt cecinit Columella.

Queque tuas audax imitatur Nyse vitis
Nec metuit sentes: nam Vepribus improba surgens
Achradis, indomitas Bryonias alligat ulmos.

Tempus.
Li. 4. c. 176.
Vires &
Temper.

Floret æstate, Autumno fructum producit. Bryoniæ, in prima germinatione asparagi, auctore Dioscoride, elixi manduntur: vrinam & aluum cientes, folia, fructus, & radix, acrem vinū habent. Eapropter chironiis, gangrænicis, phagedænicis, & tibias putrefacientibus vlceribus cum sale illita, auxilium tur. Radix abstergit corpus, & erugat. Vitia faciei, varos, lentigines, & cicatrices nigras cum eruo, terrachia, & fœnogræco emendat. Ad eadem prodest decocta in oleo vsq; dum lique scat. Sugillata tollit, & digitorum pterygia compescit. Cum vino illita, inflammationes discutit, & abscessus rumpit. Ossâ extrahit trita & illita. Miscetur apte medicamentis quæ exedendo sunt. Bibitur comitialibus drachmæ pondere quotidie per annum. Attonitis & vertigine laborantibus consimiliter assumpta prodest. Contra viperarum ictus pota drachmis duabus prodest. Mentem aliquando subvertit. Cit vrinam pota. Eclegma ex ea fit cum melle, quod præfocatione oppressis, tussientibus, latera dolentibus, & ruptis datur. Apposita vtero fœtus & secundas trahit. Lienem trium obolorum pondere ex aceto triginta diebus pota confumit. Illinitur eadem vitiliter cum fico ad eadem. Ad infessus decoquitur: vulnias siquidem purgat, & abortum facit. Vere ex radice eius extrahitur succus, bibiturq; cum mulla ad eadem, pituitam ducens, fructus eius ad psoras & lepras illitus & inunctus facit. Lactis abundantiam efficit succus fructus eius, si cum tritico decocto sorbeat. His satis consentanea sunt quæ Plinius de eadem re prodidit. Bryoniæ asparagi decocti in cibo, aluum & vrinam cient, folia & caules exulcerant corpus: vitique vlcera phagedænis, & gangrænis, tibiârūque tædio cum sale illinuntur. Semen in vua ratis acinis dependet, succo rubente, postea croci (vetus codex habet crocino) Nouere id qui coria perficiunt: illo enim vtuntur. Psoris & lepris illinitur. Lactis abundantiam facit coctum cum tritico potumq;. Radix numerosis

Lib. 23. c. 1.

rosis vtilitatibus nobilis, contra serpētium ictus trita drachmis duabus bibitur. Vicia cutis in facie, varosq; & lentigines, & sugillata emendat, & cicatrices. Eadēque præstat in oleo decocta, Decocta datur & comitialibus potus (Vetus codex habet, Datur & comitialibus in potu) item mēte cōmotis, & vertigine laborātibus, drachmā pondere quotidie anno toto. Et ipsa autem largior aliquanto sensus purgat (tur bat non purgat legēdum esse ex Dioscoride, perspicuum est, qui habet ὑποταράττει τὴν διάνοιαν) Illa vis præclara, quod ossa infracta extrahit trita in aqua & imposita (Sic enim legēdum ex Dioscoride) vt Bryonia: quare quidam hanc albam Bryoniā vocant. Alia verò nigra efficacior in eodem vsu cum melle & thure (In veteri exem plari legimus, albam Bryoniam vocant: aliam verò nigram efficaciorē in eodem vsu: cum melle & thure suppurationes &c.) Suppurationes incipientes discutit, ve teres maturat & purgat. Ciet menses & vrinam. Ecligma ex ea sit suspiriosis, & cōtra lateris dolores, vulsis, ruptis. Splenem ternis obolis pota triginta diebus consu mit. Illi nitur eadem cum fico, & pterygiis digitorum. Ex vino secūdas forminarum apposita trahit: & pituitam drachma pota ex aqua mulsā. Succus radice colligi de bet ante maturitatem seminis: qui illitus per se & cum eruo, lætiore quodam colo re & cutis teneritate mangonzat corpora, serpentes fugat (Duæ postremæ voces in vulgatis codicibus redundant, nec in veteribus reperiuntur, nec huc pertinent) Tunditur ipsa radix cum pingui fico, erugatq; corpus, si statim bina stadia ambulē tur: alias vrit, nisi frigida abluatur. Iucūdius hoc idem præstat nigra vitis: quoniam alba pruritū adfert. Bryoniæ prima germina, inquit Galēnus, ab omnibus pro mo re edi solent, vtpote edulium stomacho propter adstrictionem gratum, sed & sub amaram & modice acrem adstrictionem habent: quare & vrinam modice ciēt. At radix & abstergentem, & desiccantem vim habet, & moderate calidam: quare & lienes induratos liquat tum epota, tum foris cum ficubus imposita: & lepram & pforam sanat. Porro fructus eius racemosus iis qui coria deplunt, est vtilis.

VITIS NIGRA,

CAP. V.



ἡ Μ Π Ε Λ Ο Σ μέλανα Græcis, & Βρυόνια μέλανα, & χερσίωντα ἀμπέλως, *Nomina*
 Latinis Vitis nigra, & Bryonia nigra, & Vitis Chironia nominatur,
 Arabib⁹ Fesire sentanim, Italis Vite nera, Gallis Couleuree noire. Nigra vero
 vitis dicta est ab acinis radiceq; nigris, & quod vitis similitudinē ha
 beat. Vitem nigram describit Dioscorides foliis hederæ similibus, magis tamen ad
 similitacis folia accedentibus, sed maioribus, ita & caulibus similibus. Clauiculis et
 hanc arbores amplecti, fructu esse racemoso, initio viridi, cū maturuit nigro: radi
 ce foris nigra, intus buxei coloris. Plinius cum de vite alba dixisset subiungit. Est
 ergo & nigra quam proprie Bryoniam vocant, alij Chironiam, alij Gynecanthen,
 aut Aproniam, similem priori, præterquam colore: huius enim nigrū esse diximus.
 Radix foris nigra, intus buxæo colore. Fuchsius pro vite nigra Vitalbā seu Viornam *Cap. 33 hi.*
 Gallorum, Germanorum Lynen seu Lenem exhibuit, quam pro Vite siluestri po
 suimus. Matthiolus Italorum Tamaro, à tamo, siue à Tano, quam in Italia edulem *In cap. 17.*
 esse Plinius scribit cap. 15. 21. vocabulo, Vitem nigram Dioscoridis esse putat, quæ *lib. 4.*
 Herbariis & Officinis Sigillum beatæ Mariæ nuncupatur, Gallis Signet de Nostreda
 me, & Couleuree sauage, Dodonæo Vitis siluestris, vt diximus. Illius sententiæ duo
 maxime refragari videntur, quod vitis nigræ radix foris nigra sit, intus buxei colo
 ris, quodq; racemos nigros ferat: vnde Viti nigræ nomen. At sigillum Mariæ si in
 pratis, aut humidis aut vliginosiis locis nascatur, radice est crassa Bryoniæ instar, fo
 ris subrufa, intus alba, tactu viscida. Si in asperis, saxosis & opacis, tenuis, fibrata, per
 petuò alba, fructu semper rubente, nō nigro. Qui fructus color Matthiolum à sen

VITIS NIGRA,

Marthioli.



parum distare. Vuam Taminiam Plinij, diuersam à staphisagria, quā falsò quidam ita vocabant, hanc esse docti herbarij censent, rubentibus acinis, in apricis nascentem, præsertim cum Tamaro Italicum vocabulum ad Vuæ Taminiae sonum accedat, siue ad Tamum, cuius vuam, Taminiam vocarunt. Vitem nigram ab alba tantū illis duabus notis discrepātem, quas expressit Dioscorides in Vvestphalia, Saxonia, Hestia, Misnia frequentem esse, ē Germanorum scriptis ac epistolis cōpertum sibi esse Dalechampius ait. Quare Sigillum Mariæ, non vitem nigram, sed potius Dioscoridis Cyclaminum Cissanthemon esse Ruellius & quidam alij docti Herbarij non temerè censent: Vitem verò nigrā nondum planè notam, in qua est sententia Dodonæus. Pena leuioris momenti esse ait, quod duæ supradictæ notæ Sigillo Mariæ desint, nèpe color rubēs in acinis, & buxeus internus radice: quia alioqui folia sunt hederacea, similaci asperæ quamsimillima, circa frutices & sentes flexuosi gyri, viticularum multiplici capreolo proxima quæq; amplectente, racemi multisaggesti acinulis, virentibus primū, deinde rubellis: demum ad maturitatē quasi vietatam progressis, ex fusco rubore in fuscadinem atram vergentibus. Cætera (vti radix quæ Bryoniam magnitudine, figura, efficacia & teneritudine inuitatur, foris nigra, intus alba) planè tam vera, quā vulgo notissima sunt: etenim ubiq; in Gallia & Germania siluosis & asperis dumetis arbores sepèsque scandit, & visis speciosis, oblongis, floribúsq; muscosis labruscæ, vel oleæ, pallentibus conuestit. Hæc est Penæ sentetia: cui addit, vires etiā satis cōuenire. Scribit enim Diosco. viticulas prima germinatione erūpentes olerum modo in cibi vsum venire, vrinæ ciere, menses pellere, splenē liquare: comitialibus vertiginosis & resolutis prodesse: radicē similem albæ vitis radici vim habere ad eadem vtilē, sed minus efficacē, folia cum vino exulceratis iumentorū ceruicibus, cōmodissimè illini, & luxatis similiter imponi. Plinius Vitis nigræ asparagos, inquit, Diocles prætulit veris asparagis in cibo, ciendæ vrinæ, lieniq; minuēdo. In frutetis & arundinetis maximè nascitur: radix foris nigra, intus buxæo colore. Ossā infracta vel efficacius extrahit quā supradicta. Caterū eidem peculiare

Lib. 3. c. 46.

Lib. 4. c. 177

Vires &

Temper.

Lib. 23. c. 1.

peculiare est, quod iumetorū ceruicibus vnicè medetur. Aiunt si quis villā ea cin-
xerit, fugere accipitres, tutāsque fieri villaticas alites. Eadem in iumēto hominēq;
phlegma, aut sanguinē qui se ad talos deiecerit, circūligata sanat. In aliis exēplari-
bus exaratū est, sanguinē qui scretur, talis circūligata sanat. Quā lectionē mēdo-
sam esse & decurtatā putat Hermolaus. Id quod ipsa medicina indicat absurditas.
Quid enim stultius, aut quā nā est hęc antipathia, vt adalligata hominis, aut iu-
mēti talo herba, pituitā, aut sanguinē qui reiiciatur curet. Et sane codices vetustos
longe aliter habere, etiam si corrosi & ipsi laceriq; sint: Dioscorides luxatos sanari
circūligata ea scribit, vt fortasse legendū sit, Talos circūligata sanat, videlicet qui
moti sunt. Priora autē verba separatū & facilē sensum habent. Vitis nigra, inquit
Galenus, quā propriè vocatur Bryonia, supradictā ad omnia similis est, nisi quod
imbecillior. Sic cōpertum est vel mulierculis, ait Pena, Sigillum mariæ vehemen-
tius vrinā, renumq; sabulū & mensū saburram impellere potu. Verū quod scribit
Matthiolus, Vitis nigræ radici vim præstantissimam inesse ad excitandam vene-
rem, si sub feruētib; cineribus decocta deuoretur, id ille negat: quin potius quos-
dam suo malo expertos fuisse lumbos enervare, sanguinem renēque inflammare.

DVLCIAMARA,

CAP. VI.



PERITIS recētoribus Herbariis herba hęc quā vt supra descriptā, sepibus & fruticibus sese intorquet, & cui cūuoluit, γλυκύπικρον & γλυ-
κὺν πικρὸν nominatur, Latine Dulciamara, siue Amaradulcis, à studiosis
Luteriæ & Mōspelij præsertim, Solanū ligneū, vel lignosum, German-
is *Telever Teleber*, id est dulciamara, & *Hinschkraut*, quod ad morbū pecorū, *Die Hinsc*
appella: ū faciat Sarmēcis multis, lōgis, gracilibus, teneris, rotundis, lignosis, fruti-
cat, quibus vicinis arboribus, sepibus & dumis
hæret. Folia ei sunt lōgiuscula, obscure virenria,
ferè hederæ, sed minora, siue Solani, vel simila-
cis, vel Sigilli mariæ, sensim acuminata, quorū
nōnullis infernē vtrinq; foliolū vnū quasi ap-
pēdicula vel pinnula adnascitur, acetoſcē mino-
ris, vel saluie nobilis modo: flores multi aggesti
violaceis saturatiores, singuli in quina foliola
mucronata, recurua, angusta, diuisi, è quorū me-
dio luteus apiculus prominet, vnde succrescūt
acini oblōgi, teretes, cōferti, primū virides, cū
maturuerint, rubri, coralli rubri modo, granu-
lis intus miliaceis, cōpressis, ingrati planē sapo-
ris. Radix parua est & fibrata. Plantæ huius cor-
tex primū quidē gustatu amarus est, & insuauis,
deinde quo diutius mādatur, eo dulcior & iucū-
dior redditur: vnde ei nomē. Secus sepes & du-
mos vīsq; vliginosas luxuriat. Mōspelij etiā in
rueribus, maceriis & macilentis. Floret Iulio
mēse, Augusto semē maturū producit. Calida &
sicca esse tēperie scribūt Herbarij. Quare deco-
cti foliorū eius, siue sarmentorū & radicū in
vino potu, hepar obstructionibus omnibus li-
berari, & regiū morbū inde sanari. Idē decoctū ex alto delapsis, cōtufis, luxatis, ru-
ptis, vulneratis prodesse, quod sanguinē concretum per vrinas vacuet. Hęc herba
peritis quibusdā herbariis Theophrasti *μυρωδρον*, Penæ & Mōspeliensibus, circæa
esse creditur, Dodonæo Cyclaminus altera, Matthiolo Vitis siluestris. Plinius, cap. 18.

Li. 6. simpl.

Nomina

DVLCIAMARA, siue

Vitis siluestris, Matth.



Locus.

Tempus.

Lib. 3. hist. cap. 18.

quod antea monuimus, in Historia Vitis siluestris, Ampelon agriam in salictis nascentem, idèoque Salicastrum vocatam esse tradit.

LVPVLVS,

CAP. VII.



RYONIIS & Vitibus adiungenda hæc quæ in veterum Græcorum Latinorúmque monumentis non extat, nisi sit Plinij Lupus salictarius inter herbas sponte nascentes, quibus pleræq; gentium vtuntur in cibis, numeratus. Officinis Lupulus dicitur, Latinis recentioribus

Lupulus salictarius, & Lupus salictarius, quia subit scanditque salices, & arbusta omnia circumuoluendo sese complectitur: hinc etiam Lupulus reptitius à nonnullis hodie nominatur, à Græcis hodie vernacule *Βρυωνία*, aliquot Italiæ rura ad Græcam appellationem alludentia Brusculam, quasi Bryon vel Bryoniâ scusilem vocant, Galli *Houblon*, & *Houblon*, Germani *Hopfen*. Lupulus duum est generum, siluestris & satiuus. Siluestris sarmenta producit longa, hirsuta, tactu aspera, multis capreolis virgulta & frutices vicinos amplectentia, folia vitis albæ, asperiora, triangularia: flores pallidos, foliaceos, ac multis tenuibus folliculis struicti serie compactiles, qui ferè allium vinumque suboleant: semen compressum, pullum, genistæ, sed minus: radicem nigram, longam, longius proreptantem & surculosam. Lupulum ex siluestri satiuum sedulo cultu fecere septentrionales, multisque pedamentis ac radicis tenellos eius capreolos fulciunt, quæ fulcra, quia ferè semper saligna sunt, ideo forte salictarium Lupulum vocarunt. Hic siluestri prolixis sarmentis foliis & floribus est perquam similis, sed lætior multò tota planta cultu euadit, florumq; thyrsis foliaceis & squamosis adultioribus, semine item multò maiore. Lupulus siluestris iuxta sepès & vepres prouenit: item in hortorum & agrorum marginibus. Satiuum colunt Germani & Flandri in hortis, atque in campis patentissimis vinetorum modo, solo humentiore, lætiore, pinguiore. Augusto mense floret & Septembri. Lupulus auctore Mesue, temperatus est, vel potius frigidus, principio ordinis primi. Sanguinem bile flaua purgat modicè, eumque clarum reddit, & sedato eius calore temperat, præsertim sero lactis infusus. Ictericum syrupus ex eo sanat, febribusq; biliosis & sanguineis prodest. Ipse quoque & succus eius cum hordei polëta, cephalalgiam calidam sanat, & ventriculi ac hepatis intemperiem calidam. Cùmque tam efficax sit medicamentum,

LVPVLVS, Matthioli.



mirum subit cur à nostræ tempestatis medicis in usu tam raro habeatur. Hæc Mesues. Quibus haud assentiuntur recentiores. Flores enim calidos & siccos esse, odoris grauitas & notabilis amaritudo testantur, inquit Fuchsius. Antiquus etiam Herbarius calidum & siccum secundo ordine esse tradit. Denique constat radices quoque eius calidas esse. Item Dodonæus Lupulum, flores potissimum calidos siccosq; esse secundo ordine statuit. Matthioli eiusdem flores, folliculos & radices calfacere, aperire, extenuare, abstergere & expurgare. Turiones verò quibus elixis vtimur in acetariis cum plus humiditatis habeant, parum tum excalfacere, tum siccare: esse sumentibus & cibum & medicamentum, quoniam sanguinem mudant, ventrem solunt, obstructions aperiunt, palatoque grati sunt. Florum & folliculorum

Genera.

Forma.

Locus.

Tempus.

Li 2. simpl.
cap. 24.

Temper.

& Vires.

Ca. 8. hist.
Lib. 3. cap. 9.
hist.In cap. 140.
lib. 4.

lorum decoctum dari vtiliter potandū contrā hausta venena, scabiem, Hispanicā luem, aliaq; huiusmodi vitia quæ extimam cutem inficiunt, veluti lichenas, serpigines, impetigines, alphos atque cætera id genus. Dari & in febris diuturnis ab infarctu iocinoris prouenientibus: defectionibus additos, valere ad induratos & tumidos fœminarum locos, & ad eos qui difficulter vrinam reddunt: semē tritum & potui datum semidrachmā pondere interaneorum animalia necare: menses prouocare, vrinā pellere. Fuchsius eiusdē vires ex recentioribus tradit. Bilem vtrāq; detrahit, inquit, abscessus discutit. Pituitam in aqua inter cutem per alium ducit. Succus eius crudus haustus ventrē magis subducit, minus vero obstructions auferret. Coctus vero magis ab obstructionibus liberat, minūsculo ventrem subducit. Auribus instillatus eas à putredine vindicat, & à fœtore liberat. Radices obstructiones tollunt, lienis potissimum, & iocinoris. Ex his perspicuum est, diuersas lupuli partes diuerso esse temperamento: asparagos primo vere erumpentes, quos tam siluestres quam satiuos acetariis miscet, cichorij terra defossi, vt sit ab holitobus, sapore non ingrato, item folia, calore esse temperato, flores & folliculos atque semen tum calidiore, tum sicciorē esse temperie. Flores Septentrionales regiones frigidiore decerpunt, ad Bieræ, siue Ceruissæ confectionem.

HEDERA, CAP. VIII.

KΙΣΣΟΣ & Κίττος Græcis, Hedera Latinis, Mauritanis *Cussis*, Italīs *Hedera*, Germanis *Ephreu*, Hispanis *Edera*, Gallis *Lierre*. Κίσσαν autē dictum putant à Cisso, quem pusionem Liberi patris fuisse Græci fabulantur, & in nominis sui fruticem conuersum, dum minister cum eo Deo salsiens, allisus terræ periit. Athenienses *Citon* *Bacchum* ipsum vocant, & apud se Acharnis vico, Hederam primō natam volunt. Hederam Dionysiam à Baccho, id est Bacchicam appellauit antiquitas, hoc honore Liberum patrem dignata, qui primus ex India in Græciam Hederam asportauit: itaque in tutela Liberi patris putabatur esse. Nam vt ille iuuenis semper, ita hæc perpetuō viret. Nec secus omnia, quàm ille mentes hominum illigat. Vel potius Κίσος Hedera dicta est ἀπὸ τῆς κίος, id est à verme siue curculione. Cis enim auctore Theophrasto, in hordeo & tritico nascitur, cui natura est semina illa cuspe potius, quàm ore, exiguīs foraminibus terebrare: vnde & κίος ηὐρὶς pumex ob fistulosas cauitates ita dicitur. Sic & κίσος à textura porosa & spiraculis innumeris ferè peruia, qua vinum transmittit, Catonis experimento sic scribentis: Si voles scire an in vinum aqua addita sit, nec ne, vasculum facito de materia hederacea. Vinum id quod putabis aquam habere, eodem mittito. Si habebit aquam, vinum effluet, aquā manebit: nam non continet vinum vas hederaceum. Inde & κίσιον Homero vas pastorale ex hedera factum. Hederam vero Pompeius dictam censet quòd hareat, vel potius quòd edita petat, vel quia id cui adhæserit edat, & enecet. Plurimæ Dioscoride auctore, sunt hederæ species, sed maximè generales tantum tres, candida, nigra, quæ & vulgo Dionysia, & tertia Helix. Theophrasto quoque Hedera multiplex est, id quod fusiùs declarat his verbis. Πολυδὴς δὲ ὁ κίττος. καὶ ὃ μὲν ἐπὶ γένος, ὃ δὲ εἰς ὑψὸς ἀνθρώπου. καὶ τῶν ἐν ὑψίᾳ παλαιῶν γένη, τρία δὲ οὖν φαίνεται τὰ μέγιστα, ὅτε λευκὸς, καὶ ὁ μέσος, & τὸ τρίτον ἢ ἐλὶξ. Ἐξ δὲ ἐκ τῶν παλαιῶν λευκὸς, ὃ μὲν τῷ χερσὶ μόνον, ὁ δὲ καὶ τοῖς φύλλοις ἔστι. πάλιν δὲ τῶν λευκοχέρων μόνον, ὁ μὲν ἄδρον & σικκόν, & σικκονόζιον (ἔστι συνέσκητόζιον τὸν χερσὶν ἔχει καθαπτερόν σφοδρῶν, ὃν δὲ καλεῖσσι τίνες κορυμβίαν. οἱ δὲ ἀθηναῖοι ἀνθρακὶν ἄδρων ὀνόματι δὲ ἐλάτῃ, διακεχυμένον, ὡς περὶ τὸ μέλος. ἔχει δὲ τὸ μέλος διαφοράς, ἀλλ' ὅχι οὐκ ὁμοίως φανεράς, ἢ ὅτι ἐλὶξ ἐν μεγίσταις διαφοραῖς. καὶ ὃ τοῖς φύλλοις παλαιῶν διαφέρει, τῇ τε μικρότητι, & τῇ γωνιότητι καὶ τῇ διθυμότερα εἶναι (emenda, γωνιοφθῇ καὶ διθυμότερα) τὰ δὲ τῆς κίττος περιφερέστερα καὶ ἀπλῆ καὶ τῷ μήκει τῶν κλημάτων, & ἔτι τοῖς ἀκαρποῖς εἶναι. διακρίνον) γὰρ τινες, τῷ μὴ ἀποκρίσθαι τῇ φύσει τὴν ἐλὶξ, ἀλλὰ τῇ οὐκ ἔχει

Ca. 38. hist.

Nomina

Li. 4. caust. cap. 15.

Cap. III.

Li. 2. ca. 175. Genera. Lib. 3. hist. cap. 18.

κίττος

κίτλις τελεφεμύνη. (Qui locus valde deprauatus sic restituendus videtur. καὶ ἔτι τοῦ ἀκέρπου εἶναι, τίνες ἀποκιτλίσαντες φασὶ τὴν ἑλικὰ ἀλλαγῇ εἰς τὸν κίτλον τελεφεμύνη.) Εἰ δὲ πᾶς ἀποκιτλίσται, καὶ θάπερ τίνες φασὶν, ἡλικίας ἀν εἶη τὸ διαθέσεως, ἐκ εἴδους ἢ διαφοράς, καὶ θάπερ ἐκ τῆς ἀπείας πρὸς τὴν ἀρετὰν. τολὴν τὸ γὰρ φύλλον τὸ ταύτης πολὺ διαφέρει πρὸς τὸν κίτλον. πᾶν δὲ τὸ τοῦ καὶ ἐν ὀλίγοις ἔστιν, ὥστε παλαιόμυνον μετὰ ἀλλάξιν, ὡς περὶ τῆς λελύτης καὶ τῆς χρώματος. Εἶδη δὲ ἐστὶ πλεῖστα τῆς ἑλικας, ὡς μὴ τὰ πορφανέστατα καὶ μέγιστα λαβεῖν τελεφεμύνη καὶ ποδώκης, ἵπερ τὸ πλεῖστον καὶ ἐτέρα ἢ λελύκη, τὸ τετὶν ἢ ποικίλη, ἣν διὰ χαλκὸς τινὲς θρακίαν. Εὐχάρι δὲ τῶν τοιαύτων διαφέρειν καὶ τῆς χαλκώδους ἢ μὲν λεπτότερα, τὸ μακροφυλλό-
 Li. ix. ca. 34
 τερα (Plinius legisse videtur τοκοφυλλότερα, id est, ἐν ῥύθμο φυλλότερα) καὶ ἔτι πυκνοφυλλό-
 τερα, ἢ δὲ ἵπτον πᾶσι ταῦτ' ἐχέτω. τὸ ποικίλης, ἢ μὲν μεῖζον, ἢ δὲ ἑλάττω τὸ φύλλον, καὶ τῆς ποικίλης διαφέροντα. ὡς ὁμοίως δὲ λελύκης, τὸ μὲν μεῖζον τῇ χροίᾳ διαφέρουσιν. ἐκαστὴ δὲ ἢ ποδώκης, τὸ ἐπὶ πλεῖστον ποικίλῃ. φανερὰ δὲ ἐν αἰσὶ φασὶ τὴν ἀποκιτλίσειν, ὅτι μόνον τοῖς φύλλοις, ὅτι μεῖζον καὶ πλεονέστερον ἐχέτω, ἢ τοῖς βλάστοις. ὁμοίως δὲ ὁρθὸς ἐχέτω καὶ ὡς ἄλλαι καὶ ἄλλαι (Gaza legit καὶ ἄλλαι. Potest etiam legi καὶ ἄλλαι. κεκλιμέναι) τὸ διὰ τὴν λεπτότητα, τὸ διὰ τὴν μήκος. τῆς δὲ κίτλιδος, τὸ βραχυτέροι καὶ παχύ-
 τεροι, (Gaza ποδώκης legit) καὶ τῆς πᾶς ὁ κίτλος ὅταν ἀρχῇ) περὶ καὶ μεῖζον ἐχέτω καὶ ὁρθὸν τὸν βλάστον. πολὺ ῥιζὸς μὴ οὐκ ἅπας κίτλος, καὶ πυκνὸς ῥιζὸς, σπυρταμύνης, τοῖς ῥιζαῖς δὲ ξυλῶδες, καὶ παχέας, καὶ ἐκ ἀγαν βαθύρριζος, καὶ μάλιστα δὲ μέλας, καὶ τῶν λελύκων τὸ τραχύ-
 τας καὶ ἀχειρότερος. διὸ τὸ χαλεπὸς παραφύει) πᾶσι τοῖς δένδροις ἀπόλλυται καὶ πᾶσι, καὶ ἀφανιστὴ παραφύει τὴν τροφήν. λαμβάνει καὶ μάλιστα πᾶχος ἔτος, καὶ ἀποδεδρῆται, καὶ γίνε-
 ῖται καὶ ὡς αὐτὸ κίτλι δένδρον. ὡς δὲ ἐπὶ τῶν πλεῖστον ἀπὸ τῆς ἐτέρας φιλέει καὶ ὡς (Lege φιλέει
 ἔστιν) καὶ ὡς ἐπαλλὰ καυλὸν ἔστιν. ἐχέτω δὲ ὁμοίως καὶ τῆς φύσεως τι τοιοῦτον. καὶ γὰρ ἀπὸ τῶν βλάστων ἀφίησιν αἰετὶς ἀνὰ μέτρον τῶν φύλλων, αἷς ὡς ἐνδύει τοῖς δένδροις, καὶ τοῖς τε-
 χνοῖς, οἷον ἐξέπτηδες πεποιημῆρας ὑπὸ τῆς φύσεως, διὸ τὸ ἐξαρμόμιος τὴν ἐξοτήν, καὶ ἑλκων ἀφανιστὴ. καὶ ἐὰν ὑποκοπῇ καὶ ἄνωθεν διωκῇ) διαμυρῖν καὶ ἔστιν. ἐχέτω δὲ καὶ ἐτέρα διαφοράν καὶ τὸν ἀκέρπον ὅτι μακρὰν, ὁ μὴ καὶ ἐπὶ γλυκύς ἔστιν, ὁ δὲ σφοδρὰ πικρὸς, καὶ τῶν λελύκων, τὸ μέλας. σημειῖον δὲ ὅτι τὸν μὲν ἐσθίουσιν αἰετὶς, τὸν δὲ πᾶσι. τὰ μὲν οὐκ ὡς τὸν κίτλον ἔτος ἐχέτω. Quæ dilucidius sic verti possunt quàm Gaza reddiderit. Hedera multiplex est: quædam enim humi repit, alia in altum attollitur. Atque excelsum genera plu-
 ra. Summa verò tria sunt, Candida, Nigra, & quæ Helix appellatur, (clauiculâ ver-
 bum è verbo Gaza interpretatus est, Plinius Græca voce vititur.) Singularum item species multe. Alia enim fructu solo, alia etiam foliis candida est. Rursus fructum tantum candidum ferentium, quædam grandiore, densum, & veluti in orbem circumactum fructu producit, quam nonnulli Corymbian vocant, Athenienses Acharnicam, quæ in riguis nascitur, quædam minorem, sparsiore, nigra modo. Habet & nigra differentias, sed non ita perspicuas. At Helix maximis differentiis distinguitur. Etenim foliis plurimum differt, tum quod minora, tum quod angu-
 losa & concinniora sint. (Sic Plinius & Gaza interpretati sunt γωνιοδὴ καὶ ὀρθομύ-
 τερα. Quare Cornarij non placet emendatio, qui in hac foliorum Helicis delinea-
 tione apud Dioscoridem, ἐχέτω τὰ φύλλα λεπτά, γωνιοδὴ καὶ ὀρθομύ, id est, folia habet te-
 nuia, angulosa, & rubra, vocem ὀρθομύ falso legi cum perspiceret, quod nullus in foliis Helicis rubor conspiciatur, æquè falso in vulgatis Theophrasti codicibus ὀρθομύ, quæ cōcinniora Plinius reddidit, hic ὀρθομύ, id est succulentiora le-
 git, in Dioscoride verò ὀρθομύ eadem significatione, id est crassa, Hederis autem reliquis rotundiora, & simplicia. Differt etiam flagellorum longitudine, longius enim porriguntur: præterea quod sterilis sit. Quidam Helicem aiunt Hederae natu-
 ram adipisci, mutarique in eam, cum perfecta iam adoleuerit. At si in eo genere omnes in Hedera adolecant (hedera scere Gaza vertit) ut nonnulli volunt, ætate sanè & affectu, non genere constabit hæc differentia, qualis est piri à pirastro. Tamen eius Helicis folium ab Hedera folio plurimum distat. Raro autem & in paucis


pauca euenit, vt vetustate cōmutentur, velut in populo alba, & Ricino. (Quæ sic expressisse videtur Plinius, Maximè foliorum vnitas in suo cuiq; genere permanet, præterquam populo, Hederæ, crotoni, quam & Cici vocari diximus) Sunt igitur Helicis genera multa, maximè verò nota & summa tria. Prima est virens siue herbacea, quæ plurima est, secunda candida, tertia versicolor, quam Thraciam quidam nominant. Et singularum differentiæ quædā sunt. Nam virētis alia tenuior est, & longiore folio (Plinius habet, in ordinem digesto) densiorque. Alia minus hæc omnia habet. Et versicoloris alia maius, alia minus folium habet, & colorum varietatem in eo dissimilem. Similiter & magnitudine & colore distant candidæ folia. Facillimè augetur herbacea, & altissimè assurgit. Manifestum esse aiunt Helicen in Hederam transiturem, non solum foliis quæ maiora latioraq; gerit, sed etiam germinibus: protinus enim recta gerit, non inflexa vel inclinata, tum ob tenuitatem, tum ob longitudinem. Nam aliis hederis (Gaza legit *πράδης*, id est herbaceæ pro *κρίδης*) breuiora crassioraq; sunt germina. Nam Hedera cum semen parit, sublime & rectum germen edit. Est quidem Hedera omnis, radice numerosa, densa, intorta, lignosa, crassa, nec valdè in profundum acta, sed maximè nigra, & inter candidas quæ asperissima, maximeq; siluestris. Quare non sine damno arboribus adnascitur: omnes enim necat & arefacit, sublato ipsis alimento. Crassescit hæc maximè & arborefcit, ipsaq; per se arborefcit. Maiore autem ex parte super aliud viuere solet, caulibus suis vicinas arbores velut amplexando, tale quid statim habens sua natura. Etenim è germinibus assidue radices per media folia emittit, quibus quasi de industria à natura datis, muros & arbores subit, & iis pertinacius hæret. Atque ita sublato humore, atque exhausto, ipsas tabefacit. Quod si inferius succidatur, durat, nec emoritur. Est & huius non parua differentia à fructu sumpta. Nam alius dulcis est, alius valdè amarus, tam candidæ, quam nigre. Id demonstrat aues, quæ alio vescuntur, alio minimè. Hæc de Hedera Theophrastus literis mandauit, cum quibus Plinij locum in quo eadem genera distinxit, conferre, nec iniucundum, nec inutile fuerit. Duo genera Hederæ prima, inquit, vt reliquarum, Mas & fœmina. Maior traditur mas corpore, & folio duriore etiam ac pinguiore, & flore ad purpuram accedente. Vtriusque autem flos similis est rosæ siluestri, nisi quod caret odore. Hæc scilicet Plinius quæ *πτελὲς* & *κίτρυ* sunt audienda, τῶν *κίτρυ*, id est Hederæ incogitanter tribuit.) Species horum generum tres. Est enim candida & nigra hedera, tertiæque quæ vocatur helix. Etiamnum hæc species diuiduntur in alias: quoniam est aliqua fructu tantum candida, alia & folio fructu quoque candidum ferentium aliis densus acinus, & grandior, racemis in orbem circumactis, qui vocantur Corymbi. Item selenitium, cuius est maior acinus, sparsior racemus (Hæc aliter legisse videtur Plinius quàm in Græcis nostris exemplaribus exaratum sit, in quibus selenitium vox deest, & hederam Corymbiam vocari legimus) Simili modo in nigra. Alicui & semen nigrum, alij crocatum, cuius coronis Poëtæ vtuntur, foliis minùs nigris, quam quidam Nysiam, alij Bachicam vocant, maximis inter nigras corymbis. Quidam apud Græcos etiamnū duo genera huius faciunt, à colore acinorum Erythranum (rectius fortasse Erythrocarpum) & Chrysocarpum. Plurimas autem habet differentias helix, quoniam folio maximè distat. Parua sunt & angulosa, concinnioraque, cum reliquorum generū simplicia sint. Distat & longitudine internodiorum, præcipuè tamen sterilitate, quoniam fructum non gignit. Quidam hoc ætatis esse, non generis, existimant: primoq; helicem esse, deinde fieri hederā vetustate. Horum error manifestus intelligitur. At enim helicis plura genera reperiuntur, sed tria maximè insignia. Herbacea ac virens, quæ plurima est, altera cādido folio, tertia versicolor quæ Thracia vocatur. Etiamnū herbaceæ tenuiora folia, in ordinem digesta, densioraq;

Li. 16. c. 22.

Li. 16. c. 34.

genere diuersa omnia. Et in versicolori alia tenuiori bus foliis, & similiter ordinatis, densioribusque est: alteri generi neglecta hæc omnia. Maiora quoque, aut minora sunt folia, macularumque habitu constant: & in candidis alia sunt candidiora. Adolefcit in longitudinem maximè herbacea. Arbores autem necat candida: omnemque succu auferendo tanta crassitudine augetur, vt ipsa arbor fiat. Signa eius, folia maxima, atque latissima ramos erigētis (non māmas: nam *ματς* legisse videtur pro *βλατς*) qui sunt cæteris inflexi: racemi stantes atque surrecti. Et quanquam omnium hederarum generi radica brachia, huic tamen maximè ramosa, ac robusta: ab ea nigra. Sed proprium albæ, quod inter media folia emittit brachia vtrinq; semper amplectens arbores: hoc & in muros, quamuis ambire non possit. Itaque etiam pluribus locis inter cisa, viuit tamè duratque: & totidem initia radicum habet, quot brachia, quibus incolumis & solida arbores fugit, ac strangulat. Est & in fructu differentia albæ nigraque; hederæ: quoniam aliis tanta amaritudo acini, vt aues non attingant. Est & rigens Hederæ, quæ sine adminiculo stat, solâ omnium generu ob id vocata Cissos. Hactenus Plinius. Matthiolo duæ sunt præcipuè Hederæ differentie, maior & minor. Maiorem vocat arboream, quæ non solum in siluis excelsas arbores scandit strangulatque, arcto brachiorum complexu, sed etiam antiquis ædificiis, vrbium mœnibus, sepulchrisque; adeo pertinaciter hæret, vt tandem ea diruat, & vna cum iis collabatur. Minorem quæ sterilis est, helix dicta, raro arbores scandens, sed aut humi repens, aut per saxa, macerias, sepēs aut aggeres serpens. Duo quoque Hederæ summa genera nostra ætate nota sunt. Primum genus est Hederæ vulgaris arboreæ cunctis notæ. Huius multæ varietates, inquit Pena, antiquis persuadere potuerunt, vt plures differentias, siue species statuerint: tamen si discrimen è baccis duntaxat Dioscorides accersat, vt in malis, nucibus, & aliis fructibus vulgò fit. Quinetiam arborefcit quædam, suo pteque stat stipite, nulli innixa pedamento, qualem in siluosis quibusdam Angliæ se vidisse ait. Orthocissos antiqui dicunt. Interdum etiam quibusdam locis per ampelino colo-

HEDERA Arborea,
Matthioli.



Lib. a. c. 175


Forma.

re folia nitent. Pisces sibi demonstratas ab Herbariis corymbis cæsis & albicantis coloris: melinos subfuscis corymbos plerisque plantas factas in hortis Italicis & Germanicis ex Campania & Apulia hodie maturare. Alterum genus est humilis planè, minoris & infrequentioris hederæ, quæ concinne Helix vocata fuit: & quam plurimis clauiculis capreolisque viticeis, quibus serpit & propagatur. Duo ista genera hic appinximus, tertium ex Dalechampsio hic adiecimus. Hederæ albæ, inquit Dioscorides, album fert fructum, nigra nigrum, aut crocei coloris. Helix nullum fert fructum, sed albæ habet sarmenta (Antiquus codex habet *λεπλὰ ἔχοντα κλίματα*, id est tenues viticulas habet) & folia tenuia, angulosa & concinniora. Hederæ nigra vulgaris est nostræ arborea fruticosa stirps, quæ brachia fundit dura, lignosa, cortice cinereo, spisso contexta, quibus arbores, parietes, & quicquid nancisci potest, amplectitur. Folia primum cum pubescit, angulosa, quam plurimis in triangulam figuram exeuntia, quæ cum vetustiora sunt, rotundantur, pinguis, dura,

leuia,

læuia, etiam inuita bruma virentia: flores cogerie muscarij glomerosi, pallidi, non inodori, quibus æstate de lapsis bacca racemosa, primum herbacea, deinde atræ ineunte hyeme maturescentes, ex longiore pediculo in vna modum dependent, ligustro similes, corymbos vocant. Radicem spargit numerosam, densam, flexuosam, contortam, ac furculosam, nec admodum profundam. Helix, vt describit Pena, ex sarmentis, seu viticulis capreolos emittit, qui humi panguntur, & propagatione quadam quasi in spiras & anfractus prouoluuntur: interdum etiã serpẽdo muscidis truncis & caudicibus aduoluitur, gracilioribus sarmentis, folia minora, alius triquetra diuisura, sinuata edentibus, planè superioris, sed minora, minorisque vsus: nec enim vel folia eius decerpuntur, vel gummi vllum Officinæ ex hac colligunt. Quin nec fructus quidem vllus in ea obseruatur: vnde sterilis putatur. Hederæ Chrysocarpos dicta ab acinorum colore aureo, Dionysia aut Bachica, quod coronis ex ea Poëtæ vterentur. Dionysiacos enim artifices Græci olim vocabant, qui aut cantu, aut musicis instrumentis scenæ ludisque publicis inferuient, ex congeneribus nigris folium habet minus atrum, minimè angulosum, crassum, carnosum, venosum, in acumen fastigiatum, nec admodum densum: in corymbis acinos luteos aureo nitore fulgentes, maximè ex congeneribus aspectu pulchros. Hæc radicos brachiis reliquarum modo vicinas arbores enecat, succo earum exhausto. Raro in Gallia prouenit. Helix in siluis humi serpit. Nigra & arborea vulgaris, circa vda, & circa ripas humentium regionum, frigidarũ, & temperatorum: nam calidissimarum impatiens est. Hederæ omnis auctore Dioscoride, acris est, & adstringens, neruos tentat. Flores trium digitorũ captu in vino bis die poti, ad dysentericos faciunt. Ambustis cum cerato illiti profunt. Terneræ folia cum aceto cocta, aut cruda cum pane detrita, lienes sanant. Foliorum & corymborũ succus cum irino vngueto, melle, aut nitro, naribus infunditur. Et contra veteres capitis dolores valet, atque eo perfunditur caput cum aceto & rosaceo. Dolentibus & purulentis auribus cum oleo medetur. Nigræ Hederæ succus, aut corymbi epoti imbecillitatẽ pariunt, mentemque turbant, largius sumpti. Pilulæ quinque corymborum tritæ calfactæq; in malicorio cũ rosaceo, si instillantur in cõtrariam aurem, dolorem dentium mitigant. Denigrant capillos illiti corymbi. Folia in vino decocta, omnium

HEDERA Helix,
Marthioli.



HEDERA Dionysias,
Dalechampij.



Locus.

Li. 2. c. 172.
Vires &
Temper.

ulcerum generi, etiam si cacoethe sint, illinuntur: vitia cutis in facie, & ambusta, ut iam diximus, decocta sanant. Mouent menses tristi & subditi corymbi. Iidem poti post purgationes foeminarum, sterilitatem faciunt. Pediculus foliorum melle irrigatus & vuluæ inditus, menstrua & foetus extrahit. Succus instillatus naribus graueolentiam & putredines expurgat. Lachryma eius depilat, pediculósque illita, necat. Radicum succus cum aceto potus, phalangiorum moribus succurrit. In veteri codice habetur $\sigma\omega\delta\epsilon\tau\iota\epsilon\iota\ \iota\psi\theta\epsilon\tau\iota\varsigma\ \chi\alpha\iota\ \pi\alpha\theta\epsilon\tau\iota\varsigma$, id est, cum aceto potus coctusque. Eundem usum medicum hederarum Plinius exposuit etiam prolixius his verbis. Hederæ genera viginti demonstraui. Natura omnium in medicina anceps. Mentem turbat, & caput purgat. Largius pota, neruis intus nocet. Iisdem neruis adhibita foris prodest. Eadem natura quæ aceto ei est. Omnia genera eius refrigerant. Vrinam cient potu, capitis dolorem sedant, præcipuè cerebro continentique cerebrum membranæ vtiliter mollibus impositis foliis, cum aceto & rosaceo tritis & decoctis, addito postea rosaceo oleo. Illinuntur autem fronti: & decocto eorum fouetur os, caputque perungitur. Lien & pota & illita, prosunt. Decoquantur & contra horrores febrium, eruptionesque pituitæ, aut in vino teruntur. Corymbi quoque poti vel illiti lienem sanant, iocinora autem illiti. Trahunt & menses appositi. Succus hederæ tædianarium graueolentiamque emendat, præcipuè albæ satiuæ. Idem infusus naribus caput purgat, efficacius addito nitro. Infunditur autem purulentis auribus, aut dolentibus cum oleo. Cicatricibus quoque decorem facit. Ad lienes efficacior albæ est, ferro calefactus, satisque est acinos sex in vini cyathis duobus sumi. Acini quoque ex eadem alba terni, in aceto multo poti, tineas pellunt: in qua curatione ventri quoque imposuisse eos vtile est. Hederæ quam Chrysocarpum appellauimus, bacis aurei coloris viginti, in vini sextario tritis, ita ut terni cyathi petentur, aquam quæ cutem subierit, per vrinam educit Erasistratus. Eiusdem acinos quinque tritos in rosaceo oleo, calefactosque in cortice punici, instillauit dentium dolori à contraria aure. Acini qui croci succum habent,

THLASPI Hederaceum,
Lobell.



Li. 7. simpl.

præsumpti potu, à crapula tutos præstant: item sanguinem excreantes aut torminibus laborantes. Hederæ nigrae candidiores Corymbi poti, steriles etiam viros faciunt. Illinitur decocta in vino omnium ulcerum generi, etiam si cacoethe sint. Lachryma hederæ psilothrū est, phthiriasimque tollit. Flos cuiuscumque generis trium digitorum captu, dysentericos & aluum citam emendat in vino austero bis die potus. Et ambustis vtiliter illinitur cum cera. Denigrant capillum Corymbi. Radicis succus in aceto potus contra phalangia prodest. Huius quoque ligni vase spleneticos bibentes sanari inuenio. Et acinos terunt, moxque comburunt, & ita illinunt ambusta, prius persusa aqua calida. Sunt qui & incidant succi gratia, eoque vtantur ad dentes erosos, frangique tradunt, proximis cera munitis, ne lædantur. Gummi etiam in hederâ quarunt, quod ex aceto vtilissimum dentibus promittunt. Hæc Plinius. Galenus easdem vires distinctius docet. Hedera, inquit, ex contrariis composita est facultatibus. Habet enim quiddam adstringentis substantiæ, quæ terrena & frigida est, habetque;

habētq; etiam nonnihil acris, quæ calida. Nec deest tertia, aqueam namque substantiam quandam tepidam habet, si viridis sit. Cum enim arescit, hæc prima exhalat necesse est, manētque quæ est terrena, frigida & adstringens, & ea quæ calida est, & acris. Viridis foliis in vino decoctis, vlcera grandia glutinar, quæq; maligna sunt, ad sanitatem reducit. Igne etiam factas exulcerationes, cicatrice includit. Cum aceto decocta folia lienosis profunt. Flores autem quodammodo validiores sunt, vt ad læuorem redacti cum cerato ambustis conueniāt. Præterea succus medicamentum est, quod naribus infusum, capiti purgando idoneum est. Vetusitas aurium fluxiones sanat. Adhæc vlcera vetera, tum in auribus, tum in naribus. Porro si acrior appareat, aut rosaceo, aut dulci oleo miscetur. Lachryma eius pediculos interimit, pilis nudat, vsque adeo calidæ potestatis, vt obscure adurat. Plantam aliam Hederaceam ex Lobellio pictam damus, Hederaceam Thlaspi vocat. In Portlandiæ peninsula, Cornubiæ vicino portu Plimmoavve, aliisque maritimis cautibus reperit herbula, dodratalibus & spithameis gracilibusque cauliculis, stratis, puniceis, foliis sinuosis Hederaceis, carnosiss. Flosculi cædidi & semen exile in folliculis gustu & habitu Thlaspi exprimunt. Hæc Lobellius.

SMILAX.

CAP. IX



MILACIS vox valde est ambigua, vt quæ quasdam cognatas vel similes plantas, significet, quasdam admodum discrepantes, & viribus planè cōtrariis pollentes, veluti taxū venenatā, (σμύλαξ enim Dioscoridi dicitur) & Smilacem asperam quæ venenis aduersatur, præterea Smilacem læuem, facultatis non admodum exploratæ, quandoquidem vilitatem nullam, sed tantum incommodum turbulenti somnij parere Dioscorides scribit. De duabus hîc agimus, quarum prior σμύλαξ τραπεζία Græcis dicitur, μύλαξ Galeno, Latinis Smilax aspera, & Hedera Cilissā, aliquibus volubilis aculeata, vel pungens, Ital. s. *Hedera spinosa*, & *Rouo ceruino*, Gallis *Liset piquant*, Germanicè, inquit Fuchsius, *Stechendwuid* ab aculeis quos habet apte nominari potest: σμύλαξ vero λεῖα, siue μύλαξ λεῖα Græcis altera vocatur, Latinis Smilax lævis vel levis, Plinio Conuoluulus, Officinis & Herbariis Volubilis maior, nonnullis Campanella, & funis arborum, Ital. *Viluchio maggiore*, Gallis *Grand Liset*, vel *Liseron*, Germanis *Vindenkraut*. Lævis porro non alia ratione appellatur quàm quod aculeis careat. Smilax aspera vt describit Dioscorides, folia habet periclymeno similia, ramulos multos, tenues, paliuri, aut rubi modo aculeatos. Circumuoluitur arboribus sursum deorsum se circumagens: fructum fert racemosum, paruum, cū maturuit rubentem, gustu leuiter mordentem: radicem duram, crassam. Smilax lævis hederæ folia similia habet molliora tamen, læuiora, & tenuiora: ramulos supradictæ similes, aculeis carentes. Conuoluitur & hæc arboribus vt prior. Fructum fert lupino similem, nigrum, paruum: flores circumquaque albi, copiosi, orbiculati per totam Smilacem exeunt. Æstâte tabernacula ex ipsa fiunt: Autumno folia decidunt. Smilax aspera, vt Dioscorides ait, nascitur in palustribus & asperis, vt Plinius, in conuallibus opacis, at Smilax lævis amat culta, & in iis potissimum gignitur. Nascitur nobis passim per fruteta, & sepibus se aduoluit. De vtrâque Smilace Plinius hæc prodidit. Similis est hederæ, & Cilicia quidem primum profecta, sed in Græcia frequentior quam vocant Smilacem, densis geniculata caulibus, spinosis, fruticosa, ramis & folio hederaceo, paruo, non anguloso, à pediculo emittente pampinos: flore candido, olente lilium. Fert racemos labruscæ modo, non hederæ, colore rubro, cōplexa acinis maioribus nucleos ternos, minoribus singulos, nigros, durosq;: infausa omnibus sacris, & coronis, quoniâ sit ligubris, virgine eius nominis propter amorem iuuenis Croci mutata in hunc fruticem. Et mox. E Smilace sunt

Nomina

Lib. 4. c. 139.
Forma.

Locus.

Lib. 16. c. 35.

codicilli, propriūque materiæ est, vt admota auribus leuem somnū reddat. Quæ Plinius ex Theophrasto sumpsit, sic scribente: ἡ δὲ σμίλαξ ἐστὶ μὲν ἑπταυλόχαρπον. ὁ δὲ χαρπὸς ἀκανθώδης, καὶ ὡς περ ὀρθάκανθος (mendosa hæc, sic enim legenda. ἑπταλόχαυτος, ὁ δὲ καυλὸς ἀκανθώδης, καὶ ὡς περ ὀρθάκανθος.) τὸ δὲ φύλλον κιτρίδης, μακρὸν, ἐγώνιον, καὶ τὴν μίχην περισφυσιν, καὶ παχύτερον. ἴδιον δὲ ὅτι τὴν τε διὰ μέγρου τρινομήνην ὡς περ ῥάχιν λεπίην ἔχει, καὶ τὰς σημινύς διαλήψας (Rectius καὶ τὰς σημινύς διαλήψας) ἔκ ἀπὸ ταύτης, ὡς περ τὰ τῶν ἄλλων, ἄλλα πρὸς αὐτὴν περιφερῆς, ἡγμιφύας ἀπὸ τῆς περισφύσεως τῆς μίχρου τῶν φύλλων. παρὰ δὲ τὸν καυλὸν τὸν ἀτονον, καὶ παρὰ τὰς διαλήψας τὰς φυλλοκὰς, ἔκ τῶν αὐτῶν μυχῶν τοῖς φύλλοις παρὰ πύκνυν καυλὸς λεπτός, καὶ ἐλακτός, ἄνθος δὲ λευκόν, ἔρδιωδες ἥενον (Repone ex Plinio λευκόν τὸν δὲ χαρπὸν ἔχει περισσεμερῆ τῷ σπύρχνῳ, καὶ τῷ μηλόθρῳ, καὶ μάστιγι, τῇ χαλκιδιῇ σαφυλῇ ἀρείῃ, καὶ ἀκρέμασι οἱ δὲ οἱ βότρυες κίττοι τριόνοι, παρεγγύς δὲ μάλλον πρὸς τὴν σαφυλὴν, ἀπὸ γὰρ ἐνὸς σημείου οἱ μίχοι οἱ ῥαγικοί, ὁ δὲ χαρπὸς ἐρυθρός, ἔχων πυρήνας, δὲ μὲν ἐπίπαν δύο, ἐν τοῖς μετέσσι δὲ τρεῖς, ἐν τοῖς μακροῖς ἑνα, σκληρὸς δὲ ὁ πυρὴν εὐ μάλα, καὶ τῷ χρώματι μέλας ἔξωθεν. ἴδιον δὲ τῶν βοτρυῶν, ὅτι ἔκ παλαιῶν τὸν καυλὸν παρὰ θρυγγίσι, καὶ καὶ ἄκρον ὁμέγιτος βότρυς τῆς καυλῆς, ὡς περ ἐπὶ τῇ ῥάμνῳ, καὶ τῇ βάτῃ. τὸ τῷ δὲ διήλθεν ὡς καὶ ἀκρόχαρπον καὶ παλαιάχαρπον. mendosè pro παλαιόχαρπον, vel, παλαιόπλοχαρπον. Id est, Smilax caulibus suis sese aliis implicat, & obuoluit. Caulis eius spinosus, veluti rectos aculeos gerit. Folium hederaceum, oblongum, angulosum, quā pediculo annectitur, & latius. Propriū huic quod mediū ipsum neruus, spinæ tenuis modo secatur, & staminum diuisiones non ab ipsa spina, vt in aliis foliis, sed circa ipsam in orbem circumactas ducit ab ipso pediculi annexu. Ad caulem verò imbecillum, quā folia velut interstitio quodam ab ipso sciunguntur, ex eodē sinu enascitur cum foliis cauliculus gracilis & conuolutus: flos est albus, odoratus, liliū olens (Sic Plinius. Ex quo perspicuum est λευκὸν legisse, Gazam verò ἥενον, sicuti habent vulgata exemplaria: vertit enim, Verno proueniens tempore.) Fructus similis solano, aut melothro, & maximè viti siluestri, racemis vt hederæ pendentibus, propriū tamen ad vix figuram accedentibus: quoniam ab eodem puncto pediculi acinorum exeunt. Fructus ruber sapius quidem nucleos binos complexus,

SMILAX Aspera, Manth.



maior ternos, minimus singulos. Foris nigri sunt nuclei, & valde duri. Peculiare habent racemi, quod ex obliquo caulem sepiunt, & vnus omnium maximus est in summo caule, velut in rhamno, atque rubo. Vnde liquet Smilacem & in summo, & in latere fructiferā esse. Hactenus Theophrastus. Smilacem asperam esse plantam hîc depictam censent Herbarij, quæ, inquit Penna, non nisi montosis collibusq; feruidiorum tractuum, Romaniae, Hispaniae, Lingagothiae, prouenit. Vbi plurima horridis, aduncis, crebrisque spinis rubi ritu amplexatur proxima quæq; assurgitq; ultra supraq; parietes, & sepes vicinas. Folia hederacea, longiora, bryoniae nigrae ambitu, & superficie, non incisa, sed læuia, & in medio secundum strias neruulorum spinulas habentia, ex atro virentia. Fert acinos rubros racematim copiosos, ribes vulgaris magnitudine & modo: nec flores dissimiles ribes vtriusuis, racemosos, sed albos. Radices tamen si longius excurrant subter humum, ternis, aut quaternis vlnis longiores, non tantum tamen cum

cum Zarfa parilla similitudinis habent, quantum hactenus persuasum fuit doctis quibusdam, qui scripserunt Zarzam parillam, nihil aliud esse quam Smilacis asperæ radices. Quæ de re suo loco dicemus. Ab hac Smilace aspera, foliis, viticulis, spinosis, floribus, vuis, radice, viribus, deniq; natalibus differt Smilax læuis, ab Herba-

SMILAX Læuis, Anth.



riis vulgò dicta Volubilis maior, Italis *Viluchio maggiore*, Gallis *Liseron*, Germanis *Vuidenkraut*. Consentiant notæ omnes dempta collatione seminis huius, nigri & angulosi, cū lupino compresso & rotundo. Quare suspicatur Pena pro *ῥῆμα* legendum esse in Dioscoride nomē *ῥῆμα* ex Latino Græcum factum. Suspicionem augēt verba proximè sequentia, quæ neutiquam s. ite coherent, Semen veluti lupini, paruum, & nigrum. At semē lupini, nec parvū est, nec nig. ū. Non est igitur quod quis conuoluulū ieiiciat, inquit Pena. Est enim nō modo sarmentis viticeis, mollioribus, longissimis, & aptissimis ad fornicatas opacationes, sed etiam foliis læuibus, hederaceis, flore albo, orbiculato, radice longa, sparsa, flexuosa. His accedit antiqui & manuscripti Herbarij testimonium, qui Smilacem læuē, Volubilem maiorē interpretatur. Quidam aptius pro re ipsa, nescio an veriùs, at melius, legūt apud Dioscoridem, *χαρπὸν δι' ἔχιδ* ἐπὶ *φυλάκας, μέλανα, μακρόν*; alij verò, ἐπὶ τῷ *ῥῆμα*, id est, fructum nigrum & paruum habet, folliculi septo inclusum. Eius etiam p. ctura, Volubilem,

quam maiorem appellauimus, penitus exprimit. Smilacis asperæ folia, auctore Dioscoride, si antè & post bibantur, cōtra lethalia venena efficacia sunt. Tradunt si tritum ex his aliquid nuper in lucem edito infanti bibendum detur, nullum illi postea venenum nociturū. Conciditur etiam in Alexipharmaca. Smilacis læuis semen, eodem auctore, cum Dorycnio, & utrūq; trium obolorum pondere potum, somnia multa & turbulenta facere traditur. De vtriūsq; viribus hæc Plinius scripsit. Smilax quoque, quæ & Nicophoros cognominatur, similitudinem hederæ habet, tenuioribus foliis. Coronam ex eo factam impari foliorū numero, aiunt capitis doloribus mederi. Quidam duo genera Smilacis dixerunt. Alterum immortalitati proximum, in conuallibus opacis, scandentis in arbores, comantibus acinorum corymbis, contra venenata omnia efficacissimis, in tantum, vt acinorū succo infantibus instillato, nulla postea venena nocitura sint. Alterum genus culta amat, & in iis gignitur, nullius effectus. Illa est Smilax prior, cuius lignum ad aures sonare diximus. Galeno Milacis folia leniter acria gustu sunt, alioqui vrentibus calida: cui similes quodammodo vires Milax læuis obtinet. Empirici hodie succo Volubilis maioris ad calidos vtuntur affectus, capitis potissimum, & oculorum.

Li. 4. ca. 39.
Vires.

Li. 24. c. 10.

HELXINE CISSAMPELOS. CAP. X.


Hελίνη κισσάμπελος Græcis, Helxine Cissampelos Latinis nominatur, Arabibus *Asm*, vulgus Herbariorum & Officinæ Volubilem mediā, & vitealem appellant, Gallicè *Liseron de vigne*. Est autem dicta *ἡλξίνη* ἀπὸ τῆς ἑλκύν, quod significat trahere & arripere. Cissampelos autem, quod tum folio sit hederæ, tum viticea propagine. vicinis sese obuoluat, vnde

Nomina

HELXINE Cissampelos,
Marthioli.

Li. 4. ca. 35.
Forma.

Locus.



Cap. 274.
hiflor.

HELXINE Cissampelos,
Dodonai.

Lib. 3. ca. 33.
& Purg. 3.
cap. 6.



Vires.

Li. 6. simpl. nuncupatur, digerendi facultatem habet.

Conuoluuli nomen, & q̄ in vineis potissimum nascatur, vnde & Viteal's. Hæc, inquit Dioscorides, folia habet hederæ similia, minora tamen, ramulos exiguos, circumplectentes quodcunq; contigerint. Nascitur in sepibus, vineis, & frumento. Hæc, inquit Matth. satis declarât Helxinem Cissampelon eam esse quæ in aruis tū segetes ipsas, tū linū, tum legumina irretit, ac vincit, & in vineis, palis, ac vitibus circumuoluitur, quam Hetrusci *Viluchio minore* appellant, Tridentina rura *Minutola*, Recentiores Volubilem minorem, & Conuoluulum minus, Galli *Petit Liseron*, Germani *Kleyn Vuindekraut*. At Dodonæus & Lobellius Smilacis lævis speciem esse statuunt, & ad eam referunt. Ille Smilacem lævem minorem, hîc cum Pena Smilaci læui maiori subiungens, Conuoluulum minorem purpureum vocant. Maiorem Smilacem satis refert, sed humilior, tenerior, ac omnino minor est: tenues illi quoque & viticulosi cauliculi, quorum nonnulli humi repunt, alij herbas frugēsque scandunt, & crebris eas voluminibus vinciunt: folia oblongiora, hederaceis minora, mollia, ac læuia: flos similiter calathi figura, nonnihil odoratus, magna ex parte candidus, relucente tamen in eo diluto rubentis purpuræ colore, & radiantis stellæ effigie: semen exiguum, radices tenues, candidæ, velut prioris sparguntur. Helxinem vero Cissampelon Dodonæus, tum in Stirpium, tum in Purgantium Historia eam esse censet, quæ ad Smilacis lævis genus quoq; pertinet, & Conuoluulum nigrum, & Volubilis nigra dicitur, à Democrito in Geoponicis *μολδοκόκκιστος*, Latine Mollis hederæ, Officinis Volubilis media, Germanis *Schuuartz Vuindr*, & *Mittel Vuindr*. Huic prætenues multæ cirrorum instar subrubentes viticulæ, quibus fruticibus, & omnibus quæ contingit vicinis sese crebris circumuolutionibus implicat, ab imis ad summa proserpens: folia lata sunt, longa, acuminata, hederæ foliis molliora, tenuioraq;: flores exigui racematim coherant, candiduli, semen triangulare, nigrum, tenuibus & subrubentibus membranis, veluti glumis integitur: radix exigua brevisq; est. Iuxta sepes & sæpius

in vineis reperitur. Vindemiæ tempore semen perficitur. Pena & Lobellius Helxinem Cissampelon alteram Atriplicis effigie nominant. Foliorum succus, inquit Dioscorides, potu deicit aluum. Et Galenus, Helxine, quæ Cissampelos




OLVVLVM terrestrem plantam istam nominarunt Herbarij, quòd *Nemina*
flore Voluulo siue conuoluulo, siue volubili similem proferat, ter-
restrem, quòd caules perpetuò per humum spargat, nec conuoluulo-
rum more in proxima adminicula scandat. Radice est crassiuscula, nigricante, modicè fibrata, caulibus multis, sesquipedalibus, humi iacentibus, villosis, *Forma.*

VOLVVLVS Terrestris,
Dalechampij.



VOLVVLVS Ceruleus,
siue Cāpana Azura, Lobel.



cùm franguntur nullum lac emittentibus, quorundam Voluulorum modo, gustu subauferis: foliis longis, angustis, rugosis, non ita densis: flore Conuoluuli minoris, superiori capite descripti, è puniceo candicante, suauiter olète, ex decem veluti foliolis constante, sed quæ à sese minimè dis-iuncta sunt, verùm lineolis tantùm discreta, alioqui cohærentia. Prouenit in aridis, macris, sabulosis, apricis. Alius est Voluulus siue Conuoluulus hederaceus, siue ceruleus, omnium huius classis rarissimus & pulcherrimus, inquit Pena, nec nisi hortis Italiæ, Galliæ, Belgij notus, vti amœna purpura porrectis attextisque secus parietes, & perticas, longis viticulis, gracilibus, vmbacula concinnat, aspectu periucundus: visendus quoq; floribus è pediculorum calice exeuntibus, Vincæperuinæ colore similibus, in ambitu quinis prominentibus angulis, Nolæ caruleæ effigie: vnde Campana Lazura Italis dicitur. Folia ternis angulis singula, in teneriusculis pediculis Cyclaminū, hederamve annosam imitantia, nōnihil hirsuta: longa & gracilis radix. Nulla sui parte in vsum à

Locus.

Medicis assumitur. Serapio cap. 273. Granum Nil vocat, etiam ab Auicenna memoratum, & ita describit: Conuoluulo similem esse: flagellis duobus, aut tribus, applicare sese arboribus: virētibus ramis & foliis: purpureo flore, oblongo, calatho simili, ad exortū foliorum prodeunte: seminibus, flore delapso in suo capitulo tribus, nigris, leuibus, minoribus quàm Staphysagriæ: quæ huic plantæ conueniunt omnia. Dodonæus esse putat Ligustrum nigrum Columellæ. Alij, quod non est contemnendum, censent Virgilij, Columellæq; vnum ac idem Ligustrum esse, album Virgilio dictum à colore floris, nigrum Columellæ à colore fructus. Quidam Pothon ceruleum Theophrasti esse credunt, ornamento & vmbraulis sepulchrorum laudatū antiquitus. Alij Pothon illum esse malunt Cōuoluulum purpureum duplicè Cortusij, illustri viri, laudandique multis nominibus, caulibus prælongis sese vicinis perticis aduoluentem, in altero genere spinosis, in altero læuibus: folio lato, læui, minimè anguloso, in ea specie quæ caret spinis, prona parte candicante: flore eleganti purpura nitente: semine læui, nigro, splendido. Clusius Conuoluulum

Lib. 2. stir.
Hisp. c. 50.



alium peregrinum pinxit, qui vepribus atque fruticibus adnascitur, illisque aduoluitur, alioqui humi iacens, nec sese attollens, quod viticulis seu clauiculis sit infirmiorib⁹, gracilibus, pedali⁹ aut cubitalibus, subhirsutis. Folia illi hederæ, siue althææ minora,

incana, per ambitum crispa, nonnunquam serrata, & nonnihil laciniata, gustatugumosa, subacria, & subamara. Flores ex alarum sinu promittunt, longis pediculis hærentes, conuoluuli floribus similes, qui ita complicantur, ut pluribus foliis constare videantur, ex purpureo candicantes, interdum omnino purpurascens. Radix tenuis, exilis, fusca, per summos cespites repit, & alias plantas producit. In collibus iuxta Tagum lato solo, in Baetica, plurimisque aliis Hispaniæ locis frequentem esse ait, florereque Martio & Aprili. Ad quam stirpem à veteribus descriptam referri possit, ignorat, nisi fortè lasionem, cuius meminit Plinius, esse quis existimet. Valentini Conuoluulum folio althææ, Hispani vulgari nomine *Campanilla*, id est, Campanulam, Lusitani *Verdezilla* vocant, & ad vulnera curanda efficacissimam esse aiunt.

CONVOLVULVS Minimus, Clusij.




Conuoluulum peregrinum Clusij vocat Lobellius, & Conuoluulū Scammonij facie, Helxinē Cissampelō Dioscoridis. Aliam huic congenerem idem Clusius pinxit, quæ ad Voluulum terrestrem Dalechampi videtur accedere.

Constat multis tenuibus iunctisque ramulis, ex eadem radice prodeuntibus, humi procumbentibus, pedali aut cubitali longitudine, duris, flexilibus tamen, & lanuginosis, qui in summo aliquot flores proferunt purpurascens, inodoros, superiori similes, minores tamen, unico folio constantes, sed ita implicato, ut quinque constare videatur, foris margine in totidem angulos prominente: folia per ramulos nullo ordine sparsa, oblonga, angusta, tenui lanugine obducta, salicis foliis haud absimilia, gustu gummosa, & aliquantulum amara: radix candicans, singularis, perennis, infima parte ramosa. Nascitur iisdem quibus superior locis, atque etiam in Gallia Narbonensi. Sunt qui Camtabricam Plinij esse putent. Conuoluulum minimum spicafolium vocant Pena & Lobellius, cuius effigies minus scitè expressa est apud Penam, Scammonium tenue Plinij quorundam.

PEPIKAYMENON Græcis, Periclymenum Latinis, Scribonio Sylva: *Nomina*
 mater, Græcis hodiernis *περιπλοχόδα*, vulgò, Officinis & Herbariis Ca-
 prifolium, Matriflylua, Volucrum maius, & Lilium inter spinas, Italis
Vincibosco, Germanis *Geyshblatt*, & *Speckgilgen*, Gallis *Cheurefeuil*. Periclymenum autem
 dictum, quòd circumuoluendo ad se vicinas arbores aut frutices vocet, & ab Italis
Vincibosco, quòd vicinas plantas vinciat. Periclymenum, vt describit Dioscorides, *Lib. 4. c. 15.*
 simplex frutex est, ex interuallis folia spargens ipsum amplectentia, subcandida, *Forma.*
 hederæ similia: iuxta folia erumpunt germina, in quibus est semen hederæ simile,
 flos albus, fabæ similis, subrotundus, quasi in folium procumbens: semen durum
 ægre euellitur: radix crassa, rotunda. Oribasius, qui stirpium delineationes ex Diof-
 coride transcripsit, sic depingit. Periclymenum frutex paruus est, simplex, caule
 quadrato, per interualla foliolis circumdato, albicantibus, hederæ figura. Inter fo-
 lia furculi exeunt, in quibus fructus est hederæ similis, qui quasi in folium procum-
 bit, durus, & qui difficulter auellitur: radix longa. Oritur in aruis & sepibus, sese
 fruticibus adstantibus inuoluens. Eodem ferè modo Plinius. Periclymenos fruti- *Lib. 27. c. 12.*
 cat & ipsa, ex interuallo duo folia habens, subcandida, mollia: in cacumine autem
 semen inter folia durum, & quod difficulter euellitur. Nascitur in aruis ac sepibus,
 conuoluens sese adminiculis quibuscunq̃. Hanc Periclymenon Officinarum esse
 Caprifolium, & Herbariorum Matriflyluam censent peritiquibus minimè placet
 eorum opinio, qui hanc in dubium reuocant, negantq̃ esse Periclymenū, quia ra-
 dicem non habeat *παχέαν*, *περιεφερή*, vt ait Dioscorides, id est, crassam, rotundam.
 At *τρογγύλον* is non dixit, nempe orbiculatam, siue tuberosam, sed *περιεφερή*, id est,
 rotundam, non angulosam. Alij locum corruptum esse censent, atque ex Crateua
 & Oribasio restituunt, *παχέαν καὶ μακράν*, id est, crassam & longam, vt iam omnis
 dubitandi & rixandi occasio sublata sit. Sed in hoc frutice duplex obseruatur va-

PERICLYMENVM
perfoliatum.



rietas foliorum, vt annotauit Pena. Nam folium
 Italicè & Narbonensis vulgationis furculis vnū
 cū sit, ac continuum, gemini tamen speciem
 præbet, quasi vmbilico medio traiectum, vt in
 Centaurio luteo, Perfoliata, & Tithymalo fer-
 rato: ideoque Periclymenum perfoliatum di-
 ctum, quasi pertusum aut perforatum. Extremo
 verò cacumine viticularum folium acetabuli
 forma vel vmbilici circumatum, florum delicias
 continet, ex purpura niueo candore nitentes,
 & alicubi luteo asperfas, sensim in longitudinē
 porrectas, quasi promuscides elephantorum,
 aut lagenulas, floribus fabaceis figura multū
 similes: semine rotundo, coccineo, bryoniæ,
 succuléto. Istud Dalechampsius Periclymenum
 grandius vocat. In septentrionalibus verò re-
 gionibus, vt in Germania, Gallia, Anglia, Bel-
 gio, frequentius vsitatiúsque est Periclymenum
 non perfoliatum. Longis, tenuibus, lignosis, &
 in ramulos diuisis sursum repit cauliculis, circa
 quæ ex interuallis folia bina ex aduerso sita, ob-
 longa, mollia, dilutè virentia, infernè magis ca-
 nescentia, non continua, nec à cauliculis pertu-
 sa: flores

Pena In
 Aduers.

PERICLYMENVM,

non perfoliatum, Lobellij.

Tempus,

Vires &
Temper.

Lib. 4. c. 13,



sa: flores in summis ramulis multi pariter emicant, oblongi, candidi, suave olētes, interius caui, vna parte prominētiore, staminibus aliquot ē medio exeuntibus fructus acinis similis in exiguarum vuarum modum compactus per maturitatem rubet, in quo semen duriusculum: radix lignosa cum multis adnatis. Periclymenum Iunio & Iulio mensibus floret: semen Augusto & Septembri maturum est. Id postquam maturuit collectum & in vmbra siccātū datur Dioscoride auctore, drachmę pondere in vino quadraginta diebus, vt lienem minuāt absumatq; & lassitudinem discutiāt. Orthopnœæ & singultui prodest. Vrinam cit à sexto die cruetam. Partum accelerat. Habent easdem vires & folia, quę triginta septem diebus pota sterilitatem facere putantur. In periodicis febribus cum oleo inuncta, earum horrores mitigant. Quod interpretes verterunt, sterilitatem facere putantur, Gręcē legitur *Ἐργὼν ρίσοφείτω ποτὶν*, quod est interprete And. Lacuna, Impotentes facere viros ipsos produntur. Sterilitas enim, inquit, defectus est scēminarum, quas *ἀδύκας* perpetuo

vocat Dioscorides, dum ipsis notam sterilitatis inurit: quemadmodum *ἀδύκια* medicamenta omnia illa, quę vim concipiendi adimunt. E diuerso autem solet vocare *ἄργινος* eos viros, qui prolifico sunt semine destituti, aut illud adeo frigidum, languidum, inefficax quę habent, vt ex eo neutiquam gigni animal possit. Hanc verò Periclymeni facultatem Plinius ad Clymenum retulit. Cum enim Clymenum descripsisset, subiungit. Quibus morbis pota medeatur, dicemus. Sed hīc indicandum est dum medetur, sterilitatem potu etiam viris fieri. Qua in re Theophrastum Plinius scutus est scribentem. *Ἀδύωται δὲ φάσι γεννᾶν, καὶ ἐάν τις τῶ κλυμένω τὸν χαρπὶν πᾶν τὴν σιωχῶς ῥιζόκον (ἡμέρας ἐν οἶνω λαβὼς, συλλέξας ὅσον χόνιν χατὸ ἴσον ἀν' ἐκαστὴν ἡμέραν. ἐάν ᾧ ἐκλεῖσθαι τὴν πόσιν, ἀργεῖν τὸ ὄν.* Id est, Gignere nequaquam posse aiunt eum qui Clymeni fructum biberit continuo triginta diebus in vino albo, collectum sextarij mensura, æqualibus quotidie portionibus, hac enim portione absoluta penitus sterilem fieri hominem aiunt. Alias Periclymeni vires tradit Plinius parum à Dioscoride dissidens. Semen eius in vmbra siccatum tunditur, & in pastillos digeritur. Hi resoluti dantur in vini albi cyathis tribus, tricenis diebus ad lienem, eumq; vrina cruenta, aut per aluum absumit. Quod intelligitur à decimo statim die. Vrinā cient & folia decocta, quę & orthopnoicis prosunt. Partum quoque adiuuant, secundasque pellunt pota simili modo. Galenus Periclymeni tum fructus, tum folia, inquit, adeo vehementer incidentis & excalfacientis sunt facultatis, vt si plusculum bibantur, vrinam sanguinolentam efficiant, principio quidem vrinam duntaxat mouentia. Porro foris cum oleo illita excalfaciunt. Iuuant lienosos & difficulter spirantes. Competens portionis mensura est drachmę vnus cum vino. Porro desiccet quoque semen: & quidam aiunt si copiosis bibatur, sterilitatem bibentibus adferre. Sed & sunt qui certum dierum numerum ad talem portionem præfīnīunt, vt Dioscorides, qui septem & triginta dies eos tradi refert. Hīc etiam vrinam cruentam reddi à sexto die memorat. Matris silua, inquit Fuchs-

sus, cum gustu acrimoniā prę se ferat, omnia quę veteres Periclymeno tribuunt præstat.

præstat. Quibus accedit quod recentiores Herbarij suo Caprifolio easdem vires assignent. Exsiccare enim ipsum tradunt vlcera humida & fordida: sanare impetigines, & alias cutis scæditates, lienem absumere, difficultati spirandi conferre, partus celeritatem facere, calculos pellere, faciei maculas abstergere.

CUCUBALVS PLINII, siue Ocimoides repens. CAP. XIII.

PLANTAM istam Cucubalum esse Plinij siue Cacubulū quasi maleficum, quidam esse arbitrantur, quam alio nomine, inquit, Strumum appellant, alij Græcè Strychnum ob foliorum cum Solano similitudinem. Est Cyclaminus altera Luca Ghini, Clusij Alfine repens, aliis Ocimoides repens. Nasçitur in sepibus radice cådida, crassa, ramosa: flagellis multis in vicina adminicula scandentibus: foliis Ocimi vel Solani, in ambitu minime diuisis, candicantibus, per intervalla semper geminis: flore candido, quinque foliolis constante, per medium fisis: baccis rotundis, nigris, fructui Solani similibus, quas foliola quinque herbacea sustinent & amplectuntur, scætidī & ingratisimi saporis. Sunt qui hanc Clymenum herbam esse putent à Plinio descriptam foliis hederæ, ramosam, caule inani, articulis præcinctam, odore graui, & semine hederæ, siluestribus & montosis nascentem. Alij Cucubalum Plinij Solanum hortense

Lib.27.c.8.

Locus.

Forma.

Lib.25.c.7.

CUCUBALVS,
Plinij.

OCIMOIDES Repens,
Polygoni folio.



Græcorum esse credunt, nimirum cuius acini nigricant, quòd in quibusdam Dioscoridis exemplaribus legerunt, Solanum hortense à Romanis Strumum & Cucubalum vocari. Sed hæc & permulta alia huiusmodi notha esse, & Dioscoridi falso adscripta, à viris doctis dudum obseruatum fuit. Præterea cùm Plinius aliis locis de Solano tractarit, credibile non est eum in vulgarissimæ herbæ cognitione lapsum fuisse. Cucubali folia trita cum aceto scribit Plinius serpentum ictibus & scorpiorum mederi. Quidam hanc alio nomine Strumum appellant, alij Græcè Strychnum. Acinos habet nigros. Ex his cyathus succi cum mulsi duobus medetur lumbis:

Vires.

Lib.27.c.8.

bis:

bis: item capitis doloribus cum rosaceo infusus. Ipsa strumis illita. Aliud Ocimoides repens polygoni folio pictum dedit Lobellius, quod, ut describit Pena, è cauliculis gracilibus, genicularis reptantibus, teneris, flexuosis, Asines maioris folia profert bina iuxta genicula, oleæ siluestris, myrti, aut polygoni similia, sed paulo latiora: flores in caliculis oblongis, saponariæ concoloribus, multò minoribus: radicem exilem. In Taurinensium ad Padum collibus umbrosis & siluosis & iuxta sepes frequens oritur, atque etiam in Veginij herbidis & umbrosis marginibus, secus riuulos è saxorum commissuris.

I E S E M I N V M,

CAP. XIII.

Nomina

Cap. 176.

Genera

Forma.

ARABES vernacula lingua *Zambach* & *Sambach* appellant auctore Serapione, & Græcos imitari volentes Iesemin, à Iasme Græco nomine, quod violaceum significat. Qui cum Gelsemini siue Iasmini (sic enim plantam istam nominamus, Itali *Gelsimino*, Galli *Iosemin* & *Iasmin*, Recentiores quidam *Apiariam*, quod apes eius floribus plurimum delectentur) flores odoratos, albicantes albæ violæ modo conspicerent, ipsi violæ nomen indidere, quod est Iesemin Huius tria genera Serapio esse tradit. Vnum cui flos albus, alterum cui luteus, tertium cui cæruleus. Quartum adiecit Dalechampius flore puniceo. Ioseminum planta est pergularum ornamentis aptissima, & quæ industria & pedamentis ad fornices concinnè erigitur, à radice prolixissima fundens virgulta octo vel decem cubitorum longitudine, flexilia, viridia, ex quibus folia prodeunt, fere semper septena, ex atro virentia, mollia, oblonga, in mucronem sensim desinentia, superne acutiora quam lentisci, toto ambitu minimè crenata. Flores in virgultorum summitate racematim prodeunt, oblongi, suauiter olentes, albi, ex quibus rarissime semen oritur, in quibusdam tamen locis edere lupino si-

I A S M I N V M Album,
Mathioli.

P O T H O S Cæruleus,
Mathioli.



mile scribit Matthiolus, quod à Cortuso ad se missum fuisse ait. Calidos & amœ-
nos tractus amat, passimq; habetur in hortis & viridariis. Flores Iulio & Augu-
sto profert. De Iasmino luteo tractauimus in libro de iis quæ in asperis nascun-
tur. Tertium genus quibusdam Pothos Theophrasti purpureo flore, Clematis pe-
regrina carulea & purpurea Penæ & Lobellij, Clematis altera Matthiolo & Do-
donæo & in Stirpium, & in Purgantium, Historia. Prolixis admodum, tenuibus,
genicularis & subrubentibus sarmentis, per arbores, frutices, perticas, pergulas, pe-
damenta scandendo in altum proræpit. Folia multa, prioris flammulæ modo diui-
sa, sed tamen maiora latioraq; . Flores elegantes è tenuibus & longis dependent
pediculis, expansis quaternis ex aduerso sitis foliolis constantes, sæpe carulei,
quandóque purpurei, staminibus aliquot mediis: semina plana, rotunda, lata,
acuminata in globulum congeruntur. Radices proluxæ, tenues, in omnem par-
tem sparguntur. In hortis colitur, nec vspiam alibi se vidisse Pena refert. Quare
Dodonæo imposuerunt, qui in Anglia iuxta sepes & agrorum margines sponte
prouenire persuaferunt. Plantam istam quidam inter Iosmini genera numerant.
Sed cum nec foliorum figura, nec positus, nec floris species Iasmino quadret, hanc
ab illo diuersam esse multi credunt. Quartum Iosmini genus numerari potest,

In cap. 66.
lib. 1.

Locus.

Tempus.

Lib. 3, c. 48.

In Aduers.

IASMINVM Puniceum,
Dalechampiij.



quod Galli *Iosmin rouge*, & *Iosmin large* appel-
lant propter floris & colorem & amplitudi-
nem. E' Chio insula planta Genuum primùm
aduecta, inde Lugdunum, fruticat recto proce-
ròque caudice, sambuco non dissimili, fungoso,
laui, non admodum crasso, eius cortice ima
parte rugoso, ramorum viridi & tenui. Flagellis
multis luxuriat in cameras & pergulas horto-
rum scandentibus. Folia in ramulis alarum mo-
do expansis septena aut nouena, ordine ex ad-
uerso sita, extremo quod impar est longo, acu-
to, mollitamen cuspide, nec pungente, cæteris
breuioribus & rotundioribus quàm in Iasmino
albo, crassis, nigricantibus, minimè incis: flore
priusquàm dehiscat purpureo, cum reclusus
est, intus candicante, foris verò purpurascenti-
bus foliolis duobus, qui priusquàm hiaret, flo-
rem candidum contegebant, quàm in albo la-
tiore, ampliore, venosiore. Qui Byzantium
profecti sunt, affirmant plátam hanc in eo tra-
ctu, & multis Peloponnesi locis, à Græcis &
Turcis coli studiosissimè, & vbiuis in hortis
spectari. Sunt docti Herbarij, qui Pothon albû,

à Theophrasto memoratā inter coronarios æstiuos flores, Iasminum esse putant: Lib. 6. hist.
cæruleum verò, plantam à nobis demonstratam, & explicatam suprà ad finem ca-
pituli vndecimi. *ἔτι δὲ ὁ πῶτος χαλκόμενος, οὗτος δὲ ἐστὶ διττός, ὁ μὲν ἔχει τὸ ἄνθος ὅμοιον τῷ*
ἰακίνθῳ. ὁ δὲ ἕτερος ἀχρὺς, λευκός, ὃ χροῖνται περὶ τὰς τάφους, καὶ χροιώτερος οὗτος. Quæ
Plinius sic interpretatus est. Sed maximè spectabilis Pothos. (Desiderium vertit
Gaza) Duo genera huius. Vnum cui flos hyacinthi est: alterum candidius, qui
ferè nascitur in tumulis. (Rectius dixisset, quo circa sepulcra vtebantur, nimirum
prope ea ferentes, vt eius vaga fronde contegerentur, deciduisque floribus con-
spargerentur: id enim apud veteres in religione positum fuit, vt vita defunctorum

Lib. 6. hist.
cap. 7.

*Vires &
Temper.*

Lib. I. c. 66.

busta, & sepulcra, manesque floribus & coronis ornarentur.) quoniam diuturnior est. Diutius florescentem Theophrastus intellexit ac viuaciorem, quia quotannis non moriatur, vt cœruleus. Pothon priorem vulgare Iasminum floribus albis, quod dixi, plerique esse credunt. Alterum suprà descriptum, flore hyacintho simili, cœruleo, venustissimo: Iasminum album sicut odore fragrat, ita & viribus multis pollet. Serapio tradit calidum esse in principio secundi gradus, humores discutere, aduersus phlegma salsum valere, senibus frigidis vtile esse, doloribus à pituita viscida ortis & catarrhis prodesse: folia eius tam humida quàm sicca impetigines & lentigines abstergere: dolorem capitis facere iis qui calida sunt temperie. Ex floribus paratum oleum frigidis affectibus confert. Ex iisdem vnguentarij oleum conficiunt, quod Zambacinum siue Sambacinum vocatur, cum amygdalino oleo hominum barbæ odoris tantum gratia affundendum, quod tamen temperie calidis caput adeo exalfacit, vt quandoque sanguinem è naribus eliciat. Flores, Iasmini cum amygdalis dulcibus tamdiu & toties commiscant, quousque eorum humore odorato illæ imbutæ fuerint. Tundunt deinde eas in mortario lapideo, & calidas sacculo conclusas prelo committunt, vnde oleum exprimitur perquam odoratum. Sunt qui vtrumque similitudine decepti Sambacinum oleum & Sambucinum à Sambuco dictum idem esse falsò credunt. Dioscorides apud Persas Iasminum oleum fieri prodidit ex albis floribus Leucoij, quod inter epulandum odoris gratia vsurpabatur. Vnguentum hoc ex ea viola compositum intelligit Hermolaus, quæ vulgò Gelseminum vocatur, distinctiones & arundineos parietes in hortis opere topiario conuestiens. Nec de vllò alio violarum genere Iasminum Dioscoridis vnguentum intelligit Marcellus, Vergilius, quàm de vulgari Gelsemino: cuius vnum genus cum sit flore caruleo, quartum id violarum esse genus colore caruleo à Dioscoride traditum is autumat. Quorum sententia ab omnibus doctis hodie improbat. Nam Gelseminum viticulis, foliis, ramulis, flore, radicibus, totius denique plantæ habitu ab omni Leucoio differt. Præterea Iasminum vnguentum ex Gelsemini flore quod cœruleum Leucoium Dioscoridis Marcellus esse vult, non fit, sed *τὸν ἀνθὼν τὸν λευκὸν τῆς ἰσ.* id est, ex floribus albis violæ. Ad hæc Iasminum grauius spirat Dioscoridi, quàm vt libenter à plerisque recipiatur, quod demonstrat ex nostro Ielsemino non fieri. Postremò Serapio Dioscoridis interpres, alterum ab altero diuersis capitibus distinxit, & seorsum de vtriusque tanquam de diuersis disseruit. Probabilius est quod existimant attentiores herbarij, vnguentum id parari ex Albæ violæ floribus, qui inter omnia *τὸν λευκοῖον* genera iucundissimi & validissimi sunt odoris, vt suauitate & vehementia rubras, puniceas, cœruleas violas longè superent.

DE IASMINO RUBRO, Dalechampij.

CAP. XV.



QVAM plantam Iasminum rubrum vocant herbarij, in hortis colunt ac serunt olitores, floris gratia pulchritudineque inuitati. Radice ea nititur crassa, longa, carnosâ, fibrosâ, inæquali ac verrucosâ, foris nigra, intus alba, cum manditur, sapore acri. Caulis ad altitudinem propè hominis surgit, iuxta radicem scabro & ruffo cortice tectus, suprà herbaceo, ac virenti, malux instar, quadrangulus, canaliculatus, medulla candida farctus, statim nodosus, nodis alternatim & sigillatim protuberantibus, non ex aduerso, alarum modo, sitis. E singulis nodis rami pro

DE IASMINO Rubro,
Dalechampij.



nescente caule , addito stercore munitam , perferre hyemem aiunt , vèrequè repullulascere.

mi prode unt, bicubitales, quadranguli caulis modo, atque medulla pleni, canaliculo exculpro striati, nodis per intervalla ad cacumen vsque prominentibus, è quibus minores furculi nascuntur. Folia Amaranthi purpurei, aut Bliti, sed in extremo acutiora, ordine sic digesta, vt perpetuò inuicem bina opponantur, neruo per media porrecto, venis hinc illinc ad medium neruum distentis, velà neruo ad extremam oram folij pertinentibus: in summo fastigio, quà flos exoritur, sena, ampliora nempe duo, minora quatuor: saporis principio fatui, deinde acris. Flos coccineus, coloris nitidissimi, Periclymeno similis, angustus infernè, suprà latiusculus, apicibus exantibus insignis, è quatuor decussatis granis emicat, compressis, quibus, delapso flore, semen continetur, rotundum, nigrum. Quod è sapore iudicare licet, aquosa & humida est quædam eius portio: ignea verò, calidâque, & sicca altera, quæ discutere valenter possit tumores frigidos. Alias eius facultates nondum cognitæ esse intellexi, aut proditas. Senescente caule, addito stercore munitam, perferre hyemem aiunt, vèrequè repullulascere.

CLEMATIS ALTERA BAETICA,

CAP. XVI.



EREGRINVM herbæ genus Clusij industria nacta est posteritas, quod sarmentum longa, lenta & ramosa habet, quæ binos per intervalla capreolos contrariis semper inter se pediculis nascentes proferunt, quibus per vicinas arbores & frutices scandit: folia pyri ferè, minora, dura, viridia, & per ambitum incisa siue serrata, sapore acri & feruido, singula in singulis pediculis, sed plurima simul ex clauicula- rum alis prodeuntia: inter quæ ex vtroque sarmentorum latere pediculi exeunt calyculum sustinentes vt in tithymalis, ex cuius medio capitulum eminet è multis seminibus milio similibus congestum, quibus insident oblongi cincinnati, villosâq; veluti plumulæ albæ. Hanc primùm se inuenisse ait Clusius inter Asindum (vulgò Medina Sidonia) & Calpen secundum fluentia, vicinas arbusculas operientem, & pondere suo deprimentem: deinde aliis Bætica locis, Ianuario iam suos cincinnos explicantem. Censet ad Clematida, cuius meminit Dioscorides, referendam esse, quia illi admodum similis est cùm forma, tum temperamento. Huic adiungenda Clematis altera minor, longifolia Lobellij, cui folia sunt flammulæ, siue Clematidis albæ, multò longiora, ex aduerso bina. Cubitales & bicubitales cauliculos humi spargit. Semen,

Forma.

Locus.

Lib.4.

CLEMATIS *Batica*,*Cusij.**CLEMATIS* *Altera minor**longifolia*, *Lobellij.*

radix, cæteroque facies non diuerfa à Clematide vulgari. Hanc quidam Cly-
menum esse arbitrantur.

HISTO



HISTORIAE OMNIVM PLANTARVM

LIBER DECIMVS-

QVARTVS,

*In quo omnes Cardui & alia spinosa aculeataq; planta describuntur,
& ad vinum depinguntur.*

SPINOSARVM PLANTARVM DIFFERENTIAE.
CAP. I.



ONCE diuerſam à ſuperioribus plantarum differentiam proſequimur, eamque admodum conſpicuam, vt pote quæ nobis inuitis ſe prodat, nec inultos abire ſinat eos qui paulò imprudentiùs plantas huius claſſis vel colligant, vel cõreſcent. Hac differentia plantæ multæ ab aliis, ſpinis, ſentibus, aculeis, muricibus, echinis diſcrepant. Eâdem ſpinofarum ſiue aculeatarum caulibus, ſurculis, foliis, flore, fructu, carduorum & acanaceorum genus conſtituitur. Spina vocatur, quod prætenue in durum mucronem occal-

Ruell. lib.
1. cap. 1.

Spina.

Sentis.

Aculeus.

Echinus.

Murex.

luit, ſic vt vellicet, vel ſtimulo quodam laceſſat, non aliter quàm ſi quamprimùm à tangentibus ſentiat, ſentis conſuevit nominari. Aculei, quæcunque duriuſcula in cuſpidem turbinata punſtionem inſigunt ſpiculorum modo. Quicquid numeroſa congerie aculeorum ſtipatur, ſiue tegmen, ſiue caput, ſiue cacumen, echinus eſt, ſic dictus quòd globoſo ſpinarum agmine marinum echinum ſiue erinaceum imitetur. Nec longè ſecùs murer paucioribus ſauit aculeis. In iſtis autem producendis tantus fuit, & ſic prodigus, vt ita dicam, naturæ luxus, vt iſpſis etiam veteribus tam difficile fuerit omnes earum differentias noſſe, quàm accuratè eas deſcribere, & notis inter ſe diſcernere. Nobis verò qui multò plures ſpinofas plantas & carduos diligenti herbariorum conquiſitione notiores, quàm de eorum leſtione habemus, & quibus hodie cardui innotuerunt longè admirabiliores noſtratibus, nuſquam à veteribus memorati, longè difficilior fuerit ex obſcuris iſporum delineationibus priſca nomina paſſim obuiis accommodare, qualia ſunt polyacanthos, onopyxos, myacanthos, tetralix, chalcios, leimonia, &c. atque iis quæ nominibus carent propria ponere. Præterea cùm inter ſeſe diſſidentes herbarij eandem plantam variis nominibus designarint, de hac controuerſia iudicare arduum fuerit. Quare vt plantarum iſtius generis cognitionem capere poſſimus, primùm operæpretium eſt iſpas exquiſitè nouiſſe: deinde eas quæ ad veterum cognitionem referri, & priſcorum nominibus nuncupari poſſunt, ita expendere, alias ab iis aut præteritis, aut ignotas neutiquàm omittere, ſed & tum accuratis deſcriptionibus, tum aptè cõſectis appellationibus indicare. Quod vt rectè fiat, primùm iſparum diuiſionem vniuerſe ponemus ex Theophraſto, deinde ſingulorũ tractatione aggrediemur. *Αγρωδάμ* igitur, id eſt, ſpinofa ſiue aculeata Theophraſto ſunt,

Lib. 6. hiſt.
cap. 3.

ἡ μὲν ἀκνῆθωλη ὅλως, id est, in totum spinosa, alia non in totum. In totum spinosa, Corrua, Scorpio. Non in totum spinosa sunt φυλλάκηθη, id est, quæ folia omni ex parte sic in spinas diuisa habent, vt tangenti præter spinas vndique nihil occurrat, vt acorna, drypis, acanacea, spinosa foliata Gaza vertit. Alia εἰς ὄξυ ποροῖσσι, καὶ παραγωνίζουσι, id est, mucronatur, & habent latera angulose dissecta, vt smilax, phellodrys, ilexin acutū producta, & in angulum depressa Gaza interpretatus est. Alia εἰς ὄξυ ποροῖσσι, καὶ μὴ παραγωνίζουσι, vt ruscus, hippoglossum. Alia sunt ἀκνῆθωλη ἐκ τῶν ἀκρων, καὶ περιονώλη, καὶ εὐθιγίς, id est, mucronata, & infecta pectinum modo, vt abies, pinus, picea, cedrus, iuniperus. Alia παρακνῆθίζοντα ἐκ τοῦ ἀκρου καὶ πλάγιον, id est, quæ spina foliis addita (id enim παρὰ significat) & mucrone pungunt & lateribus, vt ilex, phellodrys, smilax, agria, Gaza reddidit quæ cū extremo tum lateribus sinuata cōcidunt. Alia παρὰ τὴν ἀκάνθαν φύλλον ἔχοντα, id est, præter folium minimè spinosum aculeis horrentia, vt rhamnus, tribulus, ononis, stæbe. Gaza non rectè reddidit, quæ iuxta aculeum folium gerunt, cū præter aculeum dicere debuisset. Alia ἐκ τῶν θυμῶν ἀκάνθαν ἔχοντα καὶ φύλλον ἐπακάνθισεν, id est, spinas caulibus enascentes habentia, foliumq; insuper aculeatum: hoc enim ἐπὶ significat, vt capparis Aegyptia Gaza reddidit quæ non solum caulem aculeatum, sed etiam folium habent hispidum. Quæδā ὀρθοάκανθα, id est, arrectis spinis muricata, vt smilax, quædā voce ex superiore conficta καμπυλάκανθα dicta, id est, vncinatis arcuatisq; spinis armata. Quæ Plinius sic expressit. Spinosa rum multæ species. In totum spina est asparagus, scorpio: nullum enim folium habent. Quædā spinosa foliata sunt, vt carduus, eryngium, glycyrrhizon, vrtica: iis enim omnibus foliis inest aculeata mordacitas. Aliqua & secundum spinam habent folium, vt tribulus, ononis, phleas, quod aliqui stæbē appellauēre: hippophaes spinis angulosis. Quædam in folio habent, & in caule, vt Capparis. Tribulo (non tribula, vt vulgati codices habent) proprietas, quod & fructum spinosum habet. Hæc Plinius ex Theophrasto, corrigēda, vt adnotauimus. At nos de spinosis omnibus hīc dicere non instituimus. Quædam enim superioribus libris sparsim sui similibus coniunctæ sunt, aliæ hīc explicabuntur, potissimum cardui & acanacea, à vulgarioribus & notioribus ad alia minùs nota progrediendo.

SCOLYMVS, CACTVS, CYNARA, CAP. 11.

Nomina



ΚΟΛΥΜΟΝ Græcorum, Latini Carduum interpretantur generatim. κινάρεον autem à quibusdam per i, scriptam teste Galeno, ab aliis per ypsilon, quidam corrupta voce Artiocum, alij Alcocalum vocant, nunc vulgus herbariorum Artiocalum, Arabes Raxos, Harxos, Germani Strobildorn, Itali Artiococa, Carcioffo, Hispani Cardo de comer, Alexander Trallianus ἀρτυλικὴν, Galli Artichaut. Cynaræ nomen dedit puella eiusdem nominis, quam in hanc herbam conuersam fuisse fabulantur. Sunt qui à cinere dictam velint, quo, vt Columella & Palladius aiunt, lætatur. Hoc etymū Græcos nomē id à Latinis mutuo sumpsisse indicat, tametsi contra huius vocabuli notionem, ex Græcia venisse in Latium vetustissimi quique Græci tum Poetæ tum oratores demonstrent, qui apud Athenæum cynaræ spinæ meminerūt, Sophocles, Hecataeus Milesius, Callimachus, & alij. Sunt qui potius à cane dictam malunt κύναραν, quòd Apollinem consulenti Locro redditū est oraculum, urbem ibi conderet, vbi ligno cane morderetur, tandem in crure cynara vulneratus, oppidum cōstruxit. Sed Didymus apud Athenæum Cynosbaton potius, id est, canis sentem intellexit. Dioscorides de scolymo tātum egit, de cynara minimè. Verūm ne ambiguitate significationis deceptus lector vel hallucinetur, vel fluctuet, hīc monendus, Scolymum Dioscoridis, aliū esse quàm Theophrasti: amboque Plinium confudisse his verbis: Syluestrium genera sunt duo: vnum fruticosius

Lib. 1.

Lib. 3. cap. 14.

Genera.

Lib. 20. c. 23.

fruticosus à terra statim (Scolymus est Theophrasti) alterum vnicauale, crassius (Scolymus Dioscoridis iudicatur) vtrique folia pauca, spinosa, muricatis acuminibus: sed alter (nempe Dioscoridis: nam alterius luteus flos est:) florem purpureum mittit inter medios aculeos, celeriter canescentem, & abeunt cum aura.

Scolymum Græci vocant. Idem cum tradit Orientem Scolymum quoque in cibos recipere, & alio nomine Limonium vocare, fruticem nunquam cubitali altior, cristisque foliorum, ac radice nigra, sed dulci, Eratostheni quoque laudata in pauperis cœna, &c. de Scolymo Theophrasti illa sunt intelligenda, quamvis quod subiungit emedullatæ radicis vnciam vnam graueolentiam alarum emendare, & vitium id ex alis per vrinam effluere, petium sit ex Dioscoride. Quod verò ibidem alio loco tradit, Scolymum quoque vocari Limonium, apud Theophr. legisse videtur *σκόλυμος, ὃς καὶ λεμονία*, cum tamen illic apertissime Leimonia Cardui genus à Scolymo discernatur. His ita distinctis prius Scolymum Dioscoridis proponamus, deinde alterum Theophrasti. Scolymus Dioscoridi folia Chamæleonis habet, aut eius plantæ quam albam spinam vocant, nigriora, crassiora: longum caulem edit, foliis vndiq; plenum, cui spinosum caput inest: radix nigra, & crassa, cuius vis vtilis est iis quorum alæ & reliquum corpus grauius olent, si illinatur, (Cornarius pro *καὶ ἐπεὶ αὐτὴν*, id est illita, legit *καὶ ἐπεὶ αὐτὴν*, id est insperfa, cū in puluillum detrita fuerit, aut si bibatur in vino decocta: copiosa sic vrina & fecida expellitur. Herba recens nata, asparagi modo elixa manditur vt olus. Scolymus hic circa Mōspelium in lætis agris secus vias prosilit, quem indigenæ vocant *Chardonnerette*, Officinæ Chamæleontam, nulla prorsus nota ex iis quas Dioscorides memorat reclamante: partu etiam cum adhuc tener est, in cibis grato, & germinibus, ac radicibus, quæ præsertim germinibus connectuntur (nam inferiores & altius depactas ob lignosam duritiem respuunt) esu suauissimis. Hanc plantam Pena Scolymum siluestrem, siue Cynaram siluestrem vocat: quia tota facie Cynaram aculeatam refert. Hoc tantum interest, quod foliis angustioribus, aridioribus,

Li. & c. 22.

Lib. 25. c. 9.
Lib. 6. hist.
cap. 3.

SCOLYMVS Dioscoridis,
Cynara silvestris, Pena.



& multo densioribus spinis sit: flores item eleganti purpura multi, conferti lanugine. Huius delibratis caulibus teneriusculis & capitulis nodum in flores erumpentibus victitare rusticos Italos ait Pena. Eius flore lac desant in caseum: eiusdē florem vulgò credunt contra seminarū sterilitatem valere, & grauidarum partus ad iustum vsque tempus continere. Scolymo Theophrasti hoc proprium quod nō solum elixa radix vescendo est, sed etiam cruda: quod tum esu iucundissima est cum planta floret: quod durefcens lactescit: sed maximè peculiare floreſcēdi tempus, circa solstitium. In cibo grata est tumescētis capitis carnosā moles, oblonga, minimè aculeata, & omnino ei propria in illarum genere quibus spinosum folium, contrā quam in Chamæleone, cui folium aculeatum, non autem spinosum caput. Scolymi flos senescens in pappos abit, velut Aconæ, ixines, & aliarum quæcumq; his similes. Ad æstatis vsque finem capita & florem parit indefinenter. Semini humoris & medullæ parum. Arefcens folium elanguescit, desinitq; pungere. Hactenus Theophrastus.

Lib. 6. ca. 4.
hist.

Plantam hanc Græci etiâmnun hodie vocant Scolymum: Vegetius libro de Veterinaria Eryngium nominat. Eryngium luteum Monspelienses, & Itali Bononienses appellant. Nascitur prope Narbonam in maritimis: radici crassities pollicis, thaphani figura: color sublaeus: succi lactei copia, vt denti leonis: estur illa

SCOLYMVS Theophrasti, Clusio.



Li. 2. Stirp.
Hispa. cap.
78.

CACTVVS, Math.
Carduus Aculeatus.



Li. 19. ca. 8.

cruda & cocta à perquam multis: ex ea caules numerosi prodeunt, crassitie digiti, cubiti altitudine, nonnunquam proceriores, foliosis: folia prope radicem maiora, longiora, obscure virentia, vt in aliis Carduis laciniata, albis maculis notata: per summos caules minora: flos luteus: semen compressum, in capitulis Cnico similibus, magnitudine nucis moschatae, aculeis præduris adeò tota planta horret, vt vix tractari possit illeça manu. Clusius eandem plantam Scolymum Theophrasti esse censet, eoque nomine depinxit, quæ caules cubitales profert, admodum ramosos, ad quorum alas singulas folia intensius viridia, sinuosa, & albis spinis horrida: flos illi luteus Cnici ferè modo: semen in capitulis spinosis latum, foliaceum, squamatis coherens: radix longa, digiti crassitudine, carnosâ, dulcis, quæ libenter vescuntur sues, quemadmodum & Eryngij vulgaris radice, eaque de causa in agris vtramque rostro eruunt. Tota planta dum recens est, lacteo succo manat. Salmanticensi agro & tota Castella frequentissimam esse ait. Tota æstate florere, & interdum etiam Autumno, deinde semen proferre. Similem etiam esse circa Monspelium, sed multò lætorem, paucioribus ramis, & altius assurgentem, neque flore adeò copioso, & foliis veluti lacteis maculis insignitis. Salmanticensis Silybum nuncupant, vulgus *Cardon Lechal*, siue *Lecher*, id est Carduum lacteum. Iidem tenellam adhuc plantam & primum germinatam cum ipsa radice elotam, crudam aut cum carnibus coctam edunt: ipsius lacte omne lactis genus coagulât, & flore crocum adulterant. De hoc Scolymo legimus apud Plinium, gulâ, quæ portenta terrarum in ganeam vertit, etiam ea quæ refugium quadrupedes conscia, Scolymum in hortorum areas & puluinos transtulisse, vbi cultus mangonio domita feritate mansuescit, licet quidam de Carduis altilibus & Cactis exponât, ex agris in hortos transgressis, & ad hanc mitiorem naturam, qua hodie tantum placent, olitorum diligentia perductis. Scolymorum caulibus adhuc teneris, & capitulis nondum florem ostendentibus, Itali rustici etiâmnun hodie vescuntur, vt diximus. Præter vtrumque hunc Scolymum, sunt

CYNARA Non aculeata,
Matthioli.



CARDVVS Vulgaris,
Matthioli.



sunt in hortis frequentes Cacti, ac Cynaræ cū cuius foliis albi Chamæleonis folia Dioscorides confert. Gallix vulgus Cactos appellat Cardons, Cynaras Artichautz, hac differentia quòd Cactorum capita non mandantur, sed radicis pars suprema, foliorum ima, cū tenellis germinibus, planta terra sepulta per multos dies, quoad

CYNARA Non aculeata,
Dodonæi.



tenerescat, albescat, dulcescat, idque feretora Hyeme, & Autūno iam progresso: contrā in Cynara nullus earum partium vsus est, sed capitum solum. Præterea Cactis & folia & capita nunquā nō aculeata sunt: Cynaræ verò cū duplex genus sit, alteri, pariter ea, vt & Cactis, spinis armantur, alteri spinis carent, diuerso hac in re palatorum iudicio, quibusdam eam magis commendantibus quæ spinosa est, aliis contra eam quæ spinis nullis pungit, Theophrastus utrāque hanc plantam Cacti nomine indicauit, nulla facta Cynaræ mentione. Galenus, Paulus, Aëtius Scolymum stomacho prodesse adnotarunt. Cynaram autem vitiosum succum genere, præsertim, vt Galenus ait, cū iam induit, nempe melancholicum, aliàs verò biliosum & tenue, ideoq; elixam adiecto coriandro potiùs edendam, ex oleo, garo, & vino: vel absq; iis, si in patinis, aut sartagine cocta fuerit, quo modo eius strobilos, siue capita multi præparant. De Cacto iam Theophrastum audiamus sic scribentem: ἡ δὲ χείλος χαλκιδών περὶ

σικελίαν μόνον, ἐν τῇ ἐλλάδι δὲ ἐκείνῃ, ἴδιον δὲ παρὰ τὰ ἄλλα

Lib. 6. hist.
ca. 4.

*CARDVVS Altilis, Cynara
sine capitibus acuta, Dod.*



τὰ ἄλλα τὸ φυλόν. ἀρήσι γὰρ δούτος ἀπὸ τῆς ῥίζης
καυλὸς ἐπηξέσθαι. τὸ δὲ φύλλον ἔχει (adde ex Gaza,
Plinio, & Athenæo παλαιῶν) καὶ ἀχανθῶδες. καλῶσι δὲ
καυλὸς (deest vox καλῶς, ex Athenæo & Plinio
addenda) ἐδωδμοί δὲ εἰσὶ περὶ ἐπιπόμυνοι (emenda
περὶ ἐπιπόμυνοι) μικρὸν ἐπίπικροι (lege ὑπόπικροι ex
Athenæo) καὶ ἡγευρίζουσιν αὐτὸς ἐν αἵμῃ (inendo-
le, pro ἐν αἵμῃ) ἕτερον δὲ καυλὸν ὀρθὸν ἀρήσιν, ὃν κα-
λῶσι πῖερνιχα. γίνε' δὲ ἢ ἕτος ἐδωδμος, πλὴν ἀθη-
σαύρετος. τὸ δὲ περὶ ἀρπῆσιον ἐν ᾧ δ' ἀσέρμα, τὴν μὲν
μορφήν ἀχανθῶδες (lege ἀχανθῶδες) ἀφαιρεθείων δὲ
τῶν παππιδῶν ἀπερμασίαν, ἐδωδμον καὶ τῷτο, καὶ ἐμπε-
ρὲς τῷ τῷ φοίνικος ἐγκεφάλῳ. καλῶσι δὲ αὖλον σχα-
λιαν. (Ascaliam legit Plinius, Athenæus Ascale-
ron.) Id est, Cactos in Sicilia tantum nascitur, in
Græcia nusquam habetur: planta est suæ pro-
prietatis: statim enim à radice caules emittit,
non in terram repentes, vt Gaza interpretatus
est, sed in terram vergentes, folium latum &
spinosum: caules vocant Cactos, qui delibrati
sunt edules, paulum subamari, quos & muria
seruant: caulem alium rectum edit, quem pter-
nica appellant: is quoque vefcendo est, sed fer-

uari non potest. Fructus in quo semen acanaceam speciem gerit: sed detractis pap-
pofis seminibus, is quoque vefcus est, & palmæ cerebro similis. Scalam eum ap-
pellant. Plinius quoque hæc sic conuertit. Et Cactos quoque in Sicilia tantum
nascitur, suæ proprietatis & ipso, cuius in terra serpunt caules à radice emissi, lato
folio & spinoso. Caules vocant Cactos: nec fastidiunt in cibis inueteratos quoq;
vnum caulem rectum habent, quem vocant Pteruica, eiusdem suauitatis, sed vetu-
statis impatientem. Semen ei lanuginis, quam pappum vocant: quo detracto &
cortice, teneritas similis cerebro palmæ est: vocant Ascaliam. Hæc cum Theo-
phrastus scriberet, Caeti in Sicilia tantum, nusquam in Græcia, nec Italia forasse
colebantur. Sed cum eò tandem colendi ratio manasset, nihilq; essent aliud Sici-
li Caeti quàm carduorum genus, Græci Caetos & Cynaras, Itali Carduos nomi-
narunt: quod auctoritate Athenæi comprobatur, sic scribentis: φαμίνας δὲ ἐν περὶ φυ-
τῶν, καὶ κίλον σικελικὴν τινα καλεῖ ἀχανθῶδες φυλόν, ὡς καὶ Θεόφραστος ἐν ἐχω περὶ φυ-
τῶν. ἢ δὲ καλῶς καλεῖται, & cætera quæ modò citauimus ex Theophrasto: quibus
subdit Athenæus. τοῖς δὲ τῷτοῖς ὅχι περὶ πόμυνοι θάρρων ἐν εἴποι τὴν καλὸν εἶνα τὰ αὐτὴν
τὴν ὑπὸ ῥωμαίων μὲν καλεῖται καὶ ἄρδουον, ἢ μακρὰν ὄνιν ᾧ σικελίας, περὶ φανῶς δὲ ὑπὸ τῶν
ἐλλήνων κυκλάραν ὀνομαζομένην, ἀλλὰ γὰρ ὡς ῥωμαίων καὶ ἄρδουον καὶ καλῶς ταυτὸν ἐν εἴη.
Id est, Phæniæ lib. quinto de plantis Caetum appellat Scalam quandam plantam
spinofam, velut etiam Theophrastus in libro sexto de plantis. Quæ Caetos voca-
tur, &c. Quis non iis notis persuasus intrepidè dicat, inquit Athenæus, Ca-
eton eandem esse, quæ Romanis qui non procul à Sicilia absunt, Cardus nomi-
natur, & perspicuè reliquis Græcis Cynara? Siquidem mutatis duabus literis Ca-
etus & Cardus in eandem vocem consentient. Cynaræ olitorum industria &
mangonio quædam est varietas, præcipuè capitis figura distincta. Nam omnibus
est non quidem echinatum, vt scribit Matthiolus, (echinatum enim esse non po-
test, quin sit etiam spinis horridum,) sed omnibus squamarum, seu laminularum
ordine structili coagmentatum. Verum in quibusdam aculei sursum eriguntur, in
aliis

Li. 21. c. 16.

Lib. 2.

Cap. 14.
lib. 3.

aliis deorsum inclinantur, quarundam capita prorsus aculeis carent, vt iam monuimus, cæterisq; vt vulgus credit, in cibis præstant. In hoc genere caput nonnumquam in longam & sensim gracilescētem metam fastigiatur, nonnumquam in compresiore & rotundiore globum extuberat, laminis interdum sponte dehiscētib; & sese recludētib; interdum arctius coniunctis & compactis. Spinis carebunt Carduorum capita, vt ait Palladius, si cacumina seminum confringas, vel, vt olitores aiunt, si delibratis lactucæ radicibus & dissectis, semina integra condantur. Cynaram Columella pinxit his verbis.

*Hispida ponatur Cynara, * quæ dulcis laccho
Potanti * veniat, nec Phæbo grata canenti.
Hæc modo purpureo surgit glomerata corymbo,
* Myrtiolo modè crine viret, * deflexæque collo
Nunc adoperta manet, nunc pinea vertice pungit,
Nunc similis calathæ est, spinisque minantibus horret.
Pallida nonnumquam * tortos imitatur Acanthos.*

Qui potius & Carduum altilem, siue Cacton, & Cynaram videtur delineasse: vtræque planta foliis conspicitur albæ spinæ, vel Cardui siluestris, caulibus altis, quorum summi vertex in squarosum extuberant globum, corticosis vnguibus turgentem, spicisq; squamatim compactilibus coagmentatum, quorum orbis exterior viret, interior niueo candore nitescit. Hac struētili nucleorum serie pineā nucem videtur exprimere. Quare cū Galenus scribit Cynaræ capita *σπονδύλως* Græcis dici, *σπονδύλως* potius legendum crediderim. Flos purpureo rutilat colore, & tandem evanescit in pappos. Caput vetustate dissilit in corticeas laminas, semen ostendens Cnici figura. Hæc est Scolymi, Cynaræ, Cacti dilucidior, opinor, & magis enucleata quàm ab aliis quibusdam tradita distinctio: quas plantas satis indistinctè Matthiolum explicauit & depinxit. Galenus scribit Scolymi radicem copiosam vrinam graueolentem elicere, si quis eam in vino coctam bibat, ac proinde graueolentiam sanare tum alarum, tum totius corporis. Atque hoc, sanè medicamento inest ex tota substantia, nimirum cū succus sit purgatorius. At quæ secundum qualitates editur actio, calidum in secundo ordine completo, aut tertio incipiente medicamen indicat, siccum verò in secundo. De Scolymi viribus plura Plinius habet. Scolymus vrinam ciere præcipuè traditur: sanare lichenas & lepras ex aceto, venerem stimulare in vino, Hesiodo & Alcæo testibus: qui florēte eo cicadas acerrimi cantus esse, & mulieres libidinis audissimas, virosq; in coitum pigerrimos scripsere, velut prouidentia naturæ, hoc adiumento tum validissimo. Item graueolentiam emendat radicis emedullatæ vncia, in vini falerni heminis tribus decocta ad tertias, & à balineo ieiuno, itēque post cibum cyathis singulis pota. Mirum est quod Xenocrates promittit experimento, vitium id ex alis per vrinam effluere. Hæc Plinius. Nunc nullis non hortis cardueta spectantur, plurimæ hortorū areæ Cynaris refertæ sunt, nec iam sine cibo hoc, nisi tempus anni neget, opipura vel adicialis vlla sit cœna. Apponuntur capita nondum florescētia Asparagi modo iuribus incocta, eorūque pulpa estur cum sale & pipere. Itali rarò decoquunt, sed cruda cum sale vorant. Hac ob miram, tum raritatem, tum venustatem non omittendus carduus peregrinus, quem ex Pena depictum & descriptum hîc exhibemus. Hunc, inquit, sponte edunt noui orbis insulæ occiduae, præsertim ea quæ D. Margareta sacra est, vnde reduces naucleri Anglicis oris Morgano pharmacopœo Londinensi attulerunt. Videtur autem hic quasi quidam naturæ cinnus ex pepone, melone, & carduo coaluisse. Ob id ille Echino-melocactum, siue melocarduum echinatū, signata magis, quàm recepta nomenclatura vocauit. Turbinata illi metæ effigies, torulis, callosisq; quatuordecim quasi costis

Lib. 10.

* Quidam:
hæc non dul-
cis lacchum.* Quidam:
ueniet, non.* Quidam:
Luteolo.
* deuexa.

* totos.

Li. 2. alim.

In cap. 14.
lib. 3.
Li. 3. simpl.
Vires.

Li. 2. c. 22.

In Aduers.
Locus.

Nomina

Forma:
costis




costis canaliculata, à sessili & latiore basi secundum longitudinem in conū obtusiorē coeuntibus, ex quo quasi vertice emicat tomentosa, ut in cynara, sericea bombax admodum farcta & delicata, ferè qualis lapidis amianthi, qua inuoluuntur mucronatae vaginulae, siliquosae, sanguineae, capsico concolores & similes, sed perquam exiles, semine pusillo, rotundo, amaranthi, plenae, multis setis cro-

ceis supernè se exerentibus, sed rigidis & pungentibus. Dorsā autem summa striarum, quā latius protuberant, exerunt infestos hystricis, aut echini aculeos aduncos, corneos, denos & duodenos, quasi hamos, radiatim septenas ut plurimum stellae effigiantes: adeoque vniuersum conum armant instar echini, vix ut inultus manu premas. Est autem cutis externa callosior, crassiorque tota, aloës aut cucumeris colore, & concretionē. Caro subtus albicat, pinguis, flaccida, melonem, aut adipem referens, gustu insulso & acidulo, non ingrato, aqueo, refrigerante, innoxio. Quasi autem melo foret, interiore & superna sui parte, quae flori subest, carduis simili, carnem firmiorem dissepit membranula per medium ducta, cellulamque efformans ferè qualis cucurbitae, sed seminis vi fungosiore minùsque compacta medullam ibi inuoluit. Eius natales qui viderunt tum naucleri, tum familiares quidam, maritima fabuleta esse referebant. Cum maturuit, peponem mediocrem, vel maximum melonem aequat. Nouem libras & vnus trientem hae pendebat. Humi sessilis est, nusquam apparentibus ne minimis quidem foliorum vestigiis in ipsa planta, aut radice, quae exilis est, aliquot appendiculis vimineis, pullis, prolixis, firmis, nec fractu facilibus sparsa. Carduum non minùs admirandū

Li. 8. c. 24.

CARDVVS Pitahaya
fructum ferens.



descripsit. Quiedus in Hispaniola insula nascentem. Pitahaya, inquit, fructus est pugni mediocris magnitudine. Hunc profert Cardui genus, spinis quidē horridum, sed aspectu iucundum & pulcherrimum: foliis enim caret, sed horum & ramulorum vice brachia quaedam habet, sex pedes longa, quadrangula, in medio canaliculata, in quo medio & in angulis spinæ sunt valde pungentes, venenatae, satis longis spatiis à sese distantes, ternæ simul, aut quaternæ digiti maximi longitudine. Inter hæc brachia fructus medius exoritur, qui Pitahaya illic nominatur, cortice crasso, spisso, & veluti squamoso contextus, qui tamen facile cultro inciditur, etiamsi to-

ta interiore parte granulis carni permixtis ficuum nostratium modo sit refertus, coloris venustissimi, nempe chermesini saturati. Est & tota hæc pars edulis, manusque inficit mori modo. Qui comederit, non statim, sed duabus horis ab eo sumpto, vrinam reddit planè crudam. Est tamen innoxius & spectatu elegantissimus, sed qui eum profert Carduus horrendus, specie valde agresti & admiranda, viridi, cinerea, candicante, qualem hinc pictam videris ex Quiedo.

ACANTHVS,

CAP. III.



ΚΑΝΘΟΣ & ἀκανθα Græcis, μέγαφυλλος & πάλιδρος, Latinis Acanthus & Acantha dicitur: Officinæ à similitudine, quàm eius folia cum anterioribus vrsorum pedibus habet, Brancam vrsinam vocant. Ad quam etiam similitudinem respicientes Germani *Bernkraut*

Nomina

ACANTHVS Satiuus,
Math.



ACANTHVS Siluestris,
Carduus pratensis, Tragi.



nominant, Galli *Branche vrsine*. Adnotauit Fuchsius hanc herbam olim etiam Romanis Marmorariam esse dictâ, quæ vox in omnibus Dioscorid. exemplaribus inter nothas appellationes deprauata est, ac in Mamolariam detorta, quod eius, columnarû, maximè Corinthiarû folia capitulis insculpebatur, quarû identidè, tam scapi, quàm vertices marmore splêdebant. Antiqui etiam Acâtho pateras & pocula alia ornabant. Acanthi genera duo Dioscorides tradidit, satium, siue hortensem, & siluestrem. Satiuum describit folia habere multò latiora, longiora quàm lactuca, erucæ modo incisuris diuisa, nigricantia, pingua, læuia, caulem læuem, bicubitalè, digitali crassitudine: ex interuallis verticem foliolis quibusdam circumdatum, velut nucamētis aculeatis, è quibus flos candidus promittitur: semen illi est oblongum, luteum, caput thyrsi specie: radices sub sunt glutinosæ, mucosæ, rubentes, longæ. In quibus hæc in Græcis sic exarata, *διονει κινθαρίας υπομήκειν, ἀκανθώδεσιν*, vertit Cornarius, veluti pileolis oblongis, pronucamentis: per *κινθάρια* intelligens foliorum inuolûcra illa ad oblongi pileoli figuram obtorta. Est enim *κινθάρια* & *κινθάρων* pileoli genus. Est etiam id notandum in quibusdam exemplaribus Græcis scriptum inueniri *υακινθώδεσι* pro *ἀκανθώδεσι*, sed perperam: nam minuta caulis folia, nec figura, nec colore hyacinthinis respondent, quin potiùs exilia, & spinulis armata, quæ verò humi procumbunt, amplissima, vt quæ arearum puluinos possint vestire, nullis tamen aculeis rigentia. Acanthus siluestris eodè Dioscoride auctore, scolymò similis est, aculeatus, breuior quàm satiuus & is qui in hortis provenit. Satiuus in hortis, petrosi, & humentibus locis nascitur. Iunio præcipuè & Iulio mēsisbus semine & floribus abundat. Plinius breuius duo Acanthi genera notauit. Acanthus est topiaria & vrbana herba, lato longoque folio, crepidines marginum, assurgentiùq; puluinorum toros vestiēs. Duo genera eius sunt, aculeatum & crispum, quod breuius: alterum læue, quod aliqui pæderota vocant, alij Melamphylon. Hæc Plinius. Et si Acanthus, vel Acantha

Lib. 15. hist.

Genera.

Forma.

Embl. 17.
lib. 3.

Locus.

Tempus.
Li. & c. 22.

spinam significet, & Branca vrsina omnium herbariorum sententia Acanthus Dioscoridis credita, rigidis spinis non horreat, non ob id tamen vera Acantha non dicenda: spinosa etenim est, verum thyrsus duntaxat ex Dioscoridis descriptione, & columnarum apud Vitruvium epistylis, sed mollibus duntaxat spinis, ideoque à Vergilio mollis Acanthus dicitur: nec vlla alia est, cui Dioscoridis descriptio verius respondeat. Siquidem quinis senisve foliis extenditur, lactuca, longioribus multo, ac latioribus, ut quæ nonnunquam cubiti longitudinem æquant, pinguibus, carnosissimis, eruce ritu laciniatis, subnigris, caule tripedaneo, digitum crasso, laxi, cuius vertex foliorum in aculeos molles exeuntium cingitur vallo, & veluti in dehiscentem paniculam nucamentumve fastigiatur. Summatim caput erumpit thyrsi figura, flores candidi, semen oblongum, luteum, radices oblongæ, pingues, lentæ.

Ruel. lib. 3.
ca. 16.

Lib. 2. ca. 3.

ACANTHVS Silvest.
alter, Dalechamp.



Lib. 6. hist.
cap. 3.

Acanthus
silvestr. 2.
Forma.

hic picta, quibusdam alter Acanthus silvestris, aliis Leimonia, quod ut & superior in pratis nascatur. Radice est foris nigricante, in multas appendices asphodelo præcon: & ve similes diuisa, quæ quotannis alias atque nouas, veluti si sobole recetem ex sese gignunt, exarescente radice ex qua propendent: folio crasso, incisuris sinuoso, oblongo, aculeis armato, sic à natura factis, ut aculei singuli ex tribus cuspidibus in vnum

gine inuolutum, quæ in pappos tandem euanescent. Planta est hyemis contemptrix, & quæ frigora faciliè ferat. In pratis nascitur, vbi rediuiua quotannis, Aprili mense folia emittit, radice candida, fibrata, crassa, plerumque exesa. Ex locis natalibus coniecturam sumpsere quidam hunc Cardum Leimoniam esse Theophrasti, à pratis sic dictam, quam nullis prorsus notis inter spinosas numerat, nempe ἀκανθάν, λευκὰ κανθάν, χαλκιδόν, κνήκον, πολυάκανθον, ἀτρακτύλιδα, ὄνυκτον, ἔλινον, χαμαλέονα, σκόδυμον, quibus additur ἡ λημωνία. Ineptè Betam siluestrem Gaza interpretatur nominum similitudine deceptus, quia Leimonium minimè spinosis foliis à Leimonia valde diuersum est. Hic quoque Plinius bis lapsus est, scribens scolymum in cibos ab Oriente recipi, & alio nomine Leimonion appellari, tum quod Leimonium, id est Betam siluestrem ἀπὸ τῆς λημωνίας spinosa planta non separet, nisi fortè mendosus sit codex, tum quod Leimoniam spinosam plantam à Theophrasto inter aculeatas acanaceasque proximè scolymum memoratam cum scolymo confundat. Est etiam planta alia

in vñ coëuntibus videantur esse coagmētati, pallidè virentibus, caule recto, pro-
cero, gracili, parū ramoso, capitulo echinato, vno fere tantum vel altero: flore pu-
nico, semine oblongo, paruo, lanugine contecto, quæ in auras tandem euolat. Ob
aculeos ternos, quemadmodū suprà dixi, vna stipatos, herbarij quidam Carduum
τεργώχινα vocant. Quidam Leucacanthā, de qua posthac nos agemus, esse vo-
lunt. Lobellius pinxit alium Acanthum siluestrem Scolymo similem aculeatum
Dioscoridis, vel potiùs nouam aculeatam Brancam vrsinā, & subiicit, in agro Bo-

BRANCA Vrsina aculea-
ta, Lobellij.



noniensi Lombardiæ, adeò flores & folia simi-
lia fuisse huic Acantho spinoso, vt crediderit
Dioscoridis esse Acanthum siluestrem, quem
assimilauit Scolymo siluestri, & satiuo Acātho
breuiorem & aculeatum dixit. Chamæleonta
Monspelienſium esse non potest quia caput
habet echinatum. Acāthi satiuī radices, aucto-
re Dioscoride, vstis & luxatis illæ profunt. Po-
tæ vrinā mouent, & aluū sistūt. Tabidis, ruptis,
conuulsis mirè vtiles sunt. Eadē Plinius tradit.
Huius radices vstis luxatisq; mirè profunt: item
ruptis conuulsis, & pthilim metuentibus in-
coctæ cibo, maximè p̄tisana. Podagricis quoq;
illinuntur trita & calefacta calidis. Galenus,
Acanthi folia, inquit, mediocriter digerentem
facultatem obtinet: radix exsiccatoria est, & le-
uiter incisoria, & tenuium partium. At quoti-
diana & diurna experientia constat nostri
Acanthi satiuī radices emollire, vniuersamq;
plantam mucosam esse, ac ob id ad enematum
emollientium decoctiones duntaxat, in hortis
haberi. Quare mirū Dioscoridem dixisse radi-
ces τρέμμασι, id est luxationibus prodesse, cū iis

Lib. 4. c. 17.
Vires &
Temper.
Li. & c. 22.

Li. 6. simpl.

Pena in
Aduerſ.

obſit potiùs relaxando: aptius fortasse τρέμμασι hīc cōuertas torsiones, ligamen-
torū mve tractiones, quibus medentur initio suauiā malactica, dolorem sedando,
& leuiter digerendo, si quid affectæ parti influxerit: hac enim ratione fractis &
conuulsis proderunt. Acanthi siluestris radix ad eadem ad quæ superior efficax
est, nihilq; a satiuo differt, nisi mollitie & magnitudine.

ACANTHIVM,

CAP. II. II.

QUOD Græci ἀγκύθιον, Latini similiter Acanthiū nominant, Germani
Vveisz vuerge distel, Galli Chardon argētin, cuius hæc est in vulgatis Diof-
coridis exemplaribus descriptio. Αγκύθιον ἐμπερὴ τὰ φύλλα ἔχει τῇ λευκῇ
ἀγκύθῃ, ἐπ' αἰκρῷ ὃ ἀγκυθώδης ἐξοχὰς, & συλλεγομένης, &c. Quæ ex Plinio,
multo verò tutius ex Oribasio viri docti sic restituerunt. Αγκύθιον ἐμπερὴ τὰ φύλλα
ἔχει τῇ λευκῇ ἀγκύθῃ, ἐπ' αἰκρῷ δὲ ἀγκυθώδης ἐξοχὰς, ἧς ἀσ ἀραχνοειδὲς ἔστι χνῆς, vel ἧς
ἐπ' αὐτῷ χνουῷ ἀραχνοειδῆ, ὅς συλλεγομένης, & ὑφανόμενος βαμβάκοειδης γίνεσθαι. Id est, Acan-
thium folia similia habet albæ spinæ in summis extremitatibus aculeata, in quibus
est lanugo, instar telæ aranæ, quæ collecta & texta bombycis effigiem præbet.
Plinius. Spinæ albæ similis est spina illa, quā Græci Acanthium vocant, minori-
bus multo foliis, aculeatis per extremitates, & araneosa lanugine obductis: qua
collecta etiam vestes quædam bombycinis similes fiunt in Oriente. Dioscorides
folia quidem Acanthij figura candorēve cum Alba spina confert, sed citra

Nomina

Forma.

Li. 24. c. 12.

ACANTHIVM, Matth.

Ca 16 hist.

Acanthiū
montanū.

Forma. Iura, vnde & hoc aduectū est, nascitur. Radice est crassa, numerosa, caulibus multis, intus cauis, angulosis, densissima lanugine opertis, foliis albæ spinæ similibus, toto ambitu marginibus aculeatis, prominentibus, araneosa lanugine obductis, quā neri possē, & in vestes texti omnino credibile, cū digitis summis tractata non abrupatur, & quā longissimè ducatur, flore purpureo, lana candida & tam

*ACANTHIVM, Spina
alba siluestris. Fuchsj.*



ACANTHIVM Montanum, Dalech.



spissa

spissa vndiq; per initia sic obuoluto, ac circūclūso, vt priusquā detegi possit, veluti lanæ glomus sit dilacerandus & euoluendus. Acanthij radix & folia, inquit Dioscor. in potu opisthotonicis auxiliantur. Eadem prorsus Plinius tradit. Ipsa folia vel radices ad remedia opisthotoni bibuntur. Galenus verò radicem & folia facultatis esse excafactoria; & iis qui conuelluntur auxiliari.

DIPSACVS,

CAP. V.

I' K A K O Σ Græcis, Labrū veneris, & Carduus veneris. Latinis, Virga pastoris Officinis, & Carduus fullonū vulgò dicitur, Gallis *Chardon à carder*, vel *Chardon à foulon*, Hetruscis *Cardo da cardare*, Foroiulienſibus *Garzo*, Germanis *Kartendistel*, *Bubenstrel*, *Vueberkarden*. Dipsaci autē, id est sitibūdi nomen à cōtrario inuenit, quoniā concauo alarū sinu rore, vel imbrē recipiat, quo velut ad abigendas sitis iniurias abutitur. Labri veneris nomenclaturā à carinato foliorum habitu contraxit, quæ se anfractuosa sinuantia ambage, peluis vel solij speciem constituunt, & intra se humorem retinent. Virga pastoris dicta est, ob longas virgas, quas detractis Carduis pastores fortè sumūt, & ea parte qua possit manu capi aculeis nudant, reliqua autē aculeata gregē ducunt. Carduus fullonius appellatus est, quòd eo rudes pānos, velut echino quodā poliūt, detractisq; floccis carminat. Cæterum hīc animaduertendū Auicēnæ & Serapionis interpretes Virgæ pastoris nomine minimè Dipsacum, sed Polygonū utrūque Dioscoridis intellexisse. Herbarij duo Dipsaci genera fecere. vnum satium, alterū qui sua sponte passim prouenit, eumq; duplicē, nēpè Dipsacū siluestre maiore, quē Dipsacū purpureū vocat Fuchsius, & Dipsacū siluestre minorē. Dipsacū, vt describit Dioscorid. aculeatarū generis est. Caulem habet albū, spinis horrentē, folia caulē amplectētia, lactucæ similia, in singulis geniculis bina, oblōga, atq; etiā spinosa, quæ in dorsi medio intus & extrā veluti bullas spinosas habent, cōcauo, quo se vtrimq; geniculis cōiungunt sinu, quo aquæ, rores & imbres asseruantur, vnde Dipsaci quasi sitientis nomen

Nomina.

Li. 2. c. 736.
c. 351. simpl.

Genera.

Ca. 82. hist.
Lib. 3. ca. 11.

Forma.

DIPSACVS Seu Labrum
veneris, Matth.DIPSACVS Satius alter,
Matthioli.

DIPSACVS Siluestris maior, Fuchs.

Li. 27. ca. 9.

*DIPSACVS Siluestris minor, seu Virga pastoris, Matth.*Matth. in
ca. 11. lib. 3.Lib. 3. ca. 11.
Vires &
Temper.

Li. 27. ca. 9.



trahit. In cacumine caulis singulis furculis capitula singula echinis similia insunt, oblonga, aculeata: quæ postquam exaruerunt, candida apparêt. dissectum per mediâ medullam caput vermiculos habet. Plinius eadê breuiter & dilucidè tradit. Dipsacus folia habet lactuæ, bullasq; spinosas in dorsi medio, caulem duum cubitorum, iisdem spinis horridum, genicula eius binis foliis amplexantibus, coccum alarum sinu, in quo subsistit ros salus. In cacumine capitula sunt echinata spinis. Nascitur in aquosis. Huic descriptioni si pastoriâ virgâ cõferas cõperies notas omnes optimè respondere Dipsacus siluestris satiuo similis est, foliis tamen est angustioribus, & floribus purpureis. Nec solo cultu videtur euenisse, inquit Pena, vt satiuus Dipsacus aculeis aduncis, recuruis & rigidioribus à siluestri & spõte prodeute tantum distet. Nam pleraq; omnia culta, molliora & teneriora, minusq; spinosa euadunt. At hîc satiuus capitibus est reductioribus, oblongis spinis, crebris, aduncis, terram versus reflexis, adeo rigidis, vt stamina carpendo, & vellendo filamenta, non facile effringatur: siluestris verò mollioribus, minoribus, surrectis, nec aduncis, longioribus multo, imbecillioribus: foliis ite mollioribus, minoribus, haud dissimilibus, capitulis crebris, & bituminoso trifolio similibus. Nascitur in agrorum & scrobium marginibus, & in viis iuxta sepes. Dipsaci tertium genus minimum, nec adeo frequens, superiori siluestri sat simile est, non tamè ita striato caule, nec tam spinis horrido, foliis ite infirmioribus, capitulis multo minoribus, vt quæ oliuæ magnitudinem vix superent. Sunt autem capitula hæc tenuibus capillis referta, ita vt sericis viridi colore infectis floccis similia videantur. Quidam Plumbaginem esse Plinij credunt, nec temere fortassis. Dipsaci radix, auctore Dioscoride, cum vino decocta & tusa vsque dum cerati crassitudine accipiat, imposita rimas fistulasque sedis sanat. Oportet autem medicamentum hoc æreapyxide recondere. Ferunt præterea formicis & verrucis pensilibus remedio esse. Vermiculi capitis eius in folliculo clausi, & collo aut brachio appensi quartanas sanare produntur. Eadem breuiter Plinius dixit. Sanat rimas sedis: item fistulas, decocta in vino radice, vsq; dū sit crassitudo cera, vt possit in fistulâ mitti: ite ver-

rucas omniū generū. Quidā & alarū, quas modò diximus, succū iis oblinūt. Dipsaci spinæ radix, inquit Galenus, est secūdo ordine exsiccatoria, habetq; nōnihil absterforiū. Scribit Pena priora duo Dipsaci genera refrigerātis & siccātis esse facultatis, & cancerosis vlcerationibus multū conferre: tertium vsui incompertum.

C N I C V S

CΝΙΚΟΣ & κνήκος Græcè, Cnicus & Cnecus Latine nominatur, Mauritanis *Kartam*, siue *Charthom*, Officinis Mesuen & Serapionem secutis, Carthamus, Italis *Zaffarano* *Sarrasinesco*, Germanis *Vuldengarten saffran*, Gallis *Saffranbastard*. Nomina

CNICVS Satiuus, Matth.



CNICVS alter, Clusij.



Dicitur autem Cnicus seu Cnecus ἀπὸ τῆς κνήξης, quod mordere & pungere significat: est enim spinosus carduus, vel ἀπὸ τῆς κνημῆς, quod pungendo pruriginem excitet. Carthamus verò ἀπὸ τῆς καρτάρης, quod est purgare. Dioscorides de Cnico satiuo duntaxat scripsit. Theophrastus & Plinius duo genera fecere, satium siue hortense, & siluestre. rursus siluestris species duas. Cnicus satiuus, vt describit Dioscorides, folia habet oblonga, incisuris diuisa, aspera, aculeata, caules cubitales, in quibus capita oliuæ magnitudine, florem similem croco, semen candidum & rufum, oblongum, angulosum. Nascitur in hortis, & agris satius. Floret Iulio & Augusto mensibus, ac subinde semē etiam profert. Cnicum alterum pictum dedit Clusius, cui vnicus caulis, interdum bini, terni, aut quaterni, cubitales, firmi & lignosi vti alterius, nullis tamen aut paucissimis ramis: folia Cnici vulgaris, candidiora, & paulò longiora: capitula Cnici: flos diuersus, quippe qui non sit luteus, sed ex multis staminibus carulei coloris constans: semen Cnico & minus & subtrifidum: radix pollicari crassitudine, carnosa, succulenta, foris nigricans. Circa Cordubam in segetibus inuenitur, & agro Hispalensi. Floret Maio & Iunio. Vulgare nomen nullum nouit. Sed cum tota facie Cnicum vulgarem referat, Cnicum alterum nominauit. De reliquis generibus hæc prodidit Theophrastus. τοῦ κνήκος δι᾽ εἶσιν ὁ μὲν ἀρχίος, ὁ δὲ ἡμέρος. τοῦ δὲ ἀρχίου διὰ τὴν εἰδη. τὸ μὲν προσωπεῖος σφόδρα τῷ ἡμέρῳ, πάλιν εὐτυχυλότερον. διὰ καὶ πηνίοις ἐνταῖ τῶν ἀρχαίων ἐχρῶντο γυμνασίων. καρπὸν δὲ ἔχει μέλανα, καὶ μέγαν, καὶ πικρὸν. ὁ δὲ ἡμέρος διασὺς τὴν καυλὸν ἔχει συγχυλῆς, ὥστε τρόπον τινα ἐπεγείνητος γίνεσθαι. διὰ γὰρ μαλακῶν τῶν καυλῶν κατὰκλινεσθαι πρὸς τὰς ἀρούρας. καρπὸν δὲ ἔχει πικρὸν πωγωνιάδους ἀσέματος. πρὶν ὥσπερ πλάτους: μέλους δὲ, καὶ πικνότεραι τοῖς ἀρχίοις. ἰδιον δὲ ἔχει πρὸς τὰ ἄλλα ἄχρη. τὰ μὲν γὰρ σκληρότερα, καὶ ἀκνυθώδεα τῶν ἡμέρων. αὐτοὺς δὲ μαλακότερος καὶ λειότερος. Id est, Cnicus est siluestris, & mitis. siluestris species duæ. Vna miti consimilis admodum, sed rectiori caule. quare ex ea præcæ quædam mulieres pro fuso vtebantur. Fructum

Lib. 4. c. 18

Genera.

Ibidem.

Forma.

Locus.

Temus.

Lib. 2. stir.

Hisp. c. 32.

Lib. 6. hist.

cap. 4.

fert nigrum, magnum, amarum. Altera species hirsuta caules sonchi profert, & quodammodo humi accubat, nam propter caulium molliem in terram inclinatur, fructum gignit amarum ($\alpha\tau\tau\upsilon\lambda\acute{\iota}\delta\upsilon\varsigma$ pro $\alpha\tau\tau\upsilon\lambda\acute{\iota}\delta\upsilon\varsigma$ legit Gaza, & vertit frequentem) barbatum semen-omnibus radices multæ, densiores tamen siluestribus, & maiores.

CNICVS Siluestris prior.
Atractylis, Dalech.

Lib. 21, c. 15.



Lib. 3, c. 55.

Cap. 42.

hiflo.

Lib. 4, c. 70.

CARDVVS Benedictus.
Cnicus siluestr alter.



Præ aliis siluestribus hoc peculiare est, quod cum duriora spinosioraque sint mitibus, vrbani Cnicus mollior sit & lauior. Quæ ex Theophrasto sic transcripsit Plinius. Multas præterea ignobiles habent, sed maximè celebrant Cnicon Italiæ ignotum, ipsis autem oleo non cibo gratam. Hoc faciunt è semine eius. Differentia prima siluestris & sativi. Siluestrium duæ species. Vna mitior est, simili caule, tamen rigido, itaque & colu antiquæ mulieres utebantur ex illis: quare quidam attractylida vocant. Semen eius candidum (hic Plinius contradicit Theophrasto, qui semē nigrum esse ait) & grande, amarum. Altera hirsutior torosiore caule ($\alpha\tau\tau\upsilon\lambda\acute{\iota}\delta\upsilon\varsigma$ caules legit Plinius, quos $\gamma\gamma\omega\lambda\acute{\iota}\delta\upsilon\varsigma$ Theophrastus) & qui penè humi serpat, minuto semine. Aculeatarum generis hæc est. Hæc Plinius. Cnicus siluestris prior Ruellij, Fuchsj, Dodonæi Atractylis est. Is durus est & erectus, sativo non dissimilis, foliis asperis & pungentibus: capitula multis foliolis angustis & per extremitates aculeatis muniuntur, ex quibus hirsutus flos prodit, magis quàm Cnici horten sis ex luteo pallescens. Semen Cnico par, oblongum & angulosum, sed subatrum, non vt Cnici album: magnitudo ei quæ homini. Quamobrem prisca mulieres, vt scribit Theophrastus, si locus mendo careat, pro colu vti poterant eius stipitibus satis firmis & longis ad lanam sustinendā quæ nebat, vt pro fuso attractylide, humili plantā, suis capitulis momentū & pondus præbente ad intorquendum & circumagendum filum. Alteram Cnici siluestris speciē, Carduum esse, qui Benedictus ob admirabiles eius vires contra varios morbos nominatur, iamdiu doctis omnibus persuasum est, qui hunc cum alterius Cinci siluestris descriptione à Theophrasto tradita diligentius cōtulerunt. Herba est vsu & visu omnibus cognita, radice longa, tenera, valde fibrata, foliis longis, pinguibus, teneris, mollibus, hispidis, profundius incisis: caules ei hirsuti villosiq; ($\gamma\gamma\omega\lambda\acute{\iota}\delta\upsilon\varsigma$, id est, leues, inanes, fragiles sonchi modo, non $\alpha\tau\tau\upsilon\lambda\acute{\iota}\delta\upsilon\varsigma$, vt legit Plinius, id est, torosiores, in terrā sparsi, quoniam ob comæ foliorumq; molliem recti nō stant, sed caduci solo procumbunt, & inclinatur, hirsuta

suta quoque, capitula foliis pungentibus circundantur. Flos ex luteo pallet, semen copiosum, oblongum, cinereum, pilis barbatum, amarum, lanuginosis pappis obvolutum. In arduis alpinis Galloprovinciæ teste Pena prope Monasterias quas Marignols vocant, ubi effodiuntur CrySTALLINÆ, Irides, & varij coloris alij lapides, crescit, in summis montibus, rigidior, & aliquantum minor hortensi. Nunc passim in hortis omnibus magno studio colitur ob eximias eius dotes. Cnici satiui flore prisci utebantur in obsoniis auctore Dioscori. Semen tundeatur, & ex eo exprimebatur succus, ut tum hydromelite, aut gallinaceo iure datus aluum purgaret. Stomacho tamen aduersatur. Fiebant etiam placenta ad aluum emolliendam, succo eius amygdalis, nitro, aniso, & melli cocto admixto. Oportet autem ante cœnam in partes quatuor diuisas iuglandis nucis magnitudine, duas aut tres sumere. Eas hoc modo conficere oportet. Sumatur Cnici candidi sextarius, amygdalarum tostatarum & decorticatarum cyathi tres, anisi sextarius vnus, aphronitri drachma vna, caricarum triginta carnes. Seminis succus lac cogit, & ad soluendam aluum efficacius efficit. Cnici semine duntaxat utimur ad purgationes, inquit Galenus. Tertij ordinis est excalfacientium si foris admoueatur. Sed de eius temperamento & facultatibus fusius disseruit Mesues his ferè verbis. Cnicus est agrestis & satiuus, idemque melior semine, præsertim eo magno, albo, plano, pleno, medullæ pinguis, cortice tenui. Nec inutilis est flos croci pilorum effigie. Calfacit ordine primo, siccatur secundo. Agrestis flos minùs calidus ac siccus. Pituitam & aquas vomitu & deiectione vacuat sumptus, & clystere iniectus. Ob id morbis inde natis, ut colico affectui & similibus confert. Thoracem quoque & pulmonem expurgat, præsertim eclegmate sequente & oleo suo, unde & vocem claram reddit: sperma quoque vsum auget, sed alimentum est prauum, stomacho valde noxium, in eo & mammis lac dicitur cogere, fastidiendum ac nauseabundum est, ac conturbans, facultate est lactariorum plantarum, sed remissa, terget, aperit, etiam flore cum mulla icterum sanante. Ne ventriculum lædat, ei misce stomachica, anisum, galangam, mastichen: acriora verò, ut cardamomum, zingiber, sal panis, sal gemmæ addita actione ipsius celerant, & intestinorum noxam prohibent. Sic medullæ eius drachmæ decem, cum cardamomi aureo vno in catapotia cicerum magnitudine drachmis quinque, sufficienter purgant Paulo auctore. Eadem medulla panno ligata, oxymeliti præsertim scillitico incoquitur mersa, & purgatoriū id efficit. Medullæ eiusdem aurei duodecim, penidiorum aurei quatuor, cardamomi, zingiberis ana aureus vnus, cum mellis forma bolos nucis magnitudine, da vnum vel duos. Medulla eadem ex iure galli vel gallinæ cum speciebus prædictis cocta, idem præstat: vel medullæ eius drachmæ tres, amygdalarum drachma vna, strobilorum drach. semis, cum melle cocto & sicco scillæ fiat eclegma, mirificum in thoracis affectibus. Hæc ex Mesue. Sed id animaduertendum orientalem Cnicum multò facilius & vtilius minori quantitate purgare. Nostrium multò imbecillius esse, ut pote qui non minore quàm duarum vnciarum, vel saltem vnius & semissis mole, aluum subducatur, nec obstructions meariarum æquè probè referet. Carduus verò benedictus obstructions internorum viscerum tollit, urinam mouet, calculum frangit, vlcera potissimum pulmonis sanat. Percussis à feris venenatis medetur tam interiùs sumptus, quàm venenatis ictibus aut moribus impositus. Negant etiam pestis sentire contagia, qui cum cibo aut potu præsumpserit. Iam quoque correptis magnò fore præsidio vulgus sibi persuasit. Item contra capitis vehementissimos dolores, vertiginem, memoriam amissam, in cibo aut potu sumptum valere tradunt. Item ad putrescentia vlcera, mammarum potissimum, si in puluerem reductus inspergatur: caecothæ tam recens quàm sicca herba, pota & admota sanat, cutemq; obducit. Quamobrem decoctis miscetur, quæ ex ligno Gaiacono parantur Hispanica lue laborantibus.

Confert

In Aduers.

Vires &
Temper.

Lib. 7. simi

Lib. 2. c. 11.

Confert maximè iis qui quartana febre aut aliis febribus laborant, quarum accessiones cum frigore redeunt, hausto eius decocto, aut stillatitia aqua, aut pulueris drachma pota. Profunt eadem comitialibus infantibus eodem modo pota. Herba decoctum ex vino sumptum, ilium & renum dolores mulcet, ventris tormina sedat, sudorem citalui tineas necat, & vteri vitii auxiliatur.

CHAMÆLEON, CAP. VII.

Nomina



ΑΜΑΙΛΕΩΝ λευκός Græcis, Chamæleon albus Latinis nominatur, Carduus varius, Carduus suarius, & Cardopatium, Arabibus *Chamelon leuce*, seu *Chamaliū*, Italis *Carlina*, & *Chameleone bianco*, Hispanis *Cardo pinto*, Germanis *Eberuurtz*, eleganti allusione ad Carduum suarium. χαμαιλέον μέλας, Latinis Chamæleon niger. Chamæleon autem à foliorum

Lib. 3. c. 8.

varietate dicitur Dioscoride teste: mutant enim cum terra colorem. Hic enim viridia, illic albicantia, alibi cærulea, nonnusquam rubra inueniuntur. Suarius autem carduus, quod siues, si in polenta exhibeatur, perimat. Carlina verò quasi Carolina quod credat vulgus hanc herbā Magno illi Carolo Regi olim ab Angelo demon-

Lib. 3. c. 8.

stratam fuisse ad propulsandam ab exercitu suo pestem, tanquam antidotum omnium præstantissimum. Quam ob causam multi ad arcendam pestilentiam huiusce herbæ radices miris efferunt laudibus. Chamæleon albus à nonnullis Ixias vo-

Forma.

catus, vt ait Dioscorides, quod quibusdam in locis ἴξις, id est, viscum ad radices eius inueniatur, quo pro mastiche vtuntur mulieres. Folia habet silybo aut carduo similia, asperiora tamen & acutiora, nigroq; Chamæleone robustiora. Caule caret, sed è medio spinam echino marino aut cynaræ similem erigit: flores purpureos velut pilos, qui in pappos euanescent, semen cnico simile: radicem in pinguibus collibus crassam, in montosis graciliorem, in profundo albam, aliquatenus aromaticam, graueolentem, & dulcem. Chamæleon niger & ipse foliis scolymo similis est, minora tamen & tenuiora, & robustiora hæc habet. Caulem emittit digitali crassitudine, dodrantalem, subrubrum, qui umbellam gerit, & flores spinosos, tenues, hyacinthi æmulos, varios, radix crassa, nigra, densa, quandoque etiam corrofa, quæ dissecta subflaua est, & commanducata mordax. Prouenit in campestribus, siccis & cliuosis tractibus & maritimis. Plinius de iisdem hæc prodidit. Chamæleonem aliqui Ixiam vocant. Duo genera eius. Candidiora, asperiora folia habet, serpit in terra echini modo spinas erigens, radice dulci, odore suauissimo. Quibusdam in locis viscum gignit album, sub alis foliorum, maximè circa canis ortum, quo modo thura nasci dicuntur: vnde & Ixias appellatur. Hoc vt mastiche vtuntur mulieres.

Locus.

Lib. 22. c. 18

Quare & Chamæleon vocetur, varietate foliorum euenit: mutat enim cum terra colores, hic niger, illic viridis, alibi cyaneus, aliubi croceus, atque aliis coloribus. Et paulò post. Ex nigris marem dixere cui flos purpureus esset, & fœminam cui violaceus. Vno nascuntur caule cubitali, crassitudine digitali. Theophrastus de vtroque Chamæleone hæc quoque Dioscoridi consentanea literis mandauit. χαμαιλέον διὲ ὁ μὲν λευκός, ὁ δὲ μέλας. αὐτὸ δὲ λινάμεις τῶν ῥίζων, καὶ αὐτὰ ὃ αὐτοῖς ῥίζαι τοῖς εἰδῶσι διαφόροι. τὸ μὲν γὰρ λευκὴ καὶ γλυκύτα, & παχέστα, καὶ ὁσμὴν ἔχουσα βαρεῖται. Et paulò post. φέρεται διὲ ὁμοίως πανταχοῦ, καὶ ἔχει τὸ φύλλον ὁμοιον σκολύμῳ, μετρίον ὃ, αὐτὸ δὲ πρὸς τῇ γῇ, τὴν δὲ κεφαλὴν ἔχει ὁμοίαν ἀγροῦ, μεγάλων οἱ δὲ ἀκτῶν χαλδῶσιν. ὁ δὲ μέλας τὸ μὲν φύλλον παρόμοιος: σκολυμῶδες γὰρ ἔχει (non σκολυμῶδες, vt habetur in vulgatis exemplaribus) πλὴν ἔλαττον καὶ λειότερον (λεπότερον ex Dioscoride) αὐτὸς ὃ ὅσος ἔστιν (lege ἔχει) ὥσπερ σκιάδιον. ἡ δὲ ῥίζα παχέστα, & μέλαινα διαρραγέτω διὲ, ὑπόξανθος. φέρεται ὃ χροεὶ ψυχρῇ, καὶ ἀργῇ. Id est, Chamæleon quidam est albus, alter niger, radicem facultates, atq; ipsa etiam radices specie differunt: illius enim radix alba est, dulcis, & grauis odoris.

Lib. 9. hist.
cap. 13.

Nascitur

Nascitur similiter multis locis, foliūque habet scolymo simile, sed maius, & terre proximum, caput autem magnū acano simile, quod nonnulli acanum vocant. Niger simili est folio, scilicet scolymi, sed minore & tenuiore. Tota planta habet veluti umbellam, radix crassa est, nigra, & disrūpta, subflaua. Locis gaudet frigidis & incultis. Gaza non ἀργά, sed ὑγρὰ legit, id est, humida, cui contradicit Dioscorides scribens plantam istam in campestribus & siccis locis prouenire. Idem Theophrastus alio in loco Chamæleonem album ἑξίνην appellat, quam Carduum pineam interpretatus est Gaza, ratus forasae diuersam hīc à Chamæleonis genere plātam describi. At si quis plantas istas diligentius expendat, & Theophrasti locos conferat, rem aliter habere comperiet. Nam Chamæleonis facta mentione, alteram eius speciem, nimirum Ixinein accuratè omnibus suis partibus delineat, præterquam radice, quæ velut hīc omīssa luculenter declaratur loco suprā adducto. Quod autem Ixine, vel, ut in Dioscoride legitur, Ixia, Chamæleon sit albus, eius historia fidē facit, tum ex Theophrasto iam descripta, tum ex his eiusdem verbis. ἡ δὲ ἑξίνη φύεται μὲν ἐν πολλὰς χού, lege φύεται μὲν ομοίως πολλὰς χού, ut & loco iam citato) ῥιζόφυλλον δὲ ἔχει, ἀπὸ τῆς ῥίζης μέσης δὲ σπερματικὸς ἀκανὸς ἐπιπέφυκεν, ὥσπερ μῆλον, εἰ μάλ᾽ ἐπικεκρυμμένον ἐπὶ τῶν φύλλων, οὗτος δὲ ἐπὶ τῷ ἄκρου φέρει τὸ δάκρυον ἕως ὅσον, καὶ τοῦτο ἐστὶν ἡ ἀκρότης καὶ ἡ μαστίχη. emenda, ἡ ἀκροθιὴ μαστίχη, quod confirmat Plinius, ut diximus. Id est, Chamæleon albus æquē locis multis nascitur, à radice folia emittit, ex qua media feminibus grauis acanus veluti malum exoritur, in foliis ipsis absconditus. (Videtur Theophrastus hīc acanum dicere spinosum & echinatum caput carduorum, quod Dioscorides nunc echinū vocat, nunc ἀκανθώδη κεφαλὴν, nisi fortè pro ἀκανθὸν legendum sit ἔχθος.) Hīc lacrymam ori gratam parte summa profert, quæ est acanthice mastiche. Qui hos duos Theophrasti locos cum Chamæleonis albi historia à Dioscoride tradita contulerit, vnam & eandem plantam ab utroque describi iudicabit: hodie periti herbarij Carlinam esse credunt. Hæc, inquit Dalechampius, vbitis in Allobrogum montibus frequens est, Diensibus Chardouffe dicta, quasi

Lib. 3. c. 9.

Lib. 3. hist. cap. 4.

Lib. 6. hist. cap. 4.

CHAMÆLEON Albus,
Matthioli.



Carduus siluestris, radice longa, crassa, subrufo, cum gustatur principio fatua, mox subdulci, tandem acri, foliis latis, albis, aculeatis, humi iacentibus. ex horum medio absque caule echinus prodit, cynaræ capitibus similis, in metam fastigiatus, cōpactili squamarum pungentium aceruo horridus, quo exsecto, sicuti & diuulsis eius laminulis succus lacteus manat, vis i aut glutinis modo lentus ac tenax, sic contrectantium manibus inhærescens, ut vix detergatur, ut ab eo ixiæ meritò dici possit. Flos purpurascit, quo dilapso hiat echinus, papporumque densam lanuginem media orbis sui area complectitur, quæ in auras auolat. Semen cnico. simile est. Huius echinos adhuc cōpressos priusquā floreat, indigenæ detractis corticosisvnguibus, structilique laminularum serie reuulsâ, concidunt in orbes, & raporum ritu in cibos coquunt, vel cum butyro in pfunis, vel super foculo parant, sale & pipere condiunt, gustu multò quidē palato suauiore & lautiore, quàm echinorum cynaræ, vel scolymi satiui. Quare cum tam vulgaris sit in ea regione hīc cibus, sentiendum

*CHAMÆLEON Niger,**Math. & Fuch.*

Lib. 4. C. 68.

In cap. 9.
lib. 3.

In Aduers.

*CHAMÆLEON Niger,**alter Math.*

fatorum marginibus obuium & frequentem esse hunc Carduum, figura & foliis Carlinæ, sed retusioribus laciniis, minoribus. Flores purpurantes, & capitula Carlinæ vulgaris, caule carentes, in pappos euanescentes. Semen Cnico simile. Radices aliquantulum rubescentes, grauiſſimi odoris. Augusto mense floret. Tragus pinxit alium

sentiendum viscidū hunc echinati capitis lentorem minimè venenatum, neque exitiosum esse, cum citra noxam cum sui globi frustulis comedatur, vel Allobrogū Chamæleonē innocentiorē esse quā Græcorum, vel igne, præparatione, conditura maleficam eius vim obtundi. Plerisque herbariis & Officinis ferè omnibus persuasum est, duplicem esse Carlinam, aliam caule carentem, aliam caule donatam, quam Leucacantham facit Dodonæus: Matthioli & Fuchsii nigrum Chamæleonta. Sed si uti nos, inquit Pena, vtriusq; radices, & vtriusque gummi subflauum, vermiculosum, nonnihil pellucidum, odore viroso, gustu & visu explorassent: demūque eadem radice & flore, caulēque donatam, alias verò caule carentes: & alibi etiam proximè copiosè enatas, partim caule viduas, partim vtrōque præditas obseruassent, volentes sententiam mutassent. Id se expendisse ait non procul ab arido & gelido dicto D. Bernardi monte, atque etiam via qua Ispurgo itur Tridentum locis lapidosis & siccis. Quare herbariorum Carlinam varietate non genere duplicem, non esse Leucacantham, sed Chamæleonem album Dioscoridis esse censer. Matthioli aliam Chamæleonis nigri iconem exhibuit à Marantha Neapoli ad se missam, quæ tamen, inquit, umbellas similibus Hyacinthi floribus scatentes proferat, cum tamen folia rubris maculis distincta non sint, cum minimè rubeat caulis, cum mansa radix nullo modo sit acris, non exesa, non flauescens, nec caules digitali crassitudine, hanc plantam genuinum Chamæleonem nigrum esse minimè putat. Sed hæ notæ ne illiquidem insunt, quam Chamæleonem nigrum ipsemet statuit. Tragus Carlinam Officinarum, Chamæleonem vulgarem nigrum facit, alterum & exiguum eius genus sine caule, Cordus Chamæleonem album, Lobellius Carduum *αχυνον* Septentrionalium. Vbique ferè prouenit, inquit Tragus, potissimum in asperis montibus, ac forti albaq; terra, radice, foliis & semine Chamæleonti vulgari simile, sed minùs. Flos eius aculeatus & purpureus humi procumbit, & caule caret. Lobellius scribit Angliæ collibus, Picardiæ & Gallobelgij

CHAMÆLEON *Exiguus*,
Tragi, Dalech.



CHAMÆLEON
verus Niger, Dalech.



aliū verum Chamæleonem nigrum, pallidulis cæterisque carduis similibus floribus, semine oblongo & capillato. Chamæleonem nigrum in Gallia nusquam reperit Dalechampius, sed ex eius planta integerrima ex Calabria à Reinerio Solenandro viro humanissimo & doctissimo medico delata, illiq; dono data, effigies hæc ad viuū expressa est. Radix illi palmum longa erat, digitum crassa, foris nigra, & qua lacerata hiabat, intus flauescens: folia Chamæleonis albi, angustiora, minora, tenuiora, caulis dimidio pede non procerior, in cuius summo umbella floris purpurei splendebat, Hyacinthi colorem prorsus æmulantis, nisi candor eximius intermiseretur, & quamuis exaruisset, viuidū suū nitorem retinentis, absque echino globosove capite, quod videlicet ex omnibus plantis quibus aculeata folia sunt, id peculiare sortitus est Chamæleon, vt citra echinatum verticē flos emicet auctore Theophrasto duobus in locis, in quibus tamen litera adeo deprauata est, vt ex ea rectus sensus vix elici possit. Prior locus is est,

Lib. 6. hist.
cap. 3.

Ἀλλὰ ὅτι γὰρ τοιαῦτα πάντων, ὅσον ἀκονίτα, λαβυράχνη, χαλκίος, κνήκος, πολυάχνητος, ἀψαυλὶς, δονόπυξος, ἰξίνη, χαμαιλέων, πλὴν οὗτος οὐ φυλλάχνητος, σκόδυμος, ἢ λετμονία, φυλλάχνητα καὶ ἑτέρα. In quo cum de Phyllacanthi loquatur, & Chamæleonem foliis aculeatis esse ex Dioscoride constet, falso οὐ φυλλάχνητος dicitur. Quare legit Dalechampius per parenthesis (πλὴν οὗτος φυλλάχνητος ἐκ ἀκονίτι) σκόδυμος, &c. Alter locus est. Ἐρκώδης ὅτι ἐδωδέμιος ἢ τοῦ ὄγκου κύσις, ἐκ ἀκονίτωσης, ἀλλὰ προμήκης. καὶ τοῦτο ἴδιον μόνον ἔχει τῶν φυλλαχνητῶν, ἀνίστραμμένος ἢ ὁ χαμαιλέων. ὁ μὲν γὰρ ἀφυλλάχνητος ὢν ἀκονίτι. quæ sic restituit Dalechampius. ὁ μὲν γὰρ φυλλάχνητος ὢν, ἐκ ἀκονίτι. Illi tamē corruptæ lectioni subscripsit Plinius scribens, Chamæleon in foliis nō habet aculeos, &c. Sed error is vnicus non fuit: nam pro Cnico Cnidos ibidē, & bis Helxine pro vxine legitur. Diuersum à superiore Chamæleonem pinxit Clusius, quem Salmaticensem vocat. Planta est, inquit, ex Acanaceorum genere, caule pedali, interdum etiam cubitali, multis alis siue ramis concauo, & quasi foliato, duro tamen & fir-


Lib. 6. hist.
cap. 4.

Lib. 21. c. 16.

Lib. 2. stir.
Hispa. c. 79

mo: folia numerosa, longa, angusta, candicantia, spinis horrida: summis ramis veluti umbellæ ex quinque aut sex caliculis seu capitulis spinosis constantes innascuntur, in quibus flos purpureus dilutior, qui maturo semine in pappos euanesceat, reliquorum Acanaceorum more: semen Cnici, minus, dulce, intus candidū, foris subnigrum aut cinereum: radix nigra, dura, dulcis si mandatur Tota plāta firmis spinis vndique riget. Agro Salmanticēsi frequens. Floret Iulio, semē Augusto maturum.

HHH

CHAMÆLEON *Salman-*
ticensis, Clusj.

Lib. 3. c. 8.

Vires &
*Temper.*PICNOMON CRETÆ
Salonenfis, Pena & Lobellij.Lib. 9. hist.
cap. 13.

πρὸς τὴν ἔλμυντα τὴν πλάστιαν, ὅταν ἀταφίδια προφάγῃ τῶινεν (lege τῶινεν διέν) ἐπιζύουσα ταύτην, ὅσον ὀξύβαρον ἐν οἴνῳ αὐστηρῷ. ἀναρῆσι δὲ καὶ κύνα, καὶ σὺν κύνᾳ μὲν ἐν ἀλφίτοις ἀναφυραθεῖται (μῆ) ἐλαίᾳ καὶ ὕδατος: σὺν δὲ μῆ) ραφάνων μεγνυμένη τῶν ὀρεῖων. γυναικὶ δὲ διδόναι ἐν τρυγῇ γλυκεῖα, καὶ ἐν οἷ γλυκεῖα, καὶ ἐὰν βύληται τις ἀσθενεὺς ἄνθρωπος διαπειράσθαι βιώσιμος,

Vocatur à Salmanticēfibus Chamæleon, & eum referre videtur quem Anguillara pro Chamæleone nigro Dioscoridis proponit. Verùm historia non respondet. Huc fortasse Chamæleonis nigri speciem referemus Carduum pusillum & rarum, qui in planitie illa, quæ est inter Arelatem & Salonam, & Creta Salonensis dicitur, provenit, ideo à Pena & Lobellio Picnomos Cretæ Salonensis nuncupatus. Radice est exigua, mansu glutinosi quidpiam præferente, foliis longis, secus longitudinem cauli adhærentibus, Chamæleontæ Monspeliensis modo, sed nagustiorib⁹, in ramis magnitudine Calcitræ, & illius modo in ambitu sparsis, spinosis, longisque aculeis adeo stipatis, vt arrepturo nihil pateat aditus: flosculi senetionis æmuli, sed maiores in oblongis, spinosis & tomētosis capitulis: semen exiguum, Cnico simile, paleaceum. Picnomon esse nō asseuerat Pena, sed quia plāta est spinis munitissima, significationi alludentes ita vocavit. Radix Chamæleonis albi, vt docet Dioscorides, acetabuli mensura pota latos lumbricos expellit, bibitur autē in vino austero cum origani decocto. Hydropicis cōmodē datur drachmæ pōdere cum vino ipsos enim extenuat. Decoctum eius contra vrinæ difficultatem propinatur. pro theriaca est cum vino pota. Occidit canes & fues: mures item necat subacta cum polenta, aut hydrelæo madefacta. Chamæleonis nigri radix trita admixto modico chalcantio, cedrino oleo & axungia, scabiem abigit, deterget impetigines sulfure & bitumine additis, cocta in aceto & illita. Decoctū collutione dentium dolores sedat. cum pari pipere & cera radix dentibus oblita, ipsis dolētibus auxiliatur. fouentur etiā dentes ipsa cocta in aceto & affusa. dolenti denti per scalpellum calida admota ipsum frangit. maculas cutis in facie à sole contractas expurgat, & vitiliginēs cum sulfure. Miscetur & medicamentis erodentibus, phagadenica vlcera feraq; in cataplasmate imposita extirpat ac sanat. Theophrastus de harū radicum facultatibus hæc prodidit, primū de Chamæleonis albi radice. χρῆσθαι δὲ, φασὶ, πρὸς τοὺς ῥοῦς, ὅταν ἐψηθῇ καὶ καταθῇ μετὰ ὄσπερ ραφανὶς ἐνειλωμένη (lege ἐνηλωμένη) ἐφ' ὀλοχοῖν, καὶ

βιάσιμος, λούην κελύουσιν ἥμερας, καὶ πρὸς περὶ πρὸς ἐνέργειαν, βιάσιμος. Deinde de nigri Chamæleonis radice. Δύναται ὁ λέραν. ἐξελάνειν ἐν ὁρῇ τριβόμενος, καὶ τριβέεις ἐπαλειφόμενος, καὶ ἄλφον ὡς αὐτὸς ἀναιρεῖ δὲ καὶ τὸς κύνας. Id est, Chamæleonis albi radix ad fluxiones utilis esse traditur, cōcisa raphani modo, & iunco velut clauo transfixa ac decocta: & aduersus latos lumbricos cum vna passa acetabuli mensura in vino austero pota. Occidit & canes & sues. Canes in polëta subacta cum aqua & oleo, sues mixta cum brassica mōtana. (Quæ sequuntur, Mulieri datur ex fece vini pasci, aut ex vino passo, Gaza non expressit, fortasse ea notha ac suppositicia esse ratus.) Quòd si quis experiri voluerit, moriturus sit æger nec ne, præcipiunt ea radice lauandum triduo, quòd si tolerauerit moriturum negant. Nigri Chamæleonis radix in aceto trita & illita lepram & vitiligines. exterit. Occidit & canes. Plinius partim ex Dioscoride, partim ex Theophrasto hæc exscripsit. Chamæleon cādidas hydropicos iuuat succo radicis decocta. Bibitur drachma in passo. Pellit & interaneorum animalia acetabuli mensura succi eiusdem in vino austero cum origani succo. Facit ad difficultatem vrinæ. Hic succus occidit canes, suesque in polëta addita aqua & oleo. Contrahit in semures, ac necat, nisi protinus aquam sorbeant. Radicem eius aliqui cōcisa seruati iubent funiculis pendente, decoquuntq; in cibo contra fluxiones, quas Græci rheumatismos vocant. Et mox de nigris addit. Radicibus eorum lichenes curantur, cum sulphure & bitumine vna cōctis: commanducatis verò dentes mobiles, aut in aceto decoctis. Succo scabiem etiam quadrupedum sanant, & ricinos canum necant, iuuēcas quoq; anginae modo: quare à quibusdam Vlophonon, vocatur, & Cynozolon, propter grauitatem odoris. Ferunt & hæc viscum vlceribus vtilissimum. Omnium autem generum eorum radices scorpionibus aduersantur. Atq; hoc postremum videtur innuere, quod Dioscorides theriacam esse dixit. Cum origani verò succo bibi ait, quod Dioscor. dixit, μετὰ δερμάτιν ἀποζέματος, quibus cum origani decocto bibendum esse significatur. Galenus de iisdem radicibus hæc scribit. Nigri Chamæleonis radicē lethale quidpiam habere: quamobrem foris vsum eius ad psoras adhiberi, & lichenas, & vitiligines, & in summa quæ detersionem postulant. Præterea digerentibus & emollientibus pharmacis commisceri, & phagædenica vlcera illitam sanare: esse enim siccam tertio ordine, calefacere secundo completo. Porro albi Chamæleonis radicē potui dari cum vino austero mensura oxybaphi contra latos lumbricos: exhiberi etiam aqua intercutem laborantibus, ad similitudinemque habere temperiem ipsius nigri radici, nisi quòd hac illa amarior sit. Paulus quoque, Oribasius, & Aëtius tradunt Chamæleonis nigri radicē si intra corpus sumatur, veneni loco esse, & cetera eadem quæ Galenus. At Dioscorid. Theophrastus, Plinius neutrius venenatam esse radicem dixerunt. Neque enim venenatam eam esse intelligas, quæ canes, sues, & mures perimat. Quædam enim sunt iis animalibus noxia, quæ nobis salutaria sunt: nam eandem ad pellendas latas interaneorum tineas propinant: item hydropicis, & contra difficultatem vrinæ. Præterea Dioscorides de Chamæleone albo tractans, Ixiam venenum esse non ait, neq; Theophrastus, cum scribit, ἔχει δὲ δάκρυον καὶ ἡ ἰξία ἢ ἐν κρήνῃ. Id est, Lacrymam fundit Chamæleon albus, qui in Creta nascitur. Sed Dioscorid. de venenis agens, Ixiæ veneni incommoda & noxias vires, & remedia tradit ex Nicandro, qui ἰξίον ἐλοφόνον vocat. Eius scholiastæ fides habenda nō est, qui Ixiam genus blattæ esse scribit, quod sit colore nigrum, odore verò in potu ocimi semini simile, quum apertè Dioscor. viscum esse dicat quod ad radices Chamæleonis albi reperitur. At Paulus & Aëtius de venenis tractantes, cum de vtriusq; Chamæleonis veneno & curatione dixissent, seorsum de Ixiæ veneno eadem quæ Dioscorides retulerūt. Cum verò Chamæleon albus Ixiæ nominetur, ob viscidū illud gummi, quod ex radicibus manat, num etiā Chamæleonis nigri radices gummi fundunt: vt quæ de Ixiæ veneno veteres literis

Lib. 22. c. 18.

Lib. 8. sim.

Lib. 7.
Lib. 15.
Lib. 1.Lib. 9. hist.
cap. 1.

In cap. 21.
lib. 6.

Lib. 6.

Lib. 22. c. 18

fol. 367.

Lib. 3. c. 9.

mandarunt, ad succum etiam è radicibus Chamæleonis nigri pertineant. Matthi-
 ulus non solum Ixiæ nomenclaturam vtriq; Chamæleoni communem esse scribit,
 quod vterq; gummi visco simile proferat, sed etiam Ixiam Dioscoridi de venenis
 agenti, nihil aliud esse quam Chamæleonem nigrum. Idem cum Carlinam in cau-
 lem assurgentem nigrum esse Chamæleonem sibi persuaferit, vè ex vtriusque radi-
 ce gummi exudare ex quorundam Cretenesium oratione in vtraque Carlina id cõ-
 crescere narrantium, asserere nõ dubitauit. Quod verò Ixia Dioscor. Chamæleon
 niger sit, haud verum est: soli enim Chamæleoni albo Dioscor. Ixiæ, Theophra-
 stus Ixiæ & Ixines appellatione perspicue tribuerunt, nusquam Chamæleoni nigro:
 quorum auctoritas maioris apud omnes ponderis esse debet, quam nothæ illæ ac
 supposititiæ Ixiæ appellationes, & Plinij oratio quæ est eiusmodi. Ferunt & hæc, in-
 quit, viscum vlceribus vtilissimum. Quæ verba cum de Chamæleonum generibus,
 de quibus promiscue supra tractauerat, citra distinctionem proferuntur, vtriq; Cha-
 mæleoni videntur viscum assignare. Quod Ruellium mouit vt eum locum aliter
 quam est in Plinij codice citaret ad hunc modum. Chamæleonem etiam nigrum
 ferre viscum vlceribus vtilissimum Plinius commemorat. Verum hæc de albo, nõ de
 nigro, audienda esse ex iis quæ diximus perspicuum est. His adde Penæ periti Her-
 barij sententiam, qui gummi quod Ixia dicitur, è Carlinæ caule carentis, & caule do-
 natæ radice exudare virosum, & gustu ingratum se cerò scire affirmat, venenũ sit
 nec ne, nondum compertum habere. Id etiam asserit non nisi vnam esse plantam
 vtramque Carlinam, vt dictum est, neque etiam Dioscoridem viscum vllum agno-
 scere in verò Chamæleone nigro. Ixiam Græcorum Plinius locis quamplurimis vi-
 scum conuertit. In causâ fortasse fuit vtriusque consimilis lentor, inquit Ruellius.
 Nam sicut viscum cuiuscumq; rei cui hæserit, tenax est, ita si deuoretur Ixias, omnia
 glutinat interanea, omnesq; contrahit recrementorum exitus, & colligat. Sic forsi-
 tan cum pro veneno Pliniũ Latina defecisset appellatio, maluit vti largiuscula no-
 minis ambage, quam vel Græcam sequi, vel nouam effingere nomenclaturam. Hoc
 vtiq; pacto Plinius ab erroris suspitione posset vindicari, quanquam Scribonius
 Largus antiquior eo, Græco contentus vocabulo, libellis suis Ixiæ vocem satis pro-
 triuerat. Quare nomen hoc *ἀμύλλον* ad viscum arboreum, & aucupis dicatum vi-
 tio non caret, cum pugnent viribus viscum & Ixia, sitq; viscum in remediorum,
 Ixia verò in venenorum censu numerandum. Id quod pridem obseruauit doctissi-
 mus Leoniceus.

ERYNGIVM,

CAP. VIII.

Nomina



PΥΓΓΙΟΝ Græcis & *ἐρύγγιον*, Latinis Eryngium, Officinis corru-
 pro vocabulo Iringus vocatur. Plerique etiam Centumcapita nomi-
 nant, à numero nimirum capitũ quæ in summo obtinet. Vnde Galli
 Eryngium vulgare vocant *Chardon à cent testes*. Græci philosophi, in-
 quit Pena, Eryngium quasi *ἐρύγγιον*, id est, ructum, dictum autumat, quòd capræ quæ
 morfu surculum Eryngij præciderint, vel deglutierint, cunctum gregem ponẽ se-
 quentem quasi stupore attonitum sistunt, donec Eryngium ructu reiecerint. Dio-
 scorides Eryngij vnus meminit. Plinius scribit aliud esse albicans, aliud nigrum: &
 satium quidem esse, & spòte nasci in asperis & saxosis: & in litoribus maris durius
 nigriusq; folio apij. Ex his cãdidum à Romanis Centumcapita vocari. Sunt, inquit,
 qui & acanon Eryngio adscribãt, spinosam, breuemq; ac latam herbam, spinisq; la-
 toribus. Recentiores quoq; herbarij aliquot Eryngij genera obseruauerunt, ducti si-
 militudine quæ illis est cum Eryngij descriptione à Dioscoride tradita. Est autem
 huiusmodi. In aculeatarum stirpium genere est Eryngium, cuius folia initio sale
 condita olerum modo comeduntur. Sunt autẽ lata, & in ambitu aspera, gustu odo-
 rata. quum verò adolescunt, in multis caulium eminctiis spinis aculeatur, in quorũ
 summita

Lib. 3. c. 21.

Genera.

Lib. 2. c. 7.

8. & 9.

Lib. 3. c. 21.

Forma.

ERYNGIVM *Montanum*,*Matthioli.*ERYNGIVM *Marinum*,*Matthioli.*

καὶ ἀποφύσκει ἕτερον, ὁ σπερὶ ὁ κνήκος. ἐν τῇ αὐτῇ γένει ἕτερον ἐξ ἄκρου, καὶ ἄλλοτερον τὸ ῥύθρον. Quæ sic Plinius conuertit. Est & illa differentia, quod quædam in iis multicaulia ramosaque sunt, ut carduus. Vno autem caule, nec ramosum, cnicos. Quædam cacumine tantum spinosa sunt, ut Eryngium. Ex quibus intelligere licet legendum esse, καὶ ἀποφύσκει

summitatibus globosa capita duriorum acutifimarumque spinarum ambitu stellæ instar circumuallantur, quorum color modò viridis, aut candidus, interdum cæruleus inuenitur. Radix illi oblôga, lata, foris nigra, intus alba, pollicis crassitudine, & ipsa odorata, & aromatica. Nascitur in asperis & campestribus. Hæc quamuis satis dilucida sit à Dioscoride tradita delineatio, quodnam tamen Eryngium propiùs repræsentet, nondum inter herbarios constat. Aliis enim Eryngium cæstre designari placet: aliis Eryngium marinum indicij omnibus propiùs exprimi, quod Dalechapius luculenter sic descripsit. In litoribus & sabulosis, quæ exundâs maris fluctus irrigat, sæpius hoc crescit: radice dulci, ex interuallis geniculata, decem duodecim uel pedes longa, & nonnumquam longiore, ut integrâ extirpare vix liceat: folio magno, lato, subrotundo, albicâte, crasso, per ambitum insecto, & spinoso, cum manditur suauius olente: caule pedali, rotundo, ima parte rubente: in cuius cacumine globosa capitula, pilulæ forma, nucis magnitudine, aculeis horrida protuberant, circumfusus exiguis floribus, tractu nostro cæruleis, quinis, senis uel foliolis spinosis, in orbem subtus muricato spiculorum vallo stellæ modo radiantibus, colore quoque cæruleo, quem caulibus, floribus, foliorum colore in aliis regionibus variare quidam asserunt, quibus assentitur ille, sed quale Eryngium in maritimis nostris vidit, tale & descripsit in eorum gratiam qui procul à mari absunt. Hoc Eryngium Plinius in litoribus maris folio apij esse dixit, quod aut falsum est, aut deprauati codices, ut pro σκαλίμου, σκλίνε, id est, apij folia, alicubi legisse videatur. Apud Theophrastum quo loco aculeatarum stirpium differentias ex caulium ramorumque numero ac situ inuestigat, ῥύθρον, vel, ut Gaza legit, ῥύθρον mendo sè pro ἐρύθρον exaratum est, quod ex Pliniana loci illius Theophrasti interpretatione facillè demonstratur: quanquam Plinius mentem illius non omnino expresserit, neque is Theophrasti locus ex Plinij conuersione integer esse deprehendatur. Multis igitur enumeratis spinosis herbis subiungit Theophrastus. Διαφέρουσιν δὲ ἄλλῃ- λων πρὸς τοῖς Εἰρημένοις, τῷ τε μὲν πολυκαυλῶς ἕναι, καὶ ἀποφύσκει ἕτερον, ὁ σπερὶ ὁ κνήκος. ἐν τῇ αὐτῇ γένει ἕτερον ἐξ ἄκρου, καὶ ἄλλοτερον τὸ ῥύθρον. Quæ sic Plinius conuertit. Est & illa differentia, quod quædam in iis multicaulia ramosaque sunt, ut carduus. Vno autem caule, nec ramosum, cnicos. Quædam cacumine tantum spinosa sunt, ut Eryngium. Ex quibus intelligere licet legendum esse, καὶ ἀποφύσκει

*Locus.*Fuchf. cap.
III. hist.
Pena In
Aduers.Eryng. Ma-
rinum.

Lib. 12. c. 7.

Lib. 6. hist.
cap. 3.

Lib. 1. c. 6.

ἔχεν, ὡς περὶ ὁ σκόδυμος, καὶ διὰ μονοκαυλῶς, καὶ ἀπορούσης ἐκ ἑχονία, ὡς περὶ ὁ κνήκος, & pro
 ῥύθρος legendum ἐρύγιον: Plinium tamen non rectè dixisse, quædam cacumine tan-
 tum spinosa esse: dicendum enim fuerat, quædam cacumine tantum ramos & adna-
 ta fundere, quemadmodum Eryngium. Eryngium montanum in salebrosis mon-

Locus.

Forma.

*ERYNGIUM aliud monta-
 num, Dalecham.*



*ERYNGIUM Planum,
 Matthioli.*

Lib. 6. c. 16.



*Lib. 2. stir.
 Hisp. c. 32.*

tibus nascitur: foliis multis, à radice prodeunti-
 bus, venosis, amplis, in ambitu crenatis, & leui-
 ter pungentibus, vrticæ similibus, albicantibus,
 longo pediculo subnixis: caule sesquipedali, vir-
 gato, quæ furculi echinos sustinentes prodeunt,
 foliis oblongis & valde muricatis stellatim co-
 ronato: echinis ovo similibus, foliorum spino-
 forum vallo munitis albæ spinæ modo, quod
 huic carduo peculiare est: dum maturefcunt cæ-
 ruleo colore nitentibus: radice ferè Helenij, fo-
 ris nigra, intus candida, odorata, gustu Eryngij.
 Aliud Eryngium montanum recentiores fecere,
 scilicet Crithmum quartum Matthioli. Nascitur
 in Bohemia inter segetes, in agrorū marginibus
 & secus vias, foliis lōgis, angustis, firmis ternis
 ex pediculo longo prodeuntibus, vtrinque
 denticulatis, iis quæ in summis caulibus sunt mi-
 noribus & breuioribus. Caulē habet ramosum,
 alis cōcauum, geniculatum, in summo alis diui-
 sum, in quibus floridæ albicantēsq; umbellæ,
 in eis semen oblongum, paruum, acre, odoratū.
 Radix siluestri haud absumilis est, minor tamē,
 sapore primū dulci, deinde acri & odorato.
 Hæc Matthiolus. Pena scribit gustu & odore
 esse Eryngij, radice simili, Crithmo dissimili. In
 Flādria prouenire scribit Lobellius. Aëtius aliud
 Eryngium montanum describit, foliis angustis
 & paruis, floribus aureis, & oculorum speciem
 præbentibus, ex cuius radice pharmacum cōfi-
 cit, quod qui per anni spatium sumpserit, à co-
 mitiali morbo non corripitur. Huius Eryngij
 folia non solūm contactu, sed etiam propē ad-
 mota, vi prorsus admirabili salamandras aqua-
 rिकास interficiūt. Matthiolus Eryngium aliud
 pictum dedit, quod planum vocat, omisā prorsus
 eius descriptione. Potest Eryngium læue di-
 ci. Ciusus aliud exhibuit, quod pumilum appel-
 lat: tenuifolium etiam dici potest. Hoc passim
 ferè in agro Salmanticēsi in colliculis nascitur,
 palmi, nonnunquam pedis altitudine, caule gra-
 cili, multis alis brachiato: folia secundū radicē
 maiuscula, latiuscula & molliora, circa radicem
 rotæ instar humi sparguntur: sed quæ in ipso
 caule sunt sub alis, multifida sunt, tenuia & acu-
 leata: in ramulorum summitatibus globosā ca-
 pitula plerumque octo, spinosorum foliolorum
 ambitu

ambitu stellatim circumuallantur, & ipsa etiam sinuosa sunt: flos & tota capitula cum suis foliis ea ambientibus caerulei sunt coloris: folia statim exsiccantur & decidunt, vt raro plantam cum foliis reperire liceat, praesertim, vbi defloruit: radix lignosa & tenui, quae singulis annis perit. Post messes plerumque inuenitur loco supra dicto. Huic subdendum aliud pusillum Eryngium planum Mutoni ex Lobellio, quod raro ruri, vel in hortis apud Belgas visitur, foliis quam Dipfacus lon-

ERYNGIVM Puntium,
Clusij.



PVSILLVM Eryngium
planum Mutoni, Lobel.



gè minoribus, angustioribus, cauliculis dodrantalibus & pedilibus, anfractuosis, & diuaticatis, in quibus summis & secundum longitudinem flosculi minores quam campestris Eryngij: radix Corruet, aut Asparagi, sed minor multo, perennis. Nusquam se vidisse ait Lobellius, quam in hortis Mutoni. Dioscoridi Eryngij radix calfaciendi vim habet. Pota menses & vrinas pellit: tormina & inflationes discutit: cum vino iocinorosis, venenatorum moribus, & iis qui lethiferum quid hauserunt succurrit. Bibitur aduersus plurima cum staphylini semine pondere drachmae vnus. Appensa & illita tubercula discutere prodit: cum hydromelite pota opisthotonicis, & comitialibus medetur. Plinius, Clara imprimis aculeatarum Eryngium est, contra serpentes, & venenata omnia nascens. Aduersus ictus morsusque radix eius bibitur drachmae pondere in vino: aut si plerumque tales iniurias comitatur febris, ex aqua. Illinitur plagis, peculiariter efficax contra chersydros, ac ranas. Omnibus vero contra toxica, & aconita efficaciorum Heraclides medicus in iure anseris decoctam arbitratur. Apollodorus aduersus toxica cum rana decoquit, caeteri in aqua. Eryngium Galenus, ait caliditate parum, aut nihil, quod temperatum est superare, caeterum non parum habere siccitatem in tenui essentia consistentem. Aetius scribit potum radices decoctum colicis mederi: mulso addito calculos, stillicidia difficultates vrinae, & renum vitia sanare: quod per quindecim iugiter dies & ieiunos, & in lectum ituros bibere oportet. Quod si cum eo sium quoque decoxeris, magis proficies. Afirmabat quidam assiduo Eryngij vsu, nunquam postea minxisse calculos, cum prius eo morbo frequentissime vexaretur.

Li. 22, ca. 7

Li. 6, simpl.

Lib. 1.

Nomina
Lib. 3. ca. 12.
Forma.



Locus.

Ca. 16. hist.

ΚΑΝΘΑ ΔΕΥΚΗ Græcis, Latinis Spina alba, Arabibus *Bedeguar*, folia fert, vt Dioscorides describit, albo Chamæleonti similia, sed angustiora, & candidiora, aliquātum hispida, spinosa, caulem supra bina cubita altum, pollicari, aut ampliori crassitudine, albicantem, intus cauum, in cacumine capitulum inest spinosum, echino marino simile, sed minus, & oblongum, flores purpurei, in quibus semen ceu Cnicum, sed rotundius. nascitur in montibus & siluosis. Diuersi rei herbariæ scriptores diuersas spinosas plantas pro Spina alba proponunt. Fuchsius Spinæ albæ genus vnum esse scribit, quod Carduus Mariæ hodie nominatur, & Spinam albam hortensem appellat. Alterum genus, siluestre, quod Acanthiū ex Dodon. & aliis esse diximus. Alij Spinā albam, Cardui benedictū, vulgò dictū esse putant: alij Carlinā: alij Cynarā aculeatam: alij Scolymum, alij alios siluestres carduos spinis rigētes. Dalechamp. Spinā albā esse arbitratur quæ hīc picta est, notis omnibus à Diosco. traditis ei aptissimè quadrantibus. Gignitur in niuosis, asperis, & lapidosis montibus Allobrogum, locis ad Orientem solem, aut Meridiem couersis, quā celsi montium vertices in cliuosos tractus summittuntur. Planta cubito procerior assurgit, radice pedali, intus candida, foris ex albo flavescente, parum surculosa, gustu adstringente: caule anguloso, supernè ramoso, inani, pollicis crassitudine: foliis Chamæleonis albi, candidioribus, angustioribus, altius incisfis, spinosis, subhirsutis: echinis oblongis, ouatis, aculeis

SPINA Alba, Dalechampij.

SPINA Alba, Matthioli.



innumeris rigentibus, displici fatui echino prorsus similibus, horrido spinarum erectarum vallo cinctis, quod huic vni ac Eryngio cæruleo ex omnibus spinosis plantis ab eo visis peculiare est: aspectu pulcherrino: flore purpureo, in echino sub aculeorum velut radice prodeunte: semine Cnici, minore. Hæc descriptio ex planta viua expressa omnibus notis Spinam albam, ita representat, vt nihil desiderari queat, & eius cognitio herbariorum de Spina alba dissensionem dirimere debeat,

SPINA Alba altera, Matth.



debeat, ac in posterum medicamentarios docere syrupo de Eupatorio indendā. Matthi-
 ulus legitimam Spinam albam Patauio à Cortu-
 so ad se missam ait, quā hīc expressimus. Hæc,
 inquit, Spinā albā Diosc. notis, omnibus, quas
 modò ex eo recensuimus, refert. Est & altera
 planta aculeata, inquit, cuius iconem hīc exhi-
 bemus, quam quidam Spinam albam esse cen-
 sent: sed multa in hac desiderātur. Hanc tamen
 depinxit Pena, nomine Spinæ albæ, quā in hor-
 to Patauino vidit, indicante Melchiore Guil-
 landino illi præfesto, Carduum scilicet totum
 albidum, infernè albidiorè quàm supernè, ha-
 bentem folia Chamæleonis, minora in regio-
 nibus siccioribus. Nam quem in Anglia scuit
 ille, latiora aliquantò habuisse ait. Fuit quidem
 illi caulis bicubitalis, etiam tricubitalis, digitū
 crassus, & incanus totus: echinos marinis simi-
 les rotundos habuit: quando florent ex albo
 purpurascens, inter quos defluentes sese in
 summo, multò altius erigunt ternæ quater-
 næve, papposæ glumæ cōfertæ rigidis mucro-

natis tunicis, semen claudentibus oblongum, auenæ excorticatæ æquale & simile.
 Hæc, inquit, posterioribus, & accuratioribus peritiorum sententiis omnium ma-
 ximè quadrare videtur Spinæ albæ: semen tamen, cuiusmodi dixit, auenæ aut seca-
 li similis, sed rotundius Cnico. Huius iconem capite de Spina Arabica ostendi-
 mus. Spinæ albæ radix pota, vt tradit Dioscorides, sanguinè expuentibus, stoma-
 chicis, & cœliacis prodest: ciet vrinas: & ad tumores in cataplasmate imponitur.
 Decoctum ipsius in dolore dentium collutum confert. Epotum semen infantibus
 qui conuelluntur, & à serpente demorsis auxiliatur. Aiunt & amuletum ex ipso
 appensum serpentes fugare. Inter Spinarum generā Plinius Spinæ albæ meminit
 his verbis. Spinæ albæ semen contra serpentes auxiliatur. Corona ex ea imposita
 capitis dolores minuit: nec alibi ipsam describit, nisi quod ait, in Papyris & Feru-
 lis, Spinaq; alba caulis ipse pomum est. Galenus scribit Spinæ albæ radicē desicca-
 toriam esse, & modicè adstringentem: quomobrem cœliacos & dysentericos iu-
 uare, & sanguinis reiectiones cohibere, œdemataq; illitu contrahere, ac dentibus
 dolentibus prodesse, si decocto eius colluantur. Semen tenuis essentia & calidæ
 facultatis esse, itaq; potui datum iis qui conuelluntur conuenire.

Vires &
 Temper.
 Lib. 3. c. 12.

Li. 24. c. 12.

Lib. 15. c. 18.

Li. 6. simpl.

LEVCACANTHA,

CAP. X.



ΕΥΚΑΚΑΝΘΑ Græcis, Alba spina Latinis, non solū vocum
 transpositione & compositione ab *εὐκαὶ θαν* soluta compositione,
 idest Spina alba differt, sed etiam re ipsa maximè: quod apertè
 prisci auctores demonstrant, qui seorsum & diuersa de vtraque tra-
 ctant: primis Dioscorides, qui cū ea, quæ suprà diximus, de Acantha leuce tra-
 didisset, aliquantò post de Leucantha hæc breuius, quàm nobis ad eius cogniti-
 onem comparandam necesse fuerat, scripsit. Leucacanthæ radix similis est Cypero,
 amara, valida, vel, vt alij legunt, *πικρὰ ἰσχυρὴς*, idest amara valde. Nec fusiùs Plinius,
 Leucacantha, inquit, quam alij Phyllon, alij Ischiada, alij Polygonatō appellant,
 radice Cyperi, &c. Ex qua breui mentione quæ sit hodie Leucacantha, haud faciliè
 est decer-

Nomina

Lib. 3. ca. 19.

Forma

Li. 22. ca. 16.

In cap. 19.
lib. 3.

CARDVVS Lacteus,
Matthioli.



Lib. 4. c. 68.

Cap. 7.

Lib. 1. ca. 4.

LEUCACANTHA,
quorundam.



Lib. 1. cauf.
cap. 10.

est decernere. Matthiolus Leucacantham fupicatur eſſe aculeatum illum Carduum, cuius folia albis maculis notata ſunt, vnde ab Italis Carduus lacteus nuncupatur, ab aliis Carduus Mariæ. Nam præterquàm quòd coniectura quadam dici poſſet, inquit, ab albis maculis nomen inueniſſe, radicis etiã ipſius tum durities, tum amaritudo, etſi forma cyperi radicem non referat, ſatis cõſentire videtur. Dodonæus Carlinam quæ caulem proſert, pro Leucacantha depinxit & deſcripſit, quam Chamæleonem album eſſe oſtendimus. Aliam quidam pro Leucacantha monſtrant, quæ hîc picta datur. Hæc in agro Valétino Allobrogum, & in agro Seſterienſi, reliquaq; Galloprovincia frequentiſſima naſcitur, agricolis, meſſoribus & viatoribus infeſtiſſima, quòd eorum crura ſpinis ſuis validiſſimis configat, & ſauciet. Seſterienſes *Auriolæ* vocant, à floris aureo colore. Prouenit vbique in aruiſ & ſegetibus, radice ſubnigra, lignoſa, perquàm amara, terete, quaſi geniculorum lineis virgata, cypero ſimili (nam, vt ſcribit Dioſcorides, Cyperi radices nûc rotundæ ſunt, cum quibus Leucacanthæ radicẽ comparare poſſumus, nunc oblongis oliuiſ ſimiles inter ſe cohærent) caulibus ſeſquipedalibus, foliis ferè cyani, oblongis, carnoſis, è cinereo virentibus, prope radicem altiſſimè laciniatis, in extremo caule nihil inciſis, læuibus & exarmatis, flore aureo, ſpinis candidiſſimis (quam ob cauſam Albam ſpinam veteres nominarunt) ſtellatis, myacantho ſimilibus, & pariter, vt in myacantho collocatis, tam rigidis, & ſæuis, vt prætereuntium caligis tranſfixis ſapiſſime tibias dilanient. Huius ſolius & myacanthi folia in carduorum generibus, nullis ſpinis rigent. Monſpelienſes hanc ſpinam Solſtitialem nominant, quòd æſtuo ſolſtitio floreant, atque etiã feriùs. Quidam ἀχάνθη βασιλικήν Theophrati eſſe coniiciunt, id eſt Spinam regiam, quæ ante æſtatem non germinat, conueniente cum huius natura germinationis tempore, & hac inſuper cõiectura, quòd cum Theophrastus alibi τῆς ἀχάνθης βασιλικῆς meminerit, nuſquam mentionem fecerit τῆς λευκακάνθης plantæ veteribus notiſſimæ, & ab altera diuerſæ. Auger &

Lib. 3. c. 19.
Vires &
Temper.

hanc ſuſpitionem, quod legitur in vetuſtiſ Dioſcoridis exẽplaribus, Leucacanthã Spinam quoque regiam nûcupatam fuiſſe. Dioſcorides tradit Leucacanthæ radicem manducatam dentium dolores ſedare. Decoctum ipſius cyathorum trium menſura cum vino potum auxiliari pleuriticis diuturnis, iſchiadicis, ruptis, & conuulſis,

conuulsis:quin & succum radicis potum eadem præstare. Plinius, Leucacanthæ ra-
 dix, inquit, commanducata dentium dolorem sedat: item laterum & lumborum
 vt Hicesius tradit, semine potu drachmis octo, aut succo. Eadē ruptis, conuulsisq;
 medetur. Galēnus Leucacanthi, quam aliqui Polygonatō, alij Ischiada nuncupāt,
 radicem amaram esse scribit, ac proinde incidere & exsiccare tertio ordine, calfa-
 cere autem primo. Leucacanthæ hic depictæ radicibus vtuntur hodie ad tollen-
 das hepatis & lienis obstructions prospero
 succellu: eiusdem succo ad aquam intercutem,
 aquas mirificè per vrinas, ac nonnumquam per
 aluum educente. Aliam Monspeliensēs Leuca-
 cantham vulgò appellant, hîc quoque apposi-
 tam, quam neq; Spinam albam, neque Leuca-
 cantham genuinam esse iudicant periti herba-
 rij. In asperis & saxosis prouenit, radice crassa,
 succosa, modice fibrata, caulibus multis, sesqui-
 pedalibus, ramosis, foliis laciniatis, incanis, la-
 nuginosis, aculeatis, capitulis echinatis, flore
 purpureo, coloris viuidissimi & nitidissimi, in
 pappos abeunte, semine oblongo. Pena nullam
 stirpem propius ad Leucacantham Dioscori-
 dis accedere existimat, quàm Carduum bulbo-
 sum Monspeliensium, qui locis vdis & praten-
 sibus circum Monspeliū frequens oritur in-
 ter Narcissos & Aristolochias, cui folia palmū
 alta, pingua, aut crassiora, in ambitu laciniata
 & ferrata Acanthij modò cernuntur, tenuibus
 spinis ambientibus: caulis binos cubitos altus,
 gracilis, cui in summo capitula, floribus purpu-
 reis stamineis oppleta, semine Cnici, sed mi-
 nore: radices multæ, confertæ, ex vno quasi nodulo aptæ, in multos oblongos glo-
 bulos diductæ, Asphodeli, Cyperivæ modo, mandeti multum glutinis exhibentes,
 nonnihil caloris, & tenuium partium, tamen si amarores penè nihil. Quidam Car-
 duum Triglochina suprà descriptum cap. 3. Leucacantham esse malunt.

LEUCACANTHA

Monspeliensium, Dalech.

In Aduers.

SILYBUM,

CAP. XI.

GRAECIS σίλυβον, Latinis similiter Silybum nominatum, tam breui-
 ter à Dioscoride delineatur, vt pronunciare difficile sit, quænam ex
 nostratibus aculeatis stirpibus hoc nomine sit donanda. Sic enim ille
 scribit. Silybum spina est lata, folia habens Chamæleoni albo similia.
 Et Plinius, Silybum, inquit, Chamæleonti albo similem, æquè spinosam ne in Ci-
 licia quidem, aut Syria, aut Phœnice, vbi nascitur, coquere tanti est: ita operosa
 eius culina traditur. In medicina nullum vsum habet. Quare cùm breuitas ista
 obscuritatē nobis pariat, diuinare potius licet, quàm de eius plantæ aculeatæ no-
 tione certi aliquid statuere. Silybum igitur quidam esse arbitrantur plantā illam
 aculeatam quam Lonicerus nomine Leucacanthæ exhibuit & descripsit, & à Ger-
 manis *Uweisz distel* appellari scripsit, vel ad differentiam Spinæ albæ *Uweiz garten*
distel, *lungk frauen distel*, id est Carduum puellarum, quod in virginum ferta & co-
 ronas veniat, *Zamgarten distel*, id est Carduum fatium horrensem. Spinæ, & in ali-
 quot aliis Germaniæ ciuitatibus inter coronarias plātas magna diligētia in hor-
 tis colitur & seritur à puellis, quæ ex Libanotidis foliis, & huius cardui floribus
 intertextis

Nomina

Lib. 4. c. 153.
Li. & c. 22.

Silybvm, Siue Leucanthæ. Loniceri.



intertextis corollas nectunt. Radice est longa, candida, amara, fibris villosa: caule procero, ramoso, aspero, & aculeatis carduis inter segetes nascentibus simili, altero demum anno post sationem emergente: foliis magnis, latis, Chamæleonti albo non dissimilibus, valde dissectis, spinosis, capitulis perquam multis, spinis rigentibus, flore candido, suauiter olente, semine Cardui benedicti, minore, alba lanugine concluso: cum deperiit flos, tota planta moritur. Folia recentia in acetariis edunt, nec insalubria, nec insuaui. Pena pro Silybo quæ lata spina proditur, non respuendum esse opinatur Carduum lacteum, seu Carduum Mariæ, seu argentatum, de quo infra tractabimus. Est enim foliis prægrandibus, latis, spinosis, maculis & ductibus lacteis, crebris, aspersis, viridibus. Caulis ei bicubitalis, crassus, spinosus, & echino donatus spinis cincto, purpureo flore referto, semen Cnici compressum, lapidi exterdere optimum etiam muliercularum experimeto. Imum caulæ pullulantes delibatum, & radicem in acetariis aliàs se in Italia esitasse ait. Plebeicula muliercu-

larum copiam lactis illius esu prouocat. Dioscorides tradit Silybi radicem cum sale oleoque coctam edi: radice succum drachmæ pondere potum vomitiones mouere. Sed de hoc carduo aliquantò post plura dicemus.

SPINA ARABICA,

CAP. XII.

Nomina



A KANΘA Ἀραβική Græcis, & αἰγυπτία, Spina Arabica, & Ægyptia Latinis dicitur, Mauritanis *Suchaha*. Hanc Spinæ albæ subiicit Dioscorides, non tamen describit, sed similem natura videri ait Spinæ albæ, adstringentem, & ad fluxum muliebrem, ad sanguinis reiectionem, & ad alias fluxiones radicem eius similiter vtilem esse. Plinius Spinæ Ægyptiæ, siue Arabiæ laudes, inquit, in odorum loco diximus: & ipsa spissat adstringitque: destillationes omnes, & sanguinis excreationes, mensiumque abundantiam, etiamnum radice valentior. Ita vetus codex, sed in vulgatis, Ægyptiæ siue, voces desunt. Quæ eadem planè sunt cum iis quæ Dioscorides tradidit, nisi quòd ποῦν γυναικῶν, mensium abundantiam pro fluxu muliebri more suo conuertit. Locus autem quo se Ægyptiæ Spinæ laudes dixisse ait, est is. Nec minus Spina celebratur in eadem gente, duntaxat nigra, quoniam incorrupta etiam in aquis durat, ob id vtilissima nauium costis. Candida faciliè putrescit. Aculeus Spinarum est in foliis, semen in siliquis, quo coria perficiuntur gallæ vice. Flos & coronis iucundus, & medicamentis vtilis. Manat & gummi ex ea, &c. At non satis animaduertit Plinius aliam esse spinam Ægyptiam, ex qua Acacia præparatur, quæque etiam Acacia appellatur, de qua & hoc loco, & capite sequenti agit, scribens, Gummi optimum esse ex Ægyptia Spina conuenit, vermiculatum, &c. Item alio in loco supra à nobis citato, ubi Acaciæ spinam vocat, ab hac spina Arabica quæ etiam Ægyptia vocatur, de qua primo loco à nobis adducto tractat, eique eadem omnia quæ Dioscorides, attribuit, cum tamen hæc herba sit, illa arbor. Galenus quoque scribit spinam Ægyptiā, quā & Arabicam vocant, similem esse Spinæ albæ nostri, verum facultate validius

Lib. 3. ca. 13.

Li. 24. c. 12.

Lib. 3. c. 9.

Ca. 11. li. 13.

Li. 24. c. 12.

Li. 6. simpl.



ne par & angulosus, sed latiora, longiora & ampliora folia, echinus rotundior, rigentium spinarum cinctu non sic vallatus, flos vt in superiore purpureus. Quare cum potestate effectūque, & aliqua ex parte figura conueniant, nemini mirum videri debet Dioscoridem has duas plantas coniunxisse, & tanquam germanas à Mesue in syrapi de Eupatorio compositionem accitas fuisse.

ATRACYLLIS,

CAP. XIII.



ΤΡΑΚΤΥΛΙΣ Græcis, Latinis quoque Atractylis dicitur, *Nomina* quòd ea antiquæ mulieres pro fuso vterentur: *ἀτρακτος* enim fustum significat: quare Gaza fustum agrestem Latine appellauit. Vocatur etia *κνίκος ἀγρία*, id est, Cnicus siluestris, quòd ei similis sit: sic enim Dioscorides descripsit. Atractylis spina est Cnico similis, sed multò longiora folia habens in summo virgularum, caulem etiam magna ex parte nudum asperumque, quo fæminæ pro fuso vtuntur: capitula in cacumine aculeata, florē pallidum, radicem tenuem, & inutile. Hanc Atractylidem quæ ex aculeatis & Acanaceis est, Dalechampiis circa Luteriam & Lugdunum frequentem nasci tradit, in montosis scilicet, aridis, & macris, radice breui, valde fibrata, caule nūc vnico, pedali, & interdum altiore, recto, gracili, nunc multiplici, rotundo, lanuginoso, foliis longis, aculeatis, valde laciniatis, capitulis in summo plantæ vertice echinatis, floribus luteis, semine Cnici, minore. Totius plantæ odor grauis est: de qua hæc Theophrastus prodidit. *Ατρακτυλὶς δὲ τις χαλκίται, ἔλακός τερα πάντων. ἰδιὸν δὲ ἔχει τὸ φύλλον, ὅτι ἀφαιρέμιον, καὶ τῇ ἀρκί προσφερόμιον, αἰμαλώδη ποιεῖ τὸν χυλὸν. διὰ τὸ φόνον ἔνιοι χαλκοῖσι τὴν ἀκάνθαν ταύτην. ἔχει δὲ τὴν ὁσμὴν δάφνης, ἢ φονάδης. ὅψι δὲ καὶ τελεφεῖ τὸν καρπὸν πρὸς τὸ μέλεπυρον.* Id est, Quæ Atractylis vocatur, his (Cnico & Acotua) candidior est. Folium eius id peculiare habet, quòd decerptū, & carni admotū, sanguineum emittit succum: quam ob causam spina hæc à quibusdam nominata est φόνος, id est cruor: grauis etiam odore, cruoremque representans. Serò perficit fructum, scilicet Autumno. Sic vertit Gaza *ἔχει δὲ τὴν ὁσμὴν*, &c. sed auctoris mentem

Li. 3. ca. 91.

Forma.

Lib. 6. hist. ca. 4.

ATRACTYLIS.

Lib. 3. ca. 55.



Lib. I.

ATRACTYLIS flore
purpurea.

mentem affecutus non videtur, sicuti neque Ruellius, qui vertit odore grauis, & pestem denuntians: nam cum quotannis repullulascens odorem suum vibret, oporteret pestilentem quoque luem quotannis hanc minari. Alij exponunt, olere cadaueris trucidari, & in tabu iam marcescentis foetidum virus, quod ad auctoris sensum aptius est, non tamen verum. Atractylis enim resinofum & iniucundum quidpiam spirat, non autem tam abominandum, ac putidum. Mendosus igitur locus est, & sic corrigendus. ἔχει δὲ τὴν ὀσμὴν διψήνην, καὶ δυσώδη, id est graui est, & ingrato odore. Alij legunt, ἔχει δὲ τὴν ὀσμὴν διψήνην, καὶ χυλὴν φονώδη. Hæc peculiaris Atractylidis nota, q̃ foliis sanguineum succum effundat, ob id ἀνδρογύμων ab Aëtio nuncupata, Atractylidem hîc appictam genuinam esse arguit. Si quis enim echinorum squamas euellat, è plaga manabit cruor: si verò distractum & dilaceratum capitulum manibus, vel panis albis affrices, colore sanguineo tingentur: quod experientia quævis docere potest. Est & in agro Môspeliçfi Atractylis purpurea frequēs, luteæ Atractylidi caule, folio, radice, echino, odore, succo similis, hoc verò distans, quod nec pubescit lanugine quemadmodum lutea, & florem edit purpureum, seu potius coccineum. Ad hanc accedere videtur Atractylis Cypria, quam descripsit Anguillara, foliis Cnico similibus, minoribus, nonnihil crispis: ex horum medio surgit caulis, in cuius fastigio echinus protuberat, ex quo dodrantes ramuli graciles, foliis nudi, huc illuc procedunt, echinos in vertice pusillos sustinentes, flore dum explicantur purpureo, Anemonæ simili. Horum simul omnium, nempe & caulis & ramulorum, cubitalis est altitudo: semē album, Cnico simile. Nascitur & hoc Cardui genus in agro Bononiensi prope montem, quem *Mangianigo* vocant, prope villam Medesani, & in Maris prope oppidum, quod *Chieti* nominant, & in Narbonensi prouincia inter Masanum & Insulam oppidum, sed flore ad luteum inclinâte. Est præterea Atractylis marina cognominata, quod in maritimis gignatur, Pena Pynocomon appellat, radice vulgari Atractylidi simili: foliis paulò latioribus & longioribus, partim ex caule ramisque extrorsum distentis, partim, quod isti plantæ peculiare est, cauli & ramis pennarum ritu natiuo coalitu sic agglutinis, ut cohæreant, & vtrinque cauli ramisque incumbant, tanquam de industria admota & impacta: flore Cnici, croceo, in oblongis capitulis fulgente: semine quoque Cnici. Quidam sunt, inquit Matthiolus, qui plantam

lidi simili: foliis paulò latioribus & longioribus, partim ex caule ramisque extrorsum distentis, partim, quod isti plantæ peculiare est, cauli & ramis pennarum ritu natiuo coalitu sic agglutinis, ut cohæreant, & vtrinque cauli ramisque incumbant, tanquam de industria admota & impacta: flore Cnici, croceo, in oblongis capitulis fulgente: semine quoque Cnici. Quidam sunt, inquit Matthiolus, qui plantam

ATRACTYLIS Marina,
Pycnocomon Pena.


ATRACTYLIS quorun-
dam, Matthioli.



plantam cuius iconem hîc expressam videtis, Atractylidē esse existiment. Quorū opinionem approbaret, si folia sanguineum succum funderent, & caules rectiores essent. Sit itaque ea de re aliorum iudicium. Atractylidis folia, coma & semen, auctore Dioscoride, trita cum pipere vinōque pota, contra scorpionum ictus

In c. 91. li. 3.

CARDUNCELLVS,
Pena.



profunt. Sunt qui dicant à scorpionibus percussos quamdiu teneant eam herbam, non sentire dolorem, deposita verò dolore affici. Plinius de eadem hæc tradit. Nec de Cnico, siue Atractylide verbosius dici par esset, Ægyptia herba, ni magnū cōtra venenata animalia præberet auxilium, item aduersus fungos. Constat à scorpione percussos quamdiu teneant herbam, non sentire cruciatum. Et Galenus scribit Atractylidem, quæ ex spinolarum est genere, facultatem habere desiccandi, & modicè digerendi.

Vires &
Temper.
Li. 21. c. 32.

Li. 6. simpl.

CARDUNCELLVS,
CAP. XVIII.



N NARBONENSIS agri montanis ad montis Lupi ima, meridiem versus, scribit Pena oriri prope pusillum amrēm, aut torrētem, hanc Cardui speciem omnium minimam, eoque Carduncellum ab ipso nūcupatam. Plantulæ huic radix est implexa, altè humi depacta, à qua mox foliola plufcula, exilibus & altis diuisuris

In Aduerf.

Forma.

dentata. Caulis vix dodrantalis, lævis, gracilis, humi demissus: caput maius quam pro foliorum proportionem, spinis horridis, foliosis cinctum florem claudit, purpureum, Atractylidis, cui etiam folia, ipsaq; vniuersa planta valde similis est, sed longè similior Aëtij Atractylidi purpureæ à flore vocata, fortè & eadem. Vfus incognitus, quia planta vix nota. Hæc Pena.

CARDVVS STELLATVS, Dalecham.

CAP. XV.

Nomen.

Forma.



RAETER Carduorum genera partim dicta, partim dicenda, & ad prisca nomenclaturas coniectura quam maxime fieri potuit verisimili reuocata, quædam alia hodie nobis innotuerunt, specie non minus quam illa consideranda & explicanda: inter quæ primus occurrit Carduus stellatus, alius à Myacantho Theophrasti, quem Officinæ nomine Cardui stellati ostendunt. Hic noster foliis est breuibus & paruis, nec valde laciniatis, nec spinis aut multis, aut rigidis armatis: caule cubitali, parum furculoso: capitulo toroso & crasso, candicante, spinis vndique muricato, stellæ figura radiatis, ex aculeis septem vnaquaq; spinarum congerie coalescente, longissimo eo qui medius extat, breuioribus aliis vtrinque tribus qui medium ambiunt, elegantissima harum spinarum structura: flore puniceo.

CARDVVS CHONDRILLODES, Dalech.

CAP. XVI.

Nomen.

Forma.



CARDVVS hic Chondrillodes cognominatur, quod foliis Chondrillam secundam valde imitetur. Crescit in asperis & saxosis, radice dodrantali, lignosa, dura, candida, obliqua, tenuissimis villis capillata: foliis proximè radicem multis, laciniatis, & circumrosis Chondrillæ modo, breuibus, aculeatis, in superiore caule paucis, qui pedalis est: in ramulos ferè duos tantum diuisus, teres, angulosus, in cuius cacumine capitulum nullum, sed eius vice corticosus vertex, vt in Borrachine circinatus, velut in radios dispersitus: flos aureus, in pappos euanescent. Quod itaque Scolymo proprium esse vult Theophrastus, vt spinoso capitulo, quod acanum vocat, is careat, id & huic Carduo commune est præter aliorum Carduorum naturam.



EST ET Carduus alius, Aræophyllos dictus, quòd caulis, qui etiam angulosus est, raris foliis vestiatur. Hæc ex interuallis singula longiuscula; angusta, oleæ similia, paucis & mollibus spinulis aspera prodeunt in caule terete, pedem alto, in cuius summo quatuor, aut quinque conspicias capitula, subalbida, minimè aculeata, sed laminularum positu, ordinibus, & scansili inæqualitate leuissimè tantum atrectantium marius scabentia: flos purpureus est: semen paruum, oblongum, inter omnia Carduorum genera mollissima & longissima lanugine reconditum.

ONOPYXOS. CAP. XVIII.



OΝΟΠΥΞΟΣ inter spinosas stirpes à Theophrasto numeratur, & à Plinio. Buxum asininum vertit Gaza, quòd sit Carduus asinis in cibo gratissimus, &

Nomina
 Lib. 6. hist.
 cap. 3.
 Li. 21. c. 16.

non per *υ*, sed per *η*, *ὀνόπνηξον* legendum esse putent, quòd ad eum pasendum asinus perpetuò defigatur & hæreat: qua ratione & Dipfacum *ὀνομαρδίων*, ideò nuncupant, quòd ad eum asinus magna alacritate feratur cùm senserit, quasi asini corculum. Cùm verò asinos ubiq; obseruauerimus ad quosdam Carduos libentiùs accurrere, iis libentiùs, & maiori cum voluptate vesci, ab iisdem magis allici, merito *ὀνοπύξος* nominauerimus, atque imprimis eum qui nascitur passim secus vias, in agrorum limitibus, scrobium marginibus, siluarum aditu, & vbique ferè in campis obuius: radice longa, nigra, valde fibrata: caule bipedali, rotundo, ramoso: foliis Acanthio vulgari similibus, sed læuibus, nec lanuginosis, minoribus, nigrioribus, aculeatis: capitulis in summo caule spinosis, rotundis, atrociter pungentibus: quæ cùm dehiscunt, purpureum florem Iulio & Augusto promunt, coloris venustate insignem: semen reliquis Carduorum generibus par. Notior est iste Carduus asinorum pabulo, quàm viribus, Dodonæo Cardui siluestris nomine descriptus, & depictus. Est & *ὀνόπνηξος* alter, non in agris tantum, sed in pratis etiam frequens, radice nigra, pedali: caule res quatuorve pedes alto, vel nudo, vel paucis ramulis vestito, tereti: foliis superioris, minoribus, angustiorib⁹, vndique hamatis: capitulis initio rotundis, deinde oblongis, parum aculeatis: flore purpureo. Tertius quoque *ὀνόπνηξος* dicitur, qui in macris

ONOPYXVS, Dodon.



ritò *ὀνοπύξος* nominauerimus, atque imprimis eum qui nascitur passim secus vias, in agrorum limitibus, scrobium marginibus, siluarum aditu, & vbique ferè in campis obuius: radice longa, nigra, valde fibrata: caule bipedali, rotundo, ramoso: foliis Acanthio vulgari similibus, sed læuibus, nec lanuginosis, minoribus, nigrioribus, aculeatis: capitulis in summo caule spinosis, rotundis, atrociter pungentibus: quæ cùm dehiscunt, purpureum florem Iulio & Augusto promunt, coloris venustate insignem: semen reliquis Carduorum generibus par. Notior est iste Carduus asinorum pabulo, quàm viribus, Dodonæo Cardui siluestris nomine descriptus, & depictus. Est & *ὀνόπνηξος* alter, non in agris tantum, sed in pratis etiam frequens, radice nigra, pedali: caule res quatuorve pedes alto, vel nudo, vel paucis ramulis vestito, tereti: foliis superioris, minoribus, angustiorib⁹, vndique hamatis: capitulis initio rotundis, deinde oblongis, parum aculeatis: flore purpureo. Tertius quoque *ὀνόπνηξος* dicitur, qui in macris

Forma.

alter.

Dalechamp.



& fabulosis agris nascitur radice crassa, nigricante: caulibus multis, cubitalibus, rotundis, rigidissimo spinarum vallo armatis, hinc inde in ramos diuisis: foliis longis, nigricantibus, in ambitu profundè laciniatis, atrociter pungentibus: echinis in caulium vertice horridis, florem egregiè rubentem explicantibus, deinde semen longum, exile, Cnicò proximum.

ONOPORDON.

ONOPORDON,

CAP. XIX.

Li. 17. c. 12.



Forma.

PLINIVS Onopordon memorat his verbis. Onopordon si comederint asini, crepius reddere dicuntur. Id Cardui genus Onopordon rectè dici posse Dalechampius putat, quod Parisienses seruata Græci nominis significatione *Pet d'asne*, vulgò vocant, aiuntque, & affirmant asinos eo gustato subsultare, crebròque pedere. In locis cultis & pinguibus pecudum morsu non violatum, ad hominis proceritatem crescit, duos ferè trésvae caules proferens, angulosos, lanuginosos, medulla candida farctos: radicem pedalem, crassam, nigram, fibris paucis capillatam, gustu amaram: folia, quæ ramorum loco sunt, pedis longitudi

longitudinem æquant supra radicem, prope verticem breuiora, in foliola diuisa, oblonga, oleæ similia, ad exortum & in cacumine spinosa, gustu subamaro & subaustrero: capitula è foliorum sinu prodeunt suo pediculo surrecta, rotunda, antequam florescant albo tomento lanuginosa, spinulis multis armata, extra lanuginem sese exerentibus, rubris: flos ex rubro purpurascit: semen est oblongum, vt in aliis Carduis.

POLYACANTHOS, Theophrasti. CAP. XX.



POLYACANTHON quoque in spinosis stirpibus Theophrastus & Plinius recensuerunt. Theodorus Aculeosam Latinè dixit. Sic autem nominatus est hic Carduus à spinarum infinito ferè numero, quod nullum sit Cardui genus pluribus, magisque confertis aculeis contactum & armatum. Gignitur ferè in pratis & madidis locis, radice tenuissimis fibris capillata, & quam fibras multas potius esse dicas quàm radicem: caule tres aut quatuor pedes alto, recto, non valde ramoso, vndique spinis rigente: foliis Onopyxi secundi, angustioribus, & magis aculeatis: capitulis etiam minoribus: flore purpureo: semine minuto & candido. Dodonæus Cardui siluestris tertium genus facit.

Nomina
Lib. 6. hist.
cap. 3.
Lib. 21. c. 16.

Locus.

Forma.

Lib. 4. c. 72.

MYACANTHOS. CAP. XXI.

PLINIVS Corrudā siue siluestrē Asparagum à Græcis Myacanthum, Dioscorides Alparagum petræum Myacanthā, Galenus eundem Alparagum Myacanthum vocari scripsere. Myacantham autem quidam dici volunt, quod in carnariis

Lib. 19. c. 8.
Lib. 2. c. 118.

Lib. 6. sim.

suspensacarnes à murium iniuria tuetur, quia propter eius aculeos mures irrepere non audeant. Alij quod sub cauis radicum huc illuc vagantium mures occultantur, easque alijs cibi penuria arrodunt. Alij quod mures occidat, vt & canes. Sed ab hac Myacantho plurimum discrepat ea cuius meminit Theophrastus, & quā Gaza Spinā murilem interpretatus est. Nam cum Corruda tota spina sit, spinasque pro foliis gerat, vt & Scorpium siue nepa, in iis numerat Myacanthon, quæ, vt Ononis, foliis exarmatis innoxia, aculeis præter foliorum comam rigent. Quod cum in hac spinosa planta nos spectemus, quam Officinæ Calcitrapam, alij Stellariam, quidam Carduum stellatum, Cordus Polyacantham, Galli *Chaussetrappe*, Germani *Vruallendistel* nuncupant, vt in Leucacantha dictum, eam Theophrasti Myacanthon esse non sine ratione arbitratus est Dalechampius. Profilit in pratis & locis incultis, septaque villarum & rudera obsidet: radice longa, foris nigricante, intus candida, carnosa, subdulci, foliis hirsutis, profundè laciniatis: caule bipedali, ramoso: capitulis multis, quàm in aliis Carduis minoribus, stellæ modo in complures aculeos siue radorum cuspides fissis, principio ex viridi rubentibus, postea albicantibus: ea cum patefiunt, purpureus flos emicat, deinde semen paruum, nigrum, rotundum, carduelibus expetitur. Dodonæus Cardui stellati nomine proposuit, qui semen eius cum vino tritum potumque vrinam prouocare, & lapides exterere tradit. Adiciunt alij radicem eiusdem quotidie manè sumptam fistulis, in quacumque corporis parte sint, prodesse, & arcere pestis contagia. Huius generis est planta, quam

Lib. 6. hist.
cap. 4.

Locus.

Forma.

Lib. 4. c. 60.

Vires.

Iaceæ nomine depinxit Clusius : nam radiatis & aculeatis capitibus, foliis, floribus & femine cum superiore conuenit : sed omnia longè maiora hæc habet : capitula quoque Cnicum siluestrem superant. Semen item & flos non dissimilia, quo marcescete è medio centro veluti gummi quoddam flori permixtum protuberat, ver-

MYACANTHOS,

Theophr.



IACEA LVTEA,

Clusj.



miculorum modo conuolutum, aut veluti Officinarum Tragacantha, rufi coloris: vnde Tragacanthi nominis occasio Salmanticensibus, apud quos in vinetis, agrorumque marginibus frequens oritur. Est & huic cum Leucachanta nostra, seu Spina solstitiali suprâ descripta, magna affinitas, vt eadem videri possit.

LEUCOGRAPHIS.

CAP. XXII.

Lib. 27. c. 11.



LEVCOGRAPHIDOS meminit Plinius his verbis. Leucographis qualis esset, scriptum non reperi. quod eo magis miror, quoniam vtilis proditur sanguinem excreantibus, tribus obolis cum croco : item cœliacis trita ex aqua & apposita: profluuiis fœminarum, oculorum quoque medicamentis, & explendis vlceribus, quæ sunt in teneris partibus corporis. Hanc si non facies, quam nec descripsit, nec ab aliis descriptam reperit Plinius, saltem vires Dalechampio occasionem dedere coniiciendi esse Carduum Mariæ vulgò dictum, Germanicè *Mariendistel*, & *Frauentistel*, Gallicè *Chardon nostre dame*. Dicitur & Carduus lacteus ab albis maculis, vnde & à quibusdam Galaxias. Dodonæus Spinam albam, & Arabum *Bedeguar* esse credit. Fuchsius Spinam albam hortensem. Hunc Carduum prope olera in hortis, & in neglectis locis, præsertim si pinguis & latus ager fuerit, sponte nasci videmus, siticulosum Dipsaci modo: nam inter caulem & foliorum sursum tendentium concauos sinus aqua colligitur. Radice est crassa, longa, cándida, facultate sicca & astringente: caule procerò, terete, surculoso, spinoso, digiti crassitudine: foliis latis, amplis, albicantibus, notis maculisque lacteis distinctis & aspersis, multis & acutissimis spinulis horridis, in ambitu pungentibus

Nomina

Lib. 4. c. 63.

Cap. 16. histo.

Locus.

Forma.

LEUCOGRAPHIS *Plinij,*
Carduus Maria.

pungentibus : capitulis in summo caulium ramorumque globosis, squamis muricatis rigentibus, asperimis, in orbem rotæ instar spiculis prælongis munitis : flore purpureo : semine Cnico simili, longo, læui, gustu dulci, nucis iuglandis ferè sapore, nigriore, lanugine tenera & candida obuoluto. Floret Iunio & Iulio mensibus, hiemèque moritur. Ea præstat quæ ex Plinio suprà recitauimus. Præterea aqua è foliis destillata caliditati hepatis, & animi deliquiis in linteolis extrinsecus admota opitulatur. Lateris morbo succurrit, pestilenti veneno, & multis aliis partium internarum morbis : efficaciusque id præstat addita feminis drachma dimidia.

Tempus.

Vires.

CROCODILIVM. CAP. XXIII.



POKODÉΛAION Græcè, similiter Crocodilium Latine, cuius nomenclaturæ ratio à nullodum, quod sciam, explicata est, neque descriptio tam aperta, ut à tot aculeatis plantis fa-

Norma

cile sit genuinum Crocodiliū distinguere & internoscere : quæ descriptio à Dioscoride tradita est his verbis. Crocodilium simile est nigro Chamæleoni : nascitur in locis siluosis, radicem habens longam, leuem, aliquantū latam, odore acri veluti nasturtium. Radix seruata in aqua & pota sanguinem copiosum per nares pellit. Datur lienosis, eos euidenter adiuuans. Semen urinam ciedi vim habet, & rotundum, & duplum veluti scutum. Quæ Plinius sic videtur reddidisse. Crocodilium Chamæleontis herbæ nigrae figuram habet : radice longa, æqualiter crassa, odoris asperi. Nascitur in sabuletis. Pota sanguinem per nares pellit copiosum crassumque, atque ita lienem cōsumere dicitur. In quibus Plinius legisse videtur ἐν τοῖς ἀμυδάσει, id est, in sabuletis, pro ἐν τοῖς ἀμυδάσει, id est, in siluosis, ut habet Dioscorides : deinde pro ὑποπλάτην aliquantū latam, ἰσοπλάτην, siue ὁμαλῶς παχέαν, id est, æqualiter latam, siue æqualiter crassam, Oribasius subcrassam legit. Quem verò ὁσμήν δρμητιαν Dioscorides, Plinius suo more odorem asperum dicit. Oribasius radicem acrem, odorēque nasturtio similem. Quod verò ad semen attinet rotundum, duplicis scuti figura, id à Plinio omisum est, & ab Oribasio, qui integras historias ex Dioscoride exscribere consuevit. Præterea id à Dioscoride præter more additum fuisse videtur, absoluta scilicet historia & viribus explicatis, atque falso huic plantæ attributum, cum ἀγανθώλῃ ferè omnia semē edant Cnico simile. Quare adiectitia hæc viri docti censent, & ex Tordylj historia, cuius semini figuram hanc Dioscorides assignat, huc à sciolo quodam nominum vicinitate decepto ascita fuisse. His addē, quod in Crateuæ fragmentis desunt verba illa, ποσσεμπερὲς ὄν, καὶ διπλοῦν ὡς ἀσπίς, id est, rotundum, & duplum vt scutum. Quantum verò ex satis obscura delineatione colligi potest, cum præcipua Crocodilij nota ducatur ex similitudine Chamæleonis nigri, & altera Carlina, quæ in caulem attollitur, nigro Chamæleoni tam affinis sit, vt Matthiolus, & plerique alij Chamæleonem nigrum esse contenderint, Carlinam illam Crocodiliū esse non sine ratione Dalechamplus iudicauit. Etenim in siluosis sabulosisque prouenit : foliorum specie, & subrubro colore nigrum Chamæleonem

Lib. 3. c. 10.

Forma.

Lib. 27. c. 8.

Lib. 3. c. 54.

Chamæleonem imitatur: radice est longa, leui, non solida, sed exesa, non nihil lata, odoris vehementis & acris, ad nasturtium accedentis: semen Cnico simile, cinereum. quod enim de semine Crocodilij legitur in Dioscoride, falsum esse ac supposititium diximus. Sanguinem quidem per nares potu eliciendi vim nullus in Carlinæ agnouit, quæ si Crocodilio inest, tanquam insignis & eximia magnificanda est, verum optanda potius quàm asserenda videtur. Nam in Dioscoride scribitur, ἡ ῥίζα ζεοδύσκει ἐν ὕδατι καὶ τινόμενη: pro τινόμενη legunt quidam ἐπισπαιμένη, id est, si per nares attrahatur, quemadmodum de Ocino scripsit Dioscorides, ποιεῖ δὲ καὶ τὰ ριμὰς πλεονάς ἐπισπαιμὸν διὰ δόφρηστος, id est, sternutationes multas excitat si per nares olfactu attrahatur. Alias Crocodilio vires assignarunt Galenus, & eum secuti Paulus & Aëtius, quas omnes de Tordyljo tradidit Dioscorides, vt hoc magno sit argumento confusam fuisse vtriusque historiam. Maranthæ & Anguillaræ Chamæleon, inquit Pena, videtur aut verum esse Crocodilium, aut certè genuini opinionē sustinere posse, vsque dum doctis magis accurata descriptio, aut planta Crocodilio aprior occurreret. Ad eò enim ad descriptionem accedit, vt illis nigrum esse Chamæleonem persuaferit. Hunc capite de Chamæleone pinximus. Aliud Cardui

Lib. 2. c. 154

Lib. 3. c. 154

*CROCODILIVM, Carlinæ
caulem habens.*



*CROCODILIVM Monspe-
liensium, Dalech.*



genus Crocodilium Monspelienfes vocant, in aridis & apricis profiliens, radice palmum longa, nigricante, gustu amara: caulibus ferè duobus aut tribus, cubitalibus, angulosis, lanuginosis, ramosis: folijs auersa parte candida lanugine pubescentibus, aduersa in viridi pallidis, multis, aculeatis, Carlinæ similibus: capitulis multis, pilæ modo rotundis & globosis, pungentibus, aspectu cinereis, flore copioso, purpureo Hyacinthi modo, subamaro, semine longo, nigricante. Quidā Silybum esse volunt, quidam Galedragon. Lobellius Crocodilium Fuchsi & Cordi pinxit, plantam quam Dodonæus Spinam peregrinam vocat, Tragus perperam Chamæleonem verum, inquit Lobellius, cuius effigiem suprâ posuimus.

TRAGVM

TRAGVM, Matthioli.

CAP. XXIIII.



RAGIVM & Scorpionum de multis & diuersis plantis dici iam monuimus. Aculeatam verò stirpem hîc depictâ Matthiolus legitimum Dioscoridis Tragum, siue Scorpionum, siue Traganon esse credit: item Plinij Tragum, & eiusdem atq; Theophrasti Scorpionum. At alio in loco Tragum alium genuinum Dioscoridis ostendimus, qui à Scorpio Theophrasti, quem Nepam verit Gaza, longè alius sit: præterea Matthiolum citatis duobus Plinij locis de Trago & Scorpio, Tragū Dioscoridis cum Scorpio Theophrasti perperam confudisse. Quod verò Tragus Matthioli à Trago Dioscoridis plurimum diffideat, descriptio ipsa perspicuè declarat. Tragus, inquit Dioscorid. nascitur ma-

Lib. de ma
rit. cap. 22.

Lib. 4. c. 46

TRAGVS, Matth.



ximè iuxta mare frutex paruus, per terram, oblongus, non magnus, palmi altitudine, aut maior: folia non habet, verum ramis adhærent velut acini parui, rufi, magnitudine tritici, cacumine acuti, multi, gustu valde adstringentes. At hic Tragus Matthioli, succulenta est planta, non frutex, vt dilucidè demonstrat Pena. nullos acinos habet rufos, tritico pares, & supernè acutos, numerosos, magnopere adstringentes: foliis nō caret, carnosa enim habet, spinis horrida, alstrictionem penitus nullam. Quare fuerit ille illegitimus Matthioli Tragus, eodem Pena auctore, Crithmi salicornij, seu kali cōgener, propius ad eam speciem spinosam accedens, quam Pastinacā marinā, aut Secacul, aut alterum Crithmum faciunt, pedem aut cubitum altam, intortis, crassis, densis ramulis diuisam, & adeo horridam, armatamq; foliis pungentibus, Aizoi colore & figura, carnosus, crassioribus, numerosis in imo, in summo muricatis, cuiusmodi in Tribulo terrestri & aquatico, vt impune effringere surculum nequeas. Hisce ad imam basim inter-

In Aduers.

riorem flosculi herbacei, rotundi, ex quibus semen exit compressum. Radix cespitem summo exilis, lignosa, kali & herbaceo prorsus gustu, succoque multo glutinoso prægnans, minimè adstringente, salso, & nullius alioqui excellentis facultatis. Hæc Pena. Lobellius Tragum hunc Matthioli paulò aliter expressit quàm Matthiolus. Illius picturam posuimus in libro de maritimis.

TRAGACANTHA. CAP. XXV.



PAT'KANΘA Græcè, Latine similiter Tragacantha, & Hirci spina, Arabicè Chitira, Itica, Chatheth, Gallicè Espine de bouc, in Galloprovincia, potissimum circum Massiliam, Barberenard, & Ramebouc, id est, Barba vulpina, & Surculus hircinus. Gummi ex ea manans τρυγιδιον quoque Græcè nominatur, Latine Tragacanthæ lacryma, in Officinis gummi dragaganti. Tragacanthæ spinarum barbula nomen dederunt. Radix est lata, & lignosa, inquit Dioscorides, supra terram etiam apparens, à qua surculi humiles, robusti, plurimū sese diffundentes, in quibus foliola sunt multa, tenuia, quæ spinas albas, robustas, rectas inter se occultant. Eius iconem sic expressit Matthiolus. Est etiam

Nomina

Forma
Lib. 3. c. 20.

Lib. 13. c. 21.

Lib. 9. hist.
cap. 15.

γάγκυθα πολλή, καὶ ἔδδ' ἐν χείρων, ὡς οἰόνται τῆς κριτικῆς, ἀλλὰ καὶ τῇ ὁψεί καλλίων. Id est, Tragacantha in Arcadia copiosa, & nihilo deterior, ut arbitrantur, Cretica, sed & aspectu pulchrior. Sed hæc non solum in Media & Creta, sed etiam in Gallia provincia plurima fructicat, prope pomeria Massilia, ut asserit Pena, in marinis collibus ad Austrum spectantibus aliisque finitimis locis passim multa. Frutex humilis, densus, totus candicat, vno cespite copia multa aggestus, radice alba, longa, lignosa, digiti crassitie, prolixis & flexilibus fibris subter humummersa: caulis, cum maxime procerus, cubitalis, ex quo spicula foliata vtrinque quasi pinnis oriuntur, quæ ima & vetustiora nihil aliud quam veprem ostendant: superiora pallentia perpetuo sunt. Is caulis ab vna radice multiplex, solidus, lignosus, candidus, quem vestiunt spinæ foliatae spinis rigidissimis. In summo inter spinosa folia & spinas stipantur multum flosculi inuicem collecti, genistellæ similes, sed albi. Siliqua etiam numerosa, recta, ciceris aut genistellæ spinosæ modo, sed multo minor & candida, in qua semina exilia, albicantia includuntur, sinapi magnitudine, angulosa. Hæc Pena. Ei simillima

TRAGACANTHA *Altera,*
sive Poterium, Clusij.



est planta, inquit Clusius, fruticosa admodum, multos habens pedales ramulos flexibiles, late circumquaque sese diffundentes, candicantes, & dum adhuc tenelli sunt lanuginosos, multis longis candicantibus spinis horrentes: foliorum plurimæ simul iunctæ alæ lenticulæ aut Tragacanthæ proximæ, exiguæ, candidæ, lanuginosæ primo vere per interualla exeunt, sapore dulci: foliis hieme decidentibus, nervi medij, quibus folia inherebant, in spinas rigidas & acutâs euadunt, ut eo tempore tota planta sine foliis conspiciatur, contra quam in Tragacantha, quæ hieme etiam folia viridia retinet: radix lenta, longa, in multos ramos diuisa, nigro cortice obducta, materie intus candida fungosæ; & dulci, cor ipsum gummosum quiddam & subdulce refert. Neque florentem, neque fructum ferentem vidit ille, sed sub ea plurimos folliculos bombycinis similes, aut Hypocotylis Matthioli ferè inuenit, inanes, quos ab hac planta excidisse, & florem ex similibus prodire incolæ referebant, album, non magnum. De femine nihil certi intellexit. Nascitur plurima circa Guadix & la Venda el peral, in collibus arido

bus arido & inutili solo. Cùm adeò sit Tragacanthæ similis, facili sibi persuaserit Clusius esse Poterium legitimum Dioscoridis. Hæc Clusius. Tragacantha, vt tradit Dioscorides, vim habet meatus obducendi gummi similem. Vfus eius est ad medicamenta ocularia, ad tusses, ad arteriæ asperitates, vocem interceptam, & destillationes in eclegmate cum melle. Subditâ quoque linguæ liquefcit, sed & macerata in passio bibitur drachmæ pondere contra renum dolorem, & vesicæ rosiones admixto cornu ceruino vsto, & loto, aut modico alumine scisso. Galenus breuiter de Tragacanthâ scribit, similem gummi vim habere emplasticam quandam, quæ acrimoniam obtundat, & similiter desiccare. Tragacanthæ lacryma, inquit Matthiolus, collyriis addita non solum humorum acrimoniam in oculos defluentium retundit, sed oculos quoque roborat, & magis adstringit quàm sarcocolla. Præterea lacte macerata & illita, oculorum vngues, palpebrarum pustulas, pruritus, & scabiem sanat. Valet ad pulmonum, pectoris, asperæ arteriæ morbos, & medetur eorum vlcerebus, ad defluxiones omnes in fauces, guttur, pectus permeantes, & tussim excitantes. Datur vtiliter vlcerebus renibus: auxiliatur quoque dysentericis tosta, & ex cydoniorum vino pota, tum clysmate infusa. Denique vbi læuigare, obtundere, ac reprimere opus est, præstantissimum fuerit medicamentum.

Vires.
Lib. 3. c. 20.

Lib. 8. sim.

In cap. 21.
lib. 3.

DRYPIS.

CAP. XXVI.



ΠΥΠΙΣ, Cardui species, à veteribus dicta fuit ἀπὸ τοῦ δρυπίστειν, id est, σπαράττειν, vύπτειν, ξύπτειν, à lancinâdo, pungendo, vellicando, quòd aculeis suis atrectantes & colligere volentes vulneret. Huius semel tantum, quod scia, solus Theophrastus mentauit, scribens Acornam, Drypida, Acanu spinosis esse foliis, nihilque præterea. Quare cùm huius historia à nullo veterum tradita sit, Carduum istum in satis & segetibus frequenter, diris aculeis rigentem, Drypida quidam nominant. In aruis inter fruges quasi earum vitium, & auenam præcipue, Carduus hic nascitur, interdum viri proceritate, interdum humilior, alba radice, & crassa: foliis caules ambientibus muricatis, dissectis & incisis: capitulis vt in Scolymo echinatis: flore aliàs purpureo, aliàs candicante, aliàs puniceo: semine oblongo, læui, paruo, rufescente. Agriculis & messoribus plerumque impedimento est. Nullus huius vsus in medicina ab herbariis traditus est, quanquam ob calidam siccâque huius naturam ad secundum vsque gradum varias vtilitates quisque meditari & excogitare possit. Hoc Carduo tenero asini vt Onopyxo, libentissimè vescuntur priusquam obdurerit, & in caulem assurrexerit. fursculos rustici effodiunt, & iumentis suisbûsque pro cibo & pabulo obiciunt. Anguillare Drypis, à superiore diuersa, in Maris haud procul à mari nascitur, radicibus sub terra huc illuc serpentibus, graminis instar, exilibus: tenuibus ramulis, geniculatis, cubitalibus: foliis aculeatis, Iunipero similibus: umbella in summis caulibus: flore candido: semine, priusquam cortex adimatur, oriza

Nomina

Lib. 1. hist.
cap. 16.

Forma.

DRYPIS.



similis

23

DRYPIS, Theophr.

Anguillaræ.

DRYPIS, Loniceri.



simili cùm detractus est, Sertulæ campanæ, coloris valde lutei. Quibusdā Eryngium marinum Drypis Theophrasti videtur esse: aliis, quorum opinio magis arridet, Drypis est Acanos Plinij lib. 22. cap. 9. brevis herba, spinosa, lata, latioribusque spinis. Guilandino Tragus Matthioli. Est & alia Drypis, seu Cardui sylvestris species, quam Gaza Aculeosam, Ruellius Agriachantam, Lonicerus Carduum sylvestrē, seu Scolymum his verbis: Præterea sylvestris est quædam Cardui species in agris passim impedimentum, cuius meminit Vergilius, Carduus & spinis surgit Paliurus acutis: Latinis Scolymus, seu Carduus sylvestris, poterit appellari. Nascitur in aruis maxime aenaceis bicubitali altitudine, sæpe maior, aut etiā minor: foliis aculeatis, incis, capitulis aculeatis: flore in quibusdam purpureo, in quibusdam albo, in quibusdam puniceo: quandiu tenera asinis gratissima, bobus verò nō ingrata. calidum est in secundo completo aut tertio incipiente ordine, siccum verò in secundo. recens Asparagi modo in oleribus coquitur. Radices ex sale & pipere in secundis mensis hyeme eduntur: in cibis decocta vrinam cit copiosam fœtidamque educit. Extrinsecus radix illita graueolentiam alarum toriusque corporis emendat.

CHALCEIOS. CAP. XXVII.

Nomina



ΧΑΛΚΕΙΟΣ Theophrasto, & Chalceios Plinio seruatō nomine Græco, Gazæ Aeraria Latine dicta, inter spinosas & acanaceas stirpes ab iisdem recensetur. Eius historia quamuis apud Theophrastum Pliniumve nusquam extet, ac ne nomenclaturæ quidem ratio vlla ab illis tradita sit, si coniecturæ locus est, eam spinam sic vocatam fuisse arbitrantur quidam quod eius foliis vasa ænea detergerentur, vel quod ærei coloris sit, nempe virentis obscurius, intersperso flauescens nitoris paululo, splendentis. Posterius erymum magis placet, quod peculiare quiddam assignet, cùm prius spinosis omnibus propter foliorum asperitatem congruere possit, nisi fortē egregia quædā detergendi facultas huic in sit, vt Struthio. Herbam cerē speciosam, raram, & elegantem, cuius figuram hīc apposuimus, Chalceion esse suspicantur quidam: quod

CHALCEIOS.



RUTHRVM, Theophrasti.



& aliàs cubitum alto; foliis semper proportionè exiguis, & Spinæ albæ modo profundè incis. Echinus illi cæruleus, eximie purpurascens, orbiculatus, spectatu iucundus, & magnitudine quanta sphaerula lusoria. Semen & eius glutin. similia Spinæ albæ: nullas tamē sursum rectas procul aculeatas vaginulas porrigit, tametsi sint acerosæ intus & lanuginosæ, ut in Spina albâ Ruthrum esse Theophrasti censet Anguillara, qui tamen proxima, ut videtur, descriptionis immemor, ean-

quod tamen peritis herbariis disquirendū magis, quam asserendum proponunt. Gignitur in *Locus.* macris & aridis locis: radicibus multis, foris nigricantibus; caule tereti, subatro, quatuor, vel *Forma.* quinque pedes alto: foliis magnis, latis, profundius incis, per ambitum pungentibus, parte superiora virentibus, sed obscure, fusco ac tristi colore, qualis in aëre conspicitur, unde fortasse est illi nomen inditum: inferna verò cinereis & villosis: capitulis rotundis, echinatis: flore in cæruleo candicante, qui ex capitulis undique promitur, & lunio mense Iuliove prodit. Folia inter digitos tria odorem validū ac inuicundū vibrant, acriusque gustatu sunt. Hanc igitur plantam Chalceion vocant, quousque certiora de eius natura & specie herbarij compererint. Obseruandum apud Plinium in catalogo spinosarum plantarum pro Chalceo legi Chalceon, quemadmodum pro Ixine Helxinæ, Chalceumq; herbam ab eodem alibi memoratam, plurimum dissidere a Chalceo spinoso Theophrasti. Fuchsius olim Chamæleonem nigrum, sed postea rectius sentiens Spinam peregrinam nuncupauit. Dodonæus in stirpium historia Spinæ peregrinæ nomine pinxit & descripsit: in lib. purgantium Sphaerocephalum Carduum primum fecit, quam hic pro Chalceo exhibemus. Pena Ruthrum, siue Ruthrum Theophrasti esse opinatur, quæ Spina peregrina fuit Dodonæo, Echinopus seu Carduus Echinatus Gesnero, Sphaerocephalus Cardo Germanis *Uuelschedistel*, Belgis *Roomschedelstel*. Theophrastus quo tantum loco Ruthri seu Ruthri meminit, quo scilicet stirpiū aculeatarum differentias ex caulium ramorumque numero ac situ inuestigat. sed hic *ῥύθος* seu *ῥύθρον* pro *ῥύθρον* mendosè legi docuimus capite de Eryngio. Eius tamen iconē, quam Ruthrum vocat, ex Pena hic apposuiamus, & descriptionē. Dupli- *In Advers.* cis est differentia, inquit, & Chamæleonis ritu variat, radice exigua pollicem æquante: foliis Chamæleonis albi, longè minoribus: caule nullo, interdum exiguo, nonnunquam palmum, & aliàs cubitum alto; foliis semper proportionè exiguis, & Spinæ albæ modo profundè incis. Echinus illi cæruleus, eximie purpurascens, orbiculatus, spectatu iucundus, & magnitudine quanta sphaerula lusoria. Semen & eius glutin. similia Spinæ albæ: nullas tamē sursum rectas procul aculeatas vaginulas porrigit, tametsi sint acerosæ intus & lanuginosæ, ut in Spina albâ Ruthrum esse Theophrasti censet Anguillara, qui tamen proxima, ut videtur, descriptionis immemor, ean-

dem Spinæ albae notis accommodat, iisdem ferè verbis. Altera, quam Crocodilium Fuchsius putauit, prorsus genere eadem huic est, sed magnitudine multò maior. In silua tamen Valens, quæ Gangem oppidum itur, se collegisse ait caruleam, & hanc excaulem, aliam caule palmum alto præditam, quæ alibi ad duos, ternos, & quaternos cubitos assurgit. Echinus candidus est, non caruleus, & cum maximè est & rotundus magnitudinem mediocris mali Arantij allequitur: semine alterius, sed multò maiore. Cauli imò secundum longitudinem striato adnascuntur permagna folia, Acanthi similia & spinosa. Belgici horti & Britannici

*CARDUUS Sphærocephalus
acutus, Dodonæi.*



hanc spectaculo alunt, ubi luculenta magnitudine Spina peregrina dicitur. Dodonæus descripsit Carduos alios Sphærocephalos. Secundus Sphærocephalus acutus folia superiore minora habet, ac spinosiora: capitula quoque globata, sed è quibus longæ quædam, & duræ eminent spinæ. Tertius primò forma figuræque similis, sed longè minor, & eius flosculi ad caruleum magis accedunt colorè. Quartus minimus est, foliisque acutissimis ac spinosissimis, capitulòque exiguo, cuius flosculi ut primi candicant. Huc referri alius potest, qui tamen capitulo est minùs globato, compressiore videlicet, ac superius latiore, è quo flosculi carulei. Tenuis huic caulis exili lanugine candicat: folia oblonga, vtrinque similiter laciniatim diuisa, ad singulos angulos spinis munita. Hunc plerique esse volunt, quem Matthioli pro Spina alba proponit. Anguillara prorsus diuersam ab his Chalceion memorat his ferè verbis. Ad Chalcei naturam accedere videtur ea, quam in Peloponneso & Zacyntho etiamnum appellant Chalcoma. Lignosa & humilis est planta, rubens, aculeata, tenuibus spinis, folio lentis, minore, in ramulis ordine digesto sicuti in Lente, qui fracti lateum succum fundunt Tithymali modo. Quidam Hippophæstion Dioscoridis esse putant.

TETRALIX, CAP. XXVIII.

Nomina

Lib. 6. hist.
cap. 3.

Lib. 21. c. 16
Lib. 11. c. 16.

Lib. 1. c. 100
Lib. 24. c. 9.

Lib. 11. c. 16
Lib. 24. c. 9.


Lib. 6. hist.
cap. 3.



TETRAΛΙΞ à Theophrasto cum reliquis aculeatis plantis Acarna, Leucacantha, Cnico, Chalceio, Polyacantho, Atractylide, Onopyxo, Ixine, Chamæleonte numeratur: item à Plinio cum imitato, qui tamen alibi Ericam Atheniensibus Tetralicem appellari, in Eubœa Sisaram auctor est. Ex quibus colligere licet Tetralicem spinosam ab Ericæ diuersam esse: quia Ericam spinis armatam esse nullus vnquam herbariorum pròdidit, id quod etiam perspicuum est ex Dioscoride & Plinio de Erica tractantibus. Deinde Tetralicem Ericæam post primos Autumnii imbres florere, nempe ad Idus Septembres, & Calendas Octobres idem Plinius testatur. Alio verò in loco Tetralicem & Ixinem florere tradit æstate: quanquam Theophrastus, ex quo hæc Plinius mutuatus est, Ixinem & Tetralicem non scribit florere æstate; sed germinare.

TETRALIX *Spinosa, Tragi.*

ACORNA, Theophr.



do: semine Cnici, strigoso & tenui. capitulis aulis nullus cruor emanat, vt in Atractylide. Huic similem Clusius Carlinæ siluestris minoris nomine depinxit: seseque nusquam hanc alibi obseruasse ait, quàm in aridis petrosilicis & desertis circa Salmanticam locis, florentem Augusto mensē. Ad Acarnæ Theophrasti genus referri posse, siue ad Eryngium, quod Aëtius de Archigenis sententia describit, foliis Atractylidis, durioribus, & ex candido pallidioribus, multis ramis ab

germinare. Caue igitur, Tetralicem hanc cum illa confundas. Spinosam Tetralicem putant esse quidam, quam Tragus pro vero Chamæleonte nigro pictam ostendit, post Carduum vulgarem, & Chamæleonem album. Ea radice crassa, longaque nititur, & fibrata: caule alto, anguloso: foliis latis, amplis, profundius incis, vt ferè sinuosa videantur: florè pallidulo, in mitioribus globulis quibusdam, & lauioribus emicante, non cæterorum Carduorum modo horridius, echinatis: semine oblongo & capillato.

Lib. 2. c. 108

Forma.

ACORNA. CAP. XXIX.



"K O P N A, & ἀκρνα, (vtrouque **Nomina** enim modo legitur in nostris Theophrasti exemplaribus.) inter spinosas & acanaceas ab eodem Theophrasto, & Plinio reponitur. Cuius etsi nulla, quod sciam, apud hos auctores extet amplior descriptio, præter hanc Theophrasti, ἡ δὲ ἀκρνα προσωμεφής, ὡς ἀπλῶς εἰπείν, καὶ τὴν πόσον ἐν τῇ κνίκῳ τῇ ἡμέρᾳ. χρῶμα δὲ ἐπιξανθὸν ἔχει καὶ λιπαρὸν, vbi deest vox χυλὸν, ex Plinio repnenda, id est, Acorna, vt paucis dicam, Cnico miti figura similis est, colore subflauo, & succo pingui: apud Plinium, Acorna colore tantum rufo distinguitur, & pinguiore succo: tamen Acornam esse hanc spinosam herbam suspicantur quidam, Fuchsius Atractylidem mitiorem, Dodonæus Carlinam siluestem, Lobellius & Pena Sequanorum Cirsium luteum vocant. In aridis gignitur: radice alba, breui, non admodum crassa, fibrata: caulibus interdum multis, sæpius vnico, rubentibus, lanugine tectis: foliis circa radicem multis, per terram in orbem stratis, exarescentibus cum caules assurgunt per eosdē inæqualiter sparsis, spinosis, Atractylidi similibus, angustioribus, infernè candicantibus: flore in capitulis valde pallido, initio compresso, & cum dilatur in arida stamīna sese explicante, Carlinæ, aut Chamæleonis modo:

Lib. 6. hist. cap. 4.

Li. 21. ca. 16.

Forma.

ACARNA, *Carlina silue-*
stris minor, *Clusj.*



floret, eaque perpauca, lenticulæ similia, quæ cum breui decidant, tota planta maxima ex parte sine foliis spectatur, & multiplici spinarum vallo erinaceum

ACARNA *Theophrasti*,
Anguillare, *Lobel.*




vna radice cubitalibus, floribus Bupthalmi similibus, sed oculi formam stamina in medio nascentia perturbant. Huc referendæ spinosæ duæ plantæ à Lobellio depictæ. Prior est *Acarna* *Theophrasti* *Anguillare*, flauentibus aculeis horrida: virentibus sinuatis foliis, auersa parte tomento incanis, vti tota planta: plures fundit sesquicubitales caules: flores luteolos: semen *Cnici*, sed minus in squamoso & spinis horrido capitulo. Hanc *Valerandus Doureus* *Iustinopoli* *Illyrij* rediens *Venetias* detulit, sicut & sequentem eiusdem *Valerandi* *Acarnam*, foliis longioribus, spinis horridis caulem pinnatim secundum longitudinem ambientibus, quasiq; pennis telo affixis. Incana lanugine tota pubet. Caulis *dodrantal*is, interdum cubitalis: flores *Cardui benedicti*, confertim stipati minores, & *Senecionis* maiores: semen *Cnici* minus. Huc etiam *Clusij* planta noua, & sanè perelegans adducenda, quæ *dodrantal*is est, in orbem per terram diffusa, spinis multis virentibus siue aculeis horrida: flores *Pisi* ex cæruleo purpurascens, minores, caliculis concluduntur hispidis & villosis & ferè incanis, bini aut terni semper coniuncti: foliola interdum, sed rarò, producit dum

ACARNA *Valerandi*
altera.



planè

ERINACEA, Clusij.



planè refert: radix lignosa est, & magna pro
plantæ proportione. Nascitur in regno Va-
lentino, copiosè autem circa Siereaguas, sepi-
mo ab vrbe Valentia miliari, itinere Madritia-
no, asperis locis, & secus vias. Floret Aprili.
Incolæ Enzo vocant, quoniam Erinaceum ani-
mal terrestre, aut marinum azuleorum & spina-
rum vallo prorsus æmulator: qua de causâ Eri-
nacea nomen ei Clusius dedit.

HIPPOPHAES, HIPPOPHAES-
STVM. CAP. XXX.



ΠΙΠΟΦΑΕΣ Græcis, & κνέρον *Nomina*
& τῦρον Galeno teste, Latinis quoq; In Gloss.
Hippophaës. Theophrastus *ππο-*
φρον habet, mendosè opinor, pro Lib. 6. hist.
Hippophaës, vel *πποφρώς*, vt statim post eodè cap. 4.
Ca. 5.

in loco legitur, Lappaginè cōuertit Gaza. Et alio in loco καὶ τὸ τιθύμαλλον, ἐξ ὧς τὸ Lib. 9. hist.
πποφάες, κνέρον διὰ τὸ *πποφάες*, ait, id est, ex Tithymalo optimum Hippophaës ca. 15.
confici apud Tegeam: quod Hippophai spinosæ plantæ conuenire non potest.
Quare hic non Hippophaës, vt Gaza legit & cōuertit, legendum iudicat Cor- Embl. 141.
narius, sed Hippomanes, vt in Græcis exemplaribus exaratum est: cæterum hic le- lib. 4.
gunt attentiores, *τιθύμαλλον, καὶ τὸ πποφάες*, vt nulla sit occasio tam anxie hunc lo-
cum examinandi. Plinius vno loco Hippophaës vocat, in alio Hippophyes, ne-
scio an rectè, pro Hippophaës. *πποφάες* Latini etiam Hippophæstum dicunt, Lib. 21. c. 15.
quod Plinius alterū Hippophaës appellasse videtur: cū enim de Hippophæ Li. 22. c. 12.
priorè dixisset, statim subiicit quæ etiam à Dioscoride post Hippophaës de Hip-
pophæsto scribuntur. In vulgaris tamen exemplaribus corruptè legimus Hippo-
pe pro Hippophyes, vel Hippophaës. Est & altera (sub. spina) Hippophæstū, in-
quit, &c. Aliis etiam in locis idem Hippophæstum vocat. Quidam verò in Spina
fullonia Hippophæston, &c. Et, Hippophæstum nascitur in spinis, &c. Idem Pli-
nius harum vocum etymum explicat, à iuuandis veterinariis has plantas nuncu-
patas fuisse indicans: *φάος* enim vox non solum pro lumine, sed etiam pro auxi-
lio & salute accipitur. Has autem spinosas plantas Dioscorides sic descripsit. Hip-
pophæ, quo vestes poliunt, nascitur in maritimis & arenosis locis. Frutex est
furculosus, densus, vndiquaque amplus: folia habens longa, ad oleæ folia acce-
dentia, sed angustiora & tenuiora: & inter has spinas siccas, subalbicantes, angulo-
sas, à sese distantes: flores corymbis hederæ similes, & racematim inter se cohæ-
rentes, sed minores & molles, & cum candore ex parte rubescentes: radix crassā,
& mollis, succi plena, gustu amara, ex qua succus colligitur velut ex Thapsia. Hip-
pophæstum verò, quod & Hippophaës vocant, nascitur in iisdem locis, in qui-
bus Hippophaës, estque Spinæ fulloniæ species. Est autem humilis herba, foliola
solum parua habens, spinosa, & capitula inania: neque caulem, neque florem pro-
ferret: radicem habet crassam & mollem. Plinius eadem paucioribus verbis com-
plexus est. Hippophaës in sabulosis maritimisque nascitur, spinis albis, hederæ
modo racemosa est: candidis, & ex parte rubentibus acinis: radix succo mader,
qui aut per se conditur, aut pastillis farina. Et mox. Est & altera, Hippophæston,
sine caule, sine flore, foliis tantum minutis. Huius quoque succus hydropicis

Nomina
In Gloss.
Hippo.
Lib. 6. hist.
cap. 4.
Ca. 5.

Lib. 9. hist.
ca. 15.

Embl. 141.
lib. 4.

Lib. 21. c. 15.
Li. 22. c. 12.

Li. 16. c. 44.
Li. 17. c. 10.

Li. 4. ca. 156.
& 157.

Forma.

Li. 22. ca. 125.

Ll. 27. c. 10.

Cap. 13.
Embl. 142.
lib. 4.
Lib. 6. hist.
cap. 3.
Cap. 4.

mirè prodest. Debent accommodatæ esse equorum naturæ, neque ex alia causa nomen accepisse. Quippe quædam animalium remediis nascuntur, locupletati diuinitate ad generanda præsidia, vt non sit mirari satis ingenium eius disponentis auxilia in genera, in causas, in tempora, vt aliis pro sit, atque aliis horis, diésque nullus propè sine præsidio reperiatur. Et alio in loco. Hippophæstum nascitur in spinis, ex quibus fiunt aenæ fulloniæ, sine cauliculo, sine flore, capitulis tantum inanibus, & foliis paruis, multis, herbacei coloris, radículas habens albas, molles. Hoc loco Hippophæstum scriptum est in Plinij exemplaribus, & ita habet etiam Paulus sub litera v. Quod verò dixit, ex quibus fiunt aenæ fulloniæ, corruptum est: quæ enim esse possunt aenæ fulloniæ? Quidam hîc legunt, pectines fullonij: alij, venæ fulloniæ, &c. Quidam, Hippophæston spina in maritimis nascitur: hac implentur cortinæ fulloniæ, &c. auctore Hermolao, quemadmodum & lib. 24. Vulgaris quoque hæc spina, ex qua cortinæ fulloniæ implentur. Cornarius legendum putat, ex quibus fiunt pilæ fulloniæ Theophrastus Hippophaës inter *παρά τὴν ἀχάνθαν ἔχοντα φύλλον* recenset, id est, quæ iuxta folium spinas habent. Et paulò post ait esse *ἀνάχανθον τοῖς φύλλοις μονόριζον δὲ καὶ ἐπὶ γῆν, καὶ χαμαίαν γυλον*, id est, folia sine spinis habere, vnica niti radice, & deiectis in terram caulibus. Hæ delineationes quanquam perspicuè satis & scitè Hippophaës fulloniam plantam

HIPPOPHÆSTVM
quorundam, Dalech.

Pen. in
Aduers.



Ll. de ma-
rit. ca. 11.

Ll. 4. c. 156.
Vires.

expriment, nullis tamen, aut certè paucis herbariis, etiam diligentissimis inuestigatoribus, adhuc comparuit, nisi fortè Anguillaræ huius historiæ peritissimo, qui sibi hanc visam affirmat. Sabulosis Peloponnesi maritimis oritur, inquit, vocaturque vulgò Spina purgatoria, radicibus palmo longioribus, lacteum succum frangendo fundentibus, amarissimum, odore graui. Florem aut fructum tunc non vidit. Cætera similia Hippophæsto fuerunt. Tribulus marinus, siue Pastinaca marina, quædam cum Hippophaë similia habet, sed alia ita dissimilia, vt Hippophaës dici non possit: qua de re alibi diximus. Hippophæstum notius non est Hippophaë. Spina hîc depicta ad Dalechampium Hippophæsti nomine missa est è Melita insula, de qua nihil asserit, sed lectoribus liberam iudicandi potestatem relinquit. Est autem Spina candida, diffusis huc illuc ramulis, aut potius spinis, sparsa: flore exiguo, albo, veluti racematim congesto. An cathartica sit, an succus lacteus purgatorius radice, caulibus, foliis exprimatur, asseuerare non potest, quoniam arida planta missa est, nulla adiuncta mittentis historia. Hippophaës, auctore Dioscoride, succum ex radice emittit, qui syncerus pituitosa, biliosa, aquosaq; oboli pondere deorsum purgat, erui farina exceptus quatuor obolorum pondere cum aqua mulsæ. Sed & ipse frutex cum radicibus tunditur, & datur tritus cum aqua mulsæ selsquihemina. Exprimitur etiam ex radice & herba succus, velut è Thapsia. Huius drachma vna datur ad purgationes. Ex Hippophæsti foliis, radice, & sapite expressum succum siccato, & pondus trium obolorum cum aqua mulsæ cui voles exhibeto: per hunc enim purgatio aquam & pituitam ducit. Priuatim verò conuenit orthopnoicis, comitialibus, & neruorum vitis hæc purgatio. Plinius eadem

eadem breuius tradit. Radicis Hippophæsti succus ad detractiões in comitiali morbo vtilissimus habetur. Et succus earum (radicum Hippophæsti) exprimitur estate ad soluendam aluum tribus obolis, *maximè* in comitialibus morbis, & tremulis, hydropicis, contra vertigines, orthopnœas, paralyseis incipientes. Galenus Hippophæstis & Hippophæstum in simplicium censu omisit. Paulus ea, quæ Dioscorides de viroque tradidit, exscripsit. Li. 16. c. 44.
Li. 27. c. 10.
Lib. 7.

POTERIUM.

CAP. XXXI.

POTHYPION & νούρας Græcis, Latinis Poterium & Neuras, & Phrynium teste Plinio. Poterium autem, quia potrix herba paludosum riguumq; solum amat, ut scribit Dioscorides: Neuras quod nervis amica sit. Hanc sic depingit Dioscorides. Frutex est magnus, ramos habens longos, molles, lori modo lentos, tenues, Tragacanthæ similes: folia parua, rotunda. Totus autem frutex tenui, lanosa lanugine obductus est, & spinosus (in aliis exemplaribus legitur, ὅλος δὲ ὁ γένους περιεχόμενος φλοιὸν λεπτόν, καὶ ποταμὸν γονεὺν ἐχέον. Id est, totus frutex tenui cortice obductus est, & multa lanugine lanosa:) flores sunt parui, albi. Fructum fert gustu odoratum, acrem, & inutilem (sic enim legendus is locus, ut in Aldino exemplari. καρπὸν δὲ γλυκύμυρον διώδην, καὶ δλεχμὺν, &c.) Nascitur in palustribus & collibus. Radices subsunt duum, aut trium cubitorum, robustæ, nervosæ, quæ prope terram rectæ lacrymam emittunt gummi similem. Poterij duobus locis meminit Plinius: priore his verbis. Sunt & ramis venena, rubetis maximè: vidimusque Phyllos in certamine patinis candefactas admittentes, ocyore etiam quàm aspidum perniciæ. Auxiliatur eis Phrynio in vino pota. Aliqui Neurada appellant, alij Poterium, floribus parvis: radicibus multis, nervosis, bene olentibus. Posteriore verò sic. Poterium, aut ut alij vocant Phrynium, vel Neuras, largè fruticat, spinis retorrida, lanugine spissa: foliis parvis, rotundis: ramulis longis, mollibus, lentis, tenuibus: flore longo, herbacei coloris: seminis nullius usus, sed gustu acuto, & odorato. Inuenitur in aquosis collibus: radices habet duas, aut tres, binum cubitorum in altitudinem, nervosæ, candidas, firmas. Circumfoditur Autumnus, & præcisò frutice dat succum gummi similem. Priore loco Plinius flores paruos dixit, qui ἀνθη μικρὰ legerit: posteriore verò flores longos, eosque herbacei coloris, id est, ἀνθη μικρὰ καὶ χλωρὰ, quum recta lectio sit, ἀνθη μικρὰ, λευκὰ, velut Dioscorides habet. Postremo Plinius pro fructu semen dixit, & δλεχμὺν acutum pro acri reddidit. Poterium fruticem, quem Dioscorides ramulis & foliis Tragacanthæ aptè confert, genuinum se pinxisse putat Matthiolus. Peculiariter, inquit, supremos ramos habet in vertice extuberantes, & tenui lanugine obductos, quod in Tragacantha non cernitur. Pena hoc Matthioli Poterium nihil aliud quàm Tragacanthum esse ait, aut ex eius icone depictum: neque enim spinæ, neque cortex similia, neque in spinis folia, neque multa alia à verò dissidentia. Verum autem & legitimum vidisse se ait in horto Patauino, atque alibi. Sparsum & latè porrectum fruticat multis cauliculis, exilibus, cortice nigricante, ac tenui vestitis, etiam aridis, non rectis ut Tragacanthum, sed vltro citroque flexis, & ordine intortis ut Nepa, & Cornuda: sic etiā spinulæ nullo ordine digestæ, sed multò delicatesiores quàm Tragacanthæ, & minores passim cancellatim & reticulatim implicantur foliis nudæ. Foliola non albida, sed nigricantia, quæ non ex aculeis, sed è caule fibris exilibus, triplo quàm Tragacanthæ minoribus, Lenticulæ modo, vel Astragali exeunt: semem pusillum, rubellum, Rhoei simile, & minus. Poterium in Allobrogibus, prope Muram oppidulum Gratianopoli vicinum, in siluosis conuallibus reperitur. Poterij radices contusæ, & in cataplasmate impostæ nervos dissectos & vulnera glutinant. Decoctum quoque ipsarum neruorum affectibus pro

Nomina

Lib. 3. ca. 15.

Forma.

Locus.

Li. 24. c. 16.

Li. 27. ca. 12.

POTERIVM, *Marthiali.*POTERIVM, *Pense & Lobel.*Li. 17. c. 12.
Vires.

Li. 8. simpl.

bus prodest. Eadem Plinius tradit. Radix mira vulneribus sanandis traditur, præcipuèque nervis, vel præcisis illita. Decoctum quoque eius cum melle potum dissolutiones neruorum, & infirmitates & incisuras iuvat. Quibus suffragatur Galenus scribens. Nervas, quidam Poterium vocant: desiccandi absque morfu facultatem habet, adeo ut & nervos incisos glutinare credatur. Radices eius potissimum eiusmodi vim habent; quin & decoctum earum quidam exhibet iis quibus affecti sunt nervi.

CARDVVS Eriocephalus,
Dodonæi.

CARDVVS ERIOCEPHALVS.

CAP.

XXXII.

Nomen.
In histor.
purgant.



CAPITVL O Ianoso Carduum hunc Eriocepalum Dodonæus alio nomine destitutus nuncupavit, Lobellius Carduum tomentosum Anglicum, Coronam fratrum Herbariorum. Caulibus altis assurgit, crassis: folia eius laciniola, magna, spinosa, prona parte candidiora: capitula rotunda, multa, tenui, candida mollique lanugine vestiuntur, eminentibus vndique aculeis exiguis, pungentibus, superius verò stamineis purpureis floribus. Semen oblongius, splendens ut multis Carduiis. Aliunde in Belgium translatus fuisse auctor est Dodonæus: Lobellius Arthesiæ & Neruiensis agri collibus passim, non secus ac in Angliæ Sommerseti præfectura, obuium esse.

CEANO



HEOPHRASTVS cū dixisset gramen ē geniculis oriri, quod eius radices geniculatæ essent, atque ē singulis germen sursum, radicem subtus erumpere, subiicit, ὡσαύτως δὲ καὶ ἡ ἀκανθα καὶ ἀνωθος: ἀλλ' ἔχει καὶ γοναίωδες ἢ ῥίζα τάλιης. Id est, Similiter & spina, quæ Ceanothus appellatur, germinat. Verū huius radix, neque arundinacea, neque geniculata. Hanc Ceanothon Anguillara opinatur esse, quæ in agro Patauino vbiuis nascitur: radicibus sub terra procul huc illuc serpentibus: folio Sonchi, magis spinoso: caule striato: multis in eius vertice capitulis, aculeatis: flore purpureo, in pappos abeunte: semine Cnici, paruulo. Vulgus *Astone* vocat. Acanus verò quamuis priuatim speciem nullam Cardui significet, sed spinosarum omnium echinatum caput, missum tamen ē Creta fuisse asserit Anguillara spinosæ plantæ semen, Acani titulo, quod cū herbam edidisset, humi sparsa eius fuerunt in orbem folia, min⁹ longa quā lata, obscurè virentia, sed neruis per ea discurrentibus candidis: ex quorum medio caulis exit, in ramos exiles diuisus ferè tres, & nonnunquam plures, in vertice tribus foliis cinctos, ē quorum medio prodit echinus pusillus, Caeto similis, floris rubri, semine Cnici coloris cineritij. Harum plantarum quamuis figuræ desint, interea dum opera dabitur alicunde vt ad nos mittantur, historias ex Anguillara addendas hīc putauimus.

CARDVVS FEROX, Lobell.

CAP. XXXIII.



CARDVVM hunc totius acanacei generis facilè Phœnicem, Leonem & ferocem dixere recentiores, Itali *Cardo fero*, *Leone ditto*, à spiculis & infestissimis spinis: nihil enim aliud ē foliis alti⁹ diuisis, & capitulorum exordiis, quā spicula & vepres vnciam & sesquunciam longas videas: cauliculus vix palmum æquat. Flos Cnici siluestris, pallidus, spinis & aculeis sæuientibus horridisque cinctus. Plantæ raræ, & vix notæ nullus vsus. Aiunt in quibusdam collibus Italiæ, ab Apenninis non ita disitis, magna copia prouenire. Hæc Lobellius.

1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900



HISTORIAE OMNIUM PLANTARVM

LIBER DECIMVS-
QVINTVS,

*In quo describuntur & ad vinum depinguntur Planta bulbosa,
carnosa radicibus, & geniculata.*

L I L I A. C A P. I.



X DIFFERENTIIS à plantarum partibus sumptis tum multæ, tum rei herbariæ studiosis maximè cognitū necessariæ sunt, quæ à radicum diuersitate pentuntur, quas diligenter Theophrastus explicauit. Nam vt arborum radices omittamus, in oleraceo genere alia sunt lignosa, inquit, vt Ocimi (legendum enim *Εἰσι μὲν γὰρ ἀξυλώδεις*, vt legit Gaza, pro *λαχνώδεις*) aliæ carnosæ, vt Betæ, & multo magis Ari, Asphodeli, Croci: alia ex carne & cortice cōstant, vt Raphani & Rapi: alia sunt geniculatæ vt Arūdinum & Graminum:

Lib. 1. ca. 9.
& 10.

alia ex tunicis multiplicibus & corticibus cōponuntur, vt Scillæ, Bulbi, & Ceparum. De quibus omnibus hīc non agimus, sed de bulbosis: quo nomine tum eas intelligimus, quæ ex multis capitulis cohærentibus coagmētata sunt, vnde etiam capitata appellantur, quæ capitula, bulbi, & nuclei, & spicæ Latinis dicuntur, sicut Græcis Gelges, Aglithes, & Aglidia grana, sicuti in Allio, tum eas quæ rotundæ suis membranis tunicantur, quæ radices etiam Bulbi nominantur, quales sunt Liliij & Narcissi. Tum de carnosis hoc libro dicemus, & de geniculatis, id est, iis quæ nodis quibusdam interstinctæ protuberant, rotundæ & leuiter capitata. Ac primum de iis quæ etiam vulgò notæ sunt, quale est quod *κείρον* Græcis dicitur, & *λεῖρον* & *καλλεῖρον*, & *κενόνθερον*, Latinis Lilium & Iunonis rosa, Lilium album Officinis, Mauritanis *Susen*, Gallis *Lys*, Germanis *V-weisz Gilgen*, & *Lilgen*, Italis *Giglio*. *Λεῖρον* tamen, id est, blandum, suaue, ac concupitum, nō Lilium duntaxat, sed plures alios venustos flores, & bulbaceas herbas significat. Iunonis rosā dicitur, quod veteres Poëtæ Græci finxerunt ex Iunonis lacte respersa terra natum Lilium. Nam cum Hercules puer, quem ex Alcмене sustulerat Iuppiter, Iunonis dormientis vberibus admotus esset, & lacte se repleisset, post suctū digressus mamma lacte copioso profluxit: Quod in cælo perfusum est, lacteā effecit viam: quod humi sparsum, Lilium lacteo flore nitens creauit, vnde Iunonis rosā dictum. Liliij genera sunt album & rubrum, testibus Dioscoride & Plinio, quæ sponte non arte oriuntur, etiam si colores Lilio candido mangonio quæsitos fuisse Plinius asse-

Nomina

Genera.

L L L

LILIVM album, Marth.



Lib. 21. c. 5.

ueret. Lilium album folia fert longa, lata, car-
nosa, pallido virore nitentia, secundum longi-
tudinem striata: ex horum medio caulem rectū,
rotundum, cubitalem, & maiorem, foliis multo
minoribus vestitum, in cuius summitate flores
Crocī, maiores, eximij candoris, odorati, senis
vt plurimum foliis ordine dispositis constant,
longiusculis, angustis, calathi vel nolæ effigiem
exprimentibus, repandis, è quorum medio fi-
bræ crocæve stamina exeunt lingularum effi-
giē. Inter hæc vnus omnium longissimus &
rectus apex, in extremo quadatenus rotundus,
herbacei coloris, nolæ plectro ferè similis: radix
rotunda, candida, cepæ magnitudine, compa-
ctili laminularum sursum spectantium serie,
inferne fibrata, viscido succo turgens. Huius
bulbaceæ plantæ vt notissimæ delineationem
Dioscorides prætermisit: quam tamen Plinius
affabre depinxit his verbis. Lilium rosæ nobi-
litate proximum est, & quadam cognatione
vnguenti oleiq; , quod Lirium appellatur. Et
impositum etiam maximè rosas decet, medio

prouentu earum incipiens. Nec vllis florum excelstas maior, interdum cubito-
rum trium, languido semper collo, & non sufficiente capitis oneri. Candor eius
eximius, foliis foris striatis, & ab angustis in latitudinem sese laxantibus, effigie
calathi, resupinis per ambitum labris, tenuiq; filo & semine, stantibus in medio
crocis. Ita odor colorq; duplex, & alius calicis, alius staminis, differentia angusta.
Et paulò post. Est & rubens Lilium, quod Græci Crinon vocant. Alij florem eius
Cynorrhodon. Laudatissimum in Antiochia, & Laodicea Syriæ, mox in Phaselide.
Quantum locum obtinet in Italia nascens. Sunt & purpurea Lilia, aliquando
gemino caule, carnosiore tātum radice, maiorisq; bulbi, sed vnus Narcissum vo-
cāt. Huius alterū genus flore cādido, calice purpureo. Differētia à Liliis est & hæc,
quòd Narcissis folia in radice sunt, probatissimis in Lyciæ montibus. Tertio ge-
neri cætera eadem, calix herbaceus. Omnes ferotini: post Arcturum enim florent,
ac per Æquinoctium Autumni. Inuenta est & in his ratio inferendi, mōstrificis
hominum ingeniis. Colliguntur namque mēse Iulio scapi arefcentes, Liliæque
suspenduntur in furno. Deinde nudantibus se nodulis, in facie nigri vini vel Græ-
ci mēse Martio macerantur, vt colorem percipiant, atque ita in scrobiculis se-
runtur heminis facis circūfusi. Sic fiunt purpurea Lilia: mirūmque ita tingi ali-
quid, vt nascatur insectum. Quæ partim ex Theophrasto translata sunt. τὰ δὲ
κεῖνα, inquit, τῇ μὲν χροίᾳ τὴν εἰρημὴν ἔχοντα διαφορὰν μόνον καὶ οὐκ ἔστιν, ὡς ἐπὶ τῶν δι-
αφορῶν δὲ παντί. τὰ γὰρ δὲ τὸ τοῦ χάρος καὶ αἵρος διαφορὰ. καὶ ἔλαττον δὲ καὶ οὐκ ἔστιν ὅτε μὲν
ἐν κελύφῃ, ὅτε δὲ πάλιν γίνεσθαι. βλαστάνει γὰρ τὸ ἄκρον. πανιότερα δὲ ταῦτα. ῥίζαν δὲ ἔχοντα
πολλὴν, εἰρημὴν καὶ τροφὴν. ὅ δὲ κατὰ τὸ ἀφαιρέματος ἐκ βλαστάνει, καὶ ἀποδίδωσι τὸ κεί-
νον, πάλιν ἑλπίον. ποιεῖ δὲ τινα τὴν συβρίνην. (lege συβρίνην) καὶ φυτὸν ὡς οὖν. Id est, Lilia su-
pra dicta coloris differentia inter sese distant. Vnicum ferè caulem habent, dupli-
cem, rarò: quam differentiam cælum & solum efficiunt. Ex singulis caulibus ali-
quando vnum, aliquando plura Lilia emergunt: pars enim suprema germinat. Sed
hæc rariora. Radice est copiosa, carnosæ, rotundæ. Fructus detractus germinat, &
Lilium emittit, sed minus. Reddit & lacrymarum confluxum quandam, quem
etiam

Lib. 6. hist.
ca. 6.

etiam ferūt. Gaza, nescio qua ratione motus, vertit. fecit & lacryma cæcum quoddam confluuium, quod etiam ferunt. Cæterum quod dixit Plinius rubens Liliū Crinon vocari à Græcis, docti quidam legendum censent, ἐρυθρὸν κρίνον, vel composita voce ἐρυθρόκρινον: nam etiam albū Liliū Crinon vocant. Quod autem Liliū florem Cynorrhodon vocari apud eundem legitur, alij ex Hefychio lectio-

MARTAGON, Math.



LILIVM Purpureum
maius, Dodonai.



nem hanc retinendam, alij falsi suspectam, & Crinorrhodon legendum censent: maximè cum Liliū paulò antè Crinon vocari dixerit, & Cynorrhodi appellatio nihil cum Lilio commune habeat: & Crinorrhodon propriè Liliū rosam & florem significet, voce ad exprimendum rubentis cocci splendorè aptiore, ut quæ cum rosâ Liliū comparat, non alba quidem, sed rubente, & purpura fulgente: quod Crinorrhodon Hippocrates Crinanthemum nuncupavit. Liliū purpureum, quod auctore Matthiolo Chymistæ in Italia Martagon vocant, Dodonæus Liliū siluestre, Germani Goldtzwurz à flauo Bulbi colore, Galli *Lys sauvage*, Itali *Giglio rosso*, caules edit bicubitales, aut altiores, rotundos: folia longa, lata, acuminata, non per caulem incerto ordine sparsa, sed quibusdam interuallis stellæ modo radiatis eum ambientia: flores è suis pediculis deorsum dependent, Liliū diuisura, sed minores, colore purpureo obsoleto, purpureisque aliquot maculis splendentes, & staminibus eiusdem coloris in medio, quorū

foliola retrorsum reflexa in orbem ferè incuruantur: radices bulbosæ, veluti ex nucleis multis compositæ, aurei vel flauī coloris, ex quibus fibræ dependent. Nascitur Liliū istud in multis Germaniæ locis, in siluis & montibus, Fuchsio & Gesnero testibus. Belgæ cum aliis Liliis in hortis habent. Floret sub finem Maij, aut Iunij initio, candida Lilia anteuertens. Fuchsius pro Asphodelo fœmina depinxit. Tragus pro Hyacintho Poëtarum. Est Herbariorū Hemerocallis. Peruenusta alia planta à quibusdam Liliis rubris adnumeratur, quæ florem vnum pulcherrimè & suauissimè rubentem profert, magnum instar Liliū rubri, quam Turcico vocabulo *Tulipam* vocant: de qua cum Tulipis aliis dicemus. Dodonæus Lilia alia purpurea proposuit. Vnum maius, caulibus proceris, longis, sæpe altioribus quàm Liliū albi: foliis nigrioribus & angustioribus, circa caulem multis, ante eius exortum nullis: flores summo caule erumpunt copiosi, decem, duodecim, aut plures, vsque ad decem & octo, & viginti, alij super alios incerto ordine digesti, Liliū alterius forma & magnitudine, colore rubro ad croceum inclinante, multis, exiguis, nigris quasi punctulis, literarum quarundam veluti rudi-

De florib.
ca. 33. & 35.

mentis respersi: radices Bulbi magni sunt, ex multis quoque nucleis, vt Lilij candidi, sed maiores. Dodonæus etiam Hyacinthum scriptum & Comofandalon nuncupat, Fuchsius Lilium croceum, Lobellius Lilium cruentum, alij siluestre Lilium. Estq; aut Hemerocallis, aut eius congener. Negat tamen Dodonæus Hemerocallidem esse: cum enim Hemerocallis, auctore Dioscoride, in singulis apophysis tres, aut quatuor flores proferat colore valde luteo, Lilium autem istud apophyses, id est, ramulares propagines nullas habeat, & flores in caule non modò tres, aut quatuor, sed non raro decem & octo, & viginti, coloris non lutei, sed purpurei crocei, Hemerocallis dici non potest, quin potius Lilium, quod Dioscorides *αδρφυρον* vocat, Plinius rubens. At hæc de apophysis & florum numeratio leuis est momenti, vt ait Pena: nam si quis Lilium candidum contempletur interdum exortus istos edere, in quibus aliquando complures flores congesti sunt, interdum singuli, non magnopere refragabitur. Alterum purpureum Lilium minus, caule est multò breuiore, cubitali, videlicet tantum, aut minori: foliis similiter nigricantibus, angustioribus & minoribus. Flores è summo caule erumpunt, singuli tamen suis pediculis, modò breuoribus, modò longioribus insidentes, coloris quoque purpurei crocei, notulis similiter quibusdam nigris, & perquam exiguis ornati, Lilij etiam diuisura, sed paulò minores: pro radicibus & minores Bulbi sunt, supra quos & infra fibræ adhærent. Floret sub finem Maij, reliqua Lilia ante-

LILIVM Cruentum bulbos gerens, Lobellij.



LILIVM Cruentum aliud, Lobellij.



cedens. Lilium istud Dodonæus Ouidij Hyacinthum esse credit. Hæc duo Lilia cultu tantum distare videntur, vt maius satium sit, minus agreste. Neutrum verò purpureo est flore, sed colore corticis mali aurei. Quædam alia pulcherrima Lilia Lobellius picta dedit. Prius est Lilium cruentum bulbos gerens, summo alis diuiso, cui flores rutilant, & bulbos nucleis stipatos profert. Alterum, Lilium cruentum, Lilio purpureo maiori minus, flore Martagi rutilo, & secundum caule sesquicubitalem bulbulis à medio ad summum vsq; ornatum. Tertiū, Lilium Persicū, vulgò *Pennachi*



nachi Persiano, quod rarius Germaniæ, Galliæ & Angliæ: Lieræ solum Belgarum visitur, inquit, in horto amœnissimo, stirpiũque exoticarum ditissimo generosi viri Ioannis Dilshij. Caulis est ternũ cubitorum, quem fusẽ ambiunt folia ex cæruleo virentia, mucronata, Liliis cruentis paria: flores nutantes, nolarum effigie obsoleta purpura nigricant: radix bulbosa, tissa, minimẽ squamis loricata, albida, auersa parte sessilis & plana. porrectis subtrũs, obscurẽ flauentibus. Nec multũ à Liliis differt Chalcedonicũ Lale, quod supradictis Belgij hortis prouenit, sesquipedem alto caule, foliis longioribus Lilij montani. Flores rubentes, nutantes Lilij Persici ritu nolarũ figura, quales pictura docet, se non potuisse obseruare ait: caulem quidem edidisse, sed qui summo statim marcescere cœpit. Radix cepacea cõcretionẽ tetri & virosi Colchici, vti tota planta, odoris. In Belgium missum Lale, Turfani & Coronæ Imperialis nomine. Myconus plan-

tam aliam ex Hispania misit, quàm Lilium polyrrhizon nominauit. Lilium quidẽ, quod florũ figura, colore, dulci & glutinoso sapore Liliũ albũ referat: polyrrhizon à radicũ copia. rectẽ, an secũs, id peritis Herbariis æstimandũ relinquens. Herba hæc Hastulã regiam prorsus æmulatur, siue folia cõsideres, quæ illius foliis aded similia sunt, vt priuſquàm florere incipiat, Hastulæ regiæ esse dicas. Radices demissas, dulces, glutinosas: ex quibus caulis erigitur, sapius duos cubitos altus, cauus, sine medulla, in quo flores candidi, Lilij effigie, odorati, multo tamẽ minores,

LILIVM Polyrhizon Myconi, Phalangium quorūdam.



Lib. 3. c. 99.
Vires &
Temper.

Li. 26. c. 19.

Li. 23. ca. 41.

Li. 7. simpl.

stamina quædã lutea intus habentes : semen in vasculo triangulari cõclusum, nigrũ, triquetrũ. Nascitur in montibus, sed terrenis humidisq̃ue locis, quãdoq; iuxta fluenta. Quibusdã Phalangium videtur esse, aut Phalãgij genus, diuersum a Phalãgij icone quã Matthioli dedit. Ex Lilij flore, vt scribit Dioscorides, vnguentũ fit, quod ab aliis Lirinũ, ab aliis Sufinum appellatur, ad emolliẽdos nervos, priuatimq; vuluarũ duritias aptũ. Folia herbæ illita serpentii morsibus subueniunt, feruefacta ambustis prosunt, eadem in aceto cõdita vulneribus opitulantur. Succus foliorũ cũ aceto & melle in æreo vase coctus, cõtra vetusta vlcera & recẽtia vulnera medicamentum fit. Radix asã, aut cũ rosaceo trita ambustis medetur, vuluã emollit, mēstrua ducit, & vlceribus cicatricẽ inducit. Cũ melle subacta nervorum præcisionibus & luxatis auxiliatur. Alphos, lepras, fursuresq; emēdat. Achores absterget, faciemq; expurgat, & erugat. Testiculorũ inflammationes trita cũ aceto, aut Hyoscyami foliis & farina tritici demulcet. Semẽ cõtra serpentii morsus potũ valet. Illinuntur erysipelatibus se-

men & folia cũ vino trita. Vsum Lilij medicũ etiam Plinius prolixẽ exposuit his verbis. Lilij radices multis modis florẽ suũ nobilitauere, contra serpentii ictus ex vino pota, & contra fungorũ venena. Propter clauos pedũ in vino decoquuntur, triduoq; nõ soluũtur. Cũ adipe, aut oleo decoctẽ, pilos quoq; adustis reddũt. E mulso pota inutile sanguinẽ cũ aluo extrahunt, lieniq; & ruptis vulsis prosunt, & mensibus scēminarũ. In vino verò decoctẽ, imposita; cũ melle, nervis præcis mēdentur. Lichenas, & lepras, & fursures in facie emēdant, erugāt corpora. Folia in aceto cocta vulneribus imponũtur: epiphoris testium in melle cũ Hyoscyamo & farina tritici. Semen illinitur igni sacro, flos & folia vlcerum vetustati. Succus qui flore expressus est, ab aliis mel vocatur, ab aliis Siriũ, ad emolliẽdas vuluas sudoresq; faciẽdos, & suppurationes coquẽdas. Vbi pro Syriũ, Seiraũ, quasi sapã Dalechãpius legit: Cornarius falsò legi putat, Mel vocatur, & legendũ esse, Phaselinũ vocatur, ab aliis Syriũ, ex eodẽ Plinio demõstrat, qui hunc locũ citat alibi his verbis. Lirinũ, quod & Phaselinũ & Syriũ vocauimus, renibus vtilesimũ est, sudoribũsq; euocadis, vuluã emolliẽdẽ, cõcoquendisq; intus: quo tamen loco Dalechãpius legit, Lirinõ, quod & Melinũ & Seiraũ vocamus. Sed & laudatissimũ in Laodicea Syrię, & mox in Phaselide Liliũ esse Plinius ipse dixit loco à nobis primũ adducto. Galenus distinctiũs hæc declarat. Lilij flos, inquit, temperaturã mistam obtinet, partim ex tenui, partim ex terrena essentia, ex qua vtq; habet, vt gustũ sit amara, partim ex aqua, ea; tẽperata. Itaque etiã quod ex ea cõficitur oleum, citra morsum digerẽdĩ, simulq; emolliẽdi facultatẽ habet: vnde fit vteri duritiei aptissimum. Porro radix foliaq; per se trita desiccāt & absterunt, & digerũt moderate: proinde ambustis quoq; cõpetunt. Radicẽ ergo tostã, deinde cũ rosaceo contritã, ambustis, quoad obducatur cicatrix, imponũt: quippe cũ alioqui & aliorũ vlcerũ omniũ bonũ sit inducẽdã cicatrici remediũ. Quinetiã nervos emollit, mensesq; prouocat. Folia verò præcoquẽtes, & ipsa ad obductã vsq; cicatricẽ imponũt, non in ambustionibus dũtaxat, sed aliis quoq; vulneribus. Sũt & qui aceto ea cõdiẽtes, ad vulnera

ad vulnera suo tempore vtuntur. Plus tamen inest abstergentis facultatis in radice quam in foliis: quanquam tamen nec in ea ipsa multum inest: nam primi ordinis abstergentium est medicamentum. Itaque cum aut vitiligines, aut psoriam, aut lepram, aut achoras, aut aliquid id genus extergere volumus, commiscemus ei aliquid aliorum medicamentorum validius extergentium, cuiusmodi est mel. Cæterum si id moderatè illi ac conuenienter admisceatur, & ad neruorum diuisiones competit, & ad alia vniuersa, quæ valenter exsiccare postulant absque morfu. Imposuimus verò etiam quandoque & foliorum succum cum aceto & melle coctum. Quinque partibus succi plus utroque erat, atque insigne medicamen ad omnia ea quæ exsiccare postulant absque morfu: ceu vulnera omnia ingentia, & maximè quæ in capitibus musculorum eueniunt, tum ea quæ nimis mollia sunt & diuturna, atque ægre ad cicatricem perducuntur. Tradit Matthiolus elixam Lilij radicem, veteri axungia exceptam & illitam, pedū clauos tollere, sed ante triduum remoueri non debere. Eandem ex adipe & oleo adhibitam fluxos pilos replicare: cum mullō autem potam, sanguinem extra vasa concretum per aluum eicere, suppuraciones moliri & concoquere, & duritias quascumque emollire. Stillatitiam florum aquam dari vtiliter potandam ægre parturientibus, & ad pellendas secundas addito croco & cassia. Oleum quod ex floribus paratur, valere ad omnes frigidos neruorum morbos, nempe ad conuulsiones, & resolutions: præstat item ad emollienda articulorum impedimenta, & scirrhusos quoscumque tumores. Illinitur quoque puerperis vteri dolore languentibus, addito oleo è Lini semine, præsertim cum succida lema iis calidis imbuta ventri superponatur. Additur clysmatibus cum induratas faeces mollire fuerit opus. Lilia, quæ diu in oleo macerata fuerunt, illita, prius calefacta, apostemata calida citra dolorem maturant ac digerunt, præsertim ea quæ sunt in articulis.

In cap. 99.
lib. 3.

HEMEROCALLIS. CAP. II.



RÆCIS ἡμεροκαλλίς & ἡμεροχαλλίς, Latinis similiter Hemerocallis & Hemerocalles dicitur, Gazæ Elixum, Italis Giglio saluatico, Gallis *Lys sauage*. Hemerocallis, vt describit Dioscorides, folia & caulem habet Lilio similia, Porri modo viridia: flores in caule per singulas propagines terni aut quaterni erumpunt, Lilij diuisura quum hiare cœperint, colore perquam pallido (Græcè legimus, τὴν δὲ χροὴν ἰσχυρῶς ὀχρεὰν, id est, colore valde ochreo. Ochra autem, teste Dioscoride, μήλινα est, id est, lutea, & melior quæ saturata. Quare colorem florum Hemerocallidis Dioscorides intelligere videtur saturatè luteum, non valde pallidum:) radix est bulbosa valde magna. Plinius Hemerocalles inter ea, quæ folio tantum coronant, numerat. Alio in loco, Hemerocalles, inquit, pallidum è viridi & molle folium habet, radicè odoratam & bulbosam. Quæ de Hemerocalide Dioscoridis accipienda esse perspicuum est. Theophrastus suffrutices coronarios recenset, Rosam, Violam, Iouis florē, Amaracum, Hemerocalles, item Serpyllum, Sisybrium, Helenium, Abrotonū. ἅπαντα γὰρ ταῦτα, inquit, ξυλῶδη καὶ μικροφυλλὰ. διὰ καὶ φρυγανιστὰ. Id est, Omnia hæc lignosa sunt, & minutis foliis constant. Quare suffrutices sunt. Et alio in loco, καὶ ὁ ἄλλος ἀντήν, inquit, καὶ ποσειδημένηα, πένινα σπέρματα, διον. ἰωνία, διὰς ἀνθος, ἴφρουον, φλῶξ, ἡμεροκαλλίς. & γὰρ αὐτὰ, καὶ αἰρίζαι ξυλῶδεις. Id est, Reliqui autem omnes suprà dicti flores semine exeunt, vt Viola, Iouis flos, Iphyum, Phlox, Hemerocalles. Nam & ipsa, & eorum radices lignosæ sunt. Ex quibus intelligere licet, Hemerocalles Theophrasti radice lignosæ, ab Hemerocalide Dioscoridis bulbosæ dissidere. Athenæus ex Theophrasto Hemerocalles inter coronarios flores numerari scripsit. τοῦ δὲ ἡμεροκαλλίς καλουμένου ἀνθους ὁ τὴν μὲν νύκτα μαραινέται, αἶμα δὲ τοῦ ἡλίου ἀνατέλλοντι θάλλει. Id est, Hemerocallis florem nocte tabe-

Nomina

Lib. 3. c. 120.

Forma.

Lib. 5. c. 68.

Lib. 21. c. 10.

Lib. 8. c. 21.

Lib. 6. hist.

cap. 1.

Lib. 6. hist.

cap. 6.

Lib. 15.

Dipnos.

scere, oriente sole pullulare. Quod sic intelligendum, florem hunc noctu contrahi collabiq; in sese, diu verò sese explicare, ac veluti reuiuiscere: quod Solisequiis

HEMEROCALLIS prior,
Matthioli.



HEMEROCALLIS altera,
Matthioli.



In c. 120.
lib. 3.

& Heliotropiis ceteris accidit. Matthiolus Hemerocallidem nusquam non in Italia provenire tradit, circa messem in aruis inter segetes, in pratis, in montibus, & in vallibus, aureo colore micantem, Liliū siluestre vulgò dici: radice niti bulbosa, Lilio hortensi simili, sed alio colore: flores suo tempore dehiscentes fulgentis auri modo rutilare, quem colorem perquam pallidum perperam appellat, nec eum intelligit Dioscorides, cū dicit $\chi\rho\alpha\upsilon\iota\varsigma\ \iota\epsilon\chi\upsilon\pi\alpha\iota\varsigma\ \omega\chi\rho\epsilon\acute{\iota}\nu$, colorem valde ochreum quem saturatè luteum à Dioscoride intelligi diximus. Hemerocallidis genus alterum idem Matthiolus facit, specie quidem superiori simile, sed radice ex multis & pa uis coagmentata bulbis, floribus aliam diuisuram habentibus, ut eius pictura demonstrat. Priorem Hemerocallidem superiori capite diximus esse

De florib.
cap. 33.

Lilium purpureum maius Dodonæi, qui huic Hemerocallidem aliam substituit, Lilium videlicet non bulbosum. Cuius duo reperiuntur genera, florum colore discreta. Vni flos luteus: alteri in rubro dilutiori purpureus. In lutei genere flos vnus minor, alterius paulò maior est: vterque tamen purpureo minor, qui maximus est, & Lilio candido magnitudine ferè par. Sunt autem Lilio non bulboso folia oblonga & angusta, Porri aut Asphodeli folijs similia: caulis cubito altior, rotundus, lævis, absque folijs, superiùs in apophyses duas vel quatuor diuisus: in quorum singulis flores tres aut quatuor, Lilium forma & diuisura referentes, colore in vno quidem ochræ, id est, ut diximus, luteo, in alio rubro purpureo, cuius tamen medium floris luteum est. Post flores crassæ, triangulares gignuntur siliquæ, in quibus semen nigrum & splens, Præoniæ femina simile, sed minus. Radices sunt non bulbosæ, sed veluti Asphodeli lutei, multæ, oblongæ, coherentes, & vni quidem, cui videlicet flores maiores & purpurei, crassiores nodosioresque: alteri verò minoris floris, tenuiores & longiores, è quarum annexis fibris quædam crassiores

LILIUM Non bulbosum,
Hemerocallis Dodo.



LILIUM Rubrum
non bulbosum.



flores serpunt, quibus non secus ac *Asphodelus luteus* in plures platas facile multiplicatur. Peregrinum Belgio istud *Lilium* est: floret ante *Lilia candida*. *Lilium* luteum nonnulli appellant, sed rectius *Lilium* non bulbosum dici *Dodonæus* putat: alij *Liliaginem*: plerique *Liliastrum*: *Pena* & *Lobellius* *Liriasphodelum luteum* *Liliflorum*: veteres, inquit *Dodonæus*, *Hemerocallida*, quia caules non bulbosi *Lilij* in propagines seu ramulos distribuuntur, singulique flores tres aut quatuor promunt, & eos quidem ochra colore in vno genere. Jam & *porphyranthes Hemerocallis* nominata reperitur: quæ appellatio purpurei floris non bulboso *Lilio* conuenit. Quæ omnia non bulbosum *Lilium Hemerocallida* legitimam esse perspicue ostendunt. Quod verò tribuit *Dioscorides* *Hemerocallidis* radicem bulbosam, innuit istud, inquit, apud *Dioscoridem* *Hemerocallidis* descriptionem deprauatam: vel enim superuacuorum scilicet, & veritati repugnantium adiectione ampliatam, vel duorum *Liliorum* descriptiones in vnam contractas. His rationibus *Hemerocallidem* suam asserere nititur *Dodonæus*. Herbarij tamen *Matthioli Hemerocallidem* magis amplectuntur. *Lilio* non bulboso est persimilis planta hîc appicta, *Lilij* rubri non bulbosi nomine meritò donanda: radicibus duntaxat differt, quas multum fibratas habet. His pulchrius *Hemerocalles pictum* damus. Semine ex *Constantinopoli* delato *Lugduni* in horto quodam *Dalechampij* industria creuit. rara hæc stirps, aspectu perelegans, *Hemerocalles Constantinopolitanum phœniceum*, vnicò flore ab ipso appellata, è qua viua pictura hæc expressa est. Bulbum planè *Lilij* vel *Hemerocallidis Matthioli* pro radice habet, fibris plurimis capillata, ex qua erigitur caulis vnicus, cubitalis, teres, læuis, herbaceus, nodis & geniculis distinctus: è nodis singula folia, ex singulis geniculis modò bina, modò quaterna, rariùs terna prodeunt, caulem ambientia, *Lilij* foliis similia, sed minora & acuminatiora. In caulis summo vertice vnicus flos emicat, qui sex foliis constat, striatis, florum *Lilij* speciem referentibus, nisi minora essent, & colore phœniceo pulcherrimo: ex quorum medio sex apices sese exerunt phœnicei, staminibus pallidis

pallidis nixi, & media inter ipsos claua apicum staminibus concolor. Verùm non tam venustus est flos tum specie, tum colore, quàm structura, & foliorum situ admirandus. Non enim quemadmodum floris Lilij iam hiantis folia solummodo terram versus inclinata & repanda sunt, sed ita foras inflexa & intorta, vt ipsorum

HEMEROCALLES Con-
stantinopolitanum Phanicum
unico flore.

Lib. 3. c. 120

Vires.

Lib. & c. 21



cacumina omnia in idem quasi cœtrum coëant in ipsius caulis vertice, vnde primùm exiere, apicibus ex ipso floris vmbilico foris pendulis, qui in Lilio & similibus recti stant. Hemerocallidis radix trita, auctore Dioscoride, trita pota, aut cum melle & lana in pello apposita, aqua educit & sanguinem: folia trita imposita mammarum ex partu & oculorum inflammationes mitigant. Radix & folia ambustis commodè imponuntur. Plinius, Hemerocallidis radix cum melle imposita ventri, aquam pellit, & sanguinem etiam inutilem: folia epiphoris oculorum, mammarumque post partum illinuntur. Quæ eadem sunt cum iis quæ ex Dioscoride diximus, nisi quòd radix ventri imponenda non est, vt Plinius dicit, sed ad vterum apponenda in lana cum melle, vt pessus fiat, vt Dioscorides ait, συν μέλιτι ἐν ἐρίω πορεσθεῖσθαι πρὸς τὸν ὑδραγωγὸν, καὶ ἀμαγωγόν. Galenus Hemerocallidis radix, inquit, similis est Lilij radice & specie & viribus. Prodest non secus atque illa igni ambustis: nam & leuiter discutit, & nonnihil repellit.

BVLBVS.

CAP. III.

Nomina
Genera.
Lib. 7. hist.
cap. 13.



Cap. 16.
Lib. 10.

Lib. 19. c. 5.

Lib. 19. c. 5.

BΟΛΒΟΣ Græcis, Bulbus Latinis, Arabibus *Basar*, *Alzir*. Bulbi esculenti, qui βολβός ἐσθλὸς, & vomitorij, qui βολβός ἐμελικός dicitur, tantum meminit Dioscorides. Theophrastus plura genera posuit. τὰν δὲ βολβῶν, inquit, ὅτι πολλὰ γένη φανερόν. καὶ γὰρ τῷ μεγέθει, & τῇ χροίᾳ, καὶ τοῖς ὀφθαλμοῖς διαφέρουσιν, καὶ τοῖς χυλοῖς. ἐνιαχὶ γὰρ ὅσων γλῶκτες, ὥστε καὶ ὁμοῖς ἐστὶν ἡ ἀθάπερ ἐν χερρόνησῳ τῇ ταμερῇ. Id est, Multa esse bulborum genera constat: differunt enim magnitudine, colore, figura, succo: nam quidam adeò sunt dulces, vt crudi comedantur, quemadmodum in Cherroneso Taurica. Et paulò inferius. πολλὰ δὲ καὶ ἐν βολβῶν, καὶ ἐλάτῳ (Gaza legit καὶ ἐκ ἐλάτῳ) ταῦτα ὅσα γὰρ ἀπερ τὸ λακκίον, & βολβίνη, καὶ ὁ πιτίων, καὶ κύξι (Lege κίξι, quemadmodum apud eundem Theophrastum lib. 1. & apud Pollucem legimus) καὶ τῶν πρὸν τινὰ τὸ σισυριγγίον. βολβῶν δὲ ταῦτα, ὅτι ἐργονύλα, ταῖς ῥίζαις, ἐπὶ τοῖς τε χρώμασι λευκά, καὶ ὁ λεπτυνώδην, ἰδιὸν δὲ τῶν σισυριγγίον, τὸ τῆς ῥίζης ἀνέανθον τὸ γὰρ πρῶτον, ὃ καλεῖται χετιμῶνα (Emenda πρῶτον, καὶ χετιμῶνα) τοῦ δὲ ἑπὶ τὸ ἐλῶδιμον ἀνέανθον. Id est, Plura autem sunt Bulbosa, nec iis pauciora, veluti Viola alba, Bulbine, Opition (sic legit Gaza) Coix, & quodammodo Sisyrinchium. Bulbosa autem hæc sunt, quòd radices habeant rotundas, colore candidas, & non squamosas. Quæ sic conuertit Plinius. Bulborum genera differunt colore, magnitudine, suauitate: quippe cum quidam crudi mandantur, vt in Cherroneso Taurica. Et paulò post. Genera Græci hæc fecere. Bulbinen, Setanion, Piton, Acrocorion, Sisyrinchium.

rinchium. In hoc mirum, imas eius radices crescere hyeme, verno autē cū appa-
ruerit viola, minui & contrahi, tum deinde Bulbum pinguescere. Ex quorum loco-
rum cōparatione perspicuum est vtriusvis auctoris locos corruptos esse: nec enim
Seranion Bulbum, nec acrocordion Theophrasti exemplaria habent. Idem Plinius Lib. 19. c. 5.
Catonem Megaricos Bulbos celebrare ait. Deinde cū tantā suauitatis esse in
Cherroneso Taurica natas dixisset, vt crudi mandantur, post hos, inquit, in Africa
nati maximē laudantur, mox Apuli. Est & hic obseruandum, Bulbum esculentum
& vomitorium propriē Bulbos appellari. Verū generaliter omnes olerum radi-
ces, quæ similitudinem Bulbi habent, Bulbos dici. Sic Celsus. Ex oleribus valetiora Lib. 14. c. 18.
Rapa, Napiq; & omnes Bulbi, in quibus Cepam quoq; & Allium numero. Quare
Theophrastus loco citato non βολβός, sed βολβώδη appellat. Id verō magis mirum
quod de lanigeris bulbis Theophrastus prodidit his verbis. μέγιστη δὲ καὶ ἰδιωτέτη Lib. 7. hist.
διαφορὰ τῶν ἐσθλοτέρων. ἔστι γὰρ τινέος τοῦτον, ὃ φέρεται ἐν ἀγχαλοῖς, ἔχει δὲ τὸ ἐξ αὐτοῦ τὰς cap. 33.
πρώτους χιτῶνας. ὥστε ἀνὰ μέσον εἶναι τοῦτε ἐλωδύμου τοῦ ἐν τῷ, καὶ τῷ ἔξω. ὁφθαίεται δὲ ἐξ
αὐτοῦ τὰ πόδια. (Athenaeus & Pollux legunt πόδια, Plinius interpretatur mapalia)
καὶ ἄλλα ἡμέτερα. διὰ καὶ ἐλωδὺς τοῦτο, καὶ ἔχῃ ὥσπερ ἐν ἰνδοῖς τελεωδύες. Id est, Maxima au- Lib. 19. c. 2.
tem & maximē propria differentia est lanigerorum. Est enim tale quoddam genus
in litoribus nascens. Lanam sub primis tunicis habet, ita vt in medio sit eius, quod
edule est tum internum, tum externum. Texuntur ex ea & togæ (Sic πόδια verūt
Gaza, Bayffius fascias pedum, seu fascias crurales) & alia vestimenta: est enim id la-
nosum, non quemadmodum apud Indos capillaceum. Qua de re Plinius ita scribit. Lib. 19. c. 2.
Theophrastus auctor est, esse Bulbi genus circa ripas amhium nascens, cuius inter
summum corticem, eamque partem qua vescuntur, esse laneam naturam, ex qua
mapalia vestēsque quædam conficiuntur. Sed neque regionem in qua id fiat, neque
quicquam diligentius, præterquàm Eriophoron id appellari in exemplaribus, quæ
quidem inuenerim, tradit. Ex his colligas, multa quondam genera Bulborū fuisse
omnibus nota, quod Dioscorides de esculento Bulbo dixit, cuius ob id descriptionem
prætermisit, nobis verō ignota: quia, vt ait Pena, non secūs atque Asphodeli, In Aduers.
Bulbi plerique omnes edi mortalium luxu & mollitie desiere, præsertim Europæis
regionibus, seu fuerint gustu minūs commendabiles aut viles quàm Bulbacea
multa, Porrū, Cepæ, Allia, & similia: visceri enim sunt omnes & mucosi, & pleri-
que insulsi, & magis ad excipienda condimenta, vt Hyacinthi multi, & Galenicus
Asphodelus, quàm ad condiendum apti. Quare ex Dioscoride diuinare seu conie-
ctari potius licet, quàm asseuerare quid sit esculentum Bulbus: pro quo Ascaloniam
cepam, de qua dicemus, Officinæ vsurparunt, quòd venerem stimulare vulgò dica-
tur, quod de Bulbis antiquitas prodidit, vt Martialis cecinit his versibus.

Cum sit anus coniux, & sint tibi mortua membra,

Nil aliud, Bulbis quàm satur esse potes.

Bulbi nusquam hodie in hortis coluntur: quare satiuus caremus. Siluestres multi-
plices sunt: quidam edules, quanquam paucis, nempe Græcis & Apulis, eo satiuus
deteriores quòd nullo cultu mansuescant. Gignuntur passim ac in segetibus, ra-
dice bulbosa, cortice subrufo, (quamobrem quidam Pancratium esse putauerunt)
altè defossa: foliis Porri, longis & latis: caule tereti, nudo: flore per initia racemoso,
paulatim sese discescente purpureo: semine paruo, nigro, in loculis triangulis, pri-
mis Bulbi tunicis subamaris, vt in Bulbina, media cartilagine dulciore. Huius pi-
cturam pro Hyacintho primo Matthiolus, Fuchsius, & Tragus exhibuerunt: flo-
ret Aprilis initio iam deflorescente Bulbina. Horum flores rustici nostrates ferto-
rum manipulis, quos in foro vendunt, immiscent, ob purpurei floris venustatem.
Allium est caninum Dodonæi, quem Bulbum esculentum & hortensem vocat, quòd alibi in siluis, in Belgio non nisi in hortis cultu nascatur. Non est tamen

Bulb⁹ esca-
lētus mul-
torum.

Locus.

Forma.

In cap. 58.
lib. 4.
Cap. 323. hi.
Lib. 2. c. 79.

Lib. 5. hist.
cap. 76. &c.
De florib.
cap. 52.

Allij

BVLBI esculenti genus maius,
Dodonæi. *Hyacinthus*, Matth.



Lib. 4. c. 79.

Lib. 25. c. 10.

Lib. 20. c. 9.


Allij species aliqua, inquit, sed Bulbi esculenti genus quoddam, veluti Bulbina, cui certè similimus est: Bulbo enim Bulbina rubet, & porri folia habet, Plinio auctore. Videtur autem hac ex Africa Bulbus esse, quem Afrum cognominant: huius enim Dioscorides *πυρρὸν*, id est, rufum Bulbum esse ait. Huic adiunxit Bulbi esculenti genus minus illi simile foliis, floribus & radice, nisi minus esset. Tragus Hyacinthum exiguum venum appellat, Germani *Hundtsquibel*, vel *Hundtsknoblauch*, hoc est, Cepam caninam, vel Allium caninum. Prius genus peritis Bulbus siluestris Plinij Pericarpus videtur esse, sic dictus, quòd fructus caulem cingat & ambiat: alterum genus Bulbina, herba, inquit Plinius, porraceis foliis, rubicundo Bulbo. Ex eodem Dodonæo Bulbū alium hīc depinximus foliis Allij siue Porri, paucioribus, videlicet vnico aut duobus duntaxat: caule rotundo, cauo, dodrantali; multis, sinuatim emicantibus floribus luteis, speciosis, sex foliolis ex calatho stellatim radiatis, capillo intus croceo, capitulo seu siliqua floribus delapsis triāgulari, seminibus plena: radice

ce rotunda ceu Ceba siue Allium, citra odorem glutinosa. Multis Germaniæ locis crescit, sabulosis & vmbrosis, atque circum conualles & riuulos, nonnunquam in sepibus. Per initia veris Aprili & Martio mensibus erumpit: ac statim deinde euanescit. Quomodo veteres nuncuparint, hactenus incompertum esse ait. Sunt qui

BVLBI esculenti genus
minus, Dodonæi.



BVLBVS siluestris Fuch.
& Dodonæi.



Bulbinam

Bulbinam vocent, alij *Βολβὸν ἐσώδιμον*, id est, Bulbum esculentum. Quorum sententia illi & peritis herbariis haud placet. Quare Bulbum siluestrem nominavit quemadmodum & Fuchsius, Germani *Feldzwibel*, id est, Cepam agrariam silvestrem. Ruellius Bulbum silvestrem prior nūcupavit, quem rura Gallica, quod radice & foliis Porrum imitetur, Porrium vocant.

*BVLBVS Vomitorium,
Matthioli.*



*BVLBVS Aëstivus Dalech.
Tiphym Theophrasti.*



Quibusdam Theophrasti Perdicium esse placet, quod radices crassas habet, & plures radices quam folia, multis in vnam acervatis. Dictum est autem Perdicium, quod perdices ad id se volent, terramque suffodiant. Non desunt qui vomitorium Bulbum esse credant, quod usu compertum sit radice decoctum vomitiones citere, & alium valenter ducere, non dissentiente Dioscoridis delineatione, scribentis Bulbum vomitorium folia habere lori modo latiora, & multo longiora quam Bulbus esculentus: radicem similem Bulbo, cortice nigro. Quæ si per se edatur, vel decoctum eius bibatur, vesicæ malis medetur, & vomitiones mouet. Matthiolus Bulbum alium vomitorium depinxit tantum, & sine vllis notis nudam imaginem cum nominis inscriptione exhibuit. Alij Hyacinthi speciem esse statuunt. De quo fusiùs disseremus capite proximo de Hyacinth. s. Dodonæus hunc ex esculentorum Bulborum genere esse censet, & Bulbum vomitorium ab isto planè diuersum describit, de quo in Narcissis dicemus. His Bulbis idem Dodonæus Lucanthemum addit. Sed cum Ornithogalon legitimum Dioscoridis esse putet, de eo magis idoneo loco tractabimus.

Li. i. cap. ii.

Li. 2. c. 166.
Bulbus Vomitorium.

De florib.
cap. 52.

De florib.
cap. 53.

Bulbus
æstivus.

Locus.

Forma.

Tempus.

Bulbus floreat, hic verò bulbus desinente Iulio, Augusto toto & Septembri ante foliorum exortum hæc planta caulem florémque gignit: nec priùs exeunt folia, quam dilapso flore conceptum semen fuerit. Hyacinthum quidam esse credunt. Sed ab eo plurimum dissidet, quod aduérante Vere ad Februarij finem, Martijve principium Hyacin-

aut summum tria folia Hyacinthus edat, hic verò plura quàm octo, graciliora, angustiora, breuiora: quòd Hyacinthi flos emergat post folia, huius verò flos cum caule ante folia exoriatur. His adde, Hyacinthum vmbrosis siluis, humidis sepibus, locisque aliis vdis gaudere, Bulbum hunc siccissimis, squalidissimis, apricis, ventoque expositis. Iam verò vnico tantum caule

*BVLBVS Eriophorus,
Dodonai.*



Lib. 7. hist.
cap. 12.

Append.
lib. purg.
cap. 31.

Append.
lib. stirp.
Hispanic.

*BVLBVS Eriophorus,
Clusij.*



Hyacinthus assurgit, hic verò duobus, tribus, quatuor. Postremò paucis diebus florem Hyacinthus retinet, hicensem integrum, atque etiam diutius: qui flos in Hyacintho omnino purpurascit, in hoc Bulbo in purpura rubet. Sunt qui Bulbum hunc Theophrasti esse coniiciant, quòd florem ante folia promat. Bulbos ~~Eriophorus~~ diximus esse ex Theophrasto, qualem Belgij se in horto Ioannis Brancionis vidisse refert Dodonæus. Bulbus erat qualis ceparum ex multis tunicis compactus, inter quos lenta quædam veluti lanugo reperitur. Iconem Patauio ad se à Cortuso missam fuisse ait, quam hîc in nullo mutatam, nec vllò modo mutilatam expressimus. Sed hanc commentitiam esse veri & gemini Bulbi Eriophori pictura demonstrat, quam fidus & accuratus rei herbariæ scriptor Clusius expressit, qui eundem etiam Bulbum descripsit his fere verbis. Habet folia multa oblonga, Hyacinthinis fere similia, minùs carnosa & succulenta, duriora tamen, viridia, mucronata, sapore ingrato, quibus minutissimè etiam contractis, tenuia quædam fila instar telæ araneorum diduci possunt. Ex horum medio caulis exit cubitalis aut amplior, rectus, Scillini caulis æmulus, læuis, nudus, virescens, superiore verò parte ad cæruleum colorem tendens: in summo veluti oblongam ac densam fert spicam, in denos vel plures versus distinctam, viridem primum, sed paulatim (dum sese explicat in flores) cæruleum colorem contrahentem: constant flores senis foliolis stellatim expansis, triangulo vmbone in medio protuberante, Hyacinthi autumnalis floribus propemodum similes, inodoro, colore cum suis pediculis cæruleo, & internis staminibus, quorum apices initio purpurei sunt, & vbi sese explicarunt, veluti pallecente quadam farina aspersi. Incipit florere ab imo, vt Scilla solet, & reliqui magna ex parte Bulbi, qui flores racemi aut spicæ in modum confertos habent. Semen se obseruasse Clusius ait, sed flores admodum caducos statim marcescere cœpisse, & relictis in caule tantummodò pediculis decidisse. Radix crassa & bulbosa est, ex plurimis tunicis contexta, alba, tomentosa, & veluti araneorum

nearum

*BVLBVS parvus
vnifolius, Pena.*



*BVLBVS Marinus
crinitus.*



nearum telis obrita, multos adnatos Bulbos habens, & cras-
sis oblongisque fibris nitens. *ἐλεοφόρος* nomen huic Bulbo
inditum ob tomenti copiam, quòd lanæ modo in stamina
diduci potest. Hic non omittendus Bulbus parvus vnifolius
aut bifolius batrachoides Penæ, qui recto, gracili caule con-
stat, palmari vel sesquipalmari, vnicum folium aut summū
duo in medio quasi centro sustinente, multis & altis inci-
suris radiatim diuisum Aconiti modo, in cuius medio qua-
si umbilico flos vnicus, herbaceus pallensque, Aprili & Ma-
io cōspicitur, Ellebori prorsum, deinde semen siliquatum
etiam stellatum, & effigie Ellebori: radicis Bulbus parvus,
quātus Fumariæ Plinij, admodum acris gustanti. Hunc col-
legisse se ait Pena in collibus Patanio vicinis, in quibus vi-
peræ capiuntur. His atteximus admirabiliorem Bulbum, nō

ἐλεοφόρον, sed τελεχάδην. De quo hæc legimus in

Bulbus Cri-
nitus mari-
nus.

Locus.

Forma.

Nauigationibus Italico sermone cōscriptis, in-
ter quasdam insulas tantam stirpis eleganter ex-
pressæ copiam prouenire, vt naues hanc super-
gredi coactas quandoque remoretur. In fundo
maris crescit, quatuordecim vel quindecim bra-
chiorum longitudine, quatuor vel quinque al-
titudine extra aquam eminens, colore ceræ lu-
teæ, caule satis crasso, ex quo per interualla exo-
riuntur Bulbi, ex fastigiis capillitium quoddam
emittentes. Radix est crassior, bulbosa, quam plu-
rimis fibris capillata. Bulbus esculentus, vt do-
cet Dioscorides, stomacho & aluo utilis est, ru-
fus, & qui ex Lybia defertur. Amarus verò &
Scilla similis stomacho vtior est, & concoctio-
nem adiuvat. Omnes Bulbi acres sunt, & calfa-
ciunt, & venerè stimulant. Exasperant linguam
& tonsillas: multum nutriunt, carnes gignunt,
inflationes pariunt. Ad luxata, fracta, articulorū
dolores, & surculos extrahendos illiti condu-
cunt. Gangrænis & podagris cum melle & per-
se, hydropicorumq; tumoribus & canū mor-
sibus similiter cum melle & pipere trito impo-
-

Lib. 2. c. 69.

Vires &

Temper.

siti profunt. Sudores cohibent & stomachi dolores mitigant: surfures & achoras
cum nitro tosto exterunt: sugillata & varos per se, aut cum oui vitello purgant, &
lentigines cum melle aut aceto: fractis articulis vnguibusque ex polenta medentur.
Iidem calidis cineribus torrefacti tollunt ficos, item cum cinere c manarum capi-
tibus impositi. Cremati verò & cum alyconio misti vitia cutis in facie, & cicatri-
ces nigras in sole illiti emaculant: faciunt ad rupta, si cum aceto cocti edantur. Sed
copiosiore eorum cibo abstinendum, quoniam neruos tentant. Plura de Bulbi vi-
ribus à Plinio prodita sunt his verbis. Bulbi ex aceto & sulphure vulneribus in fa-
cie medentur. Per se verò triti neruorum contractioni, & ex vino porrigini: cum
melle canum morsibus: Erasistrato placet cum pice. Sanguinem idem eos sistere
tradit illitos cum melle. Alij si e naribus fluat, coriadrūm & farinā adiciunt. Theo-
dorus & lichenas ex aceto Bulbis curat, & erumpentia in capite cum vino austero
aut ouo. Et Bulbos epiphoris idem illinit, & sic lippitudini medetur. Aequè vitia

Lib. 20. c. 9.

quæ sunt in facie, eorum rubentes maximè (id est, siluestres quibus cortex radices rubet) in Sole illiti, cum melle & nitro emendant: lentiginem cum vino, aut cucum cocto (cum melle vel aceto Dioscorides.) Vulneribus quoque mirè profunt per se, aut (vt Damion) ex mulso, si quinto die soluantur. Iisdem & auriculas fractas curat, & testium pituitas. In articulorum doloribus miscet farinam. In vino cocti illiti ventri duritiem præcordiorum emolliunt. Dysentericis in vino ex aqua cælesti temperato dantur. Ad conuulsa intus, cum Silphio pilulis fabæ magnitudine. Ad sudorem tussi illinuntur. Nervis vtilis, ideo & paralyticis dantur (contrà Dioscorides monet à largiore eorum cibo abstinendum, *ἀπὸ τοῦ ἀπλίου τοῦ νερῶδους.*) Luxata in pedibus qui sunt rufi ex his, citissimè sanant cum melle & sale. Venerem maximè Megarici stimulant. Siluestres interaneorum plagas & vitia cum Silphio pilulis deuoratis sedant. Et satiurorum semen contra phalangia bibitur in vino. Ipsi ex aceto illinuntur contra serpentium ictus. Semen antiqui bibendum insanientibus dabant. Flos Bulborū tritus crurum maculas varietatesque igne factas emendat. Dioscles oculos hebetari ab iis putat. Elixos asis minùs vtilis esse adiecit, & difficilè coquoqui ex vi vniuscuiusque naturæ. Bulbine traditur vulneribus mirè vtilis, duntaxat recentibus. Galenus Bulbum edulem frigidiorē & crassiorē esse, lentumq; succum procreare scribit: nam & coctu difficilis est, & flatuosus, & venerem prouocat. Attamen illitus ob amaritudinem simul & adstrictionem, abstergit simul & glutinat, atque etiam exsiccat. Bulbus vomitorius multo est calidioris temperaturæ. Veretrum, inquit Marcellus Empiricus, id est, Bulbus, quod est genus cepæ, in aceto decoquitur, idq; acutum ore continetur, vt mobilitas dentium sistatur.

HYACINTHVS.

CAP. IIII.

Nomina

Lib. 4. c. 58.

Lib. 6. hist.

cap. 7.

Genera.

Lib. 4. c. 58.

Forma.

Lib. 3. c. 104.



GRAECIS ὕακινθος, Latinis Hyacinthus dicitur. Dioscorides vnicum Hyacinthum descripsit. Theophrastus Hyacinthum inter vernos flores recenset, eumque duplicem, tum satiuum, tum siluestrem. Recentiores Herbarij multo plures Hyacinthorū species obseruarunt. Hyacinthus, vt descripsit Dioscorides, folia Bulbo similia habet: caulem dodrantalem, læuem, minimo digito tenuiorem, viridem, comam incumbentem incuruam, florum purpureorū plenam: radicem etiam ipsam Bulbo similem. Quis sit iste Hyacinthus scitu perdifficile est. Ruellius frequentem in Gallia Hyacinthum esse ait, eumque florem à rusticis *Vacier* appellari: in quo Romani vocabuli rudimēta quædam relucet, quasi Vaccinum & Vaccinium innuant, quo Vaccinij nomine Hyacinthum à Romanis dici inter notha Dioscoridis legimus. Et Seruius, Vaccinium pro Hyacintho Maronī acceptum in carmine, affirmat. Dodonæus etiam Hyacinthum *Vacier* Gallici nomine descripsit, foliis oblongis, angustis, læuibus, & splendentibus, Porri, sed minoribus: caule glabro, teretē, cuius coma florum pondere & mole, cum primū dehiscere incipiunt, grauata, deorsum incuruatur: floribus oblongis, rotundis, concavis, in latius se pendentibus, per oras reflexis, colore plurimū cæruleis, nonnunquam albicantibus, aut candidis siue niueis, aliquando purpureis: semine in siliquis triangularibus paruo, rotundo, nigro: radice rotunda, bulbosa, candida, lento succo, vti & tota herba, plena: Cordus in Germania reperiri scribit in apricis quibusdam tumulis. Dodonæus in Belgio etiam in aruis, & iuxta agrorum margines fruticibus aut arboribus confitos, & præcipuè quidem prope Mèchliniam urbem, ibique copiose nasci: florere Aprili & Maio mense. Hunc esse Dioscoridis Hyacinthum citra adiectionem autumat: item eum cuius meminit Columella, diuersitatem coloris quæ est in floribus vno versiculo complexus, *Nec non vel niueos, vel caruleos Hyacinthos.*

Lib. 2. hist.

cap. 4.

De florib.

cap. 51.

1. Hyac.

Lib. 1. plan.

cap. 101.

Lib. 10.

HYACINTHVS, *Dodon.*

Ipse Dodonæus Hyacinthum non scriptum vocat, ad differentiam alterius, nempe scripti, qui luctus notas inscriptas habet. Pena & Lobellius Anglicū & Belgicum: quia nusquam maiori copia provenit, quàm in Anglia & Belgio. Matthiolus Hyacinthum pinxit, quem Bulbum esse diximus: item aliū, quem Orientalem vocat, eumq; duplicem, quod ex Orientalibus regionibus ad Cortusum missus sit: alij Græcum nuncupant. Dodonæus priorem Orientalem & legitimum à *Vaciet* Gallico, siue *Iacinten* Germanico non distinguit, nisi quod hic minor ac magis serotinus est, ille maior ac præcocior. Et reuera tum inter sese similes sunt duo isti Orientales Hyacinthi, tum ab Hyacintho non scripto Dodonæi non multum diuersi, teste etiam Pena, qui hos Patavij primùm se vidisse ait: floribus tamen, foliis & bulbo distinguuntur. Hos Lobellius feliciter & accuratius multo expressit. Prioris, qui Hyacinthus Orientalis Græcus ab eo dicitur, triplex differentia folio & flore: angustifolius, latifolius, & polyanthes alter

In cap. 58.
lib. 4.

De flo. c. 51.

feu minor. Cùm defloruerit duntaxat, maculis vipereis caulis variat. Præcox dilutior est flore: serotinus saturatiore, hilari, cæruleo, amæno. Hyacinthus Orientalis, maior polyanthes, quem mutilum & deprauatum Matthiolus pinxit, ut ait Lobellius, à medio cubitali caule ad summum vsque, in vnam partem vergente florum peramænorum, cæruleorum ordine decoratur, eximie magnitudinis, ca-

HYACINTHVS *Dioscoridis:*non scriptus, *Dodonæo.*HYACINTHVS *Orientalis*Græcus, *Lobellij.*

lathis, seu alabastris parvis similium: folia latiora: bulbus Narcissi par. Lobellius in Appendice Hyacinthum alium Orientalem, brumalem, album Louanio à Cornel. Gemma Medico ostendit cum hac ferè descriptione. Rarum hoc atque exoticum videtur Hyacinthi genus: nam et si foliorum & florum forma cum plerif-

HYACINTHVS Orientalis

*maior polyanthes,
Lobel.*



HYACINTHVS brumalis,

*Orientalis Gemma ex
Lobel.*




que aliis conueniat, id tamen sibi vendicat singulare, quod statim sub solis hybernæ tropicon terra erumpat, caulem quoque protrudens interdum per medias niues: florem quoque venustissimum edat circa principium Ianuarij, vel à fine Decembris ferè ad medium vsque mensis Martij: folia sunt, non vt cæteris laxa & mollia, sed succulenta, spissa, ac ferè semper erecta vt in generibus Aizoi. Nerui in his nulli conspicui, sed striæ solummodò rectæ, ac veluti tenues fibræ. Durant autem virore constante vsque ad finem Iunij, ac multò diutius quàm in cæteris: flos leni caule, non nihil circa fastigia ad pediculos singulos excavata, propendet candidus, non nihil tamen sub initia, & circa supremas oras quiddam subcæruleum leuiter præ se ferens, quo quidem euanescente sensim Februario mense totus fit lacteus, odore fragrantissimus, in ea specie deinceps mense plus integro perseuerans. Radix bulbosa, intus candida, foris ruffa, circa foliorum exortus maculas quasdam, quales in Serpentariæ maioris caule spectantur, effundit, interfusa purpura nigro. Verùm id maximè sub Veris auspiciâ, & cum terræ rursus mandata caulem emeritum gerit. Hæc Lobellius ex Gemma. Poëticum Hyacinthum, vt scribit Plinius, comitatur fabula duplex, luctum præferens eius quem Apollo dilexit, aut ex Aiæis cruore editi, ita discurrentibus venis, vt Græcarum literarum figura, AI, legatur inscripta. Quam duplicem fabulam Ouidius in vnâ contraxit, &, AI, literarum figuram, non Aiæcem, sed Apollinis luctum referre dicit. Versus eius hi sunt.


Lib. ii. c. ii.

Ecce

HYACINTHVS Orientalis, I. Matth.



HYACINTHVS Orientalis, II. Matth.



*Ecce cruor, qui fusus humi signauerat herbas,
Desinit esse cruor, Tyrioque nitentior ostro
Flos oritur, formamq; caput quam Lilia, si non
Purpureus color his, argenteus esset in illis.
Nō satis hoc Phæbo est (us enim fuit auctor honoris):
Ipse suos gemitus solius inscripsit, & Ai, Ai,
Flos habet inscriptum, funestaque litera ducta est.*

Hic tamen etiam Apollo de altera fabula vaticinatur his versibus.

*Flosque nouus scripto gemitus imitabere nostros.
Tempus & illud erit, quo se fortissimus heros
Addet in hunc florem, folioque legetur eodem.*

Huius Hyacinthi meminit etiam Theocritus:

*Νόν ἔτι κινθε λαλᾷ τὰ σὰ γαῖμαλα, ἢ πλεον ἄλκι,
Ἀλλὰ καὶ τοῖς πλεῖστοις -*

Poëticum istū Hyacinthum Dodonæus κεῖνον πορφυρὸν, id est, Liliū purpureū, siue rubrum minus esse censet, vt iam monuimus, quod ex sanguine Hyacinthi adolescentis ruber flos ortus sit, eademque de causā à Poëtis Latinis ferrugineum cognominari, vt à Vergilio.

Et pinguem tedam, & ferrugineos Hyacinthos.
Et à Columella.

Syrpicalum ferrugineis cumulari Hyacinthis.

Ferrugineum verò Hyacinthum dici, quod ad similitudinē ferruginis rubeat. Est autē ferrugo, inquit, ferri corruptela, velut æris rubigo, quæ à colore subrubente rubigo appellatur: vnde & ferrugineus color, instar ferruginis rubens. Sunt qui velint ferrugineum Hyacinthum appellari, quasi lugubrem & funestum: aiunt enim ferrugineum fuscum esse & subobscurum colorem, Vergiliūq; cū ferrugineum nominat Hyacinthum ad fabulam eius alludere, quæ Hyacinthum ex sanguine Hyacinthi adolescentis natum fingit: ferrugineam etiam ab eo dici Charontis funestā & luctuosam cymbam. Sed his cōtradiceretur videtur ipse Vergilius scribens Hyacinthum suauiter, id est, non intensē rubere his versibus.

*Et me Phæbus amat, Phæbo sua semper apud me
Munera sunt Lauri, & suauē rubens Hyacinthus.*

In qua significatione Ouidium loco superius adducto purpureum dixisse Dodonæus putat, quod purpureus omnis qui rubet color in floribus nominari consueuerit. At Plinius purpureas violas, quas Vergilius nigras vocat, sola Græco nomine à cæteris discerni, appellariq; la, & ab his lanthinam vestem, & colorem purpureum qui in viola, lanthinum nuncupat his verbis. In quibus vnguento vicisse naturam gaudens luxuria, vestibus quoque prouocauit eos flores, qui colore commendantur. Hos ani-

Li. 10. Me-
tamor.

Idill. 19.

Lib. 2. hist.
cap. 39.
De florib.
cap. 33.

Li. 4. Geor.

Lib. 10.

Eclog. 3.

De florib.
cap. 33.

Lib. 21. c. 6.

Ibid. ca. 8.

Lib. 9. c. 38.

In Aduers.

maduerto tres esse principales: vnum in cocco, qui in rosis micat. Gratius nihil traditur aspectu, & in purpura Tyria, dibaphâq; ac Laconica. Aliū in Amethysto qui in viola: & ipse in purpureum, quēque Ianthinum appellauimus, &c. Hic violarum Martiarū color violaceus perspicuē intelligitur, vbi rubor nullus. Quare non omnis purpureus in floribus color rubet, vt sentit Dodonæus. Quod autem Hyacinthinus color Ianthino vt voce, ita re similis sit, id est, violaceus, nō cruentus à cruore, ostri Tyrij color violaceus, siue Ianthinus apertè demonstrat, cui laus summa, inquit Plinius, color sanguinis cōcreti, nigricans aspectu, idēmq; suspectu refulgens. Eundem colorem violaceum ostentat purpura, cuius sanies, inquit Pena, ex violaceo tantillum rubet. Vnde apud Vergilium suaue rubens Hyacinthus dicitur. At Lilio purpureo non suauiter rubent flores, sed flammeo, siue luteo saturato rutilant, vt diximus. Porro ferrugine tinctum Ibera cū canit Poëta, innuit colorem, quem politæ casides igni calefactæ, aut candefactæ simulac frigescent,

HYACINTHVS Poë-
ticus, Pena & Lobelij.



violaceum rubidum, nitidum cōtrahunt, Galli vocant *Brunissure*. De quo etiam ferrugineas violas dixit Claudianus, neutiquam, vt putarunt, funestas aut lugubres intelligens: nam Virgilij versus contrarium indicat,


Pictus acu chlamydem, & ferrugine clarus Ibera.

Quare aliū à Lilio purpureo Hyacinthum poëticum proposuerunt Pena & Lobellius, qui magnam cum Lilio, Iride, & Gladiolo similitudinem habet. Flore etenim, semine, vniuerso caule & siliqua Iridem refert, bulbo, foliis porraceis, colore Ianthino Hyacinthum, foliorum similitudine Gladiolū, quem in Angliæ, Flandriæq; viretis passim videri ait. Hanc plantam Clusius à Lobellio ad se missam Iridis bulbosæ genus facit, cuius iconem à Lobellio expressam omisit: sed descripsit folio crassiore & veluti cepaceo, viridiore, parte interiore canaliculato & candido, multisq; veluti bulbis argenteis resperso: caule crassiore & firmiore, quem, vt in aliis Iridum bulbosarū generibus, amplectuntur folia quaterna, aut quina. Hic ex vaginulis binos flores exerit inuicem succedentes, quā in aliis Iridibus bulbosis maiores & latiores,


prorsus violaceo & elegantissimo colore, inodori tamen, quibus pro fimbria, lutea macula est, vt in reliquis: succedunt binæ siliquæ magnæ, laxæ, in quibus semē reliquis maius, erui vulgaris magnitudine, pallidum, rotundum, rugosum, quod maturum, in siliquis, si quariantur, sonum edit: radix est reliquis maior, & multis membranibus tenacioribus nigricantibusque circūuestita, quæ nucleis etiam separatur, sed nō tam copiosis, atque in varia Iride & lutea, quæ singulis annis sepius; aut sex huiusmodi nucleos deponunt. Floret quo reliquæ tempore. Verisimile est Hispanicis nauibus primū ex Hispania, aut Lusitania in Angliam delatam. Idem Lobellius Hyacinthum Poëtarum luteum pictum dedit, à superiore nulla prorsus nota discrepantem, nisi floris colore, qui in hoc luteus est, in illo violaceus. Herbarij, vt diximus, multos alios Hyacinthos esse iudicant, spurios à Dodonæo vocatos: quorum primus folia habet angusta, quasi rotunda, bene virentia, per terrā magna parte strata: cauliculos inter ea rotundos, glabros, palmo lōgiore, in quorū summo

summo flosculi parui, rotundi, caui, hiantes, colore caruleo, aliàs diluto, aliàs saturato: post quos siliquæ membranosæ, in quibus semen paruum, nigrum: radix subest bulbosa. Peregrinus Belgis hic Bulbus est, inquit Dodonæus, neque vsquam illic sua sponte nascitur: in hortis, satus facile comprehendit, & in plures bulbos citò

HYACINTHVS *comosus*
minor. Bulbine Plinij.



HYACINTHVS *caruleus maior, Fuchsj.*





multiplicatur. Folia ante Hyemem exeunt, cauliculi primo Vere, flores Martio. Hunc Hyacinthum Lobellius & Pena Hyacinthum comosum minorem vocat, ad verum Dioscoridis proximè accedentem, qui in toto Meridiano tractu multò frequentissimus est, Septentrionalibus, in hortis tantum. Vere ornat editiora, agrorumque margines herbidos, flosculis item venustis, & in comâ perspicuam per versus congestis, lagenulas numerosas & admodum exiles, confertas & patulas ostendantibus: vnde vulgus Prouincialium *Barrelets* vocat, quasi lagenulas. Cauliculis est sesquipalmum altis: foliis iunceis, tenerioribus, sparsis, striatis. Dodonæo Bulbi esculenti genus esse videtur, Hyacinthum siluestrem vocat Cordus, Tragus Hyacinthum exiguum, Herbarij Hyacinthum botryoidem. Hyacinthum etiam Fuchsius appellat, & alterâ eius speciem facit, de qua mox: quem tamen Fuchsius foliis non ita iunceis, & ferè rotundis, sed latiusculis & striatis depingit, & Hyacinthum caruleum maiorem nuncupauit. Alterum Neotericorum Hyacinthum superiori similem pro Matthioli Bulbo vomitorio præcedenti capite descripsimus, depinximusque. Tertius inter spurios Hyacinthos is est, quem Fuchsius, Matthiolus, Tragus primâ Hyacinthi speciem ponunt, quem Bulbum esculentum, siue Bulbum hortensem, & Allium caninum vulgò nominatū fuisse ex Dodonæo diximus. Sunt qui velint Scillæ, aut Pancratij speciem esse: quorum iudicium Dodonæus non probat, quòd Scillæ & Pancratij bulbi grandes sint, huius autem parui, & si cum illis conferas exiguus. Pena & Lobellius hunc Hyacinthum spurium, siue recentiorum, tertium Dodonæi, vel Dioscoridis geminum esse arbitrantur, vel certè quàm maximè ad illum accedere. Etenim foliis est porraceis, Bulbi vomitorij latioribus, in terram reflexis: caule albicante, læui, herbaceo, tenero, in quo à medio à summum vsque numerosi flosculi vtrinque congesti, oblongi, purpurei, ex parauulis periolis, qui supernè comolam umbellam, latiusculam, deorsum vergentem & incuruam efficiunt, purpuream violaceam, suauis rubore permixto. Radix ce-

Ca. 23. l. 1. 2.


Ca. de Bulbo.

Lib. 4. hist. cap. 76.

pacea,

*HYACINTHVS maior,**Bulbus siluestris.**HYACINTHI comosi ma-**ioris genuina effigies, Lobellij.*

pacea, fermè quanta Narcissi, exteriore cortice nitido & roseo dilutiore purpura: qua de causa Bulbinam Plinij quidam docti esse existimarunt. Sponte sapius in Septentrionalibus regionibus prouenit. Germani *Brunlingt*, Hispani *Maios flores*, Galli *Vaciet*, Cordus siluestrem Hyacinthum nominant. In appendice verò hanc

*HYACINTHVS Co-**mosus albus, Lobellij.*

protulit Lobellius Hyacinthi comosi maioris genuinam effigiem: atque aliam Hyacinthi comosi albi eiusdem generis, qui reperitur in hortis Belgij, foliis quidem similibus, sed flore albo, intus caruleis staminibus decorato. Radicis tunicæ minimè rubent. Ad Hyacinthū comosum referenda planta, quæ tum ob formæ elegantiam, tum ob suauissimum odore minimè silentio prætereunda fuit. Hanc pinxit Clusius, & descripsit his fere verbis. Quina, aut sena oblonga folia habet, inflexa, per terram huc illuc diffusa, in acutum desinentia, canaliculata, satis crassa & succulenta, quæ cum primùm germinant purpurascunt. Ex horum medio caulis Vere erumpit, satis crassus, rotundus & nudus, sed pro sua crassitudine admodum infirmus. Hunc à medio ferè ad summum racematim coherentes ambiunt flores, vireolis similes, initio interdum purpurascences, aut virides, deinde ex purpura virentes, aut ex virore albicantes, vel nigricantes, deinde pallidi, qui marcescere incipientes gratissimum moschi ferè odorem referunt. His succedunt prægrandia, triquetra, & veluti



veluti pinnata capitula, in quibus semen continetur nigrum, rotundum, magnitudine orobi. Radix subest magna, albicans, multis tunicis ceparum ritu contexta, & frequentibus crassis fibris lignosis, viuacibus subtus firmata. Huius notitiā Cornelio acceptam refert, qui in Belgiū misit Tibcadi nomine. Constantinopoli sem-

HYACINTHVS Au-
tumnalis, Dodon.



per missa fuit Muscari appellatione, ob insignē odoris suauitatem, quæ ad moschum accedere videtur, vel potius ad pastillorum fragrantiam, qui ex Beniuno & aliis odoratis fieri solent. Lobellius Dipcadi Chalcedonicū vocat, Matthiolus Bulbum vomitorium. Idem Lobellius alterum Dipcadi floribus candidis pictum dedit, cuius varietas gemina. Quæ niueo cādore, alicubi & purpura diluta conspiciuntur, folia supernè latoria ferunt. Floribus ex cæruleo virentibus alioqui superioribus similis in hortis Belgicis visitur. Quartus ex spuris Hyacinthis est, Orientalis alter à Matth. nominatus: foliis oblongis & latis: caule longiusculo, ab imo ferè vsq; ad summum flosculis circūuestito: radice bulbosa, cuius imaginem solam Matthiolus expressit. Quintus Hyacinthus serotinus est, foliis angustis, paruulis & minoribus quā primis: cauliculis breuib; tres aut quatuor digitos altis: flosculis in summo raris, cæruleis: staminibus in medio exiguis: semine in siliquis trianguloribus exiguos: radice parua & bulbosa. Nascitur in Galliæ quibusdam prouinciis, vt iuxta Parisiorum


HYACINTHVS *Autumnalis maior. Tiphium Theoph.*



tus est. Item alius Hyacinthus-stellaris, Lilifolius, floridus Mutoni à Lobellio depictus: & Liliaceus Hyacinthus, siue stellaris Hyacinthus Liriophyllus, ex Biscayæ montibus itidem asportatus, rarus & perelegans, appositè Liliaceus dictus: radix enim est sicuti Lilij bulbus, sed minor & oblongior flavescentes: folia Lilio candido

fiorum Luteriam. Floret exitu æstatis Augusto, aut Septembri. Autumnalem Hyacinthum ea de causa & Serotinum nominant. Tiphium Theophrasti à nobis cap. superiore descriptum videtur esse. Hunc eundem Hyacinthum minimum, sed pulchellum scribit Pena se primum omnium Autumnalis donatū nomine Antuerpiam è Veronensi agro misisse: plurimū postea etiam Lutetiæ Parisiorū, & Narbonæ ad Aquas marianas, & ad Cellam nouam Monspelij à se visum, glareosis, asperis, Autumno incunte, non Vere, vr superiores, nō flosculos lagenis similes edere, sed radiatos, quinis, senis ve foliolis, cæruleis, Ornithogali minoribus. Cætera prorsus eadem, sed minora. Eius aliud genus Clusius obseruauit, altius, maiore bulbo, latioribus foliis & numerosiore flore. Floret maturiùs aliquantò superiore. Quare ad Tiphium Theophrasti, de quo in cap. de Bulbis diximus, propiùs videtur accedere. Est & Hyacinthus stellaris albicans, serotinus Lobellij, foliis exilioribus: flore aspectu iucundo, albicante. Serius hic floret. Ex Biscayæ montibus in Belgium dela-

HYACINTHVS *Stellaris albicans, Lobellij.*




HYACINTHVS *Stellaris alius Lilifolius.*



simillima

HYACINTHVS Liliaceus, Lobellij.



inculto solo. Martio, quandoque etiam Febuario flos exit. Alium Hyacinthum ex Dalechampio hîc pinximus, latifolium cognominatum, qui in Monte Aureo Aruerniæ spôte crescit: radice corticosa, Lilio simili: foliis sex, aut octo, nigricantibus, crassis, latis, Liliij ferè: floribus purpureis elegantibus, particulatim sese

HYACINTHVS Carneus mas minor, Fuchf.



simillima, sena, aut septena, inter quæ medius exilit sine foliis spithamæus caulis, in cuius summo flores Hyacinthi stellaris in cæreuleo purpurei. Præter hos, & alios duos descripsit pro Hyacinthis Fuchsius. Vnum foliis ternis, alterum binis, latiusculis, Porri minoribus: floribus circa cauliculi summum sparsis, multum & radiantis stellæ ferè similitudine patentibus, colore in priore cæreuleis, in altero candicantibus: quibus succedunt capitula rotunda, ochri magnitudine, in quibus semen milio simile: radice rotunda, bulbosa. Priorem Hyacinthum cæreuleum marem minorem Fuchsius appellat, alterum Hyacinthum albicantem, seu fœminâ: plerique à floris effigie Hyacinthum stellatum. Pena & Lobellius Hyacinthum Germanicum Liliiflorum stellarem. Dodonæus Satyrii genera esse aliquando existimavit: quam sententiam postea retractavit, quod Satyrio caulis sit cubitalis, folia Liliij, bulbus mali magnitudine, bulbo verò isti folia paruula, angusta, bulbus exiguus, cauliculus brevis. Reperitur vterque in plerisque Germaniæ locis, læro pinguiq; sed

Ca. 323. hist.

Lib. 2. hist. cap. 48.

De florib. cap. 52.

HYACINTHVS Albicans, seu fœmina, Fuchfij.



HYACINTHVS La-
tifolius, Dalechamp.

Li. 4. c. 13.
Virg.

Li. 21. c. 26.

Li. 3. simpl.



expandentibus: semine in capitulis rotundis, herbaceis. Dioscorides tradit Hyacinthi radicē pueris cum vino albo impositam impuberes seruare, vt creditur. Sistere autem aluum, & vrinam ducere potam. Opitulari demorsis à phalangio. At semen astringentius esse, & theriacis expeditum: regium morbum expurgare cum vino potum. Quæ Plinius prodidit his verbis. Hyacinthi radix est bulbacea, mangonicis venaliis pulchrè nota: quæ è vino dulci illita pubertatem coërcet, & non patitur erumpere. Torminibus & araneorum moribus resistit. Vrinam impellit. Contra serpentes & scorpiones, morbumque regium semen eius cum abrotono datur. Galenus, Hyacinthi radix bulbosa est, inquit, ordinis primi in desiccando, secundi verò completi, aut tertij incipientis refrigerando. Itaque pueros diutissimè seruare impuberes creditur illita. Fructus leuiter extergit & adstringit. Quamobrem & ipse regio morbo laborantibus exhibetur in vino, ordine quidem tertio desiccans, cæterum in medio consistens caliditatis ac frigiditatis.

NARCISSVS.

CAP. V.

Nomina



NYACINTHIS congener est νάρκισσος Græcis, Narcissus Latinis, Arabibus *Narces*, seu *Nargies* dictus, Gallis *Narcisse* & *Iannette*, Italis & Hispanis *Narcisso*, non à Narcisso adolescente, nimium suisplius amante, vt fabulantur Poëtæ, sed à vi stupefaciēdi & sopiendi, quam Græci νάρκωσιν appellant, & νάρκη, quod & Torpedini pisci nomen, quia eminens stupidam tangentis manum efficiat: qualem vim inimicam neruis & caput grauantiem Narcisso inesse testatur Plinius, item Plutarchus his verbis. Καὶ τὸν νάρκισσον ἔτας ἀνέμασαν, ὡς ἀμβλιώοντα τὰ νέραι, καὶ βαρύτερος ἐμπούκντα ναρκώδης. διὰ δὲ σοφοκλῆς αὐτὸν ἀρχαῖον μεγάλων γεῶν στεφάνωμα, τῆς τε τῶν χθονίων προσηγόρευκε. Id est, Narcissum nominarunt, quia neruos hebetet, & torpidas grauitates efficiat. Quare Sophocles ipsum velut magnorum Deorum subterraneorum coronamentū vocauit. Quod hi torpeant, utpote mortui. Theophrastus & Dioscorides Narcissum etiā λείριον appellari scripsere, Apuleius ἀνυδρον, βολῶν ἐμελικὸν, αὐτογενές. Ἀνυδρον quidem montanum, quod procul ab aquis proueniat: βολῶν ἐμελικὸν ab effectu, quod vomitum cieat. Est tamen alius Bulbus vomitorius propriè dictus, de quo diximus. Αὐτογενές, id est, à seipso genitus, vel per se nascens, quod sponte germinet. λείριον etiam Liliū dicitur: & Iulius Pollux λείρις appellatione Homerum omne genus florum comprehendere auctor est. Narcissi genera duo notauit Dioscorides, vtrumque flore albo, sed vnum intus croceum, alterum intus purpureum. Plinius de Narcisso cum Liliis tractat, & hunc ab illis ita distinguit. Sunt & purpurea Lilia, aliquando gemino caule, carnosiore tantum radice, maiorisque bulbi, sed vnus: Narcissum vocant. Huius alterum genus flore candido, calice purpureo. Differentia Liliis est & hæc, quod Narcissus folia in radice sunt, probatissimis in Lyciæ montibus. Tertio generi cætera eadem, calix herbaceus. Omnes ferotini: post Arcturum enim florēt, ac per æquinoctium Autumni. Clariùs aliquantò post de iisdem agit Narciss

Lib. 21. c. 19.
Symp. 4.

Li. 4. c. 15.

Genera.
Lib. 21. c. 5.

Narcissi duo genera in vſu medici recipiunt. Vnum purpureo flore, & alterum herbaceum. Hunc ſtomacho inutilem, & ideo vomitorium, αὐόσῃ; ſoluentem, neruis inimicum, caput grauantem, & à narce Narciffum dictum, non à fabuloſo puero. Hic Plinius Narciffum purpureo flore nominat, quem priuſ flore cādido, calice purpureo dixerat, id eſt, cui medium purpureum eſt, ob id purpureus à Ver-gilio nuncupatus eſt.

Pro molli-viola, pro purpureo Narciffō, &c.

In alio à Dioſcoride diſſidet, quòd hic herbaceum, ille in medio croceum dixit. Neoterici multò plures Narciffos oſtentant. Narciffum ſic depinxit Dioſcorides. Folia Porro ſimilia habet, ſed tenuia, multò minora, & anguſtiora: caulem vacuū, ſine foliis, palmo maiorem, in quo flos albus, intus croceus, in quibuſdam purpureus. Radix eſt intus alba, rotunda, bulbola: ſemen velut in tunica, nigrum, oblongum. Naſcitur optimus in montofiſ lociſ, odoratus. Cæteri Porrū referunt, atque herbaceum odorem emittunt Theophrastus ſic deſcribit. ὁ δὲ νάρκισσος ἢ δ' ἄλκιον, (οἱ μὲν γὰρ τὸ το, οἱ δὲ ἐκ τῶν χαλκῶν) ὁ μὲν ἐπὶ τῇ γῇ φύλλον ἀσφοδελῶδες ἔχει, πολλώτερον δὲ πολὺ, καὶ ἀπὲρ ἢ κεμονία: τὸν δὲ καὶ τὸν ἀφύλλον μὲν, πωδῶν δὲ, καὶ ἐξ ἀέρος δ' ἀνθος, καὶ ἐν ὑμῶνι τινὶ καὶ ἀπὲρ ἐν ἀγρίῳ μέγαν δὲ μάλα. (legendum prorfus καὶ ἐν ὑμῶνι τινὶ καὶ ἀπὲρ ἐν ἀγρίῳ καὶ ἀπὲρ μέγαν δὲ μάλα, &c.) Hæc enim de ſemine dici ex Dioſcoride perſpicuū eſt, ſi ſcribente, καρπὸς ὡς ἐν ὑμῶνι, μέλας, πορφυρεὺς καὶ μέλανα τῇ χροίᾳ, χρίματι δὲ πορφυρεῖ. ὅτος δὲ ἐκ τῶν πῶν ποιεῖ βλάστησιν αὐτομάτην. ὅ μὲν ἀλλὰ τὸ συλλέγοντις πηγῶν, καὶ τὴν ῥίζαν φυτῶν, ἔχει ῥίζαν ἀρκάδην, τροχίλιν, μεγάλην. ὅ μὲν δὲ σφοδρα: μετὰ γὰρ ἀρκίον ἢ ἀνθησις, καὶ περὶ ἰσημερίαν. Id eſt, Narciffus, aut Lirium (ali j enim hoc, alij illo nomine appellant) folium ad terram Aſphodeli folio ſimile habet, ſed latius multò veluti Lilium: caulem ſine foliis, herbaceum: florem in cacumine, & fructū in membrana quadam velut in vaſculo, valde magnum, nigrum, figura oblongum. Hic excidens ſponte germinat: ſed & qui colligunt, id figunt, & radicē quoq; plantāt, quam habet carnoſam, rotundam, magnam. Serotinus valde eſt: nam poſt Arcturū

Li. 4. cap. 15.

Forma.

Locus.

Lib. 6. hiſt.

ca. 6.

NARCISſVS Medio
purpureus, Dodonei.



floret, & circa Aequinoctium. Quod poſtremū conuertit Plinius loco à nobiſ ſuprà citato, & omnibuſ generibuſ attribuit. Quod autem Theophrastus Narciffi foliū Aſphodeli, Dioſcorides Porri folio confert, nulla eſt in eo differentia: nam & Dioſcorides Aſphodeli folium Porri magni folio aſſimilauit. Narciffus primus medio purpureus ex Dodonæo hîc depictuſ folia habet virentia, oblonga, Porri foliis ſimilia: caulem anguloſum, abſque foliis, dodrante, aut pede altiore, & in ſummo florem è membrana erumpentem, ſæpe vnicum, nonnunquam geminum, mediocriter amplum, odoratum, ex ſex candidiſ foliolis cōgeſtum, in quorum medio breuiſ calix eſt, circinata: rotunditatis, purpurei per oraſ coloris, intra quem ſtamina breuia cum apicibuſ ſubluteoliſ: capitula inde anguloſa: ſemen in hiſ nigrum: radix bulbola, Cephæ ſimiliſ, quæ nucleos ex ſeſe dimittēſ in multoſ faciliè bulbuloſ multiplicatur. Eundem Narciffi Poëtici medio purpurei nomine pictū dederunt Pena & Lobelliuſ. Reperiuntur huiuſ generiſ treſ, forma, colore, aut odore

De florib.

ca. 15.

nequaquam, sed florendi tempore differentes, magnitudine etiam nonnihil, sed parum dissidentes. Maiores medijs, præcoces & seriùs prodeuntes minores sunt. Quamvis Dioscorides optimum & odoratum in montosis locis nasci tradiderit, tamen Mediopurpurei Narcissi apud Heduos & Sequanos in pratis reperiuntur: item Narbonensia & Galloprovinciæ prata, inquit Pena, Liliaceo florù stellatim radiantium candore ornant Februario & Martio mensibus, qui sunt odoris sua-

In Aduers.

Idil. 10.

*NARCISSVS Medio
luteus, Dodon.*

De florib.
cap. 55.

Ibidem.

*NARCISSVS Medio
luteus alter, Dodon.*

Lib. 7. hist.
cap. 12.

uissimi & verè soporiferi, & quasi quiddam Nymphææ redolentis. Theocritus etià in pratis Narcissum nasci testis est, vbi Europam cum suis prata ingressam benefspirantem Narcissum carpsisse canit. Dodonæus florere in Belgij hortis ait primi generis præcoces Narcissos initio Aprilis, medios sub finem, seriores Maio mense. Alter Narcissus in medio luteus folia habet longiora, latiora, & aliquantò minùs virentia: caules proceriores, crassiores, in singulis flores ternos quaternosve, prioribus similes, sed medio luteos: semen & radicem bulbosam similia. Huius generis & alius quidam tertius Narcissus à Dodonæo describitur, foliis non modo quàm primus, verùm etià quàm Asphodelus latioribus longioribusque: floribus in singulis caulibus quaternis, aut pluribus, candidis, minoribus, medio eorum luteo, calice eminentiore, multò tamen quàm Narcissi lutei siluestris brevioris: radix similis est & bulbosa. Iisdè in pratis florent, & in Belgij hortis ferè sub finem Aprilis. De primo horum Narcissorum, scilicet Mediopurpureo. Theophrastu scripsisse autumat Dodonæus, quo loco Narcissum ter florere vti Scillam refert, & tria quidem arandi tempora, vti illam demonstrare. Quæ ex his Theophrasti verbis melius intelliguntur. Θαυμα-
στον δὲ ἐπὶ πάντων, ὅπερ ἐπὶ τε τῇ σκίλλῃ καὶ τῇ
ναρκίσῳ συμβαίνει. τῶν μὲν γὰρ ἄλλων, καὶ τῶν ἐξ ἀρ-
χῆς φυλάσσειν, καὶ τῶν βλαστάνων, καὶ ὅταν οἱ
φύλλων ἀναέλθῃ πρῶτον, εἴθ' ὕστερον ὁ χαλδός. ἐπὶ
τέτῳ, ὁ χαλδός πρότερον. τῇ ναρκίσῳ δὲ, ὅ τ' ἀνθὺς
μόνον, διθυπρόωρον γὰρ οἱ ἀνθός. τῆς δὲ σκίλλῃς καὶ
αὐτὸν εἰς ὕστερον ἐπὶ τέτῳ οἱ ἀνθὺς ἀνίσχοντες προσκλή-
μυον (lege, καὶ αὐτὸν πρότερον, ὕστερον ὃ ἐπὶ τέτῳ
οἱ ἀνθὺς ἀνίσχονται), &c.) ποιεῖται δὲ τὰς ἀνθήσας
τρέψας. ὣν ἡ μὲν πρῶτη διοικεῖ σημαίνει τὸν πρῶτον
ἄροτον. ἡ δὲ διδύμε τὸν μέγαν. ἡ δὲ τρίτη τὸν ἑσχάτον.
ὅσαι γὰρ ἂν αὐτοὶ γένωνται, οἱ ἄροτοι σχεδὸν ὅπως ἐκεί-
νους. ὅταν δὲ ὅπως ἀπογηράσῃ, τότε ἡ τῶν φύλλων
βλάστησις πολλὰς ἡμέρας ὕστερον. ὡσαύτως δὲ καὶ
ἐπὶ τῇ ναρκίσῳ, πλὴν ὅτε χαλδὸν ὕστερον ἢ καὶ παρὰ οἱ
τῇ ἀνθός, ὡς περ εἰρημνύει, ὅτε καρπὸν φανερόν, ἀλλὰ καὶ
αὐτοὶ τὸ ἀνθός αἶμα ἴσ' χαλδῶν χαλδασθῆναι, ὅτε ἀναθῆ, τότε

τότε

τὸτε τὰ φύλλα ἀνελήλα. Quæ sic conuertit Gaza. Mirum quod in Scilla Narcissoq; euenit: cæterorum enim tam recens factorum, quàm regerminantium, suo tempore folium oritur, deinde caulis exit. In his verò caulis prius, & Narcissi quidem floris tantum caulis protinus exit: flos enim eius plurimum festinat, Scillæ autem caulis per se prius, tum flos ex eo emergens insidit, eadèmq; florum prouentus ternos ostendit: quorum primus tempus arandi primum significare videtur, secundus medium, tertius nouissimum: quot enim fuerint isti, totidem & arandi tempora ferme occurrunt. Sed cum ita sensuerit, tunc foliorum exortus multis postea diebus inceptat. Idem in Narcisso fieri solet, nisi quòd nec alium caulem præterquam floris proprium habet, ut diximus, neque fructum conspicuum parit, sed ipse flos una cum caule desinit, & cum reflorescit, (legendum, cum exaruerit) tunc folia exeunt. In his quidem, inquit Dodonæus, Scillæ caulem florum ternos exortus ostendere Theophrastus scribit: Narcissum autem caulem non habere alterum iuxta eum qui floris est: fieri autem non potest, ut ex eodem caule ter floreat. Quare tres differentes bulbos esse consequitur, qui tribus temporibus floreat, uti Narcissum Mediopurpureum facere iam diximus. Hunc etenim ter florentem existimare possunt, qui uno eodèmq; loco reperiunt, & differentes bulbos esse non animaduertunt. Sed ubicumque hoc Theophrasti loco *νάρκισσος* legitur, Plinius *κρόκος* legit. Notabilis & Scillæ Crocique natura, quòd cum omnes herbæ folium primum emittant, mox in caulem rotundentur (alii protrudantur) in his caulis prior intelligitur (aliàs impellitur) quàm folium. Et in Croco quidem flos impellitur caule: in Scilla verò caulis exit, deinde flos ex eo emergit. Eadèmq; ter floret, ut diximus, tria tempora satiorum (Theophrastus habet arationis) ostendens. Secundi verò & potissimum tertij Narcissi Ouidius meminit, ubi Narcissi formosi adolescentis mutationem in florem sui nominis describit his versibus.

Li. 11. ca. 17.

NARCISsus totus
albus, Dodonæi.



*Nusquam corpus erat, croceum pro corpore florem
Inueniunt solus medium angustibus albis.*

De tertio verò ea scripsisse Theophrastum putat quæ supra citauimus, & diuerso ab eo cuius lib. 7. meminit. Hic enim folium ei tribuit στενόν, id est, angustum, quale utique primus Narcissus habet: illic verò folium ἀσφοδελῶδες, πλεονέστερον δὲ πολλὸν, καὶ θάπτερ ἡ κρινωνία, id est, folium Asphodelo simile, multò latius Lilij modo: ut diuersis locis de diuersis Narcissis Theophrastum scripsisse perspicuum sit. Eodem verò Theophrasti loco paulò antè à nobis citato Dodonæus pro μέλαινα τῇ χροίᾳ, legendum censet μέλαινα, id est, lutea, ut non niger, sed luteus Narcissi flos intelligatur. At locum aliter emendandum, & de semine Narcissi, non de flore, hæc verba accipienda esse demonstraui. Præterea quartus quidem est Narcissus Dodonæo, antedictis forma similis, sed per totum florem & medio quoque candidus: quem etiam Clusius depinxit foliis oblongis, viridibus, ternis, aut quaternis, è quorum medio caulis satis latus, angulosus tamen & concauus exit, cui insident seni, septeni, interdù deni flores oblongi & omnino

Cap. 12.

4. Narcif.

Li. 2. Stirp.
Hisp. ca.


5. Narcif.

candidi, quorum videlicet calix, qui in alio luteus, etiam albus est & odoratus: radix superioribus similis. Sunt & Narcissi multiplicibus floribus, inquit Dodonæus, tum primi, tum alterius generis, foliis & bulbis aliis haud dissimiles. Ita varia semper natura, & ad stirpiū genera multiplicanda fecunda, tum ad ea permittenda prona, præsertim si cultus mangonio adiuuetur, vel in alium locum stirpes transferantur: hæc enim ad stirpiū mutationes plurimū possunt. Idē Pena asserit culturæ lenocinio Narcissum variatis foliis, floribus & bulbis posse admodum à pristina effigie desciscere, seseq; audisse iamdiu apud Venetos, quosdam stirpium mangonio, in dies bulbi seminibus quibusdā, vel interitis pullulationibus novas & miras excitasse figuras. Clusius Narcissum etiā flore multiplici depinxit, latioribus, & quodammodo carinatis foliis, multiplici flore: quia medius ille calix luteus interiora sex cādida folia sic interfecat & distinguit, ut calicis formam amplius non

In Aduerf.

Ibidem.

NARCISVS flore
multiplici, Clusij.



NARCISVS Iunci
folius, Dodon.



6. Narciss.

feruet, sed veluti apophysis quædā lutea ad singula folia adnata videatur. Odoratissimus est flos iste, & grauedine quadā caput tentans. Dodonæus Narcissis etiā annumerat plantā, quā Hispani, à similitudine quā folia cū iuncis habēt, Ionquillos vocāt: vnde Narcissum Iuncifoliū appellat. Folia huic oblōga, angusta, crassa, interim propemodū rotūda, admodū læuia & flexibilia, iuncis cū læuore, tū colore, & quodammodo flexibilitate, nec nō rotūditate similia, inter quæ caulis medius exit, in cuius vertice flosculi tres, aut quatuor, vel plures, odorati, Narcissis forma similes, verū minores, & colore per totū florē lutei: radix bulbosa, candida, tenui, nigra membrana integitur. Nascitur plerisq; Hispaniæ locis sua sponte. In Belgio Aprili mense florem promit. Hunc βολβον ἐμελιον, id est, Bulbum vomitorium Diosc. esse cōtendit Dodonæus, quod eius descriptio huic Narcisso simillima sit. Etenim folia ei sunt multò quàm alterius Bulbi ἱκανωδέστερα, id est, flexibiliora, utpote iuncea propemodum lentoris, & perquàm longa, longioraque multò quàm esculenti Bulbi, & radix in tenui nigra membrana reconditur. Hanc plantam Narcissi Iuncifolij alterius & pusilli nomine descripsisse videtur Clusius.

De florib.
cap. 56.

Li. 2. stirp.
Hispa. ca. 1.


Priorem

Priorem verò Iuncifolium depinxit & descripsit aliquantùm diuersum. Huic, inquit, bina aut terna sunt folia, oblonga, angusta, carnosa, & propemodùm rotunda, iuncis viridioribus & medullofis, læuore, colore, & flexibilitate quodammodò similia: inter quæ medius erumpit caulis, rotundus, cauus, absq; foliis, in cuius summo ex tenui quadam mēbrana flores quatuor,

NARCISSVS Iuncifolius
prior, Clusij.



NARCISSVS montanus Iuncifolius minimus, Lobellij.



quinque aut sex prodeunt oblongi (gemelli interdum) forma Narcissinis similes, sed odoratiores, & omnino lutei, hoc est, tam interiore calice, quàm ambientibus eum foliis, quæ nunc mucronata, nunc quodammodò circinata conspiciuntur. His succedunt siliquæ triangulares, sed obtusis angulis, semine nigro & anguloso plenis, ut in Narcissis, verum minore. Radix parua, bulbosa, candida, nigricantibus densisq; membranis tecta. Hunc sponte nasci in pratis montanis non procul Toletto, & circa Guadalupe ait Clusius. Alterum ex Dodonæo proxime descriptū, viginosis inter Hispalim & Gades locis cum ipso flore se collegisse mense Ianuario: in Belgio non nisi Aprili vtrunque florere, interdum etiam media hieme. Quare Lobellius Narcissum Iuncifolium Dodonæi, qui alter est & pusillus Clusij Narcissum Iuncifoliū luteum præcocem vocat. Narcissum Iuncifolium priorem Clusij appellat Narcissum Iuncifolium serotinū, paucioribus foliis & floribus duntaxat diuersum: tamen pictura plura in hoc quàm in alio folia demonstrat. Addit Lobellius in Appendice Narcissum montanum Iuncifolium minimum. Palmari est longitudine, tenuibus foliolis, iuncis multò exilioribus, interdū erectis, interdum ad terram reflexis: inter quæ cauliculus palmaris erumpit, in cuius summo ex tenui, instar cæterorum Narcissorum, consimili membrana flos singularis luteus vulgato Narcisso montano simili, & penè par, aspectu suauissimo & hilarior, cui siliqua Narcissi succedit. Radicis bulbus quātus nucis Ponticæ nucleus. In figulinis seruatur & colitur. Huic subdit idē Lobellius tres alios Narcissos. Primum Narcissum montanum Iuncifoliū minimum alterum, flore luteo fimbriato: rugosis plicis, fimbriatisque floribus ex montibus Byssacæ, alioqui non differt à superiore. Alter est Narcissus montanus omnium minimus Hispanicus, flore Narcissi lutei, sed albo. Tertius est Narcissus Iuncifolius, flore circinata rotunditatis roseo. His addunt Dodonæus & Clusius Narcissum, quem Autumnalem minorem vocant. Planta est digitalis, inquit Clusius, vnicum

7. Narcissus.

HISTORIÆ OMNIUM PLANTARVM,
NARCISVS
montanus.

NARCISVS *Autumnalis*
minor, Dodon. & Clusij.



Narcissus montanus omnium minimus.

Narcissus montanus iuncifolius minimus alter, Lobel.

Narcissus iuncifolius flore rotundo roseo, Lob.

cauliculus gracilem & vacuum ferens, & in summo florem album Narcissi, odoratum, sex foliolis constantem, & in medio caliculum luteum: siliqua angulosa semen nigrum, exiguum, angulosum continet: radix Narcissi iuncifolij, minor tamen,

NARCISVS *Autumnalis*
quorundam, ex Clusio.



Ibidem.
 8. Narcif.

9. Narcif.

bulbosa, multis tunicis candidis, lentoque succo prægnantibus cõstans, quam ambit membrana quædam nigra. Tota planta amara est. Nasceitur plurimus ad Anam flumen in Turdulis, floretq; sine vllis foliis sub Octobris finẽ, à Bæticis *Tomanda* dicitur. His addi potest, inquit Clusius, & is quẽ nonnulli Narcissum vocant, tametsi flore Narcisso dissimili: foliis quinis aut senis, oblongis, & pollicem latis, præ virore ferè nigricantibus & splendentibus, humi sparsis: inter quæ brevis exit pediculus potius quàm caulis, florem suo cacumine ferens luteum, Colchici forma, sex foliis constantem (quorum tria maiora, alia tria interiora, quæ minora sunt, amplectuntur) ex membrana veluti vasculo protuberantem, intra quem sex stamina cum suis apicibus & medio pistillo videre licet: radice crassa, rotunda, intus candida, foris vt in reliquis Narcissis nigricante. Sub Augusti finem & Septembris germinare incipit, & plerumq; floret. Gaudet montosis quibusdam Hispaniæ pratis. Vide quæ de eo scripsimus capite De Satyrio. Appellant & Narcissum totum luteum, siue Narcissum

*NARCISSVS luteus
siluestris, Dodonai.*

Narcissum montanum Theophrasti, siue Narcissum siluestre, siue Pseudonarcissum, qui Gallis *Coquelourde* dicitur, Hispanis *Campanilla*, Germanis *Geeltornungs blumen*, Belgis *Geel Tydeloofen*. Folia Porri aut Narcissi similia habet, sed breuiora ac minora: caules dodrantes, atque in singulis flores singulos Narcissi similes, sed medio eorum calice longiore, oblongioris calathi similitudine, colore in totum luteo, absque odore: capitula rotunda, oblonga. Nemorosa Angliæ Belgique prata isto scatent, auctore Pena, Februario mense & Martio. In regionibus Meridiei In Aduers. propioribus, vt Narbona, Valconia, Hispania, non nisi editis montibus nascitur, & Maio Iunioq; floret, vt in Veganiis, Mindenis, Pyrenæisque iugis non procul Tholosa, inodorus, inefficacior, nec perinde narcesin inuehit. Codion Theophrasti nonnulli esse opinantur, pro quo ineptè in vulgatis codicibus Codiaminon legitur, vt dudum annotauimus in libro de iis quæ

flore placent: quidam Bulbum vomitorium. Narcissi siluestris lutei species est Narcissus multiplex, quem hîc proponimus ex eodem Dodonæo, ab illo solo flore folia multiplicante discrepans: colore etenim totus luteus est: folia quoque ac bulbi conueniunt. Alius est Narcissus flore multiplici, quem ex Clusio paulò antè depinximus. Multos etiam Narcissos Matthiolus exhibet sine vllis descriptionibus, quos tamen excepto primo non Narcissos, sed omnino alterius generis flores esse iu-

*NARCISSVS luteus multiplex,
Dodonai.**NARCISSVS Constantinopolit.
I. Matthioli.*

De florib. cap. 55. dicat Dodonæus. Nam quos secundo, tertio, & octavo locis depinxit, Scillarum aut Bulborum litoralium species videntur, quales in Gallia Narbonensi plerisque locis, & alibi proueniunt. Quartus similis est illi Bulbo, quem Marcellus capite de Narcisso in commentariis describit his verbis. Nos in Apennini montibus his

NARCISSVS II.

Matthioli.




NARCISSVS IIII.

Matthioli.



NARCISSVS III. Constantinopolitanus, Matth.



NARCISSVS V.

Matthioli.



nostris,



nostris frequentem vidimus, florem Augusto & Septembri mensibus florentem, figura Lilij, dodrantali altitudine : foliis qualia in Narcisso describuntur: singulari caule, iisdemque aliis omnibus, excepto colore, qui nec candidus nec purpureus, vt Plinius docet, fit, sed inter candidum & luteum colorem, nullius aut exigui odor-

NARCISSVS VIII.
 Matthioli.



ris. Vidimus & in mitioribus collibus enatum, sed non tam speciosum & magis albicantem: sed de quarto hoc Narcisso plura dicemus cap. De Ornithogalo. Quintum omnes Tulipam vocant, de qua aliquantò post dicemus. Sextus & septimus Leucoia sunt bulbosa, flores à Narcissis multum dissidentes, de quibus mox. Pena Narcissum tertium Matthioli, quem Constantinopolitanum appellat, nihil aliud esse censet, quàm Pancratium maritimum, de quo suo loco agemus. Alium verò radice squamosa & nucleis stipata: floribus multiplicibus & foliosis secundo loco pictum, olitorum industria & mangonio, non natura, talem videri. Matthiolus tamen non explicat vbi, quando, & quomodo nascatur, & an arte, an sponte, quemadmodum nec alterum veri Narcissi bulbo, sed florum foliis prolixioribus, angustioribus, porrectioribus staminibus. Narcissi radix siue estur, siue bibitur, vomitiones ciēt, auctore Dioscoride, ambustis igni prodest cum melle trita. Dissectos nervos agglutinat imposita. Luxatis malleolis, diuturnisque articulorum doloribus trita cum melle

In Aduerf.

Vires &
 Temper.
 Lib. 4. c. 155.

melle & imposita subuenit. Purgat & maculas in facie & vitilignes cum semine vrticæ & aceto. Cum eruo & melle vlcera sordes expurgat. Abscessus, qui ægre maturescunt, rumpit. Educt aculeos infixos cum liliacea farina & melle imposita. De eiusdem vsu medico Plinius eadem ferè tradit. Vtriusque radix mulsei saporis est. Ambustus prodest cum exiguo melle. Sic & vulneribus & luxatis: panis verò cum melle & auenæ farina. Sic & infixa corpori extrahit. In polenta tribus oleo- que contusis medetur, & lapide percussis. Purgat vulnera permixtis farinæ. Nigras vitilignes emaculat. Ex hoc flore fit Narcissinum oleum ad emolliendas duritias,

Lib. 8. sim,

calfacienda quæ asserint: auribus vtilissimum, sed capitis dolores facit. Narcissi radix, vt scribit Galenus, vsque adeò exsiccandi facultate pollet, vt maxima vulnera glutinet, vel ad incisiones vsque, quæ circa tendones accedunt. Habet verò quidam absterforium & attractorium. Hæc Galenus. Narcissi lutei siluestris radicem decoctum per aluum lentos & pituitosos humores, nec non serosos expurgare recentiorum quorundam experimento exploratum est: & his prodesse qui crudorum humorum copia grauantur, semine anisi, & zinziberis pauxillo additis, vt minus noceat, minusque ventriculo molestum sit.

LEUCOIVM BVLBOSVM.

CAP. VI.

Lib. 6. hist.
cap. 7.

HEOPHRASTVS scribit, inter vernos flores τὸ μὲν πρῶτον ἐκφαίνειται τὸ λευκίδιον, ὅπως μὲν ὁ ἀπὸ μαλακώτερος, ἐν τῷ τοῦ χερμίνος, ὅπως δὲ σκληρότερος, ὕστερον. Id est, Leucoium inter vernos flores primum emicare, vbi

Lib. 7. hist.
cap. 13.

cælum clementius fuerit, statim etiam hyeme. Vbi verò immitius, postea. Quod de eo Leucoio accipiendum esse docti censent, quod ipse postea de Bulbis differens, bulbosis annumerat: quia id præ cæteris Leucoiis florere festinet. Quare Leucoium vnum non bulbosum Dioscoridis, de quo diximus, alterum bulbosum Leucoium Theophrasti statuere necesse est, à Leucoio Dioscoridis planè diuersum. Leucoium bulbosum, Fuchsius nomen Græcum exprimens, Violam al-

Nomina

NARCISSVS, Matthioli.

bulb vocat: nec abs re, inquit, flos enim huius herbæ colorem album, & violarum odorem refert: Germani *weiß Hornungs blumen*, Lugdunenses *Campanes blanches*. Dodonæus Leucoij bulbosi tria obseruauit genera. Vnum Triphyllum, alterum Hexaphyllum, tertium Polyanthemum cognominat. Primum Triphyllum, à tribus floris foliolis dictum, folia ex singulis bulbis bina promit, oblonga, angusta, in virore albicantia: foliis Pseudonarcissi lutei colore proxima: inter quæ medius exit cauliculus palmaris: in cuius summo flos è vaginula oblonga erumpit, à tenui pediculo deorsum dependens, foliolis tribus constans, maioribus candidis, intra quæ alia tria breuia ac minora, pallidè virentia, & aliquantulum striata: in medio floris stamina cum apicibus luteis: radix bulbosa est, foris obscuri, & eius cuius Castaneæ nucleus coloris, quæ faciliè in plures bulbos multiplicatur. Peregrinus Belgio flos, sed Italiæ & aliis regionibus familiaris. Exit præmaturè Februario mense reliquos omnes ferè antecedens. Mat-

Genera.
De florib.
cap. 8.

Forma.

Locus.



thiolus sextum Narcissi genus facit. Lobellius & Pena Leuconarcissolirion minimum, palmari cauliculo: paucis foliis, quæ terna vel quaterna habet: flore exiliore, qui vnicus illi est, herbaceus, lacteolus. Septentrionalibus etiam regionibus, vt Antuerpiæ, & in Nortmania frequens. Videtur Leucoium bulbosum Theophrasti:

Tempus.

VIOLA ALBA bulbosa,

Fuchsij.



cuius meminimus in libro de iis quæ flore placent. Secundo generi, Hexaphyllo non abs re dicto à sex floris foliolis, folia similiter sunt angusta, Porri & Pseudonarcissi similia, sed breuiora, virētiora, læuiora, & magis splendentia, versus terram aliquatenus reflexa: cauliculi tenues, palmares: flores in singulis singuli, rarissimè gemini, deorsum quoque penduli, colore candidi, ex sex foliolis aliquantulum striatis commissi, staminibus in medio cum luteolis apicibus: semen in rotundis capitulis paruum, rotundum, læue, & colore flauum: radix candida & bulbosa in plures bulbos faciliè propagatur. Plerisque Germaniæ superioris locis in vmbrosis & humidis siluis reperitur, apud Belgas hortorum areas exornat: floret eodè quo superius tempore, aut non multò post. Matthioli pro septimo Narcissi genere depinxit. Leuconarcissolirion paucioribus floribus à Lobellio & Pena nuncupatur, quos non dissimiles, sed singulos in singulis cauliculis minoribus habet, luteis capillamentis è medio crumpentibus, semine fusco. Tertium Leucoium bulbosum, Polyanthemum à florum vno ex cauliculo dependentium multitudine cognominatum, caule & foliis secundo simile est, maius tamē

Locus.

Tempus.

Forma.

LEUCOIVM bulbosum minus

Autumnale, Dodon. & Clusij.



ac procerius: florem in singulis cauliculis non vnicum, sed quinq; aut sex, & particulatim quidem florentes profert, alterius floribus forma & magnitudine per omnia similes. Est in Belgio hortensè tantum. Non primo Vere cū aliis duobus, sed multò post, Aprili videlicet mense vna cum Narcisso floret. Lobellius & Pena Leuconarcissolirion pratense vocant. Hoc Narbonefè multiflorum, inquit Pena, vt cæteris maius, ita multò pulchrioribus est floribus: sunt enim lacteo Ornithogalicandore, sed Lilij parui effigie, in singulorū cauliū summo seni vel septeni ex nodo vno procumbentes: deinde semen rotundum, nigrum, Pæoniæ simile in membraneo folliculo: folia & radices sunt Narcissi Medio-lutei. Copiosè floret in pratis vel decliuibus locis herbidis, & lacunosis scrobibus, non procul Mōspelio & Magalona ad Lateranum castrum dirutum: semen fœniceciis maturat. Eadem planta quibusdam videtur esse Narcissus secundus Matthioli. Dodonæus alio in libro aliud Leucoium bulbosum minus pinxit, à reliquis distans, quod non Vere sed Autumno floreat.

Locus.

Tempus.

Lib. purg.

2. flir.
Tulipa. c.8.

Idcirco Leucoium bulbosum minus Autumnale vocat, quod sic descripsit Clusius. Cauliculo est palmum alto, gracili, vnum, interdum alterum & tertium ferens florem, candidum omnino seu lacteum, pendulum, sex foliis constantem, & in calathi seu tintinabuli modum formatum, inodorum & ingrati saporis: flori insunt pallida stamina, eoque iam aperto primum prodeunt folia quatuor aut quinque, capillaria & viridia: radix bulbosa, satisque magna pro plantę proportionem, candida, multisque tunicis glutinosis compacta & amara, quę candicante membrana regitur. Ad Anam flumen nascitur: flori sub finem Octobris & Nouembris initio. Nusquam alibi hanc plantam se vidisse Clusius ait, cui Leucoij Autumnalis nomen indidit, quod Autumnno duntaxat florētem inuenerit. De horum Leucoiorū viribus nihil neque à veteribus proditum est, neque à recentioribus obseruatum. Fuchsius tamen ex foliis omnis ferē qualitatis expertibus, radice autem dulci & glutinosa, digerentem leuiter, & cum hoc adstringentem facultatem, sicut & reliquos Bulbos, habere colligit.

Locus.

TULIPA. CAP. VII.

Nomina



LOREM peregrinum peregrino & Turcico vocabulo recentiores Tulipam nominarunt: sic enim Dalmatæ & Turcæ vocant pileum seu amiculum capitis quod gestare solent, quod ei inuersi flores isti aperti similes sint effigie. Est autem Tulipa ex bulbosarum numero: cuius variæ & quamplurimæ sunt species, & varietates, magnitudine & florum colore dissidentes: de quibus accuratissimè pertractauit Clusius. Is Tulipæ duo obseruauit genera, non quod forma à sese differant, sed quod alterius flores soleant esse præcoces, & alterius serotini. Hoc genus Turcæ sua lingua *Canala lala* appellant, illud *Cafe lala*, à locis vnde primum Constantinopolim fuerunt allata, nomine indito: *lala* enim illis florem significat. Vtrunque pedalem profert caulem, interdum cubitalem aut ampliorem, rotundum, virentem, & breui quadam incanæque lanugine aspersum, non cauum, sed firma medulla plenum: hunc plerunque terna amplectuntur folia, nonnunquam quaterna & quina, inferior lata & liliacea, longiora & crassiora, supra terram sese expandentia & contorquentia, superiora minora & angustiora, vel propendentia, vel sursum erecta, omnia colore ex cæruleo virente, aut ærugineo, veluti farina asperso, & oris interdum adeò inflexis vt sinuosa videantur, interdum minimè. Summo cauli insidet magnus flos sursum spectans, sex foliis sæpius constans, interdum septem aut octo, calathi aut cyathi modo sese in fundo pandens, ex quo sena, aut totidem, quot folia sunt, stamina erumpunt, modò lutea, modò pallida, modò nigricantia, pediculis etiam, quæ stamina sustinent, mirum in modum colorem variantibus. Dilapso flore succedit membraneum triangulare caput, satis magnum, quandoque oblongius, quandoq; breuius, & ventre magis prominulo: quo in tres partes à summo dehiscente, conspiciuntur sex ordines seminis plani, cartilaginei, ferè liliacei, & circumatæ propemodū rotunditatis, pallidi, fului, aut rubescentis. Radix bulbacea interdum breuior est, interdum oblongior, crassa, inferiore sede nonnihil prominente, vt ferè in Colchico, fibris aliquot tenuibus donata, & foris nonnunquam fuluescente, sæpius nigricante membrana obducta, quæ interiore parte lanuginosa est quemadmodum castanearum cortex, quandoque tam denso tomento plena, vt mollissimè recubet radix, quæ solida est & firma, & veluti albumen oui coctum candida, gustantique dulcis, nec ingrata. Est autē in *Caleflala*, id est, Tulipa præcoce tanta coloris varietas, quanta in nullo alio flore videri potest. Nam flos aut est omnino luteus, aut ruber, aut albus, aut purpureus: interdum bini vel plures ex his in eodem flore permixti colores

Genera.

Forma.

*TULIPA maior,
Clusij.**TULIPA minor,
Dodonæi.*

colores conspiciuntur. Simples illi colores etiam variant: aut saturiores, aut dilutiores, aut aspectu iucundi, aut inelegantes & obsoleti. Permixtorum & variorum adeò multiplex est differentia, ut eam describere perdifficile sit. In ferotina Tulipa tam variam colorum differentiã se non obseruasse ait Clusius, sed luteas duntaxat & rubras. Tulipas varias quidam curiosè in hortis alunt ob excellẽtem florum venustatem, quarum nonnullas hĩc pictas damus. Prima Tulipa maior nominatur, Matthiolo Narcissus quintus, Lobellio Lilionarcissus purpureus, cui ab eodem appictus est Lilionarcissus Chalcedonicus totus luteus, sanguineo puniceo par & similis, à Dodonæo maioris Tulipæ nomine donatus & expressus. Minores Tulipæ foliis sunt angustiorib⁹, & ferè Porraceis: cauliculis tenuioribus ac breuioribus: floribus minoribus, & minùs in latitudine se pandẽtibus, bulbis minoribus. In Thracia & Cappadocia Tulipa prouenit. Italiã, Galliã, & Belgio peregrinus est flos: quare in hortis tantum colitur. Aprili mense floret in Belgio Lobellio Narbonensis Lilionarcissus luteus montanus. Pena Narcissifolium luteum vocat, quem erutum ex Dei Paradiso in iugis Cemenei Narbonensis, iam multi sunt anni, in Belgium deferendum curauit, amicis Antuerpianis communicandum, qui primi illic Tulipam nominarunt. Huic appingit Lobellius Bononiensem Lilionarcissum luteum, siue Tulipã, qui Narbonensi, folio, caule & flore proximus est, omnia tamen vegetiora & grandiora habet: quandoque flores in caule bipartito geminos, stellatos, & alicubi ternos, iucundo Leucoij lutei odore. Sequuntur duæ aliæ pictæ à Lobellio. Prior Lilionarcissus luteus latifolius, obtusis phœniceis rubentibus oris dicitur, cuius flos sex foliis obtusis purpurei sanguinei Lilionarcissi constat. Radix item & caulis persimilis, in quo quatuor & nonnunquam plura folia, Liliaceis & Porraceis media. Interdum innatum bulbum in folio notauit Lobellius. Altera eximio est flore sese pandente, supremis foliorum oris & fundo ad basim luteis pallentibus, medium sanguineo fusco cingente: caliculorum oris & media carina foris luteis: cætera omnia sanguineo fusco

exoleto similia, medio intus flamine nigro, flaminibus croceis obducto. Semina, uti reliquarum, compressa in oblongo, tripartito, membraneo, anguloso folliculo: quæ itidem sata colorum varias subeunt mutationes, & sæpe degenerant. Lilionarcissus luteis oris, flore patulo nominatur. His adnumeranda speciosissima flore planta, quã

LILIONARCISSVS luteus
Bononiensis, Lobel.



Lilionarcissum purpureum variegatū Lobellius appellat, alij Fritillariam, rectius Meleagridem dici posse Dodonæus arbitratur : Meleagridis enim auis plumas non coloris quidem specie, at varietate, situ, magnitudineq; macularum refert: est autem auis hæc variis sparsâ plumis. Hæc planta à Narcissis differt, Tulipæ similior, sed minor. Flos pulcherrimus deorsum vergens è senis quoq; foliis componitur, violaceo colore purpurascens, quæ dilutè admodū purpureæ, ac quasi albicantes, ordine cōcinno digestæ, ac intermixtæ maculæ elegantissima varietate commendant, & foris quidē. Interiore parte nigricantibus sparsim dispositis lituris, circa basim maioribus ac frequētiorebus exornantur. Stamina hinc quoq; sex, & medius pistillus, colore sub lutea. Caulis tenuis, circa quæ quina, oblōga, angusta foliola, Croci, è virore candicantia. Radix bulbosa, rotunda, & candida est. Semē albidum, cōpressum, siliquis Hemerocallidis minoribus, Tulipæ Bononiensis paribus clauditur. Nōnihil hæc planta accedere videtur ad figurā Colchici Orientalis Matthioli. Tulipæ genus quidam esse

arbitrantur plātam, quam Ouloudiam Græcum vulgus appellat, & in hortis colit. Bulbi aduecti sunt nobis ex hortis Eremitarū & Monachorum qui mōtem Atho incolunt, solitudine & innocentia vitæ sic venerabiles, vt ob eorum integritatem

TULIPA siue *Lilionarcissus*
luteus latifolius, Lobel.



MELEAGRIS flos,
Dodonæi.



OVLVDIA seu
Tulipa lutea.

& pietatem mons is Sanctus ab omnibus vocetur. Radix illi bulbosa est, magnitudine Ceper mediocri: caulis rotundus, cubitalis, crassitie minimi digiti: folia plerunque tria, Lilio aut Ephemero Colchico similia, lata, venosa, è viridi nigricantia, non prorsus diducta, sed quasi in alueolum plicata, & imbricata, caulem ambientia: flos luteus, Lilio similis: vnde Tulipam luteam seu flauam cognominarunt, foliis foris striatis sex, ab angusto in latum sese pandentibus, effigie calathi, resupinis per ambitum labris, & in medio tot staminibus pallidis, quot floris folia sunt. Egregia sanè hæc est planta, & admiratione digna.

CROCUS CAP. VIII.



FFINIS est Narcissus Crocus non modò figura & natalibus, sed etiam facultatibus peculiaribus, quæ vtrique epispastica, deinde quadatenus

odoris soporiferi insunt. κρόκος Græcis dicitur, **Nomina**

fic & Latinis & Officinis Crocus, Arabibus *Zahafaram* & *Zafaran*, Italis *Zaffarano*, Germanis & Gallis *Saffran*. Crocus verò vocatus est à Croco iuvene, qui propter amorem Smilacis virginis in florem sui nominis mutatus est. Quod Ouidius testatur hoc versu,

Lib.4. Metamor.

Et Crocon in paruos versum cum Smilace flores.

De quo fabuloso Croco aliter hæc scripsit Galenus. Adolescens Crocus cum Mercurio disco ludens, & incuriosius consistens, illapso in caput ipsius disco statim mortuus est: ex sanguine autem ipsius in terram delapso Crocus natus est. Sed & κρόκος filum, villumve & tomentum significat, cuiusmodi sunt Croci flaua flammeæve stamina & villi, & flocci κροκίδες vocantur. Crocus est satius & filuestris. Crocus satius vbique notissimus est, non medicis solum Officinis, sed etiam culinis, ad obsonia grato colore tingenda, quanquam & sapore & odore illa commendat, & concoctionem iuuat. Folia fert oblonga, perquam angusta, graminea, per humum sparsa, densa, mollia: caules nudos, in quibus flores carulei ex sex foliolis, in singulis filamenta terna quaternave, crassiusculo cacumine, colore flammeo nitentia, odore cum inaruerint intenso, & caput implente atque soporifero, quæ cæteris partibus præferuntur, seduloque colliguntur, & adseruantur, & Croci nomine vel sola veniunt. Radix subest bulbosa, carnosa, copiosa, & viuax. De hoc Theophrastus hæc prodidit. ὁ δὲ κρόκος πωδῶν μὲν τῇ φύσει, καὶ γὰρ καὶ ταῦτα, πλὴν φύλλω στενῷ, χεῖρὸν γὰρ ὥσπερ τριχόφυλλον ἐστὶ. ὁψιανθὲς δὲ σφόδρα, καὶ ὀψιβλαστὴς, ἢ πρῶιανθὴς, ὅποτε- ρως τίς λαμβάνει τὴν ὥραν. πλεῖστα γὰρ ἀνθῆι, καὶ ὀλίγας ἡμέρας. εὐθύς δὲ καὶ ἅμα τῷ φύλλῳ καὶ ἄνθος ἀνθῆι, ὁκτεῖ δὲ πρότερον. ῥίζα δὲ πολλή, καὶ σαρκώδης, καὶ τὸ ὅλον ἐύζων. φιλεῖ δὲ καὶ πατρίδα, καὶ γίνεται καλλιῶν κατατριβομένης τῆς ῥίζης. διὸ καὶ παρὰ τὰς ὁδούς, καὶ ἐν τοῖς κροτητοῖς ἐγγλιστος. ἢ δὲ φυτεῖα ἀπὸ τῆς ῥίζης. Id est, Crocus natura herbaceus quemadmodum & alia, sed folio est angusto, & ferè in capillamenti modum extenuato. Valde serò floret, seroque germi-

Li.9. med. local.

Genera.

Forma.


Lib. & c. s. huto.

Crocus sine flore.

nat, vel præpropere floret, vtro scilicet modo tempus acceperis: floret enim Vergiliarum occasu, & paucis diebus: statim enim cum folio florem pellit, imò & prius florem mittit quàm folium. Radix huic multa, carnosæ, & omnino viuax. Calcari gaudet, atque ita lætior fit, radice deorsum versus attrita. Quare iuxta vias & fontes optimus. Seritur radice. Quæ ferè expressit Plinius

CROCVS satius,
Matthioli.

CROCVS non florens,
Matthioli.



Lib.21. c.6. his verbis. Vfus Croci in coronis nusquam. Herba est folio angusto, penè in capillamenti modum. Floret Vergiliarum occasu paucis diebus, foliòque florem expellit. Viret bruma & colligitur. Siccatur umbra, melius etiam hyberna. Carnosæ & illi radix, viuaciòrque quàm cæteris. Gaudet calcari & atteri, pereundòque melius prouenit. Ideò iuxta semitas & fontes lætissimum. Crocus optimus erat Dioscoridi Coryceus, ex Coryco Ciliciæ monte. Secundum locum dat Coryceo è tractu Lyciæ contermino. Tertium Lycio è monte Olympo. Quam Ruellij conuersionem non probat Marcellus Verg. hæc scribens. In his verbis, *διὰ τὴν ἐν τῇ δὲ ὁ ἐκ τῆς πρὸς λυκίαν κορυκίαν, καὶ ὁ ἀπὸ τῆς λυκικῆς ὀλύμπου*, articulus præpositiuus, & Corycij in genitiuo casu illic occurrentes, legitimam sermonis seriem miscent. Ideòque nos secundæ bonitatis à Corycio ex Cilicia esse dicimus eum, qui ex agro ad Lyciam, & Lyciæ Olympo monte afferatur. Sic & conuertit Cornarius. Secundum locum obtinet qui extra Corycum ad Lyciam nascitur, & qui in Lyciaco Olympo. Deinde qui ex Aegis Aetoliæ vrbe adfertur. At Cyrenaicus & Centuripinus omnium in Sicilia nascentium infirmisimis est viribus. Similiter Plinius, Prima nobilitas Cilicio, inquit, & ibi in Coryco monte: dein Lycio, monte Olympo: mox Centuripino Sicilia. Aliqui Phlegræo secundum locū dedêre. Hodie verò non solùm regiones ad Meridiem, Africa, Cyrene, Sicilia, Gallia, sed etiam ad Septentrionem sitæ Anglia, & Hibernia laudatissimum ferunt, quo Belgium, Germania, aliq; vicini cibos condiunt,

Lib.21. c.6.

Locus.

ac medicamentis miscent. Matthiolus Crocum ex Aquila Vestinorum vrbe primum sibi locum vendicare in Italia scribit, eo tamen prestantiorem esse qui ex Vienna Austria metropoli defertur. Probatur, inquit Dioscorides, recens, boni coloris, parum candidi gerens in circuitu, oblongus, integer, non fractus, cui nihil deest, plenus, dum diluitur manus tingens, non cariem, aut situm redolens, odore iucundo & acri. Qui talis non est, aut vetus est, aut humore perfusus. Crocus, auctore Theophrasto, tam montanus inodorus, quam satius Autumnus florere incipit: statim enim primis imbribus floret. Quare flores ante folium edit continuo ferè mense: quibus collectis folia exeunt, tota Hyeme virefcentia spectis algoribus. Deinde arescunt, ac Vere depereunt, nec Æstate apparent. Croci

In cap. 25.
lib. 1.

Electio.

Lib. 6. hist.
cap. 7.


Tempus.

CROCUS *filuestris* 1.

Dalechampi.


CROCUS *filuestris* 11.

Dalechampi.



filuestris verus (alium enim Officinæ Crocum *filuestris* faciunt, nempe Ephe-
merum Colchicum, ob floriseius cum satiuo Croco similitudinem) à satiuo cul-
tura, & satu differt. Huius tria obseruauit genera Dalechampus. Primum
minimum radice bulbosa, exigua, rotunda, multiplici cortice vestita, infernè
Cepæ modo fibrata: cauliculo dodrantali, duobus latiusculis foliis obuoluto, vs-
que ad floris exortum ferè ascendentibus, quatuor insuper, aut quinque fo-
liis ex lateribus vtrinque enatis, oblongis, angustis, linea cādida quæ media in-
tersecat, diuisis: flore Croci hortensis, paruo, supernè purpureo, infernè fla-
uescente, extantibus in medio staminibus croceis. Secundus priori in multis
similis est, in quibusdam diuersus: nempe quod radice sit ampliore, ac den-
sius fibrata: caule proceriore, grandiore, crassiusculo: foliis paucioribus: flore
maiore & latiore. Tertius radice est gemina, Gladioli modo, laxiore, integriorè,
minúsque lacero cortice obducta, parum fibrata: foliis quatuor, aut quin-
que, longissimis, sed angustissimis, linea media candidissima distinctis: caule
foliis vacuo, recto: flore media sui parte purpura nitente, suprà & infrà candi-
do, interdum prorsus albo. Crocus *filuestris* in plerisque Gallia locis, sed in
Allobrogibus potissimum nascitur, praesertim primus & tertius in niuosos

Crocus *fil-*
uestris.

CROCVS siluestris 111.*Dalechampij.*Li. 2. stirp.
Hispa. c. 4.

montibus, terra nigra & pingui. Liguata niue, & sub finem Maij florem & folia statim promunt. Hanc ob causam, opinor, Crocum Vernum Clusius appellauit, quòd flore sit Croci, Verèque floreat: cuius genera duo constituit, Crocum Vernum minus, & Crocum Vernum maius. Croci Verni minoris species tres. Primo angustifolio, seu minori bina, aut terna sunt folia oblonga, crocinis longè angustiora, gracilioraq; rotunda & capillaria ferè, viridiaq;. Interea cauliculus erumpit pollicari longitudine, angulosus, in quo flos vnicus Croci ferè, sed minor, senis foliis constans, ima parte foris flauescens, intus nonnihil candicantibus, reliqua cæruleis, siue violaceis, (inueniuntur & toti candidi) odoratis, quibus insunt aliquot parua stamina: succedit folliculus trigonus, in quo semen exiguum, fuluescens: radix exigua auellanae magnitudine, duro spadiceoque cortice tecta, intus alba, firma, subadstringente gustu. Bini plerūque flores, interdū terni ex eodem cortice, qui totidem bulbulos complectitur, prodeunt. Plurimus inuenitur

Gadibus, atque inter Asindum & Calpen, locis salebrosis & apricis. Alterum genus cum foliis, tum radice externo cortice huic omnino simile Clusius obseruauit in Beturiæ collibus Lusitaniæ conterminis, flore paulò minore, & ex albo purpurascens, vixque è terra prominente, qui ex octo foliis compositus est, quatuor

CROCVS Vernus minor 1.

¶ 111. Clusij.

*CROCVS Vernus*

maior, Clusij.



exterioribus

exterioribus paulò maioribus: radix illi candida & gemina, vna alteri insidente: superior firma, dulcis, edulis inferior flaccida. Tertium genus vberioribus & crassioribus est foliis, interdum rectis, cum reliquorum folia humi spargantur: flos superioribus multò minor, totusque cæruleus, tribus exterioribus foliis exceptis, quæ foris virescente colore diluta sunt: radix superioribus similis, sed paulò maior, & semen crassiusculum. Hunc Crocum Gadibus duntaxat iuxta priorem Clusius inuenit. Florent omnes Ianuario & Febuario. Crocum Vernalius maius, inquit, foliis satiuum omnino refert, nisi breuiora essent: ante florem ea prodeunt, deinde subsequuntur bini, aut terni flores crocinis similes, sex foliis constantes, quorum exteriora terna, quæ pallidula sunt, tres purpureæ saturatiores, & quasi

CROCVS serotinus cum flore, Lobellij.



CROCVS montanus, Clusij.



nigricantes lineæ, ab infima basi ad extremum folium ductæ versicoloria efficiunt, intus verò tum hæc, tum tria interiora candicant, staminaque in medio habent Croco montano similia: floribus succedunt siliquæ parvæ, oblongæ, angulosæ, subrufo, & rotundiusculo semine refertæ. His adiungit Lobellius duas alias Croci Verni species. Prior est Crocus Vernus serotin⁹, flore ex purpureo rubente, violaceis lineis striatus. Alter est Crocus Vernus serotinus, cæruleis oris, sparsis in latera foliis. Præterea Clusius Crocum montanum Autumnalem depingit, qui flore est satiuus Croci, sed dilutiore, staminibus intus tribus croceis, inter quæ veluti penicillus luteus emicat: folia quaterna Crocinis similia, viridia, interiore parte veluti lineam quandam candicantem secundum longitudinem, exteriori verò duas huiusmodi lineas & quasi canaliculos habent: radix satiuus candida, plena, & veluti internodiis distincta, subdulcis primum, deinde ingrati saporis, integitur cortice quodam denso, & multis villis contexto. Nasceitur in nonnullis Lusitanie rupibus, præsertim iuxta mare. Floret istic toto Nouembri. Siliquas Maio fert crassas, angulosas, semine plenas, quale Croci Verni est. Est & in Calcaris, vulgò de *L'esperon*, præcelso Gallie Narbonensis monte, Crocus montanus albo flore. Theophrasto *κρόκος ὀρνέος* dicitur, Latinis Crocus montanus, Autumnalis, siluestris, Lusitanis *Pie de Borro*, id est, Pes asininus. Crocus satiuus, ut tradit Dioscorides, concoquit, emollit, leuiter adstringit, vrinam cit, & coloris bonitatem efficit. Arcet crapulam cum passo potus. Fluxiones oculorum cum muliebri lacte inunctus sistit: potionibus, quæ pro interaneis parantur, vtiliter miscerur: item iis quæ vuluæ sedique subiiciuntur & illinuntur. Venerem stimulat. Inflammationes erysipelatodes inunctus lenit. Aurium remediis vtilissimum est. Lethalem sanè dicit hunc, si tritum

Lib. 1. ca. 25.
Vires &
Temper.

si trium drachmarum pondere cum aqua bibatur. Radix eius cum passo pota vri-
 Li. 11. c. 10. nam cit. Hæc & alia quædam de eodem prodidit Plinius. Discutit inflammatio-
 nes omnes quidem, sed oculorum maximè ex ovo illitum. Vulvarum quoque
 strangulatus, stomachi exulcerationes, pectoris & renum, iocinoris, pulmonum,
 vesicarumque, peculiariter inflammationi earum vehementer vtile: item tussi &
 pleuriticis. Tollit & pruritus, vrinam ciet. Qui Crocum prius biberint, crapulam
 non sentiunt. Ebrietati eo resistunt. Coronæ quoque ex eo mulcent ebrietatem.
 Somnum facit. Caput leuiter mouet. Venerem stimulat. Flos eius igni sacro illi-
 nitur cum creta Cimolia. Ipsum plurimis medicaminibus miscetur. Crocus, in-
 Li. 7. simpl. quit Galenus, paulum quid adstringens habet, quod terreum frigidumque est: sed
 superat in eo calfaciens & qualitas & facultas, vt tota eius essentia secundi sit or-
 dinis excalfacientium, & primi exsiccantium. Quare cōcoquendi vim quandam
 Li. 2. c. 129. obtinet, adiuuante scilicet in hoc paucula illa adstrictione. Scribit Auicenna Cro-
 cum cephalalgiam excitare, & capiti nocere. Id quod non exiguo, sed nimio vsu
 efficere potest. Vigiliis enim copiosus inducit, quæ modum excedentes capiti &
 sensibus obsunt. Moderatus autem Croci vsus cerebro prodest, sensus vegetiores
 reddit, somnum & torporem excutit, lætitiā gignit, corroborat cor. Thoracis
 crudos humores ad concoctionem perducit, pulmones aperit, & ab obstructione
 liberat: & ad hæc tam efficacæ est remedium, vt subinde phthificis in summo vitæ
 discrimine, & propemodum animam agentibus, spiritum reducat, & vitam ad
 aliquot dies proroget: scrupuli dimidij, aut ad summum integri pondo, cum pas-
 so, aut vino dulci propinatus. Quo etiam modo grauissimas subito irruentes
 dyspnœas citra febrem, statim & momento temporis tollere experimento com-
 pertum est. Laudatur ad hepatis & fellis obstructiones, & ad regium morbum.
 Croci stamina trita carpis, aut sub mammis admota illitæ, vires suas cordi cere-
 broq; illico transmittunt, quasiq; vertiginem tenebrosam inuehunt, aciem ocu-
 lorum præstringunt, aut hebetant. Scribit Serapio ex auctoritate Rhazis Crocū
 Cap. 173. drachmarum duarum pondere partum accelerare, maximè inebriare si cum vino
 simpl. misceatur: tantam lætitiā parere, vt ex nimia lætitiā insaniam gignat. Quod ex-
 perimento confirmat Amatus Lusitanus se mercatorem vidisse, qui cum in
 ollam in qua carnes coquebantur, multum Croci inieciisset, post earum esum in
 tam profusum risum prorupit, vt parum abfuerit quin risu nimio & cachinno e
 vita excesserit. His addenda Symeonis Sethi auctoritas. Crocus stomacho bonus
 est, inquit, ciborumq; concoctionē efficit. Obstructiones tollit. Pituitosa & lethar-
 gica vitia iuuat. Discutiendi quoq; vim obtinet, vlceribus vtilis est, & ad spiritus
 difficultatem conducit. Si quis illo mediocriter vtatur, bonum colorem habebit:
 sin verò vltra modum, pallorem contrahet, & capitis dolorem, cibiq; inappeten-
 tiam faciet. Cum opio & lacte & rosaceo pedum doloribus impositus vbi dolent,
 summo opere prodest, superpositis Betæ folijs. Croco siluestri verno maiori, quem
 In Advers. ex Clusio descripsimus, foris duntaxat vtendum esse censet Pena. Illitus pubi vri-
 nas elicit crebras atque crassas, tumores hydropicorum discutit, spicula euellit.

C E P A.

C A P. I X.



Nomina



Genera.

P O' M NYON Græcis, Cepa & Cepe in neutro genere Latinis &
 Officinis, Arabibus *Basil*, seu *Bassal*, Italis *Cipolla*, Germanis *Zunibel*,
 Hispanis *Cepolla*, Gallis *Oignon*. *κρόμμυον* autem Aristotele in Proble-
 matis auctore dictum est *παρὰ τὸ κύβας μύψιν τῶν ἐσθίωντων*, quod ocu-
 lorum tunicam pupillamq; mordaci vapore lancinando, conuiuere contrahiq;
 cogat lacrymas eliciendo: vnde Latinis Cepa lacrymosa. Cepa autem à capitis
 magnitudine. Quemadmodum Theophrasti & Dioscoridis æuo, ita etiam hodie
 magna

magna Ceparum varietas è locis, colore, magnitudine, acrimonia, tenericudine, variòque mangonio petenda. De iis sic scripsit Theophrastus. *πλεον δὲ τῶν κρημνῶν τὰ γένη, οἷον τὰ καὶ τὰς χώρας ἐπὶ ἀσκαλονία, γάρδια, κνίδια, Ἰσθμοθράκια.* (Sic enim Gaza legit: Plinius pro γάρδια, Sardia, pro κνίδια, Alfidena: fortasse κάρδια pro γάρδια ἀπὸ τῆς ἑσπερίας vrbe Thraciæ, ex facie loci nomine accepto, Plinio auctore) καὶ πάλιν τὰ σιθάνια, καὶ χιτὰρ, ἀσκαλονία. τῶν δὲ τὰ μὲν σῆθνια μικρὰ, γλυκεία δὲ ὁ μάλιστ'. τὰ δὲ χιτὰρ Ἰσθμοθράκια, ἔ τοῖς θεραπεύσις διαφέρουσι, καὶ δὴλον ὅτι τῇ φύσει γὰρ χιτὰρ τῶν μὲν χιτῶνι μετὰ τῆς κομῆσεως ἀργόν. ἅμα δὲ τῷ ἦεν τὰ φύλλα, περὶ αἷμασι τὰ ἔξω. Quæ admodum deprauata sic restitui possunt. τὰ δὲ χιτὰρ καὶ ἀσκαλονία καὶ θεραπεύσις διαφέρει, καὶ δὴλον ὅτι τῇ φύσει. χιτὰρ γὰρ τῷ μὲν χιτῶνι μετὰ τῆς κομῆσεως ἀργόν ἀπολέπσιν. ἅμα δὲ τῷ ἦεν τὰ φύλλα, περὶ αἷμασι, καὶ τὰ ἄλλα, θεραπεύσις. περὶ αἷμασι δὲ τῶν φύλλων, τὰ ἔπερ βλαστῶν, καὶ ἅμα χιτῶνι, διὸ καλεῖται χιτὰρ. οἱ δὲ καὶ ὅλως φασὶ πάλιν λεῖν, ὅπως ὁ δὴ καλεῖται τὰ χιτῶν, καὶ μὴ περὶ αἷμασι. Id est, Ceparum genera multa, à locis cognominata, Gardiæ, Cnidiæ, Samothraciæ: item fisciiles, Ascaloniæ. Ex his Setaniæ parua, valde dulces: fisciiles & Ascaloniæ cultu differunt, atque etiam natura. Fisciilem enim cum sua coma hyeme incultam relinquunt. Vere folia detrahunt, & reliqua colunt. Detractis his foliis altera germinant, & simul infernè finditur: vnde fisciiles appellant. Quidam prorsus omnibus generibus detrahenda folia censent, vt vis omnis in profundum subeat, & non in semen abeant. Ex quibus hæc mutuatus est Plinius. Cepæ genera apud Græcos Sardia, Samothracia, Alfidena, Setania, Schista, Ascalonia ab oppido Iudeæ nominata. Omnibus etiam odor lacrymosus, & præcipuè Cypriis, minimè Cnidiis. Omnibus corpus totum pinguitudinis earum cartilagine. (Quæ cum deprauata sint, & sine vlllo sensu, sic correxit Dalechampius. Omnibus radicum corpus tectum pingui cartilagine.) E' cunctis Setania minima, excepta Tusculana, sed dulcis. Schista autem & Ascalonia condiuntur. Schistam Hyeme cum coma sua relinquunt, Vere folia detrahūt, & alia subnascentur iisdem diuifuris: vnde & nomen. Hoc exemplo reliquis quoque generibus detrahi iubent, vt in capita crescant potius quàm in semina. Deinde explicata Ascaloniarum natura alias Ceparum differentias Theophrastus persequitur. Διαφέρει δὲ ἔνια ἔ τοῖς χρώμασιν. ἐν ἴσῳ γὰρ (Sic legit Gaza, non ἐν ἴσῳ, vt habent vulgata exemplaria, Plinius legit ἐν σάμῳ) τὰ μὲν ἄλλα ὅμοια τοῖς λεύκοις, λευκὰ δὲ σφοδρὰ τῇ χροίᾳ, φέρει δὲ φασὶν ὅμοια τοῖς σαρδιανοῖς. ἰδιωτέη δὲ ἡ φύσις τῶν κρημνῶν, περὶ αἷμασι καὶ τῶν τοῖς ἀσκαλωνίαις, ἐν μὴ ἀρὰ καὶ ἡ ἀλῆ. ἐν κρήνῃ γὰρ τι γένος, ὃ ἀφρόμυον μὲν ῥίζαν ποιεῖ, φυλλομυον δὲ χυλὸν καὶ σπέρμα. κεφαλὴν δὲ ἔκ' ἑξ, γλυκὺ δὲ τῷ χυμῷ. τὸ το γὰρ οἷον ἀνάπαλιν ἔχει τοῖς ἄλλοις. ἀπαντα γὰρ πηγνύμενα, καὶ βελία, καὶ γὰρ τὸν παρὰ γένος. Id est, Cepæ quædam colore differunt. Nam in Ifo cætera quidem similia candidis, valde autem candidæ sunt. Aiunt & similes esse Sardiæ. Cretensium peculiaris quædam natura est, sed Ascaloniis quodammodò similis, nisi eadem sit. Est enim in Creta genus quoddam, quod satum radicem gignit, depositum verò caulem & semen fundit. Caput non habet, dulciq; est succo. Quod ei contrà quàm cæteris euenit: omnes enim depositæ, & melius & celerius proueniunt. Quæ Plinius sic exscripsit. Est & colorum differentia. Samo enim & Sardibus candidissimæ proueniunt. Sunt in honore & Creticæ, de quibus dubitant, an eadem sint quæ Ascaloniæ: quoniam faties capita crascent: depositis caules & semina. Distāt sapore tantum dulci. Latinis etiam sua sunt genera. Plinius apud nos, inquit, duo prima genera. Vnum condimentaria, quam illi Gerhyon, nostri Pallacanam vocant. Seritur mensibus Martio, Aprili, Maio. Alterum capitata, quæ ab Æquinoctio Autumni, vel à Fauonio. Genera eius austeritatis ordine, Africana, Gallica, Tusculana, Amiterina. Optima autem quæ rotundissima: item rufa acrior quàm candida, sicca quàm viridis, & cruda quàm cocta, sicca quàm condita. Similiter nostri

CEPA *fissilis*,*Matthioli.*CEPA *Afcalonia*,*Matthioli.*

καὶ ἀπὲρμα φύδι μόνον, ἔστι καὶ ἄραια, καὶ ἀνάνη). Quæ sic Plinius expressit. *Afcaloniarum* Lib. 9. c. 6.
 propria natura. Etenim velut steriles sunt ab radice, & ob id semine feri illas, non
 deponi iussere Græci. Præterea seriùs circa Ver cùm germinant transferri: ita
 crassescere, & tunc properare præ eriti temporis pensitatione. Festinandum au-
 tem in his est, quoniam maturæ celeriter putrescunt. Si deponantur, & caulem
 emittunt & semen, ipsæq; evanescent. Has *Afcalonias*, siue *Afcalonitides*, siue *Pa-*
læstinas *Cepas* esse putant docti, quas Galli vocant *Efchalottes* seuatis prisce voca-
 buli veltigiis, quæ quod ancipitis & dubiæ sunt naturæ inter *Cepam Allium* &
Porrum, peculiarem quandam naturam, vel figuram eas habere tradit Theophras-
 tus. Sunt tamen *Cepis* similiores, sed multò minores, & crudæ in ientaculis lau-
 tiores frequentioresque habentur. Quapropter Franci *Appetiz* appellant, quia Pen. in
 edendi aviditatem excitant. Fortè etiam rectè *Bulbum Setanium* dixeris, quem Aducrf.
 Theophr. & Plinius *Cepæ* genus quoddam esse testatur. Quæ *Cepa Afcalonia* ex
 Matthiolo hîc expressa est, *Schænoprason Dodoñæi* quibusdam videtur, de quo
 capite proximo dicemus. Omnium maximæ sunt *Cepæ*, quæ Caieta Romana im-
 portantur, quæ etsi saturatè rubescant, & crassioribus tunicis cõpactæ sint, leuius-
 cula tamen acrimonia præditæ sunt, mansuq; tenerrimæ: ob id in cibos præstan-
 tiores sunt cæteris. In *Hetruria*, inquit Matthiolus, minùs acres, quæ magis rubet, In cap. 145.
 albæ omnium acerrimæ, quamvis flauas candidis acriores esse Dioscorides scri-
 pserit. Suauitate & mole omnibus *Italicis* & *Gallicis*, inquit *Pena*, excellunt *Afri-* In Aducrf.
cæ, ac *Hispanicæ*, & *Hispanicis* maiores, ac speciosiores *D. Altomari* in *Belgio* sa-
 turæ, quibus prima commendatio, & magnitudo capitis extuberantis, compressæ
 vtrinque rotunditatis, Rapum non mediocre æquantis, squamosa cuticula, exti-
 misque tunicis sanguineo saturo colore rubentibus, & nitentibus, *Flandriæ*, *Angliæ*, aliisq;
Septentrionalibus expetitur. Ad quas tamen gentes asportantur quot-
 annis *Hispanicæ* non minore copia, aut commendatione, quæ partim albæ, par-

*Locus.**Tempus.**Lib. c. 145.**Vires &**Temper.**Lib. 20. c. 5.**Lib. 7. simpl.*

tim purpurascens, gustuque aliquantō acriores sunt, pares ténacitate & mole, cibis & condimentis quàm medicamentis aptiores. Cæterarum ubiq; in Italia, Gallia, Germania, Anglia, Vasconia prouentus maximus hortorum cultoribus venit. Et ut quæque ad illarum bonitatem proximè accedit, ita optima habenda.

Terram amant pinguem vehementer subactam & irriguam. Florent Iulio potissimum mense, deinceps semen proferunt, quod non antè legendum quàm cum nigrum colorem præ se fert, is enim color maturitatis est index. Omnibus eadem facultas incidendi, lacrymas ciendi, odor non insuauis, sed vapor & sapor intensior, aut mitior. Omnes mordicant, inquit Dioscorides, status gignunt, appetentiam inuitant, extenuant, sitim excitant, fastidium pariunt, & expurgant. Aluo viles sunt. Detractis tunicis in oleum coniectæ, ac pro glandibus subditæ, hæmorrhoidas reliquasque excretiones aperiant. Succus cum melle illitus oculorum hebetudinibus, argemis, nubeculis, & incipientibus suffusionibus auxiliatur, anginæque laborantibus. Suppressos menses mouet. Caput purgat naribus infusus. Canis moribus cum sale, ruta, & melle illinitur. Cum aceto autem in sole inunctus, alphas sanat: cum pari spodio scabras lippitudines sedat. Varos cum melle reprimat. Contra calceamentorum attritus cum gallinæo adipe utilis est. Alui fluoribus prodest. Aurium grauitati, ac sonitui confert. Ad purulentas aures, & eliciendam aquam in iis interceptam valet. Alopecias earum succo vtiliter perfricantur: celerius enim quàm alcyonium pilos euocat. Largior Ceparum cibus capitis dolores ciet. Cocta vehementius vrinam pellit. In morbis cocta etiam largius comesta lethargum efficit. Cum passis uis & ficu illita, tubercula concoquit & rumpit.

Plinius de iis eadem & quædam alia prodidit. Cepæ olfactu ipso & delacrymatione caligini medetur, magis verò succi inunctione. Somnum etiam facere traduntur, & vlcera oris sanare commanducata cum pane. Et canis moribus virides ex aceto illitæ, aut siccæ cum melle, aut vino, ita ut post diem tertium soluantur. Sic & tritæ sanant (lege ex veteri codice, Sic & attrita sanant.) Coctam in cinere & epiphoris multi imposuere cum farina hordeacea, & genitalium vlcibus. Succo & cicatrices oculorum, & albugines, & argema inunxere: & serpentium morsus, & vlcera omnia cum melle: item auricularum cum lacte mulierum: & in iisdem sonitum & grauitatem emendantes cum adipe anserino, aut cum melle stillauere. Et cum aqua bibendum dedere repente obmutescensibus. In dolore quoque ad dentes colluendos instillauere, & plagis bestiarum omnium, priuatim scorpionum. Alopecias fricauere & psoras tufis Cepis. Coctas dysentericis vescendas dedere, & contra lumborum dolores, purgamenta quoque earum cremata in cinerem illinentes ex aceto serpentium moribus, ipsasque multipedæ ex aceto. Reliqua inter medicos mira diuersitas. Proximi inutiles esse præcordiis & concoctioni, inflationemque & sitim facere dixerunt. Asclepiadis schola ad colorem quoque validum profici hoc cibo: & si ieiuni quotidie edant, firmitatem valetudinis custodiri: stomacho viles esse spiritus agitatione: ventrem mollire: hæmorrhoidas pellere subditas pro balanis: succum cum succo sceniculi contra incipientes hydropises mirè proficere. Item contra anginas cum ruta & melle. Excitari eisdem lethargicos.

Cepa, auctore Galeno, ex quarto est ordine excalfacientium. Essentia eius potius crassarum est partium: unde etiam hæmorrhoidas aperit tum apposita, tum cum aceto inuncta. In sole alphas abstergit: tum alopeciis attrita pilos alcyonio citius restituit. Si succum eius exprimas, quod reliquum est admodum terreæ substantiæ est, eiusque calida: at succus aqueæ æreæque caliditatis. Hic igitur iis qui suffusi sunt, aut aciem oculorum obtusam præ crassitie humorum habent, inunctus prodest. Ex huius temperatura tota Cepa flatuosa est manducata. Itaque quæ temperatura sunt sicciore, minus flatuum generant. Cepa elixa, aut sub prunis tosta,

inquit

inquit Matthiolus, datur cum saccharo vtiliter anhelosis & tussientibus, addito butyri momento. Excauatur ea parte quā sunt radices, & praestanti repletur theriaca citrei mali succo subacta: deinde ocluso foramine sub calidis cineribus coquitur, donec probè fuerit macerata: tunc premitur, & excipitur cremor, iis perutilis qui pestilentialaborant, sed eos illico sudare oportet. Item excauatur & cymini puluere repletur, coquitur, & exprimitur eodem modo. Succus is vtiliter instillatur ad aurium surditatem. Crassior Cepae squama sub feruenti cinere tosta antiquum capitis dolorem sedat, si frustulum eius calidum in dolentis lateris aurem intromittatur, superasperso rosaceo & laurino oleo, succidaque addita lana quae totam operiat aurem. Cepae succus cum acerrimo aceto mistus sanguinem è naribus manantem sistit iis immixtus.

PORRVM.

CAP. X.



ON solum hic Bulbus Cepis est affinis, sed etiam tunicarum inuolucris demptis, interius eius capitulum cor vocatum Cepam refert: nec foliis, floribus, caule, & semine multum dissimilis, quem Graeci *πράσον* vocant, Latini Porrum, Arabes *Curat*, siue *Kurat*, Itali *Porro*, Germani *Lauch*, Galli *Porreau*, Hispani *Puerro*. Praefum verò dictum est à colore, quod sit *πράσιον*, siue *πράσιον*, id est, viride. Porrum autem Latine quod porro eat, & longè latèque grassetur auctore Ruellio. Pena à callosa Porri capitis simillima in ossibus ferruminatis concrezione dictum conicit. Oltorum industria Porrum in capitatum & sectium diuisit. Illud *κεφαλασόν* Graeci vocant, id est, capitatum, quod in caput accrescat, hoc sectium, cui frondentem comam solo tenus amputant. Tale si facere velis: ait Columella, densius situm praeceperunt priores relinqui, & ita cum increuerit secari. Sed nos docuit vsus longè melius fieri, si differas, & eodem more quo capitatum modicis spatiis, id est, inter quaternos digitos depangas, & cum conualuerit, defeces. In eo autem quod magni capitis efficere voles seruandum sit, vt antequam translatum deponas, omnes radículas amputes, & fibrarum summas partes intondeas. Tum testulae vel conchae quasi sedes in singulis subiectae seminibus adobruuntur, vt fiant capita latioris incrementi. Quod & Plinius tradidit. Seritur semine ab Aequinoctio Autumni: si sectium facere libuit, densius. In eadem area secatur, donec deficiat, stercore usque semper: nutritur in capita, antequam secetur. Cum increuit in aliam aream transfertur, summis foliis leuiter recisis ante medullam, & capitibus detractis tunicis extremis. Antiqui silice, vel tegula subiecta capita dilatabant. Nunc leuiter sarculo conuelluntur radices, vt delumbatae alant, neque distrahant. Porrum foliis est Allio similis, latioribus tamen ac longioribus, carinatis, & in acutum desinentibus. Ceruix illi

Nomina

Lib. 3. ca. 12.
In Aduers.
Genera.

Lib. 11. ca. 3.


PORRVM sectium,
Fuchsj.



Li. 12. ca. 6.

*PORRVM sectium &
capitatum, Matth.*

*PORRVM commune,
Matthioli.*



longa bulbosaq; candicans, crassiori summitate, radiculis multis capillata, & ex numerosis tunicis contexta. Bimum in caulem prosilit, Cepæ modo longum cauumq; : floribus in cacumine in orbem conglomeratis: semine nigro, cepaceo non ablimili. Hortis omnibus frequentissimum, lato solo gaudet, odit rigua. Maio & Iunio mense floret, altero a latu anno. Porrum capitatum inflationem parit, inquit Dioscorides, noxium succum creat, molesta insomnia parit. Vrinam ciet, aluo accommodum, extenuat, oculorum aciem hebetat, menses pellit, vesicam exulceratam, renēque lædit. Cum ptisana coctum esu quæ in thorace sunt educit. Coma eius in aqua maris & aceto cocta in decessionibus ad præclusiones vuluæ & duritias utilis habetur. Vna & altera aqua coctum, aut aqua frigida maceratum, dulcescit, & multò minùs inflat. Semen acrius est, & quandam adstrictoriam vim habet. Quare succus eius cum aceto, addito thure, aut manna, sanguinem, maxime è naribus profluentem, sistit. Venerem stimulat. Contra thoracis vitia omnia pro delinctu efficax est, & ad tabem, comestum. Purgat etiam arteriam. Sed si assiduè estur, visus obscuritatem inducit. Stomacho aduersatur. Succus ex melle potus contra bestiarum morsus auxilio est. Idem quoque illitus prodest. Cum aceto, thure & lacte, aut rosaceo instillatus, aurium doloribus & sonitui confert. Varos tollunt folia cum rhoë obsoniorum illita: epinyctidi medentur. Cruetas ex sale illita rumpunt. Veteres sanguinis reiectiones cohibent seminis drachmæ binæ cum æquali baccharum Myrti pondere potæ. Hæc de Porro capitato solum Dioscorides tradidit. Plinius ex variis auctoribus decerpta miscet, ac consarcinat. Porrum sectium, inquit, profluuia sanguinis sistit in naribus, contrito eo obturatis, vel gallæ mixto, aut menthæ. Item ex abortu profluuia, pote succo cum lacte mulierum. Tussi etiam veteri, ac pectoris & pulmonis vitiis medetur. Illitis foliis sanantur & ambugta


*Vires &
Temper.
Liz. ca. 143.*

Liz. ca. 6.

ambusta, & epinyctides : item alia vlcera cum melle trito. Vel bestiarum mor-
sus ex aceto : item serpentium. Aurium verò vitiis cum felle caprino, vel pari
mensura mulsi : stridores cum lacte mulieris : capitis dolores, si in nares funda-
tur, dormiturisve in aurem duobus succi cochlearibus, vno mellis. Succus & ad
serpentium scorpionumque ictus bibitur cum mero, & ad lumborum dolores
cum vini hemina potus. Sanguinem verò excreantibus & phthisicis, distilla-
tionibus longis, vel succus, vel ex ipso cibo piodest. Item morbo regio, vel hy-
dropicis. Et ad renum dolores cum ptisanæ succo acetabuli mensura. Idem
modus cum melle vulvas purgat. Estur verò & contra fungorum venena : im-
ponitur & vulneribus. Venerem stimulat, sitim sedat, ebrietates discutit. Sed
oculorum aciem hebetare traditur : inflationem quoque facere, quæ tamen sto-
macho non noceat, ventrémque molliat. Vocis splendorem affert. Capitato ma-
ior est ad eadem effectus. Sanguinem reiicientibus succus eius cum gallæ, aut
thuris farina, vel acacia datur. Hippocrates & sine alia mistura dari iubet : vul-
uasque contractas aperiri iubet : fecunditatem etiam fæminarum hoc cibo au-
geri. Contritum ex melle vlcera purgat. Tusim & destillationes thoracis, pul-
monis, & arteriæ vitia sanat, datum in forbitione ptisanæ, vel crudum, præter ca-
pita, sine pane, ita vt alternis diebus sumantur, vel si purulenta excreentur. Sic &
voci, vel veneri, somnôq; multū confert. (De voce nihil Dioscor. dixit, de somno
autem, *Δυσονόμος* esse, id est, tumultuosum somnum parere.) Capita bis aqua mu-
tata cocta aluum sistunt, & fluxiones veteres. (Dioscorides ait, Porrum bis aqua
mutata coctum, tum frigida maceratum, dulcescit, & minùs inflat.) Cortex de-
tractus illitúsque inficit canos. Hæc Plinius, qui paulò antè tradidit Neronem
Porro sectiuo auctoritatem dedisse, vocis gratia, ex oleo statis mensium omnium
diebus, nihilque aliud, ac ne pane quidem vescendo. Grauem enim vocem ex-
plicat Porrum, sua lentitia faucium asperitatem deliniens. Certè & perdicæ

Lib. 19. c. 6.

AMPELOPRASVM,
Matthioli.



vtuntur eo, si credimus Aristoteli, canoræ
vocis gratia. Galenus de Porris, Alliis, &
Cepis agens : Harum plantarum, inquit, ra-
dices vulgò frequentissimè esitant, caulem
tamen rarò & folia, quæ & ipsa proportione
radicum acrem admodum habent faculta-
tem. Corpus calefaciunt, & qui in ipso sunt,
humores crassos tenuant, lentosque incî-
dunt. Si cocta tamen bis tæruæ fuerint, acri-
moniam quidem deponunt, tenuant tamen
adhuc, & alimentum corpori dant paucissi-
mum, quod certè priùs quàm elixa essent,
omnino non dabant. Est aliud Porrum, ni-
mirum siluestre, quod Græcis *ἀμπελόπρα* *Gu*
dicitur, id est, Vineale Porrum, Arabibus
Nahati, Italis *Porro saluatico*, & *Porrandello*, Ger-
manis *Vuïldlauch*, Gallis *Porreau de chien*. Am-
pelopRASVM caule proflit bicubitali : foliis
porraceis, sed angustioribus : flore candido :
radice bulbosa. Prouenit in vinetis, in agro-
rum marginibus, & in amœnis collium locis.
Ex Matthiolo id pictum damus : à quo diuer-
sum est quod Lobellius exhibuit, folio Allij

Lia. Alim.

Forma.

Locus.

AMPELOPRASVM,

seu Porrum siluestre,

Lobellij.



Li. 2. c. 144.
Vires &
Temper.
Li. 24. ca. 15.

Li. 2. Alim.

siluestris tenuifolij non dissimili, sed maiore & acriore, in caule bicubitali, radice bulbosa, non ex nucleis, sed singulari capite constante, Porri minore, duriore, acriore, nonnullis adnatis sese propagante: flore & nucleis seminis vice, triticeis granis paribus, in glomeratis capitulis non disparibus Allij siluestris tenuifolij. Vinetis, aru's, marginibus, senticetis, & dumetis Gallia & Belgij gaudet. Stomacho magis quàm Porrum aduersatur, vt tradit Dioscorides, plus excalfacit, vrinam & menses vehementius ciet. Eius esus contra serpentium morsus vtilis est. De quo hæc Plinius. Ampeloprasum in vinetis nascitur, folijs Porri, ructu grauis. Contra serpentium ictus efficax. Vrinam & menses ciet: eruptiones sanguinis per genitale inhihet potum impositumque. Datur & à partu mulieribus, & contra canis morsum. Galenus scribit Ampeloprasum tantum à Porris dissidere, quantum in omnibus alijs generibus agrestia omnia à domesticis differunt. Quosdam autem in totum annum sequentem, vt Cepas aceto condientes, ita & Ampeloprasum reponere:

fieri que in cibo præstantiora, ac minùs habere vitiosi succi. Item Ampeloprasum agreste esse Porrum: quare & acrius eo, & siccius esse, sicut agrestia omnia reliquis hortensibus, ac proinde stomacho quàm illud nocentius. Sed & crassos & lentos humores potentius incidere, valentiusque infarcta organa obstructione liberare. Hac quoque ratione, vrinam sæpe prouocasse, vbi à crasis & lentis humoribus retinebantur. Adeò verò esse calidum, vt, illitum cataplasmatibus modo, exulceret. Porrum aliud paruum à Dodonæo ponitur. Germanis *Vintzeulauch*, Belgis *Bieslook*, id est, Allium iuncum: vnde *χλωμόπρα* Græcè nuncupauit. Cauliculos, graciles, teneros, cauos veluti iuncos paruos, in vnum acruum coactos foliorum vice profert, gustu ferè Porri. Inter hos nonnunquam cauliculi emergunt rotundi cum capitulis, vt in Ceba, sed multò minoribus, floribus purpureis referti. Radices sunt Bulbi Cepas paruis similes, vel porracci, minores, oblongi, coherentes & implexi, fibris quamplurimis capillati. Prouenit vbique in hortis, adeoque Porrum refert, vt quibusdam non solum veri Porri vicem expleat, sed opinionem faciat. Crudi folia acetariis gustum gratissimum addunt. Hanc plantam Fuchsius Porrum sectium facit. Matthiolus pro Ceba Ascalonia Theophrasti depinxit, vt diximus, Lobellio & alijs testibus. Pena negat veterum Ascalonitidem, seu Palaestinam Cepam esse.

Schæno-
prafum
Dodon.
Forma.

Locus.


Cap. 243.

ALLIUM



EPACEI etiam generis est, quod σκόροδον Græci, Latini Allium **Nomina** vocant, Arabes *Chaum*, *Chairin* & *Thum*, Itali *Aglio*, Germani *Knobloch* vel *Knoblouch*, Hispani *Ayos*, Galli *Ail* & *Aux*. Scorodō Aristophanis enarrator in Pluto dici tradit, quasi σκαῖον ῥόδον, id est, rudem & iniuriam rosam, quod asperè suprà modum redoleat, & olfacientium nares offendat. Latinos Allium dixisse putat Ruellius à Græco ἀλλεῖον, quod exiliendo crescat. **Lib. 1. c. 20.** Allij varietates hæc sunt Theophrasto. τὸ δὲ σκόροδον φυτεύεται μὴ μικρὸν πρὸ τροπῶν, ἢ μετὰ τροπὰς, διακρίνεται καὶ γένη (legendum καὶ γένησις.) διαφορά δὲ ἐστὶν αὐτῶν, ἢ τε τῶν ὀψίμων πρὸς τὰ παλαιότερα γάρ τι τυγχάνει τοῖσιν. ὅθεν (repono, ὅ, τε ἐν) ἐξηκοντα ἡμέραις τελείσθαι, καὶ μετέθαι καὶ μικρότερον. Ἐ τῷ μεγέθει γένος τι διαφέρειν ἐστὶ μαλίστα τὸ κύριον καλούμενον τοῖσιν, ὅπερ ἔχει φύσιν, ἀλλὰ πρὸς τὸς μυθολογούς χρῶνται: καὶ ἐν τῇ τριψύχῃ θαύμασιν ποιεῖ τὸν ὄγκον ἐκπνεύματίζμενον, καὶ ἐν τῷ μὴ ἔχειν ἐνία τὰς γένησις. ἢ ὅ γλυκύτης, ἔ ἡ εὐωδία, καὶ ἡ ἀδρότης σχεδὸν παρὰ τὰς ὥρας (legendum χῶρας) γίνεσθαι, καὶ τὰς θεραπείας, ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων. Id est, Allium seritur paulò antè solstitia, aut post solstitia in spicas diuisum. Differunt Allia, quòd alterum sit serotinum, alterum præcox: est enim genus quoddam, quod sexaginta diebus perficitur. Differunt & magnitudine & paruitate. Magnitudine excellit maximè quod Cyprium vocatur: quod non decoquunt, sed ad intrita, quæ Myttota appellantur, vtuntur, & cùm teritur in molem admirandam flatu intumescit. Præterea quædam ex spicis non coagmentantur. Dulcedinis autem, odoris, & crassitudinis Alliorum, quæ admodum & caterorum satorum, causa sunt natura loci & cultus. Ex quibus hæc sumpsit Plinius. Allium ad multa ruris præcipuè medicamentum prodesse creditur. **Lib. 19. c. 6.** Tenuissimis, & quæ separantur in vniuersum, velatur membranis: mox pluribus coagmetatur nucleis, & his separatim vestitis, asperi saporis: quo plures fuere, hoc asperius. Tadium huic quoque halitus, vt Cepis, nullum tamen coctis. Generum differentia in tempore. Præcox maturefcit sexaginta diebus. Tum in magnitudine. Vlpicum quoq; in hoc genere Græci appellauere Allium Cyprium, alij Antiscorodon, præcipuè Africæ celebratum inter pulmentaria ruris, grandius Allio. Tritum in oleo & aceto mirum quantum increfcit spuma. Ex his intelligimus prægrande Allium Vlpicum Latinis dici, quod Theophrastus Cyprium vocat, quod Antiscorodon dici corruptè in Plinij vulgatis exemplaribus legimus, cùm ex Columella Aphroscorodon legendum videatur, qui Vlpicum, non Cyprium, sed Punicum Allium appellat. Verba eius hæc sunt. Vlpicum, quod quidam Allium Punicum vocant, Græci autem ἀφροσκόροδον appellant, longè maioris est incrementi quàm Allium. Sed hîc dubitare licet, an Aphroscorodō à spuma, quæ Græcis ἀφρος dicitur, qua increfcit, vt Plinius ait, vel, vt Theophrastus, ἐκπνεύματίζεται, an ab Aphrorum gente, cùm Columella Allium Punicum appellet. Id quod Plinius etiā non differtur, scribens Vlpicum præcipuè Africæ celebratum inter pulmentaria ruris. Iam verò quod Theophrastus genus quoddam Allij nucleos habere negat, id Dioscorides in Aegypto nasci tradit, Matthiolus in Hetruria, & multis aliis Italia locis, vbi Allium mas appellatur. Dioscoridi Allij genera sunt duo. Satium siue hortenfc, & siluestre, quod Ophioscorodon, id est, Anguinum Allium vocat, & Elaphoscorodon, id est, Ceruinum Allium. Recentiores siluestris duo genera faciunt tenuifolia, aliud latifolium maculosum serpentinum, Ophioscorodon. Præterea aliud vrsinum etiam latifolium. Allium satium fronde viret cepitia, sed minimè caua: caule tereti & inani, in cuius cacumine flores in globum circumaguntur, in quo semen emicat. Radicis bulbus tenuibus velatur membranis, mox pluribus coagmetatur nucleis, & iis separatim vestitis, in cuius vertice complures **Forma.** **Ruell. lib. 2. cap. 8.**

ALLIVM sativum
silvestre, Matthioli.



Pena in
 Aduers.

Locus.

rum Allij vrsini speciem proximè referunt & redolent, radicis ceruice longiore, rimosa cute obsita. Allium hortense passim in hortis satum prouenit. Silvestre sponte in aruis & cāpestribus, inuisum alicubi colonis, quia segeti innatum prauū odorē & saporem ei cōmunicat, quo deinceps tum farina, tum panes inbuuntur.

ALLIVM Vrsinum latifolium,
Fuschij & Dodon.



ALLIVM Vrsinum,
Matthioli.



Vrsinum

fibræ cirrorum modò crispatur, tædiosi, vt Cepa, halitus, acris saporis: quo enim spicæ plures vna coierint, hoc acrius sentitur. Silvestre foliis constat paucis, prælongis, teretibus, intus concavis, iunceam speciem representantibus: caule procero, læui, purpureos flores ostendente, cacumine tum colore, tum forma conspicuo. Radix bulbus est pusillus, oblongus, non ex nucleis constans, sed vnico læuique capitulo, nonnullis interdum adnatis minoribus sese propagante. Est alterum hoc minus, cæterum foliis, caule, femine, radice superiori simile, in pratis frequētius proueniens. Allium vrsinum, odore magis quàm habitu Allium referens, folia profert sapius duo, grandia, fermè Lilij conuallium, virētia, flaccida, læuia: caulem vnum aut alterum, tenellum, in quo flores multi, candidi, stellati. Bulbus aliquot nucleis paruis, oblongis, sparsis, candicans, odorem Allij tædiosum spirat, gustantique saporem acrem non ingratum præbet. Ortu & habitu non ita huic dissimile est Ophioscorodon verè dictum, à caule foliisque Serpētariæ modo maculosis, quæ tamen folio-

ALLIVM *anguinum*,
Mathioli.



Vrsinum in editis montibus & vmbrosis, vel vdis pratensibus. Anguinum maculosum etiam in montibus. Hortense & siluestre ætate florent. Vrsinum Vere, Aprili & Maio mensibus. *Tempus.*
Vis Allio est acris ex Dioscoride, calfacit, flatus *Li. 2. c. 146.*
excernit (Legendum enim non ἐκκρῖναι, φου- *Vires &*
σώδην, id est, vim excernendi, flatuosum, sicut in *Temper.*
publicis codicibus habetur, sed ἐκκρῖναι φου-
σῶν) aluum turbat, stomachum exsiccat. Sitim efficit, flatus alterat aut concoquit (Ruellius interpretatus est, flatum permouet, cum Græcè legatur, ἐμπνέουσα ἀλλοιωτική, id est, flatuum alteratricem, aut concoctricem vim habet.) Summam corporis cutem exulcerat. Esu latos ventris lumbricos expellit. Vrinas ducit. Contra viperarum morsus & hæmorrhoidum prodest, ita vt non aliud magis (Græca habent, ἐχιδνηκτοῖς τε, καὶ αἱμῶρροῖσιν ἀρμόζει, &c. Sunt enim αἱμῶρροῖντες q. per vniuersum corpus sanguinem fundunt, ab Hæmorrhoi, siue Hæmorrhoidis serpentis morsu) si vinum iugiter sumatur, aut in eodem tritum bibatur. Contra rabio-
forum morsus vtiliter illinitur. Contra aqua-

rum mutationes confert. Asperas arterias clarificat. Veterem tussim crudum & coctum esu lenit. Cum origani decocto potum pediculos & lendes enecat. Vstum & cum melle subactum illitumque hypopia & alopecias sanat. Exanthemata cum nardino vnguento, sale & oleo curat. Alphos, impetigines, lentigines, achoras, lepras, furfuresque eximit. Cum teda & thure decoctum, si in ore contineatur, dentium dolorem leuat. Contra muris aranei morsus cum ficulneis foliis & cumino illinitur. Comæ decoctum in infelsionibus mensēs & secundas trahit. Eiusdem gratia sufficit. factum ex eo & nigra oliua intritum, quod Græci μυττωδον vocant, vrinam cit, & aperiendi vim habet. Vtile etiam hydropicis. Hic Myrtoti vox aliquoties ab Hippocrate vsurpatur, vt in libro de visu, de medicamento quodam oculari scribens. καὶ ὁλόγον ἀναμίξαι, ἕως ἂν πύαρον γένηται ὡς μυττωδός. Cuius vocis Galenus meminit in Glossis Hippocraticis, Dioscoridem citans. μυττωδον ἐπὶ ὀφθαλμοῖς εἶναι φησι σκορόδης ἢ κρομύνης. Quæ de hoc Dioscoridis loco intelligi possunt. Eadem voce vsus est Theophrastus loco supra à nobis citato. Allij vires pluribus exponit Plinius his verbis. Allio magna vis, magnæ vtilitates contra Lib. 20. c. 6.
aquarum mutationes. Serpentes abigit, & scorpiones odore: atque, vt aliqui tradidere, & bestiarum omnium ictibus medetur potu, vel cibo, vel illitu: priuatim contra hæmorrhoidas prodest cum vino redditum vomitu. Ac ne contra araneorum murium venenatum morsum valere miremur, aconitum, quod alio nomine pardalianches vocatur, debellat: item hyoscyamum: canum morsus, in quæ vulnera cum melle imponitur. Ad serpentium quidem ictus potum cum restibus suis (Alij cum vestibus, id est, membranosis corticibus) efficacissimè ex oleo illinitur: attritisque corporum partibus, vel si in vesicas intumuerint. Quin & suffitu eo secundas partus euocari existimauit Hippocrates: cinere eorum cum oleo capitis vlcerà manantia sanitati restituens. Sulpiriosis coctum, aliqui crudum id dedê-
re. Diocles hydropicis cum centaurio, aut in fico duplici ad euacuandam aluum: quod efficacius præstat viride cum coriandro in mero potum. Sulpiriosis aliqui
&

& tritum in lacte dederunt. Praxagoras & contra morbum regium vino miscuit: & contra ileum in oleo & pulte, sic illinens strumis quoque. Antiqui & infanientibus dabant crudum. Diocles phreneticis elixum. Contra anginas tritum imponi, & gargarizare prodest. Dentium dolorem tribus capitibus in aceto tritis imminuit, vel si decocta aqua colluantur, addaturque ipsum in caua dentium. Auribus etiam instillatur succus cum adipe anserino: phthiriasis & prurigines potum, tufum item cum aceto & nitro compescit: destillationes cum lacte coctum, vel tritum, permistumve caseo molli: quo genere & raucitatem extenuat: vel phthysim in fabæ sorbitione. In totum autem coctum vtilius est crudo, elixumque tosto: sic & voci confert. Tineas & reliqua animalia interaneorum pellit, in aceto inulso coctum. Tenesmo in pulte medetur. Temporum doloribus illitum elixum, & pustulis coctum cum melle, deinde tritum. Tussi cum adipe vetusto decoctum, vel cum lacte. Aut si sanguis etiam excreetur, vel purulenta, sub pruna coctum, & cum mellis pari modo sumptum. Conuulsis, ruptis, cum sale & oleo. Nam cum adipe tumores suspectos sanat. Extrahit fistulis vitia cum sulphure & resina, etiam arundines cum pice. Lepras, lichenas, lentigines exulcerat, sanatque cum origano, vel cinis eius ex oleo & garo illitus. Sic & sacros ignes. Sugillata ac liuentia ad colorem reducit, contusum ex melle. Credunt & comitalem morbum sanare, si quis eo in cibo vtatur ac potione. Quartanas quoque excutere potum caput vnum cum Laserpitij obolo in vino austero. Tussim & alio modo ac pectoris suppurationes quantalibet sanat, fractæ incoctum fabæ, atque ita in cibo sumptum, donec sanitatem restituat: facit & somnos, atque in totum rubicundiora corpora. Venerem quoque stimulat cum coriandro viridi tritum, potumque è mero. Vitia eius sunt, quod oculos hebetat, inflationes facit, stomachum lædit copiosius sumptum, sitim gignit. Cæterò contra pituitam, & gallinis & gallinaceis prodest mixtum farre in cibo. Iumenta vrinam reddere, atque non torqueri tradunt, si trito natura tangatur. Hæc Plinius. Qui cum Allium cōtra hæmorrhoidas prodesse dicit, per hæmorrhoidas non sedis affectionē intelligit, sed genus serpentis, cuius mas Hæ-

Lib. 9. c. 23. morrhus, fœmina Hæmorrhœis vocatur auctore Aëtio, ex cuius morfu sanguinē

Lib. 8. sim. per totum corpus ferri contigit: vnde ei nomen positum. Galenus scribit Allium calcare & exsiccare quarto excessu. Agreste domestico valentius esse, ceu reli-



Lib. 2. Alim. qua agrestia. Alibi Allium mandi nō vt obsonium, sed vt salubre medicamentum, quod digerendi & obstructiones aperiendi facultatem habet. Quod si elixum parum fuerit, adeo vt acrimoniam deponat, vires quidem habere debiliores, succi

Lib. 12. Metho. autem prauitatem non amplius retinere. Et alio in loco, Allium, inquit, ex eorum ciborum est genere, qui & flatum discutiunt, & minimè sitim inferunt. Sunt qui parum id experti existimēt maiorem quàm Cepam sitim excitare, sed planè errore: cum non modò maiorem quàm Cēpa, sed nec omnino sitim faciat. Idem omnium planè eduliorum maxime flatum discutit. Itaque ipse certè agrestium theriacen id appello. Ex his perspicuum est Dioscoridem à Galeno scribentem vim habere *διψὺς ποσιν*, id est, sitim efficientē, reprehēdi. Symeon Sethi tradit proprietate quadam sitim à falso humore factam sedare, & non solum flatum discutere, sed horum generationem prohibere: colicos affectus à flatibus ortos, & diuturnos coxendicum, qui à pituita proueniunt, dolores iuuare. Porro & Allio hīc *σκαποδιδωπρασον* subdemus, Latinis Alliporum, Gallis *Ailporreau*, quod non solum effigiei, sed qualitatum Allij & Porri, vt Dioscorides ait, sit particeps. Magnitudine Porrum æquat: foliis est Porraceis, quæ digitis trita Allium & Porrum resipiūt. In multis Italiæ locis sua sponte nasci Matthiolus affirmat, vnde translatum in hortis & viridariis virescit. Aliud Scorodoprason pinxit Lobellius, folio Porri latiore, caule quaternum & quinum cubitorum è bulbo crassiore, nucleis quinis

& senis ex squamatis cuticulis coacto, odoris ingrati, Allij, vegetioris. Item aliud, crassioribus & longioribus nucleis: bulbus eius stipatur membraneis inuolucris ex atro flauentibus: flos & folia Allij exiliora: odor & sapor Scorodoprafi. Magis spirare Allium ait Pena, sed propius exprimere Porrum, quod in cliuosis vinetis,

SCORODOPRASVM,
Matthioli.

SCORODOPRASON alterum
duplex, Lobelij.



& incultis ericetis Ligurum, Nicæq; in Sabaudia sponte prouenit. Quare fallitur Marcellus Vergilius, qui, quod Plinius huius plantæ non meminerit, nec alij rei rustica scriptores, monstrum aliquod Naturæ credit id fuisse, coactis humano opere coalescere simul non dissimilibus penitus oleribus duobus: qualia in re rustica aliquando excogitata in maiore ocio ab aliquibus fuere. Scorodoprasum, ut scribit Dioscorides, promiscuas sibi vires ex Allio & Porro vendicauit, effectus Allij & Porri præbens, sed inefficacius. Coctum Porri modo dulcescit, & in olerum vicem transit. Idem Galenus tradit, Scorodoprasum sicut gustu & odore mediam Allij & Porri qualitatē possidet, ita & viribus. Li. 2. c. 147. Lib. 8. sim.

ORCHIS.

CAP. XII.



VM Bulbis, Hyacinthis, Cepaceis, atque aliis similibus Testiculos & Satyria recensere conuenit. In quibus qui ὄρχις, & κωδὸς ὄρχις Græcis, Latinis similiter Orchis & Cynosorchis dicitur, Officinis Testiculus canis, Arabibus *Chaf alkes*, seu *Chaf alchels*, Italis *Testicolo di cane*, Germanis *Knabenkraut*, Hispanis *Coyon de perro*, Gallis *Couillon de chien* & *du Satyrion*, Officinarum nomē retinentes. Nam Officinæ Orchies Satyria nominant, & eorum bulbis legitimi Satyrii vice vtuntur. Præbuisse occasionem videtur Apuleius, qui nullam inter Satyria & Orchies differentiam facit, sed vtrumque Satyrium cum vtroque Orchicanis videlicet dicto, & Serapiade confundit. Græcis, inquit, dicitur Satyriū, aliis Cynosorchis, aliis Eutaticos, Panion, Serapion, aliis Orchis, Galli Vram, Itali Priapifcon, alij Orminalem, alij Testiculum leporinum nominant. Nomina

Orchis

Orchis dicta est herba, quod radices sibi inuicem haud secus atque duo testiculi cohæreant. Cynosorchis verò quod canum testiculis similem radicem habeat.

Genera.

Orcheos duo esse genera dixerunt Dioscorides, Galenus, Plinius, Orchin siue Cynosorchin, & Orchin Serapiada. Multò plures sunt recentioribus differentiæ, omnes à radice effigie sic nominatæ. Fuchsius Orcheos duo genera facit, marem & fœminam. Marem item duorum generum, vnum latifolium, alterum angustifolium: fœminam itidem duorum generum, vnam maiorem, alteram minorem.

In c. 124. &
125. lib. 3.
Lib. 2. hist.
cap. 46.

De flor.
cap. 61.

Lib. 3. c. 124.
Forma.

Lib. 27. c. 8.

De flor. c. 61

Matthiolus quinque Orcheos species depinxit, foliis & floribus differentes, quibus addidit Palmæ Christi species duas, de quib⁹ capite De Satyrio dicemus. Dodonæus Orcheis quatuor generibus distinxit. Primi generis, Orcheos videlicet, siue Cynosorcheos quinque species constituit, duas priores maris, tres reliquas fœminæ nomine designans. Secundam Tragorchin, id est, Hirci testiculum. Tertiam speciem duplicem etiam, marem scilicet & fœminam. Quartam quoque duplicem, hanc maiorem, illam minorem. Alio in libro Orcheis quinque generibus comprehendit. Primum Cynosorchin vocat, cuius species quinque, secundum Testiculum morionis, tertium Tragorchin, quartum Orchin Serapiada, quintum Testiculum odoratum, siue Testiculum pumilum. Orchis siue Cynosorchis, ut describit Dioscorides, folia habet circa caulem, & ima eius parte per terram strata, Oleæ molli similia, angustiora tamen, læuia & longiora: caulem dodrantali altitudine, in quo flores purpurei: radicem bulbosam, oblongam, duplicem, oliuæ modò angustam, superiorem alteram, inferiorem alteram: & hanc quidem mollem ac rugosam, illam verò plenā. Plinius Cynosorchin, aliqui Orchin vocant, foliis Oleæ, mollibus, ternis, per semipedem longitudinis in terra stratis: radice bulbosa, oblonga, duplici ordine, superiore quæ durior est, & inferiore quæ mollior. Hanc

ORCHIS 1. species Dodo.
s. Matth.

Orcheos delineationem Dodonæus primo, vel secundo, vel utriusque Cynosorchis conuenire censet, & falsò legi apud Dioscoridem folia ἐλαττωματικῇ ὄψει, pro σκελλῇ μαλακῇ, ut Scilla intelligatur Epimenidia, foliis minùs asperis & angustioribus, quam hîc Dioscorides mollem appellat. Hanc lectionem confirmat Theophrasti auctoritate, qui de Orchis scribens ait, ἡ χεῖρ δὲ φύλλον σκελλῶδες, id est, folium Scillæ habet. Quare paulò post dicturi sumus. At priorem in Dioscoride lectionem agnouit Plinius loco iam citato, Orchis Oleæ mollia folia assignas, & Theophrastus, ut ex eodem Plinio colligere licet, non de Cynosorchis, sed de Orchis Serapiade hîc verba facere videtur. Cynosorcheos prima species, auctore Dodonæo, folia fert lata, pingua, Lilij foliis, propemodum similia: caulem pedalem ait altiorem, angulosum, & in eo flores copiosos, spicatim digestos, colore rubentis dilutæ purpuræ, cucullo aut galeæ patenti similes, ex quibus parte inferiore laciniosum quiddā, canis aut alterius animalis quadrupedis exuuio simile dependet, dilutè & ipsum purpurascens, punctulis magis purpureis respersum. Pro radicibus præter fibras supra adhærentes gemini sunt bulbi veluti testiculi, forma aliquantum oblongi,



1. Cynoso.

Lib. 2. hist.
cap. 46. &
De flor.
cap. 61.

Dod. ibid.

quorum vnus plenior ac vegetior, alter rugosior. Secunda species foliis similiter læuibus, oblongis & latis est, sed quàm antecedentis minoribus & angustioribus, quinque aut sex, nonnullis caule amplectentibus qui dodrantalis est, spica densa, breui,

ORCHIS II. species Dod.

& Matthioli.



breui, in qua flores multi, colore ex cādido pur-
purascentes, multis purpureis punctis, & inte-
riore parte obscurioribus, copiosis, exiguis li-
neis ornati, forma galeam aut hiantem cucullū
referentes, dependente ex singulis veluti ani-
malculi quadrupedis, aut homunculi extensis
brachiis, & diuaticatis cruribus absque capite
corpusculo: radices duæ subsunt globosæ, nu-
clei nucis myristicæ magnitudine, adhærentibus
ad annexū fibris aliquot crassiss. Tertia Cynos-
orchis species folia edit angusta, striata, Planta-
ginis angustifoliæ foliis quodammodo similia:
caulem dodrantalem: flores in breui densaque
spica copiosos, colore foris puniceo, & obscurio
rem purpuram referente, intus verò albicante,
eiusdem cum superioribus formæ, sed tamē mi-
nores, dependente quoque ex ipsis rudi ac infor-
mi exiguo veluti quadrupedis animantis rudi-
mēto. Radices subsunt aliorum Orcheon simi-
les. Exhibuit Matthiolus eam, quæ hīc expressa
est, Testiculi speciem tertiam sine vlla delinea-
tione. Illi & alius floribus per omnia similis, fo-
liis tamen latioribus, & secundum referētibus.

Dod. ibid.

Dod. ibid.

Dod. ibid.

Iam & quinta quædam species reperitur, foliis vti secundus canis Testiculus: caule
pedali: spica longa: floribus colore herbaceo subuirentibus, ex quibus quod laci-
niæ simile dependet, oblongum est, & quasi quadrangulum. Hæ sunt primi gene-
ris Cynoforchios species. Secundum Orcheos genus, Testiculus morionis à Do-

Orcheos
genus. 2.
De flor.
cap. 61.

ORCHIS III.

Dodonai.



TESTICULI III.

species, Matth.



ORCHIS IIII. & V.

Dodonæi: I. Match.

modo adnascuntur, non erectis, sed ipsi floris cucullo ita incumbentibus, vt non facile obseruentur: gemini & huic testiculis similes globuli exeunt, & supra annexum aliquot fibræ. Et vni quidem huius generis flores purpurei, violæ ferè nigra colore, in medio candidiores, punctis aliquot variegati, pluresque in dēfiori spica,

TESTICVLVS Morionis
mas, Dodonæi.



TESTICVLVS Morionis
femina, Dodonæi.



caulisque

caulisque quàm reliquorum longior. Alteri flores dilutè rubent, cauliculus breuior est, & folia aliquatenus minora. Tertij flores purpuram referunt exquisitè rubentem, & vermiculum colorem: densa huic breuisque spica: flores minores: folia nonnihil striata, pleraque erecta, & caulem circumamplectentia. Sunt verò & huius generis minores Testiculi, quibus cauliculus brevis est: folia paruula, quina aut fena, vno aut altero circum cauliculum erecto: flores in spira breui, rari, colore nunc in cæruleo purpureo diluti, nunc candidi, quandoque rubentes, sed coloris obsoleti & odoris ingrati. Tertium Orcheos genus Tragorchis nominatur, id est, Hirci testiculus, ab aliis Testiculus leporis: tamè ab odore, quo hircu, cum in flore est, refert, Hirci testiculus potius appellandus: folia similiter læuia, lata, & longa

ORCHIS Saurodes vel Scinphora Gemma: Testiculus Hircinus vulgaris.



fert, Liliaceis proxima, maiora quàm aliorum Orcheon: caulem cubitalem, sæpe foliis nonnullis inferius implicitum: flores secundum caulem in longa veluti spira multos, foetidos & hircum olentes, quorum forma patenti quoque galeæ similis est, ex quibus tamen non exuuiio simile quid, sed longa, aliquantulum retorta veluti laerte cum medio corpusculo cauda propendet, coloris eius cuius est caulis, purpureis aliquot punctulis circa annexum insignita: semen in valuulis oblongis & striatis gignitur perexiguum: testiculi subsunt grandes, fibræ aliquot suprâ adhærent. Eius iconem infrâ posuimus. Quartum Orcheos genus Serapias ab antiquis cognominatur auctore Dioscoride, quoniam radix ad multa utilis sit. Sunt qui à Serapi Alexandrinorum Deo sic nominatum velint, inquit Fuchsius, propter lasciuia impudentè, qua is Deus Canopi, vbi templum & cultu & religione excellens habebat, colebatur, vt videre est apud Strabonem. Paulo Triorchis dicitur non alia de causâ, quàm quòd tribus testiculatis radicibus in terra nititur, quas etiam Fuchsius vtrique Serapiadi appinxit. Plinius tamen &

Lib. 3. c. 115. Cap. 210. hist.

Lib. Geo. 17. Lib. 6. & 7.

Theophrastus non nisi geminos bulbos Serapiadi tribuerunt, neque plures duobus in his vel aliis testiculis se obseruasse Dodonæus affirmat. Huius Serapiadis duo genera depinxit Fuchsius, marem & fœminam. Dodonæus tria. Vnius flos papilionem, alterius fucum, tertij muscam refert. Orchis Serapias, vt describit Dioscorides, folia Porro similia habet, oblonga, latiora & pingua, in alarum cauis inflexa: cauliculos dodrantes, subpurpureos flores: radix subest testiculis similis. De quo hæc scripsisse videtur Theophrastus. κατὰ πέρ ἐπὶ τῆς ὀρχεως. χαλαρὰ μέν. διυαίν γὰρ ὄνθιν, τὸ μὲν μέγαλιν, τοῦ δὲ μικροῦ, τὸν μὲν μέγαν ἐνεργότερον ποιεῖ πρὸς τὰς ὀμυλίας, ἐν γὰρ ἀκλινὶ διδόμενον ἀγρός ὀρετιόμιν, τὸν δὲ ἐλάττω σίνεαζ καὶ κωλύειν. ἔχει δὲ τὸ μὲν φύλλον σιλωῶδες, μετρίτερον δὲ καὶ ἑλαττον. τὸν δὲ χαλὸν ὁμοιοτάτων ἀπὲρ ἀπύρω, ἥτοι ἀκάνθη. Quæ sic vertit Gaza. Sicut qui testiculus appellatur. Cum enim gemini sint, alter magnus, alter autem paruus, magnum efficacem ad coitum, datum è lacte caprino tradunt, minorem verò obesse, ac inhibere. Habet folium Laferis, verum læuius atque minus: caulem simillimum spinæ, quam Pirum vocant. Sed hunc locum mendosum esse testatur Plinius, vt rectè Hermolaus annotauit. Non enim Silphij seu Laferis folium habet Serapias, vt Gaza conuertit, σιλωῶδες pro

De flor. cap. 61. Cap. 210.

Lib. 3. c. 115.

Lib. 9. hist. cap. 19.

In corall. cap. 143. lib.

σκιλλῶδες legens. Etenim Silphio folium est Apij, nō scillaceum aut porraceum, vt Serapiadi. Deinde spinosus huic herbæ caulis, & Apio, id est, Raphano siluestri, inquit Hermolaus, nō, vt Theodorus, Piro similis. Plinius Theophrastū sic interpretatus est. Sed inter pauca mirabilis est Orchis herba siue Serapias, foliis Porri: caule palmeo: flore purpureo: gemina radice, testiculis simili, ita vt maior, siue, vt aliqui dicunt, durior ex aqua pota exciter libidinem, rarior siue mollior è lacte caprino inhibeat. Quidam folio Scillæ esse dicūt, læuiori ac minori: caule spinoso. Quare legendum, φύλλον σκιλλῶδες, λεϊότερον ὃ καὶ ἔλαττον. τὸν δὲ καυλὸν ἀχαλιδῶδη, ὁμοίωτον ἀπίῳ. Potest & sic legi, σκιλλῶδες, λεϊότερον διὲ καὶ ἔλαττον, καυλὸν ἀχαλιδῶδη, ὅρχιν διὲ ὁμοίωτον ἀπίῳ; id est, Piro. Testiculum Serapiada primum his verbis describit Dodonæus: folia fert duo aut tria, læuia, latiufcula, at Lilij foliis multò mi-

De flor.
cap. 61.

ORCHIS Serapias primus,
Dodonæi.



TRIORCHIS Serapias
mas, Fuchsij.



nora: caulem dodrantalem, aut altiore: flores in eo raros, candidos, papilionibus expansis alis quodammodo similes, è foliolis scilicet tribus, vno superiore, duobus lateralibus alas referētibus, & longiori, tenui velut papilionis corpore, cauda propendente, melleum & dulcem liquorem continente commissi: qui contorto aliquantulum pediculo cauli adhærent. Globuli subsunt gemini, candidi & rotundi, & supra eorum annexum fibræ aliquot pro radicibus. Secundum Serapiadis genus quinis senisve constat foliis, venosis, aliquantulum latis, Plantaginis angustifoliæ quadantenus similibus, sed minoribus, quibusdam terram versus reflexis, aliis circum caulem, qui palmaris aut dodrantalis est: floribus in summo quinque aut sex, ex aliquot foliolis compositis, quorum inferius forma, & colore subnigro sordido fucum proximè referre videtur: testiculi subsunt vt aliis gemini. Reperiuntur huius species duæ: vnus flos foliola maiora, candidiora, & aliquantulum purpurascentia habet: alterius omnino minora & subuirentia. Huius caulis breuior, illius altior. Est Triorchis scæmina Fuchsio. Tertius Orchis Serapias foliis est minoribus & paucioribus: cauléque breuiori ac tenuiori quàm secundus, cui alioqui satis similis est: flores huic tres aut quatuor, ex tribus exiguis superioribus foliolis,



TESTICVLVS odora-
 tus, Dodonai.



liolis, & quarto inferiore oblongiore, colore in purpu-
 ra tristi subnigro, nonnihil variegato, forma muscæ
 cuiusdā corpori similes. Testiculi veluti geminæ par-
 uæ pilulæ sunt. Secundum ex his Serapiada præsertim
 maiorem Dodonæus cum Dioscoridis delineatione
 conuenire ait: folium enim ei Marrubij folio longius
 latiúsque & læue est, quod reflectitur: caulis dodranta-
 lis: florum superiora foliola dilutè in candore ruben-
 tem purpuram referunt: testiculi exigui sunt. Vbi Do-
 donæus εὐχόρα πασιών, id est, Marrubio, pro πασιών, id
 est, Porro legit, Pliniumq; qui folia Porri ei tribuit, in-
 terpretibus omnibus errandi occasionem dedisse ait.
 Quintū Orchios genus Testiculus odoratus, siue pu-
 milio nūcupatus, omnium foliis minimus est: etenim
 ei foliola sunt omnino paruula, eaque venosa, & Plan-
 tagini aliquatenus similia, sed minutis ac paruulis eius
 foliis minora, virentia: caulis tenuis est, palmi altitudi-
 ne, circa quem flosculi paruuli, candidi, suauiter odo-
 rati, ordine digesti, ac spiræ modo caulem ambientes:
 bulbi subsunt gemini, parui, oblongi. His addo Te-

Lib. de flo.
 cap. 61.

5. Genus
 Orchios,
 Dodon. de
 flor. ca. 61.

sticulum vulpis vulgò vocatum, seu Testiculum sacerdotis, Germanis *Stendeluurtz*,
 quem Fuchsius Satyrij trifolij nomine descripsit & depinxit. Tria duntaxat fere
 semper folia profert Lilij albi foliis similia, minora tamen & rubicundiora, cau-
 lem pedalem, in quo flores venusti, radicis caux floribus haud dissimiles, modò
 niuei candoris, modò saturè purpurei: radices sunt veluti nuces duæ exiguæ, vel
 oliuæ cohærentes, foris rubescentes, intus candidæ, quarum vna plenior & maior,
 a tera minor, spongiosa, flaccida, sapore dulci & grato. Est alius Orchis, rotundus

Cap. 269.
 hist.
 Dodo. lib.
 2. cap. 46.

TESTICVLVS Vulpis,
Dodonæi.

ORCHIS rotundus,
Dalechampij.



à Dalechampsio cognominatus, radice gemina, testiculis simili, carnosâ, supernè fibrata: caule vnico, cubitali, rotundo: foliis ad summum tribus vel quatuor, latis, venosis, pallidis, arundinis instarè caulis amplexu sese explicantibus: flore puniceo in capitulis globosis, & aliquantulùm compressis, non aliorum generum modo in thyrsos longo & spicato emicante, capituli vertici velut de industria affixo. Præterea obseruauit Dalechampsius in editis montibus Orcheos genus humile, rarum flore luteo, tribus aut quatuor foliolis constans, cætera vulgò cognitis simile.

CYNOSORCHIS maior Lob.

Serapias Dioscor.

Gemma.



I.

II.

III.

IIII.

V.

VI.

Prope oppidum Monspelio vicinum, Veganiū nominatum, id genus nascitur. Orcheon genera aliter distinxit Lobellius ex Cornelio Gemma, & multò plura spectanda nobis proposuit, vt tum huic, tum illi multarum id genus plantarum cognitionem acceptam referre debeamus. Sunt omnes ordine, qui sequitur, expressæ. Cynosorchis Morio, Orchis mas angustifolia Fuchsij, Satyrium Apulei, Orchis Delphinia palustris Corn. Gemma, Testiculus Morionis mas Dodonæi. Cynosorchis maioris species secunda, Cynosorchis altera Dodo. Cynosorchis Morio fœmina Dodonæi, Orchis Delphinia môtana Corn. Gemma. Testiculus hircinus. Testiculus vulpinus primus, Orchis Serapias primus Dodonæi. Testiculus vulpinus secundus, Orchis Serapias secundus Dodonæi. Hi Testiculi

sticuli suprà descripti sunt, & depiçti. Cynosorchis Lobel. maior. Serapias Diosc. VII.
Cornel. Gemmæ, siue Basilica, Syderites vel Erythraa, floris omnino purpurei,

SERAPIAS Dioscor. 2. *Gemma*

Orchis Basilica altera, Cynof-
orchis altera maior, Lob.

& aliarum omnium facile princeps. Cynosorchis altera maior Lobelij, Serapias Dioscoridis secunda. Corn. Gemmæ, siue Orchis Basilica altera Syderites flore candidiore, thyrsosq; magis compresso, & foliis latioribus vsq; ad verticem inflexis, circa caulem argenteis. In Serapiadum genere principes, siue Basilicas appellauit Corn. Gēma, ob regalis sceptri diadematis ac trabearū similitudinem. Maior tum prima, tum secunda foliis constant perfecte virentibus instar Porri, oblongis, pinguibus, paulò latioribus, interdum leuiter inflexis: testiculi perfecte rotundi: cauliculus dodrantalis, sæpe procerior: flos venustissimus, valde purpureus, interdum leuiter subpurpurascens, dispositis ferè in umbellæ dilatentis speciem, nulla odoris gratia. Altera flore minùs purpureo, magisque in aciem explicato. Floret vtraque à principio Iulij, constante specie & venustate mirabili. Erumpunt folia circa solstitium Hyemale. Gaudet umbrosis & asperis, muscoso solo, & maximè graminetis. Vulgaris Testiculus hircinus, seu Tragorchis, IX.



TRAGORCHIS minor, &
verior, *Gemma*.

ORCHIS Melittias,
Gemma.



- X. & Leporis testiculus nostrâs, quem iam descripsimus, Orchis saurodes vel Scincophora, lacertarum æmulatione, Cornel. Gemmæ, siue Tragorchis altera. Tragorchis minor & verior Corn. Gemmæ, siue Coriosmites, siue Coriophora, flore XII. instar Cimicum. Orchis Melittias, siue Apis cadauerulum exprimens, Orchis

ORCHIS Myodes 1.

Gemma.



XVIII.

ORCHIS Sphecodes,

Gemma.



Myodes prima Cor. Gemmæ, floribus muscam exprimens. Hæ duæ postremæ videntur referre Orchis Serapiam marem & fœminam Dodonæi in Historia stirp. Vulpinus Testiculus, siue Orchis Myodes lutea Narbonensis, congener cû minimo Testiculo vulpino, floribus fucum colore & effigie repræsentantibus, Orchis Serapias 3. Dodonæi, supra descriptus. Orchis Sphecodes Gemmæ, Gallicè *Mouscheguespe*, Belgicè *Uvespen*. Huius ex magnitudine, & floris intenso & remisso colore varietas gemina conspicitur. Orchis Myodes altera Corn. Gemmæ, folio læuiore & flore grandiusculo. Orchis Ornithophora, vel Ornithes, folio læui Corn. Gemmæ, Testiculus Vulpinus Lobellij, papilionis alas expansas referens. Orchis Ornithophora folio maculoso Corn. Gemmæ, cuius differentiæ multæ sunt, ex floribus purpureis, subpurpurascens, albis: foliis prægradiibus, parvis, ovalis figuræ, ex acuto in latum desinentibus, ex acuto in amplum & rotundum. floret medio Aprilis ferè, & quandoque sub initium, vel finem mensis Martij. Orchis Stra-

ORCHIS Myodes

altera, Gemma.



teum

teumatica, vel Stratiotes maior, siue Militaris Cor. Gemmæ, quam meritò Basili- XIX.
cam tertiam liceat appellare. Orchis Strateumatica minor Cor. Gemmæ. Or- XX.
chis Batrachites, vel Batrachoides Gemmæ, Belgarum *Vorskens*, id est, Ranula, à XXI.
floris figura. Orchis Hermaphroditica secunda Cornel. Gemmæ, siue Orchis XXII:

ORCHIS *Ornithophora folio
lani, Gemma.*



ORCHIS *Ornithophora foliis
maculosis, Gemma.*



ORCHIS *Strateumatica maior,
Basilica 3. Gemma.*



ORCHIS *Strateumatica
minor, Gemma.*



psychoides

psychoides diphylla. Testiculus odoratus, à nobis suprà depictus & descriptus,
 XXIII. Orchis Spiralis Cornel. Gemmæ. Huic adiungitur Tetrorchis, vel Triorchis alba Spiralis, vel Autumnalis Cornel. Gemmæ. Alter Pumilio, inquit, flore candido odorato, rectè Spirale Satyrium vel Autumnale vocetur. Estq; vt plurimum

ORCHIS Batrachoides,
Gemma.



TETRORCHIS vel *Triorchis*
alba, Gemma.



ORCHIS Hermaphroditica Gemma:
sive Orchis psychoides diphylla.



ORCHIS Frisia litoralis,
Gemma.



Triorchis

Triorchis, aut Tetrorchis, oblongis bulbis instar oliuæ compressæ, folia rhomboide, impenfè virentia, cum fulgore subatro. Flores in spiram apicè dispositi forma diadematis, vt Testiculo odorato. Erumpunt folia mense Septembri, florem iam marcescēte, ac perseverant vsque in Maium, inde verò per æstatē delitescunt:

TRIORCHIS lutea
Gemma, Lobell.



TRIORCHIS lutea, flore
luteo Gemma, Lobell.



erumpit autem, cauliculus mense Augusto, florens vsque in Septembrem. Orchis Frisia litoralis Gemma, quæ gemina inferiora folia bifolia, Plantaginis latifolia angustiora edit, & in dodrantali cauliculo herbaceo, siue luteo virentes flosculos in hortō D. Braugionis. Eadem, aut illi congener est Triorchis lutea altera Corn. Gemma, folio rotundior & latiore quàm Triorchis alba virētiore, trifolia & nonnihil hirsuta. Est etiā Triorchis lutea tertia, cuius effigies hīc appositæ est, sed obliq̃ioribus radicis oliuaribus bulbis. Sequitur Orchis minor Leodiensis Triorchis lutea, flore luteo, siue Basilica minor Corn. Gemma, Serapias & Triorchis quorundā, Terna folia angustiora, Quinqueneruæ Plantaginis æmula edit, læuiore & viriditate Auriculæ vrsinæ, vti superior flos itidem in cauliculo exili testiculi odorati pari. Radix ternis & quaternis pusillis, pendulis testiculis subest, quibus diuaticatur & propagatur. Collibus agri Leodiensis gaudet. Dicitur hæc Basilica minor Gemma, Pamilio, flore luteo nonnihil herbaceo instar regij diadematis, odore fragrantissimo, cui vis ad excitandam venerem præ cæteris admiranda: quare Hispani *Amor di donna* meritò appellant: testes parui, rotundi, solidi, cortice rufo obducti. Folia emergunt prius Maio mense, vel circa finem Aprilis: floret mense Iulio vsque in Augustum: valde sese multiplicat sub terris. Gaudet montosis. Dux, quæ sequuntur, à nobis descriptæ sunt & depictæ capite de Satyrio. Serapias mas læui folio, floribus dilutè purpureis, notulis conspersis, Satyrium Basilicum primum Dodonæi, Palma Christi Herbariorum, & Serapias scemina pratensis, foliis notulis inspersis, Satyrium Basilicum alterum maius Dodonæi, & Palma Christi. Serapias candido flore montana maculatis foliis, Cynosorchis montana folio maculoso Corn. Gemma in pratis niueo flore crebra visitur: cætera haud absimilia Satyrio Basilico altero Dodonæi. Serapias minor rubra nitente flore angustifolia, nullis inspersis punctulis. Serapias palustris latifolia, Cynosorchis palustris platyphylla, folio læui luteoque: flore albo, subpurpurascēte Cornel. Gemma

XXIII.

XXV.

XXVI.

XXVII.

XXVIII.

XXIX.

SERAPIAS candido
flore, Lobell.

SERAPIAS minor rubra,
Gemma.



CYNOSORCHIS palustris
Platyphylla, Gemma.



SERAPIAS palustris altera
Leptophylla Gemma.



- xxx. Gemmæ. Præcior est violacea Cynosorchi. Serapias palustris altera Leptophylla. Serapias palustris tertia, Cynosorchis altera Corn. Gemmæ, seriùs florens, comâ violacea, foliis interdum læuibus, interdum maculosis. Serapias montana folio læui, Cynosorchis montana folio læui Corn. Gemmæ. Cynosorchis Dracontias
- xxxI.
xxxII.
xxxIII.

SERAPIAS palustris
III. Gemma.



*SERAPIAS montana folio
leui, Gemma.*



*CYNOSORCHIS Dracon-
tias, Gemma.*



CYNOSORCHIS
Conopsea.



contias foliis & floribus impensè rubris Corn. Gemmæ. Floret circa finem Aprilis, aut initia mensis Maij. Nascitur in humidis & vliginosis, præsertim vbi nigrior terra est. Cynosorchis Macrocaulos, vel Conopsea, siue Galericulata Cornel. XXXIII. Gemmæ. Floret circa medium finemque mensis Maij, vsque ad mensis Iunij ferè
R R R

medium. Ad duorum cubitorum altitudinem sæpe pertingit. Flores illi purpurei admodum elegantes, & odorati vt in Serapiade Basilica prima, atque secunda, nisi quòd color Conopseæ magis dilutus, & hæc alterius velut scemella propria videatur. Gaudet pratis, sed tamen non vsque adeò humidis, vt priores: quin potius


XXXV:

SATYRIUM castratum, Gemma.

XXXVI.

Locus.

*Vires &
Temper.
Lij. c. 124.*



CYNOSORCHIS leptophylla, Gemma.



medio quodam solo ac temperato. Satyrium castratum, vel eunuchum, ex genere Cynosorchicos Corn. Gemmæ. Cynosorchis palustris læui folio & angusto omnium vilissima Corn. Gemmæ. Cynosorchis palustris altera lophodes vel nephelodes Corn. Gemmæ. Flos illi communis ferè cum cæteris maculosus. Ob id huic communis appicta est deflorescentis Satyrii forma, vna cum corniculis, quibus semen atomum prorsus includitur. Hætenus Lobelius & Cornelius Gemma. Cynosorchis in petrosis & arenosis locis provenit. Quidam locis palustribus, ac humectentibus, in siluis ac pratis. Tragorchis in pingui & argilloso solo. Testiculus vulpis & odoratus in editis, incultis, & aridis locis maximè. Orchis rotundus cliuosis pratis altorum frigidorumque montium gaudet. Maio & Iunio mensibus omnes florèt, dempto odorato, qui Augusto, aut Septembri mense flores promit. Cynosorchis radix editur vt Bulbus cocta, inquit Dioscorides. Fertur de ea, si maiorem edant viri, mares generari, si minorem scemina, sceminas. Addunt etiam in

CYNOSORCHIS palustris altera lophodes, Gemma.



Thessalia

Theſſalia mulieres mollem cum caprino lacte bibendam dare, vt ad venerea excitent, aridam verò ad inhiſcenda, ac diſſipanda. Alterum etiam alterius potu reſolui. Eadem planè Plinius tradidit. Eduntur vt Bulbi cocti in vineis ferè inuenti. Li. 27. ca. 8.
 Ex his radicibus ſi maiorem edant viri, mares generari dicunt, ſi minorem ſceminæ, alterum ſexum. In Theſſalia molliorem in lacte caprino viri bibunt ad ſtimulandos coitus, duriorẽ verò ad inhiſcendos. Aduerſatur alter alteri. Serapiadis radix, auctore Dioſcoride, illita tumores diſcutiendi vim habet, atque vlcera expurgat: herpetas cõhibet: fiſtulas abolet: inflammationes illita mitigat: ſicca nomas compẽſcit, vlceratque putreſcentia & maligna oris ſanat. Cum vino pota aluum fiſtit. Feruntur de hac etiam quæcumque de Cynoſorche dicta ſunt. Plinius quædam horum duntaxat habet. Eius radices, inquit, ſanant oris vlcera, thoracis pituita: aluum fiſtunt è vino potæ. Cynoſorcheos radici bulbosæ, ac geminæ, inquit Galenus, viſ inest calida & humida, ac guſtantibus durieuſcula eſt. Cæterum maior radix multam videtur habere excrementitiã humiditatem & flatuoſam. Li. 3. ca. 125.
 Quapropter epota venerem excitat. Altera minor contrà, admodum elaborata eſt ad calidius & ſiccus vergens. Itaque hæc radix tantum abeſt, vt ad coitum ſtimulet, vt etiam contrà planè inhibeat ac reprimat. Orchis Serapias ſicciorẽ facultatem obtinet, quã vt primi ordinis haberi mereatur. Quocirca nec proinde ad venerem accommodus eſt. Oedemata illitu diſcutit: ſordida vlcera expurgat, herpetas ſanat. Siccatuſ multò ampliùſ deſiccatur: nam & putreſcentia vlcera ſanat contumaciãque: quippe cum & ſubadſtringens ſit, ac proinde etiam ventrem ex vino potuſ fiſtit. Hodie Sepaſiarij, inquit Dodonæuſ, Orcheon bulbos compoſitionibus ad excitandam venerem ſine diſcrimine admifcent. Præſtantes tamen ſunt Tragorcheos bulbi. Ambo autem aſſumendi non ſunt, ſed durior, plenior ac ſucculentior: ſtaccidior ac rugoſior reiiciendus. Eſt autem plenior non ſemper qui maior, ſed non rarò etiam minor, ſi videlicet bulbi colligantur priuſquàm ſtirps deſloruerit, aut cum primùm caulis erumpit. Neque enim ſucculentior alterum magnitudine ſuperat, priuſquàm ſemen maturari cõperit. Nam cum alternis annis vnus bulbus intumeſcat, alter verò pereat, fieri non poteſt vt durior ac ſucco plenior ſemper maior ſit. Quando enim folia erumpunt, tunc demum, vel non multò antè plenior creſcere incipit, quo paulatim incrementũ ſumẽte alter ſtaccet, rugatque contrahit, donec maturato ſemine vna cum foliis & cauliculis ſubinde totuſ ſubſidat, ac pereat, eo qui interea creuit vegeto, ac ſucci pleno. Li. 26. ca. 10.
Li. 8. ſimpl.
De florib. cap. 61.

SATYRIVM.

CAP. XIII.

IVSDEM Bulbacei generis cū Teſticuluſ eſt *Γαύριον* Græciſ dictum, Nomina
 Latinis Satyrium, Arabibus *Gaſi alchaleb*, *Chafi atraleb*, ſive *Tartarichi*,
 Italiſ *Satirio* & *Satirio*. *♂*, Galliſ *Satyrion*. Satyrio nomen fecerunt
 Satyri, qui primi ſilueſtres dij colludenteſ Nymphis per ſiluaſ &
 antra, ad firmiorem venerem herbam hanc inuenerunt. Dioſcorideſ Satyria duo
 ponit. Vnum Triphyllum, id eſt, trifolium, alterum Erythronium, ſive Erythraicũ,
 id eſt, rubrum. Præter iſta recentior ætaſ Satyrium Baſilicum adinuēnit, id eſt, Satyrium Regium, quod & Palmam Chriſti nominauit, propter ſimilitudinẽ
 quandam, quam ei긯 radix cum humana habet manu, Germani *Creutzblumen*,
 Galli *Satyrion Royal*. Sed ne quiſ homonymia fallatur, lōgè alia eſt ſtirps vehemen-
 ter purgans Palmæ Chriſti nomine donata. Satyrium Baſilicum duplex eſt. Vnum
 maiuſ, alteruſ minuſ. Quoddam folio non maculato, aliud maculato. Satyrium
 trifolium delineat Dioſcorideſ hiſ verbis: Folia fert Rumici, aut Lilio ſimilia, mi-
 nora tamen, & rubentia: caulem nudum, longum, cubitale: ſtorem Lilio ſimilem, Li. 3. ca. 126. & 127.
Genera.
Ibidem.
Forma.

Li. 26. c. 10.

Ode 8.
Epod.

album: radicem Lilio similem, mali modo extuberantem, foris rufam, intus oui modo albam, gustu dulcem, & ori gratam. Satyrium Erythronium semine est Lini, maiore, duro, læui, splendente, quod fertur quemadmodum & Scincus venerè excitare: cortice radice gracili, luso, interiore parte alba, gustanti dulci, & ori non ingrata. In apricis & montosis nascitur. Plinius de iisdem hæc prodidit. Concitatricem vim habet Satyrium. Duo eius genera, vna longioribus foliis quàm Olea: caule quatuor digitorum: flore purpureo: radice gemina ad formam hominis testium, alternis annis intumescere, ac residente. Altera Satyrium Orchis cognominatur, & femina esse creditur. Distinguitur internodiis & ramosiore frutice, radice fascinis vtili. Nascitur ferè iuxta mare. Vbi Cornarius legit ex veteri codice, radice fascini, pro virili membro fascinum accipiens, in quo significato vsurpauit Horatius hoc versu.

Amisue languet fascinum.

Hic Plinius Satyrium cum Orchi confudisse videtur, & ex Latini cuiusdam auctoris sententia ista prodidisse: subiungit enim. Græci Satyrium foliis Lilij rubri, minoribus, & tribus non ampliùs è terra extantibus tradunt: caule læui, cubitali, nudo, radice gemina, cuius inferior pars & maior mares gignat, superior ac minor fœminas. Et aliud genus Satyrj (Erythraicum appellant) semine Viticis maiore, læui: duræ radice cortice rubro intus album includi, sapore subdulce: ferè in montosis inueniri. Satyria Dioscoridis vera vix adhuc Herbariis bene sunt cognita: tamen ex Dalechampij coniectura potiùs quàm certa asseueratione ea hic exhibemus. Erythronium, siue Erythraicum montosis & apricis nascitur: radice bulbo-

SATYRIUM rubrum,

Dalechampij.



sa, ima parte fibrata, oblonga, Porro non dissimili, foris subrufa, intus candida, nulla grauitate odoris iniucûda, veluti Orcheos, tenera, gustu principio dulci, qualis est Castaneæ, deinde acri Cephæ Ascaloniæ modo, quam aiunt semine perfecto in globosum caput colligi, mali figura, crescente verò caule extenuari, ac in longum produci, vt cauli quod satis sit alimenti velut de suo suppediret, nunc simplici, nunc velut è duabus in vnum coëuntibus iuncta, subnascens aliis perpetuò, & cohærentibus duabus, tribusue, ac interdum pluribus, quæ exhausta crassiore, ac maiore postea augetur: caule, si ortum eius à radice consideres, procerro, tereti, supernè rubenti: foliis Rumicis, aut Lilij, minoribus, binis, nonnunquam ternis, aliquando quinis, ad terram infractis, virentibus, sed maculis rubris conspersis, tam crebris, vt rubere magis quàm virere videantur: flore purpureo, Lilio rubro, quod Martagon vocant, figura simili, priusquàm pandatur, oblongo, dum referatus est, sex foliis constante, ad radicem candicantibus, reliqua sui parte ostro purpurascens, apicibus totidem quot sunt foliola, niueis, supernè velut atro capite conspicuis. Alterum, trifolium videlicet, inuentu rarius, priori omnino consimile, nisi quòd guttis & maculis lacteis folia variegantur, flos candicat. Vtrique semen oblongum siliquis includitur, nunc triangulis, nunc quadrangulis, copiosum. Inuenitur genus quoddam vnico, ac lato folio, sine flore, sine fructu. Marem appellant


SATYRIVM trifolium, seu
album, Dalechampij.

SATYRIVM Dalech. fortè
Pseudohermodactylus, Matth.



appellant Herbarij. Florent Aprili & Maio mensibus. Satyriorum historiæ id repugnare videtur, quòd rotunda & globosa radice non sint, qualem requirit Dioscorides. At si Satyria non sunt, tamen ob insignem & venustam figuram describenda fuerunt vulgato apud Herbarios seruatò nomine, quoad verius sit inuen-

SATYRIVM Erythronium, Matthioli.



tum, aut è veterum libris erutum. Ad excitandam venerem magnam vim habere ostendit humida & calida substantia cum acrimoniæ paululo iuncta. Pena eandem plantam Herbariis innotuisse scribit Satyrij Erythronij nomine, non multis ab hinc annis nulla desiderata nota præterquàm coloris, qui valde variat loci varietate, vt in Scilla, Cepis, & aliis Bulbaceis videre est. In Iura monte & collibus Taurinensibus Pado sesquileucam distans prouenire ait. Est Lobellio Satyrium & Dens caninus Belgarum, Hermodactylus & Pseudohermodactylus Italarum & Matthioli. Genuini verò Erythronij radix ex Matthiolo hîc depicta conspicitur à Cechino Martinello Pharmacopœo præstantissimo & Herbario peritissimo missa. Ea est mali effigie, cortice tenui & rufo, candida intus pulpa, sapore dulci, orîque non ingrato. Easdem radices Pena se Venetiis vidisse ait in Alberti Martinelli Officina, quas hîc Satyrij Erythronij radices esse iudicabat. Eæ sunt subrotundæ, magnæ, rugosò tuberosoq; cortice, ex fusco rubello, effigiem & magnitudinem

In Aduers.

Cyclamini vel potiùs Aristolochiæ rotundæ prægrandis affecutæ, carne intus alida, eduli, dulci. Idem Matthiolus postrema Commentariorum editione aliud Satyrium primum pinxit, nulla adiecta descriptione. Satyrii trifolij radix, auctore Dioscoride, bibitur in vino nigro austero ad opisthotonum. Ferunt etiam hanc impetum ad venerem excitare. Erythronij radicem, si manu omnino teneatur, venerem stimulare produunt, multò magis si bibatur in vino. Idem planè de Erythronio Plinius tradit. Quibus addit arietibus quoque & hircis segnioribus in potu dari. Et à Sarmatis, equis ob assiduum laborem pigrioribus in coitum, quod vitium procedamum vocant. Et Galenus Satyrium, aut Triphyllum, inquit, humidum & calidum temperatura est. Quamobrem gustu quoque apparet dulce. Attamen recrementitiam & flatuosam humiditatem possidet: quocirca ad venerem concitat. Hæc verò & herbæ ipsius radix præstare potest. Porro, vt quidam aiunt, ex vino nigro austero potum sanat opisthotonum. Hæc de veterum

SATYRIUM primum,
Matthioli.



SATYRIUM Basilicum
maius, Dodon.



Dodon. de
flor. c. 62.

Satyrii. Recentiorum Satyrium Basilicum maius, quod plerique marem appellant, folia habet oblonga, lata & lævia, Lilij foliis minora, nullis aut omnino vix apparentibus maculis resperfa: caules pedales, vel altiores, non absque adnatis foliis: flores in summo spicatos, colore dilutè purpureos, exiguis punctis saturatè purpuræ resperfos: forma florum Testiculi morionis maris, nisi quòd ipsis crista desit, sub quibus singula acuminata nascuntur foliola: radices sunt veluti geminæ palmæ, singulæ in quaternos digitos distributæ, quarum vna flaccidior & quasi fungosa, altera vegeta, ac solida, paucis ab annexu exeuntibus fibris. Alterum maius genus, quod fœminam vocant, priore tamen minus, folia eiusdem formæ promit, sed minora, & multis nigris maculis consperfa: flores Cucullo similes, cristatos & hiantes, vti Testiculi morionis maris, colore nunc candidos, al.às in purpura vel rubentes, vel dilutè ad cæruleum inclinantes, semper magis purpureis ornatos, ac variegatos: radices alterius similes. Minus genus foliis est angustis, &

vt Matth

SERAPIAS *fœmina pratensis, siue*
Palma Christi: Satyrion basilicum
alterum, Dodon.



PALMA Christi minor, Matth.
Satyrion Basilicum minus,
Dodonæi.



Pena, tum quia succulenta minùs sicciorque est, & deterget intrò forisq̃ue vlceribus adinota, tum etiam quòd melancholicis, quartanariis, epilepticis, neruorum

vt Matthiolus ait, Croci, caule dodrâ tali, iunceo læu que, in cuius cacumine flus emicat purpureus, Amarâchi æmulus, qui recens odorẽ quàm suauissimũ reddit: radicibus aliorum similibus, sed quæ magnitudine ipsis cedant. Nascentur Satyria hæc locis maxime humetibus, palustribus in pratis & siluis. Florent Maio & Iunio. Horũ duo reperiri genera in Ananiæ vallismontibus Matthiolus ait. Sunt qui velint Buzeidẽ siue Buzidan Arabum esse. Sed scribit Auicenna Buzeidem esse medicinam ligneam Indam, in qua est virtus similis virtuti Been. Et Serapio, Buzeiden, inquit, est species Satyrionis. Et Buzeiden sunt radices duræ, albæ, similes Beh in albo. Et est medicina Indiæ, qua nos parum vtimur. Satyrj autem huiusce radices nihil minùs quàm ligneæ sunt, nec ex India petuntur. Matthiolus Satyrium Basilicum siue Palmam hanc Christi, Auicennæ digitos citrinos esse vult, de quibus hæc scribit. Afahafra siue digiti citrini quid est? Eius figura est sicut vola manus commixta ex citrinitate & albedine: & est dura, in qua est parum dulcedinis: & ex ea est citrina cum puluerulentia absque albedine. Et Rhasis digitos hos croceos, vt exemplaria habent, appellat, & esse gummi seu venam tinctorum ait. At Satyrj Basilici radices duræ non sunt, neque croceæ, neque ad tingendum viles. Quare id à digitis citrinis Auicennæ & Rhasis perspicue differre videtur. Satyrj Basilici radices Orcheon radices sapore & gustu referunt: quare & facultatibus similes existimantur. Nicolaus Nicolaus Florentinus capere de quartanæ curatione viũ habere ait & per superiorem & per inferiorem ventrem purgandi, & aduersus quartanas febres inueteratas, post purgationes radices partem pollicis longitudine, tusam cum vino ante accessionem vtiliter exhiberi, hocque remedio ter sumpto Biliotum quendam post quadraginta quatuor aut quadragintaquinque accessiones, à febre quartana fuisse lib. ratum. Matthiolus Fuchsum reprehendit, quòd Palmam Christi Satyriorum generibus accensuerit, cum in generibus Testiculorum canis potiùs numeranda fuerit. At Fuchsum Dodonæus & alij multi Herbarij secuti sunt, eam Satyrium Basilicum nuncupantes, vt diximus. Triorchin Serapiada Aeginetæ esse Palmam Christi alijs opinabatur

Locus.

Lib. 2. c. 98.

Cap. 2. co. simpl.

Li. 2. c. 207.

Lib. vet. c. 2. n.

Vires & Temper.

In Aduers.

offarctu & pituitosa saburra oppressis miram præstet opem, fluxum dysentericum sistat, quot qualésque facultates Palmæ Christi recentiores vindicant, dignandas sanè Ægyptiis venerandæ Serapiadis Deæ augusto cognomine: alioqui nihil attinebat à cæteris secreuisse, & Serapiadas nuncupasse. Rationibus hæc fauebat ex lectione coniectura: nam vbi *πολύχρυσον τῆς ρίζης*, id est, multi vsus radicem Dioscorides habet, legendum fortasse *πολύχρυσον* multifidam radicem, & fortè vtrunque, id est, multifidam & multi vsus radicem innuebat. Et mox inferiùs, vbi Dioscorides, *ρίζα δὲ ὕππεσι ὀρχιδόλοις ὁμοία*, id est, radix subest pusillis testiculis similis, legebat Pena multifida leuiore metathesi multò quàm in superiore capite, vbi pro oleo substituit Dodonæus Scillam teneram Pancratium, vti dictum est à nobis.

COLCHICVM EPHEMERVM. CAP. XIII.

Lib 4.c.79.

Nomina



DIOSCORIDES *κολχικὸν* à Græcis etiam *ἐφήμερον*, & *βολβὸν ἄγριον* dici auctor est. Latine Colchicum, Ephemerum, & Bulbum agrestem, & strangulatorium: Colchicum, à Colchide veneni ferace, in qua nascitur. Ephemerum, quoniam sumptum vno die interficiat, Gallis *Tue-chien* & *Mort-aux-chiens*, Germanis *Teitlofen*, Italis *Zaffarano saluatico* Item aliud *ἐφήμερον* seu *ἱερὸν ἀγρίαν*, id est, Ephemerum seu Irim siluestrem, quod lethale nō est: sic nuncupatum, quod breui vna & altera die florem amittat. Idem Galenus habet. Ephemerū, non illud lethale ac deleterium, sed alterum, quod Irim agrestem cognominant. Et hos secutus Aegineta, Ephemerum, inquit de venenis agens, quod nonnulli Colchicum, quod in Colchide nascatur, vocant aut Bulbum agrestem. Et alio in loco. Ephemerum, nō deleterium, sed quod Irim agrestem dicunt. Et Aëtius. Qui Ephemerum, quod aliqui Colchicum, aut Bulbum siluestrem appellant, &c. Est igitur Ephemerum duplex, lethale quod Colchicum, & non lethale, quod Ephemerū non lethale nominatur. De Colchico priore loco tractat Dioscorides, de altero proximè sequenti capite. Colchicum, vti ille describit, Autumni exitu florem edit subcandidum, crocino similem: post florem folia Bulbo similia, pinguiora tamen: caulem palmi altitudine, fructum ferentem rufum: radicem quæ corticem habet in nigro rufescentem, quo nudata, candida, tenera, succi plena & dulcis inuenitur. Habet bulbos eius in medio rimam, vnde flos erumpit. Plurimum in Messenia & Colchis nascitur. Ephemerum nō lethale caulem & folia Liliō similia habet, tenuiora tamen: flores candidos amarosque, fructum mollem: radicem vnam digitali crassitudine, longam, adstringentem, odoratam. Nascitur in siluis & vmbrosis locis. Plinius, Ephemerum, inquit, folia habet Lilij, sed minora: caulem parem, florem cæruleum, semen superuacuum: radicem vnā digitali crassitudine, dentibus præcipuam concisam in aceto, decoctamque, vt tepido colluantur. Et ipsa etiam radix mobiles sistit. Causis & exesibus imponitur. Hæc Plinius. Colchicū Ephemerum aliud non est, Herbariorū iudicio, quàm vulgarissimum plebi præterse Crocum & siluestre vbique vocatum, vti & in Croco siluestri diximus. Nam floret vt Crocus Autumno, flore perquam simili, concolore, dilutius tamē cæruleo, staminibus pallidè luteis, iamdiu antea primo Vere ortum, & Aestate amittit folia, quæ porraceis latiora, Pancratij sunt æqualia, vel Bulbi, pinguiora, terna, aut quaterna, virentia, nitentia ab radice: caule sesqui palmari: bulbosa, semirotunda: radice altera parte compressa Castanæ figura, aut Anacardi, foris tunica rufescente ex fusco, ab ima latioreq; basi ad apicem canaliculum imprimi prima caulis germinatio, intus tota alba, fungosa, mucida, virosa, gustu non ingrata. Est quibusdam Narcissus *purpureus strij* & Virgilij, apud Theophrastum

Lib.6. sim.

Lib.5.

Lib.7.

Genera.

Lib.4.c.79.

Cap 80.

Forma.

Locus.

Diosc. ibi.

Lib.25.c.13.



stum florens Autumno, post Arcturū circa æquinoctium, perperam Moly Trago lib. 2. cap. 76. quia cius flos minimè lacteus. Est & Syriacum siue Alexandrinum Colchicum, cui bulbosa radix, vt describit Pena. Id non parum à nostrate differt, tamen si Dioscorides delineationem non minùs bene referat: non enim ex radice

COLCHICVM Anglicum,
 Lobelij.



fulco, siue rima quæ est à latere, caulem emittit, sed caulis erumpens mediū findit bulbū, quasiq; geminum Colchici bulbū ab imo coagmentatum, caulemque vtrinque amplexatum ostendit, nigriorque nostrate euadit intus prioris simili, forisque, alioqui è cepacea fungosaque concretionem vti & totius figura. Istis adiungunt Lobellius & Pena aliud Herbarijs indictū, quod quia Anglia copiosissimum fundit, nec alibi facile reperias, Anglicum candido flore nuncupant. Perpulchra est planta, lacteis floribus Ornithogali vel Asphodeli, maioribus, Croci montani siluestris paribus: caulem ornant sesquipalmarem radix & folia, alioqui pratenfis vulgaris sunt, foris fusca, intus candida. Londini hortis mersæ radices Hiemem ferunt, Vere emergūt, non secus atque in collibus & montosis prope Bristolium & in agro Somerseti. Clusius aliud Colchicum montanum exhibuit, quod terna quaternave folia fundit, digitum longa, per terram strata, Hyacinthi non scripti fere æmula, sed saturatiùs virentia & splendentia, gustūque acida, quæ vbi flaccescere incipiunt, colorem subrubrum

Lib. 2. stir.
 Hisp. c. 6.

subrubrum contrahunt. Flos sine foliis primùm exilit, & sex oblongis purpureisq; foliis, & in medio staminibus totidem constat: eum folia statim (contrà quàm in alio Colchico) subsequuntur & quodammodò protrudunt, totàmque Hiemem perdurant in mensem vsque Maium aut Iunium. Radix est bulbosa, vnica, non magna, multis subruis & nigricantibus tunicis amicta, intus solida, candida, dulcisque cum quadà adstrictione, sede longiuscula, quæ adnatis in lateribus propagatur. In collibus Salmanticæ vicinis lapidoso admodum solo provenire ait Clusius, seque mense Maio collegisse proferentem caulem dodrantalē, firmum, & in fastigio triangularem siliquam: semine ex rubro nigrescente, laui, exiguo, subrotundo, amariuscule plenum. Illic vulgò *Merenderas* vocari. Idem scribit se observasse in pratis Salmantinis Colchicum nostrò vulgari simile, sed minus, atque eius plātas nonnullas flore omnino lacteo: sed in eo genere folia antè primum Ver emergere non solere, quemadmodum nec in Anglico; quod hîc ex Clusio pictum videtis. Colchici nostri radix quovis anni tempore eruta, à quibusdam pharmacopœis pro *Hermodactylo* habetur, etiamsi ficcata, flaccida, vieta rugosaque, tangenti partim euanida, partim fungosa sit. Id quod acerrimè Matthiolus reprehendit, & eius erroris causam Serapioni adscribit, qui Surungen, id est, *Hermodactylum*, vt ipsemet interpretatur, iisdem planè verbis describit, quibus Dioscorides Colchicum. Quod autem magno & pernicioso errore has duas plantas confuderit, confirmat ex Paulo Aegi. qui lib. 7. de Ephemero & *Hermodactylis* seorsum tanquam de diuersis tractauit, ac primùm de *Hermodactylo*. *Hermodactyli* radix, inquit, & per se, & ipsius decoctum vim habet purgandi. Priuatim arthriticis, cum humores defluunt, exhibetur. Verùm stomacho valde aduersatur. Paulò post de Ephemeris ita scribit. Ephemerum nō illud venenatum, sed quod Iris silvestris nominatur, mixtæ facultatis est, & repellentis, & discutientis per halitum. Ex quibus perspicuum est *Hermodactylum* ab Ephemero longè diuersum esse, & hac in re Serapionem vehementer errasse, & Mauritanos omnes, ac eius sequaces medicos, qui Colchicum *Hermodactyli* vice catapotis, & aliis medicamentis immiscerent. Quare Matthiolus genuinum *Hermodactylum* esse credit, quem ex planta expressit quam Augerius de Busbeke Constantinopoli allatam donauit: vbi etiam *Hermodactylus* appellatur, & radices

COLCHICVM montanum
cum flore, Clusij.




Cap. 194.
Simpl.

COLCHICVM montanum
minus, Clusij.



HERMODACTYLVS

verus, Matthioli.PSEUDOHERMODACTYLVS, *Matth.*

non venenatos Officinarum appellat. Se Venetiis habuisse ait munere Alberti Martinelli Alepo Syriæ euulsas à fratre Cequino Colchici Anguillare plantas, pronis palmitibus, septenis, denis & duodenis foliis Colchici striatis, mucronatis, reflexis, in angustum fastigiatis, imbricatis & lateratim stipatis, è quibus in pu-

lices digiti speciem referunt, adèò vt vnguim quoque figura conspicua sit. Folia fert prælonga binum dodratum longitudine, & fortasse longiora, Porri aut Hastulæ regię similia: sed lōgè angustiora, breuioræque sunt quæ circa radicem diffunduntur. Radices habet quatuor ex vna eadēq; basi emergētes, digitorum figura, colore ex pallido rufescente, albis in summitate vnguib; nullis circa sese fibris: nam quæ spectantur fibræ, circa radicem originem superiore parte capillacæ sese fundunt. Caulis è medio profilit tenuis, herbacea tunica circumuestitus, in cuius summitate oblōgum prominet capitulum (florem non vidit) piri figura, Colchici ferè modo, minus tamen. Differt ab hac planta ea quam quidam in Italia Hermodactylum esse arbitrantur, Matth. Pseudohermodactylum appellat. Sed Hermodactylū priorē, quē verū putat, pleriq; respiciūt, & Iridis generibus adscribunt, Iridē tuberosam appellantes, de qua capite de Iride locuti sumus. Præterea Colchici nostri radix medicamentis immixta, pernitiōsa nō est. Neq; propterea dicendū, id, quod in Colchide plurimū nascēbatur auctore Dioscoride, aliud à nostro esse: sed illic lethali interimēdi facultate ceteris omnibus antecelluisse, tum q; succo illic esset magis concocto, tum quod à solo cœloque vim hanc nancisceretur. Sic fungi quibusdam locis exitiosis proueniunt, & nisi iisdem quibus Colchicum remediis vincantur, interimunt: alibi innoxij passim esantur. Sic Taxus Narbonensis & Hispanica deleteria sola vmbra, vt prodidit antiquitas: in Anglia & alibi minimè malefica. Cicuta & aliis idē vsuuenit. Sed nostri Colchici radices etiam si pro Hermodactylis à quibusdam vsurpentur, sciendum tamen ab Officinarum Hermodactylis plurimum differre. Hi enim peregrini sunt, nō pernitiōsi, vt multis seculis plurimus vsus edocuit. Hos Hermodactylos Officinarum, Tralliani & Pauli, esse Colchicum, seu Ephemerum non venenatum Dioscoridis Pena opinatur, & leuiore aliqua nota, non specie differre, vel si eadem non sint saltem admodum affinia esse. Idem censuit Lobellius, ex quo Colchicum Illyricum, siue Græcum nō venenatum Anguillare, pictum exhibemus. Hermodactylos

fillo

*COLCHICVM Illyricum siue
Gracum non venenatum,
Lobellij.*



Cap 88 hi-
stor.

*EPHEMERVM non lethale,
Matthioli.*



Lib. 3. c. 79.

Lib. 6. sim.

sillo pediculo flores exoriuntur lutei, pallentes, terni, vel quaterni, Colchici parui minores, staminibus ite concoloribus. Siliqua non dissimilis. Radix foris cepe cōcreione, intus euanida & vieta, quia in caule, folia, flores, fructū & semen vis tota exhausta fuerat. Anguillaræ & Cequino assentiendū putat, quibus hanc plantā acceptam refert. Colchicis accenset Lobellius plātam quam capite de Narcissis ex Clusio descripsimus nomine Narcissi Autumnalis quorundā, Lobellij Colchicū luteum, fortasse Ephemero non venenato Dioscoridis cōgener, Narcissus Autūnalis Marcelli Vergilij Mutono, flore luteo pallente, cuius Narcissi meminimus cū de quarto Narcisso ageremus. Certè radice, caule, folio, flore, ortu, tota deniq; planta propius ad Colchicū accedit. Matthiolus longè aliud Ephemerum nō lethale depinxit, q; in Ananiēsis motibus tam in pratis quā in siluis copiose nascitur, ab indigenis vulgò *Giglio matto*, hoc est, *Lilium stultum* nominatum: Ephemerū spurium Lobellius appellat. Folia habet *Lyfimachia* *Glasti* aut *Luteolæ* media, in sesquicubitalibus cauliculis densis, multisque alis concavis: flosculos candicantes, Verbasci nigri, quinario foliorum numero: semen pusillum in rotundis lini pericarpis oclusum: radicem multum fibratam Isatidis. Hæc Lobellius. Fuchsius plantam, vulgò *Lilium conualliū* nuncupatā, Ephemerum non lethale esse contendit. Colchici radicem comesam scribit Dioscorides fungorum modo strangulando enecare. Remedio esse quæcūq; contra fungos opem ferunt: bubulum etiam lac potum, adeo vt quoties hoc adfuerit, nullum prætereā quærendum præsidium sit. Ephemerum non lethale radix dētium doloribus remedio est, si decocto eius colluantur. folia in vino decocta & illita, œdemata & tubercula, quæ nihil adhuc puris contraxerunt, discutunt. Vbi pro, *μίσκω ὑγρὸν ἐχόντα*, legēdum putat Fuchsius, *μίσκω ξηρὸν ἐχόντα*, vt ex Galeno liquet sic scribete. Ephemerum nō lethale radicem habet adstringentem, & boni suauisque odoris. Ex quibus perspicuum est facultatis temperaturæq; esse mista, nempe repellentis, & habitu euaporantis. Testificatur opera, quæ particulatim edit. Siquidem non inefficaciter radix eius in dentiū

doloribus colluitur. Tum phymatum augmento & statui folia cōueniunt. Oportet autem ea in vino decocta prius quā pus moueas illinere. Plinius de Colchico hæc solum tradit, priuatim lac bubulum iis qui Colchicum biberunt vtile esse. Et Li. 26. c. 12. folia Ephemerum tuberibus atque tumoribus illinuntur, quæ etiam dum discuti possunt.

Lib. 18. c. 9.

Li. 26. c. 12.

possunt. Ferunt Turcas Colchici floribus uti cum inebriari volūt: eos enim vino macerant, quo epoto adeo stupidi redduntur, ut in ecstasim abeant. Hermodactylus, auctore Mesuē, calidus est & siccus ordinis secundi initio, cum humiditate tamen excrementitia, flatulenta, nauseabunda qua vetriculo nocet, præsertim quando in eum ex partibus aliis excrementa cōfluunt. Pituitam crassam maximè à iunctoris trahit: ob id podagræ, & aliis arthritidis differentiis confert, non sumptus modò, sed etiam cataplasmate admotus, præsertim cum vitellis ouorum, & farina hordei, vel mica panis. Impinguat, sperma auget, vlceribus confert, quia terget sordem eorum, & carnem in his putrem consumit. Cuminum, Zingiber, Piper longum, Libysticū, Menthastrum, mastiche mixta, Hermodac. prohibent, ne suo humore excrementitio & flatulento lædat ventriculum, nève flatus crassos & nauseabundos in eo excitet, aut multa in ipso excrementa colligat. Si verò Hermodactylus cū pauco Zingibere, & succo Raphani, vel Scilla assata, aut Scilla succo & Zingibere, & pauca spica in trochiscos fingatur, purgat celerius & plenius (per se enim tardè & imbecilliter vacuat.) Myrobalani quoque roborando stomachum Hermodactylos citò deturbant, & humorum in ventriculū affluxum prohibent. Datur ab aureo vno ad aureo duos. Ad annos tres seruatur.

S C I L L A.

CAP. XV.

SEPACEO etiam generi tantopere similis est σκίλλα Græcis dicta, *Nomina* Latinis similiter Scilla, ut multi eam Cepam marinam vocent, & Varro Squillam, cuius exemplo omnibus Officinis sic nominatur, Arabibus *Haspel, Hausel, Aschil* seu *Alachil*, Italis *Silla*, Germanis *Meerzumbel*, Gallis *Scipoule, Oignon marin*, Hispanis *Cebolla Albatrana*. Quia autem inter hanc & marinum testaceum piscem, à tunicata squamarum cōpactili serie Squillam vocatum, tanta similitudo intercessit, hæc putatur sic dicta, inquit Pena. *In Aduers.* Potuit etiam ἀπὸ τῆς σκίλλης, id est, ab ariditate dicta esse, quòd in fabuletis maritimis Sole torridis oriatur, cuiusmodi sunt in Hispania, & prope aridæ Lusitaniæ resqua maritima. Plinius, Scillarum in medicina, inquit, alba est quæ masculus, *Lib. 20. c. 9.* fœmina nigra. Quæ candidissima fuerit, vtilissima erit. Et, Nobilissima est Scilla, *Genera.* quanquam medicamini nata, acetoque exacuendo. Nec vlli amplitudo maior, sicut nec vis asperior. Duo genera medica: masculus albis foliis, fœmina nigris. Et tertium genus est cibus gratum: Epimenidium vocatur, angustius folio, ac minus aspero. Quæ ex Theophrasto transtulit Plinius. *Lib. 7. hist. cap. 11.* ἐδωδοί μοι μὲν γὰρ οὐ μόνον βολεῖ, καὶ ὅμοια τούτοις, ἀλλὰ καὶ ἡ τῆς ἀσφοδελῆος ῥίζα, καὶ ἡ τῆς σκίλλης, πλὴν ἡ πάσης, ἀλλὰ τῆς ἐπιμενιδίης χαλκωμένης, ἢ ἀπὸ τῆς χρύσεως ἔχει τὴν ποροσηγορίαν. αὐτὴ δὲ στενοφυλλέστερα τε καὶ λεπτότερα τῶν λοιπῶν ἐστίν. Id est, Edules non solum Bulbi & his similia, sed etiam Asphodeli radix & Scillæ, non omnis quidem, sed eius quæ Epimenidia vocatur, quæ ab vsu nomen accepit. Hæc angustiore est folio, læuioreq; quàm ceteræ. Scillæ differentias duas ex colore duntaxat inter Hispanicas tam multas animaduertit Pena: quarum extimac tunicæ vni rubent, ut Cepis oblongis, alteri al bent, magnitudine pares. Vtrius maxima pomū Assyrium nō superat, Cepæ modo multipliciter tunicata, corticosaq;. Vniuersa folii carina vel dorsum palmum ferè lata, pedē alta, crassitudine minori quàm Aloës, crebro è bulbo pullulant squamatum cōpacta: caulis sesquicubitalis, gracilis, flores stellatos Ornithogali habet similes, sed minores, in spicam postremò deficiens. Matthiolus ait se cū olim credidisset Scillas, quibus in Italia tum medici tum seplasiarij vtuntur vulgò, veras esse Scillas, mutata tandem sententia eas pro legitimo Pancratio habere; Scillas verò geminas eas esse, quæ illis duplo maiores in Hispaniæ maritimis proueniunt,

SCILLA, *Marthioli.*SCILLA *Hispanica sine flore, Clu.*

foliis Aloë æmulâtibus, sed minùs crassis, cùm illæ folia ferant nō Aloë, sed Lilio proxima, inter quæ non parua est differentia. At perperam, inquit Pena, pro Pancratiū vulgarem Scillā, quæ vera est, accipit: quam non nisi vietam, aut adolefcentem, cuiusmodi Venetiis vaneunt, viderat. Et foliorum gracilitas sanè nō aliam speciẽ constituit Scillā, sed tantum contingit habitiora & maiora adolefcere folia mutatione celi, soli, & cultu. Sic Cepis euenit angusto interiecto tractu, sic in foliis Aloës, & aliis multis obseruatur. His verò Bulbis flores, folia, omnia prorsū similia, aliquantò duntaxat graciliora, vt bulbaeis multis præpropere enatis, & aliò transplantatis euenit. In contignatione suspensæ, dum sabulo merguntur aut feruantur, languidiora promunt folia, & succo seu pabulo cōsuetō defraudantur, exilioraque sunt. Katio par in Scillis pusillis, quas Pancratiū Marthiolus adstruit. Sed ex Clusio legitimam Scillæ iconē hīc proponimus, qui eam & primū emergentem, & florētem seminē quæ onustam plerisque Hispaniæ & Lusitaniæ locis se eruisse ait. Est verò Scillæ, inquit, caulis plerunque cubitalis aut maior, rectus, nudus, absque foliis, floribus plurimis candidis & stellatis ornatus, Asphodeli minoribus, Ornithogalo maiori similibus, qui ab imis florere (vti rectissimè scripsit Theophrastus) quæ admodum Asphodelus incipit. His succedūt siliquæ triangulares, & veluti compressæ, in quibus semen nigrum, planum & paleaceum. Folia demum emergunt quinque aut sex lata, ampla, viridia admodum, densa, humi extensa, & quodammodo carinata. Radix crassa, alba, multipliciter tunicata, lento quodā humore plena, multis fibris crassiusculis capillata. Copiose nascitur supra Olysiponem, & plerisque aliis Lusitaniæ

& Hispaniæ locis. Floret Augusto & Septembri, semen Octobri & Nouembri maturefcit. Folia maturo iam semine, & caule arido emergunt Nouembri & Decembri. De Scillæ viribus & præparatione satis prolixè Dioscorides. Vim acrem & feruentem habet. Assata verò multiplicis est vsus. Pasta aut luto oblita in clibanum coniecitur, aut carbonibus obruitur, donec circumlita pasta sufficenter tosta fuerit. Qua amota, si non mollescat, altera pasta aut luto circumliniunt, eademq; quæ priùs fuit. Nam quæ ita non assatur, noxia magis est, præsertim interaneis data. Torretur item in olla indito operculo, & in clibanum coniecta. Sumitur ex ea abiectis extimis partibus, quod maximè medium est, quod concisum effusa priore aqua coquitur, nouaque superinfusa vsquedum nec amaritudinem, neque acrimoniam habeat aqua. Siccatur autem in vmbra dissecta, & lino traiecta, ita vt ne talleolæ inuicem se contingant. Sic igitur secta, ad oleum, vinum, acetumq; scilliticum vtimur. Ad rimas verò pedum crudæ Scillæ interanea pars in oleo feruesceta,

aut

Lib. 2. cap.

167.

Vires &

Temper.

SCILLA Hispanica cum
flore, Clusij.

aut cum resina liquefacta imponitur. Decocta in aceto demorsis à vipera cataplasma est. Asinæ eiusdem pars vna, tosti salis partibus octo subigitur, datúrque ieiunis cochlearis vnus duorumve pondere ad emolliendam aluum. Additur potionibus & odoratis medicaminibus, & quibus vrinam ciere voluerimus, hydropicisq; & stomachicis, quibus innatant cibi, & morbo regio, torminibus, in vetere tussi, asthmaticis, cruenta reiciendis (ἀναφορεχών. Hic Dioscorides, & Medici alij ἀναφορεχός appellant, qui sanguinem ex inferioribus partibus sursum educunt, & per os reiciunt.) Trium verò obolorum pondere in delinctu ex melle sumptis satis est. Coquitur eadem cum melle, sumiturq; in cibo ad eadem, maximè coctionem adiuuans. Strigmēticia per aluum ducit. Coctu & simili modo sumpta idem potest. Cauendus Scillæ vsus iis quibus interaneum aliquod exulceratum fuerit. Prodest verrucis & perniciibus assam inungere. Semē eius tritum cum caricis, aut melle exceptum, si manditur, aluum emollit. Pro foribus domus suspensa tota amuletum est. De iisdem Plinius confusè tractauit his verbis. Scillæ aridis tunicis directis, quod reliquum è viuo est confectum suspenditur lino modicis interuallis. Postea arida frusta in cadum aceti quàm asperrimi pendentia immerguntur, ita ne vlla parte vas contingant. Hoc fit ante solstitium diebus 48. Gypso deinde oblitus cadus ponitur sub regulis totius diei solem accipientibus. Post eum numerum dierum tollitur vas, Scilla eximitur, acetum transfunditur. Hoc clariorem oculorum aciem facit. Salutare est stomachi laterumque doloribus, parum sumptum binis diebus. Sed tanta vis est, vt auidius haustum, extinctæ animæ momento aliquo speciem præbeat. Prodest & gingiuis & dentibus, vel per se commanducata. Tineas & reliqua ventris animalia pellit ex aceto & melle sumpta. Lingua quoq; recens subiecta, præstat ne hydropici sitim sentiant. Coquitur plurimis modis: in olla quæ coniiciatur in clibanum aut furnum, vel adipe aut luto illita, aut frustatim in patinis. Et cruda siccatur, deinde conciditur, coquiturque in aceto, tum serpentium ictibus imponitur. Tosta quoq; purgatur, & medium eius iterum in aqua coquitur. Vfus sic coctæ ad hydropicos. Ad vrinam ciendam tribus obolis cum melle & aceto potæ. Item ad spleneticos & stomachicos, si non sentiant vlcer, quibus innatet cibus: Ad tormina, regios morbos, tussim veterem cum suspirio. Discutit & foliis strumas quadrinis diebus soluta, surfures capitis, & vlcerata manantia illita ex oleo cocta. Coquitur & in melle cibi gratia, maximè vti coctionem facias. Sic & interiora purgat. Rimas pedum sanat in oleo cocta, & mista resinæ. Semen eius lumborum dolori ex melle imponitur. Pythagoras Scillam in limine quoque ianux suspensam malorum medicamentorum introitum pellere tradit. Hæc Plinius. In quibus Marcellus Vergilius & Cornarius erroris eum insinulat, quòd dixerit adipe aut luto illita, pro eo quod est apud Dioscoridem *συντρίδι* ἢ *συντρίδι* *συντρίδι*, id est, farina aqua subacta, quam pastam vocamus, aut luto oblinitur. *συντρίδι* enim & *συντρίδι* hic non adipem, nec multis aliis locis apud medicos significat, sed pastam aut fermentum. Dioscorides de Stibio, *ἀπὸ τῆς συντρίδι* *συντρίδι*, id est, Lib. 5.

Li. 20. c. 10.

- assatur farina circumlitum. Vbi tamen etiam impegit Plinius, qui sic vertit. Quidam non fimo vtuntur coquentes, sed adipe. Idem Dioscorides de Erisymo. ἐνδιε-
θεν εἰς ὀθόνιον, καὶ ἐπὶ τοῦ ἐν τῷ ἐλάσῳ περιπλασθέντος. Hoc est, linteo illigatum, & fermento
oblito assatum. Et de fici vtriusq; succo. καὶ μυρμηκίαν ἀμείψασθαι περιπλασθέντος τῆς
Lib. 3. c. 38. ἐν κύκλῳ σφοδρῶς. Id est, fermento vel pasta oblita in circumfusa carne. Idem Paulus
ᾧ οὗ ἐν τῷ ἐλάσῳ ἐπιημένῃ τὴν λέκυστον. Hoc est, Oui in fermento assati vitellum. At sicut
his in locis atque aliis τῶν pro pasta aut fermento rectè intelligitur, ita multis aliis
Lib. 7. hist. pro adipe vsurpatur. Porro quod ex Pythagora refert, idem prodidit Theophras-
cap. 12. tus, λέγειται καὶ πρὸ τῶν θυρῶν τῆς εἰσοδῆς φυλάττειν, ἀλεξιτήλον εἶναι τῆς ἐπιπερομέ-
νης ἀνελήσεως. Id est, Traditur & ante portas satam remedio esse contra veneficio-
rum noxam. Scilla, inquit Galenus, admodum incidentem facultatem habet, non
tamen admodum calidam. Sed secundum hoc eam quispiam secundi ordinis cen-
seat excalfacientium. Præstat autem aut assam aut elixam sumere: sic enim virium
eius vehementia exoluitur. Vnum de Scilla volumen condidit Pythagoras philo-
sophus auctore Plinio, colligēs medicas eius vires. Idem Plinius Scillam ter flore-
re refert, tria tempora sationum ostendentem. Quod ex Theophrasto exscriptum
esse capite de Croco declarauimus. Vbi non τρίς αὖθις Scillam ait, id est, ter flore-
re, quemadmodum Plinius scripsit, sed ποτὶς καὶ τρίς αὖθις. Quibus verbis non
significatur Scillam tribus diuersis anni tēporibus, exempli gratia, Autumno, Ve-
re, Aestate florē edere, sed inter bulbosas plantas Scillam & Asphodelum quā-
diutissimè florere, ob alimentum copiam & vbertatē, quod Theophrastus τὴν αὐθι-
σιν καὶ μέρος ποιεῖν, id est, particulatim florem promere dicit, (In vulgatis tamen co-
dicibus mendosè legitur τὴν ἀθανασιν, pro τὴν αὐθισιν) vt ab ima caulis parte primū
Lib. 7. hist. incipiat. Quare Augusti mensis principio Scillæ caulis assurgit, seorsum eam ob
cap. 12. causam pictus, quod sapius est obseruatum, cubitalis aut etiam procerior, densissi-
mè floribus stipatus, qui primū diducuntur, ac interim dum aperti vigent, me-
dij turgescunt, supremi gliscunt duntaxat, quæ πρῶτη αὐθις est, primus ad flore-
scendum impetus. Exactis aliquot diebus flores qui primi reclusi fuerunt, dilaban-
tur, medij sese promunt, supremi tantū intumescunt, quæ est secūda αὐθις. Po-
stremò defluentibus mediis supremi sese explicant, quæ est tertia αὐθις. Hic flo-
rescendi ter repetitus impetus, terrā quoque ter subigi oportere denuntiat, prius-
quā fruges serantur. Flaccido verò & emortuo caule folia nascuntur circa Ia-
nuarij medium vel finem, ob id bulbus cum foliis depictus sine caule, quæ po-
stea Aestatis squaloribus exarescunt. Quod de Scilla illi prodidere, Vergilius ex
Arato idem de Lentisco literis mandauit.

PANCRA TIVM.

CAP. XVI.

Nomina

Lib. 2. cap.
163.

Forma.

Li. 27. c. 12.



RAECI παγκράτιον, sicut & Latini Pancratium, à vincendis & profligandis morbis omnibus nominasse videtur. Scillæ species est, propterea Scillā nominant, vt ait Dioscorides, vt Plinius Scillam pusillam. Pancratiū, vt describit Dioscorides, radix est Bulbo magno similis, subrufo colore aut subpurpureo, gustu amaro ac feruēte. Folia habet Lilio similia, sed longiora. Plinius. Pancratiū aliqui Scillam pusillā appellare malunt, foliis Lilij albi, longioribus crassioribusq; radice Bulbi magni, colore rufo. Dalechampius sic depingendū curauit, & descripsit his ferè verbis. Nascitur vbiuis in litore maris, radice Bulbi magni, cortice subrufo vestita, infernè capillata Capē modo: foliis καλῶς, id est, Lilij albi, vt Plinius vertit, longioribus & crassioribus, quod idem addidit: caule pedali & nonnunquam proceriore, anguloso, summo fastigio in quinque foliola candicantia virgata, acuminata sese explicante, è quorum medio angulosa,

guleſc, breues & veluti comprſſæ eriguntur ſiliquæ pediculis ſubnixæ, ex quarum vertice flos albus emicat, oblongus, infernè arctus, ſupernè latus, ambitu ſupremo in radios velut cuſpidatim diuiſo, pallidis apicibus multis, ſtaminibúſque intus extantibus, flore delapſo ſemen in ſiliquis adoleſcit, & matureſcens grádēſcit. Floret menſe Iunio. Ex his perſpicuum eſt, Pancratium Scillam non eſſe, ſed ſpeciem *Tempus.*

PANCRA TI VM, Dalech.



PANCRA TI VM, Cluſij.



flore potiſſimum ab ea diſtātem. Pancratium iſtud Monſpelienſe Ciuſius Heme-
rocallidem Valentinam vocat, eóque nomine depinxit. Pancratium verò longè
aliud, quale hīc videtis expreſſum. Cūm autem de Scilla dixiſſet, ſubiecit. Pancratio
amplitudo maior eſt, extimæ tunicæ rubent, foliáque ampliōra & longiora. Na-
ſcitur copioſè in mediterraneis Hiſpaniæ, eſtque præſens venenū. Germinat cum
Scilla. Vires Scillæ & præparationem habet, vt tradit Dioſcorides, ac eodem pon-
dere in iſdem morbis exhibitur. Mitior autem huius vis eſt quàm Scillæ. Radicis
ſuccus cum erui farina in paſtillos cōformatus cum hydromelite ſpleneticis & hy-
dropicis vtiliter exhibitur. Horum quēdam omiſit Plinius, & alia addit his verbis.
Aluum ſoluit ſucco cum farina erui ſumpto: vlcera purgat. Hydropicis ſpleneri-
ciſq; cum melle datur. Alij decoquunt eam donec aqua dulcis fiat, eaq; effuſa ra-
dicem terentes digerunt in paſtillos Sole ſiccatoſ: & poſteà vtuntur ad capitis vl-
cera & cætera quæ repurganda ſunt. Item ad tuſſim, quārūm tribus digitis appre-
henderint in vino dantes, & ad lateris dolores, aut peripneumoniciſ ecligmate.
Propter iſchiada in vino bibendum, & propter tormina menſeſque ciendos. Ra-
dix Pancratij, inquit Galenus, Scillæ ſimilem guſtum reſert ac vires. Quare ea qui-
dam pro Scilla, ſi ea non adſit, vtuntur: efficit enim omnia in genere quidem ſi-
militer, ſed longè imbecilliūſ.

*Vires et
Temper.*

Li. 27. c. 12.

SISYRINCHION Dodonai.

CAP. XVII.

HEOPHRASTVS cum Bulbis multis *σιουσίνχιν* vel *σιουσίνχιν* nu-
merat, & poſt eum Plinius. *Ἰλιον ὃ τὸ σιουσίνχιν*, inquit ille, τὸ τῆς
ρίχης αὐξάνει τὸ κατὰ πρῶτον, ὃ καλεῖται *χέτιμωνα* (corrigē πρῶτον, καὶ *χέτι*
μωνα, vt legunt Plinius & Gaza.) *τὸ δὲ ἵπποσ υποφαίνοντο* (addit Plinius *ἵε*)

Lib. 7. hiſt.
cap. 13.

Lib. 19. c. 5. τοῦτο μὴ ταπεινὸν, τὸ δὲ ἀντὶ τὸ ἐδαμναι αὐξάνει. Quæ sic reddidit Plinius. Sisy-
 rinchium. In hoc mirum imas eius radices crescere Hieme, Verno autē cū appa-
 ruerit Viola, minui & contrahi, tum denique bulbum pinguescere. Sisy-
 rinchium
 De florib. istud arbitratur esse Dodonæus plantam hīc depictam, quam Hispani *Nozelhas*
 cap. 48. quasi nucas siue paruas nucas vocant, Bulbi esculenti genus, cui gemina est ra-
 dix, & in Hispaniis pāsīm editur: qualem radicem geminam & edulem Sisyri-
 chio veteres illi assignarunt. Lobellius Hyacinthum poeticum Hispanicum gemi-
 no gladioli reticulato bulbo appellat. Huic folia sunt graminis, bina aut terna,
 oblonga, & angusta: caulis rotundus, dodrantalis, in quo flosculi tres aut quatuor,
 pulchri, cærulei, verū fugaces, & paucis admodū horis vigentes, alternatim

*SISTRINCHIVM,**Dodonæi.**SISTRINCHIVM**minus, Clusij.*

prodeuntes, forma quodammodo florum Iridis, ex nouem videlicet foliolis com-
 positi, quorum tria deorsum inflexa pro fimbria maculam habent plurima parte
 luteam, alia tria sursum versus aliquantulum eriguntur, tria verò reliqua respon-
 dentia iis quæ Iridis florum fimbriam contegunt, proportionē huic flosculo ma-
 iora & tenuiora sunt, sursumque arrecta medium floris tenent, summa extremā-
 que parte diuisa: capitula inde succedunt oblonga, in quibus semen rotundum,
 paruum, vti Rapi: radix bulbosa, gemina, vno Bulbo alteri superposito, sicuti gla-
 dioli, sapore dulcis & edulis, quæ inuolucro quodam integitur reticulato, quod
 quidem maioribus spissius est, minoribus minus crassum. Duo etenim huius ge-
 nera esse videtur, magnitudine sola differentia. In Lusitania, & alibi apud Hispa-
 nos nascitur. Clusius idem Sisyrinchium alterum genus depinxit, superiori simi-
 le, in omnibus autem minus, & foliis gracilioribus, floreque longē odoratiore,
 Hispanis *Lirio*, nonnullis *Macuas* dicitur. Clusius etiam Sisyrinchium Theophras-
 ti esse arbitratur. Inuenitur in Valentino regno, sed in Murciano frequentis-
 simum.

Lib. 2. stir.
 Hispan. c. 10.

QUOD ὀρνιθόγαλον Græcis, Ornithogalum similiter Latinis dicitur, Plinio Ornithogale. A lacteo gallinarum candore Ornithogalum nomen accepisse videtur, inquit Ruellius, quòd flores intus lacteo colore niteant, nisi quis censeat ab oui candidi figura, quam radix præ se fert dictum: nam aucicularum oua radix imitatur, intus albißima. Ornithogalum, vt describit Dioscorides, cauliculus est tener, tenuis, subalbicans, ad duos dodrantes assurgens, supernè tres quatuorve habens propagines teneras, in quibus flores foris herbacei, aperti verò lactei coloris, inter quos capitulum Cachryos modo infectum, quod vnà cum pane coquitur velut Melanthium. Radix bulbosa, quæ & cruda & cocta editur. Idem delineauit Plinius his verbis. Ornithogale caule tenero, candido, semipedali, radice bulbosa, molli, tribus aut quatuor agnatis. Coquitur in pulte. Ruellius Ornithogalum esse ait, quod à rusticis in Sueßionum agro eruitur, rotunda radice, bulbaceam speciem præ se ferente, è cuius medio cauliculus exit tribus, aut quatuor adnatis appendicibus in cacumine: foliis in capillamenta quædam extenuatis: floribus exiguis, foris herbaceis, intus lacteo colore candicantibus, qui simul coaceruati velut paniculæ quædam compactili callo squamatim cohærentes in pilulam extuberant, nucamentum pineæ nucis representantem. Sueßionensis ager *Churles* vocat, pueris non incognitos, qui propter adstantes cum aratro terra proscinditur, aut in latiores porcas sulcatur, erutos vomere colligunt, multò castaneis suauiores in cibis, quibus & crudis, & in cineribus incoctis rura vescuntur, odore iucundissimo mirum in modum os commendante. Radix in orbem ferè collecta est, cortice pullo, candidissima intus carne pulpave perquam odorata. Vere vel Æstate cum fronde virent: Hyeme vel Autumno cum exarantur agri radicitus euelluntur. Diu seruari possunt, & vbi annonæ premit inopia, plebis rusticæ famè & ieiunia castanearum more satiant.

Nomina

Li. I. ca. 20.

Li. 2. c. 138.

Forma.

Li. 19. c. 17.

ORNITHOGALVM

I. Matthioli.




Nec aliud humo genitum promptius in cibum cedit, cum frugum penuria gliscit. Mirè suisbus expetitur, qui rostro scrobiculos excauant, & horum capti dulcedine, gregatim ad hos eliciendos, radicitusque vellendos adcurrunt. Rura ex agris sponte natum gratiorem cibum non norunt. Lautiores etiam mensas diuitum Ornithogalum non reformidat. At Dodonæo humi, modi radix non Ornithogalum, sed Bolbocastani genus esse videtur. Radix enim est Bulbi forma, sapore castaneæ, quale Bolbocastanum esse nomen ipsum indicat. Ex Matthiolo duas Ornithogali plantas exhibemus, quòd duo esse eius genera existimet. Quorum vtrumque cum caule foliosum sit, differt ab eo quod Dodonæus depingit, quòdque legitimum Dioscoridis Ornithogalum esse censeat. Id etiam Bulbum leucanthemum appellat. Huic folia multa sunt & angusta, graminis minora: caulis inter hæc exit, dodrantis minor, rotundus, glaber, absque foliis: flores in summo dispersi emicant sex aut septem, foris herbacei viridis, intus candidi, ex sex foliolis commissi, exiguis Liliis, præ-

Li. de flor. cap. 13.

In cap. 138. lib. 2.

ORNITHOGALVM

I I. Matthioli.

Li. purgat.
App. c 6.

fertim priusquàm aperiuntur similes, qui Sole quidem splendente patent, noctu verò, & cùm aër nubilus etiam interdiu occlusi permanent: capitula succedunt triangularia, Cachrysos femini similia, in quibus semen exiguum: radix bulbosa, lento succo plena, sapore vt plurimum insipida & aquea, cum obscura tamen quadam acrimonia. Reperitur in agris frumetariis apud Brabantos locis compluribus. Maio mense flores edit. Dodonæus alio in loco Ornithogalum, quod Narbonense cognominat, haud parum differens à superioribus depinxit, foliis oblongis & tenuibus, & quàm aliorum angustioribus: caule tenello, cubitali, aut proceriore, nullis foliis vestito, floribus verò exornato quamplurimis, à medio fastigium petentibus, qui foris herbacei sunt, patentes verò interiùs lactei candoris visuntur, Phalangij flores referentes. Fructus triangularis est lobus, in quo semina: bulbos paruos & oblongos pro radice est. In Narbonensi Gallia, ac iuxta Monspelium in agris frumenti feracibus gignitur. Sunt qui Dioscoridis legitimum Ornithogalū esse existimant.

At superiora pro legitimis Dodonæo magis placent. Ornithogalo Narbonensi simile, & magnitudine tantum distare videtur, quod à Mycono habuimus. Inter segetes oritur, inquit, cubitali altitudine, interdum maiori. Caulem ha-

ORNITHOGALVM Dodon.

seu Bulbus Leucanthemus.



ORNITHOGALVM

Narbonense, Dodon.



bet laucem



bet laeue, rotundum, solidum, Asphodeli instar, in quo flores intus candidi, ex sex foliolis constantes, foris virides ex petiolo pendent, prope cuius exortum foliolum è caule prodit, ipsum petiolum amplectens: in florum medio stamina multa sunt veluti in Rosa. Radix crassa est, bulbosa, candida, solida, non squamata, dulcis, inferiore parte fibras in orbem emittens, eius extremum ambitum cingentes coronæ capitis monachorum instar. Cum huic idem sit sapor qui Ornithogalo vulgari, foliorū, florum forma eadem, Ornithogali speciem esse censet Myconus, etiam si folium sit in hoc duplo maius & latius. Quare Ornithogalū magnum appellauit. Raram plantam esse ait, seque bis tantum reperisse, semel Toleti, iterum iuxta Barcinonem. Ornithogali speciem faciunt quidam, vt scribit Pena, quod Ornithogalum luteum vocant. Quamuis enim Ornithogalo nomen dedit florum lacteus cādor, cuiusmodi in gallinarum alis renidet aut ouis, non earum lacte, quo caret volucrum genus, tamē propter totius figuræ affinitatem nobis erit etiam vo-

candum Ornithogalum, quod flore luteo est elegantissimum, nec ita frequens Italiae, Narbonæ, calidioribusque visitur. In Aruernis & ad pomeria Lugduni pone & prope suburbium trans Lugdunum, vulgò *La Guillotiere*, in campis latis &

ORNITHOGALVM luteum Lobel.
sive Bulbus siluestris, Dodon.

NARCISSVS IIII.
Matthioli.



glareosis,

glareosis, etiãque in Borbonio agro, quã ducit regia via Luteriam, plurimisque Belgij, Angliæ, nemorosis Sommerfeti Ornithogalum luteum se collegisse ait. Tota planta minor multò, sed simillima candido Ornithogalo. Martio mense floret. Bulbus vnicus plurimùm Scorodoprasi, oblongior, inodorus, pauciora, sed latiora quàm Ornithogali folia: flores prorsum Ornithogali, sparsi, & foris quidẽ herbidi vt Ornithogali, sed luteoli non candidi, intus verò eleganti luteo nitent. Est Bulbus siluestris Fuchsi & Tragi, Sisyrinchium Cordi, Bulbus esculentus Lacunæ. Hic satis appositè collocabitur venusta planta inter Ornithogala & Liliom narcissos media: habet enim radicem Ornithogali, folia oblonga Narcissi, inum caulem glabrum, singularem, pedalem & cubitalem ambientia, in summo in alas diuisum, quibus Liliacei, lactei candoris calicis instar senis foliolis radiati flores, Tulipæ minores, obtusi, e quorum fundo glomerulus pullus protuberat. Semen pericardio tereti Ornithogali clauditur, stamina luteola glomeratum fundum pullum ambientia. Plantæ odor suavis, aromaticus, Belgio hortensis vt rara, ita vsu incomperta. Narcissus est quartus Matthiolo, Lobellio Lilionarcissus polyanthes, recentioribus Lilium Alexandrinum, Italis *Hyacintho del pater nostro* propter glomerulos floris. Hæc Lobellius.

T R A S I.

C A P. XIX.

Nomina



ARA est planta hæc, nec alibi scribunt Herbarij sponte oriri, quàm in amœnissimo Veronensium agro, non procul ab vrbe, vbi etiam colitur pingui riguoq; aruo. Seritur & in Athesis fluminis sabulosis auctore Alexandro Benedicto. Huius radices Trasi illic vocantur, & *Trasi Dolce* & *Dolzolini*, Guilandinus & Dodonæus *Dulcichinũ* vocant plantam ipsam, Pena esculentus Cyperos, q; hæc planta prorsus sit è Cyperi genere seu radices, seu reliquam totam plãtam spectes, eiusq; locos natales: nec differre videtur nisi radicum sapore, qui gratus vescendo est, nec minùs vtilis. Sunt autem bul-

Forma.

T R A S I cum flore, Matth.



rugosè. Planta ipsa folio est oblongo, arundinaceo, dorso eminente, triangulo, Cyperino simili. Caules edit cubitales, angulosos, in quorum cacumine folia exiliora stellarum modo radiata, inter quæ flores exeunt spicati, siue iubæ subfulucentes. Radices habet numerosas, tenues, e quibus globuli dependent bulbosi, oblongi, fabarum magnitudine, colore subrubescente, alba, dulciq; intus medulla, Castaneæ sapore. Autumno parui isti bulbi leguntur, Vere seruntur in plures multiplicandi. Sunt qui putant stirpem istam esse Theophrasti *κυπέρων ἐδωδιμον*, id est, Cyperum esculentum, cum cæterorum radices amaræ sint, & minimè edules: *ἂν αἱ μὲνρίζαι γλυκεῖται, τὰ δὲ ὑπὲρ γῆς ἔχουσι. λέγω δὴ διον ἀρχαῖος, κυπέρου, τὰ τλὴς, σελίνος, ἱπποσειλίνος, τῶν ἐν τοῖς λίμναις καὶ τῶν ἐν τοῖς ποταμοῖς τῶν φυομένων ἐδωδιμών.* Id est, quorum radices sunt dulces, quæ verò supra terrã, minimè, veluti Graminis, Cyperi, Apij, Hippofelini, atque eorũ quæ in paludibus & fluuiis esculenta proueniunt. Quidam putant Trasos esse Arabum

Arabum medicorum *Halalzelin*, sed falsò. Nam *Alzelin* ab Arabibus inter fructus, seu grana, non inter radículas numeratur. Sic enim Serapio scribit, cap. 347. simpl. *Halalzelin*, id est, Granum *zelin*, est granum pingue, ciceris magnitudine, citrinum exterius, album interiùs, & habet bonum saporem, & defertur ex terris Barbariæ. Idem confirmat Auicenna, cap. 304. his verbis. Granum *Alzelin* est granum boni saporis, & oritur in partibus *Herzuz*. Ex quibus perspicuum est, granum istud à *Trasis* multùm differre. Horum cremore, vt tradit *Matthiolus*, pectoris & laterum vitia expurgantur. Quo fit vt tussientibus perutiles sint: tunduntur enim maceranturque carniùm iure, deinde per linteolum exprimitur cremor, quem etiam venereis potionibus miscent recentiorum nonnulli. Idem cremor potus ad viue ardores valet, & ad dysenterias: nam humorum acrimoniam retundit, præsertim ex aqua potus, in qua candens ferrum extinctum fuerit. Veronenses pro bellariis vtuntur. Sunthæ radices, vt ex experientia & dulcedine coniici potest, in modera: è calfacientium & humectantium genere, sed status quodam modo gignunt. Humenti Belgico solo complures capillares radices edidisse scribit *Lobellius*. Venerem stimulare, abstergere modera: è humectando, ideo expectoratione iuuare.

*Vires &
Temper.*

TUBERA ET FVNGI.

CAP. XX.



ADIGIEVS aut Bulbis, inquit *Galenus*, adnumeranda quæ Græcè *Nomina* ὄδρα & ὀδρα, Latine Tubera dicuntur, Arabicè *Ramech*, *Alchamech*, *Tumer* & *Roma*, Italicè *Tartuffi*, Germanicè *Hirtzbrunst*, Hispanicè *Turmas de terra*, Gallicè *Truffles*. Vocantur autem ὄδρα ab imbris, & ὀδρα à tumore. Ac ne quis homonymia fallatur, sunt fructus arboris *Tuberes* nominati, & à *Plinio* descripti, & *Cyclaminus* Tuber terræ appellatur. Tuber tradit *Dioscorides* radicem esse rotundam, sine foliis, sine caule, sublauiam. Effoditur Vere, & cruda & cocta in cibi vsum venit. Eius luculentior est apud *Plinium* descriptio. Et quoniam à miraculis rerum cœpimus, sequemur eorum ordinem, in quibus vel maximum est aliquid nasci, aut viuere sine vlla radice. Tubera hæc vocantur,

Lib. 15. c. 14.
Li. 2. ca. 19.

Forma.
Lib. 19. c. 11.
& 111.

TUBERA, Matthioli.



vndique terra circumdata, nullisque fibris nixa, aut saltem capillamentis, nec vtrique extuberante loco in quo gignuntur, aut rimas agente: neque ipsa terræ coherent. Cortice etiã includuntur, vt planè nec terram esse possumus dicere, nec aliud quàm terræ calum. Siccis hæc ferè & sabulosis locis fructectosissq; nascuntur. Excedunt sæpe magnitudinem mali cotonei, etiam librali pondere. Duo horum genera, arenosa dentibus inimica, & altera syncera. Distinguntur & colore, nigro rufosq; & intus candido, laudatissima Africa. Crescunt, an'ne vitium id terræ (neque enim aliud intelligi potest) ea protinus g'obetur magnitudine qua futurum est: & viuant ne an non, haud facile arbitror intelligi posse. Putrescendi enim ratio communis est iis cum ligno. *Lartio* *Licinio* *Prætorio* viro, iura reddenti in Hispania Carthagine, paucis his annis scimus accidisse mordenti Tuber, vt deprehensus intus denarius primos dentes inflecteret. Quo manifestum erit terræ naturam, in se globari: quod certum est ex

est ex iis quæ nascuntur, & feri non possunt. Et paulò post. De Tuberibus hæc traduntur peculiariter, cùm fuerint imbres autumnales, ac tonitrua crebra, tum nasci, & maximè è tonitribus: nec ultra annum durare: tenerrima autem verna esse. Quibusdam locis accepta riguis feruntur: sicuti Mytilenis negant nasci, nisi ex inundatione fluminum iniecto semine ab Tiaris. Est autem hic locus in quo plurima nascuntur. Asiæ nobilissima, circa Lampſacum & Alopeconnesum, Græciæ verò circa Elin. Hactenus Plinius. Duo in Romano agro genera haberi scribit Matthiolus. Vni candida, alteri pulla pulpa subest. Rimosus utriusque cortex, ac niger. Est & tertium genus in Ananienſi & Tridentino tractu proueniens, colore subrufo, cæteris longè minùs, insipidum & gustu iniucundo. Tuberæ, auctore Galeno, nullam qualitatem insignem habent. Quare qui ipsis vtuntur, ad cõdimenta excipienda magis vtuntur, quemadmodum & aliis quæ vocant insipida, & innoxia, & ad gustum aquosa. Quibus omnibus est commune, vt alimentum quod ab ipsis in corpus distribuitur, nullam insignem habeat facultatem, sed subfrigidum quidem sit, crassitiè verò, quale ipsi est quod sumptum fuerit: crassius quidem quod ex Tuberibus est, humidius autem, ac tenuius, quod ex Cucurbita: atque in aliis proportionem. Sed de iis aliter scripsit Auicenna. Tuberæ terreæ magis consistunt substantia, aquea minùs: est & in iis aërea & subtilitas pauca, suntq; omnis saporis expertia. Melancholicos & crassos gignunt humores magis quàm quoduis aliud cibi genus. Quare frequenter deuorati apoplexiam & paralyſim inuehant. Præterea concoctu difficilia sunt, & ventriculum grauant. Tuberibus deteriores sunt Fungi, qui Græcis dicuntur *μύκητες*, Arabibus *Hatar*, vel *Father*, Italis *Fongino*, Germanis *Pfifferling*, & *Reysken*, Hispanis *Hongos*, *Cogomelos*, & *Cylherquas*, Gallis *Champignons*, & *Potirons*. Horum differentiam duplicem statuit Dioscorides. Aut enim manduntur, inquit, aut perniciales sunt. Multis de causis venenati gignuntur, vbi videlicet clauus ferreus in quo sit rubigo, aut pãni marcor adfuerit, aut si iuxta serpentis cauernam, arborémve noxiam emergant. Cõtinent qui tales sunt nescio quod strigmentum, concretamque pituitam, terræque eruti quàm celerrimè putrescunt. Qui verò esculenti sunt, suauem in iuribus gratiam ineunt, largiùs tamen sumpti nocent, & ægriùs concocti strangulant, aut cholera morbum citant. Remedio est nitri (Oribasiùs habet olei) potus, aut lixiuium cum acida muriæ, aut feruefactæ Satureiæ, aut Origani iusculum. Debellantur etiam gallinacei fimi potu ex aceto, aut eiusdem delinctu cum melle multo. Corpus alunt, sed ægre dissoluantur, cùm magna ex parte integri cum recrementis alui deliciantur. Hæc Dioscorides. Matthiolus eorum qui sunt edules differẽtias multas reperiri scripsit, præsertim in Hetruria inter omnes Italiæ regiones Fungorum feracissima. Sunt enim, inquit, qui *Prignoli* vulgò dicuntur, singulis annis primis Aprilis imbribus erumpẽtes, nõ solum odorem suauẽ spirantes, gustuque gratissimi, sed etiam prorsus innoxij. Secundum locum tenent porcini, hoc est suilli vulgò nuncupati, qui priùs elixi, deinde farina obliati, & in butyro, vel oleo frixi magnam cum palato ineunt gratiam. Sed in eo genere plures perniciosi quàm in aliis reperiuntur, qui faciliè dignoscuntur cùm à terra & cortice purgantur, incidunturq; decoquendi. Nam dissectorum statim, vt Plinius ait, dilutus aduenit rubor, rancidus subinde aspecit, liuidus intus color, rimosa stria, pallidum per ambitum labrũ, postremò accedit nigredo, & ita protinus computrescunt. Rectè etiam scripsit Auicenna eos nocentiores esse qui nigri sunt, vel virides, vel in rubro purpurascetes. Sed accidit plerumq; vt eos potissimùm Fungi perimant, aut in magnum discrimen adducant, qui super ferrea craticula, aut cineribus calentibus assatos deuorant, quia nondissecti, noxij ab innoxiiis non faciliè secernuntur. Præterea nõ semper nocet Fungi, quia ex sese lethiferi sint, sed quod copiosius quàm par sit ingerantur: cùm enim

Li. 2. Alim.

Li. 2. c. 698.

enim


F V N G I.



enim lenti admodū
crassissimiq; sunt suc-
ci arteriarum oscula
ita obstruūt, vt con-
clusis intus spiriti-
bus suffocent. Quod
cū norint Hetruf-
cæ rusticæ, rarò Fun-
gos edant, nisi Allio
& pipere additis. Af-
feruatur Fungi mu-
ria, inquit Matthio-

lus, præsertim qui vulgò porcini vocantur: sic enim innocentiores redduntur, de-
posito lentore. Idem multa alia Fungorum vulgaria genera recenset, *Prataioli, Tu-
rimi, Boleti, Orceje, Cardarelle, Ordinali, Parigoli, Uesci di Lupo*. Fungi etiam non
tantū hūmi, sed etiam in arborum caudicibus nascuntur, quos omni ferè peri-
culo vacare putat Matthiolus, modò non sint arbores noxiæ, & è corticibus pro-
deant, quibus nec ferrum, nec tabefactus pannus, nec serpentis cadauer sublit. Ex
eo genere præter Agaricum, quosdam Laricibus innasci, ait in Ananèsibus mon-
tibus, triginta librarum pondere, aureo colore, per ambitum insectos, in cibus gra-
tissimos, sine vlllo amarore, licet Agaricus, ex eadem arbore sit amarissimus. Sed
optimè omnium Galenus dixit Fungum plantam esse admodū frigidam & hu-
midam: quomobrem ad deleteriam enecantēque facultatem accedere, ac sanè
inter eas esse quæ interficiant, potissimū qui ex natura mixtam habent qualita-
tem putredinosam. Et in lib. de Alim. Inter Fungos, inquit, Boleti si bellè in aqua
elixi fuerint, propè accedunt ad cibos insipidos. Non tamen sic solis ipsis vulgò
vtuntur, sed apparant variè & condiunt, vt alia omnia, quæ nulla insigni qualitate

F V N G V S *spongiosus,*
Dalechampij.



sunt prædita. Alimentum autem ex ipsis est
pituitosum & frigidum, prauūque succi, si quis
ipsis largiū. vtatur. Omnium igitur Fungorum
ij minimū sunt noxij. Secundi autem post
hos sunt Amanitæ. Reliquos verò tutius est ne
attingere quidem: multi enim ex ipsorum esu
interierunt. Noui quēdam, cui post Boletorum
non satis elixorum (qui innocentissimi esse pu-
tantur) vsū largiorem, os ventriculi pressum,
ac grauatum coarctatumq; fuit, difficilēque
habuit respirationem, & in animi deliquium
incidit, sudoremq; frigidum sudauit, ac demū
seruari ægre, sumptis iis quæ humores crassos
incidunt, potuit: cuius generis est oxymeli
ipsum per se, & cum hyssopo, & origano ipsi
mediocriter incoctis. Is enim tū hæc sumpsit,
tum nitri spumam ipsis inspersam: post quæ
Fungos quos comederat vomuit, qui iam quo-
dammōdo in succum pituitosum frigidumq;
ad nodū, ac crassum erant mutati. Hic non
omittendus Fungus insignis, quem spongiosū
Dalechāpius cognominauit. Nascitur in aspe- *Locus.*
ris & saxosis, sæpe ad Castanorum radices, co-

lore fuluo, corpore spongioso, figura in meam desinente, suauissimi gustus: quam obrem in deliciis habetur variis modis præparatus, vt hominum palatum variis condimentis oblectatur. Galli vocant *Morilles*, inde fortasse, quòd ad Mori fructus figuram non nihil accedat.

ASPHODELV S.

CAP. XXI.

Nomina



RAECIS ἀσφόδελος, Latinis Asphodelus, & Hastula regia, quòd dum floret prorsus sceptri regij effigiem referat, & Albucum, siue Albucus vocatur, Officinis corrupta voce Afrodilus, Arabibus *Cheunce*, *Bhunte*, *Bnuach*, *Abg*, seu *Axeras*, Italis *Asphodelo*, Germanis *Goldwurtz*, Gallis *Afrodile*, & *Hache Royale*, Hispanis *Gamonos* & *Gamonites*. Florem ἀνθέμενον appellari ait Dioscorides, Plinius caulem Anthericum, radicem verò, id est, bulbos, Plinium secutus. Dioscorides vnus Asphodeli meminit. Plinius Dionysium duo genera facere tradit, marem & fœminam. Recentiores tria obseruarunt. Asphodelum describit Dioscorides his verbis. Folia habet Porro maiori similia, caulem læuem in summo florem ferentem, Anthericum vocatum: radices oblongas, rotundas, glandibus similes, gustu acres. Hunc Dioscoridis Asphodelum album vocant Herbarij quidam, alij marem, qui folia fert complura, oblonga, angusta, Porri foliis similia, acuminata: caulem rotundum, læuem, cubito longiorem, quem à medio sursum versus multi quinque foliolorum flores patentes exornant, colore candidi, aut ex rubro valde diluto modicè purpurascentes, staminibus in medio, post quos capitula sequuntur orbiculata, in quibus semen durum, triangulum, nigricantis obsoleti coloris: radices ab vno capite complures exeunt, oblongæ, teretes, Pæoniæ minores, concolores fermè, acres, magnis glandibus quodammodo similes, succosæ. Arida Narbonæ litora huius Asphodeli feracissima sunt, nec minùs montes à mari disiti, vbi bulbis illius aduictioribus rostro effosis quantumuis

Lib. 21. c. 17.

& lib. 22.

cap. 22.

Lib. 7. hist.

cap. 12.

Li. 2. c. 164.

Genera.

Ibidem.

Forma.

Locus.

HASTVLA Regia, siue
Asphodelus, Matth.



Lib. 7. hist.

ca. 2.

acribus suis lubenter vescuntur. Apud Germanos & Belgas non nisi satus prouenit. Floret Maio & Iunio mensibus, & particulatim quidè ab imis incipiens. Plinius, Asphodelus, inquit, oblongum & angustum folium habet. Et mox, Asphodeli mentionè & Homerus fecit. Radix eius Napis modicis similis est: neq; alia numerosior, octoginta sunt acervatis sæpe bulbis. Theophrastus & ferè Græci, princepsq; Pythagoras, caulem eius cubitalem, & sæpe duum cubitorum, foliis Porri siluestris, Anthericum vocauère: radicem verò, id est, bulbos, Asphodelū. Nostri illud Albucum vocant, & Asphodelum Hastulā regiam. Theophrastus hæc de Asphodelo. ὁ μὲν γὰρ ἀσφόδελος μακρὸν, καὶ στενότερον καὶ ὑπεργλυκύνει καὶ δὲ φύλλον. Id est, Asphodelus longum, & angustum, & quadātenus viscidum folium habet. Et, μέγιστον ὁ πάσιων ἀσφόδελος. ὁ μὲν γὰρ μέγιστος ἀνθέμενος. Omnium maximū caulem Asphodelus habet: Anthericus enim maximus. Et mox. ἔστι δὲ πολύκαρπος ὁ ἀσφόδελος, καὶ ὁ καρπὸς αὐτοῦ ξυλωδὴς, τῇ μὲν μορφῇ τελεγωνος, τῷ δὲ χημαλιμέλεος. γινέει δὲ ἐν τῷ τροχίλῳ τῷ ὑποκρίτῳ τῷ

ἀνθες,

ἀνθες, ἐκ πλείων δὲ τῶν ἑτέρων, ὅταν τὸ το διαχάνη. τὴν ἀνθισιν (non ἀνασιν, vt habent publica exemplaria) ποιεῖται καὶ μέρος, ὡς περ καὶ ἐπὶ τῇ σκίλλης. ἀρχαίαι δὲ πρῶτον ἀπὸ τῶν κῆπων. ἐν δὲ τῷ ἀνθεράκῳ σωίτῃ σκώληξ, ὃς ἐς ἄλλο μεταβάλλει ζῶον πτηνὸν ἀθηνόδες. Ἐπὶ δὲ τανὸ ἀνθεράκος ἀναρτῇ, διεσθίων ἐκπέταται. Δουεῖ ὁ ἴδιον ἐχθρὸν πρὸς τὰ ἄλλα. τὰ λήκη γὰρ, δούτι φενὸς ὦν, ἀποφύσας ἀναθεν ἐχθρὸν.

ASPHODELVS minor,
Dodon. & Clusij.



ASPHODELVS bulbosus, Galeni.



Id est, Multi seminis est Asphodelus, estq; semē eius lignosum, forma triangulum, figura nigrū. Gignitur hoc in rotundo quodam quod flori subest, excidens ætate cū id dehiscit. Floret particulatim, vt & Scilla, incipiens ab imis. In Antherico nascitur vermis, qui in aliud animal volatile floridum transmutatur. Deinde cū Anthericus exaruerit, ipso cioso euolat. Videtur autem hoc peculiare habere præ cæteris læui caule præditis, quod, angustus cū sit, propages supernè habet. Hæc Theophrastus. Dioscoridis Asphodelo satis similis est caule, foliis, floribus, planta appicta, sed radicibus differt, quæ non glandulosæ, sed crassæ, fibratæ, numerosæq; ex vno capite nascuntur: folia Asphodeli minora & angustiora multò, breuioraq; & dilatiore colore: è quorum medio sex, aut plures ex eadē radice assurgunt caules cubitales, ramosi, quos sine ordine nascētes exornant flores, superioribus similes, sed minores deinde triangulares siliquæ, primū virides, deinde albicantes, & in his semen rugosum, triquetrum, altero minus. Dodonæus & Clusius Asphodeli minoris nomine plantam hanc donarunt: nullumq; alium ferè Asphodelum ait Clusius toto Valætino regno nasci, & Gadibus, & plerisq; Granatensis regni locis: inueniri etiā in lapidosa illa planitie supra Arelatem, secus vias. Huius meminimus in libro de iis quæ flore placēt, cū de Phalangio ageremus. Asphodelus fœmina Dodonæi, siue bulbosus, siue Hyacinthinus, folia habet porracea, sed tamen angustiora & tenuiora quàm primi Asphodeli: caulem rectum, rotundum, floribus similiter multis circūuestitum, rarioribus tamē, qui primi Asphodeli floribus, haud multum sunt absimiles, ex sex paruis acuminatis foliolis, & aliquot in medio staminibus compositi: capitula quoque triangularia, sed longiora, in quibus semen, radix subest bulbosa, magnitudine esculēti Bulbi, aut maior. Belgæ in hortis colunt. Floret eodem quo primus tempore, aut paulò tardiùs. Asphodelum esse caulis Anthericq; similis ostendit. Quare is erit Asphodelus, cuius meminit Galenus in libris de Alimen. facultat. bus,


Lib. 5. c. 80.
hist. stirp.
& de flor.
cap. 39.

Dodon de
florib. c. 38.

de quo postea dicitur. Ab hac sententia non abhorrent Lobellius & Pena, qui Asphodelum fortè Galeni & Hyacinthinum appellant : quia ancipitis videtur figuræ & generis ex Asphodelo, cuius flores habet, & ex Hyacintho, propter similem radicem. Est & alius Asphodelus luteus, à florum colore luteo cognominatus, cui folia sunt oblonga, angusta, striata, in virore quasi cærulea, longiora & angustiora quàm primi : caulis rotundus, cubitalis : flores in eo à medio sursum versùs plurimi, alterius satis similes, sed colore lutei, staminibus in medio : capitula succedunt rotunda, in quibus semina : radices similiter còplures, sed singulæ oblongæ & tenues, multò quàm primi & tenuiores & lōgiores, colore luteolæ, supra quas fibræ quædam è lateribus exeunt, per quas in plures alias stirps ipsa facilè multiplicatur. Hortis Belgij & Galliæ familiaris est. Floret similiter Maio aut Iunio mense. Est & Asphodelus luteus palustris, de quo in lib. de Palustribus. Addit Lobellius Liriasphodelū Liliiflorū, de quo egimus cap. de Hemerocallide. Præterea Liriasphodelū phœniceū, cui ex miniato flauēte flores rutilāt : folia sunt Porri, Asphodeli albi vel Liriasphodeli vegetiora latioraq̃, supernè reflexa : caulis rotundus, durior, binos ternosq̃ cubitos interdū superans, in cuius summo Liliacei itidem flores striati, Liliū puniceum minus æquant. Radix tuberosa teres, Asphodeli lutei minoris. Aspho-




ASPHODELVS luteus
minor, Lobelij.



deli, in virore quasi cærulea, longiora & angustiora quàm primi : caulis rotundus, cubitalis : flores in eo à medio sursum versùs plurimi, alterius satis similes, sed colore lutei, staminibus in medio : capitula succedunt rotunda, in quibus semina : radices similiter còplures, sed singulæ oblongæ & tenues, multò quàm primi & tenuiores & lōgiores, colore luteolæ, supra quas fibræ quædam è lateribus exeunt, per quas in plures alias stirps ipsa facilè multiplicatur. Hortis Belgij & Galliæ familiaris est. Floret similiter Maio aut Iunio mense. Est & Asphodelus luteus palustris, de quo in lib. de Palustribus. Addit Lobellius Liriasphodelū Liliiflorū, de quo egimus cap. de Hemerocallide. Præterea Liriasphodelū phœniceū, cui ex miniato flauēte flores rutilāt : folia sunt Porri, Asphodeli albi vel Liriasphodeli vegetiora latioraq̃, supernè reflexa : caulis rotundus, durior, binos ternosq̃ cubitos interdū superans, in cuius summo Liliacei itidem flores striati, Liliū puniceum minus æquant. Radix tuberosa teres, Asphodeli lutei minoris. Aspho-

LIRIASPHODELVS
phœniceus, Lobelij.



deli ra

deli radix, vt Diosc. tradit, calfaciendi vi prædita est. Vrinā & mēses pota mouet. *Vires & Temper.* Lateris dolorib⁹, tussibus, cōlusionib⁹, ruptioribus drachmæ pōdere ex vino pota medetur, vomitiones adiuuat ludicri tali magnitudine in cibū accepta. A serpēte demorsus datur vtiliter triū drachmarū pondere. Illinire aut oportet morsus foliis radice & floribus cum vino: itē vlcera sordida & depascētia: mammarum quoq; & testiū inflāmationes, tubercula & furūculos, decocta in vini fæce radice: ad recentes autē inflāmationes cū polenta. Radicis succus adiecto vino vetere dulci, myrrha & croco simul decoctis, perquā vile fit oculis medicamentū. Ad purulentas aures per se, & cū thure, melle, vino & myrrha tepefactus prodest. In contrariam aurē per se infusus dentiū dolorē mitigat. Cinis ē radice cremata illitus, alopecias capillis replet. Oleū in excauatis radicibus igni decoctū, illitū exulceratis perionibus, & ambustus igne cōducit. Dolori auriū instillatus auxiliatur. Candidā vitiliginē linteo antea perfrictā in Sole, illita radix emendat. Semen & flores in vino poti, scolopendræ & scorpionū venenis egregiē aduersantur. Aluū quoq; deiciūt. Galenus tradit Asphodeli radicē vtilē esse sicut Ari, Arisari (exēplaria falsō habent Afari) Dracōtij, nempe extergentis facultatis: vltæ autē cinerē calidiorem & exsiccantiorem, magis tenuium partium, & ad discutiendum potentiorē effici. Quare & alopecias sanat. Meminit Asphodeli etiam Hesiodus his versibus.

Li 6. simpl.

Νήπιοι ἔδ' Ἰθσι ὅσων πάλον ἥμισυ πάντες,

Οὐδ' ὅσον ἐν μάλ' αἷτε, καὶ ἀσφοδέλῳ μέγ' ὄνησας,

Id est,

Ignorant stulti quantum plus dimidium sit

Toto, quāque bonum magnum in Malua Asphodeloque.

Sed cūm Asphodeli Dioscoridis radices acriores sint & ingratiore, quā vt præfertim hominibus nostris in cibū cedere possint, verisimile est Hesiodū Asphodelū aliqū aliū intellexisse, fortē Galeni, cuius vis etiā nō elixi ignauior multō, & feruor mitior. De quo sic scripsit. Radix Asphodeli & magnitudine & figura & amarore Scillæ radicis quodāmodo similis est, si tamen vt Lupini paretur, maximam partem sui amaroris deponit, in eoque à Scilla discrepat. Nam Scillæ qualitas difficillimē exiuit. Hesiodus certē Asphodelū laudat. Equidē noui quosdam rusticos qui grassante fame vix tandem cōpluribus elixationibus decoctionibusq; in aqua dulci esculentam ipsam reddiderint. Porro hæc quoque radix, quemadmodū & Dracontij, facultatem habet tenuandi & aperiendi. Proinde quoq; pro summo remedio ipsius asparagum ictero laborātibus exhibent. De eodem eduli Asphodelo hæc literis prodidit Theophr. πολλὰ δ' εἰς τροφήν παρέχειαι χρέσιμα. καὶ γὰρ ὁ ἀνθρώπος ἐδάδιμος σαθευόμενος, καὶ τὸ σπέρμα φρυγόμενον. πάντων δ' ἐμάλιστι ἢ ῥίζα κοπιούμενη μέλα σῦκα, καὶ πλεῖστα ἐν ὀνήσῃ ἔχει καὶ ἡ σίλοδον. Id est, interprete Theodoro, Asphodelus permulta ad cibum vtilia adfert: quippe Albucū tostum in cinere manditur, & semē torrefactum vsui est. Sed radix tusa cum ficu in vsu maximē omniū venit, & vtilitatis plurimū auctore Hesiodo præbet. Hæc ex Theophr. Plinius exscripsit, Asphodelus māditur & semine tosto, & bulbo: sed hoc in cinere tosto, dein sale & oleo addito: præterea cū ficis, præcipua voluptate, vt videtur Hesiodo. Traditur & ante portas villarū satum remedio esse contra veneficiorū noxiam. Quod postremū Theophr. & Diosc. non de Asphodelo, sed de Scilla literis mandarūt, vt diximus. Idem Plin. prolixius Asphodeli vires exponit, sed quæ partim mari, partim scēminæ debētur.

Li. 2. Alim.

Lib. 7. hist. cap. 12.

Lib. 21. c. 17.

M O L Y.

CAP. XXII.



Ts 1 Homerus Moly illud primus celebrauerit, quo contra Circes veneficia Vlyssēm Mercurius armauit, ita canens:

Ὡς ἄρα φωνήσας πῶρε φάρμακον δργεῖσθοντῃς

Ἐκ γούνης ἐρύσας, καὶ μοι φύσιν αὐτῆς ἔδειξεν.

Ῥίζαν μὲν μέλαινα ἔσκε, γάλακτι δὲ σκεῖλον ὄθος.

Odiss. 10.

Μῶλυ δὲ μὴν χελέσει θεοί.

Id est,

*Sic fatus diuulsam è terra porrigit herbam**Mercurius, simul & naturam me docet huius.**Radix magna huic, sed lactis flos concolor exit.**Moly vocant superi.*

Et post Homerum Ouidius, dum canit:

*Pacifer huic florem dederat Cyllenius album,**(Moly vocant superi) nigra radice retentum:*Lib. 14. Me
tamor.


Nomina

Li. 3. ca. 47.
Li. 7. simpl.

Li. 25. ca. 4.

Lib. 9. hist.
cap. 15.

tamen cū graues Græci & Latini rei herbariæ scriptores peculiaris herbæ bulbosæ meminerint, quæ μῶλυ Græcè dicatur, Latine etiam Moly, eisque locos natales in quibus reperitur assignarint, de ea hîc dicendū. Dictam autē volunt ἀπὸ τοῦ μωλύειν τὰς νόσους, id est, à mitigandis sedandisque morbis. Verū cū nomen istud non vni, sed pluribus postea accōmodarint plantis, vt insigni quopiā odore, ita vi & figura non ita dissimili prædiris, vt Rutæ siluestri, auctoribus Diosc. & Galeno, tamen de Moly bulbofo Diosc. hîc agimus. Folia, inquit, gramini similia habet, latiora, humi sparsa, flores Violæ albæ, lactei coloris, minores tamen, & cū Violæ purpureæ floribus cōparandos: caulem album, quaternū cubitorū, in cuius summo inest quid Allij speciē referēs. Radix est parua, bulbosā. De alio Plinius scripsit. Clarissima herbarum est, Homero teste, quam à Diis vocari putant Moly, & inuentionē eius Mercurio assignat, contraq; summa veneficia demonstrat. Nasci eam hodie circa Phenēū, & in Cyllene Arcadiæ tradunt, specie illa Homerica, radice rotunda, nigraq; magnitudinis Cepæ, folio Scillæ: effodi autē difficulter. Græci auctores florē eius luteum pinxere, quum Homerus candidum scripserit. Inueni ē peritis herbarum Medicis, qui & in Italia nasci eam diceret: afferriq; ē Campania vidī, aliquot diebus effossam inter difficultates faxeas, radicis triginta pedes longæ, ac ne sic quidē solidæ, sed abruptæ. Quæ magna ex parte ex Theoph. trāscripsit, cuius verba hæc sunt. Τὸ δὲ μῶλυ περὶ φανεὸν (legendum ex Plinio φανεὸν) ἔστι ἐν τῇ κυλλήνῃ. φασὶ δὲ εἶναι καὶ ὅμοιον, ὡς ὁμηρος εἴρηκε (sic habent vulgata exēplaria: Gaza legit, καὶ ἐν τῇ κυλλήνῃ φασὶν εἶναι, ὡς ὁμηρος εἴρηκε,) τὴν μὲν ῥίζαν ἔχον τρυφύλλῃν, ποροσμεπέρης κρομμύω, τὸ δὲ φύλλον ὅμοιον σκίλλῃ. χεῖρ δὲ αὐτῷ πρὸς τε τὰ ἀλεξίφάρμακα, καὶ τὰς μαγείας, δὲ μὴν ὀρύττειν γε εἶναι χαλεπὸν, ὡς ὁμηρος φησι. Id est, Gaza interprete, Moly apud Phenēū exit, atq; apud Cyllenem esse (quemadmodum Homerus dixit) affirmant: radice rotunda nō ab- simili Cepæ, folio Scillæ. Vsum eius contra vene- ficia summū, non tamē effodi difficulter, vt ait Homerus. Hæc Theophr. De Dioscoridis Moly primū dicemus. Id genuinū doctis Herbariis videtur esse, quod horti Patauini & Bononienses iamdiu, nunc etiā Belgæ colunt, cui bulbosus exiguus, oblongus, fermē Porri, albicans, triticeis aut gramineis foliis: flos in cauliculis cubitū altis, lacteus, Ornithogali aut Allij vsini æmulus: semen in siliqua. Istud Moly Dioscoridis faciūt. Matth. Patauio missum à Cortuso pictum dedit. Idē prorsus esse opinor quod Clusius vidit Gadibus extra mœnia, Februarij initio florēs, & ita describit. Habet hæc planta bina aut terna folia graminea, exteriore parte aliquantulū lanuginosa, mollia, & ad terrā inflexa, inter quæ caulis exilit dodrantalis laevis, rotundus, vacuus, in



M O L Y, Matth.

Forma.


cuius

MOLY foliis Narcissi,
Lobellij.

cuius cacumine ex membranula quadam emergunt multi flosculi exigui, candidi, sex foliolis constantes: radix bulbosa, alij aut auellanae magnitudine, nigricantibus mēbranis inuoluta, intus candida, succulenta, calidiuscula, & subingrato odore. Clusio plurimū ad Dioscoridis Moly accedere videtur, praesertim si pro *πικρὸν τέσσαρον*, legatur *Ναρκίσσον τέσσαρον*, id est, quaternū digitorum. Illi assentiuntur Lobellius & Pena. Idem Lobellius perelegans aliud Moly serpentinum exhibuit. Dioscoridis Moly ortu persimile, folio ad terram item reflexo, odore & bulbo, sed flos candore rubens, cui subiacent bulbuli nitidi, Indici Moly ritu. Radix cepaceo quodam inuolucro obtegatur: caulis pedalis & fescquipedalis. Belgis hortense est. Addit aliud folio Narcissi, proceritate & caule non ab simile, sed floribus caruleis, & foliis compressis Narcissi similibus, & ferè paribus, oblongis, & albis radicis bulbis porraceis simul implexis & cohaerentibus magno capitulorum stipatu, Allium odore praferentibus. Ab his differt Moly, quod ex Homero Theophrastus & Plin. descripserunt iis verbis quæ supra memorauimus. Est enim horum Moly foliis Scilla, tribus aut quatuor, lōgiōribus: caule cubitali, crasso, concauo, rotundo, foliorum ex parte, multos flores candidos, stellatos in cacumine summo ferente, oblongis pediculis inhærentes: semine in capitulis triagulis nigro, Ceparum ferè simili: radix crassa, alba, nigra membrana tecta. Iuxta caulem inter folia plerunq; exit alius cauliculus planus & folia-

prà memorauimus. Est enim horum Moly foliis Scilla, tribus aut quatuor, lōgiōribus: caule cubitali, crasso, concauo, rotundo, foliorum ex parte, multos flores candidos, stellatos in cacumine summo ferente, oblongis pediculis inhærentes: semine in capitulis triagulis nigro, Ceparum ferè simili: radix crassa, alba, nigra membrana tecta. Iuxta caulem inter folia plerunq; exit alius cauliculus planus & folia-

MOLY serpentinum, Lob.*MOLY Liliflorum, Lob.*



ceus seu veriùs folium, quod in summo veluti Allij nucleum gerit, initio candicantem, deinde pallescentem, qui terra exceptus germinat, & plantam eiusdem profert. Moly Liliflorum vocat Lobellius. Aliter in hortis, & Maio mense floret. Itadescripsit Clusius. In lib. Purgantium Dodonæus pinxit & descripsit. Præterea aliud Moly Indicum cognominatum, quod alij barbaro nomine *Caucasum*, quod ex India primùm in Hispanias delatum est. Superiori, inquit Clusius, cum

PSEUDOMOLY,
Dodonæi.



Lib. 4. c. 50.

Lib. Quæ
flore plac.

Ibidem.

Lib. 3. c. 47.

foliis tum reliqua forma simile est, sed nunquam florens, & cui floris loco in extremo caule (qui pedalis est, & planus ferè, nec attolli sine adminiculis potest) conglomeratum caput est, multisque veluti Allij spicis mespili vulgaris magnitudine constans, primùm viridibus, deinde flavescentibus aut pallescentibus, quæ etiam sine terra repositæ germinant: terræ autem commissæ in maiores bulbos adulescunt, foliæque & caules proferunt: radix ut alterius cepacea, rotunda, alba, & tunicis amicta, quæ vetustate separatur, & in alios bulbos multiplicatur. Dodonæus in Historia stirp. Plinij Moly aliud, quod peritis aliis Herbariis neq; Diosco. neq; Plinij Moly esse videtur, sed potius Phalangium, ut suo loco diximus. Idem Dodonæus Pseudomoly facit graminis genus quoddam in maritimis proveniens, valde tenerum, paruum, foliis pusillis, angustis, breuib, magna ex parte super humum iacentibus: cauliculis teneriusculis, breuib, gracilibus, in summo flores in muscariis candidos aut purpureos edentibus: radices teneræ sunt, graciles & longæ. Dioscorides tradit Moly radicem habere ad aperiendas vulvas maximè utilem, tritam cum irino vnguento, & in pesslo adhibitam. Hoc Moly Dioscoridis à Galeno *μύλιν* dici

dici demonstrant ea quæ Galenus ei attribuit, citato etiam ipso Dioscoride. Sic enim Galenus. Myles radix paruo Bulbo similis est, facultatis constringendi siue contrahendi. Quare ipsam cum loliij farina admotam mederi vuluæ apertè scribit Dioscorides. At in nostris vulgatis Dioscoridis exemplaribus legimus, μετὰ ἱρίνης μύρου, non μετὰ αἰθέρος ἀλέουρου. Cum verò scribat Dioscorides, hanc radicem esse σφόδρα ἀγαθὴν πρὸς ὑγέρας ἀναπομώσεως, id est, summopere prodesse, non ad aperiendos vteros, videlicet conclusos, vt perperam quis accipere possit, sed aduersus vteros apertos, vt videlicet constringantur atque concludantur, (est enim συνεκτικὴ) μετὰς ἀναπομώμενης, vt Galenus clarè dixit,) sitq; loliacea farina ad id idonea, ordine tertio calefaciens ac siccans, ineptum verò vnguentum irinum molliens vteri conclusionibus, & hæmorrhoidibus aperiendis vile, perspicuum est ex Galeno reponendum in Dioscoride, μετὰ αἰθέρος ἀλέουρου, pro, μετὰ ἱρίνης μύρου: ad stipulante etiam veteris codicis lectione, vt annotauit Andreas Lacuna.

APIOS.

CAP. XXIII.



RACIS ἄπιος & ἰσχάς, & ῥάφανος ἀγρία, Latinis Apios similiter dicitur, & Ischas, & Rhabbanus siluestris, Cretensisbus hodie Pyraria, Theodorus Caricam siue Pyrum vertit. Apion dixerunt Græci, quod radice extremum in pyri figurā turbinetur. Eadem ratione Ischas, id est, ficus, scilicet à radice effigie, cuius hæc est ex Dioscoride delineatio. Ramulos duos aut tres, iunceos, tenues, rubentésque profert, qui supra terram parum se attollunt: folia Rutæ similia, longiora tamen & virentia, semen exiguum, radicem Asphodelo similem, & ad pyri figuram accedentē, rotundiorē tamen, & liquore plenam, intus candidam, foris nigro cortice contextam. Plinius iisdem penè

Nomina

Lib. 4. c. 170.

Forma.

Lib. 2. c. 8.

APIOS, Matthioli.



verbis descripsit. Apios, Ischas, siue Raphanus agria iuncos duos siue tres spargit in terra rubentes, foliis Rutæ: radix Cepæ, sed amplior. Quare quidam Raphanum siluestrem vocant. Intus habet mammā candidam, extrā cortices nigros. Nascitur in mōtosis asperis, aliquando in herbidis. Effoditur Vere. Theophrastus. ἡ δὲ ἰσχάς ἢ ἄπιος φύλλον μὲν ἔχει πηγανῶδες. βραχὺ, καυλὸς δὲ ἐπιγίγνεται, τρεῖς ἢ τέτταρας, ῥίζαν δὲ ὁσον ἀσφόδελοσ, πλὴν λεπυρώδη. φιλεῖ δὲ ὀρεῖνά, χυμὸς καὶ κοχλακώδη. τίλλεται δὲ τὸ ἥρος. Id est, Apios folium habet rutaceum, breue: caules per humum stratos tres aut quatuor: radicem veluti Asphodeli, verum squamosam. Locis gaudet montosis & lapidosis. Legitur Vere. Apios vera ex Creta aduecta ex Matthiolo hic depingitur, foliis exiguis, Rutæ vel Hyperico proximis, primo statim Vere ab radice exeuntibus, nigrioribus tamen, alba quadā linea in longitudinem procurrentibus: cauliculis iunceis, subrubentibus, lacteo succo madentibus: radice foris nigra, intus candida, pyri effigie: vnde & nomē. Cuius radice mirabiles sunt vires. Nam eius superior pars

Lib. 9. hist. cap. 10.

Lib. 4. 170.

sumpta, inquit Dioscorides, vomitione bilem pituitāque extrahit, inferior per alium. Tota verò vtrinque purgationes mouet. Succus eius sesquioboli pondere haustus, vtrāq; parte, hoc est suprà & infrà purgat. Cum verò liquorem colligere volueris, tundito radices, coniectaq; in craterem aqua plenum agitato, tum pen-na collectum qui supernabit liquorem siccato. De eiusdem radice vsu hæc Plinius.


Lib. 16. c. 3.

nus. Rad. x tufa in fictili mergitur, deiectoque quod super natat, reliquus succus purgat vtraque parte, sesquibolo in aqua mulsâ. Sic & hydropicis datur acetabuli mensura. Inspargitur & aridæ radicis farina potionibus: aiuntque superiorē partem eius vomitione biles extrahere, inferiorem per aluum. In quibus Plinius non nisi in succi collectione à Dioscoride dissentit. Theophrastus quoque de eadem radice hæc tradit. τὸ μὲν ἔμψυχον τὸ ἀπὸ πάντων τῶν μέρων χεῖρμα πυχρῶν, ἔκ τινος ἀποπον. τὸ δὲ τῆς αὐτῆς ῥίζης τὸ μὲν ἄνω, τὸ δὲ κάτω καθαίρεται θυμασιώτερον, οἶον τῆς τε θαλάσσης, καὶ τῆς ἰχθύος (ὅτι ὁ ἄπιον χαλᾷσι) καὶ τῆς λιβανωλίδος. Id est, Non omnes eiusdem herbarum partes ad idem viles esse minimè absurdum fuerit. Sed radicis partē vnā

Lib. 9. hist. cap. 10.

APIOS, Fuchsj.

Cap. 46. hi. Lib. 4. c. 33.



per superiora, alteram per inferiora purgare admirabilius, vt Thapsia & Ischados, quam Apion vocant, & Libanotidis. Ab hac legitima Apio & facie & viribus longissimè abest ea quam Fuchsius Apion fecit. Dodonæus χαμαιβάλων vocat, id est, Glandem terrestrem, Germani *Erdnusz*, *Erdfeighen*. Cauliculos tres quatuorve profert, seu furculos teneros, paulum à terra rubescentes, cum capreolis, quibus vicinis sepibus, atque omnibus quæ nanciſci potest, sese alligat: folia parua, angusta, flores venustos, rubore tinctos odore non ingrato: siliquas exiguas semen exiguum cōcludentes. Radices longæ sunt, graciles, à quibus pendent bulbi parui napsi exiguis similes, glandium ferè figura, foris nigricantes, intus albæ, gustu ferè castaneæ. Prouenit copiosa in Hollandia, in frumentaceis agris, hordeaceis potissimum, & in sepibus. Sunt docti qui Astragalum esse arbitrentur. Matthiolus Pseudoapion vocat. Caule est multiplici, inquit, cubitali, quandoque maiore, humi procumbente. Viciæ ferè modo foliis oblongis & subasperis: floribus punice coloris, Pisi

æmulis, odoratis, racematim cohærentibus, quibus flaccescētibus siliquæ oriuntur, in quibus est semē. Radices habet Fici aut Pyri figura, ternas aut quaternas è fibris pendentes, nigra exteriore cute, alba interiore pulpa nulla purgatoria vi prædita. Floret Iunio mense. Passim nascitur in Boëmia præsertim in vineis.

ARVM.

CAP. XXXIII.

Nomina




PON Græcis, Arum Latinis, Syris *Lupha* dicitur, Arabibus & Officinis *Iarrus* & *Sara*. Quidam, quod folium vestigij bubuli effigiem præbeat, Pedem vituli appellant, Barbari *Aron* & *Barbam aron*, Draconteam minorem & Serpentariam minorem, quod Dracunculum amuletum sola magnitudine discrepans. Vulgus, quod pistillum promit exerti ferè genitalis effigie, Sacerdotis penem nominat, Germani *Pfaffen pint*, Itali *Aro* & *Gigaro*, Galli *Pied de Ueau*, & *Vid de prestre* Arum, vt describit Dioscorides, folia emit tit Dracunculo similia, sed longiora, & minùs maculata: caulem dodrātalem, purpascētem, pistilli figura, à quo Croci colore fructus exit. Radix illi candida, Dracunculo similis. Plinius Arum cum Dracunculo cōfundit de Bulbis agens. Est inter genera bulborum & quod in Aegypto Aron vocant, Scillæ proximum amplitudine

Li. 2. c. 162. Formæ.

plitudine: foliis Lapathi: caule recto, duum cubitorum, baculi crassitudine: radice mollioris naturæ, quæ edatur & cruda. Quibus ferè verbis Dracontium descripsit Dioscorides. Arum in siluis, locis vmbrosis, humidis & frigidis nascitur. Othcenis & Herbariis notum est, idque geminum. Etenim folia promit hederacea, cordi- Locus. ferè effigie, Dracunculi longiora, minimè dissecta, paucioribus & albis respersa

ARVM, Matthioli.



ARVM aliud minus, Matthioli.



maculis: caulem dodrantalem, album, in purpureum leuiter tendentè, è cuius fastigio erumpit inuolucrum, quod mucronata in turbinem vaginula pistillum complectitur, & suo fouet sinu. Verùm vbi fructu prægnaus fatiscit in hiatu, solida pistilli facies dilutiorè purpura rutilans emergit, & anfractu penitus tandem patente, primum viridia, dein crocea spectantur semina, quæ in coronæ modu concinnè cõtexta imam eius partem ambiunt. Radicem habet albam, bulbosam, oblongam, permultis stipatam fibris, Ellebori ferè modo, gustu perquam acri. Matthiolus scripsit, in Bohemiæ montibus quibusdam copiosum admodum cõuenire, sed Italico longè minùs, foliisque tenuioribus, & minori quoque radice. Quare hoc Arum minus vocat. Alteram Ari speciem ex Baldo monde à Francisco Calzolario ad Matthiolum missam hic etiam expressimus, cui folia sunt sagittæ speciem referentia, cau'is valde perspicuus, rubentium baccarum botrum in cacumine habens confertum, & in acutum desinentem. Radicibus nititur numerosis, tenuibus, circumquaque sese diffundentibus, è quibus bulbosi quidam globuli fabarum magnitudine dependent, alba intus pulpa, gustus acerrimi. Idem Matthiolus alio in loco aliud Arum, nimirum Aegyptium, depinxit, & eum, opinor, secutus Dodonæus, Exit, inquit, & in Aegypto Arum, sed ab Europeo diuersum, maius videlicet & latioribus foliis, quod plerique perperam Colocasiam appellant. Quos secutus est Clusius, vt ostendimus in Agro cap. de faba Aegyptia. In eadem est sententia Anguillara. Matthioli & Dodonæi sententiam Myconus approbat, non solum eam ex simili plantæ illius cum Aro sapore confirmans, sed multò certiore argumento, quod scilicet vaginam emittat Aro similè, petiolo crasso fultam, ex profundo & medio plantæ sinu ortum ducente. Primum intra vaginam, deinde extrà flores visuntur, postea semen racematim cohærens adnato illi longo ex vagina enato: folia & radix eadem quæ Matthiolus icone representauit, vt in hac nihil præterea spectare possis quam vaginam, flores, & semē racemosum. Flo-

rentem

In ca. 162. lib. 2.

In cap. 99. lib. 2.

Lib. purg. t. cap. 5.

Lib. 2. stir. Hist. pa. c. 19.

Lib. 2. c. 162.

ARVM *Aegyptium cum
flore, Myconi.*

Li.2. c.162.

Vires &
Temper.

Li.24. c.16.



rentem hanc plantam se vidisse ait Myconus Barcinone in horto Petri Gulielmi Regij pharmacopœi Barcinonensis. Radix Ari cocta estur, inquit Dioscorides, vt quæ minùs acris sit. Folia sale condiuntur ad esum, & arida per se decocta māduntur. Radix, semen, & folia eadẽ cum Dracunculo vires habent. Radix priuatim cū simo bubulo illita podagricis prodest, Dracūculi more reponitur. In totum ob mitiorem eius acrimoniam edendo est. Arum miris laudibus extulere Græci, vt scribit Plinius, primum in cibis fœminam præferentes, quoniam mas durior esset, & in coquendo lentior. Pectoris vitia purgare, & aridum in portione inspersum, aut ecligmate vrinam & menses ciere. Sic & in exymelite potum stomacho, interaneisque exulceratis ex lacte ouillo bibendum: ad tussim in cinere coctum ex oleo dedere. Alij coxere in lacte, vt decoctum biberetur. Epiphoris elixum imposuere: item fugillatim, tonsillis. Ex oleo hamorrhoidum vitio infundere, lentigines ex melle illinentes. Laudauit Cleophantus & pro antidoto contra venena: pleuritidis, peripneumonicis, quo tussientibus modo: semen intritum cum oleo aut rosaceo infundens aurium dolori. Dieuches tussientibus aut suspiriosis, & orthopnoicis, & purulenta excreantibus farina permixtum in pane cocto dedit. Diodotus phthificis è melle ecligmate, & pulmonis vitiis: osibus etiam fractis imposuit. Partus omnium animalium extrahit naturæ circumlitum. Succus radices cum melle Attico, oculorum caligines, ac stomachi vitia discutit, tussim decocti vis cum melle. Ulcera omnium generum, siue phagedænæ sint, siue carcinomata, siue serpant, siue polypi in naribus, succus mirè sanat; folia ambustis profunt ex vino & oleo cocta. Aluum inaniunt ex sale & aceto pota. Etiam luxatis cocta cum melle profunt: item articulis podagricis cum sale, recentia vel sicca. Hippocrates quilibet ad collectiones cum sale imposuit. Ad menses trahendos seminis vel radices drachmæ duæ in vini cyathis duobus sufficiunt. Eadem potio, si à partu non purgantur, & secundas trahit. Hippocrates & radicem ipsam apposuit. Dicitur & in pestilentia salutarem esse in cibis. Ebrietatem discutit. Serpentes nidore cum crematur, priuatimq; aspides fugat, aut inebriat, ita vt torpentes inueniantur. Perunctos quoque Aro & laureo oleo fugiunt. Ideo & contra ictus dari potu in vino nigro putant vtile. In foliis Ari caseus optimè seruari traditur. De eodem hæc statuit Galenus. Manditur Ari radix eodem modo quo Rapi. In quibusdam autem regionibus acrior quodammodo provenit, vt propè ad Dracontij radicem accedat. Et dum ipsam coquis, priore aqua effusa, in aliam calidam conuenit conicere. Ad Cyrenen planta hæc à nostrate est diuersa. Nam in illis locis Arum minimè est medicamentosum & acre, vt Rapis etiam sit vtilius. Perspicuum autem est, quòd talis in cibo quidem est præstantior. Si quis tamen humores crassos vel lentos in thorace vel pulmonibus collectos tussi velit eicere, acrior ac medicamentosa magis est præferenda. Non obscurum etiam est, quòd succus qui ex ipsa in hepar & totum corpus distribuitur, ex quo animalia aluntur, crassior quodammodo est, quemadmodum de Rapis dictū est: potissimum quum radices ipsæ qualitatis medicamento

Li.2. Alim.

dicamentosa fuerint expertes, cuiusmodi sunt, quæ Cyrene adferuntur. Quandoquidem apud nos in Asia Arum magna ex parte est acrius, facultatemque habet iam medicamentosam. Et alio in loco. Arum terrena essentia constat, sed calida. Quare extergendi vim habet, verum non valentem, sicut Dracontium. Est itaque in exsiccando & exsalfaciendo primi ordinis. Radices eius maximè sunt viles: siquidem comestæ crassitiem humorum mediocriter incidunt, adeo ut & excreationibus ex pectore viles sint. Vbi Galenus de Aro quod non vehementi acrimonia pollet, locutus est. Est enim haud dubiè quod in tertio ordine calidum & siccum est, ob multam qua præditum est acrimoniam. Lib. 6. sim.

ARISARVM.


CAP. XXV.



PISAPON & Aëis Græcè, Arisarum Latinis & Aris Plinio. Apud Hippocratem *æeïs* non pro herba, sed pro instrumento chirurgico legitur. Galenus autem in Glossis Hippo. ait. *Æeïs* ἔ μόνον τὸ ὄργανον, ἀλλὰ καὶ βοτάνη τις οὕτως ὀνομάζεται. Aris non solum instrumentum, sed herbam significat. Arisarum tradit Dioscorid. paruam esse herbulam, quæ radicem habet oleæ magnitudine, maioris quàm Arum acrimoniæ. Eius post Arum & Dracunculum meminit Plinius his verbis. Est & Aris quæ eadem in Aegypto nascitur, similis Aro, minor tantum, minoribusque foliis, & vtiq; radice, quæ tamen oliuæ grandis magnitudinem implet: alba geminum caulem, altera vnum tantum emittens. Hæc Plinius. Huius plantæ genera duo Herbarij ostendunt. Matthiolus prius, cui folia sunt Aro similia, à Luca Ghinose accepisse ait, alterum ab Anguillara, quod non approbat, neque verum putat. Totidem statuit Clusius, prius latifolium, alterum angustifolium. Latifolium Hederæ aut Smilacis ferè folia habet tria aut quatuor, satis carnosæ, mollia, viridia, & acria, oblongo fulta pediculo, qua illi adhærent vtrinque pinnata, vti Ari folia, sed obtusioribus multò Nomina Lib. de Art. Li. 2. c. 163. Forma. Li. 24. c. 16. In cap. 163. lib. 2.


ARISARVM prius,
Matthioli.

ARISARVM alterum,
Matthioli.



angulis. Inter hæc pediculus duorum vel trium digitorum longitudine multis rubris maculis variegatus erumpit, cui oblongus flos infidet, cuculli monachi, seu floris Aristolochiæ modo efformatus, amplior tamen, extrema parte nigricantis coloris qui deorsum radiatim definit, in cæteris candidus, caninum olens, & qui pistillum obtusum incuruum, & veluti ex cucullo spectans continet: radix rotunda & globosa, Aro minor, foris nigricans, intus alba, interdum tuberosa & oblonga, initio dulcis, deinde acris, non adeò tamen vti Ari radix (licet veteres contra

ARIS ARVM cum flore
Myconi, angustifolium.



sentiant) fibris aliquot super eam expansis. Istud à pictura Arisari prioris Matthioli aliquatenus diuersum est. Alterum Clusij Arisarum planè diuersa est forma: eius enim folia oblonga sunt & angusta, Plantaginis angustifoliæ ferè modo, viridia & splendentia, quinque aut sex, post quæ flos seu cucullus oblongus, mucronatus, & retrorsum inflexus candicansque prodit, è cuius rima longus veluti vermis exilit, spithamæ interdum longitudine, inflexus, nunc purpurascens, nunc ex purpureo virescente colore, extremo non obtusus, sed acuminatus: fructus racemosus, albus, non ruber (vt quidam, qui non obseruauerunt, prodidere) vixque terra emergens. Latifolium in collibus Lusitaniæ frequens est, solo lapidoso, in sepibus iuxta vias, vbi Nouembri & Decembri floret, atque nonnullis etiam Beturiæ locis solo sæcundo & pingui, iuxta semitas & aggeres, vbi Ianuario & Febuario. Lusitani *Aro* vocant, quod nomen etià Aro commune est, Hispani *Fraillos*, id est, fraterculos, fortasse quæ eius flos cucullum monachi æmuletur. Alterum genus in vmbrosis ad olearum ra-

trices nascitur post urbem Olyssiponem. Secundum hoc Arisarum cum flore Myconus ex Hispania misit, in cuius historia à Clusio in quibusdà dissidet. Ex eius icone, inquit ille, agnoscet omnes Ari seu Arisari speciem esse. Inuolucrum enim habet oblongum, intus rufum, aliquantulum fætidum, eiusdem cum Dracuculi inuolucro coloris. Intra hoc semen continetur in processu longo, supernè læui, infernè versus radicem aspero, racematim cohærens, cum maturuit rubrum. Hanc plantam Guadalupi iuxta Carpentaniam collegisse ait. Arisari radix, auctore Dioscoride, illita nomas sistit. Fiunt collyria ex ea ad fistulas. Corrupta ea indita cuiusvis animalis pudendum. Quæ sic tradit Plinius. Medetur vtrique radice vlceribus manantibus: item combustis ac fistulis. Collyrio immisso nomas sistunt, decoctarum in aqua, & postea tritarum. Sed vnum miraculum ingens, contactu genitali cuiuscunque fœminini sexus, animal in perniciem agi. Quæ cum mendosa sint, vt ex Dioscoride intelligere licet, sic ex vetere codice emendat Cornarius. Fistulis collyrio immissa. Nomas sistunt decocta folia in aqua, & postea trita rosaceo addito. Arisarum scribit Galenus multò minus esse Aro. Radicem habere oliuæ magnitudine, sed multò esse acrius.

Li. 2. c. 163.

Vires.

Li. 24. c. 16.

Lib. 6. sim.

DRACON



GRAECIS *Δρακόνιον*, & *Δρακονία*, Dracunculus Latinis, *Serpentaria*, *Nomina*
 & *Colubrina*, Arabibus *Luf*, *Alluf*, Italis *Dragontea*, Gallis *Serpentaire* &
Serpentine, Germanis *Schlaugenkraut*. Nomen autem à figura sumptit:
 caulis enim glaber purpureisque respersus maculis, versicolori facie
 corpus anguinum repræsentat æquali longitudine. Vertex quoque sinuoso oris
 hiatu linguam exerens cruentam, caput exprimit. In antiquissimis Græcis Diosco- *Genera.*
 ridis codicibus teste Marcel. Vergilio duo de Dracunculo capita leguntur, vnum
 de maiore, alterum de minore. At neque Galenus, neque post Galenum Paulus
 Aegineta diligentissimus in Græcis medicinae auctor, & qui Dioscoridis dicta
 vbiq; bona fide retulit, Dracunculum priorem nouerunt, neque post Græcos
 Latini scriptores, Apuleius, Serapio, &, quod multi apud omnes momenti esse de-
 bet, in vetustissimis Latinis codicibus, vnicum est duntaxat Dracunculi caput, al-
 terius vestigium nullum. Præterea de vtroque eadem ferè traduntur, sed diuersis
 verbis, vt ex alio auctore id caput adscriptum fuisse videatur. Quare viri docti
 supposititium esse illud censuerunt, quod *Δρακονίαν μεγάλην* describit: ideoque
 ipsum hoc loco exemerunt, & inter notha retulerunt. Plinius tamen, qui Arum
 cum Dracontio confundit, plura eius genera facit his verbis. Quæ & Aron ma- *Li. 24. c. 16.*
 gnæ cum Dracontio litis. Quidam enim eandem esse dixerunt, Glaucias fatu dif-
 creuit, Dracontium siluestrem Arum pronuntiando. Aliqui radicem Arum ap-
 pellauerunt, caulem verò Dracontium, in totum alium si modò hic est, qui apud
 nos Dracunculus vocatur. Namque Aros radicem nigram, in latitudinem rotun-
 dam habet, multoque maiorem, & qua manus impleatur: Dracunculus subruti-
 lam, & draconis conuoluti modo, vnde ei nomen. Quin & ipsi Græci immen-
 sam posuere differentiam, semen Dracunculi feruens mordaxque tradendo: tan-
 tumq; inesse ei virus, vt olfactum grauidis abortum inferat. Idem paulò inferiùs.
 Dracunculus, quem dixi, Hordeo maturescente effoditur Luna crescète. Omnino
 habentem serpentes fugiunt. Ideò percussis prodesse in potu aiunt maiorem, vt
 & menses, si ferro non attingatur, sistat. Succus eius & aurium dolori prodest. Id
 autem, quod Græci Dracontium vocant, triplici effigie demonstratum mihi est,
 foliis Betæ non sine thyrso, flore purpureo. Hoc est, simile Aro. Alij radice longa,
 veluti signata, articulosaque monstrauere tribus omnino cauliculis, folia eius ex
 aceto decoqui contra serpentium ictus iubentes. Tertia demonstratio fuit, folio
 maiore quàm Cornus, radice arundinea, totidem, vt affirmant, geniculata nodis,
 quot haberet annos, totidémque esse folia. Hi ea ex vino vel aqua contra serpentes
 dabant. Theophrastus quoque quoddam Ari genus Dracontium appellari scribit *Lib. 7. hist. cap. 11.*
 his verbis: *ὅτι τὸ Δρακονίον (χαλῶσι γὰρ τὸ Δρακόνιον, ἄρον, διὰ τὸ τὸν χαλὸν ἔχειν τινὰ
 πικρίαν) ἀβρωῖος καὶ φαρμακώδους*. Est Dracontij radix (vocant enim quoddam Ari
 genus Dracontium, quòd caulem habeat variegatum) ad esum inepta & medica-
 mentaria. De Dracunculo Dioscoridis ab Aro diuerso hîc agimus, quem scribit *Lib. 2. c. 16.*
 folia habere Hederæ similia, magna, albis maculis notata, caulem rectum bicubi-
 talem, varium, anguis specie, purpureis notis aspersum, baculi crassitudine: fructus *Forma.*
 est in summo racemosus, colore primum herbaceo, & cùm maturuit croceo, gu-
 stui mordax. Radix quodammodo rotunda est Bulbi specie, Aro similis, corticem
 habēs tenuem. Nascitur locis vmbrosis circa sepes. Hic Dioscoridis Dracunculus *Locus.*
 doctis Herbariis, vt Fuchsio, Dodonæo, Penæ, Serpentaria est maior vulgò dicta,
 foliis hederaceis, maculas albidas habentibus: caule recto, glabro, læui, extima cu-
 te serpentis exuium maculis albis, fuscis, vipereis, pullis, puniceis, giluisque, tran-
 uersis, obliquis & fortuitis adeò exprimente, vt eminus repentè intuenti horro-

DRACUNCVLVS *sive Serpentaria maior*, *Dodon.**SERPENTARIA minor*, *Matthioli.*

pentaria, è radice fibrosa, geniculata, latiùs serpente, & multis fibris humi depacta, nullo bulbo appenso aut annexo, vrente gustu & crustas excitante. Iuxta riuulos & labentes aquas frigidarum & calidarum regionum, vt in Belgio, Northmânia, Apulia, Hispania Granata sponte emergit. Inde in hortos suos alij transplatarunt.

Serpenta

rem incutiat, sescquicubitali, bicubitaliç, in cuius summo ex vaginula emicat cõgestus in conum racemus, planè Ari, cui radix etiam nõ ab- similis, rotunda, maior, sescque in latera propa- gans. Qui hanc Dracontium Dioscoridis esse negant, folia hederacea obiciunt, quòd nõ sint huiusmodi. At illi, inquit Pena, actum agunt, nempe monent propter consecutionem & ar- ctam similitudinẽ folia Dracontij dicta fuisse hederacea, cùm potiùs folia Ari hederacea de- buerint dici, quia huius postea conferuntur cū foliis Dracunculi & radice. Vbi Dioscorides ad vniuersum habitum plantæ respexit, foliorum læuorem, virorem, colorem nitidum super- ficiei contulit, quia essent perquam affines plan- tæ, vt vides in collatione radicis: vbi singularis numeri nulla expressione maioris aut minoris Dracontij bis repetit collationem. Nec vniuer- so tractu Græciæ ab iis qui eam lustrarunt, eo- dem Pena teste, vlla alia vsquam visa Serpenta- ria quàm ista, quæ etiam non procul mœniis Monspelij inter segetes, Gladiolos, & Hyacin- thos læta exit, alibique in pinguibus aruis non diuersa, nisi ætate, quando decussis seminibus, & summitatibus effractis à præreuntibus, fre- quenter repullulant nouellæ. Quæ potuerunt Plinio persuadere, vt plures cõstitueret species Dracunculi, misceretq; Ari, Arisari cognatas differentias, vt in Bechio, aliisq; locis illi conti- git. Nec alterius plantæ videtur geminata de- scriptio apud Dioscoridem, sed ab alio quopiã paulum diuersæ, vt ferè fit, descripta. Eandem Serpentariã Matthioli Dracunculum mino- rem facit, maiorem longè aliam, cuius radix est Rapi effigie, quam tamẽ non describit, vtrun- que se Tridenti ac Venetiis vidisse affirmans. Vbi sepius se frustra sciscitatum fuisse ait Pena: negauerunt enim Patauini, Veneti, Veronenses pharmacopœi, & doctissimi cõplures vsquam sibi visam: negauerunt item Cortusus & An- guillara Penæ anxie sciscitari. Adiecerunt Her- barij Dracunculum palustrem, quem Arum pa- lustre vocat alij, Gallicè *Serpetaire d'eau*, vel *aqua- tique*, q̃ folia promit hederacea, maiora, super- ne acuta è caule rotundo, humili, vix palmari: florem rubellum, odorem, non absimilem Ser-

SERPENTARIA maior,
Matthioli.

DRACUNCULVS palustris.



cum aceto: tum folia, vt pote similem facultatē habētia, vlceribus, vulneribusq; recēs inflētis accōmoda sūt, & quantō minūs fuerint sicca, tātō magis cōglutināt. Nā quæ sicciora sūt, viribus sūt acrioribus, quā vltius reponatur, ob tēperaturē illorū sicutatē, à putredine cōseruari. Fructus valētior est nō foliis tantū, sed & radice. Itaq; & cācros & polypos eliquare creditus est. Succ^o quoq; eius vitia oculorū expurgat.

Serpentarię succus, auctore Dioscoride, ex semine expressus & cum oleo in aurem infusus, eius dolorem sedat. Lana exceptus & naribus inditus polypum consumit. Illitus carcinomata cōpescit. Triginta eius grana cum posca pota abortum faciunt. Odorem, postquā flores emarcuerunt, recens conceptos fœtus enecare aiunt. At radix calfaciendi vim habet: orthopnoicis, ruptis, vulsis, tussis catharro auxiliatur. Humores pectoris excreatu faciles reddit tum cocta, tum assata, cū melle & per se ipsam in cibo accepta. Eadem arida trita cum melle delingitur. Vrinā ciet, & venerē stimulat cum vino pota. Vlcera maligna & phagedænica addita Bryonia alba, cum melle trita repurgat, & ad cicatricem perducit. Collyria item ex ipsa fiunt ad fistulas & fœtus extrahendos. Eum, qui radice manus suas conficauerit, à viperis feriri negant. Expurgat vitilignes cum aceto illita. Folia trita linamentorum vice recentibus vulneribus induntur. Eadem in vino cocta & imposita ad perniones faciunt. Et caseus foliis inuolutus à putrefactione tutus manet (Hoc foliis Ari Plinius adscripsit, vt suprā diximus.) Succus autem radice ad nubeculas, albugines & caligines conuenit. Radix ad sanorum vsus oleris vice est, cruda coctāve editur. Dracunculi radicem bis ter v̄e elixantes, quoad medicamentosum omne deponat, nonnunquam exhibemus mandendam, inquit Galenus, quēadmodum Ari: quando humores crassi & lenti, qui in thorace ac pulmonibus cōtinētur, vi maiore indigent. Et alio in loco, Dracontium, ait, quiddam Aro persimile habet tum foliis, tum radice. Cæterum illo tum acrius est, tum amarius: quare calfactorium magis, tenuioribus partibus. Habet etiam leuiculam quandam adstrictionem, quæ quandoquidem cum prædictis duabus qualitatibus, acri scilicet & amara coniuncta est, medicamentum factū est, vt quæ maximè efficax. Nam radix viscera omnia expurgat, crassos potissimum & lentos succos extenuans: optimūq; remedium est cōtumacium vlcus. Expurgat extergetq; strenuè tum alia, quæ extersionem desiderant, tum vitiliginē

Li. 2. Alim.

Lib. 6. sim.

Nomina



ΥΚΛΑΜΙΝΟΣ vel ἰχθυόνηρον Græcis, Cyclaminus, Rapum, & Tuber, Umbilicūque terræ Latinis, Cyclamen Officinis mutata voce, Panis porcinus & terræ, atque Archanita à nostræ ætatis Herbariis dicitur, Mauritanis *Buchormarien* *Bulhermarien*, seu *Bothormarie*, Italis *Ciclamino*, & *Pan porcino*, Gallis *Pain de pourceau*, Germanis *Erduurtz*, & *Schuenbrot*.

Cyclaminum Græci ἀπὸ τοῦ κύκλου, id est, ab orbe dixerunt, tum ob folij circinatum ambitum, tum ob orbiculatum radicis bulbum. Ichthyotheron autem, quod ea pisces necantur. Romani Rapum terræ, quoniam eius radix in terra velut Rapum extuberat: qua sanè ratione Tuber terræ, quod in molem quandam intumeat, aut Umbilicum terræ, quoniā, ut umbilicus circinata figura emergit, sic & Cyclaminus sub terra conspicitur, etiam appellarunt. Panem porcinum haud dubiè primū vocarunt subulci, qui pecori suo radicem huius gratam pabulis cognouerunt. Alij quia radicem in orbem circumactam sæpius intueretur, quæ non in globum intumescens, sed veluti compressa sese in latitudinem explicaret, qua forma in quotidiano vſu panes videntur, Terræ panem nominauerunt. Cyclamini species duas ponit Dioscorides. Cyclaminus prior folia habet Hederae similia, purpurea, varia, suprà infrāque albicantibus maculis: caulem longitudine quatuor digitorum, nudum, in quo flores Rosarum effigie, purpurei: radicem nigram, Rapo similem, & aliquantum latam. Nascitur in vmbrosis, maximè sub arboribus. Cyclaminus altera, quam Cissanthemon, alij Cissophyllū vocant, folia habet Hederae, sed minora: caules crassos, geniculatos, qui vicinis arboribus capreolorum modo se obuoluūt: flores albos, odoratos. Fructus est velut vuar acini, similis, Hederae mollis, gustu leuiter acris & viscosus. Radix inutilis est. Nascitur in locis asperis. Duas etiam species describit Plinius, Dioscoridem ferè exprimens his verbis. Folia habet minora quàm Hedera, nigriorāque & tenuiora, sine angulis, in quibus albicant maculae: caule exiguo, inani: floribus purpureis: radice lata, ut Rapū videri possit: cortice nigro. Nascitur in vmbrosis: nostris Tuber terræ vocatur. Et paulò post de altera sic. Est & altera Cyclaminus cognomine Cissanthemos, geniculatis caulibus, superuacuis, à priore distans, circa arbores se voluēs: acinis Hederae, sed mollioribus: flore cādido, specioso: radice superuacua. Mihi & tertia Cyclaminos demonstrata est, cognomine Chamæcissos, vno omnino folio: radice ramosa, qua pisces necantur. Hæc Plinius. Prior Cyclaminus nota est Officinis & Herbariis sine cōtrouersia: altera non item. Matthiolum duas Cyclamini primi generis species Mesue auctore reperiri dixit, minorem & maiorem. Minorem se vidisse ait in agro solum Tridentino in vallis Anania montibus, vbi copiosè nascitur. Sed eam neque depinxit, neque descripsit: dixit tantum radice esse parua, nucis aulanæ cicerumque magnitudine. Cyclaminum secundam fatetur se non vidisse. Tragus in Heluetia, non procul à Curia oppido, nec non prope Velcurium, in planitie inter quædam densa

Genera.

Forma.

Locus.

Lib. 25. c. 9.

CYCLAMINVS vulgaris,
Lobellij.

Ibidem.



Lib. 2. c. 75.

læ: caule exiguo, inani: floribus purpureis: radice lata, ut Rapū videri possit: cortice nigro. Nascitur in vmbrosis: nostris Tuber terræ vocatur. Et paulò post de altera sic. Est & altera Cyclaminus cognomine Cissanthemos, geniculatis caulibus, superuacuis, à priore distans, circa arbores se voluēs: acinis Hederae, sed mollioribus: flore cādido, specioso: radice superuacua. Mihi & tertia Cyclaminos demonstrata est, cognomine Chamæcissos, vno omnino folio: radice ramosa, qua pisces necantur. Hæc Plinius. Prior Cyclaminus nota est Officinis & Herbariis sine cōtrouersia: altera non item. Matthiolum duas Cyclamini primi generis species Mesue auctore reperiri dixit, minorem & maiorem. Minorem se vidisse ait in agro solum Tridentino in vallis Anania montibus, vbi copiosè nascitur. Sed eam neque depinxit, neque descripsit: dixit tantum radice esse parua, nucis aulanæ cicerumque magnitudine. Cyclaminum secundam fatetur se non vidisse. Tragus in Heluetia, non procul à Curia oppido, nec non prope Velcurium, in planitie inter quædam densa

CYCLAMINVS

prior, Matthioli.



ac vlginosos locis sita arbuta, plantã quendam nasci scripsit elegantissimam, foliis rotundis, prorsus cõsimilem Asaro, ita vt primo quidem intuitu Asarum esse crederet. Sed cùm eam effodisset, radicem deprehendit rotundam, rufam, magnitudine radicis Croci, gustu aliquantulum amaram : flores odoratissimos, Bieslij colore tinctos, odore & forma Violam Martiam purpureã referentes. Hanc ille Germanicè *Valdzeitlosen* nominat. Quam cùm Hermodactylum esse aliquando falso credidisset, postea Cyclamini exigua verã speciem esse iudicauit, quia Cyclamino priori per omnia respondet, nisi quod non perinde acris est & feruens. Nascitur etiam in vmbrosis siluis. Dodonaus Cyclaminum alteram esse arbitratur, quã hodie *Vitalba*, Gallis *Viorne* nuncupatur, Cordus Dulcamaram, alij Bryoniam nigram, alij Periclymenum alterum, aliis aliã magis placent. Pena in montibus Alpini Rheticis in Italiam proficiscentibus, locis vdis, & saxeis itineribus obuiam passim esse alteram Cyclaminum scribit, quã non est folio circinato Asari, aut vulgaris Cyclamini, sed poti-

Trag. lib. 2.
cap. 134.Lib. 3. cap.
11. & 48.

tius triplici mucrone distincto, herbæ Trinitatis, aut Hederæ helicis modo. Eandẽ etiam Narbonæ riguis montibus & hortis crebram. Eius radices quæ vetustiores, magnitudine alterius sunt, quæ nouellæ, adeò exiguæ, vt auellana magnitudinem vix superent. Adultioribus caulis est exilis, teneriusculus, & in humum pronus, ex quo prælongis pediculis folia surrecta fastigium versus, vbi sunt flores purpurei, vulgaris Cyclamini prorsus similes. Nonnunquam & luteos verno tempore exortos nondum foliis exortis meminisse vidisse. Florent enim Vere & Autũno interdum odorati, aliàs non. Lobellius Cyclamini alterius, plantæ hederaceæ foliis in Italiæ collibus repertæ, rei herbariæ studiosis iconem hanc & descriptionem exhibet. Herba est Hederæ foliis sinuatis, paribus, in mollibus, flexilibus, cubito prolixioribus cauliculis, floribus oblongis, galericulatis, ex purpura pallentibus. Dodonaus tradit præter Cyclaminum alterum Dioscoridis, eius qui orbiculari est radice, nempe primi, à recetioribus aliquot obseruatas fuisse species, & foliis quidem differentes. Prima foliis virescentibus, angulosis ac Hederæ similibus, in ambitu leuiter serratis, superiore parte in virore nigricantibus, albicantibus tamen maculis variegatis, & vmbilico siue medio folij subalbido, inferiore verò ac prona purpurea, aliquando saturato colore, aliàs dilutiore. Flosculi ex tenellis pendent pediculis, deorsum nutantes, foliolis earum sursum reflexis, & purpureo Violæ nigre colore non tamen intenso splendentes, odoris exigui. Succedunt capitula seminfera, pediculis in spicas contortis. Radix Bulbi aut Rapi modo in orbẽ circumacta, & aliquantulum in latitudinem pressa, foris nigricat, intus candida, rugas inarefcentes contrahit. Hanc speciem pinxit etiam Lobellius nomine Cyclamini folio Hederæ. Alterius Cyclamini & lata quidem sunt folia, sed non angulosa, verum quasi rotunda, nullis superiùs aut omnino obscurissimis apparentibus maculis, saturo colore virentia, inferiùs verò è punicante purpura rubentia : flores prioris similes, at odoratiores : radix aliquantò minor. Tertia species foliis est similiter haud angulosis, sed ambitu eorum aliquantulum crenato : maculata hæc sunt, sed

Li. de pur
ga. cap. 13.

CYCLAMINVS altera
hederaceis foliis, Lobell.

CYCLAMINVS altera
orbicularis, Dodon.



Li. 2. ca. 1. 8.
Vires &
Temper.

umbilico nigriore. Flos intensiore colore purpurascit, odoris suauissimi: radix quàm aliarum minor. Hæc ex Dodonæo. Vires Cyclamini non vulgares has edocet Dioscorides. Radix Cyclamini cum hydromelite pota pituitam aquamque per inferna trahit: menses pota & appositâ cit. Tradunt si prægnans mulier radicem transgrediatur, abortum fieri. Partum appensa accelerat. Bibitur & in vino cōtra lethalia, præsertim leporem marinum. Illita contra serpentium ictus remedio est. Immista vino ebrietatem facit. Regium morbum sistit tribus drachmis pota cum passo, aut diluta mulsâ. Sed oportet eum qui bibit cubiculo calido reclinare multis vestibus contextum, quo sudet. Eiectus verò sudor felleus colore inuenitur. Succus eius ad purgandum caput naribus instillatur. Ad deiicienda etiam excrementa in lana subiicitur. Umbilico, imò ventri, & coxæ illitus succus aluum mollit, (pro κοιλίαν μαλαώσει, vetus codex habet κοιλίαν παράπλη, id est, aluum turbat. Quæ lectio videtur alteri præferenda, quia purgationes, quas molitur Cyclaminus potus admotusque, sunt admodum violentæ & difficiles) verum abortum efficit. Suffusus & hebetibus oculis inunctus cum melle succus prodest: medicamentis abortum facientibus admiscetur. Sedem procidentem cum aceto inunctus compescit. Exprimatur succus tusa radice, & ad mellis crassitudinem decoquitur. Radix autem extergit, exanthemata reprimi, vulneribus per se ex aceto, aut melle medetur. Illita lienem minuit, vitia cutis in facie à Sole, & alopecias emendat. Decocto eius luxata, podagra & capitis vlcuscula (ἐλκύνδεα, id est, manantia vlcera) pernionesque vtiliter fouentur. Ipsaque in vetere oleo feruefacta, ad cicatricem perducit quæ oleo illo inuncta fuerint. Cauata radix oleo repletur, & cineri feruenti imponitur, adiecto interdum Tyrrhenicæ ceræ modico, vt strigmenti crassitudinē cōtrahat vnguentum, cū primis vtile pernionibus. Radix Scillæ modo confisa reponitur. Narrant ad amatoria assumi contusam, & in pastillos cōformatam. In veteri codice pro κοπήσαν, id est, contusam, legitur καύσαν, id est, combustam.

Cyclamini

Cyclamini alterius fructus drachmę vnus pōdere potus cū vini albi cyathis duobus, quadraginta diebus splenem liquat, ita per vrinam & aluum consumens. Bibitur & ad orthopnœam, & reliquias à partu purgat. Eadem vires variis in locis exponit Plinius. Bibitur Cyclamini radix, inquit, contra serpentes omnes, in omnibus ferenda domibus, si verum est, vbi sata sit nihil nocere mala medicamenta, amuletum vocant: narrantq; & ebrietatem representari addita in vinum. Radix siccata Scillæ modo concisa reponitur: decoquitur eadem ad crassitudinem mellis. Suum tamen venenum ei est: traduntq; si pręgnans radicem transgrediatur, abortum fieri. Lepori marino aduersatur & Cyclaminus. Purgat cum melle in nares addita, & vlcera capitis sanat illita. Ad hypochoysim & caliginem Cyclaminū in pastillos diluunt. Soluit ex aqua pota, aut balanis subditis sedem conuersam Cyclamini radix ex aceto sanat. Eius radicis decoctum pernionibus prodest. Eruptiones pituita eadem emendat cum melle. Tribus drachmis bibitur in loco calido, & à perfrictionibus tuto: sudores enim felleos mouet. Sanguinis profluuium sistit Cyclaminus, si ore sanguis reiciatur, siue è naribus, siue aluo fluat, siue feminarum vtero. Vlcers manantia sanat Cyclamini radix, vel per se, vel ex aceto, vel cum melle. Eadem & contra steatomata efficax. Omnia corpori infixia extrahuntur Cyclamini radicibus cum melle: cutis maculas omnes emendat. Theophrastus de Cyclamini prioris viribus hæc prodidit. τῷ δὲ κυκλαμίνῃ ἡ μὲν ῥίζα πρὸς τε τὰς ἐκπνέουσας τῶν φλεγμονῶν, καὶ προσθεῖον ταῖς γυναιξί, καὶ πρὸς τὰ ἔλκη ἐν μέλει. ὁ δὲ ὀπὸς πρὸς τὰς ἀπὸ τῆς κεφαλῆς χαθάρσεις ἐν μέλει ἐγγεθύμνος: καὶ πρὸς τὸ μεθύσκεν, ἀν ἐν οἶνῳ διατρέχων διδῶ τις πικρὴν ἀγαθὴν διὰ καὶ τὴν ῥίζαν ἢ εἰς ἀκνιόκιον περιέπιπν, καὶ εἰς φίλιρα. ὅταν δὲ οὐρύξῃσι, καὶ σταγύξῃσι. Ἐτα οἶνῳ διδάσαντες, προχέσκουσ ποτίζουσ ὡς τῆς πυργός, ἢ ῥυπλιόμεθα. Id est, Cyclamini radix ad inflammationum exhalationes valet, & ad menses subdita, & ad vlcera ex melle. Succus autem ad purgandum caput cum melle infusus, & ad ebrietatem, si vino inspersum potui dederis. Confert & radix ad partus celeritatem appensa, & ad amatoria. Cum autem effoderint, vrunt: deinde cum vino subegerint, in pastillos formant sicuti facis vini, qua maculæ absteruntur. Cyclaminus vterque, auctore Mesue, est medicamentarius, calidus siccus initio tertij ordinis. Galenus gradus non finit, sed absterget, inquit, incidit, ora venarū aperit, attrahit, digerit, quod ex particularibus operibus eius perspicuū est. Nā succus eius hæmorrhoidas reserat, violentérque ad secessum prouocat in floccis appositus. Sic etiam medicamentis phymata, strumas, aliásque durities digerentibus commiscetur, ac suffusus cum melle illitus competit: adhæc per nares quoque expurgat. Adeo vehemens eius facultas est, vt abdomine illito ventrem subducatur, & fœtum interimat. Nam & alioqui validum interimendo fœtui medicamentum est in pessa additus. Tota autem radix succo imbecillior est, quanquam & ipsa vehemens sit: nam & menses siue pota, siue apposita euocat, & aurigini prodest, non modo ipsum viscus expurgans, sed etiam quæ in toto corpore bilis fuerit, eam per sudorem eiiciens. Proinde post potionem, sudoris adiuvanda prouocatio est. Modus eius bibendi est drachmarum trium, siue cum melicrato, siue cum passo. Cutem detergit cum in aliis, tum quod alopecias, ephelidas, omniâque exanthemata curet: lienem quoque induratum iuuat emplastri modo illita tum recens, tum arida. Sunt qui radicem siccam asthmaticis exhibeant. Porro altera Cyclaminus radicem quidem superuacaneam habet, sed fructum admodum efficacem: nam hic cum vino pluribus diebus potus lienes sanat, vrinam mouens, ac vëtre subducens: locos quoque eiicit, & asthmaticis prodest. Qualitas eius gustanti acris est & sublenta. Hæc Galenus. Cyclamini alterius vires, inquit Pena, communi priores, & vsus frequens Narbonensibus ad Hispanicam luem.

Lib. 25. c. 9.

Lib. 9. hist. cap. 10.

Li. 7. simpl.

Nomina

Li. 3. ca. 49.

Forma.

Locus.

Li. 17. ca. 11.

Vires.

Temper.

Ibidem.

Lib. 7. sim.



RAECI λεοντοπέταλον vocant, Latini Leontopetalon, id est, Leoninum folium. Caulem, vt describit Dioscorides, emittit dodrantalem, aut etiam maiorem, plurimas alas habentē, in quarum cacuminibus siliquæ sunt veluti in Cicere, & in his duo aut tria parua semina; flores puniceï, Anemonæ similes: folia similia Brassicæ, incisa foliorum Papaueris modo: radices nigrae, Rapo similes, eminentias habētes veluti nodos quosdam. Nascitur in aruis ac segetibus. Sic planè descripsit Plin. Leontopetalon alij Rapheion vocant, folio Brassicæ, caule semipedali: alæ multæ, semē in cacumine in siliquis Ciceris modo: radix Rapo similis, grandis, nigra. Nascitur in aruis. Hanc plantam, eiuſque nigram extuberantemq; radicē Rapi instar vidisse se ait Matthiolus non modò Venetiis & Patavij in quibusdam hortis, verum etiam in Hetruriæ aruis, aliisque Italiæ locis, nascique frequentem in Apulia. Huius radix, inquit Dioscorides, in vino

pota auxiliatur demorsis à serpentibus, breui dolorem omnem sedans. Miscetur etiam infusus per clysterem in coxendicum affectione. Sic & Plinius. Radix aduersatur omnium serpentium generibus ex vino pota: nec alia res celerius proficit. Datur & ischiadicis. Leontopetali radice maximè vtimur, inquit Galen. Digerēdi facultatem, exsiccandi, exsiccandi in tertio ordine possidet.

COTYLEDON. CAP. XXIX.

UMBILICVS Veneris, Matt.

Nomen.

Li. 4. ca. 87.

Forma.

Lib. 25. c. 13.

Vires.



ΚΟΤΥΛΗΔΩΝ Græcè, Latine Cotyledon, Acetabulū, Umbilicus Veneris nominatur, Italicè *Ombilico di Venere*, in Hetruria, quod eius folia nectilium operculis similia sint, *Copertoiole*, Hispanicè *Scudetes*, Gallicè *Eſcuellles*. Dicitur autē Cotyledon à concauo folio acetabulū aut umbilicum imitato. Folium enim habet, inquit Dioscorides, rotundum, acetabuli figura, ineuidenter cauum: caulem in medio breuē, in quo semen est: radicem rotundam oliuæ modo. Sic delineauit Plinius. Cotyledon paruula herba, cauliculo tenero, pusillo, pingui folio & concauo, vt coxendices. Nascitur in maritimis petrosilq; viridis, radice oliuæ modo rotunda. Hæc Plinius. Vulgaris est notitiæ planta, à Matthiolo rectè depicta. Radicis & foliorum succus circumlitus aut infusus contecta genitalia nudat, auctore Dioscoride. Inflammationibus, erysipelatis, pernionibus, strumis, & stomacho æstuanti auxiliatur. Folia cum radice comesta calculos

calculos atterunt, vrinas cient, hydropicis cum vino mulso dantur. Herba vtuntur ad amatoria. Plinius, Oculis medetur succo. Et, Calculos herba & radix Cotyledonis sanat: itémque genitalium inflammationem omnem, pari pondere caulis & seminis, & myrrhæ. Cotyledon condylomata & hæmorrhoidas mirè curat. Et perniunculos curat cum axungia. Galenus sic definit. Cotyledon facultatis est mixtæ, nempe humidæ, subfrigidæ, & cuiusdam obscure adstringentis, & cum ea leuiter amaræ. Vnde refrigerat, repercutit, abstergit & discutit. Itaque phlegmonas erysipelatodeis, & erysipelata phlegmonode curat: & maximè stomachi ardore æstuantis admodum vtile est cataplasma. Putantur folia cum radice manducata calculos confringere, & vrinas mouere.

Lib. 25. c. 13.
Li. 26. ca. 8.

Li. 7. simpl.

I R I S. CAP. XXX.

I P I S Græcis, Iris Latinis appellatur. In quibusdam Theophrasti & Athænei codicibus *ieeis* legitur, ob id à Gaza Consecratrix vertitur. A cælestis arcus similitudine, quam flores eius representant, nomen accepit Iris. Eadem de causa *ieeis*, *εἰς πᾶν*, & *ἱερμαστος*, id est, sacra, cælestis, & admirabilis dicta est. Arabes *Asmeni iuni*, siue *Aierfa* vocant, Itali *Iride*, *Giglio azzuro*, seu *Giglio celeste*, Germani *Blauugilgen*, *Blauuschuertel*, & *Veichuertz*, Galli *Flambe*. Dioscorides Iridis vnus meminit, sed quæ tantum pro loci natalis varietate magis minusve commendetur. Herbarij nostri aliam satiuam statuunt, aliam siluestrem, easq; multiplices. Iris, ita describete Dioscoride, folia Gladiolo similia fert, maiora tamen, latiora & pinguiora: flores in caule æqualibus inuicem spatiis distantes, inflexos, varios: siquidem candidi, pallentes, lutei, purpurei, & cærulei conspiciuntur. Vnde ob hanc varietatem arcui cælesti Iris cõparata est. Radices subsunt geniculatæ, solidæ, odoratæ. Quæ simul atque fuerint dissectæ siccantur in umbra, & filo traictæ reconduntur. Melior est Illyrica & Macedonica, & inter has optima quæ densam & submutilam habet radicem, ægre fragilem, subfuluam, valde odoratam, gustu amariori (Græcè legimus *γλίσσετι πυρρῶς*, id est, gustu feruentiori, qualis certè in Iride perspicitur, licet etiam amaricet. Ruellius legit *πυρροτέρη*) odore syncero, & situm non redolente, & quæ dum tunditur sternutationes mouet. Secundum locum tenet Africana, candida, gustu amara. In vetustate teredines sentiunt, sed tunc odoratiores fiunt. Plinius hæc de Iride prodidit. Sed Iris radice tantum commendatur, vnguentis & medicinis nascens. Laudatissima in Illyrico: & ibi quoque non in maritimis, sed in siluestribus Drilonis & Narone. Proxima in Macedonia. Longissima hæc, & candicans, & exilis. Tertium locum habet Africana, amplissima inter omnes, gustuque amarissima. Illyrica quoque duorum generum est, Raphanitis à similitudine quæ melior: rhizotomos subrusa. Optima quæ sternutamenta tactu mouet (tractata pro tactu reponit Cornarius ex veteri codice, qua voce & postea vtitur Plinius.) Caulem habet cubitalem, erectum. Floret diuersi coloris specie, sicut arcus cælestis, vnde & nomen. Non improbat & Pisidica. Natura est feruens, tractatæque pustulas ambusti modo facit. Teredines non siccæ modò, verum & in terra celerrimè sentit. Galenus Irin Illyricam cæteris præstare testatur his verbis. Omnes Herbarij vnanimis scripserunt Irin in Illyrio natam optimam esse: Petroselinum verò quod in Macedonia provenit: bitumen è Iudæa aduectum: item & Opobalsamum. Idem & in reliquis fecerunt, quorum dotes à regionibus acceptas, cum particulatim de vnoquoque loquemur, non omittemus. Id quod ante Galenum Theophrastus prodiderat his verbis. *ἐν γὰρ τῆς ἀσίας ὅθεν ἐστὶν ἕξις τοῦδος, αὖτις δὲ φέρει ἐν ἰλλυριοῖς, ἐκ ἐν τῇ πρὸς ῥάλατσαν χώρα, ἀλλ' ἐν τῇ ἀνακχωρηκυῖα, καὶ μέντοι δὲ μᾶλλον πρὸς ἀρκλον*. Id est, In Europa nihil præter Irin inueneris. Quæ optima apud Illyrios provenit, non locis tamen mari-

Nomina

Lib. 1. ca. 1.

Genera

Forma

Li. 21. ca. 7.

Li. 1. Antid.

Lib. 9. hist.
cap. 7.

Li. 7. med.
gener.

Lib. 1. An-
tidor.

Locus.

timis, sed mediterraneis magisque ad Septentrionē sitis. Galenus in Aesclepiadeo quodam acopo Macedonicam habet, sicut etiā Carthaginensem in quadam Theriaca, lib. 2. de Antidotis recipit. Quanquam eam quæ ex Lybia magna sua ætate plurima adferebatur, tantum ab Illyrica distare ait, quantum mortuum corpus à viuo. Iris passim in hortis colitur, foliis acutioribus, rigidioribus & latioribus quā Acori aut Gladioli, vt scribit Pena. Flores cōstant senis potissimū foliolis, quorum tria deorsum repanda arcus modo curuantur, alia tria sursum, & contra se mutuo reflexa stamina aliquot cōdunt, quibus marcidis Æstate media ferè, siliqua Xyridis aut Acori palustris non dispar: angulosum item semē erui, sed minus se prodit, quod omisit Dioscorides. Radix est viuida plantæ semper virentis, plena, solida, albida, in multas propagines per summum cespitem fusa, amaro, vehementi, acriore & feruidiore, dum recens est, gustu, vt & purgandi vi, quam arida facta prorsus amittit, multumque feruoris, ingrati que saporis remittit, & odoratior, eoque commendatior euadit, præsertim Thusca, siue Florentina, hodie primam laudem adepta, vt scripsit Pena. Quæ plurima in mediterraneis, non procul à Florentinis montibus eruitur, multum temperie agri, & ætheris ad Illyricos tractus accedentibus, ideoque præstantior Illyrica habetur, quia hæc nonihil rufescat, minusque nitida sit, Florentina verò candidior, & elegantiore aspectu, suauiorque odore sit. Neutra tamē illic flaccida, rugosa, raucida, fuscave aut mucida insolatu sit, vt nostræ, præsertim Septentrionalis. Quamuis autem Galenus Illyricæ palmam statuerit, cum tamen idem sanxerit quodlibet simplex medicamentum in suo genere quo sit fragrantius, eo esse præstantius, de eius sententia Florentinæ postponat quis Illyricum, à cuius bonitate tantum abesse Africanam, quantum animal vegetum à suo cadauere Galenus dixit, vt supra retulimus. Quare videtur Iris natalibus gaudere neque admodum feruidis, vt Africæ, neque ita frigidis, vt Septentrionum, sed montosis temperatis & riguis, cuiusmodi ex Hispania hodie valde odoratam & laudatissimam ferunt. Sic ad Drilonis & Naronæ fluminum ripas, non in maritimis, Illyricam Irin nasci cecinit Nicander,

IRIS domestica, Matth.



Ibidem.

In Theria.

Ἴριν ὅ, ἐν ἔθρεψε δριλῶν, καὶ νάρονος ὄχθῃ.

Id est,

Ἴρινῃ, quam Drilonis & Naronis ripa aluit.

Vbi Scholiastes Illyricam Irin intelligit: Drilonem enim fluuiū esse Illyriorum & Naronum, qui Illyrios & Liburnos separat, vbi Cadmus & Harmonia habitauerunt in serpentes transmutati. Et Ptolemæus Drilonem & Naronem fluuios esse scribit in Dalmatia Illyrico vicina. Quare non genere aut specie differunt hæ Irides, sed multiplicem hanc fortiuntur varietatem non modò viribus, vt dictum est, sed etiam magnitudine, odore, & potissimum florum colore. Cuius multiplicis venusta mixtura, vt ait Pena, non modò in diuersis plantis, sed etiam in vnius duntaxat floribus spectanda est. Elegantia enim hortensis amantes non modò purpuream (quæ vbiuis fermè Europæ ruri oritur, omniumque frequentissima visitur) sed etiam quasdam floribus candidis, Liliaceis alunt, non item luteam, vt Dodonæus

Iris vulga-
ris candidis
floribus.

putat

putat, ratus vulgarem aureis floribus vbique in pratis Acorū, esse Iridem. Cuius radices, vt idem tradit, tantopere adstringunt, & Iridis facultatibus aduersantur, vt rectè scripserit hasce vel duntaxat appensas quemlibet sanguinis fluxum sistere. Hæc autem florum purpureorum & alborum varietas fecit, vt Herbariorum vul-

Lib. 2. hist.
ca. 35. & de
florib. cap.
40. & 45.

I R I S siluestris, Matth.



I R I S siluestris altera, Matthioli.



gus olim inter Iris & Ireos discrimen fecerint, vt vulgatus ille versiculus indicat,

Iris purpureum florem gerit, Ireos album.

Quæ distinctio ineptior est, quā vt refutatione egeat. Iris siluestris duūm est generum auctore Matth. Vna quæ plurimū saxosis nascitur locis, satiuæ per omnia similis, minoribus tamen foliis: floribus, caulib⁹, & radicibus graciliorib⁹. Altera foliis Gladioli, lōgioribus: radice tenui, lignosa, geniculata, subrufa, inodora: caule breui: flore cæteris longè minore, odore Armeniaci mali, qui constat foliis nouem, purpureis, quorum extrema superiore tantū parte aureis pinguntur lineis. Siluestris vtriusque generis plurima, inquit, oritur in Goritiensi agro Saluatino monte, & lapidiæ vallibus inter saxa, odore non ingrato. Pena duas etiam Irides, quas siluestres vocant recentiores, agnoscit, inodoras, min⁹ obuias, multoque min⁹ aromatica dote commendabiles. Vna hortensi fermè eadem, inquit, nisi quia tota gracilior, quæ plurimū squallidis saxorum marginibus sponte oritur, cultaque retinet speciem, qua distat à satiuæ, etiā sapore ingrato, odore nullo. In subalpinis Ligorum & Taurinensium passim occurrit. Alteram non triuialis venustatis se primū legisse ait in Nitiobrigum maritimis & fabuletis herbis, non procul ab oppido Frontignano ex aduerso montis Cetij multam, nec vspiam alibi in vniuersa Gallia aut Italia facilem repertu, nisi maritimis: cuius radices recēs erutæ effractæq; nullū vnquam se obseruasse Armeniaci mali odorem, qualem ei inesse scribit Matthiolus. Radix, caulis, folium, siliqua, & semen Iridis, sed minora, min⁹que aromatica, saltem quibus locis natalibus illam obseruauit, scilicet humidis & incultis. Flores tamen Iunio apti⁹ Xyridem colore & figura, foliolisq; min⁹ repandis exprimunt. Sapor illi feruidus, amarus, tenuitas multa, quam etiam in medico vſu se cōpertam habuisse scripsit. His idem Pena aliam addit Iridem minimam & rarissimam omnium, saxatilem, Narbonensem etiam, quæ radices plexu, substantia densa, & colore Illyricæ absimilis nō est: caule verò nullo, præsertim natalitiis: folio latiusculo, rigido, mucronato, palmum alto,

Dodon. de
flori. ca. 4. 2

cuiusmodi Gladioli: flore, semine, siliqua Xyridis. Hæc statim atque è terra assurgit Chamæleontis albi modo pusilla humilisque permanet: ob id à nonnullis Chamæiris nuncupatur. Plurima oritur in agro Narbonensi, locis aridis & saxosis, secus specum illam sesquimiliari à Monspelio disitam, via qua Frontignagnū itur,

IRIS perpusilla & saxatilis.




CHAMÆIRIS seu alia perpusilla Iris latifolia, Lob.

Lib. purg.



Lib. purg.

in cuius cautibus & rupium commissuris frequens adolescit prope Ferulam. Chamæiris seu alia perpusilla Iris latifolia à Lobellio picta est, quæ ex Monspelienfi agro in Belgium & Angliam transmissa, frigido humidoque solo excepta, non secus ac innumeræ calidarum regionum peregrinæ stirpes, soli & cæli tēperie mutata varias subit mutationes. Caulis illi dodrantalis, alicubi pedalis: flores candidi, aut lutei, aut violacei. Alibi caule carentes, dilutè rubentes, violacei, striati, & ex luteo pallentes observantur. Idem annotat, Clusium Irides Austriacas humiles, speciosis rubris floribus, & violaceis odoratis Vienna Belgium misisse, cum Chamæiride purpureo odorato flore. Alterum Iridis genus descripsit & depinxit Dodon. Chamæiridem vocavit Lobellius Iridē perpusillam, siluestrem, angustifoliā. Folia habet Gladiolo minora, angustiora, pinguiora: caulem palmi altitudine, foliis breviorum: è cuius summo flores singuli suis pediculis insidentes erumpunt odorati, ex cæruleo violacei, aliquando ex purpureo violacei, ex nouem foliolis conflati: radix gracilis, minimo digito duplo minor, obliqua, foris rufa, intus candida, acris, gustu Xyridis. In Belgio & Germania frequens, Maio mense floret, folia Hieme pereūt, Vere noua erumpūt. Dodonæus longè diuersam Iridem depinxit, quam tuberosam vocat, cui folia ferè Chamæiridis oblonga, angusta, tenuis cauliculus, flos in cacumine, forma Iridis, minor, angustiorumque foliorum, obscurè virens, & quo aliis fimbria loco nigricans. Capitulum satis magnum semine perfectio dependet, in tres rimas fatiscens. Semen rotundum Ochro minus, initio albicat. Non vnus formæ radix: ante florem duo vel tres veluti bulbi parui cohæret: hoc enato in plures singuli extuberant propagines, quarum nonnullè digitum referunt: vnde illi Hermodactyli nomen pleriq; dedere, Iridis siluestris genus esse potest Dodonæi sententia, non Ephemeris. Sunt qui velint hūc esse quem Matthiolus perperam pro vero depinxit Hermodactylo. Eius tamē pictura parum cum hac conuenit. A quibusdam Lonchitis prior Dioscoridis cēsetur esse. Item aliam Dodonæus pinxit, quam bifloram appellat, Clusius

IRIS tuberosa,
Dodonai.*IRIS biflora, Clusij, & Dod.*

Clusius Lusitanicā seu biflorā, quā etiā pinxit & descripsit. Huius, inquit, folia breuiora sunt & angustiora vulgari Iride, alioqui haud absimilia: in summo caule, qui pedalis est, flos ē vaginulis purpurascentibus prominet, senis foliolis constans, vt vulgaris Iridis, sed minor aliquantulum, & colore omnino violaceo, seu purpureo saturatiore, qui deorsū reflexis tribus foliis intensius nitet: villosa illa fimbria, quā in vulgari lutea, in hoc omnino candida est. Vnicum autem plerumque in singulis caulibus florem profert, interdum sed raro alterum, rarissimē tertium, singulari quemque vaginula inclusum, iucundissimo odore, & Liliū cōuallium æmulante. Istius florem se vidisse ait Clusius, qui quaterna haberet folia deorsum vergentia, totidem ligulas bifidas fimbriam & stamina contegentes, & quaterna etiam folia sursum reflexa, & inuicem amplectentia, vt interdum in floribus Natura ludere solet. Semen angulosum & rugosū in siliqua triangulari satis crassa sed raro perficit. Radix subest nodosa ac veluti geniculata, solida, pollicari crassitudine incurua, intus candida, ingrati saporis, & paulò post feruidissimi gustus, multis fibris summa terra hærens, & in multas propagines ē lateribus nascentes distributa. Nascitur passim in Lusitania supra Tagum, nunc pingui solo, nunc planē lapidoso. Bis floret, Vere cum aliis Iridis generibus, & Autumno: quam ob causam bifloram Clusius nuncupauit. Huic ferē similem esse ait eam, quam Alfonso Pancius medicus Ferrariensis Belgium misit, nomine Dalmaticæ minoris, nisi quod paulò angustiore folio videtur, flores purpuræ dilutioris, & terni, aut quaterni in singulis caulibus, oblongiori pediculo inhærentes. Dalmatica maior, quam idem misit, vulgari forma & magnitudine similis, inquit Clusius, sed est aspectu hilaris & peruenuustus foliorum exortus lateratim traiectus, vt describit Lobellius, & radiatim alas pauonis explicatas imitatur: floribus pluribus ex vno caule multis concauo alis, luculentæ magnitudinis, violaceis, nitentibus senis foliolis, alternatim etiam repandis. Vireta Belgica hanc in delitiis habent. His iungenda Iris flore cæruleo obsoleto, cineræve polyanthes à Lobellio depicta. Aliquot alias plantas in Hispania obseruauit Clusius, quæ cum flore sint Iridis aut Xyridis, tamen bulbaceas habet radices: quare eas Irides bulbosas nominauit. Prior sena sæpius habet folia longiuscula & latiuscula, inuicem alternatim amplectentia, mollia, in terram recurua, supernè ex viridi pallen-

Liz. S.
Hispania.

IRIS Dalmatica,
maior.

IRIS flore caruleo polyanthes,
Lobellij.



IRIS bulbosa latifolia
I. Clusij.



tia, infernè candicantia: è quorum medio flos exilit vnicus, odoratus, caruleus, interdum candidus, nouem foliolis constans, Iridis seu potiùs Xyridis forma, quo marcescente vtrinq̃ue alij singuli succedunt. Caulem non habet, sed flos longo pediculo insidet vt in Croco: radix bulbosa, candida, auellanæ modo dulcis, multiplici cortice nigricante inuoluta, cui (præsertim dum floret) aliquot, præter fibras, radiculae crassæ & oblongæ subnascuntur, vt in Hyacinthis interdum fieri solet. Inuenitur in Lusitania, Bati-cæq̃; collibus non procul ab Arna flumine sitis, & copiosè circa Antequeram & Cordubam. Floret istic Ianuario & Februario. Lobellius Hyacinthum poëtarum latifolium appellat. Alteri sunt quinque aut sex folia tenuia, cubitali longitudine, interna parte canaliculata & candicantia, externa autem striata, & viridis cum caruleo commixti coloris, caulem amplectentia, qui sesquicubitalis est, interdum maior rarò breuior, nodosus, florem vnicū è vaginulis promens Iridis siluestris, aut Xyridis ferè forma, cuius la bra inferiora, & ad terram infle-

xa extima parte latiora sunt & candicantia. quòque loco fimbria villosa esse solet, lutea macula insignita: folia alia his incumbentia subcarulei ex candido sunt coloris, extrema parte bifida & reflexa, ligulam vt Iridis generibus occultantia: reliqua tria erecta sunt & oblonga, & dilutioris ex caruleo purpuræ. Totus flos iucundo

IRIS bulbosa angustifolia
flore vario, Clusij & Dodon.



iucundo spirat odore præmanſi ferè Coriãdri. Flori ſuccedit ſiliqua longa, gracilis, triangula, ſubruſum anguloſumq; ſemen continens. Radix bulbosa, candida, ſubdulcis, ſpadiceis aliquot membranis inuoluta, quæ nucleis uti Allium ferè ſeparatur, & ſeri poteſt. Lobellius Hiſpanicum poëtarum Hyacinthum vocauit. Tertia iam dictæ per omnia ſimilis ferè eſt, breuiore tamen caule, gracilioribûſque, & ex viridi pallescentibus foliis: flores bini contra-ctiores latiorèſque & lutei, inodori: ſiliqua craſſior & breuior: ſemen ſuperiori ſimile: radix iam dictæ ſimilis, quæ nucleis etiam ſeparatur. Naſcitur pingui ſolo, & petroſis collibus ad Tagum ſupra Olyſiponem. Floret quo ſuperior tempore. Lobellius Hyacinthum poëtarum luteum nuncupat. Priorem Cluſius appellat latifoliam, & à floris colore purpuream, ſive cæreuleam, Hiſpani nunc *Lirio ſimpliciter*, nunc *Lirio Eſpadanal*, & *Lirios azules*, hoc eſt, Lirium enſiforme, & Lirium cæreuleum. Alteram anguſtiſoliam flore vario nuncupat, Hiſpani *Lirio Illyrico*. Tertiam Iridem bulbosa flore luteo,

Lufitani *Reylla buey*. De harum Iridum viribus niſil adhuc compertum. His affine eſt Lirium maius Dodonæi, foliis Porro, aut Aſphodelo ſimilibus: caule cubitali: flore Iridis, aut Siſyrinchij, colore aut toto luteo, aut cæreuleo purpureo, cum lineis luteis, quæ in inferioribus foliis ſimbriæ loco ſunt: radice oblonga, bulbosa,

LIRIUM maius, aut *Lirium*
verum, Dodonæi.



IRIS angustifolia flore
luteo, Clusij.



Cepæ simili. *ῥέζον* videtur esse Theophr. quod Vere post Liliū exit, & aliud à Lilio & Narcisso est. Plurisque Hispaniæ, Bæticæ, & Lusitanie locis sponte gignitur. His addemus duas Lobellij Irides. Prior admodum rara est, cui flores Chamæiridis Monspeliacæ, tribus foliis repandis, peregrina elegantia striatis, obscure violaceis. In Belgij hortis prouenit. Alterius florem vidit Bruxellis delatum, eximia magnitudinis, maculis fortuitis transuersis & obliquis, giluis, cinereis & puniceis variatum: foliis tantillum gladij ritu vndantibus. Cætera omnia Iridi vulgaræ, aut Dalmaticæ similia. Cæteræ Irides calfaciendi extenuandiq; vim obtinent. Contra tussim efficaces, humorésque excreatu difficiles extenuant. Biles ex hydromelite drachmarum septem pondere potæ purgant. Somnū conciliant: lacrymas cient: torminibus medentur. Cum aceto potæ venenatorum moribus, lienosis, conuulsis, refrigeratis, rigentibus, & quibus genitura effluit, auxiliatur.

*Vires &
Temper.
Diosc. li. i.
cap. i.*

IRIS lutea variata.



Li. 21. C. 20.

Menses cum vino potæ ducunt. Decoctum earum ad muliebria fomenta vtile, molliens aperiensque locos. Ischiadicis infunditur. Fistulas & sinus carne implent. Quinetiam glandis modo cum melle appositæ fœtus extrahunt. Strumas veterésque duritias coctæ & illitæ emolliunt. Aridæ vlcera explent, & cum melle purgant. Nudata ossa carne operiunt. Doloribus capitis cum aceto & rosaceo vtiliter illinuntur. Lentigines, vitia cutis in facie cū Elleboro albo, & duabus mellis partibus illitæ emendant. Pessis, malagmatis, & acopis medetur. In vniuersum magni vsus sunt. Infantibus circūligari salubre est, inquit Plinius, dentientibus præcipuè & tussientibus, tinearūque vitio laborantibus instillari. Cæteri effectus eius non multum à melle differunt. Vlcerata purgat, capitis præcipuè, suppuraciones veteres: aluum soluit duabus drachmis cum melle. Tussim, tormina, inflationes potæ, lienes ex aceto. Cōtra serpentium & araneorū morsus ex posca valet. Contra scorpiones duarum drachmarum pondere in pane, vel aqua sumitur. Contra canum mor-

sus ex oleo imponitur: & cōtra perfrictiones. Sic & neruorū doloribus. Lūbis verò & coxendicibus cū resina illinitur. Vis ei cōcalfactoria. Naribus subducta sternutamenta mouet, caputq; purgat. Dolori capitis cū cotoneis malis aut struthis illinitur. Crapulas quoq; & orthopnœas discutit. Vomitiones ciet, duobus obolis sumpta. Ossa fracta extrahit imposita cū melle. Ad paronychias farina eius vtuntur: cū vino ad clauos vel verrucas, triduoq; nō soluitur. Halitus oris cōmanducata abolet, alarumq; vitia. Succo duritias omnes emollit. Somnū cōciliat, sed genituram cōsumit. Sedis rimas & cōdylomata, omniaq; in corpore excrefcentia sanant. Iris, auctore Matth. māsā oris haliū cōmendat, detiū dolores mulcet, si radice decocto ij colluatur. Coquit, abstergit, digerit, resoluit, lenit, reserat, expurgat & deicit. Vulnerariis medicamentis admixta sarcotica est. Radicis succus bilem, pituitā, & aquas pellit, hæmorrhoidas fotu elicit. Fit electarium ex succi radice drachmis tribus, galangæ, zedoariæ, singulorū drachmis duabus, cinnamomi, caryophyllorum, singulorū sesquidrachma, bræsicæ marinæ semuncia, & melle quantū sufficit ad excipiendū, quo maximè iuuatur hydropici, si quotidie semuncia ieiuni deuorant.

In ca. li. i.

rarint. Radicum farina drachmarum quatuor pondere additis cinnamomi & anethi singulorum drachmis duabus, & croci scrupulo, tumores & dolores testiculorum mirificè tollit, si panni coccinei frusto meraco albo perfuso hæc omnia in puluerem trita excipiantur, & calida apponantur. Hæc radices vestibus interpositæ, eas à tinearum erosionibus tuentur, & odoris fragrantia commendant. Radix trita, & ex aceto pota omnibus aduersatur venenis. Succus naribus infusus cerebrum à pituita expurgat: ventriculo tamen nocet: ideo non exhibendus nisi cum mullâ & Indica Nardo. Potum radices decoctum obstructions aperit, præsertim cum crassâ materia impacta fuerit, ventris tineas pellit, vrinas ciet, renum calculos eiicit. Datur vtiliter potandum ictericis: sudores enim mouet, & auriginem exterit. Pulmones & thoracem expurgat, & iocinoris inflammationibus auxiliatur. Recentes radices saccharo conditæ aut melle, dantur vtiliter deuorandæ vnciæ pondere calculo affectis, anhelosis, hydropicis ac resolutis. Eadem in passo decoctæ contusæq; addita hordeacea farina & illitæ parotidas discutiunt. Illyricæ puluis sesquidrachmæ pondere datur ex passo calido ad iliacos affectus. Oleum, quod ex floribus & radicum succo paratur, resoluît, emollit, concoquit, frigidos dolores mulcet, attenuat, & mirificè prodest iocinoris & lienis doloribus. Podagricos iuuat, lenitque articulorum duritiem, & cæterarum corporis partium. Valet & ad frigidos vteri dolores, ad conuulsos, & aurium cruciatus. Vfus apud veteres radicum tantum, florum apud recentiores. Hæc ex Matthiolo.

ACORVM.

CAP. XXXI.

AKOPON Græcè, & ἀκρος Plinio, Latine Acorum & Acorus. In Officinis nomen retinet, Arabicè *Vage* seu *Vgi*. *Αφροδισια* etiam Græci vocarunt Apuleio teste, id est, Veneream, & Piper apum, quod ea in alueariis suspensa nunquam diffugiant apes. Dixerunt autem Græci ἀκρον, quia τὰς κρῆναις, id est, pupillis, siue aciei oculorum caliginosæ mederetur. Acorum depinxit Dioscorides foliis Iridis, angustioribus tamen, radicibus non dissimilibus, implicatis, neque in rectum enatis, sed obliquis, & in superficie positis, quæ geniculis distinctæ sunt, subalbæ, gustu acres, odore non ingrata. Præstat densum, candidum, non cariosum, plenum & odoratum, cuiusmodi est in Colchide & Galatia. Acoros folia Iridis habet, inquit Plinius, angustiora tamè & longiore pediculo: radices nigras, minùsque venosas, cæterò & has similes Iridis, gustu acres, odore non ingratas, ruptu faciles. Optimæ Ponticæ, deinde Galaticæ, mox Creticæ. Sed primæ in Colchide iuxta Phasin amnem, & vbicunq; in aquosis. Recentioribus virus magis (alij, vires magis, legunt) quàm vetustis. Creticæ candidiores Ponticis. In his Plinius cum Dioscoride prorsus conueniret, nisi radices nigras tribueret, & minùs venosas esse, ac ruptu faciles adderet, quanquam in vetustis quibusdam legitur raptu, in aliis erutu. Legitimum istud Acorum scitè à Matthiolo expressum est, foliis Iridis, angustioribus longioribusque, odoratis ac gustu feruidis: radicibus Iridis æmulis, frequenter genicularis, firmis, subcandidis, innumeris ima parte adnatis fibris, odoratis, gustu acri ac subamaro, complicatis, haud in rectum descendantibus, sed in obliquum actis, & summa tellure sese diffundentibus. Caule est læui, ex quo ramuli prodeunt, in quorum cacuminibus nuncamenta quædam exoriuntur (ita affirmante Quacelbeno medico: ea enim se nō vidisse ait Matthiolus) nucis Ponticæ iulis, aut longo Piperi similia. Talis est legitima Acoti planta, quam Constantinopoli ad Matthiolum miserunt Augerius de Bousbecke, Ferdinandi Cæsaris ad Turcarum imperatorem orator, & Qua-

Nomina

Pena in Aduerf.

Lib. 1. c. 2.

Forma.


Lib. 25. c. 13.

celbenus medicus, è Nicomedia, ex quodam vastæ magnitudinis lacu petita, vbi copiosum prouenit Acorum. Est enim Nicomedia Bithyniæ ciuitas, Galatis ac Colchis vicina, vbi optimum Acorum nasci tradit Dioscorides. Eandem Acori veri delineationem ex virëtis plantæ inspectione tradidit Lobellius scitè admodū & accuratè, id nimirum folia Xyridis habere, sed oblōgiora & angustiora, sesqui-

ACORVM verum,
Matthioli.



ACORVM cum flore, domini Robini,
regis Francorum Herbarij.



cubito maiora, nitida, ex atro virentia, consimili radici eximia fragrantia prædita, quæ Iridis siluestris ritu Hieme marcescūt, & Vere pullulant: radices quales in Officinis prostant nomine Calami aromatici, implicatas, nec in rectum, nec altum actas, sed cespitem summo in obliquū, vt rectè dixit Diosco. sparsas, subrūs numerosa coma fibratas, albicātes foris, intus candidas, gustu acres & amaras, & geniculis distinctas, ex quibus vtrinque alternatim alarum ritu aptantur pullulationes. Neque caulem, neque florem edidisse ait. Idem de ea quam aluit prodidit Clusius: quinimò asserit relatu Augerij de Bousbecke, Cæsaris ad Turcarum Imperatorem oratoris, & Quacelbeni medici, nullum vbi nascitur sponte, neque florem neque semen proferre, sed duntaxat nucamenta quædam iulis nucis Ponticæ similia, è ramulis ex leui caule prodeuntibus pendentia. Nascitur autem ingenti quodam lacu ad radices montis præcelsi iuxta Prussiam Bithyniæ urbem. Hæc ideò inculcauimus, tum vt omnes apertissimè Acorum verum agnoscerent, tum vt intelligerēt id prorsus esse (vt periti omnes huiusce tēporis Herbarij censuere) quod Officinæ fallō Calamum aromaticum vocant, non Galangam maiorem, vt quidam opinati sunt, multo minùs Acorum nostratrum palustrē, Gallis *Glaicul de marau* dictum, Germanis *Geelschuurtel* & *Drachenuurtz*, Belgis *Geellsch*: Officinæ olim Acorum perperā appellauere, & maiori errore radicibus eius pro genuino Acoro vsæ sunt: nam non forma modò, sed viribus potissimū ab Acoro dissidet. Quare Pseudoacorum plerique nominarunt: Dodonæus Iridem luteam siluestrem, aut potiùs Pseudoiridem nuncupare maluit, vtpote Iridi quàm Acoro similiorem;

ACORVS luteus falsus,
Matthioli.



PSEUDOACORVS
caruleus, Tragi.



ruptis, conuulsis. Lienes minuit. Vrinæ stillicidio & venenatorum moribus subuenit. In fessu, quemadmodum Iris, ad muliebria utilis est. Succus radicis caligines oculorum discutit. Antidotis radix vtiliter admiscetur. Vis ei ad calfaciendum extenuandumq; efficax, inquit Plinius, cōtra suffusiones & caligines oculorum suc-

miliore: cum contra Acoro aut Galangæ quàm Iridi propter radicis vim adstrictoriam similior sit. Quidam Butomum Theophrasti esse volunt, & verè quidem, vt opinor: quia Butomū Theophrasto lib. 1. cap. 8. caulem læuem & æqualē habet, vt & Cyperus: capite verò 17. lib. eiusdem foliū habet Arundinis & Cyperi modo, velut ex duobus constans angulosum, & media parte velut carinatum: fructum, vt alij legunt, magnum, vt alij, nigricantem, magnitudine Sidæ proximū. Quæ Acoro palustri conueniunt. Dictum autem Butomū, quod à bubus libenter edatur ac proscindatur. Est igitur Pseudoacorus planta foliis Iridis, longioribus & angustioribus, dorso aliquantulum vtrinque extante, ensis figura: caulibus glabris, rotundis, cauis, nonnunquam bicubitalibus, in quorum cacuminibus flores multi exeunt, lutei, foliolis ternis deorsum vergentibus, ternis aliis multò minoribus & surrectis. Siliquæ crassæ succedunt triangulares, in quibus semina multa simul cōpressa, ordine digesta, plana, cartilaginea, lenticulis maioribus obliquæ, longe, geniculatæ, cirrosæ, in propagines diuisæ, pallidè rubentes, gustu adstringentes. Nascitur in palustribus locis, humidis & riguis tractibus, Italiæ, Germaniæ, Galliæ, Belgiōque familiaris. Floret Maio & Iunio mensibus. Tragus Pseudoacoro Gladiolum quendam cæreuleum minorem subiungit, quem potiùs Pseudoacorum cæreuleum vocare debuerat. In quibusdam humectis pratis, inquit, & campis, qui Rheno, & prope Vormatiam & Oppenheimium oppida adiacent, plantæ genus hoc inuenit, cuius flores aquei penè coloris, sed cum cæreuleo mixti, ternis singuli versus terram inflexis foliolis præditi. Cæterum quod ad reliqua attinet, folia, caulem, radicem, ea ad Iridem proximè accedunt, nisi quod tota sua substantia magis exiguius, & angustioribus foliis & acutioribus illa esseprehenditur. Semen fert in oblongis & triangularibus siliquis, non aliter ac Pseudoacorus. De singulorum viribus nunc dicendum. Acori radix calfaciendi vim habet, auctore Dioscoride. Decoctum eius potum vrinam cit. Prodest lateris, thoracis, & iecoris doloribus: torminibus,

Lib. 2. c. 50.

Lib. 1. c. 2.
Vires & Temper.

Lib. 25. c. 15.

co eiusdem

co eiusdem potio, contrâque serpentes. Et variis in locis. Pectoribus subuenit, idè antidotis miscetur. Iocinori medetur, thoraci quoque & præcordiis. Vrinam citius decoctum, & omnia vesicæ vitia sanat. Testium tumores radix decocta in vino, tritâque & illita mirè discutit. Duritias & collectiones omnes sanat, decocto huius herbæ fountibus. Contusis & euersis pota duobus obolis in mulsi cyathis tribus radix prodest. Acorum quoque vtile est interioribus fœminarum morbis. Galenus scripsit Acori radicem gustu esse acri & modicè amaro, odoréque non iniucundo. Quare facultatis calidæ esse, & consistentiæ tenuis. Hinc cõsentaneum est vt vrinam moueat, & lienes induratos iuuat, tum corneæ membranæ crassitiem detergeat simulque extenuet: sed ad hoc melior est succus ipsius. Omnino verò siccificum esse clarum est. Et sanè ordinis esse tertij in vtroque, calfaciendo scilicet & desiccando. Ab his Pseudoacori vires multùm distant. Desiccatur enim citra calfactionem: radix adstringendi facultate prædita. Quare densatur, cogitur, contrahitur. Igitur vrinam non cit, nec menses prouocat, sed potius supprimit. Sanguinem vnde cunq; manantem cohibet, vt rectè Pandeectarum auctor scripserit, eum, qui secum Acori radicem gestauerit, à nullo sanguinis profluuii corripitur. Ex recentioribus aliqui hanc Pseudoacori facultatem obseruauerunt, atque hinc adeò tradunt eius succum igne expressum menses nimium promanantes constringere posse. Dysentericis vtilis est.

GLADIOLVS.

CAP. XXXII.

Nomina

ΓΛΙΟΝ & φάσανον, & μαχαίριον Græcis, Latinis Gladiolus, Ensis siue Ensiculus, Romanis Segetalis, Arabibus *Kasfîl*, Italicè *Gladiolo*, flores *Monicuccie*, Germanicè *Schwertel*, Gallicè *Glais* & *Glaietel*. Xiphio, id est, Gladiolo seu Ensiculo nomen factum à folij figura, quæ tamen eadem propemodum sit multis plantis, vt Iridi, Xyridi, Acoro, & bulbosis quibusdam, tamen huic præ cæteris remansit, quia folium propius ensim mucronatum refert, striatumque liris

GLADIOLVS, Math.

Forma.

Lib. 4. c. 20.



& neruis scabris rigidisque satis firmum. Quia in satis frequentissimè reperitur, Segetalem dixerunt. Gladiolus Iridi similis est, vt describit Dioscorides, minor tamen & angustior, & gladij modo mucronatus, neruosusque. Caulem emittit cubitalem, in quo flores purpurei, ordine à sese distantes: semen rotundum: radices duas, alteram alteri insidentem, velut paruos bulbos, quarum inferior gracilis est, superna crassior. Nascitur maximè in aruis. Plinius Lonchitidem à Xiphio discernens, cum illam in siccis nasci dixisset, de Xiphio subiungit. E diuerso Xiphion & Phasganion in humidis, cum primum exit, gladij præbet speciem, caule duum cubitorum, radice ad nucis auellanae figuram fimbriatæ, quam effodi ante messes oportet, siccariq; in umbra. In quibus à Dioscoride dissentit, qui non in humidis, sed in aruis nasci scripsit. Hic Gladiolus verus depictus est in aruis & satis frequens, interdum & in pratis reperitur. Cui caulis singularis, inquit Pena, rectus, rotundus, striatus, nitidus, è folijs quasi

quasi sese exerens, & flores conditos deinceps habens per interualla, interdum ad vnam tantum caulis partem digestos, quemadmodum in Narbonensi, interdum binis ordinibus, vtrinque vno, vt in Italico: flores rutilant hilari saturaque purpura, senis & septenis foliolis constantes, liliaceis similibus, vel Ornithogali, sed minus repandis aut diuulsis. Semen in folliculo rubrum erucæ magnitudine. Gemini bulbi radici sunt, quorum habitior & corpulentior interdum superior inferiori incumbit, interdum inferior maior & languidior. Vere exacto iam effecta multis pusillis bulbis propagatur Ornithogali modo: coma fibrosa subter radicanter glutinosi bulbi, & villosi inuolucro teguntur fusco, sapore non ingrato, acri. Superior radices pars, auctore Dioscoride, cum vino & thure imposita, spicula & aculeos extrahendi vim habet. Cum farina liliacea & aqua multa panos discutit: quare eiusmodi emplastris additur. Menses apposita trahit. Tradunt eandem superiorem radicem cum vino potam venerè stimulare, inferiorè verò steriles efficere. Quin & superiorem radicem cum aqua bibendam commodè exhiberi pueris enterocoele laborantibus. Plinius eadem ferè tradit. Superior pars eius cum thure trita, æquo pondere admixto vino ossa fracta ex capite extrahit, aut si quid in corpore suppurat, vel si calcata sint ossa. Serpentis eadem contra venena efficac. Et alio in loco. Xiphij quoque radix superior vrinam ciet infantibus. Enteroceliceis datur ex aqua, & illinitur vesicæ vitiis. Et rursus. Appetentiam veneris facit radix ex Xiphio superior, data potu in vino. Xiphij radix, inquit Galenus, & maximè superior, attrahentem, digerentem, & desiccantem facultatem habet.

Lib. 25. c. 11.

Lib. 26. c. 8.

Lib. 26. c. 10.

Lib. 3. sim.

XYRIS. CAP. XXXIII.

DLANTA, quæ Græcis *Ξυρίς* appellatur, & Theophrasto *Ξυρίς*, id est, Iris siluestris, Latinis quoque Xyris, Arabibus *Casoras*, Officinis & vulgo Spatula foetida, Germanis *Vuandteuskraut*, à cimicibus necandis, Gallis *Glaieul puant*. Prisci autem appositè *Ξυρίς* ob folij similitudinem, quasi rasorium cultrum aut nouaculam dixere. Est enim illi folium ancipiti nouaculæ simile, acutiore acie, & tenuiore rigidiorèquàm Gladiolus aut Iris mucrone. Spatula autem foetida, tum obeandem folij figuram, (spata enim gladij significat) tum quòd grauem exhalet odorem vulgò nuncupata est. Hanc his verbis delineauit Dioscorides. Xyris folia Iridi similia habet, sed latiora, & in summo acuta: è quorum medio caulis erumpit, satis crassus, in quo siliquæ sunt triangulares, & in ipsis flos purpureus, quod verò in medio est, puniceum est: semen in folliculis fabis simile, rotundum, rubrum, acre: radix est multis geniculis distincta, longa, rufa. Nasçitur sponte in Galloprovincia teste Pena, & in Anglia quàm vberimè prope vda prata, & litoreos maris aggeres. Alibi in hortis colitur. Veterum Xyridem, vulgi Spatulam foetidam esse periti Herbarij credunt. Cum enim obiciunt, Xyridis radicem longam esse, geniculatam, & rufam, quæ in Spatula multifida sit, gracilis,

Nomina

Pena in Aduers.

XYRIS, Lobellij.



Lib. 4. c. 22.

Forma.

cilis,

Pena in
Aduers.

cilis, fibratâque, præterea florum colorem, facile refelluntur, quod radicis magnitudo & color, vt pleraque alia, facile nonnihil non ita magna de causa mutantur. Etenim si Iridis radices & flores colore, magnitudine, densitate, bonitate & odore adeò variant, vt cum Florentina si nostram conferas, longè aliam colore & odore putes, quid ni possit tantilla mutatio Xyridi contingere? Illyricæ Iridis radix est subrufa, nostratis pulla & cinericia, Florentinæ candida eximia fragrantia, nostrâs verò ingrata fermè fœtet. Adhæc cum *πλατύτερα* folia Dioscorides dixit, & cacumine acutiora, innuit medium folij latius & ventricosius, summum verò multo angustiore mucrone, cuiusmodi prorsum spatulæ spôte nascētis. Caulis etiam eius cubito maiores, plures, glabri, teretes, crassitie mediocri per media folia recti assurgūt, florésque in summo promūt Iridis siluestris, ternis foliolis surrectis, nec inflexis, purpura saturatiore Violæ Martiæ, & in medio venis nonnullis luteis & phœniceis apparētibus, siliquis itē Iridis, triquetris, trinaq; carina dehiscētibus quado maturuit semen, quod rubrum, nitidū, gemina secundū longitudinē

XYRIS, *Marth.*Lib. 4. c. 12.
Vires &
Temper.

serie conditur in siliquarū membraneis loculis vt in Pœonia, Orobi, vt quidā in Oribasio legūt, aut Fabæ, nō vulgaris nostratis, sed Diosco. quæ multo minor, & nostrate rotundior fuisse probatur à doctis. Radix parua (facilis enim & frequens est in Dioscor. deprauatio vocis *μικρά* in *μακρά*) geniculata, fibris multis donata, & Iridi concolor, similis, aut fusca. Postremò ea vi & acrimonia prædita est radix, tametsi Cotulam aut cimices oleat, vt multorum nostræ ætatis medicorum monumentis & experimentis constet ea præstare quæ Dioscorides Xyridi reddidit. Quin Iridi non modò similis facie, sed & viribus anteit, tum ad vlcera, ossâque desquamâda, tum intrò sumpto decocto aut succo vehementius lotium ciet, & sudores mouet, sed pharyngem adurit fermè. Si multa decocto bibatur, vomitum excitat, & tormina ventris, vt Iris facit. Hisce spatulam fœtidam esse Xyrida veterū astruit Pena. Cui has vires tribuit Dioscorides. Radix Xyridis ad capitis vulnera facit & fracturas. Educit aculeos & omne telum extrahit citra dolorem, admixta floris æris tertia parte, radicis Centaurij quinta, & melle. Sanat tumores & inflammationes cum aceto imposita. Radix cum passo contusa bibitur ad conuulsa, rupta, coxendicum dolores, vrinæ stillicidia, & alui profluvia. Semen ad ciendam vrinam efficacissimum est, trium obolorum pondere in vino potum. Idem & lienem liquat cum aceto potum. Xyris tenuium est

Lib. 8. sim. partium, inquit Galenus, facultatis attrahendi, digerendi, atque desiccandi cūm radix, tum multo ampliùs fructus, qui & vrinam ciet, & lienes induratos sanare potest.

POLYGONATVM. CAP. XXXIIII.

POLYGONATON Græcis, Latinis Polygonatum vocatur, Officinis, *Nomina*
Herbariis, & vulgo Sigillum Salomonis, Italis *Frasinella* & *Gimochieto*,
Germanis *Uueiszwurtz*, hoc est, radix alba, Gallis *Signet de Salomon*. Poly-
gonatum autem à radice geniculorum frequentibus nodis ex interuallis tumēte
appellauerunt. Fuchsius, Dodonæus, aliique recentiores Herbarij duo Polygo-
nati genera dant. Vnum verum Dioscoridis, latioribus foliis, alterum multò an-
gustioribus. Polygonatum Dioscoridis frutex est cubito altior, folia habens Lau-
ro similia, latiora & læuora, quæ gustanti simile quid malo cydonio aut punico
exhibent cum quadam adstrictione. Per singulos foliorum exhortus candidos flo-
res pròmit numero maiore quàm folia, supputatione à radice facta. Radicem
habet candidam, mollem, longam, geniculis plenam, densam, graueolentem,
digitali crassitudine. Nascitur in montibus. Iam si singulas Sigilli Salomonis no-

Genera.
Forma.

POLYGONATVM maius,
Matthioli.

POLYGONATVM angustifolium, *Fuchsj.*



tas persequi libeat, omnes, ne vna quidem reclamante, adesse comperies. Nam
in montibus gignitur, frutice cubito proceriore: foliis Lauri, latioribus & læui-
oribus, quæ gustata quendam mali cotonei aut punici saporem referunt cum
quadam adstrictione. Flores per singulas foliorum eruptiones exeunt candidi, qui
folia numero superant: etenim bini, terni, aut plures ab vnoquoque foliorum
sinu prodeunt. Radix illi candida, mollis, longa, crebris nodis articulata, den-
sa, graueolens, digiti crassitudine. Floribus excussis baccae pisi ferè magnitudi-
ne dependent, primùm virides, deinde nigricantes. Ab hoc Polygonatum siue
Sigillum Salomonis minus foliis discernitur: cui radix & caulis, plantæq; ha-
bitudo & natales sunt eadem, verùm folia angustiora multò, & ambitu stellato,
rubræ maioris vel asperulæ, quaterna aut quina: minores etiam flores inter folia

Pena in
Aduers.

herbacei, paruaq; baccæ piperis minores. Multum hoc collibus Riuoli, & Taurino Pedemontium collibus siluosis vicinis, & arduis Veganij Narbonensis: Belgicis hortis charum & multum. Vbi maius etiam in pratis siluosis sponte luxuriat. Ruri etiam Gallia & Germaniæ prouenit crebrum. Huius radix, auctore Dioscoride, vulneribus efficaciter illinitur. Quinetiam maculas delet in facie. Scribit Galenus Polygonatum mistam habere tum facultatem, tum qualitatem: habet enim adstrictionis pariter & acrimoniæ quidpiam, nec non fastidiosam quandam amaritudinem explicatu difficilem. Quocirca nec admodum est vsui, sed tantum quod radicem eius quidam vulneribus illinunt. Sunt etiam qui naeuos in facie illo detergent. Hæc Galenus. Hodie mulieres ex Polygonati radicibus aquam stillatitiam conficiunt, qua ad faciem detergendam proluendamque pro fuco vtuntur.

FLOS Tygridis,
Dodonæi.



Lib. purg.

Forma.

FLOS TYGRIDIS.

CAP. XXXV.

DODONÆVS & Lobellius rarissimum florem Tygridis vocatum pinxerunt, quem nunquam vidisse fatentur, sed illius iconem tantum affabre coloribus expressam à D. Ioanne de Brancion communicatam, virentibus, oblongis, angustis, & acuminatis foliis, è pullo radicis bulbo: flore luteo, exiguis quamplurimis notulis puniceis fortuito variato, è cuius medio suaue rubens stilus exoritur. Omnibus rei Herbariæ studiosis ipsa planta hætenus incognita. Eius bulbus edulis fertur.

COIX.

CAP. XXXVI.

Locus.


Forma.



PLANTAM hîc exhibemus à Mycono missam & descriptam his fere verbis. Passim in pratis prouenit, altitudine dodrantali: caule vnicò, rotundo, geniculato, qualis est Tritici calamus, in quo folia prorsus Gramini similia, in summitate veluti Auenæ paniculâ habente. Pro radicibus bulbi duo subsunt, minor maiori insidet, vterque candidus, dulcis Graminis modo, vt inde Graminis speciem esse colligere possis. Si tamen planta est à veteribus descripta, eam potius esse suspicatur Myconus, quæ à Theophrasto κόιξ dicitur, alicubi κόιξ mendose pro κόιξ. Etenim Coicem inter κολοκύθα & γουόφυλλ, id est, ea quæ folium habent arundinaceum & angulosum recenset. Quibus mox subiungit, folia hæc quasi ex duobus constare, & medium veluti carinam habere, vnde & cæteris meatus medius amplius porrigatur. Quæ folij forma graminibus competit, etsi folia habeant arundinaceis minora. Præterea idem Theophrastus Coicem bulborum generibus

Lib. 1. hist. cap. 16.

Lib. 7. hist. cap. 13.

COIX, *Myconi.*

generibus adscribit, qui sunt radice rotunda, non squamosa. Quod huic plantæ conuenit. At duplicem radicem Coici Theophrastus non tribuit, quæ reuerà in hac planta duplex censerì non potest, ut ex pictura iudicare licet: superior enim non bulbus, sed vestigium tantum & veluti bulbi rudimentum. Vulgare herbæ nomen & vsum Myconus se ignorare scripsit, audiisse tantum lepores hac magnopere delectari, noctuque eius radices effodere. Quibusdam τὸ ξῆφις, id est, Gladioli species à nostrate diuersi, quem depinximus, videtur esse, aliis Sisyrinchium, in quo explicando Theophrastus genuinam radicem adnotasse videtur. Quanquam aliud Sisyrinchium ex Dodonæo iam ostendimus. Quid si Aegilopa Plinij quis esse dicat, quam inter bulborum genera numerat?

Lib. 7. hist. cap. 13.

Lib. 19. c. 5.

YYY 2



HISTORIAE OMNIVM PLANTARVM

LIBER DECIMVS-

SEXTVS,



In quo describuntur & ad viuum depinguntur Planta Cathartica.

MERCVRIALIS.

CAP. I.



RAETER differentias plantarum, quæ à locis natalibus & earum partibus sumuntur, de quibus hæcenus egimus, alias esse diximus, quæ ab earundem facultatibus & viribus petuntur, de quibus hîc tractare instituimus. In his maxime admirabilis, & miseris mortalibus, qui tot ægritudinibus quotidie conflictantur, vtilissima, quæ *ῥαψοειδὴς*, id est, purgatoria nominatur, vnde plantæ *ῥαψοειδὴς*, id est, vi purgandi præditæ Quid enim admirabilius, quàm stirpis particula aliqua deuorata, vel decocto aut succo epoto, humorem

quempiam aut plures ab aliis secerni, attrahi, & vomitu aut ventris deiectione purgari? Quid vtilius, quàm ægros horum sarcina oppressos, vel praua qualitate cruciatos, hac ope veluti Deorum manibus subleuari, atque morbo liberari? Quamplurimas huiuscemodi munifica Dei beneficentia hominibus largita est, quas omnes nec nouimus, nec omnes à veteribus aut recentioribus memoratas cognitasve hîc persequimur. Sunt enim multæ iâ sparsim locis idoneis explicatæ, & à quibus disiungi non poterant, vt Daphnoides, Rosa, Rosa Damascena, Senna, Cassia, Tripolium, Hippophaës, Hippophaëstû, Apios, Bryonia, Cnicus, Narcissus, Brassica marina, Brassica siluestris, Lactuca siluestris, Gratiola, Rhamnus purgatorius, Sambucus, Iris, Thapsia, Polypodiû, atq; alia quædam. Alias hîc explicabimus, easque manifestè catharticas, & satis notas, à Mercuriali etiam mulierculis cognita exordientes. *Λινοζώστis* & *παρθένιον* Græcis, & *ἑρμῆς βοτάνιον*, vel *ἑρμῆς πόα*, id est, Mercurij herba dicitur, Latinis Mercurialis, quod à Mercurio inuenta sit, Gallis

Nomina

Genera.

Forma.

Lib. 4. c. 183.

Lib. 1. c. 5.

Mercuriale & *Vignoble*, Italis *Mercorella*, Germanis *Ringelkraut*. Eius genera duo tradidêre Herbarij, marem & fœminam, quæ semine internoscuntur, & foliis in mari nigrioribus, in fœmina candidioribus. Mercurialis, vt tradit Dioscorides, folia Ocimo similia habet, Helinxæ cognata, sed minora, ramulos duplici geniculorum nodo cinctos, alarum caua multa, densa: fructum fœmina copiosum, racemosum, mas è foliorum sinu dependentem, paruum, rotundum, ceu binos testiculos vna cohærentes: frutex est dodrantalis aut minor. Plinius de eadem re paulo aliter scripsit. Linozostis siue Parthenium Mercurij inuentum est, ideò apud Græcos Hermupooan multi vocant eam, apud nos omnes Mercurialeni. Duo eius genera, masculus & fœmina, quæ efficacior: caule cubitali, interdum ramoso in cacumine: Ocimi angustioribus foliis, geniculis densis, alarum cauis multis, semine

mine in geniculis dependente, fœminæ copioso, mari iuxta genicula stante, rario-
ri ac breui contortoque, fœminæ soluto & candido. Folia maribus nigriora, fœmi-
næ candidiora: radix superuacua, prætenuis. Nascuntur in campestribus cultis.
Hęc Plinius. In vinetis nostris maximè provenit, interdum tam copiosa & efficax, *Locus.*

MERCVRIALIS mas,
Matthioli.



MERCVRIALIS fœmina,
Matthioli.



vt vina etiam suo sapore inficiat, & bibentibus ingrata reddat. Augusto mense se- *Tempus.*
mine prægnans est. Vtraque Mercurialis Medicis, seplasiariis omnibus, atque
etiam mulierculis notissima est subnitroso sapore, & nonnihil viroso succo, pur-
gâte, & medicato, ad multa perquam vtili. Vtraq; enim, auctore Dioscoride, aluū *Vires.*
mouet, olerum modo comesta, cocta in aqua, & ea epota bilem & aquosa ducit.
Creduntur præterea fœminæ folia trita & pota, post purgationem pudendis ap-
posita, vt fœminæ concipiantur efficere: masculæ verò similiter adhibitis, mares
generari. Plinius de medico vtriusque vsu paulò aliter quàm Dioscorides tracta-
uit, eundemque fusiùs ex Hippocrate declarauit, qui etià hodie in libris illius ex-
tat, maximè eo qui de sterilibus inscribitur, & in duobus de morbis muliebribus.
Verba Plinij hæc sunt. Mirum est quod de vtroque genere eorum proditur, vt
mares gignantur, hunc facere, vt fœminæ, illam. Hoc contingere si à conceptu
succus protinus bibatur in passio, edanturq; folia decocta ex oleo & sale, vel cruda
ex aceto. Quidā decoquunt in nouo fictili cum Heliotropio, & duabus aut tribus
Allij spicis, donec percoquatur. Decoctum dari iubent, & herbam ipsam in cibo
altera die purgationis muliebris per triduum: quarto die à balneo coire eas. Hip-
pocrates miris laudibus in mulierum vsu prædicauit has. At hunc modum medi-
corum nemo nouit. Ille eas vuluæ cum melle, vel rosaceo, vel irino admouit. Item
ad ciendos menses, ad secundasq;. Hoc idem præstare potu foruq; dixit. Instillauit
auribus olidis succum, inunxitq; cum vino vetere. Aluo folia imposuit & epipho-
ris. Stranguriæ, & vesicis decoctū eius dedit cum myrrha, & thure. Aluo quidem
soluendæ, vel in feбри, decoquitur quantum manus capiat, in duobus sextariis aque
ad dimidias: bibitur sale & melle admisto, nec non cum vngula suis, aut gallina-

Libas. c. 5.

ceo decocta. Salubrius purgationis causa putauere aliqui vtramque dandam per se, siue cum Malua decocta. Thoracem purgant, bilem detrahunt, sed stomachum laxant. Mercuriali, inquit Galenus, vtuntur omnes, ad ventris purgationes duntaxat. Verum si quis eius periculum facere voluerit in cataplasmate, sanè admodum eam esse digerentis experietur facultatis. Hæc Galenus. Eius hodie in enematibus frequentissimus est vsus. Et multis in locis Pharmacopœi multum vtuntur melle quod Mercuriatum vocant. Succus expressi libris tribus incoquant mellis boni libram vnam cum semisse, vel libras duas, ad enemata, & muliebria encathismata.

In cap. 183.
lib. 4.

Matthiolum obseruatum fuisse scripsit, verrucas omnis generis vtriusque Mercurialis foliis tolli, vel earum succo. Item vtriusque semen cum Absinthio decoctum ictericos mirificè iuuare: malis quæ serpunt succum cum aceto mederi. Quæ ante Matthiolum literis mandauit Ruellius.

CYNOCRAMBE.

CAP. II.

Nomina



YNOKPAMBH, vel κυνια, vel Λινοζώτης ἀρχαία ἄρραβις Græcis, Canina brassica, Cynia, & Mercurialis siluestris mas Latinis dicitur, Italis *Mercorella bastarda*, Gallis *Chou-de-chien*, & *Mercuriale sauvage*, Germanis *Uuildkingelkraut*. Cynocrambe, vt tradit Dioscorides, cauliculum binum dodratum altitudine emittit, tenerum, subalbidum: folia Mercuriali aut Hederæ similia, certis interstitiis, subalbida: semen foliis adhæret paruum, rotundum. In siluis copiose prouenit. Semen Aprili mense profert, Maio maturescit. Herbam hinc pictam Fuchsius & Dodonæus pro Cynocrambe proposuerunt: quibus assentitur Pena. Quæ, inquit, in tota Europa secus vmbrosas vias, & in siluis vdiisque locis, præsertim Septentrionalibus & minùs calidis copiosissima oritur, & vulgò siluestris Mercurialis vocatur, tantum cum mare habet similitudinè, foliis per interualla binis, in geniculis, & semine testiculis simili, gemino, in pediculis longis, caulibus quadratis, tenellis, vt quin vera sit Cynocrambe nulli sit dubium. Rectis hæc binis, ternis, & interdum quaternis non alatis cauliculis prouenit: folia subpallida sunt, quam Mercuriali longiora: sapor, & odor oleraceus, & subuirosus: radix latior humiq; serpens, sparsa. Tota facies Mercurialem esse testatur. Vfus eius nullus, tametsi optimus futurus ad serosos humores & melancholicos educendos. Cynocramben eandem Matthiolum pictam dedit, quæ

Forma.
Li. 4. c. 184.

Locus.

Tempus.
Cap. 167.
Lib. 1. c. 51.



In cap. 184.
lib. 4.

notis omnibus Dioscoridis delineationi respondeat, præter semen, quod foliis non adhæret. Quam ob causam dubitatur hæc legitima sit Cynocrambe. Dioscoridis sanè oratio *προσκετις τοῖς πετάλοις καρπὸν* scribit, *μικρὸν, καὶ τετραγύλον*: quod verum est, si *καρπὸν* non solum geminos velut testiculos intelligamus, sed præterea sustentem eos pediculum. Scribit Dioscorides caulem & folia pota, & olerum modo in cibo sumpta alium ciere: ius decoctæ bilem & aquas detrahare. Huius Cynocrambes neque Theophrastus, neque Galenus, neque Paulus, neque Aëtius meminere. Verum Galenus, Paulus, & alij, atque etiam Dioscorides alterius Cynocrambes mentionem fecere sub nomine Apocyni, à superiore multum diuersæ.

Li. 4. c. 184.
Vires.

Lib. 4. c. 76.

STAPHIS

ΣΤΑΦΙΣ ΑΓΡΙΑ & *σταφίς ἀγρία*, Latinis Herba pedicularis, & pituitaria, Officinis & Italis Staphisagria, Arabibus *Alberas*, *Habebras*, *Mu bazagi*, *Mu bezugi*, Gallis *Staphisagrie*, & *Herbe aux pouilleux*, Germanis *Bismjntz*, Hispanis *Fabaras paparaz*. A foliorū diuifura, qua Labruscam, siue Vitē siluestrem imitatur, nomen duxit Staphisagria, id est, Vitis siluestris: pedicularis autem, siue pituitaria, à viribus quas habet. Pediculos enim necat, & commanducata feruore suo multam pituitam trahit. Folia habet Labruscæ, filsa, cauliculos rectos, molles, nigros: florem fert Glasti: semen in folliculis viridibus, velut cicer, triangulum, asperum, ex nigro subfuluescēs, intus album, gustu acre. Ita descripsit Dioscorides, & sic breuiter Plinius. Astaphis agria, siue Staphis, (Vuam Taminiam vocant falso: suū enim genus habet) cauliculis nigris, rectis, foliis Labruscæ, fert folliculos veriùs quàm acinos, virides, similes ciceri: in his nucleum triangulum. Maturefcit cum vindemia, nigrescitq; cum Taminie rubentes norimus acinos, sciamusque illam in apricis nasci, hanc non nisi in opacis. Hæc Plinius. Hodie in hortis nostris feritur. In Istria, Dalmatia, Apulia, Calabria copiosissimè provenit, auctore Matthiolo. Æstate floret. Monspessuli quidem vbuius nascitur. Hæc est omnium tum Medicorum, tum Officinarum consensu Staphisagria, cuius hodie vsus est ad eadem, quæ à veteribus præscripta sunt. Verumtamen Dioscorides ei flores Isatidis tribuit, qui sunt lutei pallidive, cum Staphisagriæ sint cærelei, venusti, & stellati, in quinque, aut sex foliola diuisi. Est autem Glasti color intelligendus, non qualis visitur in Glasti flore, sed qualis sit Glasti succo, nempe subcæreleus. Eius grana decem aut quindecim, inquit Dioscorides, si trita in aqua mulsā dentur, crassa per vomitus purgant. Sed qui hauserūt ambulare debent. Prudenter tamen animaduertendum est, vt aqua mulsā continuò potui detur, quoniam strangulationis periculum inferunt, & fauces vrunt. Trita herba, & ex oleo illita aduersus

Nomina

Forma.

Li. 4. c. 150.
Lib. 23. c. 1.

Locus.

In cap. 150.
lib. 4.

Tempus.

Vires.

Li. 4. c. 150.

STAPHISAGRIA,

Matthioli.



morbū pedicularem, pruritus & scabiem valet. (Hæc in veteri codice sic leguntur, *ταφθίζε* & *χαθ' εαυτήν*, & *χθ' μτ' σπανδαράχης*, & *χθ' ἐλαίω συγχεσθίζε*, & c. Id est, Trita per se, vel cum sandaracha, posteaq; ex oleo illita, & c.) Cit plurimam pituitam commanducata: decocta in aceto dentium dolori, si ea colluantur, subuenit: rheumatismum gingiuarum sistit: vlcera oris, (aphthas vocant) cum melle sanat. Vrentibus malagmatis imponitur. De iisdem ita differit Plinius. His nucleis ad purgationem vti non censuerim, propter ancipitem strangulationē, nec ad pituitam oris siccādam: fauces enim lædunt. Phthiriasi caput & reliquum corpus liberant triti, facilius admixta sandaracha: item pruritus & psoriasis. Ad dentium dolores decoquuntur in aceto: ad auriū vitia, rheumatismū cicatricum, vlcerū manantia. Flos tritus in vino contra serpentes bibitur: semen enim abdicauerim, propter nimiam vim ardoris. Quidā eam pituitariam vocant, & plagis serpentium vtique illinunt. Hactenus Plinius. In quibus quod dixit rheumatismos cicatricū, perspicuè

Lib. 23. c. 1.

lapsus est, vel corrupta sunt Dioscoridis exemplaria: non enim ἑλὰς, id est, cicatrices, sed ἑλὰ ῥευματιζόμενα, id est, gingivarum rheumatismos, siue gingiuas fluidas dicere oportet ex Dioscoride, itémque vlcera oris depascentia. Aſtaphis agria, inquit Galenus, vehementer acrem facultatem obtinet, adeo vt ex capite purget, quod ἀποφλεγμολίξιν Græci dicunt, abstergatq; valenter. Itaque ad pſoram accommoda est. Sed & vrendi vim habet.

RICINVS.

CAP. IIII.

Nomina



ῬΙΚΙ vel ῥιόνων Græcis, Ricinus Latinis, Mauritanis *Kerua*, Officinis nonnullis Cataputia maior, quibusdā Pentadactylon, & Palma Christi, Mesuæ granum Regium, Italis *Girasole*, Germanis *Underbaum*, vel *Creutzbaum*, Gallis *Paume de Christ*, Hispanis *Figura de l'inferno* dicitur. Croton autem & Ricinus à similitudine animalis, quod semen eius refert.

Li. II, ca. 34.
Li. 30, ca. 10.

Est enim Croton Latinis Ricinus, inquit Plinius, animal eiusdem turpitudinis, in fixo semper sanguini capite viuens, atque ita intumescens, vnum animalium, cui cibi non sit exitus: dehiscitq; nimia satietate, alimento ipso moriens. Nūquam hoc in iumentis gignitur, in bubus frequens, in canibus aliquando, in quibus omnia: in ouibus & in capris hoc solum. Et alio in loco. Minus mirentur hoc, qui sciunt fœdissimum animalium quantum magnificent ricinum: quoniam vni nullus sit exitus sagine, nec finis alia quam morte (mendoſe, legendum enim, nec finis alia quam morte) diutiùs in fame viuenti. Septenis ita diebus durasse tradunt, at in satietate paucioribus dehiscere. Palmā Christi vulgus vocat à foliorū digitata effigie, quæ volam palmamque expansis digitis quadantenus æmulatur. Ricinus, vt describit Dioscorid. arbor est paruæ Ficus magnitudine, folio Platani, maiore, latiore & nigriore: ramis caudicibusq; cauis arundinis modo: semine in vis asperis, quod cortice nudatum, ricino animali simile est. Plinius de oleo factitio loquens, Proximum sit, inquit, & Cici arbore in Ægypto copiosa: alij Crotonem, alij Sesamum siluestre appellant: ibiq; non pridem. Et in Hispania repente prouenit

Li. 4, c. 38.
Forma.

Lib. 15, c. 7.

RICINVS, Matthioli.



Locus.

altitudine Oleæ: caule ferulaceo: folio vitium: semine vuarum gracilium, pallidarumque. Nostri cum Ricinum vocant à similitudine seminis. Coquitur id in aqua, innatansque oleum tollitur. At in Ægypto, vbi abundat, sine igne & aqua sale aspersum eximitur, cibis fœdum, lucernis vtile. Hæc omnia nostra Palmæ Christi ita quadrant, vt nihil magis. Est enim ei caulis crassus, rotundus, cauis, quinque aut sex cubitorum, geniculatus: folia ampla, alterno situ in pediculo ficulneo hærentia, septenis & nouenis, altioribus diuisuris Ficus, Platani, Castaneæ equinæ, Staphisagriæ, vel Ellebori nigri, subnigra aut subcærulea, pinguis: flores in summitate racematim compacti, quorum infimi luteoli sunt, & sine fructu pereunt, summi rubri & siliquas proferunt triangulares, in quibus terna grana, cinerea, phasiolis minora, medulloſa, ac multum olei, si premantur, reddentia. Non nisi in hortis satus prouenit. Carpitur Autumno dum semine abundat. Clusius suis Annotationibus in Historiam simplicium medicamentorum

dicamentorum ex Occidentali India Nicol. Monardus scribit se vidisse in Hispania circa Malacam & Calpen ad fretum Herculeum, aliisq; maritimis Baticæ locis, Ricini plantas crassitudine hominis, altitudine trium, multis praegrandibus ramis brachiatas instar aliarum arborum, qui rami illic tertio aut quarto quoque anno amputari solent, adamusimq; cōuenire Dioscoridis descriptioni illas plantas asserit. Refert etiam Bellonius, magnas in Creta Ricini arbores se vidisse. Theophrastus aliarum arborum folia sibi ipsis similia esse scribit, sed Populi, Hederae, & eius, quæ Croton vocatur, dissimilia, & figura diuersa: noua enim rotunda sunt, vetustiora angulosa, quod & alio in loco repetit. ὁ δὲ τῶν φύλλων μετασχηματισμὸς καὶ ἑτέρων κοινὸς, ἐπεὶ καὶ τὰ τῶν κρότωνος ἔνια περιεληφθῆναι φύλλοι τὴν εὐχὴν, ὅτερον ἀπογωνίσταται, καὶ ἀπὲρ ἀναδιαρθρῆναι. Id est, foliorum transformatio etiam aliorum communis est, nam Crotonis nonnulla initio cum proueniunt, rotunda sunt, deinde in angulos formantur, tanquam perfectè articulata. Quod & Plinius adnotauit. Maxima foliorum vnitas in suo cuiq; genere permanet, præterquàm Populo, Hedera, Crotoni, quam & Cici diximus vocari. Huic vires istas reddidit Dioscorides. Ex semine Ricini oleum nomine Cicinum vel Ricinum exprimitur, ad edendum minimè aptum, alioqui tamen lucernis & emplastris vile. Grana triginta, putaminibus purgata, trita & pota, pituitam, bilem, aquasque per aluum extrahunt, vomitionesque mouent. Sed iniucunda admodum est & molesta purgatio: stomachum enim vehementer subuertit. Tusa & imposita varos & faciei maculas à sole contractas expurgant. Folia cum polenta trita oculorum tumores & inflammationes sedant, mammasque turgentes cohibent. Per se aut cum aceto illita, erysipelata restinguunt. Plinius de eadem re hæc tradit. Oleum Cicinum bibitur ad purgationem vetricis cum pari calidæ mensura. Priuatim dicitur purgare præcordia. Prodest & articulum morbis, duritijs omnibus, vuluis, auribus, ambustis: cum cinere verò muricum sedis inflammationibus, item psoræ. Colorem cutis commendat, capillumq; fertili natura euocat. Semen ex quo fit, nulla animans attingit. Ellychnia ex vua fiunt claritatis præcipua: ex oleo lumen obscuri propter nimiam pinguitudinem. Folia igni sacro illinuntur ex aceto: per se autem recetia mammis, & epiphoris. Eadem decocta in vino inflammationibus cum polenta & croco: per se autem triduo imposita faciem purgant. De eiusdem purgatrice facilitate manifestius hæc scripsit Mesues. Ricinus calidus succus ordine tertio, Hamech in principio tertij. Pituitam ac interdum bilem valenter purgat deiectione, & vomitu, materias quoque & aquam serosam à iuncturis attrahit. Dantur autem grana eius cocta & trita in iure galli antiqui: conferunt colico dolori, & iuncturarum, vt podagræ, ischiadi: aut coquuntur in aqua casei, aut lac caprinum super ea mulgetur & colatur, & datur hydropicis vtiliter. Oleum autem Ricinum colico dolori à pituita & flatibus confert. Quoniam ventriculo nocet, corrigitur assatione, & si coquendo semen Anisi & Fœniculi addatur. Ricini fructus, inquit Galenus, quemadmodum expurgat, deterget ac digerit, sic quoque folium, sed vnde quaque debilius. Oleum quod ex semine conficitur, tum calidius est, tum tenuiorum partium quàm oleum commune: quare potentiùs quoque digerit.

Li. 1. obser.

cap. 15.

Lib. 1. hist.

cap. 16.

Li. 16. c. 22.

Li. 4. ca. 1. 8.

Vires.

Li. 23. ca. 4.

Li. 2. purg.

cap. 28.

Li. 7. simpl.

ELLEBORVS ALBVS.

CAP. V.



ἘΛΛΕΒΟΡΟΣ λεγὸς dicitur à Græcis, à Latinis Elleborus albus, & Veratrum album, Arabibus Cherbachem, seu Chaebech Abaid, Italis Elleboro bianco, Germanis Vveisniefz wurtz, Hispanis Herba de Baleste, Gallis Ellebore blanc & Veraire. Elleborum autem dictum volunt, quòd cibum corporis eripiat, Veratrum quòd mentem vertat. Album à radice vocarunt, quæ cum nigri radice comparata, candida est. Ellebori albi & nigri tantum

Nomina

Genera.

meminit

Lib. 25. ca. 5. meminit Dioscorides: & Plinius, Genera prima duo sunt, inquit, candidum & nigrum. Hoc radicibus tantum intelligi tradit plerique. Elleborus albus, ut describit Dioscorides, Plantagini similia folia habet, aut Betæ silvestris, breuiora tamen, nigriora & colore rubentia (id de costis intelligendum): caulem palmi altitudine, cauum, quum siccari incæperit, corticibus, seu tunicis inuolutum, à cuius summo, quod Dioscorides omisit, alternis pediculis surrecti florum thyrsi, ut in Botry, racemosis floribus onusti colore albicante visuntur, quibusdam in hortis purpureo. Radices subsunt numerosæ, tenues, ab exiguo & oblongo capite Ceparum modo

Lib. 25. ca. 5.

ELLEBORVS albus,
Matthioli.



Lib. 25. ca. 5.

Locus.
Tempus.
Ibidem.

Electio.

Vires.
Li. 4. c. 145.

Li. 5. meth.

prodeuntes. Plinius albi folia esse tradit Betæ incipietis, (Dioscorides silvestris) hæc quoque nigriora, & canalium dorso rubescencia. Vtraque caule palmi, ferulaceo, bulborum tunicis conuoluta: radice fibrata, Ceparum modo. Hæc Plinius, in cuius veteri codice exaratum reperias fimbriata pro fibrata, ut non fibras, sed fimbrias variè sectas radices accipiat Cornarius: sitque id quod Theophrastus dixit, πολύριζον δὲ δὲ μάλα τὰς λεπταῖς καὶ χερσίμοις, id est, multis radicibus, iisque tenuibus & vtilibus, & Dioscorides,ρίζαι δὲ ὑποσι πολυαί, λεπταί, ἀπὸ κεφαλῆς μικραὶ, καὶ ἐπιμήκεις ὥστερ κρομύς συμπεφυκῆαι. Quod autem Plinius habet, Hæc quoque nigriora & canalium dorso rubescencia, facit ut in Dioscoride legendum suspicetur, μελάνερα καὶ ἐρυθρὰ τὴν βάσιν, cum vulgata exemplaria habeant, ἐρυθρὰ τὴν χροάν, id est, colore rubro. Nascitur Elleborus albus in montosis & asperis locis. Circa messem radices colligendæ. Candidum probatur Oetæum, inquit Plinius: secundum Ponticum: tertio loco Eleaticum, quod in vitibus nasci ferunt: quarto Parnasium, quod adul-

teratur Aetolico. Quæ sequuntur voces duæ, ex vicino, in vulgaris codicibus, in vetusto exemplari desunt. Veratrum album legitimum hinc depictum esse, tum omnium consensus, tum experientia infinita & certissima comprobant. Optimum habetur, quod mediocriter extectum est, album, fragile, carnosum, nec tamen Iunci modo mucronatum, aut cum frangitur puluerulentum, tenuem interiorē medullam habens, gustu non admodum feruens, neque saluam confertim ciens. Huiusmodi autem strangulat. Primatum Cyrenaicum tenet, Galaticum autem & Cappadocicum candidiora, & puluere quodam obsita celerius strangulationem mouent. Purgat vomitionibus, varia educens, auctore Dioscoride: miscetur colluriis, quæ claritati oculorum officientia purgare possunt. Menses ducit, & fœtus in vtero appositum enecat. Sternutamenta citmures interficit cum melle & polenta subactum. Carnes simul coctum colliquat. Datur ieiunis per se, & cum Sesamo, aut ptisanæ succo (Græca habet θάψις χυλῶν, id est, Thapsiæ succo, sicuti & legitur in Actuario, pro πρὸς αἵματι χυλῶν) aut alicæ, aut aqua mulla, aut pulte, aut lenticula, aut alia forbitione. Pani compiniscitur & torretur. Dant aliqui cum copiosa forbitione, aut succo multo, aut modicum cibum dari præcipientes statim Elleborum offerunt, præsertim iis in quibus suspecta timendaue erit strangulatio, aut corporis imbecillitas imminet: tuto enim sic peragitur purgatio, quod non intempestiuè medicamentum corporibus cibo munitis accedat. Sed etiam balani ex

Elleboro

Elleboro subditę cum aceto, vomitiones eliciunt. De vtroque Elleboro simul Galenus & Plinius differunt, quę proximo capite explicabuntur. Album Mesues mortiferum esse prodidit, quod facili homines suffocare possit, ideoq; prorsus reiiciendum. Matthiolus tamen scribit antiquos Medicos albi Veratri puluerę propinasse comitialibus, melancholicis, vertiginosis, insanientibus, lymphaticis, conuulsis, podagricis, hydropicis, elephanticis, sed nunc eius vsum exoleuisse, quod eius puluis, non sine periculo dari possit, quamuis eius diluto multi absque incommodo vtantur. Id dilutum se melancholicis quibusdam exhibuisse testatur, nullo eorum incommodo. In lixiuio decocta eius radix pediculos & lendes necat. Decoquitur in lacte ad muscas perimendas: cum enim degustauerint, paulo post moriuntur. Mures quoque necat & gallinas. Paratur ex earundem radicum succo arte quadam presentaneum venenum, quo quibusdam in locis venatores sagittas inficiunt. Id, vt, saepe in brutis animantibus & pullis gallinaceis se periculum fecisse Matthiolus affirmat, vbi sanguinem contigerit, facto sagittę ictu vulnere, paulo post vulneratum animal interit. Sed id permirum, quod deuoratum id venenum, nisi magna quantitate, nihil ferę incommodi adfert, eoque ipso vesci venatores affirmat Hispani, cum purgationes moliri cupiunt. Quare nihil mirum, si ferinę carnes hoc veneni genere infectę, nihil comedentibus obsint. Verum vbi facto a iaculo vulnere sanguini se commiscuerit venenum, nulla alia antidoto seruari potest animal, quàm deuoratis malis cotoneis. Id quod se a Cesare Ferdinādo primū audiisse ait. Hac de re Hispanus quidam venandi peritissimus, rogatus, ita scripsit, Celtiberos, seu Nauarros succum albi Veratri seruare in vasis corneis, aut fictilibus fuso lythargyro subtilis, donec exactę fermentescat. Id cognosci filo intincto, & inserto acui, si rana transfixa moriatur: celerius enim interire animalia cętera cū sagittis eo succo illicitis vulnerata fuerint: venatores stuparum eo succo imbutarum puluillo ferrum sagittarum cum hastule parte quadam obuoluere, ne humore siccescente vis exhalet: integris viribus succum diu custodiri, si mala Cydonia, vbi reponitur, nulla fuerint, quia Cydoniorum odor vim eius obtundat: illam autem restitui mixtis vix bene maturę acinis collisis, aut pipere trito & iniecto: quamuis feris perniciosum id venenum sit, occisarum tamen carnem esse teneuiorem, ac suauiore, illam præsertim, quę circa vulnus est. Lobellius scribit esse Ellebori albi differentiam ex vario flore, albo, subuiridi, & ex albo rubente in horto Mutoni: quod postremum ante aliud germinat, foliis etiam maioribus, latioribus & longioribus. Ex horum medio caulis exit tricutibalis, aut amplior, in quo flores non albi, sed ex atro rubentes, stellati, quibus succedit semen foliaceum alterius æmulatione: paucioribus fibris radix longior donata: cuius peculiari icone opus non est, cum sola sit in floribus differentia.

ELLEBORVS NIGER.

CAP. VI.



ΛΛΕΒΟΡΟΣ μέλας, Μελαμπόδιον, ἐκ τριών, τὸ αὐτὸ ῥίζον, & μελαμβόριον
Græcè dicitur, Latine Elleborus niger, & Veratrum nigrum, quibusdam Luparia, Arabicè *Cherbachem*, seu *Charbech Afued*, Italicè *Elleboro*

Nomina.

nero, Gallicè *Elleboro noir*. Melampodium, auctore Dioscoride, quod Melampus caprarum pastor Præti filias furore correptas eo purgasse, ac sanasse creditur. Recentiores Ellebori nigri species aliquot faciunt, vt ex sequentibus perspicuum fiet. Is, vt depinxit Dioscorides, folia habet viridia, Platani foliis similia, sed minora, ad Spondylii folia accedentia, pluribus incisuris diuisa, sed nigriora, subaspera: caulem asperum: flores albos, purpureos, racematim coherentes: semen Cnici, (in Anticyra Sesamoides vocant,) quo deiectiones moliantur: radices subsunt tenues, nigrae, veluti a quodam capitulo Cephæ simili prodeuntes, quarum est vñs.

Li. 4. c. 145.

Genera.

Li. 6. c. 145.

Locus. est vsus, Nascitur in asperis, editioribus, ac siccis locis. Optimum quod ex huiusmodi petitur terris, vt ex Anticyra. Nigrum ibi probatissimum gignitur. Eligi debet corpulentum & plenum, in quo tenuis sit medulla, acre gustu feruensque. **Electio.** Plinius de eodem hæc tradit. Melampodis fama diuinationis artibus nota est. Ab hoc appellatur vnum Ellebori genus Melampodium. Aliqui pastorem eodem nomine inuenisse tradunt, capras purgari pasto illo animaduertentem, datoq; lacte earum sanasse Proetidas furentes. Genera prima duo sunt, candidum & nigrum. Hoc radicibus tantum intelligi tradunt pleriq;. Alij folia nigri Platani similia, sed minora, nigrioraq;, & pluribus diuisuris scissa. Vtrumq; caule palmi ferulaceo, bulborum tunicis couoluto: radice fimbriata Ceparum modo. Et aliquantò post. Nigrum alij Entomum vocant, (Dioscorides Ecstomum) alij Polyrhizon. At verò, vt Plinius in his cum Dioscoride de Elleboro utroq; consentire, ita Theophrastus dissentire videtur. Scribit enim: ὁ δὲ ἐλάβερος, ὁ, τε μέλας, καὶ λευκός, ὡς περ ὁμώνυμοι φαίνονται. περὶ δὲ τῆς ὁφέως διαφέρουσιν. οἱ μὲν γὰρ ὁμοίους εἶναι, πλὴν τῷ χρωματι μόνον διαφέρειν. τὴν γὰρ ῥίζαν τῶ μὲν λευκὴν, τῶ δὲ μέλαιναν. οἱ δὲ τῶ μέλανος δ' φύλλον διαφνώδες, τῶ δὲ λευκοῦ πρασῶδες. τὰς δ' ῥίζας ὁμοίας, πλὴν τῶν χρωμάτων. οἱ δὲ ὁμοίας λέγοντες, τοίαν δὲ φασιν εἶναι τὴν μορφήν: χαλὸν δὲ ἀνθεμικῶδη, βραχὴν σφόδρα φύλλον δ' πολυχύσιον, ὅμοιον τῷ τῶ νάρθηκος, μήκος ἔχον ἀμύκηδες, ὁμοῖος δ' ἐκ τῆς ῥίζης ἡ ῥητιμύρον τε καὶ ἐπιγυρόφυλλον, πολυῖνον δὲ δὴ μάλα, ταῖς λεπταῖς καὶ χρησίμοις. Id est, Elleborus niger & albus velut homonymi esse videntur. De figura varia sentiunt. Alij enim similes esse aiunt, sed colore tantum differre: huius enim radicem albam esse, alterius nigram. Alij nigro folium Lauri, albo Porri tribuunt, radices autem similes dempto colore. Qui similes putant, talem eorum figuram esse dicunt: caulem Antherico similem, sed valde breuem: folium late fissum, Ferulæ simile, bene longum, statim à radice pendens, & humi sparsum: radices multas prætenues, atque viles. Et paulò supra scriptum Elleborum χαλὸν ἔχον σιγαμικῶδη, id est, fructum ferre Sefamo similem. Quæ cum Dioscoridis descriptione haud conueniunt, qui nigro Elleboro Platani

ELLEBORVM nigrum,
Matth. flore purpureo.



In cap. 146.
cap. 4.
Elleb. nig.
flore purp.

folia & Spondylii, Theophrastus Lauri tribuit. At si Theophrasti locus is diligentius expendatur, haud alium quam Dioscorides Elleborum delineasse videbitur. Cum enim nigri folium ait esse διαφνώδες, albi πρασῶδες, subaudiendum τὴν χροίαν, vt de colore intelligat. Quid enim ineptius, quid tam graui auctore indignius, quam Elleboro vlli Porri folium assignare? Cum autem vtrique Ferulæ folium tribuit, tam absurda comparatio demonstrat locum hunc vitiatum esse, quia veterum nullus Veratri folium Ferulæ folio comparauit. Quare locus sic videtur emendandus. χαλὸν δὲ ἀνθεμικῶδη, ἢ ὁμοίον τῷ τῶ νάρθηκος, βραχὴν σφόδρα, φύλλον δὲ πολυχύσιον (aut, vt apud Dioscoridem legitur, πολυχιδέσπερον) μήκος ἔχον, &c. Id est, caulem Asphodeli, aut Ferulæ similem sed valde breuem: folium multum fissum, &c. Quam lectionem Plinius confirmat his verbis. Vtrumq; caule palmi ferulaceo, &c. Ellebori nigri tria sibi nota esse genera scribit Matthiolus: primum, quod flores fert purpureos: alterum, quod candidos: tertium, quod herbaceos. Ei, cui flos est purpureus, numerosa sunt folia

folia, robusta, saturatè virentia, septena simul ex apice canaliculatiq; pediculi prodeuntia, quorū sēna, vtrinque videlicet terna in exortu coniuncta sunt: quod medium est, solū, & sine comite est. Caulem habet cubitū paulò breuiorem, rotundū, glabrum, ac solidum: flores Rosarum effigie, in purpura albicantes, è quorū medio inter alba quædam capillamenta, octo exoriuntur siliquæ, parvæ, coniunctæ, corniculorum figura, in quibus semen oblongū. Radicibus nititur numerosis, tenuibus, longis, saturatè nigricantibus, tenui intus matrice, à bulboso capitulo, vnde caulis exit, prodeuntibus, amaro acriq; gustu, & qui facillè stomachū moueat, odore insuauis, & ingrato, præsertim cū exenteratæ radices siccescunt. Ab hoc facie nihil distat Elleborus is, cui flores candidi, nisi florum colore. Eandem plantā pro gemino Dioscoridis Elleboro agnoscunt Pena & Lobellius. Niger Elleborus, inquit ille, iam plurimus ex Pyreneis & Alpinis in hortos translatus ineunte Hyeme, vel paulò post brumam flores profert, in candore rosèos, interdū albos, nonnunquam purpureos, è pediculis statim à radice ortos, Cyclamini modo. Folia habet in singulis pediculis maiora, breuiora, rotundiora, & retusiora superne, quæ duntaxat paululum crenata sunt, ex atro viridia, minùs crassa, aut rigida. Radix in-texta, & intricata innumera fibrarum nigrarum sobole, eodè fermè superno complexu appcisa, amara valde & ingratissima. His reclamatione nota vna à Dioscoride posita, nempe florum τὸ ὄμμα βοτρυώδες, id est, florum forma racematim coharens. Ij autè in vero Elleboro sunt primū Rosarū compressarum & nōdum reclusarū, deinde expansarum effigie, quæ figura à racemosa multum abest. Quare non βοτρυώδης in Dioscoride periti quidam legendum censent, sed βοτρυώδης, facili lapsu in tanta nominum affinitate, id est, comæ, siue capilli in modum. Sunt enim βοτρυῶδες siue βοτρυῶι cirri muliebres, capilli, cæsaries, & plexus muliebris, quæ scitè exprimūt in medio florum Ellebori velut Rosarum capillamenta, alba, deinde siliquæ octo parvæ coniunctæ. Præterea caulem τραχύ, id est, asperum, Elleboro nigro tribuit Dioscorides, qui in nostro glaber lauiq; est, non asper. At τραχύ etiam rigidum

Elleb. nig.
flore albo.

ELLEBORVS niger
III. Matthioli.



firmumq; exponi posse Pena putat. Tertius Elleborus, quem Matthiolus fœminā, aut Pseudoelleborum appellandum censet, habet folia digitorum nouem instar ad pediculum vsq; dissecta, Aconiti cynosconi ferè modo, sed longioribus diuisuris, nigricantia, vndequaq; serrata, & è longo planoq; pediculo, caua per medium excurrente linea ortum ducentia. Caulem edit vegetum, subasperum: flores cæteris similes, sed herbaceo colore subuirides, quinque aut plures, emergentibus è medio corniculis acuminatis, & vtrinque compressis, in quibus semen. Radicibus cohæret numerosis, tenuibus, palmā longitudine, ac etiam longioribus, colore nigricante, ac perinde vt in aliis è cepaceo capitulo enascentibus, odore similiter graui, & sapore amaro, acuto, ac nauseam mouente. Nascitur in montibus & conuallibus. Germināt omnia hæc Ellebori genera Ianuario, ac Februario mensibus, & sæpe germinādo niues perforant: florēt Martio. Dodonæus Ellebori nigri nomine tres plātas complexus, primū genuinum Dioscoridis Elleborū nigrū esse asserit, cui folia aspera,

Locus.
Tempus.

Elleb. nig.
Dodon.
Lib. 3. hist.
cap. 16.

nigricantia, in quaternas, aut quinas crenas profundius fissâ, Vitis, aut, vt Dioscorides ait, Platani foliis similia, sed minora: caules læues, è quorum verticibus flores aceruatim exeunt in paruis umbellis, veluti in Scabiosa, dilutè purpurei: deinde semen grano tritici haud absimile: quamplurimâ subsunt fibræ, tenues, longæ, nigra, ab vno capitulo prodeuntes. Idem Dodonæus alio in libro eundem Elleborum nigrum verum Dioscoridis esse, non Theophrasti, pertinaciùs astruit, eiusq; descriptionem ei adamusim quadrare contendit, caulem asperum illi tribuens, quem illic læuem esse dixerat. Præter formam vires etiam cōuenire ait. Sed id hominem torquet, quòd scribat Dioscorides semen Ellebori nigri in Anticyra Sefamoides vocari, eiusq; ad purgationes vsum esse: idè hanc lectionem vitiatam esse opinatur. Nam si Sefamoides, inquit, à Sefami similitudine nomen habet, improprie Veratri nigri semen, non Sefami, sed Cnici æmulum, Sefamoides nuncupabitur. Ex his colligit aliunde hæc verba Dioscoridi accessisse, & fortasse ex Theophrasto translata: scribit enim, *ὁ δὲ ἐλλέβορος ἐπὶ ταῦτα τῆ τερίξη, ἢ τῷ καρπῷ χεῖσιμος. Ἐπερ οἱ ἐν ἀντικύρᾳ, καὶ ἀπερ φασὶ, τῷ καρπῷ καθαίρουσιν: καὶ δὲ σηματοδοῖ τὸν*. Id est, Elleborus ad eadē & radice & fructu utilis est: siquidē in Anticyra, vtraique, fructu eius purgant, quē Sefamo similem fert. Et aliquantò post, *οἱ ἐν ἀντικύρᾳ τῷ σηματοδοῖ ἐλλέβορος διδοῦσιν, ὃ τινι καρπὸς ὅμοιος σησάμω*. Id est, Anticyrenses Sefamoidea Elleborum propinant, cuius fructus Sefamo similis est. Hæc verò non ab alio Dioscoridi adscripta, vt arbitrat̃ur Dodonæus, sed ab ipsomet Dioscoride ex Theophrasto mutuo sumpta fuisse non dubito, cū scribit, *καὶ ἐν ἀλλῷ καρπὸς κνίκῃ ὅμοιος, ὃν ἀπὸν καλῶσιν οἱ ἐν ἀντικύρᾳ σηματοδοῖ, χαράμωι πρὸς τὰς καθαίρουσας ἀλλῷ*. Quæ sic vertit Ruelhus. Semen Cnici, quod in Anticyra Sefamoides vocant, quo purgationes moliantur. Hæc si rectè intelligantur, vera sunt, & legitimi Ellebori fructū optimè referunt. Nam fructum Sefamo similem, auctores illi non semen, sed filiquas integras intelligūt, in quibus inclusum semē est Cnico simile: quas similes filiquas in iis Elleboris cōtemplari potes quos depinxit Matthioli, nō in eo quē Dodonæus legitimū Dioscoridis Elleborū nigrū statuit. Hæc nota, atq; aliæ quædam cū

ELLEBORVS niger,
II. Dodon.

Elleb. nig.
II. Dodo.



Elleb. nig.
III. Dod.
Carios.

in eo desiderētur, illegitimus Dioscor. Elleborus niger habēdus est Sanicula fœmina Fuchf. Astrantia nigra Gesnero. Alteram plantā à veri Ellebori nigri viribus parū dissentientē posuit Dodonæus, quæ à Belgis *Heylichkerstuyt*, id est, Herba Christi, aut natalitia dicitur, quòd Hymæ clemētiore ad Domini natalem diē floreat, quibusdam Planta Leonis. Huic folia sunt lata, spissa, in septenas, aut octonas partes diuisa, quarum singulæ oblongæ, acuminatæ, margine vtrinq; à medio sursum versus serrato: caule caret: flores in pediculis palmum altis è radicibus erūpunt, magni, primū niuei & venusti, deinde purpurascētes, postremò virentes, cū videlicet è mediis staminibus luteis exortæ filiquæ increuerint, quatuor aut quinque coniunctæ, in quibus semen. Pro radicibus multæ sunt crassæq; fibræ, nigra, in quibus medius tenuis neruus. Tertium genus Dodonæus Elleborum nigrum adulterinū cū Fuchfio nuncupat, à Germanis *Christwurtz* appellatū, à Belgis *Viercruyt*, quæ vox Herbam ignis significat, quòd quadrupedum morbo,

ELLEBORVS niger

-III. Dodonæi.

**ELLEBORVS niger**
adulterinus siluest. Fuchf.

morbo, quæ igne rustici vocant, medeatur. Superiori quatenus similia folia habet, minora, in multa etiã alia nouena scilicet diuisa, angustiora, toto ambitu vndeque serrata: caule pedalem, aut maiorem, cacumine in ramulos diuiso, à quibus flosculi deorsum nutantes dependent, minores, coloris ex pallido herbacei: quatuor etiã, aut quinque siliquæ parue succrescunt, semenque nigru & rotundum continent. Radicis fibræ sunt tenuiores, nigricantes, inter sese implicatæ. Enneaphyllò Plinij esse quibusdã doctis placet. Enneaphyllò, inquit, longa folia nouena habet, causticæ naturæ. Est Elleborus niger tertius Matthioli, flore herbaceo. Fuchsius Elleborum nigrum genuinũ Dioscoridis non describit, sed adulterini genera duo. Præus, Elleborũ nigrum adulterinũ hortensem, quod te. tiũ esse Dodonæi modò diximus. Alterũ, Elleborũ nigru adulterinum siluestre, quod Germani *Leuzkraut*, id est, pedicularem vocant, quod pediculos interimat. Hunc Elleborũ inter Aconita recenset, & Lycædonum primũ appellat: in 10 libro Elleborum nigru tertiu facit, proximè descripto nõ admodum dissimile. Caulẽ proceriorẽ habet & crassiorẽ: folia minora & angustiora, in sena, vel septena alia diuisa, ambitu vndiq; serrata: flores magnitudine superioris, pallidos: siliquas paruas, Sefamo similes, in quibus semẽ: radicẽ lignosam, breuẽ, cũ foliis plurimis & subnigricantib⁹. Nascitur in montibus asperis & petrosis, atque inter sepēs. Hyeme aut eius sine floret. Allobroges *Mastire* vocant. Tragus Elleborũ nigru adulterinũ eundẽ cũ priore Fuchsij posuit, genuinũ verò longẽ alium, tenerrimis videlicet foliolis, Abrotoni exigui, vt mox dicemus. Elleboro affines sunt Elleborastri & Cõsiliginẽ, sic dictæ à rusticis, quod in aruis inter Siliginẽ frequentissimè reperiatur, vel fortasse quod cierent aluum. Matthiolus plantã hĩc appictã Cõsiliginẽ esse suspicatur, nõ asserit: quoniã nullus tũ veterũ, tum recentiorum Cõsiliginis notas memoriæ prodiderit. Verũ quia huiusce plantæ radices per aurículas pecorũ perforatas insertæ, à pulmonaria, atque aliis morbis ea liberant, Ellebori nigri modo, suspicio est Columellæ & Plinij Cõ-

Lib. 27. c. 9.

Elleb. nig.
adulteri-
nus, Fuchf.Lib. 3. hist.
cap. 78.
In Histor.
purgant.

Lib. 1. c. 135.

siliginem esse. De hac sic Columella. Præsens remediũ cognouimus radicula, quã Lib. 6. ca. 5.
pastores Cõsiliginẽ vocant. Ea in Maris moribus plurima nascitur, omnique pecori maximè est salutaris. Læua manu effoditur ante Solis ortũ: sic enim lecta maiorẽ vim habere creditur. Vñ traditur talis. Aenea subula pars auriculæ latissima circũscribitur, ita vt manantẽ sanguine tanquã O literæ ductus appareat orbiculus.

Hoc & intrinsecus, & ex superiore parte auriculæ cū factum est, media pars descripti orbiculi eādem subula transiit, & factō foramini prædicta radícula inferitur, quam cū recens plaga comprehendit, ita continet, vt elabi non possit. In eam deinde auriculam omnis vis morbi, pestilensque virus elicitur: deinde pars,

PSEUDOELLEBORUS, siue *Consiligo*. Matth.

Lib. 25. c. 8.



Lib. 1. c. 35.

ELLEBORASTER
maximo flore & semine
pregnans.



quæ subula circumscripta est, demortua excidit, & minimæ partis iactura caput conseruatur. Plinius. Nostra ætas meminit herbam in Mar-
sis repertam. Nasçitur & in Æquicolis circa vi-
cum Neruesiæ, Consiligo vocatur. Et radix her-
bæ Consiliginis, quam nuper inuentam dixi-
mus, suum quidem & pecoris omnis remedium
præfens est pulmonum vitio, vel traiecta tantū
in auricula. Bibi debet ex aqua, haberi que in ore
assiduè sub lingua. Planta itaque, cuius hîc ima-
go expressa est, siue sit Consiligo, siue Pseudoel-
leborus, ad duorum palmorum altitudinem as-
urgit: cauliculos profert tenues ac molles: folia
longiuscula, tenuia, quadatenus Abrotoni: flo-
res Buphthalmi, paulò maiores, ex quibus capitu-
la prodeunt oblonga, moris Ruborum similia:
radicibus nititur nigris, nigro Elleboro simili-
bus, tenuioribus tamen, & aliquantò nigriori-
bus. Plurima nascitur in Boëmia, præsertim in
agro Pragensi. Ea vtuntur illic tum Medici,
tum pharmacopœi omnes pro Elleboro nigro,
peculiariter ad pecorum morbos magno suc-
cessu. Tragus legitimum Elleborum nigrum
perperam esse vult, vt diximus, alij Elleborum
ferulaceum Theophrasti. Sed iam ostendimus
Elleborum Theophrasti à Dioscoridis Ellebo-
ro diuersum non esse. Gesnero Sesamoides mi-
nus est hæc planta, Dodonæo & Anguillare
Buphthalmum. Elleborastrum; siue Consiligi-
nem geminam tradunt Pena & Lobellius, Ma-
ximam, quæ in segetibus reperitur passim circū
Biturigas, & variis aruis Vidugassum (Beauciam
vocat) Galliæ Aquitanicæ & Narbonensis, vt
iuxta Ladum amnem Monspelio vicinum, co-
piose prouentu foliorum florumq;: Caules pro-
ducit sesquicubitales, geniculatos, squamosa cu-
te, ex viridi nigricante vel atra, in alas multas di-
uisos, quæ densa folia fulciunt, singulæ septena,
leuiter crenata, digitata, Lupini, Platani, vel Vi-
ticis diuisura & figura, sed longiora, crassa, rigi-
da, odore & sapore ferè Laureolæ. Porriguntur
inde multiplices pediculi, qui in flores herba-
ceos, vel buxeos, pallentes, rugosos primū ex-
plicantur. Deinde succrescunt cornicula mem-
branosa, pallentia, quadamtenus Aquilegiæ: se-
men teres, atrum, oblongum, grano Tricici mi-
nus, re

nus, recludentia Sole Arietem ingressio. Perennis bruma frigidissima etiā Septen-
 erionalibus perstat, florētque Christi natalibus ferē. Altera Consiligo minor est
 tota, paucioribusque caulibus, & foliis, sed maioribus & latioribus magisq; ferratis.
 Hæc nihil aliud est quā Elleborus niger Matthioli flore herbaceo, Consiligo
 Ruellij, Sesamoides Cordi, Elleboraster Belgarum Lobellio. Annotat Pena nostra
 memoria pharmacopœos utraq; Consiligine vsos fuisse Ellebori nigri penuria
 & ignorantia, nonnullos etiam quod verum Elleborum nigrum esse sibi per-
 suassent: quæ tamen si ad illum non parum accedunt, tamen ei neutriquam tutō in
 vsu medico substitui posse. Superest vt Ellebori nigri vires explicemus. Purgat, in-
 quit Dioscorides, (legendum τὴν κατὰ κοιλίαν ex Plinio, Purgat per inferna.) Pituitā
 & bilem detrahit datus per se, aut cum scammonia, & tribus obolis, siue drachma
 salis: decoquitur etiam cum lente & iusculis, quæ purgationis causa sumuntur.
 Prodest epilepticis, melancholicis, insanientibus, arthriticis & resolutis. Menses
 inditus trahit, partus enecat, purgat fistulas impositus, & post tertium diem exem-
 ptus. Item contra grauitatem auditus in aurem immittitur, ibique in alterum, aut
 etiam tertium diem esse finitur. Scabiem sanat illitus cum thure, aut cera, & pice,
 cedrinoq; oleo: vitiligines, imperigines, lepras ex aceto sanat: coctus cū aceto do-
 lorem dentium collutione mitigat: erodentibus medicamentis commiscetur: ex
 eo, farina hordeacea & vino vtile fit hydropicis cataplasma. Consitus prope vitiū
 radices, vinum purgatorium efficit. Ipso domos respergunt, expiandi vim habere
 putantes: quare cum effodiunt, stantes Apollinem & Æsculapium precantur, vi-
 tantes aquilam, aduolare enim non sine periculo aiunt, quia mortem adfert auis,
 si Ellebori effossionem conspexerit. Celeriter autem effodere oportet, quoniam
 capitis grauitas ex odore oboritur: quapropter qui effodiunt, ad id arcendū Alliū
 edunt, & vinum bibunt, ita nulli noxæ oportuni redduntur. Emedullatur Veratri
 albi modo. De vtriusque Ellebori vsu multa præclare à Plinio literis mādāta sūt.
 Nigrum, inquit, purgat per inferna. Candidum autem vomitione, causasq; mor-
 borum extrahit, quondam terribile, postea tam promiscuum, vt plerique studiorū
 gratia ad peruidenda acrius quæ commetabantur, sæpius sumptitauerint. Carnea-
 dem respōsurum Zenonis libris, Drusum quoque apud nos Tribunorum popula-
 rium clarissimum, cui ante omnes plebs stans plaussit, optimates verò bellū Mar-
 sicum imputauere, constat hoc medicamento liberatum comitali morbo in An-
 ticyra insula. Ibi enim tutissimè sumitur, quoniam sesamoides admiscet. Farina
 eorum per se, & mista radícula qua lanas diximus lauari, sternutamentum facit,
 amboq; somnum discutiunt. Nigrum medetur paralyticis, insanientibus, hydro-
 picis, dum citra febrim, podagris veteribus, articulariis morbis. Trahit ex aluo bi-
 lem pituitasq;. Ex aqua datur ad leuiter molliendam aluum, plurimum drachma,
 modicè quatuor obolis. Miscuere aliqui & scammoniam, sed tutius salem. In dul-
 cibus datum copiosius periculum infert, oculorum caliginem fotu discutit:
 ob id quidam & inunxere trito. Strumas, suppurata, durities concoquit & purgat:
 item fistulas tertia die exemptum. Verrucas tollit cum squama æris, & sandara-
 cha. Hydropicorum vètri imponitur cum farina hordeacea, & vino. Pecorum &
 iumentorum pituitas sanat, furculo per aurem traiecto, & postero die eadem ho-
 ra exempto. Scabiem quadrupedum cum thure, aut cera ac pice. Album optimū
 quod celerrimè mouet sternutamenta, sed multò terribilius nigro, præcipuè si
 quis apparatus poturorum apud antiquos legat, contra horrores, strangulatus, in-
 tempestiuas somni vires, singultus infinitos aut sternutamenta, stomachi dissolu-
 tiones, tardiores vomitus, aut longiores, exiguos, aut nimios. Quippe alia dari so-
 lita, quæ concitarent vomitiones, ipsumq; Elleborum extraherent medicamentis,
 aut clysteribus, sæpe etiam sanguine venis emissio. Iam verò & cū prosperè cedit,

Consiligo
Belgarum.Vires.
Li. 4. c. 146.

Lib. 25. c. 5.

terribili visu variis coloribus vomitionum, & post vomitiones obseruatione alui, balinearum dispensatione, totius corporis cura, antecedente omnia hæc magno terrore famæ. Namque tradunt absumi carnem si coquatur vñ. Sed antiquorum vitium erat, quod propter hos metus parcius dabant: cum celerius erumpat, quo largius sumitur. Themison binas non amplius drachmas dedit: sequentes & quaternas dedere, claro Herophili præconio, qui Elleborum fortissimi ducis similitudini æquabat. Concitatis enim intus omnibus, ipsum imprimis exire. Præterea mirum inuentum est, quod incisum forficulis, vt diximus, cribrant: cortex remanet: hunc inaniunt: medulla cadit: hæc in nimia purgatione data vomitiones sistit. Cauendum est felici quoque cura, ne nubilo die detur: quippe impatientes cruciatus existunt. Nam Æstate potius quàm Hyeme dandum, non est in dubio. Corpus septem diebus antè præparandum cibis acribus, abstinentia vini, quarto & tertio die vomitionibus, pridie cœnæ abstinentia. Album & in vino dulci datur, aptissimè verò in lacte, aut pulte. Nuper inuenere dissectis Raphanis inferere Elleborū, rursumque comprimere Raphanos, vt transeat vis, eoq; lenimento dare. Reddi post quatuor ferè horas incipit. Totum opus septenis peragitur horis. Medetur ita morbis comitialibus, vt diximus, vertigini, melancholicis, insanientibus, lymphaticis, elephantia albæ, lepris, tetano, tremulis, podagricis, hydropicis, incipientibusque, tympanicis, stomachicis, spasticis, cynicis, ischiadicis, quartanis quæ aliter non desinant, tussi veteri, inflationibus, torminibus redeuntibus. Vetant dari senibus & pueris: item mollis ac fœminei corporis, animæ, exilibus, aut teneris, & fœminis minus quàm viris. Item timidis, aut si exulcerata sint præcordia, vel tumeant, minimè sanguinem excreantibus, caulariis vel latere, vel faucibus. Medetur extra corpus eruptionibus pituitæ: cum axungia falsa illitum: item suppurationi veteri. Mures polentæ admistum necat. Galli sagittas in venatu Elleboro tingunt, circuncisoque vulnere teneriorem sentiri carnem affirmant. Muscæ quoque necantur albo trito, & cū lacte sparso. Eodem & phthiriasis emendatur. Hæc de

Lis. simpl. Elleboro Plinius. Elleborus vterque tum albus, tum niger, inquit Galenus, extergentis simul & excalfacientis est facultatis. Quamobrem ad alphos, impetigines, scabies, lepræque accommodi sunt. Quinetiam niger si in fistulam callo induratam immissus fuerit, duobus tribusve diebus callum detrahit. Dentibus prodest cum aceto colluentibus. Sunt autem in tertio ordine excalfacientium & desiccantium.

Lis. meth. Porro niger gustu calidior est, candidus, subamarus. Veratrū album, inquit Actuarius, varios humores vomitione educit: datur ieiunis per se, & cum Sesamoide, Thapsiæ succo, halica, aqua mulsâ, lenticula aut sorbitione quapiam. Nonnulli exiguo cibo antea exhibitio Veratrum offerunt, iis potissimum quibus strangulationis suspicio imminet, aut corporis imbecillitas adest. Siquidem in iis qui ita assumunt purgatio periculo vacat, quod medicamentum citra mediū corporibus non apponitur. Quin & glandes ex eo sedi inditæ, vomitiones cient. Veratrum nigrum atram bilem & flauam vndique ex corpore trahens, deorsum pellit, non tamen cum difficultate: quocirca ipsum in febribus circuitu redeuntibus & diuturnis exhibemus. Datur etiam furore percitis, altera capitis parte dolentibus, & quos cephalæa diu infestauit. Est autem longè omnium aptissimum intestinis, vtero, vesicæ medicamentum purgans exhibentibus. Maxima eius vis est educendi peculiariter si quid permixtū est sanguini, quod ipsum vitiare possit: quare & in vultustis arquatis commodum est, & aspritudinibus quæ in summa cute exoriuntur, qualis est lepra, impetigines, & id genus alia: quin & elephantia laborantibus est accommodatum. Modus exhibitionis sunt scrupuli tres, paulò plus minusve, tenuiū fibrarum eradicebus pendentium, in aqua paululūm maceratarum, deinde cortice detracto, & in vmbra siccato, proiectaque tenui quæ ipsi subest medulla. Datur ex passo

ex passo & in oxymelite: verū suauitatis gratia quādā ex odoratis seminibus sunt inferenda. Si verō efficaciorē cupis purgationē, scammonij pauxillum adiecito. De vtriusq; etiā vsu distinctē admodū scripsit Mesues his ferē verbis. Elleborus duplex albus & niger, idēq; albo salubrior: quin & albus symptomata terribilia minatur: niger autē corpus incolume, & velut iuuenile tuetur. Calidus est & siccus ordine tertio, tenuat, terget, resoluit, carnē vlceribus superexcrecentē exedit. Adde quōd si ad arboris alicuius radices crescat, fructus ipsius purgatorios reddit. Albus calidus siccus in medio tertij, similiter terget, mordet: sed vomitu multo purgat, & sternutamēta valenter mouet. Vitandus autē hic est, quōd strangulet. Niger autem omnium consensu sumendus, præsertim castigatus natura & arte: solis robustis & animosis dandus, & Vere ipso. Datus autē quando & cui cōuenit, temperamētum melius: ob id mores quoq; probatiores reddit, & corpus incolume ac velut iuuenile efficit. Hæc enim propria ipsius sunt opera. Corpus enim totū excrementis corruptis expurgat, clementer ac sine molestia vacuat bilē vtramq; & pituitā: sanguinē proinde puriorē reddit, attrahēdo scilicet excrementa in venis mista, nō à solis cauitatibus partiū, sed à toto corpore, & à remotis partibus, & cute ipsa. Ad cerebrū quoq; purgandū, & caput totū, & sensuū instrumēta, & nervos & viscera, & vesicā & vterū est efficacissimus: cerebri quoq; affectibus, vt cephalalgia, hemicrania, mania, melancholia, vertigini, epilepsia, paralyti, aquarū in oculos defluxui apertē cōfert, iuncturaruq; quoq; morbis, vt nodis, & tumoribus scirrhis, strumis etiā. In summa est velut Theriaca, & per antonomasiā medicina cācri, elephantiæ, herpetis, erysipelatis, exāthematis, phagedenarū. Pulvis quoq; tenuissimus Ellebori nigri visum roborat. Acetū quoq; cum hoc decoctū, auri instillatū tinnitui cōfert, & auditū roborat. Idē acetū, si os colluatur, dentiū dolori confert: præterea splenis affectibus, febribus diuturnis, quartana biliosa, reliquis affectibus melancholicis sanatu contumacibus: urinā & menses mouet: corporis colorē & odorē bonum efficit, ac etiā oris. Cutis affectus, alphas vtroq; quoque vtriusq; modo sanatur: ex aceto affricus cuti, eius scedatē & panos delet. Albus autē vomitu immodico & violēto symptomata excitat horrēda: foris autē affricus cutis vitia, scabiē, impetiginē, lentigines valenter iuuat. Vterq; autē fistulis & vlceribus putridis ac malignis medetur. Albus autē quia huius tēpestatis corporibus est molestus, quin & velut venenum præsertim suffocans vitatur. Nigri autē virtus ad nostra vsq; tēpora est tolerabilis, licet etiā difficilis. Sanis etiā corporibus Elleborus est molestus, inquit Hippocrates. Arte autē & industria nostra castigatū quādo, & cui conuenit rectē propinamus, agitq; salubriter. Filius autē Zesar manna melli simili, tepida, quantitatē corticis radicularum Ellebori aptam horis octo macerat, colatū dat, in quo virtus est Ellebori. Idē fit in melle vuarū passarū aut iure gallinarū vel carniū, aut oxymelite, aut vino dulci, aut condito, aut syrupo, aut sapa aliqua, superaddentes polentam velorizam, aut pultem, & sorbēdum ita datur. Sunt qui in radicem Raphani perforatam Ellebori fibras immittūt die vno, postridie fibris ablatis dant Raphanum Ellebori vires habentem. Daucus item & piper longum, anisum, petroselinum, hyssopus, succus Calaminthæ, origanum, succus Cyrenæicus efficaciorē ipsum reddunt: & præter hæc Epithymum, Polypodium, sal Indus & similia: sese enim hæc confirmant. Ex hoc catapotia formauit Haly ad affectus melancholicos, elephantiam, alphas nigros contumaces efficacissima, quæ recipiant Hieræpicæ drach. duodecim, Ellebori nigri, Polypodij ana drach. quinque, Epithymi, Stæchadis ana drach. septem, agarici, lapidis Cyanei, salis Indi, Colocynthidis ana drach. tres. Dantur tutō à drach. vna ad aureos duos. Vtriusque autem Ellebori virtutem ex corpore deturbat mulsā, decoctum vuarum passarum, aut hordei, aut gallorum, aut gallinarum, cum oleo nucum, vel amygdalarum dulcium, vel simili:

puluerem verò Ellebori sumere tutum non est. Datur autem à filiquis sex ad tertiam drach. vnius, vel vsque ad drach. vnam.

TITHYMALI.

CAP. VII.

Nomina

TΙΟΥΜΑΛΟΣ & Τηθύμαλον Græcis, Latinis Lactaria herba, Lactuca marina, & Lactuca caprina, Mauritanis *Xanxer*, & *Ethulia*, Italis *Tithymalo*, Germanis *U-volffz milch*, Gallis *Tithymal*, vel, *Herbe au lait* dicitur. A' succo lacteo, quo turgent species omnes, nomen commune inditum Tithymalis, vel per diphthongum potius Tithoimalis, quòd mammam siue papillam vberis exitiosam siue virosam, non inicitè quis interpretetur: τῖθος enim mammam, μάλδς exitiosam significat. Similiter Lactariæ ob commune omnibus lac vocitata: atque ob eandem causam Lactuca, quòd ex hac herba haud secus atque ex Lactuca secta lac fluit: caprina, quòd capræ Tithymalis vescantur. Septem sunt Dioscoridi & aliis veteribus Tithymalorum genera. Sed plura hodie à recentioribus sunt obseruata. Primus Dioscoridis Tithymalus est mas, Characias, id est, vallis cognominatus, quòd vallis septisq; muniendis idoneus sit, à quibusdam Cometes, aut Amygdaloides, aut Cobius nominatus. Secundus femina, Myrtites, aut Myrsinites, id est, Myrtifolius, à Myrti foliorum figura, aut à nucibus, quibus similem fert fructum, Caryites. Tertius Paralium, id est, marinus, quòd in maritimis nascitur: quidam Tithymalida, & Mecona, id est, Papauer nuncupauerunt. Quartus Helioscopius, hoc est, Solem aspiciens, quia eius coma ad Solis cursum circumagitur. Quintus Cyparissias, à Cupressi foliorum similitudine. Sextus Dendroides, quòd ad arboris magnitudinem crescit. Septimus Platyphyllos, id est, Latifolius à foliorum latitudine. Plinius eadem & totidem genera recenset: Theophrastus tria tantum, Paralium, Marem, & Myrtiten, vt dicemus. Characiæ caules, vt delineauit Dioscorides, cubitum excedunt, rubri, acri &

Genera.


Lib. 16. c. 8.
Lib. 9. hist.
cap. 12.

Forma.
Li. 4. c. 159.

CHÀRACIAS, *Matth.*
secundus, Dodonæi.



TITHYMALVS *Myrsinites*
seu femina, Matth.



albo

TITHYMALVS Myrsinites melius expressus.*TITHYMALVS Paralius, Matthioli.*

à radice foliis pendulis, in cacuminiibus coma lunci. Nascitur in asperis maritimis. Alterum genus Tithymali Myrsiniten vocant, alij Caryiten foliis Myrti, acutis & pungentibus, sed mollioribus, (maioribus, non mollioribus, vetus codex habet) & ipsum in asperis nascens. Tertium genus Tithymali Paralius vocatur, siue

albo succo pleni: folia circū ramos, Oleæ similia, sed longiora, & angustiora: radix crassa, & lignosa. In summis caulibus coma est, qualis iuncearū virgarum, & super ipsis caeolae peluibus similes, in quibus semen est. Nascitur in asperis & montosis. Myrsinites similis natura Daphnoidi est, foliis similibus Myrti, maioribus, firmis, in cacumine acutis & spinosis. Samenta à radice mittit palmi altitudine: fructū fert alternis annis nuci similem, mordaci gustu. Nascitur & hic in asperis. Paralius nascitur in maritimis: ramos habet palmi altitudine, subrubētes, quinos senōsve, à radice, circa quos folia ex ordine parua, subangusta, oblonga, Lini foliis similia: caput in summo rotundum, in quo semen velut eruum, colore varium, flores albi. Totus autem frutex & radix succo albo turget. Helioscopius Portulacæ folia similia habet, tenuiora rotundioraque: ramulos emittit à radice quatuor aut quinque, dodrantes, tenues & rubentes, lacte copioso plenos: caput est Anethi specie, & semen velut in capitulis. Huius coma cum Sole circumagitur, vnde Helioscopij nomen accepit. Nascitur maximè in ruderibus, & circa oppida. Colligitur succus & semen, vt aliorum. Cyparissias caulem profert dodrantalem, vel maiorem, subrubrum, ex quo folia oriuntur Piceæ foliis similia, teneriora tamen & rotundiora, & in totum Piceam nascentem æmulantia, vnde nomen traxit. Candido succo madet. In petris nascitur. Tithymalus Dendroides cognominatus, in cacumine amplus & largam spargens comam, succo prægnans, subrubentes ramos habet, circa quos folia Myrto tenui similia, semen Characiæ simile. Platyphyllos Verbasco similis est. Plinius eadem genera iisdem ferè verbis descripsit. Tithymalum nostri Herbam lactariam vocant, alij Lactucam caprinam, narrantque lacte eius inscripto corpore, cum inaruerit, si cinis inspergatur, apparere literas: & ita quidam adulteras alloqui maluerunt, quàm codicillis. Genera eius multa. Primus cognominatur Characias, qui & masculus existimatur, ramis digitali crassitudine, rubris, rugosis, (reponne succosis ex veteri codice) quinque aut sex, cubitali longitudine, Lib. 26. c. 8.

Tithymalis,

*TITHYMALVS dendroides,*
Matthioli.

Tithymalis, folio rotundo, caule palmum alto, ramis rubentibus, semine albo. Quartum genus *Helioscopium* appellant, foliis *Portulacæ*, ramulis stantibus à radice quatuor aut quinque, rubentibus, semipedali altitudine succi plenis. Hoc circa oppida nascitur semine albo, columbis gratissimo, quod colligitur incipiente vva. Nomen accepit quoniam capita cum Sole circumagat. Quintum *Cyparissiam* vocant propter foliorum similitudinem, caule gemino aut triplici, nascentem in campestribus. Sextum *Platyphyllum* vocant, alij *Corymbiten*, alij *Amygdaloidè* à similitudine, nec ullius latiora sunt folia. Septimum *Dendroides* cognominant, alij *Cobion*, alij *Leptophyllum*, in petris nascens, copiosissimum ex omnibus maximè (maximis in veteri codice legitur) cauliculis rubentibus, & semine copiosissimum. Hactenus *Pinus*. *Dioscorides* *Characiam* *Cobion* appellatum fuisse scripsit, quam appellatione *Plinius* *Dendroidi* attribuit: item ille *Characiam* *Amygdaloidè* vocari, *Plinius* *Platyphyllum*. *Theophrastus* de tribus generibus hæc literis mandavit.

Lib. 9. hist.
cap. 12.

τῶν δὲ τιθύμαλων μὲν παράλιος καλούμενος κόκκιος, φύλλον ἔχει πτερυγεῖς, καυλὸν δὲ τὸ ὅλον μέγεθος ὡς τῆς σπιθαμῆς, τὸν δὲ καρπὸν λευκόν. ὁ δὲ ἄρβυρον καλούμενος τὸ μὲν φύλλον ἐλασιώδες ἔχει, τὸ δὲ ὅλον μέγεθος διπληχυαῖον. ὁ δὲ μωρτίτης καλούμενος τιθύμαλος, λευκός, τὸ μὲν φύλλον ἔχει χυθράπερ ὁ μύρρινος, πλὴν ἀκυνθίδες ἐπ' αὐτῆς, κλημάτια δὲ ἀρίστην

TITHYMALVS dendroides,
Dodon. ex Codice Casareo.

TITHYMALVS leptophyllus,
Matthioli.



ἀφῆσιν ἐπὶ γῆς, ὡς σπιθαμῖαι. ταῦτα δὲ ἑκάμα φέρει τὸν καρπὸν, ἀλλὰ παρ' ἑτοσ, τὰ μὲν νῦν, τὰ δ' εἰς νέωτα, πεφυκότα ἀπὸ τῆς αὐτῆς ῥίζης. φιλᾷ δὲ ὀρεῖνὰ χυμεῖα. ὃ δ' ἡ καρπὸς αὐτῆς καλεῖται κάρυον. Id est, Ex Tithymalis est Paralium, granum vocatus, folio rotundo, caule tota magnitudine palmum attingente, fructu candido. Qui mas vocatur folio est Oleæ, magnitudine duos cubitos æquat. Myrtites, qui Tithymalus albus dicitur, foliū habet Myrti, nisi quod in cacumine spinosum est fardamenta parua per terram emittit, palmi longitudine, quæ non simul, sed alternis annis fructum ferunt, alia hoc anno, alia proximo, exorta tamen ab eadem radice: fructus Nux vocatur. Matthiolus hæc Tithymalorum genera depinxit, Characiam, Myrsiniten, Paralium, Helioscopium, Cyparissiam, Dendroiden: Platyphyllum vulgaris notitiæ prætermisit, & alium, cuius Dioscorides non meminit, Leptophyllum addidit, quo Leptophylli nomine Plinius Dendroiden nuncupauit. Pena affirmat Characiam Matthioli, Tithymalum Platyphyllum esse. Est enim longioribus, latioribusque foliis quàm ceteri, ramis sesquicubitum & cubitos duos altis, alioqui Dendroidi assimilatur. In Narbonæ, Gallicæ Prouinciæ, Lugdunensis præfecturæ, & aliis plurimis Galliæ & Germaniæ siluosis, & fluentorum ripis, nihil frequentius. Floret Maio & Iunio vnicaulis sæpius, eoq; Dendroidi affiniore. Characiam verò huic Platyphylo admodum similem, sed minorem caule & foliis, ait Pena frequentiore etiam esse in Germania, & Aureliæ vicinis siluosis, quàm calidiori solo, nullibi quàm in Anglia copiosiore: primò Vere florere, caulésque complures à radice lignosa, fusca, rubentes mittere, in quibus folia multò minora, purpurascencia, amygdalini similia, quàm Paralij maiora: luteolos flosculos, ex quibus deinde per Iunij messes oriuntur triangulares siliquæ, in quibus terna grana, paulò superius quàm sint concaua folia, quæ pertranscunt umbrellarum ramuli. Dodonæus in Historia purgant. Characiæ species quinque constituit. Primus caules profert cubitales, teretes & rubentes, folia tenuia, oblonga, angusta & longiora, maioráque quàm Oleæ, sed amygdalini angustiora, com

Cap. 15.
lib. 4.

TITHYMALVS Characias
primus, Dodon.



TITHYMALVS Characias
quartus, Dodon.



terorum Tithymalorum ritu fert. E' Narbonensi agro & Gallica Prouincia in hortis Belgicis colitur. Quintus Dodonæi Characias, nobis est Tithymalus Myrsinites serratus, de quo mox dicemus. Matthioli Myrsinites habet folia circa caulem totum crassa, acuta, Myrto similia. Idè Paraliū nasci ait in maritimis tātūm, Senensis

ra, comam in cacumine largam, & lunci ferè modo effusam, quæ concava quædam sursum spectantia profert, vasculis siue acetabulis similia, ex quibus flosculi sublutei: deinde triquetra exeunt capitula, parua, in quibus semina: radix dura fibras multas habet. Monspelicibus Amygdaloides dicitur, in agro Mōspeliensi ad crepidines Ledi amnis cis pōtem Castri noui, item Lugduni ad Athenæum cœnobium in peninsula, Aureliæ, Biturigibus, & alibi in Gallia plurimus: folio Characiæ Anglici, sed longiore, molliore, & longè maiore, latiore magisque sparsa fœtura, peltata coma: radix fibrata. Est Clusio Characias legitimus Dioscoridis, cui florem nigrum tribuit, nō subluteum aut pallefcētem. Est altera Characiæ species, foliis superiori similis, sed durioribus: caules quoque non nihil, tamē minùs rubent: coma altior, & qui hanc fert caulis, foliis haudquaquam ut prioris exuitur: illius enim comam peltatam facientis folia ferè semper defluunt: vascula, flores, semina, & radices satis conueniunt. Hic est Characias Matthioli. Ad hoc genus pertinere videtur, non caulibus rubēs, sed candidus Tithymalus. Caules ei teretes sunt, ramosi, cubito sæpe altiores, folia quoque oblonga, angusta, albida, tenuique lanugine pubescentia: umbella contractior: flosculi parui, luteoli: semina trigemina in acerabulis, ut aliorum. Tithymalus Characias quartus Dodonæi foliis est similiter longis, angustisque; paulò quàm primi aut secundi minoribus, etiam albicantibus, sed minimūm lanuginosis, umbella ex viridi sublatea, quæ, priusquam explicetur, oblongioris fructus, veluti amygdalæ, rudimentum præfert, eiusdem tamen cum reliquis foliis coloris: flosculi & semina aliorum similia: radix altè demittitur. Est Myrsinites altera, & Turbith Alexandrinū quorundam, multò tamen cognatio-rem Characiæ quàm Myrsinitis putarunt Belgæ, inquit Lobellius, quamvis priusquàm umbellas pandat, suprema folia proferat occlusa, quæ veluti nucem amygdali adumbrare videntur, ut diximus: foliis enim est pallidè virentibus, Characiæ æmulis, sed minoribus angustioribusque: fructus & flores luteos herbaceos cæ-

TITHYMALVS paralius,
Dodonæi & Penæ.



Senensibus, Argentario promontorio, & in toto illius regionis tractu, item in Aquileiensi agro esse frequentissimum. At Pena Paralij & Myrsinitæ effigies à Marthiolo propositas esse commentitias, neque ex plantis ipsis expressas ait, Paraliumque, nusquam, nisi sabuloso sterili- que litorum solo mediterranei, occidui, & Germanici maris, copiose proueniētem, descri- bit, virgis à radice rectis, rubellis, tactu gluti- nosis: foliis densè stipantibus, subnigris, lino la- tioribus: flosculis ex herbaceo luteolis, in sum- mis pediculis circinata foliola media traiciēti- bus, sicq; vnabellam efformantibus, & semen edentibus tricoccum, Chamælææ aut Lathyri- dis non dissimile, minus & coactius: intus esse tria medallosa grana: radice simplici, prolixa, lignosa. Eundem Paralium descripsit & pinxit Dodonæus in Histo. stirpium. Pena Dioscori- dis Myrsiniten, id est, Myrsifolium, siue scemi- nam, siue repentem Tithymalum, proxima Pa- ralio facie esse scribit, sed breuioribus, pedali- bus, pinguioribus furculis humi repere, quos fo- lla prorsum Chamælææ, latiora Myrti, vel Ru- sci, mucronata, crebra stipant, vt Paralium, pallidè virentia, & in summo magis sparsa, Sedi maioris aut Laureolæ ambitu, è quo trans folia concava & vmbilicata sparguntur quaterni aut quini pediculi, qui Iunio & Iulio flores luteos herbaceos, pusillos, muscosos ferunt, & semina triquetra Paralij, Augusto matura, maiora, que

Lib. 3. c. 23.

TITHYMALVS helioscopius,
Dodonæi.



TITHYMALVS paralius,
Dodonæi ex Hist. purgant.



etiam tribus constans lateribus, & in trigonas valuulas dehiscunt, quæ singulæ singula grana, teretia, oblonga, fusca concludunt, medulla alba, acri, non ingrata. Hunc, inquit, Angliæ, Belgij, Francia horti sæpius alunt, nec alibi natum vidi. Eum certè multò melius pinxit Dodonæus, additis flore & capitulis affabre expressis. Idem in Historia purgantium Paraliū exhibuit, & ab eo, quem ex Historia stirpium monstrauimus. Illi cauliculi quini senive assurgunt, cubitales, tenues, dilutè rubentes, quos multa parua, angusta, oblonga vestiunt foliola, instar Lini, sed candida densioraq;: rotunda, sed minimè amplæ in cacuminibus umbellæ, in quibus flores & semina perinde vt aliorum. Tithymalus Helioscopius, inquit Matthiolus, vulgaris notitiæ est: nascitur enim passim prope urbium & oppidorum mœnia, in agris cultis & incultis, hortis & collibus. Dodonæus & Pena eundem Helioscopiū depinxerunt, qui Germanis *Sonne-vuende-vuolfszmelk*, Belgis *Croonkens cruyt*, Gallis *Reueille-matin* dicitur, omnib' familiaris & notior, foliis Portulacæ, minùs crassis, ambitu non nihil crenato: caules paruos, pedales, teretes, in humum flexos, quaternos & quinos cingentibus: floribus ex luteo in pallidum languentibus, in umbellam collectis: semine cæteris simili. Sed Narbonæ, vbi maturuerit, adeò spiritu vaporoso turget, vt in solo relictum quasi sese moueat, exiliat, mediūque crepet, puerisq; grato sit spectaculo, quæadmodum & Tamaricis semen. Hæc Pena. Cyparissias, inquit Matthiolus, ea est planta, quam Esulam minorem perperam vocant Itali, cuius pro omni Tithymalo inualuit vsus. Ab hoc multum differt Cyparissias Dodonæi in Histo. purgant. & ab eo, quem ipse in Historia stirpium depinxit. Illi enim foliola sunt oblonga quidem, sed perangusta, & quàm Esulæ minoris angustiora, satis ad Picæ folia accedentia, molliora tamen ac tenuiora: cauliculus nonnihil ruber, dodrante altior, ramulos effundit complures, in quorum medio umbella cum acetabulis purpurascens: floribus seminibusque perpusillis: radix fibrata. Idè videtur esse, qui Leptophyllos Matthioli: cacuminibus tamen differunt. Huius species quædam minor reperitur, auctore etiam Dodonæo, palmum duntaxat alta, tenuibus cauliculis, oblongis & angustissimis foliolis, umbella exigua, flosculis luteolis, seminibusq; minutis. Matthiolus Dendroiden vidisse ait extra Terracinam, agri Neapolitani urbem, inter saxa

TITHYMALVS Helioscopus,
Dodonæi.



TITHYMALVS Cyparissias,
Dodonæi.



ter saxa antiquissimi specus, plantæ arborescentis effigie, & in Tergestino litore, non procul à Timauro fonte in saxosis quibusdam rupibus arborescens, Anguillara in Thuscia, Liguria, & prope Massiliam. Bellonius refert in Creta ad duorum hominum altitudinem crescere, caudicem habere crassitudine corporis humani. *Platyphyllū*, id est, Latifolium genuinū se reperisse credit Clusius. Is pedali, interdum maiore altitudine aliquotà radice ramos emittit, nonnunquam simplici caule assurgit, circa quem ampla folia, mucrone rotūdiore, ad lætitudinis nouellæ foliorum formam accedentia, viridia aliquantū um carnosa, & succo pallescente acrique turgentia: flos ex luteo purpurascens ramulis insidet, ac veluti acetabulis quibusdā continetur: radix crassa est & candida. In solo Valentino regno inter Biar & Huementente via scæbrofa inter medios frutices duntaxat se obseruasse ait, florentem mense Martio. Eundem pictum dedit Dodonæus in Historia purgant. Duos alios *Tithymalos* ex Dalechampio hic exhibemus. Prior est *Tithymalus ferratus*, qui in agro Monspelienſi vbiuis gignitur, radice multiplici, candida: caulibus multis, pede alioribus, rotundis: foliis ima parte longis & angustioribus, superiore latoribus, serratis in ambitu, vnde cognomentum: flore subluteo, fructu anguloso. Tota planta lacteum succum fundit acrem & erodentem. Summa caulium parte, vt in *Tithymalo* Characia, folia duo iuncta quasi lacunatum alueolum efficiunt, è quo pediculi florem ac fructum sustinentes exeunt. Alter est *Tithymalus verrucosus*, qui in aridis & sabulosis gignitur prope Lugdunū, ad Rhodani fluuienta: radice breui, sed surculosa: caulibus multis, cubitalibus: folio Myrti, inæqualibus spatiis disposito, candicante, minimè per ambitum diuiso: flore ex herbaceo subluteo: fructu rotundo, verrucarum tuberculis simili, qua de causa Verrucosum cognominarunt. Tota planta lacte manat, vt & cætera *Tithymalorum* genera. Nunc de eorū viribus dicendum. Characiæ liquor lacteus, auctore Dioscoride, vim habet aluum per inferna purgandi: pituitam & bilem ducit, duorum obolorum pondere ex posca sumptus. Cum melicrato autem potus vomitiones cit. Appetente vindemia lacteus hic liquor colligitur. Depilat is recens ex oleo in Sole inunctus, renascentēq; capillos flauos & exiles efficit, tandēque omnes perimit. Cauernis dentium inditus leuat dolores, sed ceras dentes oblinendi, ne effluēs fauces aut

TITHYMALVS *platyphyllus*,
Clusij & Dodon.




TITHYMALVS *ferratus*,
Dalechampi.



Li. 4. c. 193.

TITHYMALVS verrucosus,
Dalechampi.



Lib. 26, c. 8.

linguam vitiet. Idem inunctus formicantes verrucas penfiles, thymos & impetigines tollit. Valet etiam aduersus pterygia, carbunculos, phagedanas, gangrænas fistulasque. Semen & folia eadem quæ lacteus succus præstant, dimidio acetabulo pota. Radix drachmæ pondere cum hydromelite insparfa & pota, per inferna purgat. Decocta cum aceto colluto ore, dentium dolori auxiliatur. Huic consimilem facultatem habent Myrsinitæ succus, radix, semen, folia, ad ciendas tamé vomitiones imbecillior hic est. Paralij vsus supradictio similis est. Helioscopius vim eandem habet cum superioribus, sed non adeo validam. Cyparissia vis etiam eadem quæ præcedentibus. Dendroides quoque eiusdem effectus cuius superiores. Platyphylli radix, succus, & folia, per inferna trahunt aquas. Pisces necat tufus, & aqua dilutus. Plinius eorundem Tithymalorum vires partim ex Dioscoride, partim ex Theophrasto, partim ex aliis tradidit his verbis. Tradunt toties purgari hydropicos fico sumpta, quot guttas lactis Characiæ exceperit. Est & semen in vsu cum melle deco-

ctum ad catapotia soluenda alui gratia. Semen & dentium cauis cera includitur. Colluuntur radices decocto è vino aut oleo. Illinunt & lichenas succo: bibuntque eum, vt purgent vomitione, & aluo soluta, aliàs stomacho inutilem. Trahit pituita sale adiecto in potu, bilem aphronitro. Si per aluum purgari libeat, in posca: si vomitione, in passo aut aqua mulsa. Media potio tribus obolis datur, ficos à cibo sumplisse melius est, fauces vrit leniter: est enim tam feruentis naturæ, vt per se extra corpori impositus, pustulas ignium modo faciat, & pro caustico in vsu sit. Myrsinitæ fructus demetitur cum messum maturitate, lauaturque, deinde siccat, & datur cum Papaueris nigri partibus duabus, ita vt sit totum acetabuli modus. Minus hic vomitionibus purgat quam superior, cæteri item. Aliqui sic & folium eius dedere, nucem verò ipsam in mulso, aut passo, vel cum sesama. Trahit bilem & pituitam per aluum. Oris vlcera sanat. Ad nomas oris folium cum melle estur. Paralij semen colligitur incipiente vua, & siccatum teritur, sumiturque acetabuli mensura ad purgationes. Trahit bilem per inferna in oxymelite dimidio acetabulo: cæteri vsus qui Characiæ. Cyparissia eadem vis quæ Helioscopio aut Characiæ. Platyphyllus pisces necat, aluum soluit, radice, vel foliis, vel succo, in mulso, aut aqua mulsâ drachmis quatuor. Detrahit priuatim aquas. Dendroides est eiusdem effectus cuius Characias. Galenus dilucidius has vires exposuit his verbis. Tithymali omnes vincentem habent acrem calidamque facultatem: inest verò & amaritas. Validissimus Tithymalorum liquor est. Secundum locum tenet semen, & folia. Sed & radix earundem facultatum particeps est, verum non ex æquo. Sanè ipsa cum aceto decocta dolores dentium sanat, maximè qui illis erosio proueniunt. At liquores vt qui valentior vim habeant, in foramina quidem ipsa dentium induntur. Cæterum si aliam corporis partem contigerint, continuo adurunt, vlcerantque: quapropter foris illis cera circumuoluitur. Sic pilos quoque succus inunctus tollit. Porro quum vehementior sit, oleo miscetur: & si id sæpe fiat, tandem prorsus radices pilorum adustæ corrumpuntur, corpusque depile red-

Lib. 8, sim.

detur. Eadem facultate myrmecias, acrochordonas, pterygia, & thymos auferunt, detergentque lichenas & psoras, quia scilicet illis abstergendi facultas inest propter amaritudinem. Præterea vlcera phagedænica, anthracode, & gangrænode, quia valenter calfaciunt & abstergunt, si in tempore & moderatè quis vtatur, iuuare poterunt. Verumenimvero & fistularum callos eadem facultate adimunt. Porro hæc omnia genere quidem similiter, imbecillius tamen & folia & fructus præstare possunt. Quibus sanè & ad pisces in aqua stagnante capiendos vti assolent. Celerrimè namque ab illis in vertiginem acti, ac semimortui redditi ad aquæ superficiem feruntur. Cæterùm cùm septem sint eorum genera, valentissimus est, quem Characiam nominant, & Myrsinites, & qui in petris nascitur instar arboris: deinceps qui Verbasco similis est, & Cyparissias, post Paralys, de nique Helioscopius. Proportione verò cõprehensæ eorum facultatis & cinis, & lixiuium erit.

TITHYMALVS TUBEROSVS

sive Apios. CAP. VIII.



TUBEROSVS Tithymalus exiguos promit cauliculos, aliquantulum rubentes, tenues ac teretes: circa quos exigua & parua foliola, forma quidè foliorum Hyperici aut huiusmodi Rutæ syluestris, at minora, Chamæxyces æmula. Umbellæ in fastigiis raræ, in quibus acetabula: flosculi pallentes lutei: semina asperiuscula triquetra, vt aliorum Tithymalorum,

TITHYMALVS tuberosus
sive Apios, Dodon. purg.



minora tamen: radix tuberosa pyri modo turbinatur, inferiore parte angustior, foris nigricans, interiùs candida. Manat ex hoc lacteus quoque succus, quacunque eius vulnerata aut læsa parte. In Apulia Italiæ prouincia gignitur, nec non in Græcia ac vicinis insulis, vt Creta, Lemno, aliisq; & quidem illic locis montosis. Exit vno loco longioribus cauliculis: aliis teneioribus breuioribusq;. Huius quandoq; maior: illius verò subinde minor est radix. Memini siquidem me ab excellentissimo clarissimoq; viro Iacobo Antonio Cortuso, patritio Patauino, duas olim huius plantas accipere. Vnius radix maior crassiorq;: folia verò & ramuli minora: alterius verò radix minor, sed ramuli longiores, & folia paulò maiora. Hunc Tithymalum Græci ἀπιον à figura & similitudine pyri nūcupant: dicitur quoq; & ἰχθὺς & à Gaza Latine Carica, quod ἰχθὺς, id est, Caricam sive ficum aridam radix referat: item & χαμαῖς κάλαμος, sive terrestribus glans, & à figura quoq;. Sunt tamen & alij χαμαῖς κάλαμοι Germaniæ familiares ac edules de quibus in historia frumentorum. Pempt. 4. scri-

psimus. Bellonius χαμαῖς κάλαμος modò in Græcia Apion dici scribit. Facultate autem & temperamento Tithymalus iste, sive Apios, vehementer calidis ac siccis est, reliquis Tithymalis similis, ac perinde quoque humano corpori molestus ac noxius. Pars radice superior, Dioscorides ait, sumpta vomitione bilem pituitamque educit: quæ ad radicem inferior, per aluum. Tota vtrinque purgationes mouet. Succus sesquiboli pondere, vtraque etiam parte purgat. Hydropicis, inquit Plinius, datur acetabuli mensura.

Nomina



ΠΙΤΥΟΥΣΑ Græcis, Latinis Pityusa, Mauritanis *Alsebram*, & sine articulo *Scebran* & *Scobran*, quod ex Serapione facile intelligi potest, qui nomine *Scobran*, id est, *Esula*, ut ipse interpretatur, totum Dioscoridis de

Li. 4. c. 160.

Pityusa caput transcripsit, Officinis *Esula* siue *Ezula* nominatur. Pityusa autem à dictione *ωλτρος*, quæ *Piceam* significat, quòd *Piceæ* folia referat. Hanc Dioscorides

Forma.

Tithymalorum generibus assignauit: attamen cum *Cyparissia* Tithymalo nomine, viribus, natalibus, foliis præsertim, sit ad eò affinis, ne quem falleret hæc similitudo, Dioscorides specie à *Cyparissia* differre monuit, scripsitq; caulem habere cubito altiore, multis geniculis cinctum, foliis acutis, tenuibus, *Piceæ* similibus circumdatum: flores paruos, veluti purpureos: semen latum instar lenticulæ: radicem albam, crassam, succo plenam. Inuenitur quibusdam in locis magnus hic frutex.

Lib. 24. c. 6.

Plinius de herbis propter cognationem nominis cum *Pino* & *Picea* agens, breuius descripsit. Cum honore & Pityusa, inquit, simili de causa dicitur, quam quidam in Tithymali genere numerant. Frutex est similis *Piceæ*, flore paruo, purpureo. In quibus hæc duæ voces, cum honore, quæ in vulgatis codicibus leguntur, redundant, & penitus ineptæ sunt. Quare legendum ex veteri codice, Et Pityusa simili de causa dicitur, &c. Matthiolus censet *Alsebran*, siue *Scebran* minus, eam

In cap. 160. lib. 4.

PITYUSA Matth. siue
Esula maior.



esse plantam, quæ Officinis *Esula* minor dicitur, Dioscoridi Tithymalus *Cyparissias*: *Alsebran* maius, siue *Mehesclengi* *Auicennæ*, eam esse, quæ Græcis dicitur Pityusa, Officinis *Esula* maior, quæ in Italia passim ferè prouenit, facie minoris *Esulæ*, sed longè in omnibus maior, ad eò ut in quibusdam regionibus, ut in *Apulia*, arbusculæ speciem referat. Copiosa nascitur in *Veronensi* agro, ea planitie qua ad *Benacum* transitur, sed quòd aridissimum hic sit solum, non valde adolefcit. *Dodonæus*, *Pena*, *Lobellius* Pityusam *Esulam* minorem esse censent. Cum enim Dioscorides non totum Pityusæ habitum & lineamenta *Piceæ* compareret, sed folia duntaxat, *Esula* minor *Piceam* foliis faris refert, quàm *Cyparissia* maioribus latioribusq;. Præterea *Esulæ* vox ex Pityusa videtur detorta: subla- tis enim duabus primis syllabis Pity, ex *Vsa* videtur deminutum nomen *Vsula*, & mutata prima vocali *Esula*. Cum etiam Dioscorides Pityusam, id est, *Esulam* minorem delineasset, innuit eius alteram esse speciem maiorem, scribens fruticem hunc quibusdam in locis reperi-

ρι σφόδρα ἐννεγόν, id est, valde magnum, quæ est *Esula* maior, vnica nota repugnante: scribit enim Dioscorides Pityusæ fructum esse *πλατυδὸς φανόν*, id est, latum *Lenticulæ* instar, quum *Esula* flores & fructum habeat non *Lentis*, sed *Tithymali*, id est, triquetra capitula, in quibus semen. Sed mendosum hunc locum esse credunt docti viri, rei ipsius cognitione, & virium experientia suffragante. Vtriusque *Esulæ* iconem ex *Dodonæo* in historia purgant. hic proponimus, quæ & à *Matthioli* pictura hic etiam posita, & ab *Esula* in *Histo.* Stirpium picta differre videtur, vbi *Esulam* maiorem pinxit, quem *Fuchsius* Tithymalum *platyphyllum* fecit,

*ESULA maior, Dodonæi
Hîstor.purgant.*



Esula parua, flosculis rubris, & semine *Pepli*, peltata foliola transmittentibus, *Tithymalorum* ritu. *Esula* maior *Dodonæi* ex *Hîstor.purgant.* videtur esse *Esula* maior *Germanica*, à *Pena* depicta, cuius apud *Germanos* & *Belgas* pharmacopœos


*ESULA minor, Dodonæi
Hîstor.purgant.*



PITYUSA siue *Esula* minor, *Dod.*
Hîst.stirp.Tithym.platyphyllos, Fuchf.



PITYVSA siue *Esula minor*,
Dodon. Histor. stirp. Tithym.
Cyparissias, Fuchf.



bi quàm in litoribus, quèadmodum *Tithymalus Paralius*, & insulis maris Adriatici facillè reperitur, & *Lio*, insula parua. Est hæc Venetis Medicis & pharmaco-

frequens est vsus, prægrandis *Pityusa* *Dioscoridis*, quam ille luculentius descripsit his ferè verbis. Ex ampla multisque adnatis implexa radice, crasso, denso, pulloque cortice amicta, innumera eriguntur virgultæ, minimè digittum crassa, & binos cubitos alta, virentia, quæ folia habet crebra, *Lathyridis*, aut arbo rescetis *Tithymali*: nec semen dissimile, sed partim secundum caulis & foliorum interualla, partim in umbella, sed minùs lata, & minùs in orbem collecta. Cætera non dissident à reliquis *Tithymalis*. Verùm rarior hæc in Italia & Gallia, frequens in Germania superiori & inferiori ad *Rhenum*. Alia *Esula* genera obseruauit *Herbarij*. *Pena* & *Lobellius* *Esulam* raram ex *Lio* Venetorum insula monstrarunt, quæ sesquicubitum, & cubitos duos longos caules emittit, fungosos, rugosos, fuscos, minimè digittum crassos, in ramulos multos pedales diuisos, in quibus bina folia per interualla, maiora quàm *Alypi*, lenta, pingua, *Thymeleæ*: flores penduli, purpurascens: radix foris pulla, sesquicubitum longa, digittum minimè crassa, succo plena. Tota planta lactescit. Non ali-

PITYVSA siue *Esula minor altera*
floribus rubris, Lobell.



ESVLA maior Germanica,
Pena.



ESVLA rara, *Pena*
& *Lobell.*

ESVLA rara elio *Venetorum*
Insula Pen.alia.



ESVLA filuestris, Tragi.



pœis Pityusæ species, & hac Esulæ vulgaris vice vtuntur in confectione Benedictæ, & catapotiiis catharticis: purgat enim non segniùs, quàm Esula communis. Quibusdam creditur Alypum Dioscoridis, aliis, sed perperam, nigrû Turbith, quod Actuarius Pityusam esse arbitrat, vt diximus. At Pityusa quidem ea non est, sed persimilis, ideò rara Esula nominata. Tragus tres alias exhibuit. Siluestrem, quæ in sabulosis siluis prouenit, caule procero, cubiti altitudinem ferè attingente, elegantioribus, ac magis rubris umbellis: alteram dulcem, quæ in vmbrosis ac vliginosis montibus & vallibus alpium Helueticarum nascitur, caule, flore, foliis, radice & lacteo succo Tithymalis & Lathyridi adeò propinqua, vt ab illis vix discerni possit. At gustus ipsius lactei succi & radiceis dulcis est: semen rotundum, luteum, ad milium accedens, è vasculis suis cùm maturuerit exilire solitum. Est Trago alia Esulæ exiguae species, quæ in agris quibusdam à messe autûnali tempore reperitur, frutex dodrantalis, furculosus,

Li. 1. ca. 100.

minutissimis foliis, Thymo similibus, vestitus: semen in tripartitis loculamentis continetur. Pityusæ radix, vt auctor est Dioscorides, purgat per inferna duarum drachmarum pondere, data cum aqua multa. Seminis autem drachma vna datur: succi verò cochlearis vnus mensura. Excipitur hic farina, & in catapotia formatur. At foliorum drachmæ tres dantur. Plura tradit Plinius. Bilem, inquit, & pituitam

Li. 4. c. 160.

Vires &

Temper.

Lib. 24. c. 6.

tuitam

tuitam per aluum detrahit radix, decocti hemina, aut seminis ligula in balanis. Folia in aceto decocta furfures cutis emendant: mammas quoque misto Rutæ decocto, & tormina, & serpentium ictus, & in totum collectiones incipientes. Pityusam, inquit Galenus, quidam speciem esse putant Tithymali, quod succum illi similem habeat, quodq; similiter purget, & in cæteris omnibus sicuti li viribus addimilis. Multa de hac planta tradit Mesues diligenter notanda. Esula, inquit, herbarum lactiarum species, rusticorum est purgatorium. Vna est magna, altera parua. Magna vlcera viscera, ob id perniciofa. Parua est præstantior, præsertim corrice radice tenui, leui, fragili, subrubro Calsiæ modo, ante sex menses collecto:

Li. 3. simpl.

Lib. purg.
cap. 23.

ESULA dulcis, Tragi.



ESULA minima, Tragi.



nam recens quo mense collecta mala est, & orta loco aliquo prope thermas. Colligenda est Veris initio. Lac, quod calidius, tum acrius, ac valentius sit, sine Veris. Calida sicca principio tertij gradus. Substantia constat tenui, ignea, acii, incidente, tenuante, fundente, siccante, aperiente, & terrea styptica etiam, siccante materias altius immerfas. Purgat valenter pituitam, aquas, atram bilem etiam, à iuncturis: ob id harum doloribus confert, & hydropi insigniter, sed nocet cordi, stomacho, hepati, viscera excoriat, venarum ora disrumpit, corpus immodicè siccatur, semen absorbit, febres inflammando excitat, lacte suo maximè. Ob id miscenda ei sunt cardiaca, stomachica, hepatica. Ad hæc glutinosa, cogentia & astringentia: glutinantia, vt gummi, tragacanthum, bdellium, muccago Psyllij, succus Portulacæ: postremò refrigerantia. Infundantur ergo in acetum, præsertim quo Cydonia sint macerata, & in succû Intybi, vel Sonchi, vel Portulacæ, vel Solani: additis etiam myrobalanis, absinthio, aloë præstantior euadit. Radicè Esulæ maioris, inquit Lobellius, aceto & lacte præparatam, in puluerem redactam à granis duodecim ad grana sexdecim enemate infundere solemus, & in medicamêto cholagogi grana sex vel octo sine molestia: pituitosis verò ad tempus tantillum idest submolestum, quia ægrius pituita expellitur.



ΑΘΥΡΙΣ Græcis, Latinis etiam Lathyris, quibusdam Tithymalus, Nomina
 & inter Tithymalos numeratus teste Dioscoride, Officinis Catapu-
 tia minor, quod in pilulis quibusdam, seu potius catapotii semen fe-
 rat, vel potius quia dixit Dioscorides, ἐν χαλαροῖς χαλεκοῖσιν, id est, in
 catapotis sumpta grana purgare, Arabibus *Mensana*, seu *Mahendane*, Italis *Ca-*
taputia minore, Infubribus *Cacapuzze*, Gallis *Esपुरge*, Germanis *Sprinkraut*. Forma
 Caulē profert cubitalem, vacuū, vt describit Dioscorides, digiti crassitudine, in cuius ca-
 cumine sunt alar: folia in caule oblonga, amygdalinis similia, latiora tamen & læ-
 uiora. Quæ in summis sunt ramulis, minora, Aristolochiæ, aut Hederæ oblongæ
 figura. Fructum fert in summis ramis, tribus loculamentis distinctum, rotundum
 ceu capparim, in quo terna sunt semina, mēbranis discreta, rotunda, maiora eruis,
 quæ cū corticibus exuuntur, candida sunt & dulcia: radix illi tenuis, & inutilis.
 Totus frutex lacteo succo Tithymali modo turget. Plinius paulū à Dioscoride Lib. 27. c. 11.
 disidet, hæc scribens. Lathyris folia habet multa, Lactucæ similia, tenuiora, germi-
 na multa, in quibus semen tuniculis continetur, vt Capparidis, quæ cū inaruerit,
 eximūtur grana piperis magnitudine, candida, dulcia, facilia purgatu. Hæc postre-
 ma omnium Tithymalorum Lathyris, notissima est omnibus & visitatissima, Ca-
 tapucia nostra minor, cui omnia aptissimè quadrat. Nascitur in hortis, & in agro-
 rum marginibus occurrit. Carpitur Autumno, dum fructu prægnans est, semenq;

Li. 4. c. 161.

Locus.

LATHYRIS, *Marthioli.*

LATHYRIS minor, *Dalech.*



eximitur dū tuniculæ quibus includitur inaruerit. Lathyridis grana sex aut septē, Vires &
 vt tradit Dioscorides, purgant aluum in catapotio, aut cum caricis, aut palmulis Temper.
 deuorata, sed aqua frigida postea sorbenda. Trahunt autem pituitam, & bilem, & Li. 4. c. 161.
 aquas. Succus Tithymali modo exceptus eundem effectum præstat. Folia cum
 gallinaceo, aut oleribus decoquuntur ad eisdem effectus. Plinius verò eius grana Lib. 27. c. 11.
 vicena in aqua pura, aut mulsâ pota, hydropicos sanare tradit. Trahunt & bilem,
 inquit.

inquit. Qui vehementius purgari volunt, cum folliculis ipsis sumunt eam: nam stomachum lædunt. Itaque inuentum est, ut cum pisce, aut iure gallinacei fumerentur. Sunt qui dicant, inquit Galenus, Lathyrum etiam Tithymali esse speciem, tum quod similem illis succum habeat, tum quod eodem modo purget, tota quoque illis facultate similis sit, nisi quod semen gustantibus videatur dulce. Quod sane etiam

Li. 5. meth.

maximè purgatoriam vim habet. De eadem Actuarius hæc scripsit. Lathyrus vehementius pituita purgat: dantur eius grana maiora quindecim, & minora viginti. Atque iis, qui vberius purgari cupiunt, mandi: iis vero, qui multa euacuatione opus non habent, integra deuorari iubentur, præsertim si eius qui sumit stomachus vitiatum fuerit. Lathyrus minor in pinguibus nascitur, radicibus multis, crassiusculis, tenuissimis fibris huc illuc vagantibus: ramulis ad radicem complusculis, humi sparsis, in quibus folia sunt Polygono similia, paruula. Caulis dodrantalis, aut paulò altior: foliis inæquali situ vtrinque prodeuntibus, oblongis, Hyssopi ferè modo. Floribus in eius summo vertice conglomeratis, planta tota lacteum succum fundit.

PEPLVS, PEPLIS.

CAP. XI.

Nomina



RAECIS *πέπλος, συκή*, & *μήκων ἀφρώδης* dicitur, Latinis Peplus, Officinis Esula rotunda, Gallis *Reuille-marin des vignes*, Germanis *Tauselz-milch*. Peplus autem nominatur, auctore Pena, quod ramulorum ambitu, & quasi rotundo amictu velum efformet: est enim *πέπλος* velum, & stragulum. Vel potius ob purpuream foliorum superficiem, sanè xerampelinam, quæ Peplo in vinetis, & Peplidi in maritimis nascenti sapius inest. Peplum enim fuisse purpurei, vel phœnicei coloris multæ historiæ declarant. *πέπλις*, & *ἀνδράχνη ἀγρία*, id est, Portulaca siluestris. Hippocrati *πέπλιον*, Latine etiam Peplis & Peplum, ut nomine, sic effigie Peplum referens, & propius adhuc etymum Pepli exprimens, idcirco *ῥάμνος ἀμφιλόφης* à Dioscoride dicitur, id est, largius & vberius fruticans vndequaque. Peplus, ut describit


PEPLVS, Matthioli.

Li. 4. c. 162.


Forma.

Locus.

Li. 27. c. 12.



Diocorides, exiguus frutex est, albo liquore plenus, foliis paruis, ut Rutæ, latioribus tamen. Tota eius coma dodrantalis, rotunda, humi sparsa: semine sub foliis paruo & rotundo, minore quam candidi Papaueris. Radix vna, ex qua totus frutex provenit. Nascitur in hortis & vineis. Colligitur mæsisibus, siccaturque in umbra, & continuè vertitur. Plinius, Peplo, inquit, quã aliqui Sycem, alij Meconium aphrodes vocant (alij Meconium, alij Mecona aphrode vocant, verus codex habet) ex vna radice tenui fruticat, foliis Rutæ, paulò latioribus: semine sub foliis rotundo, minore quam candidi Papaueris (huic lectioni Dioscorides assentitur: repugnât quædam exemplaria, quæ habent, minus candido, quã Papaue- ris, ut hîc color, illic magnitudo indicetur.) Inter Vites ferè colligitur mæsisibus, siccaturque cū fructu suo, subiectis aquis in quas excidat. Quod postremum perspicuè falsum est. Quid enim siccari opus erat, si in subiectas aquas excidere debeat? Quare ex veteri codice legendum, sub- iectis in

PEPLIS, Matthioli.

iectis in quæ excidat, vt intelligamus vasa, aut substrata lintea. Peplis autem, Dioscoride auctore, frutex est vnde quaque amplius, candido succo plenus: foliis Portulacæ hartenſi ſimilis, rotundis, & infernè rubrum quid habentibus: ſemine ſub foliis rotundo, velut in Peplo, feruente guſtu: radice ſingulari, ſuperuacua, tenui. Vtræque hîc depiçta eſt. Quibus Dalechampij Peplion, & Peplin minorem adiecimus. Illud in litorum arenis gignitur, radice vnica, tenui, ſex digitos longa, nonnihil capillata, ſupernè rubente, infernè candida: caulibus multis, humi ſparſis, & circû quaque terram operientibus, rubris, lacte manantibus: ſemine rotundo, gemino ferè, foliis annexo, vt in Chamæſyce, & Peplo, ſeruidi guſtus. Peplis minor in vineis gignitur, radice craſſiuſcula, tortuoſa, paucis fibris capillata: caulibus multis, palmum altis, ſurculofiſ: foliis ima caulium parte Lino ſimilibus: quâ verò caules in ſurculos diuiduntur, amplioribus, proximè caulem latioribus, in acutum deſinentibus: flore ſubluteo, minuto:

Peplion
Dalech.


Peplis mi-
nor Dalec.

fructu gemino teſticulorum modo, in alueolis lacunatis reposito. Lacteo ſucco tota planta turget, & corpus vehemente purgat. De Pepli viribus hæc ſcripſit Dioſcorides: Herba ipſa multos habet vſus, radix verò inutilis. Semen eius tuſum, feruidaq; aqua madefactum reconditur. Pituïtam & bilem acetabuli pondere cum hydromelitis cyatho potum ducit. Obſoniis mixta herba aluum conturbat.

Li. 4. c. 162.

Vires &

Temper.

PEPLION, Dalechampij.*PEPLIS minor, Dalech.*

Li. 27. c. 12. Cōdicitur in muria. Eadē Plinius tradit. Pepli semine poto alius soluitur, bilis ac pituita detrahitur. Media portio est acetabuli mensura, in aquæ mulsæ heminis tribus. Et cibus inspergitur, obsoniisq; ad molliendā aluū. Peplis, vī Dioscorides tradit, colligitur, ac reponitur, & datur quemadmodum Peplos, muria item conditur: vires denique easdem quas Peplos habet. Portulacam, etiam Peplion, ob similitudinem foliorum vocari præfatus Plinius, Portulacæ vires prolixè memorat, à Peplij facultate diuersas. Galeno Peplos frutex succum habet similem Tithymalis, cum in aliis, tum quia purgat, ceu illi. Peplion quoque frutex paruus succum habet sicuti Tithymali. Nascitur plerumq; ad mare: radicem habet superuacuum, vt & Peplos: succum verò validum, non tamen admodum vtilem: sed semen vtile est, & flatuosum, similiter ac semen Pepli purgans. Eo in loco in Græcis codicibus falsò *φυσώδες* legitur, & ab interpretibus flatuosum conueritur, quod Dioscorides & Paulus *ψυψώδες* τῇ γλώσσῃ esse dicunt, id est, feruentis gustus: quare & hic apud Galenū pro *φυσώδες* legendum *ψυψώδες*. Præterea Aëtius ex Hippocrate ait Peplion esse *φυσών καὶ ἀπρηκτόν*, id est, flatus disrumpere, ac discutere, quare flatuosum dici minimè potest.

CHAMÆSYCE.

CAP. XII.

Nomina
Li. 4. c. 164
Forma.



Locus.

R AECIS χαμαίσκη, & συκή nominatur, Latinis similiter Chamæsyce. Ramos profert, inquit Dioscorides, quaternū digitorū, per terram stratos, rotundos, succo plenos: folia Lentis specie, Peplo similia, parua, tenuia, humi strata: semen est sub foliis, rotundum, velut Pepli semen. Sed neque florem, neque caulem habet: radicem tenuem, & inutilem. Nascitur in petrosis & squallidis locis. Ex his intelligere licet Chamæsyce Peplo valde affinem, aut eius speciem aliquam esse. Chamæsyce Dalechampi hīc appinimus,

CHAMÆSYCE, Dalechampi.



quæ in agro Monspeliensi gignitur, exili radice, longiuscula, candida, dura, simplici & singulari: ramulis multis, quatuor digitorum longitudine, humi in orbem stratis, lacteo succo manantibus: folio Lentis ordine per ramulos disposito, in adulta planta ferè rubescente, acris & feruidi gustus: semine rotundo, exiguo, sub foliis abdito. Chamæsyce aliā Pena depinxit, quæ Peplo, ac Peplio rarior est multo, nec vsquam in Germania, aut Italia, sed duntaxat in Narbonensis Gallia: oliuetis vinetisq; reperitur, vbi plurima, præsertim in aridis & sabulosis, non procul à Monspelio ad patibulum via, & tractibus maritimis. Pulchella tota, & teneta, ramulis & foliolis numerosis, humi reptantibus, ex pallido virentibus, Herniariæ nō dissimilibus.

Chamæsyce
Pena.

non dissimilibus, sed lactescens, vti duæ superiores: simile quoque semen, folliculum, & flores habet, sed cuncta minora. Chamæfyces ramuli in vino triti, vt tradit Dioscorides, vteri dolores sedant, in pecto appositi. Tumores, verrucas pensiles, & formicantes tollunt impositi. Decocti & in cibo sumpti aluū soluunt. Ipsorum succus idem præstat, & illitus aduersus scorpionum ictus auxiliatur. Valet & ad hebetes oculos, caligines, incipientes suffusiones, cicatrices, & nubeculas cum melle illitus. Plinius nõ eadem prorsus tradit. Chamæfyce Lentis folia habet, nihil se attollentia, in aridis petrosissq; nascens. Claritati oculorum, & contra suffusiones vtilissima, & cicatrices, caligines, nubeculas in vino cocta, & inuncta. Vuluæ dolores sedat apposita in linteolo. Tollit & verrucas omnium generum illita. Prodest & orthopnoicis. Linteolum pro pecto posuit, & de orthopnoicis addidit, quod Dioscorides non habet. Chamæfyce, inquit Galenus, abstergentem simul & acrem vim habet. Itaque acrochordonas, & myrmecias, caules eius teneriores in modum cataplasmatism admoti, quique ex eis profluit liquor, auferunt. Cum melle verò crassas oculorum cicatrices detergunt. Sed & hebetudinem visus à crassitie natam adiuuant, sicut sanè & suffusionum principia.

Vires & Temper.
Li. 4. c. 164.

Li. 24. c. 15.

Li. 3. simpl.

SCAMMONIA.

CAP. XIII.

KAMMONIA planta Græcis dicitur, Latinis similiter Scammonia, *Nomina*
Arabibus Scammonia, & Sachmunia, Italis Scammonia, Gallis Scammonia.

Radici liquor Scammonium, Græcis etiam σχιμναϊον, quod recentiores Scammoniam tradit Dioscorides ramos multos ab vna radice producere (Oribasius addit, τρεῖς ἢ τέσσαρες, id est, tres aut quatuor) tricubitales (Oribasius, ἢ τετραπυχῆς, vel quatuor cubitorum) pingues, ἐμπασινοῦς τι καὶ διαστύλλος, ac nonnihil hirsutos (Ruellius legit, ἀχύντος, vertitq; , & qui nonnihil crassitudinis præ se ferant. Sed prior lectio ramulis Scammonia maxime accommodatur, quam etiam confirmat Serapio, qui ex Dioscoride transcripsit. Scammonia est planta habens ra-

Forma.
Li. 4. c. 165.

Cap. 303.
simpl.

SCAMMONIA, Matth.



mulos egredientes ab vna radice, quorum longitudo est trium, aut quatuor brachiorum, super quos est viscositas adhærens manui, & parum boræ, & habet folia pilosa.) Sed & folia hirsuta sunt, similia Helxinæ, aut Hederæ, molliora tamè, & triangula: flores albi, rotundi, caui instar calathi, graueolentes: radix admodum longa, crassitudine cubitali. (In vulgatis codicibus legitur, ἀχύντος ὅσον πῆχυς, at in veteri ἀχύντος ὅσον βραχίον, & ita legunt Oribasius & Hermolaus, id est, crassitudine brachij. Quæ lectio melior est, cum nunquam, nisi improprie, dicatur aliquid esse crassitudine, sed longitudine cubitali, præcipue apud hunc auctorem. Serapio inepte vertit, habet radicem grossam sicut pollex) alba, graueolens, succo plena. Plinius paucis huius delineationem perstrinxit. Scammonium est succus herbæ, à radice ramosæ, pinguibus foliis, triagulis, albis, radice crassâ, madida, nauseosa. Nascitur pingui & albo solo. Dioscoridi pingues sunt ramuli, Plinio folia. Illi flores & radix candicant, huic folia. Quod Dioscorides

Lib. 16. c. 8.

In cap. 16.
lib. 4.

dixit radicem esse *παρμεσην, καὶ βαρύσμον*, id est, succo plenam & graueolentem. Plinius vertit madidam, ac nauseosam. Marthiolus Scammoniam plantam, cuius effigiem hîc proponimus, Constantinopoli ad se Viennam missam fuisse ait ab Augerio de Busbecke, ad Turcarû Imperatorem legato, quam curauit illic trans-plantandam à Bono Baldino Myropola, eamq; foli humore restitutam, paulò post viticulas, folia & flores emisisse. Sed eam non oratione, verùm penicillo tantùm depictam ostendit. Pena anno sexagesimo primo, aut secundo supra sesquimille-
simum, Sequinum Martinellum pharmacopœum Venetum ex Syriaco Alepo misisse ait plusquàm centum libras glebæ Scammonij Anthiocheni succi cōcre-
ti, cui exprimendo interfuerat: conchas etiam non paucas, lacryma plenas, seu Diacrydio antiquorum, cum seminibus angulosis, volubilis. Hæc semina tum Pa-
tauij, tum Venetijs primo Vere terræ mandata in luculentam volubilem, seu vol-
uulum abiisse, adeò sinuosis smilaceis foliis triquetris, vel potiùs Cissampeli foliis,
floribus, facie similis, vt. planè cum nostra Cissampelo eadem videatur. Verùm ra-
dice insigni fuit, & mole grandem Bryoniæ radicem æquante, atque teneritudine
æmulante, foris pulla, aut cineritia, intus albida carne: cuius fissæ cor medium
exemptum, planè idem est, aut simile radices communis & probatoris Turbith
Officinarum. Verùm hæc faciliùs aliquatò frangitur, tamen si perinde gummosa
succo lacteo turgeat, atque Turbith. Communis etiam Herbariorum consensus
Scammoniam vocat volubilem hîc depictam, quæ in Mediterranei maris litore,

Scammo-
nium ma-
rini Mô-
pelienf.

*SCAMMONIA mari-
tima Mòspelienfis.*



Li. 4. cap. 16.

Lib. 12.

& tota ora Mòspelienfi cum Scilla, Peplo, & Pancratio prouenit: quoniam Scammonia folia imitatur, eius modo lacteum succum fundit, Catharticam vim Scammonia, Tithymalo, alijsq; id genus nō multò inualidiorem obtinet. Radice est candida pollicis crassitudine, succosa, in arenam altius defossa: caulibus multis, bipedalibus, surculosis, rectis: folijs Hederæ, læuibus, mollibus, pallidis: flore quoque albo. Succo lacteo tota planta manat. Quomodo Scammonia succus, cuius vsus est, sit colligendus, & syncerus ab adulterato secernendus docet Dioscorides. Colligitur succus capite radice ablato, & ipsa in fornicis formam excavata: confluit enim in ipsam succus, qui conchis de-
mum excipitur. Alij effosa ad testudinis formam terra, & substratis nucis folijs succum excipiunt, & siccatum extrahunt. Quod ab Or-
basio sic declaratur. Alij scrobes in terra mortarij instar effodiunt (*ὑποφθῶς* legit, non, *ὑποφθῶς*, id est, instar fornicis) in quos substratis nu-
cum folijs radices abradentes, liquorem effundunt, atque ita siccatum extrahunt. Probat

qui pellucidus est (*λευκός*), Ruellius ex Plinio, nitidum vertit) leuis, taurini glutini colore, foramina tenuia habens, spongiosus. Talis est qui ex Mysia Asia adfertur. Nec verò so-
lùm attendere oportet, si ad tactum linguæ albescat: hoc enim euenit etiam admixto ipsi Tithymali succo, sed magis considerandæ sunt prædictæ notæ: etsi non vehementer linguam exurat, id quod etiam Tithymalo admixto solet contingere. At Syriacus & Iudaicus pessimi sunt, graues, densi, Tithymalo & erui
farina adulterati. Scammonij historiam paulò aliter tractauit Plinius. Radix circa

Lib. 26. c. 8.

Canis

Canis ortum excauatur, vt in ipsam confluat succus, qui sole siccatus digeritur in pastillos. Siccatur & ipsa, vel cortex. Laudatur natione Colophonium, Mysium, Prienense: specie autem nitidum, & quam simillimum taurino glutini, fungosum tenuissimis fistulis, cito liquefcens, virus redolens, gummosum, linguæ tactu lactescens, quam leuissimū, cum diluitur albescens. Hoc euenit & adulterino, quod fit erui farina, & Tithymali marini succo, in Iudæa ferè, quod etiam strangulat sumptum. Deprehenditur gustu, Tithymalus enim linguam excalfacit. Quod Scammonium Dioscorides spōgiosum, Plinius fungosum dixit. Præterea cito liquefcēs, virus redolens, gummosum, linguæ tactu lactescens, cum diluitur albescens, Dioscorides inter bonitatis notas nō recenset. Hic adulterari erui farina, & sine discrimine Tithymali cuiusvis succo, ille Tithymali marini tantum succo retulit, atque quod adulteratum sit, sumptum strangulare, quod Dioscorides non habet. Scammonij facultates nunc sunt explicandæ primū ex Dioscoride. Succus drachmæ vnius, aut obolorum quatuor pondere haustus ex aqua, aut aqua mulsā, purgat per inferna pituitam ac bilem. Verū ad aluum soluendam oboli duo cum Sefamo, aut alio semine sumpti sufficiunt. Dantur etiam ad efficaciorē purgationē succi tres oboli, Ellebori nigri oboli duo, & aloës drachma vna. Fiunt etiam sales purgatorii drachmis viginti succi Scammonia ad sex salis cyathos adiectis. Horū modus est proportionē virium, integer cochlearia tria, medius duo, minimus vnum. Purgat & radice drachma vna, aut duæ, cum iis quæ dicta sunt. Quidam decoctū ipsius bibunt. Cocta cum aceto, & trita cum farina hordeacea ischiadicis fit cataplasma. Succus necat partus in lana vtero appositus. Tubercula discutit cum melle aut oleo illitus. Coctus autem in aceto, & illitus, lepras exterit. In diuturno capitis dolore cum aceto & rosaceo caput ex eo irrigatur. Qua de re ita Plinius scripsit. Scammonium quoque stomachi dissolutionem facit, bilem detrahit, aluum soluit, præterquā si adiiciantur aloës drachmæ duæ obolis eius duobus. Et mox, Bulbi more, nec antè, nec post vtile (vetus quidā codex habet, vsus bimo, nec antè, nec postea vtile. Alius verò: Bimatu, nec antè, nec post vtile: quæ neque ad Bulbum referri possunt, neque Bulbus ad Tithymalum, de quo modò dixit linguam excalfacere.) Dedere & per se ex aqua mulsā, & sale, quaternis obolis. Sed vtilissimè cum aloë, ita vt incipiente purgatione mulsū bibatur. Fit & decoctum radice in aceto ad crassitudinem mellis, quo lepræ illinuntur, & caput vngitur in dolore, cum oleo. Dandi Scammonij, ac sumendi modus longè apertius à Dioscoride quā à Plinio hīc traditus est. Deinde, Scammonio rosaceo & aceto diluto, in vetusto capitis dolore Plinio caput vngitur, Dioscoridi irrigatur, ac perfunditur, qui nec tradidit vsū bimo esse, nec antè, nec post vtile. Certè Mesues viginti annis seruari ait. Galenus Scammonia in simplicium catalogo nō meminit. Paulus verò Scammoniam scribit calfacere, discutere, & biliosa extergere, magisq; eius liquorem, qui iam & phymata dissipat, fortis appositus corrumpit, lepras exterit, diuturno capitis dolori cum oxymrhodino superfunditur. Radix cum ipsa, tum decoctū eius potum purgat: cum aceto autem & farina hordeacea decocta, coxendicum doloribus applicatur. Et alio in loco. Scammonia perinde ac Veratrum purgat, magis flauam bilem. Cæterum inter omnia quæ purgationes moliuntur, aduersissima stomacho est. Datur igitur iis qui febre carent, & stomacho sunt meliori, ad pondus quatuor obolorum cum sale, aut pipere, aut zinzibere, aut quodam stomacho vili, quod protinus corpus permeat, aut etiam cum melle: item cum gummi quoq; fiunt cataporia. Theophrastus, τῆς δὲ σκαμμωνίας, inquit, ὅπως μόνον χηρσιμος, ἄλλο δὲ ὄδον. Id est, Scammonia succus tantum vtilis est, & nihil aliud. In his quæ à veteribus de Scammonio produntur, duo sunt expendenda: eius delectus, & in purgationibus dosis. Laudant enim illi leue, pellucidum, colore quā simillimum

Li. 4. ca. 16.
Vires.

Lib. 26. c. 8.

Lib. 7. ca. 1.

Lib. 7. ca. 4.

Lib. 9. hist.
cap. 22.

taurino glutini. At vulgare nostrum squalidum est, & cineritio colore, & aspectu tristiore: quia non succus, aut liquor manans, aut lacryma Scammoniae ad nos adfertur, sed succus vi expressus. Scammoniae lacrymam, quam Venetiis apud Albertum Martinellum vidit Pena in Syriacis conchis allatam, Colophoniam concolorum, concretione simili, ex fusco caeruleam fuisse ait, cuius coloris non est Scammonium nostrum. Sic differt Meconium ab Opio, quod est manans liquor, seu lacryma Papaveris, flaua & limpidior. Verum cum pura ac mera lacryma Scammoniae tam frequenti vsui non sufficeret, succum multum vi expressum ad nos asportari oportuit: cuius maximè delectus habendus, quia nullus nisi variè adulteratus ad nos adfertur. Nam aliquando ex eodem corpore, eadem morbi causa, & eodem planè modo affecto, grana aliquot sumpta facile, & sine vlllo cruciatu, bilem pituitamque expurgabunt, ex eadem prorsus gleba frusto paruo effracto multò plura grana sumpta minùs euacuabunt, nec sine molestia, & cruciatu. In causa est dissimilis molis concretio, quæ hinc plus, illic minùs, aut lactis Tithymali, aut Lathyridis, aut alterius stirpis valentioris succi accipit: vnde dissimiles purgationes consequuntur. Cum autem veteres, aut drachmam, aut quaternos obolos, aut maiorem aliquam dosim præscribunt, purum & merum succum Imperant.

CHAMELÆA.

CAP. XLIII.

Nomina



AMEAIA Græcis & χαμελαία ῥιζονκος, Latinis etiam Chamelæa, & Oleago, Oleastellus, Mauritanis *Mezereon*, & *Almezerion*, Prouinciabilibus *Garrowpe*. Chamelæa autem, id est, humilis Olea, vel Oleago, vel Oliuella dicta est, ob eam quam cum Olea fortita est similitudinem. Chamelæa, vt tradit Dioscorides, frutex est furculosus, ramis dodrantalibus, foliis Oleæ, sed tenuioribus, dēsis, amaris, quæ gustum mordent, & arteriam deradunt.


Li. 4. c. 166.

Forma.

Lib. 15. ca. 7.

CHAMELÆA, Math.

Lib. 24. ca. 15.



Lib. 3. hist. cap. 37.


Plinius ex Chamelæa oleum factitium parari dicit, ipsamque descripsit his verbis. Simillimum huic est ex Chamelæa frutice saxoso, non altiore palmo, foliis Oleæ baccisq. Quo in loco pro saxoso, fortasse legendum furculoso, vel sarmentoso: est enim Dioscoridi frutex *φρυγανώδης*, nam reliqua, vt Dioscorides, etiam Plinius habet: & præterea baccas & oleum. Eadem repetit Plinius alio in loco. Chamelæa similitudinem foliorum Oleæ habet. Sunt autem amara, odorata in petrosis, palmum altitudine non excedente. Matthiolum Chamelæam & Thymelæam copiosè in vallis Ananiæ montibus, & Tridentino agro provenire scribit, & vtramque fructum ferre Myrti baccis similem, qui tamen Chamelææ longior sit quadantenus, & oliuæ formam referat. Verique initio virescit, mox per maturitatem rubescit, denique exsiccatus niger conspicitur. Dodonæus, Chamelæa, inquit, in Italia & Gallia Narbonensis incultis, asperis & desertis reperitur, humilis & fruticosa stirps, pedalis, aut altioris magnitudinis, multis tenuibus virgulis ramosa, foliis oblongis, Oleæ similibus, sed minoribus & nigrioribus: flores ex aliis foliorum exigui, sublatei: fructus inde tricocchi,

CHAMELÆA,

Dodonai.

CHAMELÆA Alpina

incana, Pena.



triccoci, vt in Tithymalo, & Lathyri, primùm virides, deinde rubentes cum maturuerunt, qui decerpti nigrescunt, oleosamq; pinguitudinem contrahunt olearum instar, sapore acres & mordaces, faucisque exurentes, veluti folia & cortex, osculis duris lignosis, piperi similibus: radix lignosa. Huic Chamelææ aliam addit Pena, quam Chamelæam Alpinam incanam vocat, superiori valde similem gustu, facie, viribus: foliis & virgultis ligneis, gracilibus, concoloribus, rugoso cortice amictis, quæ tamen ab illa facile discerni possit, fructu nimirum Mezerei Germanici, Oleastri, aut Philyreæ, non tricocco, & foliis summis non ex atro virentibus, sed tenui, mollique & incana lanugine obductis, quemadmodum & flores pallentes è lagenulis argenteis, Stramonii similibus, sed minoribus cõspiciuntur. Commanducata, non secus ac Mezerei Germanici, grana fauces exurunt: ideoque etiam plebs rusticum piper vocat. Manducata folia lentorem remittunt, vti Sardanellæ, Thymelææ, & Chamelææ Narbonensium. E' Lemani & Allobrogum vicinis Alpibus solùm habuisse ait. Chamelææ folia pituitam & bilem purgant per inferna, auctore Dioscoride, præsertim in catapotia deuorata: ita vt duplum absinthij cum vna Chamelææ parte misceatur, & hæc aqua aut melle excepta in catapotia formentur. Non liquecunt ea in ventrè, sed quotquot accepta fuerint, per aluum egeruntur. Iisdem foliis tritis & melle exceptis fordida & crustosa vlcera repurgantur. Plinius, Chamelæa, inquit, aluum purgat: detrahit pituitam bilẽmque, foliis in duabus absinthij partibus decoctis, succoque eo cum melle poto. Foliis impositis & vlcera purgantur. De eadem breuiter hæc Galenus. Chamelæa vincentem habet qualitatem amaram. Quamobrem admodum fordida vlcera, & maximè quæ crustas habent, commodè purgare potest.

Vires &
Temper.
Li. 4. ca. 66.

Li. 24. c. 53.

Nomina



RAECIS θυμέλας, sic & Latinis Thymelæa nominatur. Quæ appellatio effigiem naturamq; plantæ quadantenus adumbrat. Videtur enim Thymelæa quasi Tithymelæa dicta, ex Tithymali & Oleæ mixta facie. Arabes etiam *Mezezon* vocant, eam cum Chamelæa confundentes.

THYMELÆA, Matth.



Forma.

Lib. 4. c. 167.

Locus.

Lib. 13. c. 21.

THYMELÆA, Dodon.



Eius semen κνίδιος κνίδιος, id est, granū Cnidium dicitur, Eubæenses Apolinum vocant, alij Linum, quod satiuo Lino frutex hic similis sit. Falluntur qui Granum Cnidium Chamelææ fructum esse putant, foliorum similitudine decepti. Virgas producit longas, vt describit Dioscorides, multas, bicubitales: folia Chamelææ similia, sed angustiora & pinguiora, viscosa & glutinosa dum māducātur: flores albos, & inter ipsos fructum Myrti baccae modo paruum, rotundum, initio viridem, tandem rubentem, cuius fructus inuolucrum durum est & nigrum, intus album. Nascitur in asperis & montosis locis. Plinius breuiter hæc complexus est. Et in quo nascitur Granum Cnidii, quod aliqui Linum vocant, fruticem verò Thymelæam, alij Chamelæam, alij Pyros achnen, alij Cnestrū. Est similis Oleastro, foliis angustioribus, gummosis si mordeātur, Myrti magnitudine: semine, colore, & specie farris, ad medicinæ tantum vsum. Quæ mendosa sunt, & ex Dioscoride sic corrigēda, Myrti magnitudine, semine, colore & specie foris. Thymelæam cum Chamelæa in Ananiæ montibus & Tridentino agro copiose nasci scripsit Matthiolus, vti supra diximus. Eius Thymelæam hîc appinximus. Mezezon quidem ille Germanicum potius, eiusque semen, piper rusticum seu montanum appellatum, quam Thymelæam veram eiusque Granū Cnidium nobis proposuit. Genuinam Thymelæam descripsit Dodonæus in Histo. Stirp. cuius iconem hîc posuimus. Felicius pictam dedit in Histo. purgantiū: item Clusius, qui eam acuratissimè delineauit his ferè verbis. Thymelæa frutex est pollicari interdum crassitudine, cubitalis, aut amplior, qui in multas virgas diuiditur cubitales, pulchras, tenues, rectas, quas vestiunt perpetuò virentia folia, Lini, maiora & latiora, mucronata, non cuspidè obrusa, vt in Chamelæa, neq; ita fragilia, sed lentiora, & gummosum quid præbētia, si dentibus atterantur. Flores fert in extremis virgis, candidos, Oleæ ferè similes, quatuor foliolis constantes, copiosos, racematim ferè propendentes: deinde fructum

THYMELÆA *vera Clus.&*
Dodon. Histo. purgant.



fructum baccarum Myrti interdū magnitudi-
 ne, oblongiorē paulō, per initia virentem, cūm
 maturuit rubrū corallij modo, carne succi ple-
 na & aquosa vt in Cerasijs, sub qua latet vnicū
 semen, nigra fragilique pellicula, albam & ferui
 do gustu medullam continens. Radix lignosa
 & dura, in teneris plātis Raphani modo effor-
 mata, & crasso cortice tecta, lentōque & admo-
 dū tenaci, quemadmodū & tota planta. Flo-
 ret Iulio, & toto ferē Autumno, deinde semen
 profert. Nascitur locis asperis per totam ferē
 Hispaniam, & plerisque Gallia Narbonensis.
 Quod Pericarpium dixit Dioscorides, non to-
 tius baccæ rubentis inuolucrum intelligit, sed
 inuolucrum seminis in bacca conclusi, cuius
 seminis medulla alba est, & in ea feruor ille quē
 situs in grano Cnidio. Quē, eodem Dioscoride
 auctore, per inferna bilem, pituitam, & aquas
 purgat, si viginti granorum interna pars biba-
 tur. Verū fauces vrit. Quare cum farina aut
 polenta dari debet, aut in vix acino, aut melle
 cocto obducto deuoranda. Eadem trita cum ni-
 tro & aceto illinitur iis qui aegre desudant. Fo-

Li. 4. c. 167.
Vires.

lia, quæ peculiariter Cneoron vocātur, circa messē colligi debent, & in vmbra
 ficcata reponi. Qui dare volunt tundere debent, & neruos eximere. Purgat ex ip-
 sis acetabuli mensura vino diluto inspersa (legendum enim ἐπιπασσόμενον, non ἐπι-
 πλάσσομενον, vt habent exemplaria multa, quæ secutus Ruellius vertit, illitum). Sed
 moderatiū purgat mixta cum lente cocta, & tritis oleribus. Eadem folia trita cum
 vix acerbæ succo in pastillos redacta reponuntur. Herba stomacho infesta est,
 partus apposita necat. Cocco Cnidio, inquit Plinius, color corni, magnitudo gra-
 no piperis maior, vis ardens. Itaque in pane deuoratur, ne adurat, cūm gulam tran-
 sit. Huic vis præsentanea contra cicutam. Sistit aluum. Quæ ex Theophrasto sum-
 pra sunt. ὁ δὲ κνίδιος κόκκος τρυγῶν, ἐρυθρὸν τῇ χειρὶ, μείζον δὲ τῷ πεπέρειος, ἰχυρότερον
 δὲ πολὺ τῇ θερμότητι. διὸ καὶ ὅταν διδῶσι καὶ ποτόν (διδῶσι γὰρ πρὸς κοιλίας λύσιν) ἐν
 ἄρσῃ ἢ αὐτὶ περὶ πλάτλουσι. καὶ γὰρ ἄλλως τὸν φάρμακον. Id est, Granum Cnidium ro-
 tundum est, colore rubrum, maiusq; pipere, sed multo validiore caliditate. Quare
 in potu dantes (exhibent verò ad aluum soluendā) pane aut farina subacta obdu-
 ctum id præbent: alioqui enim id fauces adurit. Quod hīc exhiberi ad aluum solu-
 endam vertimus, Plinius sistere aluum non rectē videtur dixisse, cūm granum id
 catharticum sit, vel Galeno teste, qui scribit Granum Cnidium purgare, sed acris
 esse & adurentis facultatis. Attentiores in eo loco Plinij legunt: Ciet aluum. My-
 conus herbaria rei studiosissimus fruticem & eius iconem ex Hispania misit, quē
 Thymelææ speciem esse suspicatur. Frutex hic passim in locis siccis & siluis nasci-
 tur, inquit, maximē in quercetis, altitudine cubitali, ramosus, & circumquaque ra-
 mulos diffundens. Folia eius minima sunt, Myrto similia, sed minora: flos luteus
 minimus, ab ea folij parte, qua caulem attingit, nascens, vt in Chamæpity: radices
 lignosæ, præsertim superiore parte, cortice è nigro rufescente, crassitudine polli-
 cari, non altius in terram demissa, sed per summum cespitem diffusa, flexiles, gu-
 stu valde ingrato, cum acrimonia amaro, & fauces abradente quemadmodum
 Thymelæa Dioscoridis. Totius fruticis odor grauis est, & sapor insuauis. Totus
 etiam

Lib. 27. c. 9.

Lib. 9. hist.
 cap. 22.

Lib. 7. sim.

THYMELÆÆ species,
Mycono.



si mordeantur, & gustu amaro, deinde admodum acri & adurent: flores inter folia Oleæ similes, oblongi, in quatuor foliola per extremum diuisi, colore luteo: fructu Thymelææ ferè, sed nigricante: radix crassa, lignosa. Frequens est in regno Valentino & Granatensi. Martio & Aprili floret. Illic ab Herbariis Sanamunda vocatur, à rusticis *Mierda-cruz*, propter purgandi facultatem, cuius causa rusticis eius regionis apprimè in vsu est. Hæc Clusius.

SESAMOIDES. CAP. XVI.

Nomina

ΣΗΣΑΜΟΕΙΔΕΣ *Σέμενα, & σιγάμοειδὲς μακρόν* Græcis, Sesamoides magnū, & Sesamoides paruum Latinis, à seminis similitudine dicuntur.

Li. 4. c. 147.

Forma.

Sesamoides magnū, quod in Anticyra Elleborum, vel, ut ait Theophrastus, Elleborinen vocant auctore Dioscoride, quia in purgationibus Elleboro albo miscetur, herba est similis Senetioni aut Rutæ: foliis longis: flore albo: radice gracili, inefficaci: semine sesamo simili, gustu amaro. Sesamoidi paruo, quod album vocat Galenus, cauliculi sunt palmi altitudine, folia habentes Coronopo similia, hirsutiora tamen & minora. In summo cauliculorum capitula sunt flosculorum subpurpureorum, medio eorum albo, in quibus semen sesamo simile, amarū, fuluum: radix tenuis est. Nascitur in asperis locis. De quo hæc Plinius. Sesamoides à similitudine nomen accepit, grano amaro, folio minore. Nascitur in glareosis. Deinde de altero. Est etiamnum aliud Sesamoides Anticyræ nascens, quod idè aliqui

Locus.

Li. 22. c. 25.

Ibidem.

Li. 4. c. 147.

Anticyricon vocant: cætera simile Erigeroti herbæ. Sesamoidis magni semen, ut docet Dioscorides, purgat pituitam & bilem per superna, quantum tribus digitis capi potest tritum, & sumptum cum Ellebori albi sesquibolo in aqua mulsâ. Parui item semen purgat bilem & pituitam per inferna acetabuli mēsurâ potum cum aqua mulsâ. Idem impositum cum aqua tubercula & tumores discutit. Eadem ferè Plinius habet, Granum Sesamoidis datur in vino dulci ad detractiōnes, quantum

Li. 22. c. 25.

tribus

tribus digitis capitur, miscéntque Ellebori albi vnum & dimidium obolum, purgationem eam adhibentes maximè infania, melancholia, comitialibus, podagris. Et per se drachmæ pondere exinanit. Et Sefamoides paruum detrahit bilem in aqua potum. Semen illinitur igni sacro: discutit panos. Galenus, Sefamoides magnum, inquit, quod & Anticyricus Elleborus appellatur, quia semen eius vt Elleborus purgat, hoc & reliqua facultate Elleboro similis est. Nam & in abstergendo, excalfaciendo, desiccandoque similem illi vim obtinet. Sefamoidis albi semen vehementer amaram qualitatem continet, non solum mediocrem. Calfacit itaque, rumpit & extergit. Herbas istas catharticas Herbarij sibi ignotas esse fatentur. Pena tamen suspicatur Hormalam Syriacam in odoratis depictam ex Lobellio Sefamoides maius esse. Marthiolus verò Sefamoides minus ostendit, quod Cortuso acceptum refert. Per multi opinantur Sefamoides maius esse eam

Lib. 8. sim.

In cap. 147. lib. 4.

SESAMOIDES maius
multorum, Dalech.



herbam, quæ in tota ora Massiliæ & Liguria, Corsica ac Sardinia gignitur, illicque vernacula lingua *Tartouraire* appellatur. Fruticosa est, pe de non altior, radiculis subflauis, gracilibus, tenuibus, si totam plantam spectes, superuacuis: ramis multis, rotundis, densa lanugine villosis, furculosis: foliis Rutæ simillimis, numerosis, hirsutis, candidis: flore in summis ramis copioso, exiguo, candido, densius congesto, intra lanuginem delitescente: semine paruo, nigro, gustu tam feruido, vt si quis herbam mandat, diutius ardere fauces videantur, tam pertinaci vredine, vt nulla oris collutione deleri possit. Minor sane est in Chamelæa, Thymelæa, Laureolæque generibus acrimonia, ac vrendi vis, quam in hac planta. Hodie impostores, ac quidam ignari quatum malefica sit huius plantæ vis, & corporibus nostris noxia, ex vino albo, vel cicerû decocto, vel elixæ carnis iusculo bibendâ propinant drachmam vnam vel alteram, in validissimis naturis, tanta purgandi potestate, vt sæpe ob hypercatharsim sanguis erumpat. Educit autem sic sumpta biliosa, pituitosa, aquosa,

id quod & Dioscorides testatur: vt mirum non sit, in Anticyra dictum olim fuisse Elleborum, admisceriq; solitum potionibus ex Veratro albo paratis, vt facilius & citius Veratrum, quod vomitiones magis ciet quam deiectiones, aluum commodius detraheret. Hoc fortasse Elleborum est, quod fructum Sefamo similem edere Theophrastus scripsit, quo in Anticyra purgationes fiebant. Quanquam non solum fructu, sed etiam radice vtile esse scribit: quod negat Dioscorides, qui radicem *ἀντικυραίων*, id est, imbecillem, siue ignauam esse dicit, seminiq; purgandi vim tribuit, quam etiam foliis & ramulis inesse experientia docuit. Planta hæc Clusio est Sanamundæ tertium genus, Cortuso Erica Alexandrina, Alfonso Pautio Cneorum. Thymelææ congenerem esse, & iisdem facultatibus pollere putat Clusius. Plantam alteram hic etiam appictam Sefamoides minus quidam nominant, non ad Dioscoridis quidem historiam referentes, sed ad eam quam cum superiore cognationem habet originis, saporis, facultatis catharticæ. Quidam Phacoides volunt esse Oribasij, ob foliorum cum Lente similitudinem. In maritimis, vt & alterum prouenit, sed Corsicæ magis quam Galliæ, Liguriæve: caule pedali, in ramu-

los pluri

los plurimos & graciles diuiso, lanugine molli vestitos superioris modo: foliis numerosissimis, minimis, lætius virentibus, Lenticulæ similibus, circa ramos densissimè coaceruatis, vt ramorum conspectum adimant, Aizoi acris specie: flore copioso, tenui, candido, per totos ramos foliis intersparso, suauissimi odoris, nec moscho dissimilis, & quasuis acres plantas superantis. Purgat, & eodem humores educit quos Sesamoides maius, sed laboriosius, præsentiorèque

SESAMOIDES minus,

Dalechampij.



SESAMOIDES minus,

Matthioli.



nimiæ vacuationis discrimine. Eius tusæ ac cribratæ drachmam pitisanæ immixtam sorbendam dedit Dalechampus cuidam neruorum distentionibus laboranti Lugduni in publico valetudinario, cui non segnius alius deturbata est, quàm si colocinthidem sumpsisset, restitutæque sanitas. Sesamoides minus à Matthiolo positum Pena approbat, scribitque optimè Cyani comparari. Folia enim prorsus sunt Cyani parui, incisura & ortu Coronopi, hirsutiora, maiora (fortè *μακρότερα* pro *μικρότερα* in Dioscoride legendum, qui error in eo auctore frequens est) flores radiati, prorsus Cichorij concolores & similes supernè, subtus capitula ex squamulis compacta Cyami aut Iacæ modo habentes: semine intus Sesami: radice Tragopogoni, exiliore. In Narbonensi agri squallidis collibus, etiam herbis ad Ladum copiosè prouenit hæc planta, atque etiam in Longobardia. Huic Matthiolus non rectè Phalaridis flores & capitula affinxit. Hæc ex Pena. Quidam Catanancen priorem esse putant.

EM PETRON Græcis, & *φακοειδής* dicitur, Latinis Empetrum & Phacoides, & Calcifraga Plinio. Id non descripsit Dioscorides, sed dixit tantum in maritimis & montosis nasci, gustu salso, quod verò propius terreno prouenit, amarius esse. Purgat pituitam & bilem, & aquas, si in iure aliquo, aut aqua mulsâ exhibeantur. Eadem prorsus Plinius tradidit. Empetron, quam nostri Calcifragam vocant, nascitur in montibus maritimis, ferè in saxo: quo propius mari fuerit, minus salsa est (Deprauata hæc in vulgatis codicibus lectio, sic corrigenda, quæ propius mari fuerit, salsa est): potaque bilem trahit ac pituitas: quo longius magisque terrena, amarior sentitur. Trahit aquam. Sumitur autem in iure aliquo, aut in hydromelite. Galenus scribit Empetrum ad solas purgationes esse vtile, bilem ac pituitam educens, gustu salsum esse, quare ad alia quoque vti licere, ad quæ pollet substantia salsa: item nominari Prafoides. Idem planè Aëtius & Paulus ex Galeno exscripserunt, vt vox phacoides vel in Dioscoride, vel prafoides in aliis merito suspecta sit. Addit Paulus, quia salsum est, extergendi vi præditum esse. Cum verò Dioscorides, Galenus atque alij Græci medici ipsos sequentes scribant Empetrum ad purgationes tantum vtile esse: Plinius contrâ his quæ modò citauimus subiiciat, vetustate vires perdere, recens vrinas ciere decoctum in aqua vel tritum, calculosque frangere, & qui fidem promisso huic quærunt, affirmare lapillos, qui subferueant vnâ, rumpi: perspicuum est eum, alterum Empetrum Saxifragum dictum cum maritimo Empetro confudisse. De quo Saxifrago, siue Empetro altero, caput extat in multis excusis exemplaribus Dioscoridis, cui calculos vesicæ frangendi, & vrinas ciendi vistribuitur: quanquâ caput hoc inter Dioscoridis notha & adscritia à peritis herbariis referatur. Præterea ex iisdem Græcis auctoribus colligere licet sæniculum marinum, siue Herbam Sancti Petri, Empetrum non esse, hoc loco descriptum, quod quidam credidere: quia ei nulla bilem purgandi, pituitamque facultas insit. Quare diuinare potius, quam certò statuere licet, quæ planta legitimum veterum Empetrum asseri possit. Si tamen cōiecturæ locus sit, Dalechampius Empetrum esse opinatur plantam, quæ à vulgo Narbonensium Herba terribilis vocatur, cuius capite de Alypo mentionē faciemus, ob violentam in corpore purgando facultatē. Ea nunc in ipso maris litore prouenit salsum humore bibente eius radice, ac tum salso gustu est, vt cæteræ plantæ, quarum radix marinam aquam fugit: nunc in montibus mari vicinis, vt in monte Cestio, vulgò *Cap de Ceste* prope Agatham, nullo maris succo imbuta, sed tantum obie-

Nomina.

Li. 4. c. 174.

Locus.

Vires.

Lib. 27. c. 96.

Lib. 6. sim.

EMPETRVM phacoides, Herba terribilis Narbonensium.



cta eius afflatui, ac tum saluginis expers, gustari perquam amara sentitur. Cubiti est magnitudine, & eo maior, cortice purpurascēte, ramosa, folio lētis, sed lētis modo per æquales versus non disposito, per ramos & furculos nullo ordine prodeūte, supernè viridi, infernè candicante, capitulis in ramorum vertice purpureis & rotundis, Aphyllanthi non dissimilibus. Purgandi vim habet Sesamoide utroque non imbecilliorē. Purgat autē bilem, pituitam & aquas non aliter, quam Tithymalus.

Nomina



ΚΥΣ ἄγριος, Cucumis silvestris Latinis dictus est, & Cucumis erraticus, & anguinus, Officinis Cucumis asininus, Arabibus *Chete allimar*, *Katealbhner*, seu *Cheta alhamar*, Italis *Cocomero saluatico*, Germanis *Vuilder cucumern*, & *Esele cucumern*, Hispanis *Cogombrillos amaragos*, Gallis *Coucombres sauuaige*. Cucumin

Li. 4. c. 149.

Forma.

siluestrum tradit Dioscorides solo fructu distare à satiui Cucumere, quem longè minorem parit, oblongis glandibus non dissimilem: folia atque sarmenta satiui referre: radice candida, magna. His notis Cucumerem nostrum siluestrum de-

CUCUMER agrestis,
Matthioli.



signari nemo est qui non apertè videat. Is flagella per terram spargit, bicubitalia, minimi digiti crassitudine, rotunda, breuib. aculeis aspera, solida, & anguium modo inflexa. Folia edit ex longis, crassis, & aculeatis pediculis pendencia, in obtusum mucronem desinentia, superne viridia, inferne pallidiora, & crebris intricatisque venis, rugosa, vtrinque aspera: flores tota æstate ex foliorum alis, quinque, latis, acuminatis, & flauis foliolis constantes, quosdam steriles, quosdam fecundos. Steriles terna intus trifida veluti complicata, & per ambitum crocea, nec hirsuta stamina habent, nullumque posteriore parte capitulum, futuri fructus rudimentum. Fecundi in medio ternas hirsutas & flauas furculas staminum vice continent: retro hirsutum & oblongum extuberat tuberculum, quod flaccescere flore paulatim cum pediculo accrescit, donec maximæ glandis magnitudinem superauerit, quod vndique breuib. aculeis armatur, & in maturitate cum splendore, gliscere, & candicare, vel pallescere coeperit, sponte sua, aut leuiter tactum ex pediculo

exilit, & cum impetu oblonga, foris nigra, intus candida semina cum aqueo succo eiacular. Radice nititur crassa, rotunda, carnosâ, rapo oblongo haud absimili, radiculis multis huc & illuc dispersis. Tota planta vehementer amara est, præsertim fructus amarissimus, sola seminis medulla dulcedinem habet, quæ etiam mures alliciat, inquit Cordus. Quare miratur Galenum huic semini amarum saporem tribuere, quod fortasse tantum corticem seminis degustauerit, qui amarus est, non ipsum nucleum, qui propriè seminis appellatione venit. At falsò Galenum à Cordo reprehendi Matthioli arbitrat, quod nusquam scripserit Galenus Cucumeris silvestris semina amara esse, sed Cucumerum semina quædã amara esse, quemadmodum & amygdalæ: nec diserte dixisse Galenum aut satiui aut silvestris Cucumeris semen quandoque amarum reperiri, coniecere tamen ex contextu facile esse de satiui semine intelligere, & lectores admonere voluisse huiusmodi seminum nucleos, qui natura dulces sunt, aliquando soli in quo nascuntur vitio amarus effici. Nascitur Cucumis silvestris in sabuletis, ac ruderibus: estque

Locus.

Tempus.

Li. 4. c. 149.

Vires &

Temper.

in Gallia Narbonensi & Hetruria frequens. Frigidioribus locis feritur in hortis ab Herbariis. Augusto mense floret. Autumno fructum producit. Instillatus foliorum succus aurium dolori conuenit, inquit Dioscorides. Illita ex polenta radix veterem omnem tumorem discutit. Imposita cum resina terebinthina tubercula

cula rumpit. Ischiadicis infunditur : podagras discutit decocta ex aceto & illita. Eius decocto dentes in dolore colluuntur. Arida farina impetiginem, lepras & vitiliginem absterget: nigris cicatricibus colorem reddit, & in facie maculas expurgat. Radicis succus selquioboli pondere, item cortex acetabuli quarta parte, bilem pituitamque deiciunt, præsertim in hydropicis: deiectiones autem citra stomachi iniuriam mouet. Radicis felibra in vini, præsertim Lybici, hemina conteritur, danturque ex eo terni cyathi triduo, dum tumor abundè deprimi cernatur. Quæ postrema sententia sic legitur in vetere codice. Δεξ. δὲ τῆς ρίζης λαβόντα ἡμιλίβραν μζ' δυνού ξεσῶν οἶνε, μάλιστα ἀγρυπνίῃς γλυκεῶς, λεαίνεῖν, καὶ διδόναι ἐκ τούτου κούθους. γ. νῆς εἰ ἐπὶ ἡμέρας τρεῖς, ἕως ἂν ὁ ὄγκος ὑγρῶς συσταλῇ. Id est, cum felibram eius acceperis, oportet eam lauigare cum binis sextariis vini dulcis, præsertim Aegyptij, propinareque ex ipso tres cyathos ieiuno trium dierum spatio, donec abundè tumor ipse subsidat. De foliorum & radicis vsu medico, idem quod Dioscorides Plinius apertè tradidit. Radix ex aceto cocta podagris illinitur, succoque dentium dolori medetur. Arida cum resina impetiginem & scabiem, quæ psoram & lichenas vocant, parotidas & panos sanat, & cicatricibus colorem reddit. Foliorum succus auribus surdis cum aceto instillatur. Sed in his quæ de Elaterio scripsit, à Dioscoride dissentit. Cucumini siluestrem esse diximus, inquit, multò infra magnitudinem sariui. Ex eo fit medicamentum, quod vocatur Elaterium, succo expresso ex semine. Qua in re Plinius Theophrastum secutus est: scribit enim. καὶ τῆς σκευῆς ὃ τὸ ἀγρίον τὴν μὲν ρίζαν ἀλφειῶς καὶ ψώρας βοσκοῖμασι (legendum, ἀλφειῶς καὶ ψώρας βοηγεῖ. τὸ ὃ σπέρμα, &c. Est enim id, quod Dioscorides antè dixit. ξηρὰ ὃ λέγεται ρίζα ἀλφειῶς, λέπραν καὶ λετχιῆνας σμύχει, nulla facta pecudum mentione) τὸ δὲ σπέρμα χυλῶς ἐν ποίεῖ τὸ ἐλατήριο. τίλλεται δὲ τὸ φθινοπῶρος, τότε γὰρ βέλιον. Id est, Cucumeris silvestris radix vitiliginem & scabiem sanat. Ex semine verò succo expresso fit Elaterium. Legitur Autumno: tunc enim melius. Dioscorides verò ex fructu Cucumeris elaterium fieri docet, vt simul etiam quod in ipso carnosum exprimatur. Deinde quod scripsit Dioscorides. Sunt qui ad hauriendam protinus succi abundantiam cribratos cineres humi inspergant, & medium cauantes triplicatum linteam obfendunt, per quod Elaterium cum sua humiditate diffundatur, siccatumque in pila conterunt, Plinius non satis expresse. Semen quoque, inquit, cinere conspergitur, ad coercendam succi abundantiam, qui expressus suscipitur aqua cælesti, & subsidit, deinde sole cogitur in pastillos ad magnos mortalium vsus. Paulò post de Elaterio, Nec vllum, inquit, ex medicamentis longiore æuo durat. Incipit à trimatu. Si quis recentiore vti velit, pastillos in nouo fictili igne lento in aceto domet. Melius quo vetustius: finitque iam ducentis annis seruatum, vt auctor est Theophrastus, & vsque ad quinquagesimum lucernarum lumina extinguit: hoc enim veri experimentum est, si admotum, priusquàm extinguat, scintillare sursum ac deorsum cogat. Locus Theophrasti, quæ Plinius citat, is est. πάντων ὃ ἔλας τῶν φαρμάκων πλεῖστον διαμένει χροῖον ὃ ἐλατήριο, καὶ τὸ παλαιότατον αἴρετον. ἰαβδος δ' ὅν τις ἔλεγε οὐκ ἀλφειῶν, ἔδδ' ἐφύτης ὡς ἐκ παρ' αἰσῶς διακόσιον ἐτῶν, θυμαστόν ὃ τῇ ἀρετῇ, διδύμω ὃ τινὰ αἰσῶς διώρον. αἰσία δὲ τῆς κρονιότητος ἢ ὑγρότης. διὰ γὰρ ταύτην καὶ ὅταν κοῦλωσι, τιθέασιν εἰς τέφραν ὑγρὸν, καὶ ἔδδ' ἕτως ξηρὸν γίνεται, ἀλλ' ἀχειρῶν ἐνέηκοντα ἐτῶν σέβεννοσι προφθιμένον τὸς λύχνους (non αὐχμῆς, vt in vulgatis exemplaribus legimus) φασὶ δὲ μόνον μάλιστα ὑπέρβιον ἂν οὐ ποιεῖν τῶν φαρμάκων (non ὑπὲρ ἴσον, vt habent vulgati codices) αἰσῆ μὲν ὅν ἰδιότης τῆς δυνάμεως. Id est, Omnium quidem in vniuersum medicamentorum maximè diuturnum est Elaterium, & quod vetustissimū optimum. Itaque medicus quidam, vir haud gloriosus neque mendax, sibi esse Elaterium ducentorum annorum dicebat, virtute mirabili, donatum à quodam. Diuturnæ confer-

Lib. 20. c. f.

Lib. 9. hist. cap. 10.

Lib 9. hist. cap. 14.

uationis est humoris copia: eam enim ob causam etiam cum triuerint, in cinere humidum reponunt, ac ne sic quidem siccatur, sed usque ad quinquagesimum annum lucernis admotum eas extinguit. Aiunt autem solum hoc ex omnibus medicamentis maxime purgationem immodicam per superiora efficere. Hæc igitur eius medicamenti propria vis. In his Theophrasti verbis Gaza hæc prætermisit, *φασὶ δὲ μόνον μέλιτι, ὑπέρχον ἀνω ποιεῖν τῶν φαρμάκων*. Est autem ὑπέρχον, ὁ ὑπερκεχθαρμένος ἀνθρώπος, ut Galenus in Glossis Hippocraticis exponit. Dioscorides Elaterium scribit à bimatu ad decennium deiectionibus vtile esse. Theophrastus id mirabili virtute ducentis annis seruatum esse. Scribit idem Theophrastus *σβέννυσσι ποσάγόμενον τὰς λύχνους*, quæ Plinius cōuertit, lucernarum lumina extinguit. Contra Dioscorides ait, *ποροαχθέν λύχνω εὐκρίεσ*, id est, quod lucernarum luminibus obiectum facile flagret, vel ad lucernā admotum facile ardeat. Sed potior videtur esse Theophrasti sententia, ut videlicet Elaterium propter humoris copiā lucernarum lumina extinguat, & ut Plinius ait, scintillare sursum ac deorsum cogat. Nam omne humidum, quod pingue non sit, ignis flammam protinus extinguit. Quare Elaterium, in quo humiditas aquea multum exuperat, lucernæ flammam extinguet potius, quàm ardebit admotum, excitato videlicet in humido à calore flatu, id quod experientia confirmari potest. Itaque eum Dioscoridis locum mendo non carere suspicantur viri docti, & pro *εὐκρίεσ* legendum esse putat Cornarius & *χαίρει*, id est, non ardet. Elaterium bilem ac pituitam vtriusque parte extrahit, inquit Dioscorid. Optima suspiriosis est purgatio. Quod si in animo est deiectionem moliri, adiecto salis duplo, & stibij quod colorare sufficiat, ex aqua, erui magnitudine, catapotia dato, postea cyathus vnus aquæ tepidæ sorbeat. Ad citandas tamen vomitiones aqua diluens Elaterium subiectas linguæ partes penitissimè penna oblinito. Quod si quisquam difficilius euomat, oleo aut vnguento irino resoluto, somnum inhibeto. Porro his, qui eximie vacuantur, continuè vinum & oleum dare conuenit: etenim vomendo restituntur. Quod si vomitiones non finiantur, aqua frigida, polenta, posca, poma, & quæ stomachum densando corroborant, offerenda sunt. Ciet Elaterium menses: partus necat in pello subditum: morbo regio medetur cum lacte naribus infusum, à diurnis capitis doloribus liberat. Efficacissimè anginis illinitur cum vetere oleo, melle, aut felle taurino. Hæc & alia quædā Plinius habet. Obscuritates, inquit, & vitia oculorum sanat, genarumque vlcera. Tradunt hoc succo tactis radicibus vitium, non attingi vnas ab auibus. Contra phthiriasim bibitur, & hydropises. Illitum anginas & achoras cum melle & oleo sanat. Et paulò post. Podagris & articulorum morbis decoctum in aceto illinunt, præsentī remedio: lumborum verò dolori semine solo siccato, dein trito, triginta denariorum pondere, in hemina dato aquæ. Sanat & tumores subitos illitum cum lacte mulierum. Purgat eas Elaterium: sed grauidis abortum facit. Suspiriosis prodest, morbo verò regio in nares coniectum. Lentigines ac maculæ à facie tollit in Sole illitum. Adiecit & eius modum ex Dioscoridis sententia. Modus proportionē virium à di midio obolo ad solidū. Copiosius necat. Integer modus, inquit Dioscorides, obolus est, minimus semiobolus, pueris chalci duo, si quidem copiosius periculum adfert. Galeno Cucumeris agrestis tum fructus, tum fructuum succus, quem vocant Elaterium, tum non minimè radicis, & foliorum, ad medicationes perutilis est. Elaterium itaque menses ciet, & fœtum interimit appositum, ceu alia omnia amara, & subtilium partium, maxime si quam habeant caliditatem, velut Elaterium: nam summè amarum est, leuiter calidum, ut ex secundo sit ordine excalfaciētium. Porro tale protinus digerendi quoque vim habet. Sic igitur eo angina laborantes inungunt quidā cum melle, & oleo vetere. Bonum item est morbo regio affectis, fusum

Ibidem.
Vires &
Temper.

Lib. 10. c. 1.

Lib. 3. sim.

fusum cum lacte in nares, dolores capitis sanat etiam hoc usu. Atq; Elateriū quidem eiusmodi est. At radice succus, vt & foliorum Elaterio similem vim habeat, imbecilliolem tamen. Sed & ipsa radix similem facultatem habet: abstergit enim, digerit, emollit. Porro cortex potentius ea desiccatur. Mesues de huius Cucumeris facultate, viribus, noxa, & eius correctione fusius disserit his ferè verbis. Succus ex Cucumeris siluestris fructu laus est præcipua, secunda radice. Is fructus iam absolutus si maturitate palleat, viridisque esse desierit, & amaritudine sit eximia, succumque remittat album & subpinguem, est calidior. Imperfectus autem tam est noxius, vt sanguinem educat. Succus quidem exeunte Æstate excipitur: radix sine Veris colligitur. Eadem in medicamenta multum efficacia & celeberrima recipitur. Succus calidus est & siccus ordine tertio: substantia ignea & terrena constat. Purgat potenter pituitam vomitu, & deiectione, & interdum bilem, si vacuari parata est: serosum quoque excrementum etiam euulsu contumax, atque ideo à iuncturis mirificè trahit, præsertim succo & radice. Ob id earum dolorem sanat: ischiadem etiam iuuat apertè cataplasmate impositus, vel clystere iniectus. Radices eius cum absinthio in aqua & oleo percoctæ hemicraniam molestam, & curatu difficilem sanant, si ipso decocto tempora fricentur, & si ægris radices eadem cum herba trita cataplasmate applicentur. Succus quoque ipsius cum paucis lacte naribus iniectus idem efficit: excrementa enim cerebri euacuat, & nasi foetorem ab horum putredine ortum persanat: cephalalgiam quoque veterem, & epilepsiam. Idem cataplasma, præsertim si sterces caprinæ addatur, tumores magnos & duros, & strumas resoluit. Succus quoque & decoctum tum fructus, tum radice hydropem iuuat potu (valenter enim aquas serosas euacuat.) & icterum, & obstructions lienis, & hepatis. Puluis radice cum melle cicatricem scedam tenuat, ecchymomata contusionibus succedentia dissipat. Succus radice cum farina fabarum, sordem faciei, & sceditatem cutis illitus terget. Radix ex aceto forti alphis affricata, eos delet & lentigines. Resoluit enim, tenuat, terget, siccatur. Soluit molestè & tardè: aperit obstructa, & ora venarum. Quæ ne aperiat & vlceret hic succus, ac cum torminibus, & anxia molestia vacuet, datur cum Bdellio, vel Tragachantho, vel lacte dulci, recenter mulso, aut mulso & sale: promptius autem purgat cum paucis sale gemmæ & aromatibus. Succus ex fructibus per maturitatem pallentibus clementer sine compressionem multa extractus, siccatur vt Scammonium aut aloë. Nonnulli inter siccandum ei immergunt aromata nodulo ligata, quem extrahunt dum siccando cogi incipit. Alij alia immittunt pro variis scopis. Triennio seruatur, post sex menses vtendus. Noxam autem ab eo corpori impressam delent aqua hordei, mulsa, vinum, oleum. Datur succus à granis decem ad drachmæ vnius partem tertiam. Puluis radice à granis quindecim ad drachmæ semissem. Decoctum ab vncis duabus ad vncias quatuor.

Li. 2. med.
purg. c. 9.

COLOCYNTHIS.

CAP. XIX.

RΟΛΟΚΥΝΘΙΣ, θίλνος, quasi Cucurbitula, deminuto à κολοκυθα nomine, nam fructus eius cum Cucurbitæ satiuæ fructu collatus, longè minor est, Latinis similiter Colocynthis, & Cucurbita siluestris appellatur, Arabibus *Chandel*, *Handel*, siue *Handal*, Officinis, Hispanis & Italis *Coloquintida*, Germanis *Coloquint*, & *Urwildekurbz*, Gallis *Coloquinte*, & *Courge sauvage*. Quibusdam Fel terræ dicitur, Arabibus Plantarum mors, quod herbas

Nomina

alias sibi vicinas veneni modo interficiat, vt vicina illi terra adusta videatur. Hippocrates Colocynthidem sæpe συκυνήν vocat, & συκύν, & συκυνής σπόγγον, κολοκυνθίδας τὸ ἔντον, Colocynthis spongiam, eius interiorem partem, & συκύν ἄτμιστον, κολοκυνθίδα ἀδελφείον, in scētilem Colocynthida, vt Galenus in Glossis exponit. Colocynthis aspera viticulos foliāque per terram strata emittit, Cucumeri, quem hodie Citrulum vocant Officinæ, similia, in mucronem desinentia,

COLOCYNTHIS,
Matthioli.



Li. 4. c. 171.

Li. 2. c. 130.

Lib. 2. c. 4.

Genera.

Lib. 3. c. 41.

Lib. 1. de
plant.
cap. 98.
I.

atque vtrinque ex obliquo & profundius in ternas plerumque partes secta, quæ partes suas quoque habent incisuras: flores iuxta folia pallidos siue flauos: fructum rotundum, pilæ forma in orbem coactum, primum viridem, deinde flauum, cortice neque spisso, neque duro contestum, qui cum exaruit, summe læuis est, fungosa candidaque intus pulpa, in qua cauernulæ seminibus pyro similibus plenæ, duro cortice candidum nucleum claudentibus. Radice nititur oblonga, fibrata, candida. Fructus sapore est amarissimo, qui siccatur, & ad vsum medicum asseruatur. Hæc est Dioscoridis Colocynthis: sic enim describit. Colocynthis sarmenta foliāq; satiui Cucumeris emittit, per terram repentia, diuisa: fructum in speciem mediocris pilæ conglomeratum, vehēmenter amarum, quem legere oportet cum cœperit in pallidum colorem permutari. Auicennas & Mesues duplicem faciunt Colocynthidem, marem & fœminam. Mas est foris lanuginosus, nigricans, subasper, grauis, durus: fœmina præstantior, præsertim si est magna, perfectè matura, alba, lenis, rara, læuis: vti eius interior medulla albissima, rara, lenis & læuis: quoque leuior, eo melior: sitq; ex agro laxo, arenoso, libero, Autumno lecta, cum languescēte virore cœperit in colorem luteum mutari. Inmutata & his notis destituta, mala: flatus torminosos & molestissimos excitat, immodicè purgat, vt etiam sanguinem educat, & sæpe mortem adferat. Pessima est etiam ac venenosa, quam producit vnicam tota vna planta. Quæ planta si loco illo est vnica, multò perniciores fructum parit, præsertim si locus ille est vliginosus, vel puluerulentus, vel thermis propinquus, vel serpentibus abundet. Dodonæus alterum Colocynthis genus reperiri tradit suprâ à nobis descriptæ haud multum simile, quod viticulis longis, asperis alta scandit, & Cucurbitæ satiæ modo iis omnibus, quæ obuia sunt, capreolis suis se inuoluit. Folia fert Cucumeri siluestri similia: fructum Cucurbitæ prorsus similem, sed multò minorem, pyri solum magnitudine, & effigie: cortice duro tegitur, viridi, lignoso: intus succo plenus est amarissimi gustus. Hanc Lobellius pingendam curauit. Cordus sex Colocynthidum species recenset, Colocynthidem grandem, oblongam, quæ viticulis multis per terram spargitur, ex interuallo geniculis præcinctis, iuxta quæ capreolos emittit, & singula erigit folia longitudine & latitudine pedali, in tres partes Lupuli modo secta, tactu aspera, & breuioribus aculeis horrida, pedilibus aut cubitalibus, teretibus, asperis, concauisque pediculis insidentia. Ab iisdem geniculis radices in terram

*COLOCYNTHIS Pyri-
formis, Lobellij.*



in terram demittit tenues, quibus nutriendo fructui succurrit. Flores secus foliorum exortu profert, quibus decidentibus grandis, & humi procumbens excrescit fructus, longitudine plerumq; dodrantali, ea crassitudine, quam vtraq; manu circum amplecti vix possis. Is primum viridis est, postea candicantibus maculis conspergitur, postremo maturus totus luteo pallet, & circa pediculū eminentibus angulis distinguitur. Dissectus corticem primò ostendit durum lignosumq;, mox flauam cartilaginosaq; carnem, & in medio sex ordines seminum candidorum, oblongorum, acuminatorum, latorū & planorum, in quibus candidus inest nucleus. Radice nititur breui, à qua multæ aliæ candidæ in diuersas partes exeunt, cubitales, & tenues. Hæc planta ad cameras perticis extractas admotæ capreolis eas apprehendit, & attegias scenasq; facit. Sapore fructus est amarissimo, & graui odore: seminis nucleus dulcis est. Seritur

II.

speciaculi gratia in latis hortorum arcibus. Altera Cordi Colocynthis grandis, & rotunda, supradictæ viticulis, capreolis, floribus, foliorū magnitudine, asperitate, radicibus, deniq; aliis omnibus similis, & æqualis, demptis duntaxat duobus, quòd scilicet folia in quinas partes dissecta habet, & fructus minores, globi instar rotundos, aut modicè planos, colore primum viridi, in maturitate pallido, pulpa, seminum ordine & figura superiori similes. Tertia Colocynthis turbinata, viticulas, capreolos, folia & flores primæ similes profert, & similiter per terram repit, sed omnes partes tenuiores habet: fructum pyri modo turbinatum, ouo maiorem, in maturitate flauū, & candicantibus lineis per longitudinem distinctum, foris durum, & lignosum, intus fungosa carne plenum, in qua quatuor oblongorum, paruorum, pleniorum, ac candidorum seminum ordines continentur. Radicibus nititur supradictis similibus, sed minoribus: sapore est amaro, vt ceteræ, similiterq; colitur.

III.

Quarta Colocynthis oblonga, glabra, viticulis, capreolis, foliis, flore & radicibus primæ similis, & æqualis est. Folia tamen quoquo versus dodrantem vix excedunt, & non longè à mucrone duabus incisuris, sed non profundis, in tres partes diuiduntur. Fructum habet oblongum, primæ similem, glabrum, minorem, colore primum viridi, in maturitate obscurè luteo, ac in pallorem saturatum degenerante, seminum ordine, quantitate, atque pulpæ substantia, colore, ac sapore præcedentes Colocynthidas æmularur, similiter etiā in hortis colitur. Quinta Colocynthis oblonga, candida, grandis, viticulis, foliis, capreolis, floribus, fructus quantitate, semine, radicibus, asperitate, atque amaro sapore primæ similis est. Solo ferè colore huius fructus ab illius fructu differt: etenim principio viret, mox albicantibus, & inæqualibus maculis, seu nubeculis aspergitur, postremo in maturitate totus albicat. Colitur in hortis supradictarum modo.

III.

V.

Sextam Colocynthidem ponit, fungosam illam, & læuem, vulgaremq;, quam descripsimus. Hæc colitur à quibusdam Herbariis in hortis, sed rarissimè prouenit. In Italia & Hispania, & trans maria in calidioribus locis sponte in asperis gignitur. Eius flores in æstate, seu fine æstatis apparent: fructus Autumno, siue eius sine maturescunt, & durant integris natura & viribus ad quinque annos.

VI.

Locus.

- Li. 7 simpl.* Colocynthis, inquit Galenus, gustu amara est, sed quæ amaritudinis illi, dum
Vires & potatur, adfunt opera, ea euidenter efficere nequit, ob purgatoriam facultatem
Temper. quam validam in se continet: nimirum cum iis, quæ expurgat, antè & ipsa per al-
 uum excerni præuertens. Viridis ipsius succus intritus ischiadibus prodest.
- Li. 4. ca. 171.* Dioscorides verò enucleatus eius effectus declarat. Medulla fructus purgatoriam
 vim habet, si quatuor oboli cum aqua mulsâ, melle cocto, myrrha & nitro exci-
 piantur, & cogantur in catapodium. Arefactæ pilæ teruntur, & infusæ clysteri-
 bus prosunt nervorum resolutioni, coxendicû doloribus, & coli vitiis, vt quæ bi-
 lem, pituitam, & strigmenta, interdum etiam cruorem eliciant. Fœtus admotæ
 enecant. Dolorem dentium tollit, si vnâ repurgetur, & in ea luto oblita acetû &
 nitrum inferuescant, eo decocto decocti dentes colluantur. Si aqua mulsâ,
 aut passum in eadem incoquatur, & sub dio refrigerescat, potu crassum humorem
 & strigmenta alui detrahet. Stomacho supra modum aduersatur. Subdita ex ea
 balano alui excrementa reiciuntur. Virenti succo vtilissimè ischiadici perfric-
 cantur. Plinius perspicuè etiam eius vires exponit. Colocynthis vocatur alia (Cu-
 curbita subaud.) ipsa plena, sed minor quâ satiuâ. (Sic fortasse rectius legas. Vtilior
 pallida ad medicinam quàm herbacea, medulla fructus per se inanit aluû. Arefac-
 ta infusâq; clysteribus, &c.) Vtilior pallida, quâdo eius sunt medicinæ. Herbacea
 arefacta per se inanit aluum. Infusa quoque clysteribus, intestinorum omnium vi-
 tiis medetur, & renum, & lumborum, & paralyfi. Eiecto semine aqua mulsâ in ea
 decoquitur ad dimidias, sic tussienti bibitur obolis quatuor. Prodest & stomacho,
 farinæ aridæ pilulis cum decocto melle sumptis. In morbo regio vtiliter semina
 eius sumuntur, & protinus aqua mulsâ. Carnes eius cum absinthio & sale den-
 tium dolorem tollunt. Succus verò cum aceto calefactus mobiles dentes sistit.
 Item spinæ & lumborum, ac coxëdicum dolores cum oleo, si infricetur. Præterea,
 mirum dictu, semina eius si fuerint pari numero adalligata febribus, sanare dicun-
 tur quas Græci periodicas vocant. Hæc Plinius. Ex quibus Cornarius locos ali-
 quot declarari scribit, hæctenus à nullis interpretibus, vt ille arbitratur, rectè in-
 tellectos. Primùm duos modos sumendi medullam Colocynthidis in vnum
 coaluisse, paucis particulis omisis, vt pro *διώαμιν δι' ἑχδῆ ἢ μὲν δι' τετραώνη τῆ χαρ-
 πῆ καθαρίσκειν, τείραβόλη πολλῆος μέλι, ὑδρομέλιτος λαμβανομένη συννίτρω, καὶ σμύρνη, καὶ
 μέλιτι ἐφθῶ εἰς χλιαπότηιον*, sicuti habent publica exemplaria, quæ interpretes secu-
 ti sunt, legunt, *διώαμιν δι' ἑχδῆ ἢ μὲν ἐν τετραώνη τῆ χαρπῆ καθαρίσκειν, τείραβόλη πολλῆος
 μέλι, ὑδρομέλιτος λαμβανομένη, καὶ συννίτρω δι' ἢ σμύρνη, ἢ μέλιτι ἐφθῶ εἰς χλιαπότηιον*.
 Id est, Medulla fructus purgatoriam vim habet, si quatuor oboli cum aqua mul-
 sa sumantur. Sed & si cum nitro, & myrrha, & melle cocto cogantur in catapotia.
- Lib. 3, ca. 35.* Priorem modum apertè tradit Aëtius. Dantur ex medulla eius scrupuli duo in
 aquæ mulsæ cyathis duobus. Posteriorem docet Plinius, cum ait, Prodest & sto-
 macho, farinæ aridæ pilulis cum decocto melle sumptis. Alij tamen legere ma-
 lunt ex Dioscoride, Obest stomacho. Farinæ aridæ pilulæ cum decocto melle su-
 muntur. Deinde rectè dixit Plinius, Eiecto semine aqua mulsâ in ea decoquitur
 ad dimidias. Quòd in Dioscoride nonnulli longè aliter intellexerunt, ipsam scilicet
 medullam in aqua mulsâ coqui debere. Hoc falsum esse Aëtius perspicuè
 ostendit. Quod si minùs purgare volueris, inquit, sumito Colocynthidem iustæ
 magnitudinis, eamque aperito supernè, & semen totum eximito. Deinde quic-
 quid tomenti speciem præ se ferat in ipsâ, rursus citra semen in ipsâ indito, & re-
 pletam ipsâ sapa, aut vino dulci vetere, diem ac noctem macerari finito. Deinde
 excolatum per pannum vinum calefactum bibendum dato. Hoc tamen interest,
 quòd Dioscorides aquam mulsâ, aut passum in ipsâ priùs coquendum, deinde
 sub dio exponendum præcipit. Aëtius sâpam aut vinum dulce vetus diem solum,
 ac noctem

ac noctem macerari finit. Sic etiam Paulus habet. Colocynthidem semine reiecto, sed quæ medullam referuet, passio implebis, sineq; totam noctem commadescere, manè passum auferetur, potuiq; dabitur. Qui sanè vsus hodie quoque Medicis frequentissimus est, Colocynthidem, aut alia pharmaca in liquore aliquo macerandi. Infusionem vulgò vocant. Sed præcipuè Medicis scitu necessaria sunt, quæ cum Mauritanî cæteri, tum Mefues de Colocynthidis temperatura, viribus, & remedijs ex ea aduersus varios morbos, de eius vi malefica, de correctione, præparatione, dosi, & sumendi modo tradidit in libro secundo de purgantibus medicamentis. Colocynthis, inquit, calida est, & sicca, ordine tertio, ignea substantia & terrea per vstionem tenuata, eximiè amara constat. Pituitam & alios humores crassos & glutinosos magis ex profundis partibus & distantibus, vt cerebro, nervis, musculis, iuncturis, pulmone, thorace, quàm ex venis attractos, vt censet Dioscorides, purgat, (non ita Dioscorides censet, sed pituitam, bilem & strigmenta purgare. Paulus Colocynthidis medullam scribit bilem potissimùm vacuare, & mucosa, non à sanguine tantùm, quemadmodùm Veratrum, & Scammonium, sed & à nervis, & nervosis partibus) ac etiam bilem flauam, vt voluit Humain. Quapropter harum partium morbis mirè subuenit, cephalgiæ antiquæ, dolori cranij totius hemicranie contumaci, epilepsie, apoplexie, vertigini, aquosæ fluxioni in oculum, podagræ frigida, ischiadi maximè ac reliquis nervorum iuncturarumq; affectibus: asthmatis itè ac tussi antiquæ, dyspnœæ ex thoracis repleti angustia. Ac præterea summè omnium prodest colico dolori tam à pituita, quàm à flatibus, & hydropi. Omnia autem hæc siue sumpta, siue clystere, aut balano intestinis immissa præstat. Vtero autem imposita fortum necat. Eadem cum aceto forti affricta alphas, lepram, psoram, elephantiam sanat. Oleum denique super calidos cineres incoctum cortici eius inanito, capillos illitu nigrat, eosque ne cadant firmat, canitiem tardat. Idem auri instillatum eius dolorem, ac tinnitum sanat. Eodem oleo & felle bubulo interaneorum vermes necantur, si simul misceantur, & calida ventriculo illinantur. Acetum similiter incoctum collutione dentium dolorem sedat: incidit enim, tenuat, terget, digerit. Ne autem cordi, ventriculo, hepatis, & cæteris visceribus noceat turbando, subuertendo, violenter trahendo, miscenda sunt quæ has partes roborant, vt mastiche, gallia: misceantur & glutinosa, lubricando citius deturbantia, acrimoniam mordacem obtundentia, vt gummi, Tragacatha, Bdellium, & similia, ne ampliùs vias vlceret per quas fertur, & ora venarum adeò vehementer aperiat, vnde sanguis manet. Serapio Colocynthidem mulsâ, cui incocta fuerit Ruta, macerabat, siccabat, lauiissimè terebat, ex mulsâ prædictâ dabat. Græcus quidam Colocynthidem oleo rosato fricabat, & cum æquali portione Ladani in cataportia formabat, vtilia prædictis affectibus. Mefues eam minutissimè forficibus incidit, muccagine Traganthi, aut Bdellij perlinit, siccât, tenuissimè terit: cum Ladano vel mulsâ, vel mastiche oleo rosato dissoluta in pastillos cogit, citra molestiam purgantes. Quod si noxam corpori impresserit, mulsâ, vel uuarum passarum decoctum cum oleo amygdalino, vel oleo nucum eam abolet. Longam decoctionem sustinet, èstque pulueranda tenuissimè, vt eius facultas malefica permista illi exquisitè alia, plenius obtundatur, vtq; viscera celerrimè permeet, neque in ipsis ob partium minùs tritarum crassitiem cesset: qua fortasse fit, vt in visceribus pigra retineatur, eaque vlceret, præsertim cum sensu percipi possint eius particula. Datur à siliquis sex ad decem.

Cap. 4.

ALTPVM

Nomina

ΑΥΠΙΟΝ Græcis, Latinis Alypum & Alypia dicitur, id est, indolens, siue expers doloris remediū, *χρῆσις ἀλυσιασιν*, nisi quis malit dictū quasi *ἐλκεόν*, id est, salsum vel maritimum, quod secus mare, ut Dioscorides ait, oriatur. Herba est furculosa, inquit ille, subrubra, gracilibus ramulis: tenuibus foliis: flore molli, leui, copioso: radix velut Betæ est, tenuis

Forma.

Li. 4. ca. 173.

Li. 5. meth.

Li. 27. ca. 4.

(Oribasius nec Betæ similem, nec tenuem radicem esse ait:) semen velut Epithymi (thymi habet Actuarius.) Nascitur in locis maritimis, maximè Libyæ, plurima: sed & aliis locis vberima. Plinius, Alypum, inquit, cauliculus est molli capite, nō dissimilis Betæ, acre gustatu, ac lentum, mordenſq; vehementer & accendens. Actuarius Alypum est Officinarum Turpetum, *Turbith* Arabibus dictum, quod album vocant. Nam in minoris Tryphera compositione scribit: Si hoc medicamento, pituitæ deiectionem moliri instituas, Alypum, id est, album Turpetum addas. Et alio in loco, Turpetum, quod radix est Pityusæ, & album Alypiæ, glutinosam detrahit pituitam. At cū idem Actuarius iisdem ferè verbis quibus Dioscorides, Alypum descriperit, subiunxeritq; huius semen atrā bilem per inferna ducere, credidēre quidam Alypum ab Alypia differre, quæ non atram bilem, sed pituitam vacuet. Verūm is aliam radicibus, quas Turpeti nomine donauit, aliam semini Alypi, siue Alypiæ vim inesse intellexit, neque tamen hanc ab illo differre: quod confirmat Paulus his verbis. Alypi semen infernè atram purgare bilem, pari Epithymi mensura, cum sale, & aceto dictum est: intestina verò, si fidē Dioscoridi damus, leuiter exulcerat. Est autem meo iudicio quæ nunc Alypias vocatur. Mesues scribit *Turbith* radicem esse herbæ lactariæ, foliis Ferulæ. Serapio Tripolium Dioscoridi *Turbith* appellat. Quare difficile est quænam sit hodie planta, quæ verum Dioscoridis Alypum dici queat, decernere. Matthiolus plantam hīc pictam à Luca Ghino Pisus ad se missam pro Alypo fuisse scribit, sed pingendo deprauatā fuisse,

Li. 5. meth.

Lib. 7. ca. 4

Li. 3. purg.

cap. 2.

Cap. 330.


simpl.

In cap. 173.

lib. 4.

ALYPVM,

Matthioli.

ALYPVM, Pena, Herba
terribilis Narbonensis.

ait Pena

ait Pena. Qui nullam habuit quæ æquè bene, imò vllò modo (præter Ferulas) Alypo congruat, siue lineamētis, siue efficacia purgandi, quàm frutex maritimus hîc depîctus. Herbam terribilem vulgus Narbonensium appellat, de qua capite de Empetro diximus. Hanc Hippoglossi Valentini nomine depînxit Clusius, qui florentem vidit mense Febuario & Martio in Bætica solitudinibus, & in regno Murciano, totòque Valentino. Bætici *Coronilla de froyles, & Siempre enxuta*, quod semper arida & exsucca videatur, appellant: Murçiani verò & Valentini *Segullada*, nonnulli Valentini professores Hippoglossum, quamuis nihil cum Hippoglossis Dioscoridis commune habeat, nisi quis fortè ob foliorum cū Rusci foliis affinitatem sic dictum putet. Quæ tamen in hoc frutice circa pediculum sunt oblongiora & angustiora: præterea faculares sunt etiã dissimiles. Eidem Clusio Alypum esse non placet, cū planè arida sit & exsucca planta. Cæterum circūforaneos Bætici Medicos scribit eius decoctum propinare iis qui scabie Hispanica laborant, non sine scælici, vt aiunt, successu. Est & hæc planta Parmica, & Coniza tertia quibusdam. Semen Alypi, Dioscoride auctore, purgat atram bilem, si mensura Epithymo pari cū sale & aceto sumatur. Intestina tamen leuiter exulcerat. Plinio verò aluum soluit in aqua mulsâ, addito sale modico. Minima portio drachmarum duarum, media quatuor, maxima sex. Ea purgatio datur è gallinaceo iure.

Li. 4. c. 173.

Vires.

Lib. 27. c. 4.

* PYCNOCOMVM.

CAP. XXI.

PYCNOKOMON Græci, Latini quoque Pycnocomum vocant. Folia habet, vt scribit Dioscorides, Eruca similia, sed aspera, crassa, & acriora, caulem quadrangulum, florem Ocymi, semē Marrhubij (ωπαρίς habent vulgata exemplaria, alia ωπάρις, id est, Porri, sicuti & Oribasius legit) radicem nigram, rotundam, pallidam, exigui mali figura, terram olentem. Nascitur in locis saxosis. Eadem breuiter Plinius tradit. Aluum soluit & Pycnocomum, Eruca foliis crassioribus & rarioribus, (Hæc vox, rarioribus, Pycnocomi nomenclaturæ repugnans enim à densâ comâ dictum videtur. Quare pro rarioribus reponere acrioribus, veteri etiã codice, atque Dioscoride lectionem hanc confirmantibus) radice rotunda, lutei coloris, terram olente: caule quadrangulo, modico, tenui: flore Ocymi. Inuenitur in saxosis locis. Ex rei herbariæ scriptoribus nullum aut audiui, aut legi, qui Pycnocomum verum se nosse asseueret. Quod si quis diligens & industrius aliquando repererit, sciat ex Dioscoride & Plinio non contemnendas esse eius vires. Semen drachmæ pondere potum, inquit Dioscorides, vim habet grauiâ & tumultuosa insomniâ faciendi. Cum polenta impositum tumores discutit: aculeos & spicula infixâ extrahit. Sed & folia imposita tubercula & furunculos discutunt. Radix aluum soluit, & bilem vacuat. Datur drachmarum duarum pondere in aqua mulsâ. Ex Dioscoride Plinius hæc videtur exscripsisse. Radix eius in aqua mulsâ denariorum duum pondere, & aluum, & bilem, & pituitam exinanit. Semē somniâ tumultuosa facit, vna drachma in vino potum. Rursus, Passim & in quacunque parte, ac maximo incommodo nascuntur, qui furunculi vocantur, mortiferum aliquando malum confectis corporibus. Remedio sunt Pycnocomi folia trita cum polenta, si nondum caput fecerint. Et alio in loco, Spicula sagittarum extrahit Pycnocomi semen.

Nomina

Li. 4. c. 169.

Forma.

Locus.

Li. 26. ca. 8.

Vires.

Lib. 26. c. 8.

Li. 26. c. 12.

EPITHYMVM.

CAP. XXII.

QUOD Græcis ἐπιθυμον, Latinis quoque Epithymum dicitur, Arabibus *Epitimo*, Gallis *Teigne de Thym*. Epithymum scribit Dioscorides florem esse Thymi durioris, & Thymbrae similis. Habet capitula tenuia, leuia, & in eis caudiculas veluti capillamenta. Plinius magna ex parte Dioscoridi

Nomina

Li. 4. c. 172.

Forma.

Li. 26. ca. 8.

Dioscoridi assentitur. Aluum, inquit, purgat Epithymum, qui est flos è Thymo Satureiæ simili. Differentia, quòd hic herbaceus est, alterius Thymi albus. Quidam Hippopheon vocant: stomacho inutilis, vomitiones mouet, sed tormina & inflationes discutit. Sumitur & ecligmate ad pectoris vitia cū melle, & aliquādo Iride.

EPITHYMV M,
Mathioli.

Lib. med.
purg. c. 16.



EPITHYMV M Gra-
corum & Arabum, Lobellij.



Vires.
Diosc. li. 4.
cap. 172.

Aluum soluit à quatuor drachmis ad sex, cum mellis exiguo, salisq; & aceti. Mox aliā de Epithymo subiungit opinionem. Quidam aliter Epithymum tradunt sine radice nasci, tenuis similitudine pili, rubens: siccari in vmbra, bibi ex aqua acetabuli parte dimidia, detrahare pituitam, bilēque. Mesues scribit Epithymū Thymo, Thymbræ, & cuidam speciei Origanī supercrefcere Cassuthæ modo. Duplex id esse, Creticum, idemq; præstantius, præcipuè capitulis florulentis, subrotundum, acre etiam, odoratu absolutum, graue. Alterum Syriacum minus, rufum, ignobilius, vt etiam pallidum, & subcitrinum. Hæc Mesues. Epithymum Arabum, siue id quo hodie vtimur, nihil aliud, est, quàm capillaceum quiddam inter sese implicatum, sine radice Thymo innascens, & sese circūuoluens. Quare dubitauere pleriq; Græcorūne, an Arabum, siue nostrum idem sit, quod dixerit Dioscorides florem esse Thymi durioris. At certè nostrum, siue Arabum Epithymum, idem planè est cum Dioscoridis Epithymo. Sed scire oportet, vt perspicuè docet Pena, Thymum duplex esse. Vnum maius, foliis Thymbræ, aut Hyssopi, cuius surculi capitulis spicatis Stœchadis ritu operti, floribus ex pallido purpurascens, atque numerosa fibrarum coma implicantur, cuius vires præstantiores. Hoc ex Syria Venetias asportatur. Alterū vulgare nigrum Plinij, Serpyllum zygis Dioscoridis, in Narbonæ maritimis collibus pusillum nascens: folio & flore Serpylli, rigidiore, passim etiam Epithymi cincinnis & capillamenti delicatissimis obuolutum. Dioscorides prioris tantum, ex quo prodit hæc fœtura meminit. Hoc nihil aliud est, quàm capitati flosculi, geminatue, quibus aptantur caudiculæ capillamenti instar, coloris fusci, vel rubellinitentis. Flosculi interdum candidi, nonnunquam herbacei, Thymo verò vtrique purpurascunt. Altero Epithymo vulgari Thymo innascente vtimur Syriacum enim rarius. Potum cum melle purgat per inferna pituitam & bilem atram. Priuatim predest melancholicis & inflatis acetabuli mensura ad Drachmarum quatuor pondus cū melle, sale, & aceti modico.

Scribit

Scribit Galenus Epithymum Thymi facultatem habere, ad omnia efficacius: exsiccare & exalfacere in tertio gradu. Paulus, Epithymum laudatissimum esse remedium scribit inter ea, quæ atræ bili vacuandæ sunt: dari ipsius drachmas quinque lætigatas ex lactis hemina.

Li 6. simpl.

Lib. 7. ca. 4.

CASSVTHA.

CAP. XXIII.


RECENTIORIBVS Græcis *κασσύθα* dicitur, Latinis Casslytha, vel y, in v, transeunte Cassutha, Herbariis & Officinis hinc deflexa quadam pristini nominis vmbra Cuscuta, *Chassuth*, vel *Cuscuth*, Arabibus. Quidam, quod Lino maximè sese obuoluat, Podagram Lini vocât, & Anginam Lini, quod quasi cõpedibus id cui infederit illiget, nec vinctum eo facile possit extricari. Galli *Goutte*, vel *Agourre de lin* vocant, Germani *Filtzkrant*, vel *Flachseiden*. De hac veteres Græci nihil, quod sciam, memorix prodiderunt. Plinius tamen de iis loquens, quæ in alia stirpe viuunt, sicut viscum, Est, inquit, & in Syria herba, quæ vocatur Casslytas, nõ tantum arboribus, sed ipsis etiam spinis circumuoluens sese. In cuius vulgatis codicibus Casslytas sine spiritu legitur, librariorum fortasse vitio Casslytas pro Casslythas scribentium. In quibusdam Cadytas habetur, non Casslytas. Quæ vox Cadytas etiam in Theophrasto reperitur, ex quibus ista mutuatus est Plinius: scribit enim, *ἔτι δὲ δ' σωμακὸν βολάνιον, ὃ καλεῖται κασσύτας, καὶ δένδρεος, καὶ ἀκύνθους ἐμπίπεται, καὶ ἄλλοις τισί.* Id est, & Syriaca illa herbula, quæ Cadytas vocatur, arboribus & spinis, atque aliis quibusdam innascitur. Cassutha, vt depingit Ruellius, herbosis fruticibus adnascitur, eorum adminiculo fulta, radice nulla, sed velut ab alarum sinu prodeunte cirro capillamentoque miræ longitudo, statim ab ortu ramulis sese circumuolente: quæ iam velut clauiculis nixa, sensim proserpens herbarum fastigia scandit, & crebris voluminibus opere topiario per vertices rotata, comas herbarum complectitur, tam volubilis illi natura est. Foliis vidua cernitur: florem fundit album: semine quoque scatet tenui: cirri dilutiore rutilant purpurâ, nonnunquam ex rubro, rufescunt, fidibus lyrarum cæs-

Nomina

Li 16. c. 44.

Lib. 2. c. 131.
cap. 23.Lib. 2. c. 131.
Forma.

CASSVTHA, Matthioli.



sitie pares. Non in terra, sed in herbis passim nascitur Casslytha, quas tam spisso sæpius irretit contextu, vt tètorigi modo herbosum cespitem à sole vindicet. Nonnunquam cacuminibus impendens stirpes humi deturbat, propriamque parentem suis laqueis strangulat, aut continuo materni alimenti fuctu perducit ad tabem. Hæc Ruellius. Sed vt de Epithymo & Epithymbra, ita & de Cassutha à multis merito ambigitur, inquit Pena, suapte ne adolescat radice, atque inde surrecta finitimis plâtis sese implicet, vnde alimentum vberius nacta, radiculæ illæ exarescât. Qua de re ita decernit ille. Epithymo, Epithymbræ, atq; Cassuthæ nascendi & rependi conditio par. Cassutha enim orta primum & amplexata Vites Narbonenses, tam multis osculis per quandam quasi synastomosis earum succum populator, & genium defraudat, vt radices sui muneris minis iam necessarij oblitæ, feruore arescant & abrumpan- tur (non secus ac Vrachii exarescunt fœtu excludo, & mutato alimenti ductu) pendulis illis

Locus.

Temper.

Lib. 2. c. 131.

Vires.

capitulis & staminibus Cassythæ in Vitium aliarumve stirpium amplexibus relictis, ubi ideo putantur enatæ. Sic à sese deprehensum in vincetis & semine collecto & sato veram Cassutham produisse asserit. Eam in primo effecalfaciendum ordine, & desiccantium secundo statuendum: quendam enim resipit amaritudinem. Eiusdem vires ex Arabibus hæc Ruellius recenset. Abstergendi naturam obtinet, & cum quadam adstrictione roborandi facultate prædita est. Iocinoris impedimenta laxat, infarcti & obstructi lienis expedit vitia, venas pituitosis atque biliosis exonerat humoribus, pellit vrinam. Regio morbo subuenit, qui iocinoris obstructionibus contrahi ur. Febribus iis auxiliatur, quæ pueros malè habent: sed vñ nimio stomachum sua adstrictione grauat: verum noxa tollitur, si anisi modicum adiciatur. Natura eius flauam bilem per aluū exigere, sed præsentiorum cum absinthio effectum præbet. Hæc quidem & Pœnorum & Arabum sententia facultates Cassuthæ tribuuntur, quæ vtiq; vires illius magis gliscere pollicetur, si parentis ingenium ei patrocinetur. Hinc est quod hanc forsitan veteres Græci, quamuis triualem, eo nomine subticuerunt, quod natiuas suæ merito parentis dotes adsciuisset, è sinu cuius vernaculum ebibens humorem aleretur. Nam, vt testatùm iidem Arabicæ factionis medici reliquerunt, si calidæ insidet herbæ, arborivæ, calidam sortietur facultatem, & si incubuerit frigidæ, vim frigidam vendicabit. Hæc ex Ruellio. Lobellius etiam scribit Cassutham plantæ, cui innascitur, vires quodammodo referre. Ideò Cassutham è Lino à Practicis & Officinis præferri, quod citra calorem minùs astringit, magis emollit, lenit, exterget, & ad euacuationem & discursionem præparat, iocinoris & lienis infarctus à bile & pituita leniendo referat, vrinam ciet: ideo morbo regio medetur, febres tertianas, quartanas & pituitosas curat, vt Mesues auctor est, flauamq; bilem per aluum expurgat, sed efficacius absinthio addito. Epicnides, seu in Vrtica natæ magnam copiam se vidisse ait Lobellius in agro Sommerfeti Angliæ, quæ vrinis potentiùs ciendis, & obstructionibus aperiendis est efficacior.

GLANS VNGVENTARIA. CAP. XXIIII.

Nomina

BΑΛΑΝΟΣ μυρεψική Græcis dicitur. Theophrasto Βάλανος simpliciter, Latinis Glans vnguentaria, Plinio eadem vocis significatione Myrobalanos, Arabibus *Habben*, seu *Ben*, Italis *Ghianda vnguentaria*, Hispanis *Auellana de la India*. Fructus effigies triquetra, vt scribit Pena, & Glandis, præsertim Fagi, emula, huic generi nomen dedit: oleum verò, quod expressione emittit, Myreplicæ, id est, vnguentariæ nomine à cæteris Glandibus distinxit, quod eo vnguentarij plurimùm vtiatur. Hanc Dioscorides sic descripsit.

Li. 4. c. 134.

Forma.

Balanus Myreplica fructus est arboris Myricæ similis, magnitudine nucis Auellanae, cuius interior pars expressa veluti amygdalæ amaræ humorem emittit, quo ad pretiosa vnguenta pro oleo vtuntur. Nascitur in Æthiopia, Ægypto, Arabia, & in Petra Iudææ. Præfertur quæ recens est, alba, plena, & quæ facile delibratur. Theophrastus verò sic: ἡ δὲ βάλανος ἔχει μὲν τὴν προσωροειὴν ἀπὸ τῆς καρπῆς, φύλλον δὲ αὐτῇ παραπλήσιον τῷ τῆς μυρρίνης, πλὴν ποικυλιότερον. ἔστι δὲ ὁ μὲν δένδρον ὡπλὲς μὲν καὶ ἀμύεβες, ἔκ ἀφῆς δὲ (Gaza legit, ἔκ ὀρθοφῆς, vel ὀρθοφῆς) ἀλλὰ παρὰ τὸν ῥαμμόν. τῆς καρπῆς ὁ τοῖς κελύφεσι χεῖρ) οἱ μύρεφοι κόπροντες: ὡς γὰρ κατέχει ὁ ὁ καρπὸς τὸν ὡς αὐτὸ ἀχρεῖος. ἔστι ὁ τῷ μεγέθει, καὶ τῇ ὀψὶ παραπλήσιος τῷ τῷ καρπῆρος. ἔχον ὁ ἰσχυρὸν, καὶ εἰς ἄλλα τε, χεῖρσιμον, καὶ εἰς τὰς αὐτῆς. Id est, Balano à fructu nomē indicū. Foliū eius Myrto simile est, sed oblongius. Arbor est patula & ampla, non recta, sed distorta. Fructus corticibus contusis vtuntur vnguentarij: odorum enim suauitatem retinent: fructus ipse ad id inutilis est: magnitudine autē & aspectu Capparis fructui similis.

Locus.

similis. Materies valida, & cum ad alia, tum ad nauigia utilis. His verbis Theophrastus declarat vnguentarios suis compositionibus addere solitos Balani corticem tustum, pro styminate, siue spissamento, conseruandi odoris gratia, quem ad vsum nucleus est inutilis. Plinius de eadem hæc tradit. Myrobalanus Troglodytis & Thebaidi, quæ Iudæam ab Ægypto determinat, communis est, nascens vnguento, vt ipso nomine apparet. Quo item indicatur & glandem esse arboris, Heliotropio, quā dicemus inter herbas, simili folio. Fructus magnitudine Auellanæ nucis. Ex his in Arabia nascens Syriaca appellatur, & est candida. Contrā in Thebaide, nigra. Præfertur illa bonitate olei quod exprimitur, sed copia Thebaica. Inter hæc Troglodytica vilissima est. Sunt qui Æthiopiam præferant, Glandem nigram, ac pinguem, nucleosq; gracili, sed liquore qui exprimitur odoribus aptiori, nascentem in campestribus: Ægyptiam pinguiorem esse, & crassiori cortice, rubente: & quamuis in paludibus nascatur, breuiorem sicciorēq;. E diuerso Arabicam viridem ac tenuiorem: & quoniam sit mōtosa, spissiorē. Longè autem optimam Petræam ex quo diximus oppido, nigro cortice, nucleo candido. Vnguentarij autem tantum cortices premunt, Medici nucleos, tundentes, affusaeis paulatim calida aqua. Vides in eiusdem arboris & fructus delineatione auctorum veterum discordiam. Dioscorides eam *μυελικη*, Theophrastus *μυρρίνυς*, Plinius Heliotropij folio esse ait. Cum autem harum folia multum à sese distent, vt in horum aliquo mendum sit necesse est. Fructum Dioscorides nuci Ponticæ assimilat, Plinius magnitudine nucis Auellanæ esse ait, Theophrastus fructui Capparis & magnitudine & specie similem. Dioscorides scribit interiorem fructus partem tundi, & velut amaras amygdalas humorem reddere, cui assentitur Galenus, scribens carnis eius succo vnguentarios vti. Theophrastus fructus corticibus contusis eisdem vti, fructum esse inutilem: Plinius vnguentarios cortices tantum premere, sed addidit medicos nucleos tundere. Mesues Balani Myrepisicæ fructum alium magnum, alium paruum facit. Magnus, inquit, nucis Auellanæ est magnitudine, triangulus. Paruus verò ciceri similis, malus: vterq; tamen medulla leni & vinctuosa. Magnus est præstantior, præsertim Syriacus. Cortice est albo, læui, tenui, medulla intus alba, leni, pingui. Paruus, si ex nigro albescit, & medulla est alba, leni, pingui, & recens, est innocentior. Nullus verò fructum hunc magis

Li. 12. ca. 27.

Li. 6. simpl.

Li. med.
purg. c. 11.

GLANDIS vnguentariae siliqua cum fructu, Pena.



ad vium expressit, atque Pena, quem & descripsit his ferè verbis. Siliqua est admodum elegans, palum longa, ex carinula bifori compacta, teres, rotunda, gracilis, binisq; loculis ventricosa, nempe ima supremaque sui parte qua protuberat, glandem vnā vtroque loculo claudens: summa verò acuto stilo, rostri instar, mucronem protendit, intus subrufo colore, foris pullo cinereoue, & secundum longitudinem striis rugisq; exarata, coriacea tota, flexilis & corticosa, insipida, subadstringens & sicca. Hæc Pena. Glans vnguentaria, auctore Dioscoride, trita, & drachmæ pondere cum posca sumpta, splenem liquat. Imponitur etiā ipsi cum Lolij farina & aqua mulsā. Podagricis itidem. Cum aceto cocta deterit scabiem, lepram: cum nitro vitiliginēs, & cicatrices nigras. At cum vrina tollit lentiginēs, varos,

Li. 4. c. 154.
Vires.

maculas à sole contractas, faciei exanthemata. Vomitus mouet: aluum cum aqua mulsā soluit. Stomacho multum aduersatur. Oleum quod ex ipsa exprimitur, aluum soluit. Cortex eius magis adstringit. τὸ δὲ ἐκκρίσεως καὶ ἐμβλίσσεως ἀλλή

ἐπιέσμα, id est, interprete Cornario, Quod verò ex ipsa cōtusa & expressa superest retrementum miscetur smegmatis aduersus scabritias, & pruriges idoneis. Alij ἐπιέσμα succum verterunt, verum tusa, inquit, & expressa. Superiorem conuersionem approbat Galenus, qui cū de carnis succo dixisset, subiunxit, ἀπὸ λήμματος ὑπερδύοντος, id est, reliquum quod ab expressione restat, idem quod Dioscoridis ἐπιέσμα. Illius de hac tota re verba sunt. Balanus Myrepfica defertur ex Barbaria regione. Utuntur vnguentarij carnis eius succo, qui facultate calidus est. Reliqua autem, vnde expressus est succus, terrestres, scilicet & duræ, vincentem habent qualitatem amaram. Sed & admista quædam est adstrictio. Quare extergentem simul & incidentem, contrahentemque & stipantem effectum habent. Itaq; ad ionctos, lentes, ephelin, & pruritum, deinde & ad pforam & lepram conueniunt. Verum & lienes liquant, iecurque indurefcens. Quod si quis carnem eius drachmæ pondere cum melicrato bibat, medicamentum experietur vomitorium. Sæpe etiam per inferiora aluum largiùs subducit. Itaque cū hoc medicamento vtimur ad viscerum expurgationem, & maximè iecoris, lienisque, ex oxycrato ipsum exhibemus. Gaudet verò maximè aceto ad actiones externas. Ad eò enim efficax est, vt & pforas & lepras detergeat, & multò etiam magis quæ his sunt minora, lentes, vitiliginem, ionthos, ephelin, exanthemata, achoras, tum vlcerosæ, & quæ crassi sunt lucci omnia. Porro cū illinenda est lieni, præstat admistam esse farinarum quampiam exsiccatam, cuiusmodi est erui & lolij farina. Hæc Galenus. Mesæ Glans Myrepfica maior calfacit initio ordinis tertij, siccat secundo. Humiditatem habet excrementosam & acrem, qua ventriculum subuertit, nauscam excitat, viscera conturbat. Pituitam crassam & lentam vomitu & deiectione purgat: quare confert colico affectui pituitoso, & flatulento sumptus, balano, clystere iniectus, cataplasmate ex ipsius medulla, hordei farina & melle appositus, & calore suo neruorum frigidis affectibus, spasmo, tetano, contractioni. Tumores quoque dueros, strumas, nodos resoluit cum melle. Hepati autem aut lieni obstructo, vel durato cū farina lupinorum, & spica confert imposita. Ad hæc autem Glans minor, & eius oleum efficacius admouentur. Idem etiam auribus infusum tinnitui, sibilo, surditati auxiliatur: cicatrices fœdas, lentigines, alphas, & cætera cutis vitia emendat. Incidit enim, tenuat, terget, expurgat, aperit obstructa. Parua Glans ad omnia est efficacior, molestè purgat, vires deiecit, sudorèmq; frigidum mouet. Ob id non vtenda etiam oleo, nisi emplastro, vntione, cataplasmate. Glans ne ventriculo noceat, facit assatio. Ea enim humiditatem excrementosam & acrem horum symptomatum causam coquit, & resoluit: tuncque solum deiectione purgat. Adicitur præterea ipsi, præsertim coquendo, semen anisi & sceniculi. Hodie Officinis & Myropoliis, tum ad valetudinem, tum ad voluptatem ex Glande vnguentaria oleum exprimitur, vt nullo odore iucundum, ita nullo rancore, aut fœtore vnquam veterascens. Quare ad quamlibet odoris suauitatem ac vim, vt moschi, zibetti, ambari integram, ac vegetam tuendam, omnium oleorum id vnum aptissimum est, nullamque labem, aut sordem chirothecis, ad vestibus illinit.

Temper.
Vires.

MYRO

RECTVS cathartici, de quibus hîc agimus, veteribus. Græcis Latinisque fuere incogniti, præterquam ex recentioribus. Græcis Actuario, ab Arabibus irauenti; & ad leuiores purgationes frequenter vsurpati, qui omnes generis nomine Auicennæ Delegi, siue Delegi dicuntur, & Serapioni Hatilig. Tamen si librariorum vitio Hatilig pro Delegi corruptè legi putat Garcias Histo. Aromat. Ind. auctor, quod omnes Medici Arabes illi affirmarint Myrobalanos omnes Delegi nuncupari. Has cum viderent interpretes quodammodo ad glandis formam accedere, improprie Myrobalanos verterunt, cum pruna, quibus similia sunt, melius vertissent. Ad hæc cum Myrobalani vox Balanum myrepicam significet, id est, glandem vnguentariam, perperam istis fructibus nomen id inditum, quod vnguentis apti non sint. Sunt in vniuersum quinque earum genera: flauæ seu luteæ, seu citrinæ, *Azfar* Arabibus dictæ. Indicæ siue nigrae, *Afsar*. Quebulæ, *Quebulgi*. Bellericæ, *Belleregi*; & Emblicæ, *Embelgi*. Emblicæ Seniticæ sunt Auicennæ, minutæ, & leuiores. Quod docet Serapio his verbis. Myrobalani de Seni sunt ex speciebus Myrobalanorum: habent corticem subtilem, quæ nota Emblicis conuenit. Mesues Myrobalanos citreas, nigras, cepulæ eiusdem arboris fructus esse quibusdam videri ait, vt immaturi sint citreæ, maturi nigrae. Cumq; arbor his auctoribus sit bifera, primi partus sunt citreæ & nigre, secundi verò cepulæ: aliis diuersarum arborum fructus videri, idq; credi, quod eorum facultates & opera variant. Id confirmat Garcias auctor Histo. Aromat. Indic. Falluntur, inquit, tam ij qui omnia Myrobalanorum genera in eadem arbore nasci putant, quàm qui flaua & cepula tantum. Nam quinque sunt diuersa arborum genera, & quod magis mireris, in regionibus sexaginta, aut centum leucis à sese distantibus nascuntur. Nonnulla in Goa & Batecala, alia in Malanor & Dabul. In toto regno Cambay quatuor earum genera inueniuntur. Kebula verò in Bisnager, Decam, Guzarate, & Bengala. Ceterum, quæ in Lusitaniam deportantur, magna ex parte collectæ sunt in regione, quæ est inter Dabul & Cambaya. Nam experientia compertum habemus, eos fructus, quos regio Septentrioni vicinior producit, minùs putredini obnoxios esse. Inuenio autem, inquit Garcias, apud eos hæc Myrobalanorum genera, quorum vsus est in purgationibus leuibus, & sine molestia. Primum, quod rotundum est, & bilem purgat, indigenæ Arare vocant, Medici, Aritiqui: nobis sunt flauæ. Alterum genus, incolis Rezenuale: nostræ sunt Indicæ, siue nigrae. Tertium genus, Gotim incolis nuncupatum, rotundum: nobis Bellericæ. Chepulæ verò nostræ, quæ pituitam purgant, illis Aretca appellantur. Hæc sunt quatuor Myrobalanorum genera, quæ illis sunt in vsu medico. Nam quinto genere Anuale iis nuncupato, nobis Emblicodicto (tamen si apud eos reperiat) non vtuntur nisi in densandis coriis rhois coriariorū vice, & atramento conficiendo. Sunt tamen etiam nonnulli, qui iis viridibus vescuntur excitandæ appetentiæ causâ. Porro Flauæ teretes sunt: arbor Sorbi folia profert. Emblicæ arbor foliis est minutim incis, Palmæ magnitudine. Inda Myrobalanus octogona est. Arbori folia Salicis similia. Bellericæ arbor foliis est Lauri, sed pallidioribus, & subcinericiis. Chebulæ magnæ sunt, & rotundæ, oblongiores tamen, cum ad perfectam maturitatem peruenerunt, & angulosæ. Arboris folia Persicæ similia. Sunt autem singulæ arbores Pruni magnitudine, omnesque siluestres, & sponte nascentes, non domesticæ. Cum autem gustu sint adstringente & acido, sorborum immaturorum modo, ex frigidorum & exsiccantium classe esse dixerim. Præparationis modus apud Indos non inualuit. Vtpote qui iis non vtantur purgationis, sed adstrictionis tantum gratia. Nam si purgari velint, eorū decocto vtuntur, si uires.

Li. 2. c. 47.

Nomina.

Lib. 1. c. 7.

Genera.

Cap. 107. simpl.

Lib. 1. c. 17.

Forma.

Temper.

Vfus & Vires.

MYROBALANI.

*Myr.india,**Myr.flaua,**Myr.bellerica,**Myr.emblica,**Myr.chepula,*

Li. s. meth.

MYROBALANI EMBLICÆ.



& maiori dose quàm nos in Europa. Solent autem iis saccharo conditis vti, magno successu. Chebulorum autem maior est gloria. Condiuntur in Bisnager, Bengala, & Cambaya, flauæ: Indicæ in Batecala, & Bengala. Ex iis, quod iubere soleo, immaturis stillatitius liquor organis elicitur, quem post sumptam aliquâ cōferuam adstringentem propino, & syrupo admisceo si quando opus est. Flauas & Bellericas præscribere soleo initio mensis, iis qui alui profluuiio, aut stomachi relaxatione laborant: talibus enim cōuenit huiuscemodi cibus propter adstrictionem cum pauca aciditate coniunctâ. Præterea immaturorum succum in alui profluuiis admodum efficacem esse expertus sum. Hactenus Garcias in Aromat. Indicorum Historia. Actuarius de iis ita scripsit. Inter ea, quæ perquam modicè purgant, fructus quidam noti & lignosi censentur, qui è Syria & Ægypto ad nos deferuntur: quorum alij Lutei, alij Chepula, alij Migri nominantur, omnes communi nomine Myrobalana nuncupati. Duæ

aut tres eorum drachmæ læuigatæ purgandi vim obtinent, & priuatim superuacuum capitis humorem exhauriunt. At Lutei bilem flauam euacuant, pituitam Cepulæ, atram bilem Nigræ. Cæterum ventriculorum, ac intestina sua adstrictione confirmant, roborantq;. Torrefactæ Myrobalani ablutæq; plurimum vis purgatoriae exuunt, sed tenuiorum partium euadunt, exsiccantq; magis. Quare quibus defluxio ad inferiora procumbens molesta est, & intestina vlcera, hæc assumimus, quæ modicè humorem defluentem subducunt, & notatu dignum robur intestinis conciliant. Eandem & consimilem facultatē obtinet, quod Empeliliz, & quod Emplitzi barbara voce appellatur. Hæc Actuarius. Duo potissimum Myrobalanorum genera condita ad nos deferuntur. Primum, Kebula siue Chepula, quæ pluris sit, omnium maxima, oblonga, pusilli Limonij, aut Persici effigie, compacta, callosa, nigraq; carne, sapore iuglandis conditæ. Alterum Bellerica minor, rotundior, tenerior edendo. Bellerico citrina similia facie, cute, nucleo oblongo & pulpa, sed fulua, vnde nomen. Inda nigra est, notissima de colore, nuclei expers, callo penè lapideo Hanc concolorem melancholicum humorem aptius educere putant. Postremo Emblica, potius fragmenta, quàm integra pruna, quadantenus triangula, Bellericis minora. Myrobalani, inquit Mesues, medicamenta sunt benigna. Tantū enim abest vt purgando vires deiciant, vt etiā cor, vtriculum, hepar, corpusq; reliquū cōfirmant, cogēdoq; in vnum roborēt: quare vnica his incommodant, qui sunt obstructionibus obnoxij, has enim excitāt. Præterea medicamentis acerbis, & purgādo exoluētibus, vt Scammonio, perfectè corrigēdis rectè miscētur: sed huic præsertim citrinæ sunt miscēdæ. Id enim cōtraria tum substantia, tum qualitate frangit, & purgationem iuuat. Hæc & multò plura lege apud Mesuem de Myrobalanis. Omnium effigies hac pictura expresseit Lobellius, qui de Emblicis & Bellericis hæc literis mādauit. Emblicæ parū refrigerāt, siccāt ordine primo, pituita etiam putri vtriculum purgāt, eumq; & cerebrū, neruos, cor, hepar, & partes laxas cōstringendo roborāt: ob id tremori cordis cōferunt, appetentiam inuitāt, vomitum sistunt, furem & latratus bilis cohibent, vim animæ rationalem

rationalem augment, calorem viscerum insigniorem, & inde natam sitim extinguunt. Præstantiores sunt magnæ, carnis multæ, densæ, graues, ossium paruorum. Largiùs purgant, & rugis ventriculi minùs incommo-
 dant, si aqua in sole mace-
 rentur, donec humectatæ tumescant: postea expressæ multâ biduo macerantur,
 igni lento coquantur: ubi coctæ refrigerint, mellis albissimi parte quarta exceptæ
 reconduntur. Aromatibus, Cinnamomo, Xyloaloe, Cardamomo, Croco, Gallia, &
 similibus nonnulli condiunt. Bellericæ etiam sunt benignæ, & roborant: frigidæ
 primo gradu, siccæ secundo, cætera Emblicis viribus proximæ. Optimæ sunt ma-
 gnæ, multa & densa carne, graues. Hæc Lobellius.

TAMARINDI.

CAP. XXVI.



EXVE ac Myrobalani veteribus Græcis incogniti fuere Tamarindi
 ab Arabib⁹ nominati, id est, Daçtyli Indi, siue Palmulæ Indicæ: Tamar
 enim illis daçtylum significat. Sed vt Myrobalanos, ita Tamarindos
 minùs aptè illi vocarunt: quoniam eorum arbor Palmæ similis non
 est, nec ex Palmarum generibus, vt dicitur, nisi ad effigiem fructus respexerint,
 quæ daçtylum siue digitum inflexum refert. Garcias in Aromat. Indicorum Hi-
 storia tradit in Malaya Puli, in Guzarate Ambili nuncupari, eoque nomine reli-
 quis Indiæ prouinciis notos esse. Arbor est, inquit, Fraxini, aut Iuglâdis, aut Casta-
 næ amplitudine, materis firma, non fungosa: ramis foliis multis ornatis, & minu-
 tim incisfis, palmi magnitudine: fructu in arcus aut digiti incurui figuram effor-
 mato. Huius immaturi cortex virescit, siccatus verò cinereus est, & facillè auellitur:
 nucleos intus continet satiuorum lupinorum magnitudine, quodammodo rotun-
 dos, sed planos, colore furuos, læues, quibus abiectis pulpæ vsus est, quæ lenta est,
 & viscida. Illud verò mirum & obseruatione dignum tradit, quòd hic fructus in
 arbore adhuc pendens, noctu foliis sese inuoluat vitandi frigoris causa, inter-
 diu verò sese expediat, & è medio foliorum emergat. Acidus est dum virescit, ea ta-
 men aciditas suauitate non caret. Nascuntur Tamarindi multis Indiæ locis, in-
 quit idem Garcias. Sed qui locis montosis, & ad Septentrionem versis proue-
 niunt, præferuntur, & diutius incorrupti manent: quales sunt quos Cambaiete
 & Guzarate gignit. Idem Mesuen reprehendit quòd Tamarindos fecerit Palmæ
 siluestris Indicæ fructum, cum tota India Palmas non reperias, sed eò deferuntur
 Palmæ fructus ex Arabia magna quantitate, edunturque siccæ, atque etiam in
 massam compressæ, abiectis ossibus. Garcias vidisse se ait in Cambaya & Guzarate
 siluestre quoddam Palmæ genus, sed sterile, & longè diuersum à Tamarindifera
 arbore. Idem Serapionem etiam redarguit, quòd scripserit ex auctoritate Abo-
 hanifa Tamarindos in Cæsarea Aman prouenire: nullos enim in Cæsarea Aman,
 quæ est Syria, prouenire certū esse ait Garcias, cum à negotiatoribus ex India de-
 ferantur. Nonnulli, inquit ille, Tamarindos à saporis aciditate Oxyphœnicem
 vocant, quorum sententiam nec probo, nec improbo. Sed quod Lacuna Com-
 mentariis in Dioscoridem lib. 1. cap. 126. à Thebaicis palmulis non differre scribit,
 minimè probo, quemadmodum nec quod eius arborem Palmæ siluestris genus
 facit, foliis oblongis, & per extremum acutis. Tamarindorum iconem hîc positam
 Lobellio debemus. Quare quæ de iis etiam prodidit subiungenda. Tamarindo-
 rum semina recentia, inquit, Cassiæ quadantenus similia, sed maiora & angulosa
 quadrati pisi ritu, compressiora tamen è siliquis carnosiss, & multis fibrarum cir-
 ris implexis quàm Phaseli nostratis maioribus, quales in instructissimis Officinis
 Antuerpiæ prostant (minimè è palmulis, aut eius generis fructibus, vt multi cre-
 didere qui non viderunt) in horro sata G. Driesch, nobis perelegantes arbusculas

Nomina

Lib. 1. c. 28.

Forma

Locus

Cap. 348.
simpl.

TAMARINDI folia, fructus, semina, *Oxyphanicum* perperam creditum, Lobellij.

Lib. purg.
cap. 7.
Vires &
Temper.



successu, quàm si syrupo acetoso vteretur: ægros eorum infusione purgare, vt Tamarindorū vnciæ quatuor aqua frigida, aut stillatitia intybi macerentur tribus horis, facta expressione eximantur, & modico saccharo inspergantur. Euacuant biliosum humorem pituitam incidunt, & attenuant. Indos sine molestia iis sese purgare cum oleo nucis Indicæ sumptis: medicos verò folia trita partibus erysipelate affectis imponere.

EUPHORBIVM, ANTEVPHORBIVM. CAP. XXVI.

Nomina

Lib. 3. c. 30.

Forma.

Lib. 3. c. 1.



ΕΥΦΟΡΒΙΟΝ Græcis, Latinis etiam Euphorbium nominatur, Arabibus *Euforbium* & *Forbium*, Italis *Euforbio*, Hispanis *Alforuian*, Gallicis *Euforbe*. Plinius herbam Euphorbiam nominavit, eius succum Euphorbium. Euphorbium, auctore Dioscoride, arbor est Libya, Ferulæ speciei, quæ in monte Atlante iuxta Mauritaniam nascitur, succo referta acerrimo, quem timentes incolæ ob eximium eius feruorem, ventres ouillos elotos arbori circumligant, & eminus caulem contis incidunt, statimque velut ex vase quodam multus succus in ventriculos effunditur, sed ex vulnere etiam humi spargitur. Sunt autem duo succi genera, vnum pellucidum velut sarcocolla, magnitudine erui: alterum in ventriculis vitreum, & compactum. Eligendum est translucens, & acre. Adulteratur sarcocolla & glutine admixtis. Sed non difficile experimentum gustu sumptum, quia vellicata semel lingua feruor diutius permanet, vt quicquid offeratur Euphorbium esse putetur. Eius inuentio tempore Iubæ Regis Libyæ cognita fuit. Eius rei locis aliquot meminit Plinius. Iuba Prolemæi pater, qui primus vtrique Mauritanix imperavit, studiorum claritate memorabilior etiam quàm regno, similia prodidit de Atlante: præterque gigni ibi herbam Euphorbiam nomine, ab inuentore medico suo appellatam, Cuius lateum

æteum succum miris laudibus celebrat in claritate visus, contraque serpentes & venena omnia priuatim dicato volumine. Et Euphorbiam è monte Atlante, vltraque Herculis columnas, in ipso rerum naturæ defectu. Et rursus, Inuenit & patrum nostrorum ætate Rex Iuba quam appellauit Euphorbiam, medici sui nomine & fratris Musæ, à quo D. Augustum conseruatum indicauimus. Sed Iubæ volumen quoque extat de ea herba, & clarum præconium. Inuenit eam in monte Atlante: spectatur foliis achantinis (Lege ex veteri codice & Dioscoride, specie Ferula, foliis, &c.) Vis tanta est, vt è longinquo succus excipiat: incisæ conto subditur excipulum ventriculo hædino. Humor lactis videtur effluere, siccatus, cum coit thuris effigiem habet. Qui colligunt clariùs vident. Contra serpentes medetur, quacunque parte percussa, vertice inciso, & medicamento addito. Hæc Plinius. Ex quibus perspicuum est deprauatè in Dioscoride legi, ἐν τῷ πινάκῳ Mauritaniæ, cum Tmolus mons sit Lydiæ in Asia minori, rectèque Ruellium Atlantem legisse ex Plinio. Euphorbium plantam

Lib. 27.
prodr.
Lib. 25. c. 7.

In purgan.
Histo.

EUPHORBIVM,
Dodonæi.



qui representari, nullus adhuc extitit, quod sciam, præter Dodonæum, ex quo hanc expressimus. Natum fuisse scribit anno 1570. Bruxellæ in horto Io. Boissot viri generosissimi & doctissimi, à quo vnum terræ commissum folium in plura multiplicatum est, & radicem demisit in obliquos ramulos diuicicatam. Ioannes Leo in Africæ historia, ex vno solo, vt ipse nominat, fructu, vigintiquinque, aut triginta quandoque, provenire scribit, è quibus maturis & vulneratis succus effluit lacti similis, qui lentorem contrahens concrefcit, & colligitur. Euphorbium istud, vt describit Dodonæus, folia habet oblonga, crassa, virentia, in rotunda ac terete figura angulosâ. Cucumerem satium referrent, si non anguli eminentiores, & albicantibus spinis plurimis duplici ferè ordine obsiderentur. Effluit ex his vulneratis liquor vehementer acris, & mordax, facîle concrefcens. Succus illitus, auctore Dioscoride, vim habet suffusiones discutiendi: potius tota die exurit: quare melli collyriisque pro acrimoniæ ratione admiscetur. Coxendicum doloribus prædest in odorifera potione haustus. Squamas ossium eadem die eximit: verum eo vrentes oportet linamentis aut ceratis communire carnem ossibus circumsitam. Narrant quidam percussos à serpentibus nihil mali passuros, si incisâ ossæ tenus capitis cute, intritus succus infundatur, & postea vulnus consuatur. Euphorbium, inquit Galenus, causticæ siue vrentis & tenuium partium facultatis est, perinde ac alij multi succi. In his neque alibi, quod legerim, Dioscorides, neque Galenus purgatricis facultatis Euphorbij meminere, quam Plinius non omisit. Vettonica soluit aluum, &c. Item Euphorbium, vel Agaricum drachmis duabus cum sale modico potum ex aqua, aut in mullâ obolis tribus. Fusiùs eam explicarunt Aëtius & Actuarius. Euphorbium, inquit, pituitam, sed potius aquas subducit: est autem acutissimum, & maxima ignea vi præditum. Quapropter colicis, & quibus venter frigidior est, exhibetur: aënos vehementer conturbat, sitimque maximè mouet. Quidpiam ex odoratis seminibus ei permiscetur, & trium obolorum pondere ex aqua mullâ præbetur:

Lib. 9.

Vires.
Lib. 3. c. 30.

Lib. 6. sim.

Lib. 26. c. 8.

sed

Lib purg.
cap. 10.

sed præstat vt cum melle cocto in cataportia formetur. Mefues hanc & alias eius facultates recenſet his ferè verbis. Euphorbium igneum eſt, calidum ſiccum ordine quarto, omnium lacrymarum calidiſſimum, tenuiſſimum. Vrit, ruborem excitat, vlcerat, penetrat, terget. Tam valenter agit, vt præ anguſtia & labore ſyncope & ſudorem frigidum accerſat. Purgat autem præter cætera pituitam craſſam & lentam, quantumvis impactam, etiam à neruis & iuncturis remotis, & profundis, ſumptum, ſed correctum. Idem ex oleo Leucoij lutei ſolutum affectibus neruorum frigidis, paralyſi, ſtupori, tremori, ſpaſmo, ſpaſmo cynico, nodis, illitu mirè conducit. Hepatis quoque & lienis tumoribus, & dolori ab intemperie frigida, & flatu, & ei, qui per iuncturas & partes alias turget, occurrit. Pulvis eius ex aceto alphas valenter affrictus delet: idem ſternutamentum valentiſſimè ciet. Cum oleo de ſpica illitum occipiti, lethargicæ obliuioni prodeſt, aquas quoque vacuat. Ventriculo & hepati nocet ſua actionis vehementia: ob id minùs tenuiter eſt terendum, & miſcendum acrimoniam obtundentibus, calorem flammeum extinguentibus, lubricantibus, & horum omnium tanta copia, vt ſuperficies eius vndiquaque tegatur. Hæc Mefues. Sed difficile eſt Euphorbium, inquit Dodonæus, aliis ita vel inuoluerre, vel permiscere, vt non vrendi vim exerat. Nam & plurimo contemperatum oleo foris inunctum veſicas excitat, præſertim in corporibus mollioribus: quare tutius eſt intrò in corpus non admittere. Tunditur etiam non ſine moleſtia, niſi naribus diligenter obturatis ac munitis. Si quando enim acrimonia ad nares peruenerit, mox pruriginem, ſternutamentumque excitat, deinde ardore ſummo copioſam pituitam ac muccum, tandem verò & ſanguinè elicit non ſine perpetuis lacrymis. Aduerſus hanc Euphorbij acrimoniam indigenis remedio fertur eſſe herba, quæ ab effectu, & contrariis Euphorbio facultatibus Anteuphorbij nomen accepit. Hæc cauliculos emittit multos, rotundos, virentes, atque circa eos folia, qualia Portulacæ. Radix multas habet propagines. Succo quoque prægnans eſt, ſed nequaquam acri, verum lento & refrigerante, ardorem & acrimoniam Euphorbij retundere. Creuiſſe ait Dodonæus etiam in horto Boiſſoti, eodè quo Euphorbium anno, atque vna cum eodem periſſe. An veteres de ea herba literis aliquid mandarint, nondum compertum. Videtur tamen Dodonæo ad Telephij ſpecies referri poſſe.

ANTEUPHORBIVM,
Dodonai.



Forma.

Vires.

niam Euphorbij retundere. Creuiſſe ait Dodonæus etiam in horto Boiſſoti, eodè quo Euphorbium anno, atque vna cum eodem periſſe. An veteres de ea herba literis aliquid mandarint, nondum compertum. Videtur tamen Dodonæo ad Telephij ſpecies referri poſſe.

ALOE.

CAP. XXVIII.

Nomina

MEDICAMENTORVM omnium vulgatiſſimum & præſtantiſſimum eſt, quod αλὸη, tam herba quàm ſuccus eius Græcis dicitur, Latinis Aloë, Officinis Aloës, Gallis Aloë & l'herbe du Perroquet, à foliorum virore. Quia verò Aloë in maritimis naſci proditur, non abs re quis ſuſpicetur, inquit Pena, nomen illi factum à ſale, vel ſalo ſiue mari, cuius afflatu imprimis gaudet, fortè itidem & nonnihil ſalſedinis foris continet, vt cæteræ maritimæ.

ritimæ. Sunt etiam qui à crassis foliis, & similitudine, quã cum Semperuiuo habet, Semperuium marinum nominent: Dodonæus Semperuium amarum Columellæ. Græcorum quoque vulgus Aizoon hodie vocat, quia semper viret: Arabes, Persæ, Turci, teste García in Aromat. Indicorum Historia, *Cebat*. Nam quòd *Laber* à Serapione vocatur (codex meus habet, *Saber*) interpretis errore, aut librariorum negligentia factum fuisse existimat.

ALOË, Matthioli.



ALOË cum floribus, Matth.



Siquidem Arabicum exemplar *Cebat* habet, inquit: Guzarate verò & Decan incolæ *Areaa*, Canarini, qui maritimum hunc tractum habitant, *Catecomer*, Hispani *Acibar*, Lusitani *Azeure* appellant. Scillæ foliū habet Aloë, vt describit Dioscorides, crassum, pingue, modicè latum, rotundum, repandumq;: $\pi\alpha\rho' \epsilon\chi\acute{o}\lambda\epsilon\pi\alpha \delta\iota\epsilon \tau\acute{o} \mu\epsilon\rho\eta \epsilon\chi\epsilon\iota \epsilon\kappa \omega\lambda\alpha\gamma\acute{\iota}\omega\nu \acute{\alpha}\kappa\acute{\alpha}\nu\theta\eta\alpha \acute{\alpha}\rho\alpha\iota\omega\varsigma \epsilon\acute{\xi}\epsilon\chi\omicron\nu\tau\alpha, \kappa\omicron\lambda\omicron\varsigma\alpha$: id est, ab vtraque parte habet ex obliquo spinulas rariùs eminentes, mutilas. Alij legunt, $\pi\alpha\rho' \epsilon\chi\acute{o}\lambda\epsilon\pi\alpha \delta\iota\epsilon \tau\acute{o} \mu\epsilon\rho\eta \epsilon\chi\epsilon\iota \tau\acute{o} \phi\acute{\upsilon}\lambda\lambda\omicron\varsigma \epsilon\kappa \omega\lambda\alpha\gamma\acute{\iota}\omega\nu \acute{\alpha}\kappa\acute{\alpha}\nu\theta\eta\omega\delta\eta, \acute{\alpha}\rho\alpha\iota\omega\varsigma \epsilon\acute{\xi}\epsilon\chi\omicron\nu\tau\alpha, \kappa\omicron\lambda\omicron\varsigma\alpha$: id est, interprete Lacuna, folia ex obliquo vtrinque in spinas quasdã retusas longioribusq; interuallis dispositas desinunt. Vel, vt vertit Fuchsius, folia, vtrinq; gerunt ex obliquis aculeos raros & breues. Quæ Ruellius obscuriùs & ex Plinij potiùs quàm ex Dioscoridis sensu conuertit, folia vtrinque ex obliquo longioribus interuallis striantur, & in spinulas desinunt retusas truncasque. Quomodo autem Aloës folia striata dici possint, mox dicemus. Caulem profert Antherico similem, florem album, semen Asphodelo simile. Grani est tota herba odore, & gustu amarißima, radice vna pali in terrã adacti specie. Nascitur copiosissima

Lib. 3. c. 22.
Forma.

Locus.

in India, præpinguis, vnde succus quoque defer tur. Prouenit etiam in Arabia, Asiâque, & in maritimis aliquot locis, ac insulis, velut in Andro, succo extrahendo non valde idonea, sed ad glutinanda vulnera utilis, si trita illis imponatur. Hæc ex Dioscoride. Hodie plerisque Europæ locis in hortis pensilibus feliciter, non secùs ac suis natalibus in sabuleto depacta adolescit florétque. Scribit Garcias in Aromat. Indicorum Historia, Aloën plurimam nasci in Cambaya, Bengala, aliisq; multis locis. Caterùm laudatissimam esse in Socotora, quæ inde ad Arabes Persas, Turcos, deniq; per vniuersam Europam deferitur, eamque ob causam Aloën Socotorinam appellari. Distare autem Socotoram insulam à freto maris Erythræi 128. leucis: quare non minùs Arabicam quàm Aethiopicam dici posse, quòd altera parte freti Arabia terminetur, altera Aethiopia. Nec verò succum ex Aloë ex-

Lib. 2. c. 22.

trahi

In cap. 23.
lib. 3. Diosc.

trahi in quadam duntaxat Socotoræ vrbe, vt scribit Andr. Lacuna, sed per totam insulam, quæ nullis vrbibus exulta est, verum pagos duntaxat habet cum multis gregibus: neque laterculis ad excipiendum succum subterni pauimentum, vt idem auctor est. Esse autem Socotorinam laudatissimam, non solum vulgari fama, sed etiam à celebribus viris se accepisse asserit. Quin compertum se habere ait, Aloën quidem plerisque aliis Indiæ locis nasci, quæ cum Socotorina deferatur Adem, & Gida, inde terrestri itinere Cairum, postea Alexandriam: vel Ormus, deinde Basora, postea Cairum & Alexandriam: facile tamen dignosci Socotorinam ab ea, quæ in Cambaya, Bengala, aliisque locis aduehitur, Socotorinæq; quadruplo maius esse quam eius quæ aliunde adfertur pretium. Inter reliquas autem notas Socotorinam commendari, quod solida sit, & bene compacta: alterius verò partes non posse perfecte coire, quod succus ex diuersis plâtis collectus sit. Quod verò Dioscorides & Plinius scribunt laudatissimam ex India deferri, alij ex Alexandria aut Arabia, non simpliciter id intelligendum est, sed de ea quæ ex Socotora primum in Indiam delata est. Alexandrinam autem quidam præferunt, quod superioribus annis pleraque aromata Ormus deferretur, deinde Basora, Adem, Gida, inde camelis Suez, quæ in extremo maris Erythræi sita est, & Alexandriam ad Nili ostiū, vnde Veneri petentes ea reliquæ Europæ communicabant: non autem quod in Alexandria fiat Aloë. Nascitur verò nõ modò in maritimis, sed etiam desertis Indiæ locis: eam enim se vbique vidisse ducentarum leucarum itinere terrestri per eas solitudines cõfecto. Hæc tradidit Garcias. Ex quibus intelligere licet quænam sit hodie Aloë Sucotrina, & vnde dicta, cui primum locum statuit Mesues, & alij, secundum Hepaticæ seu Persicæ, tertium Armeniæ, quartum Arabicæ. Extat &

Lib. 27. c. 4.

apud Plinium Aloës descriptio, sed breuior, præter hanc alia quædam habens, quæ apud Dioscoridẽ nõ leguntur. Aloë Scillæ similitudinẽ habet, maior, & pinguioribus foliis, ex obliquo striata. Caulis eius tener, rubens medius, non dissimilis Antherico: radice vna, seu palo in terram demissa, graui odore, gustu amara. Laudatissima ex India affertur, sed nascitur & in Asia: non tamen ea vtuntur, nisi ad vulnera recentibus foliis: mirifice enim conglutinat, vel succo. Ob id in turbinibus cadorum eam ferunt, vt Aizoon maius. Quidam & caulem ante maturitatem seminis incidunt succi gratia, aliqui & folia. Inuenitur & per se lacryma adhærens. Ergo pauimentandum vbi sata sit censent vt lacryma non absorbeat. Fuere qui traderent in Iudæa supra Hierosolymam metallicam eius naturam: sed nulla magis improba est, aut humidior. Erit ergo optima, pinguis ac nitida, rufi coloris, friabilis, ac iocinoris modo coacta, facile liquefscens. Improbanda nigra & dura, arena sa quoque, quæ & gustu intelligitur. Gummi adulteratur & acacia. Quod Dioscorides dixit Aloën folio esse Scillæ simili, crasso, pingui, modicè lato, rotundo, retrorsus pando, ex vtraque parte, non anteriore aut posteriore, sed à lateribus spinulas habere rariùs extantes, & mutilas. Plinius obscuriùs dicit Aloën Scillæ similitudinem habere, maiorem, & pinguioribus foliis, ex obliquo striatam, id est, lateribus ex obliquo laciniatis, & veluti striatis cum spinularum eminentiis: alioqui Aloës folia neque parte aduersa, neque auersa sunt striata, neque in canaliculos excauata, vt autopsia ipsa demonstrat. In Aloë inueniri lacrymam per se adhærentem Plinius ait, Garcias in Aromat. Indicorum historia scripsit nullum eius inueniri gummi certum esse, sed interdum aquam quandam viscidam è foliis stillare, at neglectam & nullius vsus. Idem miratur Plinium tradidisse Aloën metallicam supra Hierosolymam inueniri, qui non solum Medicos Iudæos, verum etiã pharmacopœos qui Hierosolymorum incolas se esse assebant, diligenter interrogarit de hoc Plinij loco. Sed illi constanter negabant vnquam fuisse repertam huiusmodi Aloën in tota Palæstina. At Plinius id non affirmat, verum fuisse inquit, qui id traderent.

Lib. 1. c. 2.

Sed & Dioscorides in præfatione totius operis falsum esse asserit quod Niger dixerit Aloën fossilem (metallicam Plinius dixit) in Iudæa nasci. Probat Dioscorides Aloën *ἡπατική*, id est, hepatis speciem præferentem. Plinius iocinoris modo coactam dixit. Deinde adulterari gummi & acacia, quod & Dioscorides ait. Adulterant ipsam gummi, quod deprehenditur gustu, & amaritudine, & odore valido, & quod non dissoluitur ad minimum vsque frustum, dum digitis friatur. Quidam etiam acaciam admiscent. Hac in re iis auctoribus fidem adhibendam non esse censet Garcias, quod exigua sit iis in regionibus gummi & acaciæ copia, imò nulla, quemadmodum à viris fide dignis accepit. Præterea cum nimia sit illic Aloës quantitas, non adulteratur, sed quia negligentiores sunt incolæ in tollendis fordibus, quas hic succus secum trahit, aliàs alia purior, aliàs impurior videtur. Illud verò non negat, quin in alias regiones translata, illic adulterari possit. Dioscorides herbam Aloën gustanti amarissimam esse scripsit, Plinius gustu amaram. Anton. Musa negat amaram esse, Pena nostræ insignem amarorem non inesse ait, ne quidem recenti ex Hispaniis in Flandriam Angliamque delatæ, ubi tamen Aloë factitari dicitur. Quinetiam succum nondum solibus percoctum, ut brumæ tempore, minimum amarum esse, idque cæteris multo aqueo succo permixtis euenire, ut ignauius multo per initia sapiant, deinde maturitatem adepta, perfectioris saporis formam acquirant. Sic lactuca menstrua dulcis est, trimestris cum florem & semen profert amara. Portulaca fatua initio, adulta acida. At Garcias Aloën herbam non amaram gustu deprehendi miratur: nam sæpe degustatam admodum amaram se gustasse asserit: quòque vicinior pars erat radici, eo amariorem illi visam fuisse, extrema autem folia amarore carere visa. Huius diuersitatis causa est cælum solumque: iis enim feruidioribus herba eiusque succus perfectius excoquantur, & saporem suum, id est, amarorem contrahunt, quod non nisi tempore euenit eidem herbæ succoque in aliis regionibus minus calidis prouenientibus. Aloës herbæ succi duo genera tradit Dioscorides. Vnum arenosum, quod purissimæ fax esse videtur. Alterum quod iocinoris speciem præferet. Nec sunt audiendi, inquit Garcias, qui succum ex superiori parte plantæ profluentem eo, qui media aut infima parte profluat, præstantiorem putant: nam omnis succus bonus est, & arena caret, si adhibita diligentia extrahatur. Hodie Sucotrinam Officinæ vocant, cui prima laus. Eius singulas libras ducato emunt Venetiis, si limpidæ & lucida sit, ex rubro flauescens. Quæ verò Officinis hepatica dicitur, vbiuis infimi pretij est, arenosa verò & purioris fax, iisdem Caballina vocatur. Nunc de Aloës facultatibus tum ex veteribus, tum ex recentioribus dicendum. Aloë, id est, herbæ succus, vim habet adstringentem, auctore Dioscoride, somniferam (*ὑπνῶσις* & *ἰσχυρὸν* quidam codices Græci non habent) siccantem, densantem corpora, aluum soluentem. Stomachum expurgat duorum cochleariorum mensura pota in aqua frigida, aut tepida. Sanguinis reiectiones cohibet, & morbum regium purgat trium obolorum aut drachmæ vnius pondere pota cum aqua. Deuorata cum resina, aut cum aqua, aut melle decocto excepta, aluum soluit. At trium drachmarum pondere sumpta, perfecte purgat. Mixta aliis purgatoriis medicamentis, stomacho minus noxia ea reddit. Siccata & inspersa vulnera glutinat, & vlcera ad cicatricem perducit, compescitque. Priuatim verò exulceratis genitalibus medetur, & rupta infantium præputia agglutinat (*ἐπαγώγια πάλιν* præputia vocat, eo quod glandi inducantur.) Condylomata rimasque sedis cum passo sanat (Alij codices habent *συνγλυκτέθινον*, id est, cum dulci vino.) Sanguinis eruptiones ex hæmorrhoidibus factas sistit: & digitorum reduuias ad cicatricem perducit. Liuios & fugillata cum melle delet. Lippitudines scabras, & angulorum in oculis pruriginis lenit. Dolorum capitis sedat, temporibus & fronti ex aceto cum rosaceo inuncta. Capillos

In Ex^{am}.
simpl.

Lib. 3. c. 22.

Vires &
Temper.
Lib. 3. c. 12.

Lib. 27. f. 4

Lib. 6. sum.

fluentes cum vino compescit. Tonfillis, gingivis, & omnibus in ore affectionibus ex vino & melle prodest. Ad ocularia medicamenta torretur in testa pura ac candente liguâque subinde versatur, donec æqualiter torreatur. Lauatur, vt quod est arenosissimum subsidat velut inutile, & leue ac pinguißimum assumatur. Plinius eadem ferè tradit. Natura eius spissare, densare, & leuiter calefacere. Vfus in multis, sed principalis aluum soluere, cum penè sola medicamentorum quæ id præstent confirmet etiam stomachum, adeò non infestet vlla vi contraria. Bibitur drachma: ad stomachi verò dissolutionem, in duobus ciathis aquæ tepidæ, vel frigidæ, cochlearis mensura, bis terte in die ex interuallis, vt res exigit. Purgationis etiam causa plurimum tribus drachmis. Efficacior, si pota ea sumatur cibus. Capillum fluentem continet cum vino austero, capite in Sole contra capillum puncto. Dolorem capitis sedat temporibus & fronti imposita ex aceto & rosaceo, dilutiôrque infusa. Oculorum vitia omnia sanari ea conuenit, priuatim prurigines & scabiem genatum: item insignita ac liuida, illita cum melle maximè Pontico. Tonfillas, gingiuas, & omnia oris vlcera. Sanguinis excreationes, si modicæ sint, drachmæ pondere ex aqua: si minùs, ex aceto pota. Vulnerum quoque sanguinem, & vndeunque fluentem sistit per se, vel ex aceto. Aliàs etiam est vulneribus utilissima, ad cicatricem perducens. Eadem inspargitur exulceratis genitalibus virorum, condylomatis rimisque sedis aliàs ex vino, aliàs ex passo, aliàs sicca per se, vt exigit curatio, mitiganda ac coercenda. Hæmorrhoidum quoque abundantiam leniter sistit: dysenterix infunditur. Et si difficiliùs conquoquantur cibi, bibitur à cœna modico interuallo. In regio morbo tribus obolis ex aqua. Deuorantur & pilulæ cum mellis decocto, aut resina terebinthina ad purganda interiora. Digitorum pterygia tollit. Oculorum medicamentis lauatur, vt quod sit arenosissimum subsidat. Aut torretur in testa, pennæque subinde versatur, vt possit æqualiter torrerì. Quod Dioscorides dixit, Aloë duorum cochleariorum mensura potam stomachum purgare *μεθ' ὕδατος ἡνυχός, ἢ γαλακτώδους*, Plinius ait bibi ad dissolutionem stomachi in duobus cyathis aquæ tepidæ, vel frigidæ, &c. vt aquam tepidam verterit τὸ γαλακτώδες ὕδωρ, id est, aquam lactei teporis. Galenus de eadem ita differit. Aloë herba non admodum apud nos provenit. Quæ in magna nascitur Syria, lignosior est, & facultatis imbecillioris: attamen vsque adeò desiccare potest, vt vulnera conglutinet. At in regionibus calidioribus, qualis est Cœlosyria & Arabia, multo est melior. Optima verò Indica, cuius liquor est id quod ad nos importatur medicamentum cognominatum Aloë, ad plurimas res propter siccitatem morsus expertem vile. Est autem non simplicis naturæ, sed, vt indicio est gustus, astringit simul, & amara est. Adstringit quidem mediocriter, sed vehementer amara est. Subducit & ventrem, vt puta ex eorum medicamentorum numero, quæ Græci ab excernendo stercore *ἐκκοπραίνον* vocant. Itaque tertij est ordinis exsiccantium, calfacientium autem aut primi intensi, aut secundi remissi. Verum & ipsius facultatis misturam attestantur particularia ipsius opera. Nam & gratum stomacho est medicamen, vt si quid aliud, & sinus glutinat. Sanat & vlcera, quæ ægrè ad cicatricem duci possunt, & maximè quæ in ano sunt & pudendo. Iuuat etiam eorum inflammationes aqua liquata; & vulnera ad eundem modum glutinat. Congruit similiter videnti ad inflammationes in ore, naribus, oculis. In summa repellere & discutere simul potest, cum hoc vt parum extergeat, quantum videlicet vlcerebus puris non sit molestum. Hæc Galenus. Hodie Aloës vsum esse non modò apud Arabes Turcæque medicos, sed etiam apud Indos in purgantibus medicamentis & collyriis testatur Garcias in Aromat. Indic. Historia, tum etiã vulneribus carne explendis: in quem vsum plerumque in suis Officinis medicamentum habent, cui nomen Mocebar, ex Aloë & Myrrha paratum: quo etiam plurimum vtuntur

vtuntur in equis curandis, & vulnere lumbricis enecandis. Medicum se vidisse ait magni Sultani Badur regis Cambaia, ipsa herba Aloë vterem pro medicamento familiari, in hunc modum. Folia Aloë concisa cum sale coquebat, eius decoctiones octo propinabat, quæ aluum sine molestia & nocumento subducebāt quater aut quinquies. In vrbe Goa Aloë probè tufam, & cum lacte mixtam propinantiis qui vlcere renum aut vesicæ laborant, vel qui purulentas excernunt urinas, non sine magno successu, & ægrorum commodo: nam illico curantur. Eius vsus etiam aucupibus notus est, qui contracta auium crura ea conglutinant. Similiter in India maturandis phlegmonis idonea. Recentiores, & docti quidem viri, Arabes medicos infectati sunt, quod affirmauerint Aloë venarum oscula adeò referare, vt inde sanguis fluat, eamque ob causam hæmorrhoidibus non conuenire. Sed iis dudum responsum fuit, longa experientia compertum esse Aloë foris admotam ora venarum claudere, & sanguinem sistere, intrò verò sumptam, illis præsertim qui hæmorrhoidibus vexantur, sanguinem attenuare, calfacere, deducere ad ora venarum, ipsaque adeò vasorum extrema referare, quod & alij succi multi faciunt, vt Porri, Vrticæ, Myrrhæ, quâuis calidi & sicci. Siluius scribit Aloë calore & crassa substantia venas tum hepatis, tum hæmorrhoidas aperire: anastomatica enim esse maximè quidem calida, crassa, acria & mordacia, non minimùm tamen calida, & crassa, qualis est Aloë: foris verò admotam vasis sanguine fluentibus, ipsum sistere facultate sua adstrictoria, & va' de sarcotica. Clusius Aloë à

In Mesu.
cap 4.
lib. purg.

*ALOE Americana,
Clusij.*



vulgari planè diuersam primus, quod sciam, ostendit. Eam & plures alias illi acceptas referre debemus. Multa illi sunt folia, inquit, hominis longitudine, saturatiùs virentia, læuia, inferiore parte trium aut quatuor digitorum transversorum crassitudine, & valde lata mutuo sese amplectentia, vt in vulgari Aloë & Asphodelis, sensim verò in mucronem desinentia, qui nihil aliud est quàm spina nigricans, crassa, duos digitos transversos interdu longam, & adeò firmam, vt Americi pro subula vtantur, cuspidisque vice suis telis adaptent. Foliorum latera quæ tenuiora sunt, spinis eiusdem coloris horrent, sed breuioribus, basi latiore, & deorsum recuruis vt in Rhamno tertio, interiore parte fibrosa. Sunt hæc folia succi plena amari, & acris. Ex eorum medio caulem nasci intellexit Clusius (neque enim vidit) brachiali crassitudine, & breuioris lanceæ altitudine: radix est crassa, oblonga, incurua, & veluti internodiis distincta, è cuius geniculis ad latera adnascuntur aliæ plantæ. Primùm hanc plantam sibi demonstratam fuisse ait Clusius à D. Ioanne Placa Medico & profes-

Aloë Americana.
Forma.

sore Valentino, primo ab vrbe Valentia lapide in Monasterio D. Virgini sacro, cui cognomen de Iesv. Postea aliis etiam locis obseruauit. Erutam autem vidit omnium maxima radice in suburbanis Petri Alemani, duorum ferè cubitorum longitudine, ad cuius latera triginta ferè pumilæ plantæ enatæ erant,

ex quibus detractas duas in Belgium detulit. Earum vna à Petro Coldebergio pharmacopœo sata Aloën produxit, ex qua iconem delineandam curavit, ne quis putet vulgaris Aloës esse. Viuax est, multòsque annos durat, radice multipliciter sese propagans, cuius rei gratia, & propter spinarum rigiditatem Indi seu Americi circa agros ferunt, ad eos communiendos, & fures arcendos. Valentini *filij Aguilla* vocabant, id est, filum & acum, quòd foliorum extrema spinæ, acus, & fibræ interiores fili vicem præsent, Indi *Magney*, & *Metl*, nonnulli Hispani *Cardon*, ob aculeos. Magno in vsu est apud Indos, vt refert Gomara ad finem historiæ Mexicanæ, cuius verba, quòd integram huius plantæ historiæ contineant, adscribere hîc libuit ex Clusio. *Metl* nonnullis *Magney*, aliis *Cardon*, arbor est duplici hominis statura, aut altiùs crescens, crassitudine coxæ hominis, parte inferiore crassior & densior, deinde sursum in pyramidem desinens vti Cupressus. Quadragesima illi folia, regularum prope modum amplitudine, & eodem modo canaliculata, sede inferiore crassa, & in mucronem desinentia, lateribus tenuiora, & crassa spina mucronem occupante. Tanta circa Mexico copia nascitur, quanta apud nos vites. Profert spinam, florem, & semen. Ex ea ignem struunt, cuius cineres parando lixiuio idonei: truncus loco ligni est: folia regularum aut imbricum. Eam cadere solent antequàm nimium adolescat: tum enim radix crassior fit, qua excavata liquor quidam colligitur, qui Serapij modo illic densatur: is aliquantulum coctus mel fit, depuratus saccharum, dilutus acetur, & addito Ocatli (radix est, quam, ob eius præstantiam, Vini medicinam nominant) vinum, illis quidem in vsu, sed parum salubre: etenim caput ferit & inebriat: nullum autem cadauer, nulla impura sentina adeò foetet, atque eorum anhelitus, qui eo vino inebriati fuerint. Ex huius germinibus & tenellis foliis fit conserua. Foliorum prunis assatorum succus recentibus vulneribus aut vlceribus instillatus, breui ea curat. Germinum & radicum succus, cum Absynthij illius regionis succo mixtus, viperarum moribus vtiliter instillatur. Illius foliis paratur charta in vsum sacrificiorum & pictorum, & ex iis lini aut cannabis modo paratis fiunt Alpergates (calcei genus Hispanis admodum familiare, ex funiculis contextum.) storea, chlamydes, cingula, funes: denique illis sunt cannabinum filum. Horum foliorum cuspides seu spinæ adeò firmæ sunt & acutæ, vt illis acus aut subulæ vice sint, eos cum fibris extrahendo. Istis spinis sacerdotes illius regionis in sacrificiis se pun gere solent: etenim cuspis non frangitur, & satis altè penetrat, exiguo facto foramine. Hactenus Gomara. Addunt quidam, Americanos Veneream luem hac planta curare solitos hoc modo. Eius fragmentum in minutas partes sectum, ollæ canthari aquæ capaci impositum, trium horarum spatio decoquebant, olla priùs luto obturata: eam deinde apud ægrum positam aperiebant: magna fumicopia inde exhalans multum sudorem excitabat. Aut folium huius plantæ prunis impositum assabant, cuius fumum æger excipiebat: sed adeò vehementes sudores inde excitabantur, adeoque vires collabebantur, vt vix æger ferre posset, tamen triduo duntaxat vteretur. Ex eorumdem foliorum fibris reticula contextuntur, & indusia conficiuntur. Hæc Clusius.



PVD Arabes & recentiores duæ radices peregrinæ Rha nomine designantur. Quæ res atque vtriusque stirpis ignoratio fecit, vt plerique, num eiusdem plantæ radices essent, ambigerent. Verùm rerum inspectio atque accurata collatio totam litem diremit, docuitq; Rha-
poticum à Rhabarbaro plurimùm discrepare. Primùm Rhabarbari prisca in-
cogniti historiam perscribemus. Nascitur id in montibus Singui ciuitati Indiæ
propinquis, quæ à frequentissima & ditissima ciuitate omnium, quarum extat me-
moriam, Quinsai quatuor dierum itinere distat. Vtraque verò regionis amplissima,
& in multa regna diuisa, quam Mangi vocant, ditionis est. Singui terræ ciuitatem
indigenarum lingua significat, Quinsai verò cæli. Quod illinc Rhabarbarum ad-
fertur, Indicum nuncupant. Id autem perpauca est, tum quia ipsæmet gentes
id consumunt, tum quia pauci mercatores, cum quibus sunt cõmercia, eò vsque
penetrant, tum quia minore sumptu & periculo ex Armeniæ ciuitate, quam Tau-
ris nominant, (Terua ptolemæi quidam esse arbitrantur, alij Arsamoten Plinij)
aduehitur. Gignitur & in Prouincia Scythiæ orientalis Tartarorum Imperatori
subdita, quam Tanguth vocant, in montibus oppidis Campion & Succuir vicinis
(Succuir Sarangas à Plinio dici quidam suspicantur.) A' Tauris, quæ Armeniæ ma-
ioris caput est, ad eas vrbes iter patet centum & octoginta dierum, his stationi-
bus. A' Tauris ad Sultaniam ex ruinis Tigranocertæ ædificatâ sex diebus perueni-
tur. A' Sultania ad Casibin (Cosios esse aiunt) quatuor. A' Casibi ad Veremi, sex. A'
Veremi ad Eri Arianorû caput, vt quidâ volunt, quindecim. Ab Eri ad Bachora
(in Chorasmiis siue Choraxiis oppidum id est, Chorasam provinciâ vocant. Sunt
qui Berdrigeos Plinij esse credunt, alij Bactrianos) viginti. A' Bachora ad Sarma-
cand (Margianæ caput nonnulli esse autumant, alij Sogdianorum) quinque. A'
Sarmacand ad Cascar (Commanos Plinij quidam esse volunt, alij Aracosios) vi-
ginti quinque. A' Cascar ad Acfu (Atasini sunt Plinij quorundam iudicio) per de-
sertas ac vastas solitudines, viginti. Ab Acfu ad Cuchia, viginti. A' Cuchia ad Cia-
lis oppidum, decem. A' Cialis ad Turfon (fortasse Tagas esse Plinij non malè
quidam opinati sunt) decem. A' Turfon ad Camul, quod iam provincia Tanguth
continetur, tredecim. Hucusque Machometum colunt, ideò Musulmani dicti. A'
Camul ad Succuir quindecim. A' Succuir ad Ganta, Gandaros Plinio nonnullor-
um opinione dictos, quinque. A' Ganta ad Campion, sex. Itineris spatia viato-
res & mercatores parasangis metiuntur, quas adhuc farsing vocant veteri no-
mine, sed corrupto. Via facili, nec montibus impedita, nec solitudinibus homi-
nes iumentaque siti ac fame necantibus intercepta, octo parasangas, id est, 24. mi-
liaria Italica conficiunt singulis diebus. Nam parasanga tribus miliaribus Italicis
proportionem respondet. Campionenses ac Succuirini Rhabarbarum sua lingua
Rauend Cini vocant, quod non rectè quidam nunc *Raued Seni*, nunc *Raued Sceni*
appellant. Cuius nominis proprietas controuersiam dirimet inter medicos no-
stri seculi agitatam, cur ita vocetur, contendentibus aliis Sinicum nominatum
esse à Siniis extremæ Indiæ populis, aliis Scenicum, vel Sceniticum à Scenitis Ara-
biæ gente, aliis à Scenitis Parthorum natione, qui Ariæ & Margianæ montes ha-
bitant: quæ postrema sententia plus habuit ponderis quàm reliquæ duæ, cum
Arij, Margiani, Aracosij, & alij populi provinciæ Tanguth Campionensibusque
finitimi communi vocabulo Cini & Maucini etiam hodie nomenclentur. An verò
à Troglodytis Æthiopiæ, quos *ῥαβδάρη* Barbaros nuncupasse videtur antiqui-
tas, Rhabarbarum sit appellatum, facillè diiudicari potest. Nam Æthiopiam & eius
Troglodytas Lusitanorû nauigatio nobis patefecit, quibus in locis nec Rhabar-

Locus.

Nomina

barum prouenire, nec inde ad nos mitti cōpertum est. Quod verò in Ægyptum per sinum Arabicum camelis deportant, ex Armuzo, nunc Ormus, & Teredone, nunc Balzera, ad Euphratis ostia sitis, & aliis ciuitatibus Caramaniæ maritimæ mercatores aduehunt, in ea loca secundo Euphrate, id Barbarum potiùs nominatum crediderim, ab earum gentium immani feritate, quæ in montibus suis collectum ad nos transmittunt. Quondam enim totus is tractus desertorum vastitate, & tam longo itineris à nobis interuallo diffusus, vix solis nominibus cognitus fuit. M. Paulus Venetus viam, quæ è Carmania ad Tanguth ducit Cobinam, Timochaim veterum Arbelitin, in qua Darium Alexander vicit, Sapurgan, Balac, Thaicam, Scaffem, Balaxiam, Bascia, Cheshmur, Comaros Plinij, Vocham, Ocanos Plinij, Caschar distinctè tradidit. At verò Chagi Memet è regione Chilam ortus prope mare Caspium ex oppido Tabas, mercator summæ fidei, acutissimique ingenij apud Succairinos & Campionenses emendi Rhabbari causa aliquandiu commoratus, alteram viam suprâ descriptam, quæ è Terua Armeniæ eò proficiscuntur, rectam & compèdiolosam docuit: ex cuius narratione magnam horum partem nos sumpsisse ingenuè fateamur. Rha Turcicum Mesuæ idem esse cum Rhapontico Græcorum nemini dubium esse debet. Ad ripas fluminû Rha, nunc Volga, Edel, Elatach, (tot enim nominibus appellant,) Borysthenis, nunc Neper, Tanais, nunc Tana, vel Don, id crescit, vt & Acorus. Turcæ, qui olim vltra Tanaim sedes habuere prope Sarmatas Zygos, nunc Circassos, in paten tibus illis campis, in quibus nunc Tartari Harmatotrophi, siue Hamaxobij per Hordas, id est, turmas vagantur palantes & errabundi, Rhaponticum ad exterar nationes mittebant: vnde Turcicum cognominatum. Scribit Pena multis ab

Rha Tur-
cicum si-
ue Ponti-
cum.

Locus.

RHA CAPITATVM,

Helenij folio.

Forma.



hinc annis Rha ex semine Turcico nonnullos habuisse in hortis Galliæ & Flandriæ, quod magno studio cultum ibi viguit, foliis Personatæ, sed non perinde latis, longioribus, Helenij vel Verbasci, in ambitu serratis & fimbriatis, aduersa parte virentibus, auersa lanuginosis, caulem rectum sesquipedalem & cubitalem amplexis, capite fastigiatum, foris squamulis loricato, ac per maturitatem staminibus purpureis pleno, vt in Cynara, & Carduis purpureis, semine, dum circa lunium & Iulium maturuit, Centaurij maioris, vel Cartami, longiore: radix fungosior, maior, & Rhabbaro similior quàm Cetaurio. Id pinxerunt Dodonæus & Lobellius. Huic capitato Rheo valde affine est, inquit Lobellius, quod ex Italico semine alunt horti quidam Belgici: sed folia angustiora multo, acuto Lappathoparia, auersa parte incana: caulis rectus, capite fastigiatus, squamulis loricato, ac staminibus purpureis Cynaræ aut Cardui cōcoloribus pleno: semen Cnici siluestris, cōpressum, ægre maturefcit in Belgio: radix Centaurij maioris, fungosior. Hoc ex Lobellio pictum damus. Sed

ad Rhabbari historiam reuertatur oratio. Succuir ampla & frequens est ciuitas, ædificiis ornata sumptuosius & magnificis, è latere constructis, angustissimisque superba delubris, ex saxo & marmore compositis. In planitie iacet, innumeris fluiuij canalibus rigua. Quare omnibus rebus hominum vitæ necessariis abundat,

serico

ferico præsertim, quod illic plurimum Mori nigræ foliis pasti bombyces nent. Vites quidem locus is, nempe frigidior, dedignatur. Vini loco potum zytho similem adiecto melle incolæ parant. Cætera, illorum ager Malorum, Pyrorum, Armeniorum, Persicorum, Melonum, Cucumerum fertilissimus est. Rhabarbarum vbiuis in ea prouincia gignitur, sed præstantissimum in quibusdam montibus Succuir propinquis, editis, saxosis, siluis diuersissimarum arborum, opacis, fontes plurimos effudentibus, terra rubra, crebris pluuiis fontiumq; scaturiginibus riguisq; semper lutosa. Caulem ab radice profert viridem, palmi altitudine, quem

Rhabar-
barum.

RHAPONTICVM alterum
angustiore folio, Lobell.

RHABARBARVM,
Matthioli.



circundant folia multa, palmos duos longa, tamen pro ætate plantæ longiora, aut breuiora, ima parte angusta, in summa latiora, rotundata, in terram inclinata, toto ambitu lanuginosa, cum adoleſcunt viridia, cum ſeneſcunt flauescencia, & humi procubentia. Ex medio foliorū stipatu cauliculus, siue ſurculus prodit, flores ſuſtinens, hîc illic nullo ordine emergêtes, ex candido purpurascêtes, Violæ nigræ, siue Martiæ ſimiles, maiores, odoris validi, grauis & iniucundi. Radix ad duos trêſve palmos, terram ſubit, cortice fuſco obducta, craſſitudine diſpari: ſunt enim radices quædam tenuiores, quædam craſſiores, ſed nonnunquam tanta craſſitudine, vt ſuræ & coxæ hominis non cedant. Ex his fibræ multæ radiculae ve enaſcuntur, circumquaque per terram ſeſe ſpargentes. Planta è terra effoſa, (quod Hyeme fit, nimirum ante Maij finem, cum illis gentibus Ver incipit, quia tum priuſquam exoriantur folia, ſucco introrſum reuocato plenior & habitior, ideoq; facultate præſtantior radix turgeſcit) radiculae primùm reſecantur & reiiciuntur, deinde radicis, velut truncus in fruſta conciditur, qualia videmus in Seplasiis. Eſt autem inrus lutea, venis diſtincta, colore rubro pulchrè nitentibus, ſucco luteo rubroq; madida, quo manus inſcitur, ſic lento & glutinoſo, vt contactu facilè digitis inhæreſcat, ſaporis tam amari, vt guſtari nequeat. Fruſta protinus radice diſſecta non appenduntur, vt ſicceſcât: ſic enim luteus ſuccus totus efflueret, craſſaq; euanida,

& exhausta radix, fieret facultate imbecillior, & bonitate inferior, sed super mensis & tabulis disposita, quotidie ter, aut quater inuertuntur, ut quod supernè est inferne collocetur: hac enim ratione succus non adimitur, sed in radice veluti coactus & concretus manet, radice nisi confestim ea diligentia adhibeatur, effervescente ac inarescente. Post quartum demum, aut sextum diem pertusa frustra funiculis adactis ligata suspenduntur loco perfato, aëremq; liberè admittente, sic tamen ut solis radiis non feriantur. Hoc pacto exactis mensibus duobus siccatum Rhabarbarum egregium reconditur. Ex septem plaustris recentis, cum siccatum est, vix restat quod equum oneret. Effossa per æstatem radix foliis iam enatis, & adultis velut immatura, nec succo luteo mader, ut quæ per Hyemem effoditur, & fungosa, rara, levis, arida est, bonitateq; ab altera multum superatur. Qui in montosa pergunt, ut Rhabarbarum emant, quale effossum est, siue cum foliis, siue absque foliis plaustris imponunt, ac vehes singulas in plana deductas sexdecim Saggis argenteis vendunt. Cusæ autem moneta nullus apud illos usus: argentum & aurum in virgas oblongas malleis ducunt, eas deinde in particulas ponderis vnus Saggis diuidunt, qui valet argenteos solidos Venetos circiter viginti, aureus verò nummum aureum cum dimidio. Id pro moneta est. Emptum mercatores, ut iam dictum est, præparant. Id incolæ, quod admiratione dignum est, nullo in pretio habent, ne effossuri quidem, nisi ab externis mercatoribus eò conuenientibus, & deposcentibus, pretio sollicitarentur. Indi & Chineses mercatores maiorem partem collecti, & præparati auferunt. Catani ad purganda corpora, & alia medicinae remedia, id non usurpant more nostrò, sed eo tuso, & cum aliis confectio-nibus perquam odoratis mixto, Deorum quos adorant simulacra & imagines suffiunt. Multis in locis tanta est huius radicis copia, ut pro ligno siccata vrant. Quidam tam paruifaciunt, ut equis languentibus, & agris assidue comedendam obiciant. Longè plurius æstimatur Catani radícula Mambroni Cini vocata, cum Rhabarbaro nascens, ad varias ægritudines laudatissima, ob idque nobilissima, sed ad oculorum morbos præcipuè. Nam ea in cote trita ex rosacea, & affusa, oculorum dolor euestigio sedatur. Ad nos eam non conuehant, propterea quòd solo nomine celebris, cætera ignota est. Apud Catanos in prouincia Chianfu herba quoque nascitur Chiai Catai nominata, vniuersis eius regionis populis commendatissima. Foliorum & aridorum & virentium decocti cyathus vnus vel alter bibitur quàm calidissimè bibi potest, aduersus febres, dolores capitis, lateris, articulo-rumq; remedio inter alia efficacissimo, & ad alios plerosq; morbos. Tardiorum quoque ventriculi concoctionem decoctum id sic iuuat, ut eius grauitati ob crudum cibum contractæ faciliè medeatur, & feliciorem, ac celeriorum concoctionem præstat. Ob has nimirum dotes Catainorum quisque hanc secum herbam aliquo peregrinaturus gestat, ut subitis eorum morborum causis occurrat. Tanta ob id est huius plantæ dignitas, ac æstimatio, ut Rhabarbaro plenum saccum eius sola vicia gens illa lubentissimè permutet, atque adeò iactet Persis, ac Francis si ea planta innotescat, mercatores Rhabarbarum amplius non postulatu-ros. Aduenas non absque periculo in montes Rhabarbari feraces conscendere narrant legendi gratia, nisi eius prouinciæ iumentis vehantur. Illic enim venenatam quandam herbam nasci, qua gustata veterinis vngula decidant: equos verò eorum montium pascuis assuetos exitiosam hanc plantam noscere, nec attingere, alienos verò carpere & appetere magno suo malo. Rhabarbarum calidum est & sic-cum ordine secundo potius quàm primo, auctore Mesue. Substantia duplici constat, vna aquea, terrea adstringente, in corporis molè cōcreta, profunda, altera aërea & ignea, à qua rarum efficitur, superficialia, quæ suam terream substantiam aduren-do amaram efficit, ac purgatoriam, & obstructa liberantem. Clemens est & excellens

Mambroni
Cini ra-
dix.

Chiai Ca-
tai herba.

Temper.
Lib. purg.
cap. 6.

Vires.

excellens medicamentum, multas dotes medicamento purganti maximè expetitas complexum. Huius substantiæ macerando separantur, vt calida & purgatrix in humorem transferatur, terrea verò adstringens remaneat. Bilem pituitamque illa vacuat, præcipuè à ventriculo & hepate, & inde sanguinem purgat, obstructions liberat, & affectus inde natos, icterum, hydropem, splenis tumorem, febres putridas etiam diuturnas, dolorem hypochondriorum punctorium. Hæc insuper hæmorrhagiam pulmonum, vel aliarum partium sistit, ex casu quoque aut ictu contusa, rupta, fracta, interna & externa sanat, si eius drachma vna cum mumix granis duobus, & Rubix tinctorij grano vno & dimidio ex vino austero bibatur (mumix & Rubix non ita valentium medicamentorum mensura hic est parciore, vt mendi suspicio sit, inquit Siluius, præsertim cum Auicenna Rubix drachmam vnam Rhabarbaro addat.) Oleum quoque eius contusis & confractis musculis vtiliter illinitur: singultu & dysenteriam sanat, præcipuè assum, & cum succo Plantaginis è vino austero potum. Innoxium est Rhabarbarum: omni tempore tutò datur: omni est ætati salubre, atque ad eò pueris, & prægnantibus. Efficacius autem agit sumptum ex sero lactis, præsertim caprini, aqua quoq; Intybi, aut Apij, vel Plantaginis cocta & colata maceratum, idq; omnino cum Spica nardi, actionem eius iuuante imprimis, expressumq;. Quod si ad liberandas obstructions propinandum est, vini albi puri & odori modicum macerando admisceatur, expressumq; eius tunc sumatur, & cum deterfione ac purgatione opus est. Quod si post purgationem viscera adstringendo roborari volumus, puluis eius triti datur, si adstrictio magis expetitur, assum datur, si maxima, vsum.

AGARICVS.

CAP. XXX.



ΤΑΡΙΚΟΣ vel ἀγάρικον Græcis dicitur, qui Agaricus Latinis & Agaricum, Mauritanis *Garichum*, siue *Garicum*, Hispanis & Italis *Agarico*, Germanis *Dannenschuam*, quasi fungus Pinorum, aut potius Abietum & Laricum, Gallis *Agaric*. Agaricum gentile nomen sibi adsciuit, ab Agaria Sarmatiæ regione, in qua nascitur, teste Dioscoride, vel ab Agaro, quem & urbem, & amnem in Sarmatia vocari tradit Ptolemæus. Appianus Alexandrinus Agaros Scythicam gentem contra serpentium morsus adhiberi solitam refert: propter quod Mithridates eos apud se habuerit. Agaricum scribit Dioscorides radicem dici Silphio similem, non ita densa superficie sicuti Silphium, nam tota rara est. Duo eius genera Vnum mas, alterum fœmina, quæ etiam præfertur, rectos venarum discursus intus habens. Mas rotundus est, & vndique eadem substantia compactus, καὶ πανταχόθεν συμμῆς, cuius videtur sensus esse accommodatior iudicio And. Lacunæ, atque vniformis vndique. Nam cum dixisset Dioscorides, Agarico fœminæ inesse quosdam venarum discursus rectos, assignat postea differentiam in masculo, dicens ipsum esse rotundum, & per omnes partes sui similem, vniformem, atque eiusdem substantiæ & naturæ: id quod inter alia συμμῆς significare solet. Huic interpretationi adstipulatur Serapio, qui sic vertit. Sed est tota eius substantia continua. Gustus vtrique similis, in initio dulcis, mox cum salua madet (ἔστι ἐξ ἀναδύσεως.) Nascitur in Agaria Sarmatiæ regione. Quidam plantæ radicem esse aiunt. Alij in truncis arborum ex putredine, veluti fungos, nasci tradunt. Prouenit etiam in Galatia Asiæ, & Cilicia, in Cedris, sed friabile & infirmum. Galliarum glandiferæ arbores Agaricum ferunt, inquit Plinius. Est autem fungus candidus odoratus, antidotis efficax, in summis arboribus nascens, nocte relucens. Signum hoc eius, quo in tenebris decerpitur. Et alio in loco, Agaricum vt fungus nascitur in arboribus, circa Bosphoron,

Nomina

Lib. 3. ca. 1.
Forma.
Genera.

Locus.

Lib. 16. c. 8.

Lib. 25. c. 9.
colore

AGARICVS, *Matth.*Li. purgan,
cap. 5.Vires &
Temper.
Lib. 3. ca. 1.

Li. 6. simpl.

colore candido. Datur obolis quatuor contritum cum binis cyathis aceti mulsi. Id quod in Gallia nascitur, infirmius habetur. (Alij codices habent Galatia pro Gallia. Et sanè Dioscorides in Galatia Asiæ nasci dixit. Et hodie in Gallia nasci certum est.) Præterea mas spissior amariorque. Hic & capitis dolores facit. Fœmina solutior, initio gustu dulcis, mox in amaritudinem transit. Agaricus Galeno radix dicitur, quæ trunco innascitur. Mesuæ verò Agaricus medicamentum efficax oritur in truncis arborum magnarum, vetustate iam putrescentium, & erosarum, tanquam earum vel apostema, vel fungus. Est autem is duplex, mas & fœmina. Mas est malus, præsertim qui longus, niger, durus, densus, gravis, & in frâgmētis ceu villos neruorum ostendit. Fœmina si rotundior, alba, porosa, & rara valde, & frangi facilis, levis, dulcis primo gustatu, mox amara & styptica, est melior, præcipuè summa corporis sui parte. Nam stipes, quod ligni putrefacti aliquid præ se ferat, malus est, ut erosus Agaricus.

Hodie cum seplasiis omnibus notissimus sit Agaricus, & quotidiano vsu tritus, tamen Dioscoridi vix notum fuisse perspicuum est, ut qui radicem dici Silphio similem scribat, deinde hæsitans subiungat, aliis radicem esse plantæ, aliis fungum arborum truncis innascentem quadam putredine. Agaricum igitur fungum esse certum est, qui præter arbores glandiferas nascitur, præcipuè in Larice, in qua præstantissimum in Ananienfibus montibus se collegisse ait Matthiolus. Vim habet calfaciendi & adstringendi, auctore Dioscoride, efficacem ad tormina, & ad cruditates, ruptaque, & casus. Duorum obolorum pondere datur non febricitantibus ex vino mulso, febricitantibus ex aqua mulsa. Datur hepaticis, asthmaticis, in morbo regio, dysentericis, nephriticis, in urinæ difficultate, in vteri strangulatu, & in vitiato colore, drachmæ pondere. Tabidis autem cum passo, splenicis cum aceto mulso, stomachicis ita ut est manditur ac deuoratur sine vlla humoris sorbitione, similiter acidum ruçantibus. Sistit sanguinis reiectiones trium obolorum pondere cum aqua sumptum. Facit ad coxendicum & articulorum dolores & comitiales morbum, si pari pondere cum aceto mulso sumatur. Ducit & menses: fœminis vteri inflatione vexatis vtiliter æquale pondus datur. Rigorem soluit ante febrium accessiones datum. Alium purgat drachmæ vnius, aut duarum pondere potum cum aqua mulsa. Est lethaliū medicamentorum antidotum, si cum diluta vini portione drachmæ vnius pondere sumatur. Serpentum plagis ac moribus trium obolorum pondere cum vino potum auxiliatur. In summa, internis omnibus vitiis conuenit pro viribus & ætate datum, aliis cum vino, aliis cum aqua, aliis cum aceto mulso, aliis cum aqua mulsa. Galenus eius naturam sic declarat. Primū gustui dulcem esse, sed paulò post amarum apparere, & acrimoniæ quandam speciem temporis spatio inducere, leuiculæq; adstrictionis, & consistentia esse laxa. Quare compositum esse ex substantia æcrea, & terrea, à caliditate extenuata, præterea minimū habere essentiæ aqueæ. Hac ratione & digerendi vim habere, & crassitudinem incidendi, tum infarctus viscerum expurgandi. Ob id regio morbo laborantes sanare, eos utique qui sic ab infarctu

farctu

farctu iecoris laborant. Iuuat & comitali morbo obnoxios eadem facultate. Tum rigores per circuitum recurrentes, ex crassis aut viscosis humoribus natos sanat. Iuuat & demorſos à beſtiis frigore lædentibus, aut compunctos, tum foris in affecta parte impositum, tum intrò in corpus ſumptum pondere drachmæ vnus cum vino diluto. Eſt & purgatorium. Hæc Galenus. Hodie Agarico ſiue ſimplici, ſiue in trochiſcos coacto in purganda pituita vtimur. Nam, auctore Meſue, pituitam craſſam, lentam, putrem, & bilem flauam & atram vacuat, à cerebro, neruis, muſculis, ſenſuum inſtrumentis, ſpina doſi, thorace, pulmone, ventriculo, hepate, liene, renibus, vtero, iuncturis. Ob id medicamentum familiæ à Democrito dictum eſt, quòd ad omnes partium internatum affectiones conferat: viſcera reddit imbecilla: ob id tergentibus miſcetur, ne in ea virtus eius altiùs penetret.

Li. purgati-
cap. 3.

—HIPPOPHAES.

CAP. XXXI.



ENIT & iis quæ lacteum ſuccum fundunt Hippophæis annumerandum. Frutex (inquit Dioſcorides) eſt *φρυγανόδης*, ſiue ſurculæceus, vnde quaque denſus & amplus: folia ei oblonga veluti Oleæ, anguſtiora tamen & teneriora: inter quæ ſpinæ ſiccæ & candicantes emicant, articulatæ, interſtitio quodam diſtantes: flores Hederæ corymbos referunt, racematin coherent, ſed tamè minores mollèſque, & ex albedo partim rubentes: radix craſſa & mollis, ſucci plena, guſtu amara, ex qua veluti ex Thapſia ſuccus colligitur. Anguillara radicem reſert palmum eſſe longam vel maiorem, & ex

HIPPOPHAES, Dodon.

ex Cod. Caſareo.



hac fracta aut vulnerata ſuccum manare tenuem, lacticoncolorem, guſtu amariffimum, odore grauem. In maritimis, ac ſabuloſis, vt Dioſcorides ſcribit, naſcitur. Anguillara arenofis & maritimis locis in Peloponneſo à ſe reſertum reſert. *Γπποφαῖς* Græcis, Latinis quoque Hippophæis dicitur: à Plinio lib. 22. cap. 12. (niſi corrupta vox) Hippophyes. Hippophyes, ait, in ſabuloſis maritimisq; naſcitur, ſpinis albis: Hederæ modo racemofa eſt, candidis & ex parte rubentibus acinis: radix ſucco madet, qui aut per ſe conditur, aut piſtillis farinæ. Extant verò & inter nothas appellaciones quædam huius nomina: vt, Hippophanes, Hippion, Echinion, Pelecinon, & Lappago, quæ tamen Aparinæ conuenit: noſtra ætate ab indigenis Peloponneſi *ἀκνιθανὰ καὶ θαλαῖαν*, id eſt, Spina purgatoria vocatur. Ab Hippophæ differt Hippophæſtum, quod tamen & Hippophæis aliqui (Dioſcoride teſte) appellant: à Plinio Hippope (niſi & hîc vitium) dicitur. Spinæ fulloniæ genus eſt, abſque cauliculo, flore, aut fructu inanibus tantùm capitulis, foliis paruis

ſpinofis, radícula molli & craſſa, ex qua cum foliis & capitulis ſuccus exprimitur. E Narbonenſi Gallia, inquit Ruellius, Hippophæſtum vidimus ſpinofis capitulis, ſine flore, ſine cauliculo, minutis inter aculeos foliis candicantibus. Debent (Plinio auctore) Hippophæis & Hippophæſtum accommodata eſſe equorum naturæ, neque ex alia cauſa nomen accepiſſe: quippe quædam animalium remediis naſcuntur

nascuntur. Est verò Hippophaës, præsertim verò radix ipsius ac succus, calidæ
siccæq; facultatis, & simul valenter purgantis. Succus syncerus radicis huius pi-
tuitam, bilem, & aquosos humores detrahit oboli pondere: cum farina verò sub-
actus quatuor obolorum. Saluberrimè autem cum aqua mulsa exhibetur.

In comitiali morbo, vt Plinius ait, vtilissimus. Frutex verò ipse sicca-
tus tunditur, tritúsque cum aqua mulsa exhibetur. Extrahitur
quoq; succus è radice, foliis & capitulo Hippophæsti, qui
& ex aqua mulsa pituitam & aquam detrahit, &
præcipuè comitialibus morbis, neruo-
rum vitiis, & Orthophnææ,
vt Dioscorides tradit,
conuenit.

* *

HISTOR



HISTORIAE OMNIVM PLANTARVM

LIBER DECIMVS-

SEPTIMVS,

(649)

In quo describuntur & ad viuum depinguntur Planta Venenatae.

PAPAUER.

CAP. I.



ATHARTICA, & quantitate & qualitate malefica, graues corpori noxas inuehunt, non solum quæ deleteria, vt Thymelæa, Lathyris, Euphorbiū, sed etiam quæ benigna vocitantur, nisi necessariae conditiones obseruentur. Quare illis venenata ordine subiungenda, quæ principes corporis nostri partes, & virtutes ipsum gubernantes ita opprimunt, atque vincunt, vt necessario mors consequatur. Vt igitur de Catharticiis plantis libro superiore, ita hoc de Venenatis agemus, quas sceleratis, & qui ad hominum perniciem

his aburi voluerint, ignorasse præstiterit: probis autem, & iis qui ad hominum salutem naturæ rerum arcana scrutantur, cognitu hæ sunt necessariae, tum vt doceant homines, ne ab iis imprudentes fallantur, aut si quando per imprudentiam harum quampiam sumserint, tunc quoque innoxiae fiant, atque irritae, tum vt iis succurrant, qui iam noxam sentiunt. His adde, quod morbis quibusdam venena sunt salubria, malefica tamen vi eorum modis omnibus, vel saltem quibus nobis licet, fracta. Venenatas autem non omnes, quæ cognita sunt, hic persequimur. Quasdam enim, vt Taxum, Nerium, Cicutam, Coriandrum, similitudine ducti in alias classes digestimus: sed pleraeq; & eas notiores, quale est Papauer, Græcis *μήκων*, Arabibus *Thaxthax*, & *Chasca*, Gallis *Pauot*, Italis *Papauero*, Germanis *Maysomen*, Hispanis *Dormidera*. Officinæ Papaueris nomen retinuerunt: *μήκων* quidem à *μήκος*, id est, à non operando dicitur, quia vineti papauereo sapore sensus stupefactaq; membra nihil queunt agere, vel *παράδ' μήκος*, à proceritate, siue longitudine. Multa sunt Dioscoridi Papaueris genera. Vnum est Papauer Rhœas, Erraticum nuncupatum, de quo in Agro diximus. Alterum satium, *μήκων ήμερος*, cuius vnum genus est hortense, *μήκων κηπευτή*, *δυλαχίτης*, semine albo: alterum siluestre, semine nigro: tertium magis siluestre, Arabibus *Seil*. Hortense vocat Dioscorides quod in hortis frequentissimè seratur, cætera duo siluestria, non quod non serantur. (Nam non solum in hortis seruntur, sed etiam in campestribus, segetum & leguminum modo) sed quod asperiora sint tum caulibus, tum capitibus, tum foliis, nec tam domestica, quam hortensia. Præterea est *μήκων κερσίτης*, id est, Papauer cornutum, siue corniculatum, Arabibus *Almacharam*, & *μήκων ἀφρώδης*, id est, Papauer spumeum.

Nomina

Genera.

Lib. 9. c. 8.

Plinius multa quoque fecit genera, sed non tam perspicue distincta. Papaueris sativi tria genera, inquit: candidum, cuius semen tostum in secunda mensa cum melle apud antiquos dabatur. Hoc & panis rustici crustæ inspergitur, affusio ouo inhærens, ubi inferiorem crustam Apium githq; cereali sapore condiunt. Alterum genus est Papauer nigrum, cuius scapo inciso lacteus succus excipitur. Tertium genus Rhœam vocant Græci, &c. De reliquis generibus Papaueris alio in loco dic-

Lib. 20. c. 19.

cit. Siluestribus vnum genus, Ceratitum vocant, nigrum, cubitali altitudine, radice crassa & corticosa, caliculo inflexo ut cornicula. Folia minora & tenuiora quam cæteris siluestribus: semen exile, tempestivum est mensibus. Et paulò post. Alterum est siluestribus genus Heracleum vocatur, ab aliis Aphron, foliis (si procul intuearis) speciem passerum repræsentantibus: radice in summa terræ cute: semine spumeo. Ex hoc lina splendorem trahunt æstate, &c. Tertium genus est Tithymalon,

Lib. 9. hist. cap. 13.

Mecon vocant, alij Paralium, de quo alio iam diximus. Theophrastus etiam Papaueris siluestris genera annotavit, ex quo Plinius superiora mutuatus est. μήκωνες δὲ, inquit, εἰσὶν ἄγριαι παλαιοί. ἡ μὲν κεραλίτις καλαμυρνή, ἡ δὲ μέλιμα. τούτης δὲ φύλλον ὡς φλόμος τῆς μελιμαίνης, ἥτιον δὲ μέλιμα. τῷ δὲ καλαμῷ δὲ ὕψος, ὡς παχητάου, ῥίζα δὲ βραχεύει. καὶ ἐπιπόλομος: ὁ δὲ καρπὸς καμπύλος ὡπερ τῶν κεραλίων. συλλέγει δὲ περὶ πυροβομίας. διώει δὲ καθαίρειν κοιλίαν. δὲ δὲ φύλλον ἀργεῖα προβάτοις ἀφαιρεῖ. φύει δὲ παρὰ τὴν θάλατταν, ὅαν ἡ περὶ ὥδην χωρῆα. ἐτέρα δὲ μήκων ῥοιὰς καλαμυρνή, παρομοία κιχωρίῳ τῷ ἀγρίῳ, διὰ δὲ ἐσθίει. ἐν τοῖς ἀρφαρίοις δὲ φύει, μάλιτα ἐν ταῖς κρημνίσιν, ἀνθος δὲ ἔχει ἐρυθρὸν, κωδιὰν δὲ ὅσπην ὄνυχα τῷ διακρίβω. συλλέγει δὲ πρὸ τῆς γεινομῆς τῶν κρημνῶν, ἐγγλωροτέρα δὲ μέλλον. καθαίρει δὲ χότον. ἐτέρα δὲ μήκων ἡρακλεῖα καλεῖται, δὲ μὲν φύλλον ἐχέει ὡς οἶον εἰρηθὸς. ὃ τὰ θρόνια λαδομένον. ῥίζαν δὲ λαδομένην, ἐπιπόλομον, τὸν δὲ καρπὸν λαδομένην. καθαίρει δὲ ἄνω τούτης ἡ ῥίζα. χροῖον δὲ τινες πρὸς τὰς ἐπιλήψεις ἐν μελικράτῳ. Id est, Papaueris siluestris multa sunt genera. Vnum Ceratitis, id est, Corniculatum vocatur, aliud nigrum, folium habens Verbasci nigri, sed minus nigrum: caulem altitudine cubitali, radicem brevem, & per summa terræ sparsam: fructum inflexum veluti cornicula. Legitur circa messes. Alium purgare potest. Folium argema ouibus adimit. Nascitur iuxta mare locis petrosis. Aliud Rhœas simile Intubo erratico: quare in cibi usum venit. In aruis provenit, potissimum inter Hordea. Florem rubrum profert, calicem siue caput vnguis digiti magnitudine. Legitur ante Hordei messem, atque etiam viridius, purgat per inferna. Aliud est Papauer Heracleum, folio Radiculæ, quo lintea dealbatur: radice alba per summa terræ hærente: fructu albo. Radix purgat per inferna. Quidam aduersus comitalem morbum videntur in vino mulso. Quod hic dixit Theophrastus Papauer Heracleum (alij vocant Aphron teste Plinio, Dioscorides ἀρρωδες) folium habere Struthi, quod Struthiū Dioscorides vocat, Latini Radiculam, siue Lanariam herbam, Plinius hoc ad passerem auiculā retulit, qui & ipse εἰρηθὸς appellatur, cum tamen mox indicarit Theophrastus, de quo Strutho loquatur, nimirum quo lintea dealbant. Plinius verò hæc non de Strutho, id est, Radicula herba intellexit, sed ad Papauer Heracleum retulit, ex hoc lina splendorem trahere æstate

PAPAUER sativum,
Matthioli.



æstate scribens. Papauer fatium album caulem proferit rectum, læuem, vnicum, sed alis diuisum, ternum & quaternum cubitorum, quem totum folia ambiunt longa, lata, candida, Scariolæ hortensis, aut Hyoscyami nigri modo lacinia, tenera, Forma.

PAPAUER fatium rubrum fimbriatum, Dalech.



PAPAUER fimbriatum, & cristatum, album, & nigrum. Lobell.



succum lacteum emittentia, qui effusus vna, aut altera die post flauescit: flores in summo caule vel candidos, vel leuiter purpureos, latioribus quaternis sapius foliis: deinde rotundum, magnum & oblongum caput, in quo semen album. Huius species quedam feritur in hortis flore speciosiore, oris eius cristatis, & fimbriatis, capitis etiam quæ operculo inest corolla, radiolis multis, argutioribus, & dentatim crenato ambitu. Cætera superiori prorsus similis. Papauer fimbriatum, & cristatum album, & nigrum Lobellius appellat. In calidarum & frigidarum regionum hortis satum maximus huius Papaueris prouectus, præsertim in agris maritimis, aut flatui maritimo obnoxiiis, quibus impendiò delectatur. Est ille duplò maior, niueo candore nitens, & tantò pulchrior flos, quem horri Belgij in deliciis habent ad coronamenta: non sanè alijs generis à fimbriato albo, aut nigro satius, nisi florum incisura & laciniis profundis, ferurâ per elegantem sortitur, quæ multipla serie maiores & confertiores, Rosarum dehiscentium æmula gratia, visum oblectantes, ipsis Maluæ hortensis pares floribus cernuntur. Color renidet albus, aut coccineus sanguineus, aut niueo cādore & rubore confusus: interdum ora cristata ex albo purpurascunt. Seminibus me donauit maximæ & optimæ spei non minùs peritus quàm nobilis Carolus de Croy princeps de Chimay, studiosissimus, & summus stirpium admirator. Papauer fatium nigrum, caule & foliis albo proximum, flores promit venustos, rubros, vel colore sanguineo saturo Pæoniæ, capita rotunda in quibus semen nigrum concluditur, vnde nigrum cognominatur. Satiuum istud etiam horri alunt, capitibus superiori satiuo albo tam similibus, vt non nisi è semine nigricante diffractis illis agnoscant pharma copci ipsi qui seuerint. Eius pictura ex Dodonæi Historia stirpium hic exhibetur. Officinis Papauer nigrum magnum dicitur, indoctis Papauer rubrum à florum colore, à Lobellio Papauer spontaneum siluestre, & hortense, semine interdum albo, interdum nigro. Hic etiam appinimus Papauer nigrum satiuum, flore Maluæ hortensis, aut Pæoniæ Penæ, & Lobellij, cuius seminis tutior est vsus in syrupo de Papauere, quàm Papaueris nigri spontanei,

Lib. 3. c. 80.

In Apped.

PAP AVER silueſtre,
ſive nigrum, Dodonæi.



In Hiſtor.
 purgant.

de quo mox. Quæadmodum autem albi ſatiui, ita huius nigri ſatiui differens quædam ſpecies eſt, quæ ſorum folia multū ſimbriata, & rubro colore nitentia gerit: item capitulorum corollas criſtatas, alioqui nec colore, nec magnitudine diſtat. Prætereà inter ſuperius album, inquit Pena, & rubrum indoctis nominatum, etiam quoddam eſt Officinis notum, quod nulla re diſcrepat, niſi paruis foraminibus patulis in ſuperna capitis parte, vnde elabitur ſemen. Papauer patulū vocant Pena & Lobellius. Dodonæo Papauer ſatiuum tertium eſt, caule, foliis, floribus & capitulo minus. Flos ex cærealeo, ac purpureo obſoletum, ac dilutū quendam colorem refert: capitulum quoque rotundum habet, ſed maturato ſemine foraminibus aliquot, qua parte operculum ipſi inſidet, in circulū hiat, facilè deſtuenti ſemini viam præbens: quod aliis duobus non contingit, quorum ita clauſi permanēt calices, vt nullum inde ſemen elabi poſſit. Hæc Dodonæus. Papauer ſpontaneum hortenſe, & ſilueſtre, Penæ, & Lobellij, in hortis prouenit, foliis minoribus, floribus dilutè rubētibus, ob-

ſoleto aſpectu: capitulis triplo minoribus, numeroſis: ſemine interdum nigro, interdum albo, quandoque hiantibus oſculis, quandoque occluſis & cohibentibus ſemen, quod parum gratum & probatum habetur, præſertim nigrum. Quare vt viroſius reiiciendum, & ſatiui nigri primi ſemine vtendum. Ex Papauere albo &

PAP AVER nigrum ſatiuum flore
Maluæ hortēſis, aut Pæoniæ, Pen. & Lob.



PAP AVER ſpontaneum ſilueſtre
& hortenſe, Pen. & Lobell.



nigro

nigro utroque lacryma, seu liquor gummosus, tum sponte, tum ex vulnere manat quem Græci *ρῆμα ἐξ ὀφθαλμοῦ*, & *ὀπιον* vocarunt. Eius colligendi ratio hæc à Dioscoride traditur. Cum ros in eo exaruerit, cultello stellam circūscribere oportet, ita ut ad interna vsque non perforet: à lateribus capitis in directum summā cutē incidere, exeuntem lacrymam digito in concham deradere, & non multò post redire: inuenitur enim concreta, & sequenti die sicca. Oportet autem ipsam in mortario terere, & in pastillos coactam reponere. Præterea ex capitibus vnà cum foliis tuis, & prælo expressis succū colligunt, quo in mortario trito pastillos effingunt. Meconium id appellatur, opio imbecillius. Quæ sic declarat Plinius. E nigro Papauere opos gignitur scapo inciso (Sic habent vulgata exemplaria, tamen capite inciso legendum videtur, ut caput incidi debeat, non scapus: sequitur enim, nec in alio genere ipsum inciditur caput, & sic habet Dioscorides) ut Diagoras suadet, cum turgescit: ut Iollas, cum deflorescit, hora diei sereni, hoc est cum flos in eo exaruerit. Incidi iubent sub capite, aut calice. Nec in alio genere ipsum inciditur caput. Succus, & hic, & herbæ cuiuscunque, lana excipitur, aut si exiguus est vngue pollicis, ut lactucis, (Hermolaus legit, aut lactucis, legendū tamē videtur ex Dioscor. aut conchis: succū enim *ἐκ τῶν ἀνθῶν* derasum excipere iubet) & postero die quod magis inaruit. Papaueris verò largior, densatur, & in pastillos tritus in umbra siccatur, non vi soporifera modò, verum, si copiosior hauriatur, etiā mortifera per somnum: Opion vocant. His Meconij parandi modum alium subiicit. Cum capita ipsa & folia decoquantur, succus is Meconium vocatur, multò Opio ignauior. Nunc Papauerum vires explicandæ. Papaueribus satiuis communis refrigerandi vis est, ut tradit Dioscorides. Quare folia & capita in aqua decocta fotu somnum accersunt. Bibitur & decoctum contra vigilias. Capita trita & cum polenta cataplasmatis mixta, erysipelatis & inflammationibus profunt. Oportet autem viridia ipsa tundere, & in pastillos cōformare, siccatoq; reponere, ac uti. Capita per se etiam ad dimidias in aqua decocta, dein iterum cū melle dum humor densetur, crassescatq; decocta, eclegma medicamentum efficiunt, dolorē mitigans in tussi, & fluxionibus arteriæ, & celiacis affectionibus. Efficacius hoc medicamentū redditur adiecto Hypocistidis succo, & acacia. Papaueris nigri semen tritū cum vino bibitur cōtra fluxiones alui, & fœminarū profluuiā. In peruigiliis fronti ac temporibus cum aqua illinitur. Opium magis refrigerat, spissat, siccatoq; & mediocri quantitate sumptum dolorem leuat, somnū conciliat, concoquit. Tussi atq; celiacis affectibus auxiliatur. Maiori copia haustū nocet, lethargicos efficiens, & interimit. Ad dolores capitis cū rosaceo perfusum facit. Aurium doloribus cum amygdalino, myrrha & croco instillatur. In oculorum inflammationibus cū tosto oui luteo & croco. Erysipelatis & vulneribus cum aceto: podagricis cū lacte mulieris & croco, sedi pro balano subditū somnū allicit. Erasistratus auctor est Diagoram vsum eius improbare in aurium dolore, & oculorum lippitudine, eo quod visum hebetet, & soporem gignat. Andræas verò ait, si non adulteraretur, excacari eos qui ipso illinerentur. Mnesidemus vsum duntaxat eius olfactū probauit, quī ad somnum conciliandum conueniat. Quæ falsa esse experientia deprehēdit, quū ipsi effectus viriū huiusce medicamenti fidē faciant. Hæc paulò aliter Plinius refert. Diagoras & Erasistratus in totum damnauere, ut mortiferum, infundi ventantes: præterea, quoniam visui noceret. Addidit Andræas non protinus excacari eo, quoniam adulteraretur Alexandriæ. Sed postea vsum eius non improbatum est, medicamento nobili quod Diacodion vocant. Deinde vsum medicum Plinius præscribit his verbis. Satiui albi calix ipse teritur, & è vino bibitur somnica causa.

Meconiu.

Li. 20. c. 18.

Vires &
Temper.
Lib. 4. c. 60.

Li. 20. c. 18.

Ibidem.

Podagris illinitur cū lacte mulierū. Sic & foliis ipsīs vtuntur. Item ad sacros ignes, & vulnera ex aceto. Ego tamen damnauerim collyriis addi, multoq; magis quas vocāt lexypyretas, quosq; pepticas & cœliacas. Nigrum tamē cœliacis in vino datur. Satiuum omnino magis rotundat capita. At siluestri longum ac pusillū, & ad omnes effectus valentius. Decoquitur & bibitur contra vigilias, eademq; aqua fouēt ora. Galenus, satiui Papaueris semen, inquit, mediocriter somnū cōciliat, visu candidum. Proinde pani ipsum inspergunt, tum melle maceratū edūt. Papauer nigrū medicamentosum est, admodū refrigerans. Aliud nigrū omnium est medicatisimū, tum semine, tum caliculis, tum foliis, tum succo. Validē enim refrigerat, ad stuporē vsque & mortē perducens: est enim ex quarto & ultimo refrigerantiū ordine. *Μηλον νεφεστις*, id est, Papauer corniculatū, ab Oribasio & Aëtio Paraliū, ab aliis Papauer siluestre, aut marinū appellatum, ex Dioscoridis descriptione folia habet alba, hirsuta, Verbasco similia, in ambitu serrata siluestris Papaueris modo: caulē similē: florem pallidū: fructum longū, cornu modo inflexum, Fœnigræci fructui similem, vnde nomē accepit: semen paruum, nigrum, Papaueris: radicem per summa terræ, crassā, nigram. Nascitur in maritimis & asperis. Id in maritimis Senensibus Crassetano & Orbetellano agro, & circa Herculis portum in Argētario promontorio, itē Adriatici maris litore non longē à Timauo fonte, & Tergesto, saxoso litoris tractu copiosissimum prouenire scribit Matthiolus, atq; etiam in hortis & viridiariis feri. Idem Clusius & Dodonæus corniculatū Papauer agnoscunt, quod maius est, inquit Dodonæus. Reliqua Papauera candidis & ambitu infractis ac laciniosis foliis satis refert, non tamen lauibis, sed nonnihil lanuginosis, instar fere foliorum Verbasci: caules infirmiores breuiorēsq; in multas alas diuiduntur: flores ochri colore luteo pallent, quos excipit nō capitulū, sed tenue, oblongū, incuruūq; corniculū, siue siliqua, in qua semen nigricans: radix subest lōga, crassior. Præter istud vulgare corniculatū Papauer, duo alia obseruata sunt à Clusio & Dodonæo genera. Prius folio est Erucae modo laciniato & altē inciso, vulgari minore & tenuiore, neque adeo candicante, sed hirsuto: caules interdū vulgari non minores, teneriores tamē, & graciliores, procumbentes: flores etiā minores interdū intenso colore rubent, interdū languidiore (præsertim in eo genere quod per omnia tenerius est &

PAPAVER cornutum,
Matthioli.

Li. 7. simpl.



Li. 4. ca. 61.

PAPAVERIS corniculati
species, Dodonæi.


In Histor.
purgant.



PAPAVER corniculatum
alterum, Clusij.



PAPAVER corniculatum
violaceum, Dodon.



est & minus) nōnunquam etiam pallido sunt colore, mediis foliis ad phœniceum
vergentibus: cornicula praelonga, quibus veluti opercula quædam insident latius-
cula, in iis semē nigrum Papauere maius, radix oblonga, candicans. Nascitur in
agro Salmanticēsi iuxta vias & agrorum margines. Floret Iunio, semē Iulio pro-
fert. In Belgio satum nō nisi Augusto & Septembri floret, interdum etiam seriū.
Minimē autem croceo succo turget, vt quidam putauere. Illud quod florem habet
pallidum & phœniceum in Viennensi agro sponte nascitur inter Auenas, eaque
minutim admodum dissecta, neq; candicantia, sed viridia: cauliculi tenelli & sub-
hirsuti: flos superiori non minor, cærulei ex purpureo coloris saturati, & nigre
Violę æmuli, fugax admodum, & qui leuissima aura excutitur: huic succedunt cor-
nicula digiti duntaxat longitudine, plerumq; etiam breuiore, exilia, duriuscula, ri-
gidiūque hirsuta, in quibus continetur semē exile admodum, colore ex cæruleo
nigricante: radix tenuis est & inutilis. Inuenitur in multis Hispaniæ locis, sed non
nisi inter segetes, & Maio mense floret, in Belgio multò seriū, & in totum multò
minus ac tenerius. Hęc Clusius, qui istud postremum Papauer se collegisse ait in
agro Narbonensi inter Auenas prope Latera oppidum, secus flumē Ledum, à Ca-
stellanis vocari *Rosetta*, à nonnullis *Amapolas moradas*, id est, Papauer flore violaceo,
à succi mororum colore. Perperam, inquit Lobellius, corniculata Anemone ma-
ior à Pena dicitur, cuius flos minùs bene expressus in Aduersariis. Corniculati Pa-
paueris radix, vt tradit Dioscorides, in aqua decocta ad dimidias, & pota, vim ha-
bet coxendicum & hepatis affectus sanandi: prodest iis qui crassa quædam aut ara-
neosa cum lotio reddunt. Semē acetabuli mensura cum aqua nullā potum alium
leniter purgat. Flores & folia cum oleo imposita crustas emarginant: pecoribus
illita argema & nubeculas repurgant. Postremus est *μικρον ἀρρωστης*, Papauer spu-
neum, aliis Heracleum, vt iam diximus, non perinde vt cætera notum. Caule est
dodrantali, vt describit Diosco. foliis admodum paruis, herbæ Lanarię similibus,

*Vires &
Temper.*

Papauer
spumeom.
Lib. 4. c. 62.
Forma.

Vires.

Lib. 7. sim,

fructu circa ipsa albo, sed & tota herba alba est, & spumea, radice alba, per summa terræ hærente, Huius fructus colligitur æstate cum plenè maturuit, & siccatus decidit. Purgat per vomitus, si acetabuli mensura cum aqua mulsa bibatur: quæ purgatio priuatim comitialibus prodest. Eadem sic breuiter tradit Galenus. Papauer cornutum vim habet incidendi & abstergendi. Itaque radix herbæ in aqua decocta ad dimidias hepaticos affectus adiuuat. Porro folia & flores sordida admodum & contumacia vlcera iuuant: sed ea reiicere oportet veteribus iam repurgatis. Nam tam validè abstergunt, vt puras carnes colliquent. Hoc virium robore non sordem duntaxat, sed & crustam vlceribus detrahit. Papauer Heracleum semen habet pituitam expurgans. Opio aut meconio largius epoto consequitur venter cum perfrictione & pruritu vehementi: itaque sæpe inualecente veneno, tanta erumpit prurigo, vt hominem excitet. Corpus id medicamentum olet. Remedio sunt post citatam oleo vomitionem acres clysteres, acerrimumque mulsum cum sale potum, aut mel cum rosaceo calido. Merum cum absinthio aut cinnamomo copiosum, aut calidum per se acetum. Alia plura remedia tradunt Dioscorides & Auicennas. Corniculatum Papauer cibo & potu eadem inferre consuevit quæ opium, nec aliis expugnatur remediis.

ANEMONE.

CAP. II.

Has duas Anemones figuras, quas Pena diligentia nos debemus, propter floris similitudinem, qualis ferè in Papauere spectatur, Papaueris generibus adiecimus, quamuis suus locus esset inter Anemonas alibi descriptas & particulatim explicatas.



NOTISSIMÆ verò apud Narbonenses duæ primo intuitu Papaueris Rhœadis florem ostentant, in cultis præsertim, quarum maior folia habet etiam Coriandri diuisura, sed Papaueris Rhœadis modo hirsuta, in caule pedali & sesquipedali: flores verò ex rubro in purpu-

ANEMONE maior
Pena corniculata.



ANEMONE minor,
Pena.



reum

reum violaceum deficiunt, quos perquam tenellos Papaueris Rhœadis ritu vel lenissimus auræ appulsus celeriter aufert, remanente tereti hirsuto longiore corniculo, cornuti Papaueris non dissimili, sed minore & graciliore: quasi natura alludere voluisset isto descripto ad Papaueris cornuti siliquas, & altero ad Argemonæ glomerata capitula, in acutum fastigiata, non operculo munita, ut Papauera omnia sunt. Minor autem delicatior caule non dissimili, minutior folio & diuisura quam Coriandri, valde quam hirsutis & satis rigidis, hirsuta capitula, flore eleganti relincente multò minora quadantenus similia Rhœadis Papaueris: semine nigro Hyoscyami: radice pusilla, superiori haud dispari, quibus si tuberculum adesset nullæ notæ deessent: ac si non sint Anemones, sanè vix sint vllæ propiores aut illis, aut Argemonæ, aut non hæ putandæ sint, vel suspicandum capite de Anemone duo genera descripsisse Dioscoridem. Quorum vnum radice sit tuberosa, alterum nò dissimili Rhœadi: quod videntur innuere verba initio, deinde confirmare, ubi discrimen ponit Papaueris, Argemonæ & Anemones, huius tuberculi nulla interim facta mentione, cum tamen maximè oportuit: quare fortè idem illi cõgigit, quod Drabæ radici, quæ alicubi tuberosa, aliubi plana & æqualis visitur. Idcirco à Monspeliaceis Medicis veræ putantur, frequentésque inibi oriuntur in vinetis ac veruactis, præsertim iuxta prædium Præceptoris & harum seduli vestigatoris D. Aslatij, qui cum aliis multis opinabatur illam Germanicam & recentiorum Anemonem, stellatis luteis Ranunculi floribus & semine, radice multis bulbulis tuberosis Bulbocastani donatâ, speciè esse bulbosam Batrachij: nã tametsi eiusdem flores interdù albi aut purpurei sint, tamen nihil fermè habet tota quòd quadantenus præferat Papauer Rhœas: sunt enim folia Geracij columbini aut Ranunculi, cuius vrentem facultatem itidem habet: quapropter illuc nos referendum duxissemus, nisi à Galeno memorata Anemone luteo flore nos suspensos sententiæ de hac planta magis quam certos retinuisset.

An Gal.
Anemone
lutea lib.
κατὰ τὸν
eandem sit
Germani-
cz.

H Y P E C O V M.

C A P. I I I.



QUOD Græci ὑπὸ κρονον & ὑπόφρον, Latini quoque Hypocoum dicunt. Nascitur, inquit Dioscorides, in segetibus & aruis. Foliū habet Rutæ simile, ramos paruos. Vim habet respondentem Papaueris succo. Plinius eadem planè tradit. Hypocoum in segetibus nascitur, foliis Rutæ. Natura eius eadem quæ Papaueris succo. Galenus Hypocoum vim habere refrigerandi scribit, & ex tertio esse refrigerantium ordine, ut parum absit à Papauere. Herba hæc paucis aut nullis herbariis nota est. Eam tamen quæ hic picta est pro genuino Hypecoo Matthiol⁹ proposuit. In aruis provenit, foliis Rutæ paulò maioribus, caulibus exiguis, mollibus, hirsutis, in quibus sunt flores, in luteum pallescentes, etsi prope calicem purpurei spectentur, in quorum medio flocculus erumpit, colore aurum æmulans, visu iucundus. Floribus succedunt capitula tenui inuolucro contexta, in quibus semen concluditur nigrum, asperum, Pseudomelan-
thio

thio proximum. At folia Rutæ huic esse *ἀνθίστα* ipsa falsum esse demonstrat. Præterea viribus opij præditum non esse gustus docet: nam gustanti potus insipidum quiddam & ignauum linguæ relinquit, ab opij amarore horrido prorsus alienum. Qui explorarint gustu, humidum tantum & calidum secundo ordine facillè dicent. Hæc fortasse altera est Argemone Tragi. Est Alcea peregrina Penæ & Lobelij, descripta in Horto cap. de Alcea.

HYOSCYAMVS.

CAP. IIII.

Nomen



RAECIS *ὕοσκάμος*, Latinis Hyoscyamus, Apollinaris, Arabibus, Plinio teste, Altercum, siue Altercangenum dicitur, Arabibus Medicis *Bengi*, Officinis corrupta voce *Iusquiamus*, Gallis *Iusquiamæ* & *Hanebane*, Germanis *Bilsamkraut*, & simpliciter *Bisen*, Italis *Iusquiamo*, Hispanis *Velenho*. Hyoscyamum autem, id est, fabam porcina Græci videntur appellasse, quod Æliano auctore pastu huius herbæ conuellantur fues apriue, præsentis mortis periculo, nisi copiosa aqua statim se foris & intus proluerint: adcentes aquas, non ut proluant se tantum, verumetiam ut cancos venentur: eos enim nacti protinus sanitati restituntur. Apollinarem verò Latini ab Apolline medicinæ inuentore dixerunt, vel quia opplet cerebrum viroso ac fœtido halitu, eoque mentem percellit, quasi Apollinis æstro: Altercum autem ab altercando, Scribonio teste, quia cum verborum altercatione rixæque se torquent Hyoscyamo dementati. Tres Hyoscyami differentias assignat Dioscorides. Vna flores fert subpurpureos, folia Smilaci similia, semen nigrum, cytinos duros ac spinosos. Altera flores luteos, folia & siliquas simpliciores (vulgati codices habent *ἀπλωτέρα*, vetus & Orbasius *ἀπλωτέρα*, id est, teneriores) semen sublauium velut Irio. Tertia pinguis, tenera, lanuginosa, flores albos & semen album gignit. Nascitur in maritimis & ruderibus. Plinius quatuor recenset genera, cum secundum & quartum vnum & idē sit. Herculi eam quoque adscribit, quæ Apollinaris, apud Arabas Altercum

Li. 4. c. 64.

Genera.

Lib. 25. c. 64.

HYOSCYAMVS, Math.



Lib. 4. c. 64.

Forma.

siue Alterchægenum, apud Græcos verò Hyoscyamus appellatur. Plura eius genera. Vnum nigro semine, floribus penè purpureis, spinosum. Talis nascitur in Galatia. Vulgare autem cædidius est & fruticosius, altius Papauere. Tertij semen Iriionis semini simile: & omnia insaniam gignunt, capitisque vertigines. Quartum genus molle, lanuginosum, pinguius cæteris, cæd di feminis, in maritimis nascens. Hyoscyamus, ut describit Dioscorides, frutex est caules emittens crassos, folia lata, oblonga, incisa, nigra, hirsuta: per caulem deinceps flores prodeunt veluti mali Punici cytini, clypeolis septi, semine ut Papaueris plenis. Quod floribus hîc tribuitur, id seminis conceptaculo tribuendum videtur: hoc enim scutulis contegitur, & semen intus continet, non autem flores. Serapio id demonstrat de fructibus scribens, quod hîc de floribus, his verbis. Et super ramos eius in lateribus est fructus similis balaustix in figura sua sortitus super ramos ipsos æquedistantes per ordinem, super quem fructum est operculum simile

simile scuto, & ipse fructus est per ordinem, plenus semine simili semini Papaue-
ris. Niger familiarissimus calidis & frigidis regionibus, vbiuis in Europa gigni-
tur secus vias, locis sabulosis & incultis. Folia profert ampla, longa, lata, cinerea,
mollia & flaccida, lanuginosa, laciniata & marginibus altiùs incisà, crassa, succu-

HYOSCYAMVS albus,
Matthioli.



HYOSCYAMVS niger,
Matth. Luteus, Dodon.



lenta: caules crassos, cubitales & bicubitales, ra-
mosos, quos flores continua serie digesti ve-
stiunt, patentibus calathis similes, colore per
margines subluteo, discurrentibus vnà purpu-
rascentibus aliquot venis, in medio verò ex ob-
scuriorè purpura nigricantes, quibus calices suc-
cedunt rotundi, oblongi, crassi, ventricosi, su-
perius operculati, & aculeati, in quibus semina
haud ita magna, colore pullo: radix crassa, pro-
lixa albicat, erutu facilis, & ad anodyna mul-
tùm utilis, minùs foetens & obnoxia putredini,
quàm reliqua planta, quæ grauis odoris est, ca-
put grauans & somnolentiam inducens. Hunc
Dodonæi, Penæ, Lobellij Hyoscyamū nigrū ex
Matthio. pictū damus, qui Hyoscyamum sim-
pliciter vocat. Candidus rarior est: quare in
hortis Galliæ & Belgij feritur & colitur. Is ta-
men in maritimis ruderibus asperis prouenit
Narbonensis Galliæ, præsertim vbi Rhodanus
in mare influit. Eadem propemodùm facie est
& magnitudine qua niger: sed eius folia latio-
ra sunt, rotundiora, molliora, hirsutiora, non-
nihil quoque circumfusa ac sinuata, quamuis
minùs: cauliculi breuiores: flores per caulicu-
los & in summitate candidi, minores, radices
læues: calyces non spinosi: semen candidius.
Hunc etiam scitè pictum dedit Matthiolus. Is
nouam quandam plantā inter Hyoscyami ge-
nera à quibusdam numerari scribit, quæ caules
edit sesquicubitales, rotundos, tenui obductos
lanugine, ramosos: folia ampla, pingua, tenui
pilo referta, mollia, Solani somniferi speciem
quandam referentia, odore graui: flores luteos
Hyoscyami æmulos, è quibus capitula subro-
tunda oriuntur, qui quandam Hyoscyami spe-
ciem præferunt: nam & similibus ferè scutul-
is concluduntur, coronato vndique orificio,
& semine intus subflauo. Radice nititur alba,
spithamæ longitudine, & digiti crassitudine,
numerosis fibris. Hyoscyamum nigrum vocat,
Dodonæus luteum, cuius caulis simplicior, in-
quit, folia indiuisa, minora, lata tamen & oblon-
ga, Solani lethalis, maiora, candidiora, ac mol-
liora: flores in cauliculorum fastigiis incondi-
ti luteo pallentes colore, aliquantò minores
quàm nigri, vascula ferè similia, sed minora. te-
neriora,

HYOSCYAMVS III.

Matthioli.

Histo. put-
gant.HYOSCYAMVS Peregrinus,
Dalechampij.Li. 4. c. 64.
Vires &
Temper.

pressusque in sole siccatur. Vſus eius ad annum vsque: facile enim putrescit. Exprimitur priuatim etiam succus ex arido semine calida aqua persuso, tuso & expresso. Est verò succus hic antedicto præstantior, & magis dolores finit. Herba autem virens contusa, & trimestris tritici farinæ mixta in pastillos conformatur,

neriora, & spinis carentia, semen pallidius, subflauum, vt Irionis pusillam. Dubium Hyoscyamum Pena & Lobellius appellant. Ego verò plantam istam minimè ad Hyoscyami genera referendam esse censeo, cùm vtriusque facultates ex diametro pugnent: huius enim semen est acre, folia acris admodum, & mansa feruorem ori diu inurentia, qui non nisi longo tempore extingui possit, id quod caliditatem insignem testatur. Ad Nicotianam propius accedit, de qua in Peregrinis. Quare perperam à Dodonæo Hyoscyamum Peruvianum appellari puto, nec eius generibus rectè adscribi, quòd in eius foliis insignis acrimonia deprehendatur, qua digerunt, resoluunt, discutiunt, vt experientia compertum mihi est. Ea verò calidæ naturæ, non stupefacientis ac frigidissimæ, sunt opera, qualis est Hyoscyami. Plantam aliam hîc depictam Herbarij quidam ad Hyoscyami, alij ad Solani species referunt. Herba rara est, & foliorum & fructus figura insignis. In vmbrosis & densis Apennini siluis reperitur, foliis oblongis, per ambitum sinuosis, venosis, ternis ferè simul ex internodiis per caulem prodeuntibus, teretem, digiti crassitudine, ferè cubitalem: fructu in caulium vertice rotundo, exiguo malo simili, pruni magnitudine, rubescente, semine pleno. Vires & eius natura adhuc incogni præteritisissimæ ac elegantissimæ picturæ genere (illuminationē vocarunt maiores nostri (in vetusti codicis manuscripti membranis, quæ multarum stirpium ita pictarum imagines ostendunt, hæc herba proponitur rudius expressa nomine tituloq; Apollinaris. Qui describit ita dictam notat ab Apollonio Philosopho, qui eam Platoni monstravit, eamq; Græcis vocari Strygnion Malchion (Styrchnon Manicon) & Dorigion (Doricnion.) Hyoscyamus semine nigro, & is qui semine est subflauo, auctore Dioscoride, insaniam inducunt, caput sapore percellunt, & noxij sunt. Albus ad medicum vsum vtilior: si verò desit, vten dum subflauo. Niger pessimus improbandus. Exprimitur succus ex tenero semine (addit vetus codex τὸ λευκόν, id est, albi Hyoscyami) foliis, caulibusque, in quem vsum tunduntur omnia, ex-

& recon

& reconditur. (In antiquo legitur, ἡ δὲ χλωρὰ κοπεῖται καὶ μετὰ σσημαίνω ἀλεύρω, ἡ πηγάνω. Id est, Herba viridis tusa, & mixta farina Sefami aut Rutæ.) Prior succi expressio, & quod à sicco semine exprimitur, collyriis dolorem lenientibus commode miscetur, & contra acres calidasque fluxiones, dolores aurium & vuluæ vitia: cum farina autem & polenta, contra oculorum, pedum, aliâsq; inflammationes. Semen eadem potest. Facit ad tussim, destillationem, oculorum fluxionem, vehementes dolores, muliebria profluua, aliâsq; sanguinis eruptiones, oboli pondere cum Papaueris semine & aqua mulla porum. Confert podagris, testibus inflatis, mammisq; à partu turgentibus, si tritum cum vino illinatur. Miscetur vtiliter & aliis cataplasmatibus dolorem leuantibus. Folia omnibus medicamentis dolorem sedantibus per se, & cum polenta mixta vtiliter illinuntur. Recentia ad mitigandos omnes dolores illinuntur. Tria aut quatuor cum vino pota, hepîalas febres sanant. Decocta olerum modo, & hemina mensura comesta, mediocrem insaniam gignunt. Idem efficere tradunt, si in colo vlcus habenti quis per clysterem infundat. Radice in aceto decocta dentes in dolore colluuntur. Plinius eadē ferē tradit. Hoc (quartum genus) recepere medici: item rufi seminis. Nonnunquam ante candidum rufescit, si non ematuruit, improbatûrque. Et alioqui nullum, nisi cum inaruit, legitur. Natura vini (mendose, legendum enim, Natura veneni, vt sequentia declarant) ideoque mētem capûtque infestans. Vfus seminis & per se, & succo expresso. Exprimitur separatim, & cū caulibus foliisq; vtûtur & radice, temeraria in totum (vt arbitror) medicina. Quippe etiam foliis constat mentem corrumpi, si plura quàm quatuor bibantur. Etiam antiqui in vino febre depelli arbitrabantur. Et oleum fit ex semine, vt diximus, quod ipsum auribus infusum tentat mētem. Et aliis in locis. Hyoscyamus contra canum morsus valet, & in vulnera cum melle imponitur. Contusum cum foliis ex vino datur peculiariter contra aspidas. Eius succus sanguinem excreantibus medetur. Nidor quoque accensi tussientibus. Breuius sic Galenus. Hyoscyamus, cui semen atrum est, insaniam ac saporem adfert: is cui semen mediocriter flauum est, propinquam ei facultatem habet. Verum vtrique fugiendi sunt, vt inutiles ac deleterij. Cæterum cuius semen ac flos candidus est, ad sanationes maximè idoneus est, ex tertio quodammodò ordine refrigerantium. Hyoscyami epoti noxæ auxiliatur aqua mulla copiose data auctore Dioscoride, lacque, præsertim asininum: si desit, caprillū, vel bubulum, vel aridarum ficuum decoctum. Faciunt etiam ad id nuclei pinei: item Vrticæ semen, Intubus erraticus, sinapi, nasturtiū, cæpa, allium, & hæc singula cum vino sumuntur. Postea sinendi quiescere, quemadmodum qui vinum biberunt vt excoquant.

Lib. 25. c. 4.

Lib. 8. sim.

Lib. 6. c. 15.

SOLANVM.

CAP. V.

DE Solanis, quæ in hortis vel circa hortos crescunt, in Horto tractauimus, nunc de venenatis. Primùm de somnifico siue soporifero, quod etiam Halicacabum nonnulli appellant, inquit Dioscorides. Fruticat id ramis multis, densis, caudicosis, fractu contumacibus, pinguium foliorum Cotoneæ mali similium plenis: flore grandi, rubro: fructu ac folliculis crocato: radice magna, subrubro corrice vestita. Nascitur in saxis non procul à mari. Has omnes notas in plantam hîc pictam competere Matthioli putat, ideoque legitimū esse le Solanum somnificum Dioscoridis asserere non dubitat. Numerosis enim ramis fruticat, inquit, densis, furculosis, fractu contumacibus, foliis multis, subpinguibus, Coroneæ mali haud absimilibus, floribus subrubentibus, caules per interualla verticilli modo amplectentibus: fructu crocato,

Nomina

Lib. 4. c. 68.

Forma.

bacie figura in folliculis hirsutis concluso. Radix subest longa, vegetaque, brachiali quandoque crassitudine, cortice subrubente circumvestita. Nascitur in maritimo tractu, locis plerumque saxosis. Hanc plantam etiam Clusius nomine Solani somniferi descripsit, Lobellius eodem nomine pinxit. Aliam tamen Solani som-

*SOLANVM Somnificum,
Matthioli.*



*SOLANVM Somnificum
alterum, Matthioli.*



nifici speciem Matthiolus proposuit, hîc quoque expressam, foliis angustioribus, venosis, in terram inclinatis, caule anguloso, floribus tintinabuli figura, subpurpurascens, in ambitu denticulatis, & è longo prodeuntibus petiolo, ex quibus baccae prodeunt nigrae, aut ex nigro purpurascens, vinosae, minuto semine refertae, quemadmodum & reliquorum Solanorum acini. Hae viridi quodam calice ad medium usque ferè conteguntur, cuius ambitus coronae figuram refert.

Radicem habet grandem, strumosam, teneram, albicantem. Maio mense florere,

Lib 9. hist.
cap. 12.

Iunio fructum fert. Nascitur in agro Goritienfi Saluatino monte inter saxa. Theophrastus in descriptione Solani somnifici nonnihil à Dioscoride dissidet, cum scribit. ὁ μὲν ὑπνώδης τρύχνος ἐρυθρὰν ἔχει τὴν ρίζαν ὥσπερ αἷμα, ξηραίνουμένην διὰ λουκὴν, καὶ χαρπὸν ἐρυθρότερον κόκκῳ. φύλλον διὰ τριγυμᾶλλον ὅμοιον, ἢ μῆλεα τῇ γλυκίστῃ, καὶ αἰὶο διαστῷ, καὶ ἀνθὸν μίγας. Legendum, καὶ σπιθαμὴν μέγα. Sic Gaza legit, ut vox ἐρυθρομένην, quae legitur in vulgaribus codicibus post ξηραίνουμένην, irreptitia sit & delenda, vel superioribus addenda hoc modo, τὴν ρίζαν ἐρυθρομένην, vel ξηροῦτομένην, &c. atque ita conuertit. Vesicariae genus somnificum radice rubra sanguinis modo, sed cārida cum siccescit, fructu rubriore quam coccus folio Tichymalo simili, aut malo dulci, sed piloso. Verum pro κόκκῳ, etiam κρόκῳ legi posset, & pro ληλέα τῇ γλυκίστῃ, μέλω καυδανίῳ. Scribit enim Dioscorides huius Solani χαρπὸν ἐν τοσοῖς κροκίστῃ, id est, fructum esse in siliquis crocatum, & φύλλον ἐμπερὴ μέλω καυδανίῳ, id est, folia malo Cotoneae similia. Quare Theophrasti locus fortasse hoc modo conuertendus foret. Solanum somniferum radicem habet rubram cum effoditur sanguinis modo, cum inarescit, cāridam fructum magis rubrum, croci instar, vel rubriorem

briorē croco : folium Tithymalo simile aut malo Cotoneæ, sed densum, & palmi magnitudine. Quæ postrema Gaza omisit. Plantam, quam Herbariorum vulgus Solatrum maius nominat, Officinæ Solatrum mortale, quidam Solanum lethale, Galli *Solane mortel*, Germani *Dolkraut* & *Senkraut*, Veneti vulgò *Herba Belladonna*, Fuchsius & nonnulli eum secuti Solanum somnificum Dioscoridis esse putant.

Cap. 264.
Hiltor.

Qua de re hæc est Fuchsi sententia. Eam quidem plantam Solanum esse somnifi-

*SOLANVM Somnifi-
cum, Fuchsi.*



cum, quibusdam non sine magno errore Solanum esse credentibus hortense quod suis plurimum confert, & eas à lethalibus morbis confert ac tuetur. De quo non laborandum, sed quid in homine possit considerandum, cum constet pleraque animantibus cæteris esse cibum, quæ homini venenum sunt. Experientia verò compertum fuisse ait geminos pueros statim ex esu acinorū huius Solani mortuos esse. Quod fidē facere potest somniferum esse, præsertim cum tota ferè descriptio illi conueniat, hoc dempto, quòd semen non habet in siliquis croceum. Hortensis autem Solani notæ multæ illi non conueniunt : neque enim exilis est frutex, sed propemodum arborecens, neq; florem candidum habet, sed spadiceum : fructu verò & floribus ad Solani furiosi historiā accedere videtur, vt suspicio sit horum duorum generum historias esse confusas. Quam quidem auget Theophrastus, qui in eorundem descriptione nonnihil à Dioscoride variat. Quicquid sit, certum est Solani esse speciem, quod forma foliorum satis docet, atque huic vehementem refri-

gerandi vim, maxime si paulò copiosius sumatur, inesse, vt hoc nomine pro Solano somnifero eius vsus medicus nullo periculo esse queat. Quod si tamen hæc nonnullis haud satisfecerint, inquit Fuchsius, certè necesse est Mandragoræ speciem fateantur esse tertiam, quam pingit Theophrastus. Hæc ferè Fuchsius, à quo dissentit Matthiolus, nec hanc plantam Solanum somnificum Dioscoridis esse putat, quia fructum non fert in folliculis crocatum, quamuis eius bacca largius sumptæ interimant, & viribus iisdem quibus Solanum somniferum polleant, facie tamen maxime à sese distant. Eadem præterea vlla Mandragoræ specie cōprehendi posse negat, vt capite de Mandragora fusiùs ostendimus. Quare eam Solani quintam speciem esse antiquis incognitam putat Matthiolus. Eandem Dodonæus nec Solanum manicum, nec Solanum somniferum Dioscoridis, nec Mandragoram morion eiusdem esse arbitratur, sed potius Mandragoram Theophrasti. Gesnerus Solani genus siluaticum, Germanis *Schaffbeere*, & *Doluurtz* dictum, Italis *Belladonna*, sponte in Germania, circa siluas, alibiq; locis incultis abundare scribit, baccas aut potius poma ceraforum instar coloris è cæruleo nigricantis ferens, radiceq; crassa esse, viuaci proculdubio in hortis futura. Sed ne pueri fructus sua specie inuitantes deuorent vitæ periculo, vt in aliis Solanis, ita in hoc præcipuè cauendum. Quidā, inquit, mortale cognominant. Aliqui Morion esse suspicātur, vel potius Mandragoram Theophrasti. Ab hoc siluatico Solano non aliud esse opinatur Solanū somniferum. Tandem hoc adiicit, suum hoc Solanum legitimi quidem, sicut & Mandragoræ, omnibus suis partibus succedaneum esse posse. Cordus Solanum somni-

Lib. 3. hist.
cap. 90.

ferum hodie ignorari scribit. Id tamen certum esse plātam, quam ipse Amarodulcem, Germani *delinger ielieber* appellant, huic valde cognatam esse: foliis enim, florum forma, fructu & viribus (quas in seipso expertum esse ait) Solanum referre. De hac egimus in lib. de iis quæ in vicina scandunt. Sed ad Solanum somniferū Fuch-

Forma
Herbæ Bel-
ladonnadi
cæ.

si, aut quintam speciem Solani Matthioli reuertatur oratio. Id in montium sil-uis provenit, foliis hortensi Solano maioribus, caudice bicubitali tricubitalique, interdum maiore, subrutilo colore, numerosis ramis, alis multis concavis, in quibus flores oriuntur, longi, Luteæ digitalis floribus proximi, ex lōgo pediculo penduli, Campanulæ instar cōcaui, colore ex pallido purpurascēte, capillaceis intus staminibus. His flaccescentibus bacca suboriuntur, singulæ ex suis pediculis pendentes, insecto breuiq; caliculo comprehensæ. Maturescētes nigricant, acini vix magnitudine, pellucida exterius cute, vinoso succo refertæ, & numerofo minutō-

Forma So-
lani mani-
ci Diosco-
Lib. 4. c. 69.

que semine. Radicem fundit longam, crassam, albicantem, succi plenam. Solanum manicum, siue furiosum, folium habet Eruce simile, maius aliquātō, satis ad Acanthi folium accedens: caules à radice proceros emittit decem aut duodecim, vlnæ longitudine adolēcentes, caput in cacumine oliuæ figura, sed vt Plantani pilulæ hirsutius, verū minus latiusq; : florē nigrum. Postquam eo exuitur, racemus exit rotundus, niger, denis aut duodenis acinis constans, similibus Hederae corymbis, vt vix mollibus. Radice firmatur candida, crassa, caua, cubitali. Gignitur in montibus v̄to perflatis & plataneris. Id Solanū se non vidisse fatetur Matthiolus, quod & cæteris Herbariis fortasse ignotum est. De hoc sic Theophrastus. Ὁ δὲ μανικὸς

Locus.

Lib. 9. hist.
cap. 12.

ἔχει τὴν ῥίζαν, καὶ μακρὰν ὡς πῶχον, καὶ κοιλὴν. Id est, Solanum manicū radicem habet cādīdam, cubitalem, cauam. Et paulō pōst. ἔχει τὸ μὲν φύλλον ὅμοιον ἐν ὕψει, πλὴν μείζον, τὸν δὲ καυλὸν ὥσπερ ὀρνίθας, κεφαλὴν δὲ ὥσπερ γνήθους, μετρίῳ δὲ καὶ παχυτέραν. εἶοικε δὲ πλάτάνος καρπῷ. Id est, folium habet Eruce simile, sed maius, cau-lem quatuor ferē cubitos longum, caput Gethyi, maius tamen atq; crassius: simile autem est Plantani fructui. Quæ si quis cum Dioscoride conferat, ferē eandem huius Solani historiam comperiet, nisi quod Dioscorides habet, τὴν κεφαλὴν ἐπικε-μένην ὥσπερ ἐλάαν, διασπύραν δὲ ὡς πλατάνος σφαῖραν, μετρίῳ καὶ πλατυτέραν. Id est, caput in cacumine Oliuæ figura, sed vt Platani pilulæ hirsutius, verū maius latiusq;. Ex quibus intelligere licet in Theophrasto pro παχυτέραν legēdum esse διασπύραν, si- cut & Gaza legit, qui pilosius interpretatus est, vel πλατυτέραν, id est, latius. Solanū manicū copiosē in Ægypto nasci tradit Cordus, vnde ad nos adferuntur eius fru-ctus, quos pharmacopolæ *Cuculos de Leuante*, Galli *Coques de Leuant*, id est, Solanum Oriētale vocant. Nam Cuculus, inquit, idem est quod Cucubalus, id est, Solanum, *Leuante* verò Itali Orientem appellant. Antequam ad nos perferantur hi Cuculi, omnino exsiccantur nuclei interiores, & succosa caro quæ corticem ambit. Pisces quamprimū eos deglutierint, vertigine corripiuntur, & supini aquis innatant, ita vt faciliē manibus apprehendi possint. Aliis Cucuti siue Coccati Orientis cum Solani huius historia conuenire non videntur. De horum Solanorum facultatibus nunc dicamus, primū ex Dioscoride. Solani somniferi radice cortex in vino drachmæ pondere potus somnificam vim habet, opio mitiorem. Semen vehementer vrinam ciet. Corymbi duodecim hydropicis dantur. Si quid numero adiciatur, alienationem mentis faciunt. Remedio est aqua multā copiosa potui data. Succus (vel, vt alij legunt, φλοιὸς, id est, cortex) pastillis inferitur, & medicamētis quæ doloris leuamētum præbent: decoctum in vino, si in ore contineatur, dentiū doloribus auxiliatur. Radicis succus cum melle illitus, oculorum hebetudines tol- lit. Eadē tradit Galenus. Solani somnifici cortex radicis, si cū vino bibatur drach- mæ pōdere, somnū accersit, sed & ad cætera quoq; Papaueris succo persimilis est, nisi quod eousq; imbecillior est, vt ipse sit tertij ordinis refrigerantiū, cū hic in

Li. 4. c. 68.
Vires Sola-
somniaferi.

Lib. 8. sim.

quarto

quarto sit constitutus. Huius semen vrinam ciendi vim habet, verum si plus duodecim baccis hauseris, dementiam adferet. Plinius valentiorum refrigerandi vim huic tribuit, cum ait. Quin & alterum genus, quod Halicacabum vocat (Legendum ex Dioscoride, Quin alterum genus, quod & Halicacabum vocant) soporiferum est, atque etiam opio velocius ad mortem. Dioscorides dixit soporiferam vim habere opio mitiorem. Laudatum vero à Diocle & Euenore, à Timarchide etiam carmine, mira obliuione innocentia (Lege, mira obliuionis innocentia, nempe quam adfert citra perniciem) quippe presentaneum remedium ad dentium mobiles firmandos (Dioscorides dixit tantum ad dentium dolores valere) si colluantur. Halicacabo vni exceptionem addidit, ne diutius id fieret, delirationem enim gigni eo. Nec demonstranda remedia, quorum medicina maioris mali periculum adferat. Et paulo post. Halicacabi radicem bibunt qui sunt vaticinandi callentes, quia furere ad confirmandas superstitiones aspici se volunt. Remedio est, id enim libentius retulerim, aqua copiosa mulsâ, calida potui data. De Manici radice id non tradit Dioscorides, ut dicetur. Theophrastus etiam scribit corticem radicis huius Solani tussam & in vino maceratam, atque epotam somnum inducere. Solani somnifici Fuchsi, quam quintam Solani speciem esse Matthiolum arbitrat, baccarum deuoratarum homines in veternum inducunt, & in furorem agunt. Aiunt Empirici quidam aquam à tota planta destillatam, duorum aut summum trium cochleariorum mensura hauftam, internas viscerum inflammationes extinguere, nullo corporis incommodo: sed à largiore potu abstinendum. Ad erysipelata & alios calidos affectus confert. Contusa folia oculorum palpebrarumque phlegmonas leniunt. Siccarum radicis miram vim prædicat Matthiolum. Eius enim drachma crassiusculè trita, si in vino horis septem maceretur, & percolatum id vinum ieiunus quis hauserit, à cibo prorsus abstinebit, nec vllum vnquam carpere poterit, quoad acetum potauerit: hoc enim vnicum esse mali remedium. Solani furiosi radix, ut scribit Dioscorides, drachmarum vnius pondere pota ex vino, facit species vanas, imaginationesque non iniucundas obuersari. Sed duplicatus hic modus ad tres usque dies mentis alienationem adfert, quadruplicatus interimit. Remedio est aqua mulsâ copiosius pota, & vomitione reiecta. De eodem Galenus, Solanum furiosum, inquit, ad medicationes quæ intrò in corpus adhibentur inutile est. Nam si quatuor eius drachmarum sumptæ sint, mortem adferent, si pauciores insaniam. Vna certe innoxie sumitur: cæterum nec ipsa vtile quid obtinet. Verum si foris emplastri modo corpori illinatur, vlcera maligna & depascentia curat. Sed ad talia radicis cortex optimus est, desiccans secundo ordine iam completo, & tertio incipiente, refrigerans vero secundo incipiente. Plinius hæc de eodem prodidit. Tertio folia sunt Ocimi (ἐνζώμης Dioscorides, id est, erucarum, ut iam annotauimus) minimè diligenter demonstranda, remedia non venena tractanti: quippe insaniam facit paruo quoque succo (Dioscorides tradit id radice fieri) Quamquam & Græci auctores in iocum vertere: drachmarum enim pondere lusum pudoris gigni dixerunt, species vanas, imaginesque conspicuas obuersari demonstrantes: duplicatum hunc modum insaniam facere. Quicquid vero adiciatur ponderi, representari mortem. Hoc est venenum, quod innocentissimi auctores simpliciter Dorycnium appellauere, ab eo quod cuspides in præliis tingerentur illo, passim nascente. Qui parcius spectauerant, Manicū cognominauere. Qui nequiter occultabant, Erythron aut Neurida, ut nonnulli Perisson, ne cauendi quidem causa curiosius dicendum. Sed Plinij locum sicut in vulgatis exemplaribus legitur, emendabit & Dioscoridem illustrabit Theophrastus, ex quo vterque quæ de Solano dixit, mutuatus est. Ὁ δὲ μα-
νικὸς τρύχνος, inquit, οἱ μὲν θύρον καλῶσιν αἰλὸν, οἱ δὲ περὶ τὸν (Dioscorides habet θύρον &
πέριστον) λαβὴν δὲ ἔχει τὴν ῥίζαν καὶ μακρὰν ὡς πήχεος, καὶ κοιλὴν, διδόνται δὲ αὐτῆς, ἐάν

Lib. 21. c. 37.

Vires Solani
manici.
Li. 4. c. 69.

Lib. 21. c. 37.

μὴ δὲ οὕτως, ὥς τε παύσειν καὶ δοκεῖν ἐμψυχότατον δραχμῇ τῇ μὲν, ἐὰν δὲ μᾶλλον μαίνεται, & φαντασίας τινὰς φαίνεται. ὡς δὲ δραχμῇ, ἐὰν δὲ ὥς τε μὴ παύσασθαι μαρτυρούμενον, ἔστι ἐὰν δὲ ὥσπερ ἀποκρίσθαι, τέταρτος. Id est, Solanum furiosum alij Thyoron, alij Perisson vocant. Radice est candida, longa, cubitali cauā. Ea drachmæ pondere datur, ut sibi quis

DORYCNIVM *Monspeliense, Dalechampi.*



Nomina
Lib. 21. c. 31.

DORYCNIVM *congener*
planta, Clusij.



Lib. 4. c. 70
Forma.

illudat, placeatque, ac se pulcherrimum existimet. Duplicato pōdere magis insanit, vanis spectris animo obuersantibus. Triplicato perpetuæ subeunt furie. Si interimere volueris, quatuor drachmæ dandæ. Ex quibus intelligere licet non lufum pudoris, velut publica exemplaria habent, in Plinio legendum esse, sed simpliciter lufum, id est, τὸ παύσειν. Alij non abs re id à Plinio scriptū esse aiunt, quod drachmæ pōdere sumpto, mares inter dormiendū cum formosis puellis, fœminæ cum pulchris adolescentibus se rem habere somniant. Nulla tamen pudoris vox; imò ne vestigium quidem in vetere Plinij codice reperitur etiam Cornario teste.

DORYCNIVM. CAP. VI.



QUAM plantam Græci *δορυκνιον*, Cræteas *ἀλκμήαρον & χαλέαν* vocarunt, Latini quoq; Dorycnium. Plinius Dorycnij appellationem Solano furioso tribuit, & cur ita diceretur explicauit his verbis. Hoc est venenum (Solanum furiosum intelligit) quod innocentissimi auctores Dorycniū appellauere, ab eo quod cuspides in præliis tingerentur illo, passim nascente. Et Dioscorides Dorycnium à quibusdam Solanum manicū appellari ait. Videtur certè hæc vox communis omnibus quibus hastæ & tela inficerentur, quo celebriorem inferrent mortem: at cū harū plantarum vires diuersæ sint, diuersæq; earum descriptiones seorsum traditæ à Dioscoride, Galeno, Paulo, hanc ab illa differre perspicuū est. Est autem Dorycniū Dioscoridi, frutex Oleæ recens prodeunti similis. Nascitur in petris non procul à mari, ramis cubito maiorib⁹, foliis Oleæ simili colore, sed minoribus, solidioribus, vehementer asperis, flore albo. In summitate verò densos habet folliculos velut Ciceris, in quibus semina sunt rotunda quinq; aut sex, parui crui magnitudine, læuia, dura & varia: radicem digiti crassitudine, longitudine cubitali. Creditur hoc somniferum esse, sed copiosius haustum necare. Quidam aiunt semen in philtro amatoria assumi. Galenus scribit Dorycnium temperamento Papaueri simile esse, ac Mandragoræ & aliis ita refrigerandi vi præditis, ut in quo vincat aquea frigidas

giditas valde efficax. Quamobrè modicū quidē soporem conciliat, largiūs verò sumptū interimīt. Herbarij diuerſas plantas Dorycnium eſſe diuinarunt, à quibus mul. ū abeſt hīc depiētū, quod Moſſpelienſes docti Herbarij pro Dorycnio habēt. Gignitur hic frutex in aſperis, ſaxoſis, & editis locis non procul à mari, caulibus multis ex vna radice craſſa, lignoſa, multifida prodeuntibus, cubitalibus, nonnunquam altioribus, flexilibus & lentis Sparti modo: folijs paruis, oblongis, anguſtis, quaternis ſimul, per interualla caules & ramos circūdātibus Erythrodani modo, aut Aparines: flore in ſumo caulīū vertice inſtar vimbella: ferè circinato, è pallido ſubnigricāte, denſo, admodū paruo. Nondū explorata eſt huius fruticis facultas, vt ſomniferā ſit nec ne diiudicari poſſit. Guſtu inſipido eſt, vt etiā auctōr eſt Pena, & refrigerātis nō humectātis facultatis. Idē cū ſuperiore eſſe puto Dorycniū Hiſpanicū Cluſij, cui ferè ſimilē plantā in regno Valētino, & quibuſdā Baticæ locis naſci tradit, cubitalibus & viminis modo obſequioſis virgis, ſuperiore gracilioribus: folijs breuioribus & latioribus, breui pediculo ternis, aut quinis ſimul iunctis, & ramulos amplectentibus, guſtu ſalſo, & nō nihil acrimonix habēte: oblōgi ramuſculi ternos, quaternos, aut quinos flores ſuſtinent, medica maiores, colore viridi: alioqui tota planta candida eſt omnino & incana, magis etiam quā ſuperior.

MANDRAGORAS.

CAP. VII.



ANΔPAΓÓPAΣ Græcis & Κικκία, Pythagoræ ἀνθρωπομορφος, quibusdā ἀνίστατον, Latinis etiam Mandragoras, & canina, aut terreſtris Malus dicitur, Arabibus laboroſe, Tabrohae, Officinis & Italis Mandragora, Hiſpanis Mandracola, Gallis Mandragore. Circæ à Circe nomen inuenit, quoniam videatur radix ad amatoria conducere. Antropomorphos à forma humana, quoniam omnes ferè radices Mandragoræ à medio ad imum bifurcæ ſunt, vt cruribus hominū ſimiles videantur. Quare ſi quo tempore fructum ferunt effodiuntur, hominis cui brachia deſunt effigiem quadātē nus repræſentant. Duo Mandragoræ genera, auctore Dioſcoride. Mandragoras mas & candidus, & Mandragoras ſcæmina, ſiue niger, rridacias appellatus. Hiſ tertium addit Mandragoram nomine Morion. Mandragoras mas ſiue albus folia à radice capite profert magna Iuglandi, aut latifolia: Lactucæ æqualia, oblongiora tamen, mollia, læuia vt Betæ, in viridi candicantia, & circa radice caput per terrā ſparſa, ſecus quæ breues exeunt pediculi, in quibus flores pallidi & foliacei, latiuſculo calici inſidentes. Hiſ ſingula ſuccedunt poma, rotunda, paruis limonibus æqualia, colore ad dilutum aqua crocum inclinantia, carne ſuccoſa, qua cōtinentur pallida aut cæſia ſemina, pyri ſeminibus æqualia, non tamen acuminata, ſed modicè plana, & ab vna parte renum inſtar ſima. Radix ſub eſt perennis, grandis, longa, craſſitudine manum implente, in partes duas ſæpius diſtracta, foris pallida, aut in candido ſubſuſca, intus candida, carnoſa, ſuccoſa, & craſſo cortice veſtita. Odorem tota herba grauem ſpirat, præfertim poma, quibus ſuccus eſt aliquantulum guſtu vinoſus, ſubamarus, tam odore, quā ſapore caput grauās. Radix amareſcit, ſimulq; ſubdulcis eſt. Mandragoras niger, ſeu ſcæmina folia habet maris inſtar per terram ſparſa, minora tamen & anguſtiora, tenuifolia: Lactucæ ſimilia, ſed hiſ quoque ſimiora, mollia, odore graui, ac in viridi colore nigricantia, ſecus quæ pediculi, flores & poma ſunt albo Mandragoræ ſuccoſa carne ſeminibūſque ſimilia, colore verò paulò pallidiorē, duplò minora, ſorbis, aut paruis meſpilis noſtratibus æqualia. Radicem habet perennem, priori ſubſtantia & figura ſimilem, ſed minorem, in duas aut tres inter ſeſe implicatas partes diuiſam, foris nigricantem, intus candidam, quæ ſapore prioris radici reſpondet. Hæc proculdubio ſunt Mandragoræ genera, à Dioſcoride expreſſa hiſ verbis. Mandragoras niger, quæ

Nomina

Matthi. in
li. 4. Dioſc.
cap. 71.Li. 4. ca. 71.
Genera.

Forma.

Lib. 4. c. 71.



fœmina existimatur, angustioribus est foliis, ac minoribus quàm Lactucæ, virosis ac graueolentibus, per terram dispersis, atque inter ipsa mala forbis similia gerit, pallida, odorata, in quibus semen veluti pyrorum: radicibus hæret bene magnis, binis, ternisve inter se conuolutis, nigris foris, intus albis, crasso cortice vestitis: caulem non fert. Alter candidus, qui mas dicitur. Huius folia magna, alba, lata, læuia vt Betæ: mala quàm alterius duplò maiora, colore in crocum inclinante, iucundè cum grauitate quadam olentia, quorum pomorum cibo aliquantùm opiliones soporantur. Radix alterius similis maior & candidior, orbata & hæc caule. His

Li. 25. ca. 13. consentanea sunt magna ex parte quæ Plinius tradidit. Mandragoram, inquit, alij Circeium vocant. Duo eius genera: candidus qui & mas, niger quæ fœmina existimatur, angustioribus foliis quàm Lactucæ, hirsutis & caulibus, (legendum, hirsutis, æqualibus, non, & caulibus: vtrique enim Mandragoræ caules defunt. Prætereà hirsuta folia malè dixit, quasi *Μανδραγώ* legisset: neutrius enim folia hirsuta sunt, vt ex Dioscoride liquet) radicibus binis, ternisve rufulis, intus albis, carnosis, tenerisque, penè cubitalibus. Ferunt mala Auellanarum nucum magnitudine, & iis semen ceu pyrorum. Album hoc alij Arsen, alij Morion, alij Hypophlomon vocant. Huius folia albà quàm alterius latiora, vt Lapathi satiua. Quæ Mandragoræ nigri poma Dioscorides *ῥοῖς ἐμπερῆ*, id est, forbis similia facit, Oribasius etià *ῥοῖς* & achradibus comparat: quorum prius ad magnitudinem & formam, posterius ad figuram tantùm referendum videtur. Marcel. Vergil. *ῥοῖς ἐμπερῆ* legit, id est, ouorum vitellis, vt ipse interpretatur, similia. Sed & *ῥοῖς* malè legit, & hæc vox, oua, non ouorum vitellos significat. Prætereà omnes probati codices & Oribasius *ῥοῖς* habent. Serapio Mespilum interpretatus est, quod vitiū non Serapioni, sed ipsius interpreti adscribendum. Plinius hæc mala nucum Auellanarum magnitudine esse scribit. Idem Mandragoræ fœminæ caules tribuit, cùm vtrumq; Dioscorides *ἄχουλον* esse dicat. Quare Cornarius in Plinio hirsutis, excaulibus legendum esse crederet, nisi rursus sequeretur, Succus fit & ex malis, & è caule, &c. vt Plinius caulem ipsi omnino attribuat. Nam quæ de Mandragora tradidit, partim ex Dioscoride,

Lib. 11.

Embl 65.
li. 4. Diosc.

ride, partim ex Theophrasto transcripsit, qui etiam in Mandragora caulem agnoscit. τῶν δὲ ἄλλων, inquit, τὰ μὲν ὁμοιότερον τὸ τῶν καυλῶν ἐχέει, καὶ θάπερ ὁ μανδραγόρας, καὶ τὸ κώνιδον. Id est, Reliquorum autem quædam similiorem huic (Ferulæ) caulem habent, veluti Mandragoras, & Cicuta. At Theophrasti Mandragoras à Dioscoridis Mandragora plurimum distat. Quod cum Plinius non animaduertisset, ex utroque transcribens, vtriusque Mandragoram confudit. Maximam autem vtriusque Mandragoræ differentiam hæc perspicue demonstrant. Dioscorides Mandragoræ nigri fructus sorbi magnitudine, & pallidos esse dixit: albi verò fructus siue mala duplò maiora, & colore in crocum inclinante depinxit, ac vtrūque sine caule. Theophrastus apertè Mandragoram caulem habere scripsit, vt ostendimus, ἰδίον δὲ τὸν καρπὸν τῆς μανδραγόρος, τῶ μέλῳ τε τῆς ραγώδης, καὶ δινώδης εἶναι τῶ χυμῷ. Id est, peculiarem autem ei fructum esse, quod niger & Acino vix similis, & vinoso sit succo. Quæ non satis rectè sic conuertisse videtur Gaza. Fructus Mandragoræ peculiariis, quod niger racematus, vinosusq; suo sapore sentitur: ραγώδης enim non racematū neque racemosum significat. Nam ῥαξ, ῥαγὼς, vt alibi declarauimus, vix acinum propriè designat, id est, vix fructum, qui ex succo, carne, vinaceis, & ambiente cute constat, non totam vix, siue racemum, vnde ραγώδης vix acino similem Græci intelligunt. Ruellius hunc fructum effigie esse oui, non, vt Theodorus vertit, racemi, apud Theophrastum legendum esse censet, magno errore: integer enim est hic Theophrasti locus. Quare nemo miretur, aut alterutrū auctorem insimulet, quod tam contraria de Mandragora scripserint. Quisnam autem sit Theophrasti Mandragoras ab Herbariis ambigitur. Cordus tertiam Mandragoræ speciem, quæ priuatim Morion dicitur, Theophrasti Mandragoram esse censet. Grandem, inquit, radicem habet, caulem procerum: folia Solani & Mandragoræ nigri foliorum mediam habent figuram. Flores profert nigros, & post hos nigros fructus grandi vix acino æquales, qui vinosum succum emittunt. Vidisse ait hanc plantam in Hæsiæ vmbrosis & antiquis siluis iuxta speluncas natā, Hæsiis *Dollkraut* dictam, quo nomine Græcorum Morion interpretantur, alii etiam *Schaffbeer*, quoniam fructus eius soporem faciunt. Hanc plantam Solanum siluaticum Gesnerus appellat, Itali *Bella donna*. Quidam, inquit, Solanum mortiferum, alii qui Morion esse suspicantur, vel potiùs Mandragoram Theophrasti, vt in superioribus fusiùs diximus. Fuchsius Solanum mortiferum esse arbitrat, vel certè tertiam Mandragoræ speciem quam pingit Theophrastus. At Solanū somniferum non esse ex Matthiolo iam ostendimus: nec Mandragoram Morion rectè dici posse (omnia enim quæ de Mandragora suo Theophrastus tradit, ad tertium genus Mandragoræ Fuchsius refert) idem probat, quod Mandragoras Morion folia ferat, vt scribit Dioscorides, Mandragoræ mari similia, dodrantalia, humi iacentia circa radice summum. Quibus verbis demonstrat plantam hanc, vt & cætera Mandragoræ genera, caule carere. Quæ in eam, quæ *Bella donna* nominatur, minimè conuenient: cum folia emittat hortensi Solano maiora, palmum non excedentia, minimè candicantia, nec humi strata, sed ex caulibus exeuntia, in quibus adnata plurima, bicubitalia, ligni modo dura. Quare planta hæc Mandragoras Morion esse nequit. Dodonæus eam Theophrasti Mandragoram esse censet, vt diximus, sed à Mandragora Morio Dioscoridis distinxit, quam Dioscorides non vidit, vt ex verbis illius colligi potest. Alium, inquit, tradunt esse Mandragoram, nomine Morion, in opacis iuxta specus enatum, foliis albi Mandragoræ, minoribus, albis, dodrantalibus, radicem ambientibus, quæ mollis est & candida, paulò maior palmo, pollicemq; crassitudine æquat. Mandragoras provenit in siluis, & obscuris locis. Vtrumque genus frequēs nascitur in multis Italiæ locis, præsertim in Apulia, Gargano mōte. In hortis maximè colitur ab Herbariis. Augusto

Lib. 6. hist. cap. 2.

Lib 6. hist. cap. 2.

Ca. de Solan.

Lib. 3. c. 11.

In lib. 4. Diosc. c. 76.

In hort. Germ.

Ca. de Solan.

Cap. 264.

Lib. 6. hist. cap. 2.

Ca. de Solan.

In lib. 4. Diosc. c. 69.

Lib. 4. c. 71.

Locis.

menfe

Li 7. simpl. *menſe poma perficit. Mandragoras auctore Galeno vincentem habet qualitatem*
Vires & refrigerantem, adeo vt tertij ſit ordinis refrigerantium. Verū tamen nonihil etiā
Temper. caloris ineſt, & in pomis humiditatis. Quare ſoporem & conciliandi vim habēt.
 Radicis cortex cūm ſit valentiſſimus, non tantūm refrigerat, ſed & deſiccatur, reli-
 quum quod inius eſt imbecillum eſt. Omnes eius partes ad magnos in medicina
 Lib. 4. c. 71. vſus adhibet Dioſcorides. Succus ſit è cortice recentis radicis tuſo, & prælo ſubie-
 cto, qui inſolatus vbi concreuerit, ſicili reconditur. Malis quoque ſuccus depro-
 mitur, ſed aliquantō ignauior. Delibratur radix, & traiectus lino cortex ad vſum
 ſuſpenditur. Aliqui radices in vino ad tertias coquūt, & deſecatum ius ſeruant,
 cyathosq; vno vtuntur in peruigiliis, & doloribus, & ante ſectiones, vſionēſq; ne
 ſentiantur. Succus duobus obolis ex mulſo potus (ὁ δὲ ὅπως ποθεῖς σὺν μικρῶτερον,
 Id eſt, lacryma, ſiue liquor cū melicrato potus: ὅπως ſponte deſluit, ſuccus χύλισμα
 tundendo exprimitur) vt Veratrum per vomitiones bilē atram, pituitamq; extra-
 hit: verūm potu largiore vita adimitur. Medicamentis ocularibus, & his quæ do-
 lores finiunt, peſſis quoque emollientibus admifceretur: ſemioboli pōdere inditus
 per ſe mēſes, & partus expellit: ſubditus ſedi pro balano ſomnificus eſt. Radix ebur
 emollit, quod ſenis horis cum eo decoctum ſit, & ad accipiendam, quā effingere
 optaueris formam, ipſum facilē præſtat. Folia recentia cōuenienter oculorum in-
 flammationibus, & collectionibus quas vlcera citant, cum polenta illinuntur:
 duritias omnes, ſuppuraciones, ſtrumas, & tubercula diſcutiūt: ſtigmata ſine exul-
 ceratione delent, ſi quinis ſenſive diebus ſenſim perfricentur. Folia ſeruantur in
 muriis eoſdem ad vſus. Trita radix ignibus ſacris ex aceto, & ſerpentium iētibus
 ex melle, aut oleo medetur: ſtrumas atque tubercula cum aqua diſſipat: articulorū
 cruciatus cum polenta ſedat. Fit citra coctionem vinum è cortice radicis, ad hunc
 modum. Ternæ minæ in vini dulcis metretam coniiciuntur. Dantur ex eo terni
 cyathi iis qui ſecari, aut vri debent: ſiquidem nullo tunc afficiuntur dolore, ſed
 veterino quodam preſſi torpeſcunt (διὰ τὸ χλαρότερον, quod alto ſomno oppri-
 mantur.) Mala ſoporem afferunt olfactu, & etiam ſi mandantur: item expreſſus ex
 iis ſuccus: nimio tamen odore percuſi obmuteſcunt. Semen malorum potum
 vuluas purgat, appoſitumq; cum ſulphure ignem non experto, rubra ſcēminarum
 profluuiā ſiſtit. Scarificata, punctiſq; multifariam aperta radice erumpens lacry-
 ma cauo vaſe recipitur. Liquamētum autem ſucco lacteo præſtantius eſt. Sed non
 vbique vt experientia docet, radices lacteum ſuccum delacrymant. Vt tertiam
 Mandragoræ ſpeciem non nouiſſe videtur Dioſcorides, ita nec eius vires certas
 tradere. Aiunt, inquit, eam in pane, offa, obſoniōve, drachmæ pondere deuoratā
 vſum rationis intercipere: obdormiſcit enim homo, eo ſerè quo comederit habi-
 tu, ſenſus impos, ternis quaterniſve ex quo data eſt horis. Hoc medici vtūtur, cūm
 ſcindendi vrendiq; neceſſitas a deſt. Antidorum eſſe aiunt radicem cum Solano
 manico potā. Plinius à Dioſcoride & Theopraſto ſua mutuatus, vt diximus, non
 omnino tamen eadem tradidit. Succus ſit, inquit, & è malis, & ex caule, deciſo ca-
 cumine, & radice punētis aperta, aut decocta: vtilis hæc velut ſuccus (ſic emendat
 Cornarius ex vetere codice vulgata exemplaria, quæ habent, vtilis hæc vel ſurcu-
 lo.) Conciſa quoque in orbiculos ſeruatur in vino. Succus non vbique inuenitur,
 ſed vbi poteſt, circa videmias quæritur. Odor grauis eius, ſed radicis & mali gra-
 uior. Ex albo mala matura in vmbra ſiccantur. Succus ex iis ſole denſatur: item ra-
 dicis tuſa, vel in vino nigro ad tertias decocta. Folia ſeruātur in muria efficacius,
 aliàs recentium ſuccus peſtis eſt: ſic quoque noxiæ vires. Grauedinem adferunt
 etiam olfactu. Quāquam mala in aliquibus malis mandantur, nimio tamen odo-
 re obmuteſcunt ignari. Potu quidem largiore etiam moriuntur. Vis ſomnifica
 pro viribus bibentium. Media potio cyathi vnus. Bibitur & contra ſerpentes, &
 ante

ante sectiones vñtionēque ne sentiantur. Ob hæc satis est aliquibus somnū odore quæsisse. Bibitur & pro Elleboro duobus obolis in mulso. Theophrastus Mandragoræ folia vlceribus cum farina vtilia esse scribit, radicem rasam, & ex aceto subactam ad erysipelata, ad podagricos dolores, ad somnum, & ad amores: dant autem in vino & aceto. Secant orbiculos velut ex Raphano, quos filo transmissos, in mulso suspendunt super fumum. Quæ fortasse Plinius exprimere voluit cum dixit. Concisa quoque in orbiculos seruatur in vino. Quæ tamen alio in loco dilucidius expresit. Sed is in publicis exemplaribus valde corruptus est. Igni sacro medetur Aizoum, folia trita Cicutæ, Mādragoræ radix. Siccatur in aëre vt Cucumis, &c. Quæ ex vetere codice sic restituit Cornarius. Igni sacro medetur Aizoum, folia trita Cicutæ, Mandragoræ radix. Secatur hæc in asses vt Cucumis, primumq; super mustum suspenditur, mox in fumo. Dein tunditur in vino & aceto. Agyrtæ & impostores illi circūforanei, qui radices fictitias humana effigie pro Mandragoræ radicibus imperitæ plebi ostendant, ex Pythagoræ Anthropomorpho, quo nomine Mandragoram appellauit, vt diximus, occasione sumpsisse videntur. Cui Columellæ testimonium accessit, qui vulgi quoque superstitione motus cecinit.

Lib. 9. hist. cap. 10.

Li. 26. ca. 27.

Embl. 55. lib. 4.

Lib. 10.

Quamuis semihominis vesano gramine facta

Mandragoræ pariat flores, mæstamque Cicutam.

Illi in Bryoniæ, Al:hææ, Arūdinis, aliarumq; plantarū radicibus adhuc recentibus humanā vtriusq; sexus effigiem sculpūt, infertis in ea loca, in quibus pilos exoriri voluit natura Hordei & Milij granis. Deinde eas facta serobe tenui sabulo obruunt, vt grana illa radículas emittant, quod euenit viginti summum dierū spatio. Tum eruunt, & radículas ex granis natas acutissimō cultello cōcidunt, itaq; aprat, vt capillū, barbā, & cæterarū corporis partiū pilos referant. Has sub crucibus & rotis ex vrina supplicis affectorū enatas persuadēt, mōstrososq; eorū vsus pollicentur. Nec nisi magno vitæ periculo effodi posse nugātur, cane qui effodiat radicibus adalligato, & auribus pice obturatis, ne radices clamorē exaudiant effodiētes: qua audita illis pereundū sit. Cuius imposturæ, ac mēdacij origo ex veterū superstitione fluxisse videtur. Theophrastus enim de effodiēdo Mādragora hæc scripsit. Circūscribunt & Mandragorā gladio ter, secantq; ad occasum spectātes. Iubent & aliū saltantem tripudio circūagi, multaq; de veneris vsu & re dicere. Quæ Plinius trāstulit his verbis. Cauēt effosuri contrariū ventū, & tribus circulis antè gladio circūscribunt: postea fodiūt ad occasum spectātes. Matthioli hanc fabulam, quæ ignaris Mādragoræ radices effodere volōtibz tātopere minatur, ex Fla. Iosepho natā putat, qui etsi de alio radicis genere scripsit, ea tamen facili ab impostoribus ad Mādragoræ radices, detorqueri potuerūt. Hæc sunt illius verba. Vallis, qua ciuitas à parte Septentrionali cingitur, quidā lacus Baaras appellatur, vbi radix eodem nomine gignitur, quæ flāmæ quidē asimilis est colore, circa vesperam verò veluti iubar fulgurās. Accedētibz, eamq; euellere cupiētibus facilis non est, sed tam diu refugit, nec prius manet, quā si quis vrinā muliebrē, vel menstrū sanguinē super eam fuderit. Quinetiā tunc si quis eam tetigerit, mors certa est, nisi fortē illā ipsam radicē ferat de manu pendente. Capitur alio quoque modo sine periculo. Totam eam circūfodiunt, ita vt minimū ex radice terra sit conditū, deinde ab ea religant canem, illoq; sequi eum à quo religatus est cupiente, radix quidem facili euellitur, canis verò continuo moritur, tanquam eius vice à quo tollenda erat, traditus: nullus enim postea accipientibus metus est. Tantis autem periculis propter vnam vim capi eam operæ pretium est. Nam quæ vocantur dæmonia pessimorum hominum spiritus, viuis immersa, eosque necātia, quibus subuentum non fuerit, hæc citò, etiam si tantum admoueatur ægrotantibus, abigit. Hæc Iosephus. Sed literatū hominem nullum esse existimo, qui his imposturis & nugis fidem adhibeat.

Lib. 9. hist. cap. 9.

Li. 25. c. 13.

In lib. 4. Diosc. c. 72.

Lib. 7. c. 25. Bell. lud.

MALA

DIFFERVNT non parum à Malis infanis, quæ nostra ætas Æthiopica cognominat: horum stirps caule assurgit subinde cubitali, in duas trêve alas diuiso: foliis latis, ex albido virentibus, angulosis, duriusculis, quibus à media costa, siue neruo spinulæ quædam breues exeunt. Flosculi secundum cauliculos albicant, senum foliolorum, staminibus mediis

MALA Æthiopica, Dod.



subluteis. Fructus rotundus, striatus, Malo aureo minor ac durior, colore per maturitatem eleganter rubens, supereminente exiguo quodam veluti alterius mali rudimento, quod & rubet, sed dilutiùs. Peregrinùm istud Belgio: semina ex Hispaniis attulit honesta Domina Christina Bertolfia vidua clarissimi, ac amplius viri D. Ioachimi Hopperi. Tardè admodum (sed tamen, eodem quo factum anno) ad perfectionem Colonia venit. Malum vocant Æthiopicum, quod ex Æthiopia in Hispaniam primùm inuectum existimetur. Veteribus cognitum fuisse difficile fuerit affirmare. Cum Malinathalla, de qua ex Theophrasto superiore cap. scripsimus, nequaquam etiam conuenit. Folia siquidem cum Cyperinis haud conueniunt, cuiusmodi sunt Malinathallæ. Feruntur verò hæc Mala in pinguium carniū iure cum sale, ac pipere cocta inferri, ac edici: ac minùs mali succi esse, quàm infana aut aurea: propterea videlicet, quod duriora, diutiusq; asseruari queant, nec ita facillè uti illa corrumpantur. Sunt tamen nec hæc

APOCYNVM.

CAP. IX.

Nomina



ΠΟΚΥΝΟΝ Græcis & κυνμορον, & κυνοκράμην, Latinis Apocynū, Cynomoron, & Brasica canina dicitur. Apocynum quidem & Cynomoron, quod esu canes interficiat, quasi canicida. Cuius hæc extat apud Dioscoridem descriptio. Frutex est longas habens virgas, lentas

Li. 4. ca. 76.

Forma.

vitilium modo, graueolentes, ægre fragiles: folia Hederæ similia, sed molliora, & in summo acutiora, grauius olentia, subuiscida, succo luteo plena: fructus velut siliquas fabarum, folliculū specie, in quo semina lanugine obuoluta sunt, dura, parua,

Vires.

nigra. Huius folia cum adipe in panes coacta, & in cibos data, canes, lupos, vulpes, pantheras interimunt: protinus enim coxendices ipsorum resoluunt. Græcè legitur, τὰν τῆς τὰ ἄλλα σὺν τῇ αἵματι ἀρροποιοῦντά, quod sic Cornarius vertit: Huius folia cum farina subacta in panes coacta, &c. Legendum sanè, σὺν τῇ αἵματι. Est enim τῇ αἵματι, farina aqua subacta, & vt pinsatur, macerata, priùs quàm fermentescens acefcat, vulgò pasta, quod sensus requirit. Galenus, Apocynum aut Cynocrambē, inquit, vocant quidam Cynomoron, quod canes celerrimè interimat, sicut Lycoctonum lupos. Est autem hominibus venenum, herba multum grauius olens, proinde omnino calida est non instrenuè, non tamen proportionè desiccata. Itaque illita admodum digerentis est facultatis. De quo aliter scripsit Plinius. Sic & pleuriticos, & omnes lateris dolores Apocyni semen ex aqua (sub. sanati) frutex est folio

Li. 6. simpl.

Li. 24. c. 11.

Hederæ,


Hederæ, molliore tamen, & minùs lōgis viticulis: sēmine acuto, diuiso, lanuginoso, graui odore. Canes, & omnes quadrupes necat in cibo datum. At cum Dioscorides nullūm Apocyni vsum humano corpori commodum præscribat, & Galenus venenum hominibus esse dicat, & solūm foris impositū discutiendi vim habere, merito suspectum est Apocyni semen pleuriticis ex aqua propinatū. Quare verba hæc, Sic & pleuriticis & omnes lateris dolores ex aqua, ad præcedētia referenda videntur, vt sequatur, Apocynum frutex est, &c. Scribit Matthioli plantas duas à Luca Ghino ad se missas fuisse, qui siliquas duas dono acceperat è Syria delatas, quarum vni inscriptum erat, Periploca repens, alteri Periploca non repens,

In lib. 4.
cap. 76.

APOCYNVM, Matthioli.



APOCYNVM repens, Matth.



quòd ita in Syria has plātas nominent. Præterea has siliquas Rhododēdri siliquis admodūm similes fuisse, nisi quòd repentis Periplocæ siliqua ea erat longitudine, qua & Rhododēdri, gracilior tamen, alterius breuior. E longiori sata plantā prouenisse non modò humi repētem, sed & arbores proceras scandentem, è breuiori verò aliam, quæ notis omnibus Apocynum refert: vtramque succo turgere, repentem albo, non repentem subcroceo. Est & alia in siliquis differentia: cum enim hæ in vtraque Rhododendri similes sint, in nō repenti tamē simplices, acutiores, rectæ ex vno pediculo proueniūt, in repenti verò binæ, & in origine cōiunctæ, & in sese inuicē inflexæ, nec adeò vt illæ in acutū desinentes. Non negat Pena Apocyni descriptioni apprimè quadrare plantas duas non minùs raras quàm elegātes, quas Patauij & in publico Pisano vireto pridem vidit. Earū vtriq; nomē Periploca erat. Altera nō repens flexilibus erat surculis, vimineis, gracilibus, læuibus, pediculos vtrinque habētibus longiusculos, & exiles, in quibus folia hederacea, molliora, viridia, læuiā, nitentia, & quàm Vincetoxici rotūdiora, nonnihil in summo acuminata: flores tenues, candidi, muscosi, Valerianæ instar aut Drabæ, inter folia exoriuntur, succedentibus Augusto mēse siliquis corniculatis, mucronatis, rectis, quàm in Asclepiade maioribus, claudentibus semen nigrius, depressum, papposa lanugine obductum. Succus flauescit, ingratus, & vti tota planta virosus. Hæc si

H h h

deuorata necem infert, inquit, Apocynum esse (& huius fore antidotum Vincetoxicum) valde probabile est. Certum tamen exploratumq; sibi esse ait, aliis venenis à cane deuoratis antipharum fuisse, quæadmodum Thoræ Anthoræ, & Pardalianchis herbam Paridis. Altera Periploca repens prolixioribus & leuioribus vimineis surculis serpit, variisq; flexibus arripit & amplectitur obuios caudices Periclymeni modo: folia vtrinq; ex aduerso bina, Periclymeni potius quam Hedera æmula, sed apice quemadmodum Vincetoxicum donata: siliquæ solertiore cōnexionē mutuis erāt coniunctæ quasi rostris, vna & floris basi, seu calathō, vtrinq; repandæ, summis & imis insertæ mucronibus, Rhododendri quadantenus modo. Easdem Periplocas descripsit & depinxit Dodonæus, & ad Dioscoridis Apocynū referendas esse censuit, præsertim priorem. Easdem Lobellius etiā pictas dedit, & priorem cognatæ figuræ esse & naturæ cum Scammonio Monspelienfi tradidit, succo, viticulis & longo radice reptatu. Sed ab hac sanè diuersum est Scammonium Monspelienfē.

ACONITVM.

CAP. X.

Nomina
Li. 27. ca. 3.



Lib. 7.

Ibidem.

KONITON Græcis, Aconitum Latinis. Nascitur, inquit Plinius, in nudis cauitibus, quas aconas nominant. Et idēd Aconitum aliqui dixere, nullo iuxta ne puluere quidem nutriente. Hanc aliqui rationem nominis attulere. Alij quoniam vis eadem in morte esset, quæ cotibus ad ferri aciem deterendam, statimq; admota velocitas sentiretur. Fabulæ narrauerunt (id declarat Ouidius in Metamorphosi) è spumis Cerberi canis, extrahente ab inferis Hercule, extitisse, ideoque apud Heracleam Ponticam, vbi monstratur is apud inferos aditus, gigni. Idem Ouidius à cauitibus nomen inditum canit his versibus:

*Quæ, quia nascuntur dura vinacia cote,
Agrestes Aconita vocant.*

Lib. 6. ca. 1.

Theophrastus ab Aconis, vbi plurimum nascitur, nomenclaturam duxit. Is autem vicus est Periandynorum, qui ad Heracliam Ponti est. Rursus Plinius alio in loco ait, Portus Aconæ, veneno Aconito dirus. Aptior verò, inquit Pena, fuerit nomenclaturæ interpretatio, si eam ab herbæ succo vel radice, quibus quasi cote spicula à venatoribus affricta & subacta celerius subiret, & perniciem adferret, quàm si à cauitibus, aut à pago cognomine deducas: tametsi possit etiā ἀπὸ τῆς ἀκονιτῆδος deduci, quemadmodum τοξικὸν ἀπὸ τῆς τοξότηδος, nō à taxo. Sic enim in Cyripædia Xenophon.

Li. 4. ca. 72.
& 73.

Genera.

Ἐδὲ γὰρ τοξότης, Ἐδὲ ἀκονιτῆς ἀνθρῶπων ὑπερπεποιθὺς ὕμν. Neque enim iaculari, neque in hominē collimare permittebamus vobis. Dioscorides duo ponit Aconiti summa genera. Vnum, quod Pardalianches vocat, aliqui Cammaron, alij Thelyphonum, alij Myoctonum, alij Therrophonum siue Therophonum. Alterum Aconitum Lycoctonum, quod & Cynoctonum, cuius tria facit genera. Vnum quo vtrūque venatores, alia duo, quæ in vsum suū vertere Medici, ex quibus tertium Ponticum nominatur. Hæc tamen dissimulandum nō est, verba hæc, Vnum quo vtrūque venatores, &c. in vulgaris codicibus Græcis exarata nō esse, sed statim huius Aconiti nominibus locū natalē & descriptionē subiūgi, sine vlla generū distinctione: quæ nec in Oribasio reperiatur, & Marcellus ut spuria respuit. Illud, quia enecat pātheras, Pardalianches, quia scæmini sexus animalia tactis genitalibus, Thelyphonum, quia feras omnes Theriophonum nominatur. Camaron verò à radice Camaro marino simili, Plinio auctore. Myoctonum, quia procul & è longinquo mures necat. Hoc Lycoctonum & Cynoctonum, quia priuatim lupos canesq; interimat. Plinius de vno & priore Aconito Dioscoridis scripsit, alterum prorsus omisit. Theophrastus de Thelyphono sine Aconiti mentione tradidit ea, quæ ad prius genus Aconiti Dioscoridis pertinent, quæ

Li. c. 1. & 2.

nent, quæ etiam Plinius transcripsit, & de Aconito velut ab illo diuerso seorsum. Certè Aconitū multarū stirpiū vnū fu. r nomē, quas inter multas lethales cōper-
tum esset celerrimā & certissimā mortē adferre: de quibus quia Theophrastus &
Dioscorides succindē nimis, atque minū apertē scripsere, (flores enim & alia in
delineationibus prætermiserūt) factū est, vt alij atq; alij Aconita alia atq; alia sta-
tuerint: Aconitū Pardalianches tradit Dioscorides folia habere tria aut quatuor,
Cyclaminū vel Cucumeri similia (σικίω) simpliciter habēt exēplaria, Oribasius sil-
uestri Cucumeri) minora tamē, & subaspera, caulē dodrantalē, radicem scorpionis
caudā similē, alabastrī modo nitentē. Hic neq; florum, neque fructus vlla mentio.
Ferunt Aconiti huius radicē scorpionī admotā eū resoluerē, & ediuerso admoto
Elleboro excitari. Ocularibus medicamētis dolorem tollētibus miscetur. Enecat
pardos, fues, lupos, & feras omnes carnibus impositū & obiectum. Quibus similia
ferē de Thelyphono Theophrastus prodidit. τὸ δὲ θηλυφον (ὃ ὁ σκορπίον καλεῖται
δὲ τὴν ρίζαν ὁμοίως ἔχον τῷ σκορπίῳ) ἐπιθεύδμενον (Gaza ἐπιθεύδμενον legit) ἀποκτείνει
τὸν σκορπίον. ἐάν δέ τις ἐλλέβορον λαβὼν χλαπάσῃ, πάλιν ἀνίστασθαι φασιν. ἀπώλλουσι ὁ καὶ
βῆς καὶ ὑποζύγια, καὶ πρὸς αἶμα, καὶ ἀπλῶς πᾶν τεύχεον, ἐάν τις τὰ αἰδοῖα τεθῇ ἢ ρίζα, ἢ φύλλον,
ἀνθήμερον, χερσὶν ἢ πρὸς σκορπίου πτηγνὴν πινόμενον. ἔχῃ δὲ τὸ μὲν φύλλον ὅμοιον κηλε-
μίνῳ, τὴν ὃ ρίζαν, ὥσπερ ἐλέχθῃ, σκορπίου. φύε) δὲ ὥσπερ ἀγρωστis, ἐγὼν αἶμα ἔχῃ. φιλεῖ ὃ χαλε-
σιμώδη. Id est, Gaza interprete, Thelyphonū, quod alij Scorpionē appellant, quia
radicē scorpionī similem habet, admotum scorpionē occidere tradūt, & eum re-
uiuiscere posse si Elleboro candido linatur. Enecat idem & boues, & oues, & iu-
menta, & in summa omnes quadrupedes eadem die, si genitalibus folium vel radi-
cula imponatur. Proficit potū cōtra scorpionū ictus. Folīū habet Cyclamini, ra-
dicem, vt dictum est, similē scorpionī. Nascitur graminis modo, & geniculis con-
stat: loca amat umbrosa. Quæ sic Plinius exscripsit. Thelyphonum herba ab aliis
Scorpion vocatur propter similitudinē radicis, cuius tactu moriūtur scorpiones.
Itaque cōtra eorum ictus bibitur. Scorpionem mortuum si quis candido Ellebo-
ro linat, reuiuiscere aiunt. Thelyphonū omnē quadrupedem necat, imposita ve-
rēdis radice, folio quidē intra eundē diē, quod est simile Cyclamino. Ipsa genicu-
lata nascitur in opacis. Quāuis hæc aperte eadē sint cum iis quæ de Aconito par-
dalianche Dioscorides prodidit, tamē eadem alio in loco de Aconito repetit Pli-
nius, aliis tamen quibusdam additis. Constat omnium venenorū οὐκ ὅμοιον esse
Aconitū, & tactis quoque genitalibus sceminini sexus animalium, eodem die in-
ferre mortem. Hoc quoque tamē in vsus humanæ salutis vertere, scorpionū icti-
bus aduersari experiundo datum in vino calido. Eā est natura, vt hominē occ dat,
nisi inuenerit quod in homine perimat. Cum eo solo colluctatur, velut pari intus
veneno. Sola hæc pugna est cū venenū in visceribus reperit: mirumq; exitia a
per se ambo cū sint, duo venena in homine cōmoriuntur, vt homo supersit. Et
mox, Torpescunt scorpiones Aconitū tactu, stupentq; pallentes, & vincī se confi-
tentur. Auxiliatur eis Elleborum album, tactu resolvente: ceditq; Aconitū duobus
malis, suo & omnium. Quod duobus malis dicit Aconitū cedere, suo & omniū, in-
tellectu est difficile. Hunc locū veluti mendo inquinatum coniectura sic emēdat
Cornarius. Ceditq; Aconitum duobus malis, suo dominio. Quam lectionē mini-
mē probo. Quidam pro malis legunt, modis, & sic interpretantur, Aconitū cede-
re, id est, innoxium fieri, ac nihil lædere, duobus modis: suo, nimirum proprio, ac
peculiari, si reperiat venenum in corpore: & omnium, sub venenorum, quorū vis
frangitur idoneis & conuenientibus alexipharmacis. Pergit Plinius, Tangunt car-
nes Aconito, necantq; gustatu earū pantheras, nisi hoc fieret, repleturas illos situs.
Ob id quidam Pardalianches appellauere. Et rursus, Maiores oculorum quoq; me-
dicamentis Aconitum misceri saluberrimē promulgauere, aperta professione,

Li. 4. ca. 72.
Forma.

Lib. 9. hist.
cap. 49.

Li. 25. ca. 10.

Lib. 27. c. 1.
& 3.

malum quidē nullum esse sine aliquo bono. Fas ergo nobis erit, qui nulla diximus venena, monstrare quale sit Aconitū, vel deprehendendi gratia. Folia habet Cyclamini, aut Cucumeris, nō plura quatuor, ab radice leuiter hirsuta. Radicem modicam Cammaro similē marino. Quare quidam Cammarō appellauere, alij Thelyphonum ex qua diximus causa. Radix incuruatur paulū scorpionū modo, quare & Scorpionum aliqui appellauere. Nec desuere qui Myoetionum appellare mallerent, quoniā procul & lōginquo odore mures necat. Hæc Plinius de Aconito primo Dioscoridis. Theophrastus scorum, vt diximus, hæc de Aconito à Thelyphono diuerso scripsit. Το δὲ ἀκόνιτον γινέσθαι μὲν ὡς φασι, καὶ ἐν κρήνῃ, ὅθεν ζακύνθῳ: παλαιοὶ δὲ ἀκόνιτον ἐν ἡρακλῆα τῇ ἐν τῷ πόντῳ. ἔχει δὲ φύλλον μὲν κυχωρεῖς, ῥίζαν δὲ ὁμοίαν τῷ χήματι, καὶ τῷ χρώματι χαρύα. τὴν δὲ διωκόμεν τὴν θανάσιμον ἐν ταύτῃ. τὸ δὲ φύλλον, καὶ τὸν χαρπὸν ἔδεν φασι ποιεῖν. χαρπὸς δὲ ἐστὶ πάσας, καὶ ἔχει ἡλυσμένους. βραχέα δὲ ἢ πάσα, καὶ ἔδεν ἔχει ὡς περυσίον, ἀλλὰ παρομοία τῷ σίτῳ. τὸ δὲ σπέρμα ἐστὶ κυρτόν. φύλλον δὲ παλαιὰ καὶ καὶ ἔκ ἐν ταῖς ἀκόνιταις μόνον, ἀφ' ὧν ἔχει τὴν ποροσηγορίαν. αὐτὴ δὲ ἐστὶ κώμη τις τῶν περικαιδιῶν. φιλεῖ δὲ μάλιστα τὴν πέρσινος τῶπυς. ἐνέμεν δὲ πρὸς αἶσιν, ἔδεν ἄλλο ζῶον ἔδεν. σιωπῆσθαι δὲ πρόπον τινα πρὸς τὸ ἐργάζεσθαι, ἐν τῷ πάσας εἶναι. διὸ δὲ τὴν ἰσχυρὴν ἐκ ἐπιτομῆς σιωπῆσθαι, σηπικῶ δὲ χεῖρ καὶ πρὸς ἄλλα αἰτία πινόμενον, ἔδεμειν ἀσθῆσιν ποιεῖ, ἔτ' ἐν οἶνῳ, ἔτ' ἐν μελικράτῳ. σιωπῆσθαι δὲ, ὡς καὶ χεῖρ τὰν ἀναμειν, ἴσον δόλημον, τελεμνον, ἐξάμνον, ἐναισθον, τὴν δὲ καὶ οἶνο ἐτὶ χεῖρ τὴν ἀπαισθον τὴν τὴν ἐν πλῆτῳ χεῖρ καὶ ἀπαισθον τὴν σῶμλος, ῥῆτα δὲ τὴν παρὰ χεῖρ, λυκὸν δὲ φάρμακον ἐκ δόλη καὶ ὡς ἀναισθον ἐτερόν τι φύεσθαι, ἀλλὰ τινες τοῖς ἐνεργητικοῖς βοθηθῆαι δόλη. τὴν γὰρ ἐν χεῖρ ἀνασῶσθαι τὴν ἀναισθον καὶ οἶνῳ, καὶ τοῖς τοῖς τισὶ παλαιῖς δὲ καὶ τέττις, ἐργαζῶς. Id est, Aconitum nascitur, vt aiunt, in Creta & Zacyntho: plurimū & optimū in Heraclea Ponti. Folium habet Cichorio simile, radicē figura & colore similē nuci (Sic vertit Gaza, legit enim χαρύα, sicut & in vulgatis codicibus exaratū est. Dioscorides παλαιὰ καὶ χαρῶν, id est, cirris squillarum cōparauit, Plinius Cammaro marino, vnde Cammarū appellatū dixit:) vim mortiferā illi inesse, folium autē & fructum nihil nocere aiunt. Fructus est herbæ, non humilis materiam. Brevis est herba, & nihil superuacui habens, sed similis frumento: semen autē nō spicuum. Nascitur vbiq;, & non in Aconis solū, vnde nomen accepit. Est autē vicus is Perianthynorum. Gaudet locis petrosis. Neq; pecus, neque vllum aliud animal ipso pascitur. Cōponi id quodāmodo narrāt ad aliquid efficiendum, nec id cuiusuis esse. Quare medicos cōponendi ignaros pro putrefaciente vti, & ad alia quædam: si bibatur, nullum sui sensum inducere, neq; in vino, neque in aqua mulla. Componi verò vt certo tempore interimat, veluti duobus, aut tribus, aut sex mensibus, item anno, aliquos etiam duobus annis. Pessimē verò illos de vita decedere quibus longo tēpore corpus cōtabescit, facillimē quibus statim. Nullum autē huius antidotum esse ex aliqua alia planta audiuius, sed iis qui sumpsissent remedia quædā excogitata fuisse: nam incolas seruasse quosdā melle & vino, & quibusdā aliis huiusmodi, sed & hos rarò, atque etiam operosē. Hæc Theophrastus. Quæ de Plinij, priorēve Dioscoridis Aconito intelligi nō possunt, neque de posteriore, hoc vno dempto, quòd vterq; radices τῇ χαρῶν comparauit, si

Lib. 9. hist.
cap. 16.


Lib. 4. c. 73.
Forma.

in Theophrasto pro χαρύα rectē χαρῶν legatur. Sic enim Dioscorides alterū Aconitum describit. Aconitum alterum, quod alij Cynoetionum, alij Lycoetionū appellant, nascitur plurimum in Italia, montibus Iustinis, præstātius superiore. Folia habet Platani, magis tamen incisa, longiora & nigriora: caulem veluti Filix, cubiti altitudine: aut maiore, pediculum glabrum: semē in siliquis aliquatenus longis: radices cirris marinarū squillarū similes, nigras, quibus ad luporū venationes vtuntur: nam insertæ carnibus crudis, & à lupis deuorata, eos enecant. Hæc solū in quibusdā Dioscoridis codicibus reperias, in aliis tria notātur Aconiti Lycoetioni genera, vt iam monuimus, quorum tertium dūtaxat describitur, nimirū Ponticū.

Quare

Quare meritò docti viri in hoc capite quadā desiderari suspicātur, quibus Dioscorides & Aconitorū duorū historiā, & quomodo tum venatores, tum Medici iis vterentur, declararet, quemadmodū in Pōico nihil horum prātermisit. Nunc Aconita varia ex peritissimis Herbariis proferamus. Ac primū fuerit Matthioli Aconitum Pardalianches. Planta est, inquit, in nudis & arduis montium summitatibus cauibūque proueniens, vmbrosis tantū locis, foliis Cucumeri proximis, ad summum quatuor, iisq; subhirsutis. Caulem edit palmarem, subhirsutum,

ACONITVM Pardalianches, Matthioli.



quemadmodū & foliorum petiolorum. Florē non vidit, verū Doronici æmulum esse suspicatur. Radicem edit alabastrī modo splendentē, dum recens est, digiti crassitudine, ex lata origine in acutum desinē em, incuruā, geniculatā, & tota facie scorpionis caudam emulantem. Hanc vidisse se legisseq; affirmat tantū in Ananien-sibus montibus Tridentini agri, locis ferē inaccesis & prāruptis. Raram quidem illam esse, & ab aliis fortasse haud visā, quā ab iis quibus videndi copiam fecit quos multos veritatis locupletissimos testes profert. His tamen fidem adhibere nolunt pleriq; periti Herbarij, nec vlla aut Matthioli asseueratione aut test moniis persuaderi possunt, vt plantam hanc in rerum natura existere credant: quin potius fictam ac cōmentitiā picturam esse existimant. Imprimis Gesnerus, cuius hæc sunt verba in libro de Lunariis. Matthioli pro Aconito primo delineata imago, planē fictitia mihi videtur: siue ipse ad Dioscoridis descriptionem confinxerit, siue ab alio deceptus acceperit. Quanquā enim ipse hoc Aconitum primum sæpe in Tridentinis montibus se legisse scribat, non tamen fidem apud nos meretur radicis quam proponit forma nimirum artificiosa, nimiumq; σκορπιοςδης absque vll s fibris. Idem Gesnerus Toram venenatam (aliqui Lunariā vocant, forē quòd folium ei rotundum & orbiculare sit instar Lunæ plenæ) Aconitum primū Dioscoridis esse asserit, quòd foliatria edit ab vna radice, quorū duo extrema minora sunt, & absque cauliculo, medium maius est. Ea rotunda sunt, planē circinata, ea ferē magnitudine, vt diameter duos pollices æquet, in circutu serrata, solida, albicantia. A medi principio cauliculus enascitur, simul & paruum aliud folium mucronatum inde profertur. Radiculæ circiter decē, ceu Napi quidā exigui ab vno omnes radicis capite oriuntur. Eandē plantam ab Anguillara Patavini horti præfecto verū Aconitum Pardalianches iudicari scribit: reperiri in mōte Baldo inter Pataviū & Veronā: oriri etiam apud Valdenses in Alpibus Vnderflumen, & Engronia. In eadē sententia Gesnerus perseverat in Hortis Germaniæ. Aconitum primū, siue Pardalianches voco, inquit, nō quod Fuchsius pinxit, neq; Doroniciū, vt quidam, neque depictā à Matthiolo herbā, de qua dubitamus etiam, nū in rerū natura extet, & si extat, an rectē ab eo pingatur, nullis penitus in radice fibris, quod ego in nullam plantā cadere dico. Sed ego Aconitum primū, Toram vulgò

TORA Valdensium, Aconitum l. Diosc. Gesnero.



Hh h 3

Lib. de Lu-
naris.

Li. 27. ca. 11.

Ca. 30. hist.

dictam à Valdensibus, ut semper, & quidem primus existimaui, ita magis, ac magis in ea sententia cōfirmor. Sci o, inquit, & alias quasdā herbas diuersis in locis Thoræ nomine vocari, ut in Italia al cubi Napellū. Ego de Thora, siue Toxico Valdensiū loquor. Nascitur spōte in mōtib⁹ quibusdā Sabaudia & Valesiæ nostræ, radiculis, cū recētes sunt, omnium cādidiſsimis, scorpionū specie, præsertim caudæ, in quibusdā manifesta. Foliū aliis plātis singulare est, aliis bina, terna, quaterna, aut etiā quina ab vna radice. De eius veneno hæc ex epistola ad se missa descripsit. Venenū lethale ex ea cōſicitur, quo si gladius, aut spiculū, aut sagitta infecta fuerit, & hominē vulnerauerit (mirabile dictū) nisi pars læsa subitō abscisa fuerit, ut nequeat veneni malignitas in reliquū corpus serpere, totū sanguinē ita corrūpit atq; coagulat, ut statim occidat, nec vllō remedio aut medicamine, quod sciāt, vitæ ac salutis succurri possit. Itaq; necesse est eū qui percussus fuerit miserē perire. Si verō aliud animal sagitta huiusmodi veneno intincta, verbi gratia vrsus aut fera alia, percussus fuerit, bino aut trino sultu facto moriēs cadit, cuius carnes si edātur, nihil nocent homini. Quod datur intelligi, id venenū soli sanguini inimicū esse. Nam & cōtrā veneno illi sanguis ita inimicus est, ut si in ollā in qua seruatur venenū sanguis inciderit, venenā suā vim amittat, nec amplius nocere possit. Idē ex alterius epistola refert, herbæ huius radicē seruari aliquādiu in loco humido, postea contundi, vbi contusa fuerit, succo eo qui expressus fuerit sagittas tingi. Vim illius experturi, inquit Gesnerus, acum eo succo inficiunt, qua ranā pungūt, quæ si illico moriatur, præsentaneū venenū indicant. Peritus mihi quidam Herbarius narrauit certē, cū in arduo mōte effossam illā herbā statim comes suus olfecisset, cōcidisse velut examinatū, vixque frictionibus & vino faucibus instillato fuisse reuocatū. Dicebat & idē aliquādo sibi obseruatū, sanguinē e vulnere fluentē admota illa herba tusa cū radice primū substituisse, deinde versus plagā recurrisse. Hanc Matthiolas Pseudoaconitū Pardaliāches vocat immeritō, cū pnitiosa facultate quoduis Aconitū & Toxicū saperet. Sūt qui ad Cyclamini genera referāt. Quidā Limeū Plinij esse suspicātur. Limeū, inquit, herba appellatur à Gallis, qua sagittas in venatu tingunt medicamēto, quod Ceruariū vocāt. Pena cōmentitiū etiā Matthioli Pardaliāches esse arbitrat: Thorā verō Soʹdanellis, Gramini Parnasio hederaceo recentiorū, & Cyclamino accēset, de qua scitē admodū differuit, & dilucidius quā Gesnerus expressit his ferē verbis. Thora Valdensiū herbula est, inquit, qua passim multūm diuq; Alpiū incolæ venatores vsi sunt, vt etiā multi alij ad feras capiēdas, quibus solo succo expresso & spiculis illito certā citamq; perniciē parāt. Qua nāque hæserit telum, aut vulnus fecerit, subit repētē virus, quo illico ora vulneris (nisi præcissione anteuerit) corrūpūtur, putrescuntque: vnde Thora nūcupata, manifesto Græcæ vocis vestigio, Thora ex φθορά deducta, quæ est corruptio, venenū, aut mors. Omnium enim, ut a iorū Aconitorū, atque etiā Ellebori quibus sagittæ inficiuntur, vires qui lōga experiētia cognouerūt, si cū istius viribus cōparentur, multo minūſ efficaces & incertæ existimāt. Huius Vere ineūte succus premitur, atque vesiculis aut potius vngulis & cornibus bouillis recōditus emitur, mittiturq; venū ad emporia finitima, vbi ad vsus annuos venationū sibi cōparāt ferarū insidiatores, quos Delphinates, Allobroges, & Prouinciales *Bessiers* & *Loubatiers* vocant. In montibus Geneuæ cōterminis nascitur, sesquipalmū vix superāte caule, glabro, & iunceo, cuius ē medio & summo sepe vnū, rarō bina, rarissimē toto caule terna aut quaterna folia, ambitu circinato, & tantillū cristato, superficie glabra, & rigidiuscula, nō hirsuta, læuore & colore virēte, nō nihil ad Cyclaminū accedūt: flores lutei Pétaphylli, Tormēillæ verè radiculæ sat multæ, quasi torulis oblongis, in imo exilioribus & acutis, supnē autē quasi nodulo collectis, Asphodeli similitudine & cādore, cespitem amplexæ, quasi cancri forcipula. Hæc de Thora Pena prodidit. Fuchsius pro Aconito Pardalianche plantam depinxit, quam Herbariorum vulgus Vuam ver-

fam, & Vulpinam, alij Herbam Paridis vocant, Germani *Vuiffbeer* & *Dolnurtz*. Sed Aconitorum delineationes hanc eorum speciem non esse arguunt. Præterea deleteriam vim huic inesse plerique negant. Certè antidotis aduersus lethalia pharmaca paratis admiscetur. Dodonæus in Historia stirpium cum Aconitum Pardalianches aliud nactus non fuisset, eius picturam ex Matthiolo mutuatus ex-

Lib. 3. c. 77.

DORONICVM Rom. *Aconitū*
Pardalianches antiquorū, Dodon.



ACONITVM *Pardalianches*
minus, Matthioli.



hibuit, quam haud veram sed fictitiam plerisque videri diximus, quibus in fine eiusdem Historiæ assentitur, atque Doronicum Romanum Officinarum, Aconitum Pardalianches antiquorū esse asserit. Et in Historia purgantium Aconitum Pardalianches descripsit, quod Pena & Lobellius & Herbarij plurimi Doronicum appellant, cuius etiam radicales passim pro Doronico medicamentorum compositionibus admiscunt. Has testatur Lobellius sæpius à Ioanne de Vræde Rhizotomo sine noxa vlla impunè deuoratas, quamuis canibus perniciosæ prodantur. Foliis exit subrotundis, laris, dilutè virentibus, mollibus, tenui lanugine pubescentibus, Hederæ cuiusdā, ac vnus Cyclamini foliorum quidem forma, sed amplioribus, ad Cucumeris folia magis accedentibus, minoribus tamen, & mollioribus: caulis dodrante altior, & ipse lanugine haud carens, striatus, & quasi multiangulus, alioqui rotūdus, qui in pauculos diuisus ramulos, ipsis fastigiis flores promit, Chrysanthemi æmulos, medio videlicet disco, & orbiculato ambitu luteos, qui in tenues & candi-

ACONITVM *Pardalianches,*
Plinij.



dos pappos resoluuntur. His subfunt exigua nigricantiâque semina: radiculæ haud magnæ, candidæ dum recentes sunt, geniculis velut articulatæ non rectè descendunt, sed graminis modo per obliquum serpunt, & subinde extuberantes nouella germina protrudunt (ita sese multiplicante stirpe) demissis etiam ab ipsis tuberosis partibus aliquot deorsum concoloribus fibris. Referunt radicule exanimatos scorpiones: nam anterior & tuberosior cauliculis proxima, corpusculum cum pedibus, posterior articulata exprimere videtur caudam. Theophrastus Thelyphoni, quod idè esse cû Aconito primo Dioscoridis putamus, radicem scorpio similem esse scribit, Dioscorides $\rho\iota\lambda\alpha\nu\ \delta\iota\upsilon\alpha\lambda\alpha\nu\ \sigma\kappa\omicron\rho\iota\pi\iota\varsigma\ \epsilon\sigma\tau\iota$. Sed fortasse, inquit Dodonæus, dictio $\epsilon\sigma\tau\iota$ redundat, vt cum Theophrasto legèdum sit, $\rho\iota\lambda\alpha\ \delta\iota\upsilon\alpha\lambda\alpha\ \sigma\kappa\omicron\rho\iota\pi\iota\varsigma$. Hanc plantam appellat Matthiolus Pardaliâches minus, quod falsò Doronicum vocat. Alia verò huius Aconiti species est, inquit Dodonæus, antedicta paulò maior, saturatiùs virens, procerior, cuius radix longior minùs serpit, & adnatis vtrinque câmarum potius quàm scorpionem refert. Hanc pro Aconito Pardalianche Plinij Matthiolus pinxit, cui aliud addit, quod Theophrasti Thelyphonû & Aconitum Pardalianches facit. Hoc radicem habet non solum quæ scorpionem integrum referat, sed folia Cyclamini, radices fibras geniculatas Graminis modo, & similiter sese propagantes, & alios rursus scorpiones exprimentes, ex quibus postea & folia & germina erũpunt. At caules & flores nihil ferè à superiore differre videntur, sunt enim aurei oēs Chrysanthemi modo. Hanc triplicè proximè explicatam Aconiti Pardalianchis differentiam Pena, Lobellius, & plurimi Herbarij pro triplici Doronici differentia agnoscunt, de qua fusiùs tractauimus in libro de plantis quæ in asperis nascuntur. Vni folium hoc venenatum, Plinij Cyclaminum quidam tertium esse volũt, radice piscibus exitiosa. Gignitur in niuosis montibus Allobrogum prope oppidulum quod Muram vocant, & in luræ cacumine, vel sub ipsa niue statim vt nix liquata est sese attollens, & florescēs mense Maio, vel Iunij principio: radice in appendices diuisa, Rapûculis similes, quod fortassis Plinius ramosum dixit, fibrata, gustus valde acris cû terra primùm exit, vnico folio, crasso, carnosio, pallidè virente, venoso, lateribus diuiso, Cyclamino simili, paulò rotundiore: caule tenui, dodrâli: flore Violæ, luteo, cui foliolum alterum subnascitur, non, vt prius, rotundum, sed

ACONITVM *Pardalianches*
Theophrasti, ex Matthiolo.



LIMEVM *Pardalianchis genus*
vno tantum folio, Dalech.



*LIMEVM alterum
duplici folio.*



sed longum & angulosum. Tam venenata planta est, vt cū recēs erutam & lethalem adhuc odorem spirantem Herbarius quidam mihi comes curiosius & sapius olfecisset, velut exanimatus corruerit, vnde & ab eo pisces interfici posse, animo concipio. Alpinas gentes vallis Putæ sagittarum ferrum huius plantæ succo tingere compertum est ad ferarum venationem, ineuitabili letho pereuntibus, quas sic vulnerauerint, vt vel gutta sanguinis è plaga fluat. Acicula huius succo tincto columbum leuiter punctum nos paulò post mori vidimus, cū tam exitiosæ facultatis periculum faceremus. Lineum Plin. cap. ii. lib. 27. quo sagittas in venatu Galli tingunt, & ideò venenum ceruarium vocant; quidam esse arbitrantur. Hactenus de Aconito Pardalianche. Nam Lycoctonum seu Cynoctonum ostendendum, alterum Aconiti summum genus, cuius differētiās plures, quā recensuerit Dioscorides, hodie norūt Herbarij: tametsi ambigūæ mediæve naturæ inter Ranūculos, Elleboros & Napellos quādā earum esse videantur, vt rectè scripsit Pena. Ho-

rum Aconitorū quædam luteum florem, alia cæruleum, aut purpurascētem proferunt. Matthiolus aliquot Aconiti Lycoctoni species proposuit sine vllis descriptionibus, quòd appictæ imagines eas ad viuū representent. De floribus tantūm dicit, eos in quarto & nono aureos esse, in reliquis purpureos. Dodonæus in Hi-

*ACONITVM Lycoctonum II.
Matthioli.*



*ACONITVM Lycoctonum III.
Matthioli.*



ACONITVM IIII. *Lyc-*
etionum, Matthioli.



ACONITVM V.
Matthioli.



istoria stirpium Elleborum adulterinū nigrum siluestrem Fuchsi pro Lycocto-
no primo posuit. In Historia purgant. aliud Lycoctonum maius luteum facit, cui
folia sunt ampla, vt ipse descripsit, in complures partes confecta, Platani foliorum
similitudine, sed profundioribus diuisuris, haud *μακρότερα*. (vt perperam Diosco-

ACONITVM VI. *Matth.*



ACONITVM VII. *Matth.*





ACONITVM Lycopctonum
luteum maius, Dodonai.



ACONITVM Lycopctonum
Dod. ex Cod. Casareo.



ridis exemplaria legunt) sed μικρότερα. id est, minora, resplendentia, ac non rarò nigriora, superiore videlicet parte, inferiore magis albicàre: caulis bipedalis & quandoque altior, rotundus, lævis, ad latus nonnihil inclinans, & nequaquam in totum rectè assurgens, in ramos diffusus: flores ordine suprà inuicem digeruntur, colore pallentes

pallentes subluteo : semen in corniculis nigricat : radices sæpius nigrae, multis cir-
ris crassis & flexuosis implicatae. In montosis & opacis saltibus, auiſque nemo-
ribus viret. In hortis Gallia & Belgij colitur. Trium illorum, quorum quædam
Dioscoridis exemplaria meminerunt, postremum esse censet Dodonæus, Ponti-
cum dictum. Est Matthiolo Aconitum Lycoctonum primum. Arabes Strâgulatorem adib,
id est, lupi appellant, Officinæ quædam Napel-
lum luteum, nonnulli Lupariâ, Germani *Uol-*
uurtz, Hispani *Yerua matta loto*, Galli *Tue-loup*.
Pro deteriore cæteris veneno habetur à venato-
ribus, qui eo lupos interficiunt, non quòd idem
nò faciant alia Aconita, sed quia hoc citius &
certius. Quin nonnullis in locis, inquit Pena,
adulti flores vel solo manu fauces tumore illi-
co excitato adurunt, & vertiginem cient. Aco-
nitum Lycoctonum aliud depinxit Dodonæus
paruum siue minus cognominatû, descripſitq;
his ferè verbis. Humilis est herba, inquit, præ-
ter foliorum pediculòs cauliculos nullos ha-
bens : sunt autem hi breues, vix palmum alti &
tenuēs, folium verò in singulis vnicum, cir-
cumscriptione quidem rotundum, sed instar
Napelli multifidum, & profundis incisuris ra-
diatim dissectum, quibus medius insidet floscu-
lus luteus, forma Ranûculi, quem tamè non ca-
pitulum, sed siliquæ ponè sequatur, parua, tres
aut quatuor, sursum arrectæ, veluti Lycoctoni.



ACONITVM aliud,
Dalechampij.



LYCOCTONVM caeruleum l.
flore Delphinij, Dodon.



Radicula subest crassa, tuberosa, primæ Anemones æmula, quasi geniculis aliquot articulata, gustus admodum acris, ex qua foliorum pediculi exeunt. In Belgij hortis floret, inquit, nō rarò ipso Ianuario, cūm clementior Hyems fuerit : vnde Aconitum hyemale siue hybernum illic dici cœpit. Aconiti autem speciem esse &

LYCOCTONVM *caruleum*
paruum, Dodon.



ACONITVM *candidum,*
ἀργυρόν, Dalech.



forma foliorum siliquarumque, & pernitiōsa herbae facultas ostendunt. Matthiolus etiam Aconitum Lycoctonum secundum fecit. Vt Lycoctoni lutei, ita carulei aut purpurascētis aliquot sunt species. Prima Dodonæo est: quæ proceris caulibus assurgit, instar Napelli: folia habet variè similiter & creberrimis incisuris diuisa: flores secundum caules superius veluti in longam spicam compositos, è puniceo ac obscuriore colore purpuram æmulantes, forma ferè Floris regij (quem Delphiniū multi esse arbitrantur) in posterius videlicet corniculum desinentes: siliquas & semen vt in maiori Lycoctono luteo: radices oblongas, crassas, tres aut quatuor, paucis adhaerentibus fibris. Altera tota externa facie Napellum refert, caulibus videlicet dissectis, fissis & nigricantibus, foliis, flore caruleo, hiantē, ex totidem partibus eodem ordine composito, siliquis etiam ac semine omnino similibus: sed radix est diuersa, conis scilicet effigie, bulbosa, ex cuius media basi cirri multi & fibræ torquiles exoriuntur. Tertium genus cauliculos proferit tenuiores, breuiorē, dodrante altiores: folia diuisura Ranunculi aut Lycoctoni lutei, minora tamen: flosculi caruleo nitent colore, paulò minores quàm Napelli: siliquæ & semina eadē quæ aliis: radix fibrosa, nigricans, adnatis exiguis veluti bulbulis facillè propagatur. Hæc in montibus reperiuntur, vnde in Belgij hortos sunt trāssecta. Primum ac tertium vna cum Napello sæpenuerò aut non multò post, sed secundum multò seriùs floret. Lycoctona esse ex ipsa facie perspicuum est, ac nocendi non minoribus facultatibus prædita. Aliud Aconitum ex Dalechampsio hic depictum est, quod candidum & ἀργυρόν cognominari potest. In opacis excelsoꝝ montium iugis prouenit, tenuibus & perquam multis radicis fibris, nigricantibus: foliis multis, Geranio aut Aconito luteo similibus, longo pediculo & villoso subnixis: nullo caule, vnde ἀργυρόν dictum: floribus principio rubore aspersis, sed cūm senescunt albicantibus, duobus aut tribus ex summis foliis prodeuntibus, sex foliolis constantibus, singulis suo pediculo singillatim insidentibus. Semen

In hist. puc.
gant.

ACONITI *Lycoctoni* genus
aliud, *Dalechampi*.



Lib. 6. c. 7.
Aconit. no
xx.

videre non licuit. Id cum Dalechampus Gernium album esse suspicaretur, Herbarij quibus naturæ & facultatis huius plantæ indagandæ negotium cõmiserat, venenatam esse, & ex Aconitorũ genere asseruerunt. Dodon. in Histo. purg. Ranunculum albo flore vocat. Item aliud ex eodẽ Aconiti *Lycoctoni* genus exhibemus, quod in montosis ac gelidis siluis nascitur, lapidosissq; cliuis sæpius ad Orientem versis, radice per terram serpente, candida, carnosa, acri, crebris geniculorum nodis scabra: caule sesquipedali, ferulaceo, foliis Ebuli, valde ferratis, amplioribus, in vno pediculo fere septenis, flore Violæ, è puniceo candicante, semine paruo, in siliquis latiusculis. Cum Aconita omnia lethalia sint, quæ mala inuehant, & quæ sit omnium communis medendi ratio ex Dioscoride & aliis veteribus exponamus. Aconitum statim atque bibitur linguam edulcat cum quadam adstrictione, & ab edulcatione vertigines, potissimum cum exurgere conantur, inducit, & oculorum humiditates, pectorisq; & hypochondriorum grauitatem,

simulque multi flatus redduntur. In his, vomitionibus venenum educere oportet, & clystere aliu purgare. Vtemur in potu Origano, aut Ruta, aut Marrubio, aut Absinthij decocto cum vino absinthite, vel Eruæ (rectius *ευζώρης*, sicuti Paulus & Aëtius legunt, quàm *ἀετίζωρ*, id est, Semperuiui, vt vulgaria habet exemplaria) aut Abrotoni, aut Chamelæ: aut Chamæpityos. Prodest etiamnum ipsis opobalsami drachma vna cum melle, aut castorij & piperis & rutæ par pondus cum vino. Et coagulum hœdi, aut leporis, aut hinnuli cum aceto. Ferri quoque recementum, aut ipsum ferrum, aut aurum, aut argentum igne candens in vino restinctum, vt vinum hoc bibatur. Lixiuum item cum vino & gallina coctum, aut cornuum bubulorum iura cum vino sumpta. Dicitur autem Chamæpitys priuatim ipsis conuenire. His addit Aëtius, eos qui hausere, post dulcedinem & adstrictionem, amaritudinẽ percipere, constrictionem maxillarum comitari, & oris stomachi morsus, caligare oculos, & subrubentes videri, perseverantẽque malotremorem concussum tumoremque totius corporis sequi. Sed eandem medendirationem Aëtius & Auicenna præscribunt. Petrus Aponensis libro de venenis, iis qui Aconitum biberunt sphragidem Lemniam commendauit drachmarum duarum pondere ex calida potam, deinde vomitum excitari iubet, à vomitu theriacam eodem pondere exhiberi, ex vino, in quo incocta fuerit Gentiana, putatque Aconiti præcipuum esse antidotum Aristolochiam longam. Galenus scribit Aconitum Pardalianches septicæ & deleteriæ facultatis esse: quare in cibo potuq; fugiendum, tamen ad putrefaciendum quædam extra os & sedem aptum esse. Herbarum autem radix ad hæc utilis est. Aconitum Lycoctonum esse similis facultatis, sed peculiariter lupos interficere, sicut illud pardos.

Lib. 13. c. 19.

Cap. 23.

Lib. 6. sim.



ST & Aconiti Lycoctoni species, qui à Barbaris & recētoribus Na- *Nomina*
pellus à figura Napi in radice apparentis vocatur, à Germanis *Blou-*
voluurtz, & *Rappenblumen*, id est, flos rapaceus, à Belgis *Blauw-vuol-*
vuortele, à nonnullis *Muncks cappen*, id est, monachi cucullus siue cap-
pa monachi, à Gallis *Chapperon* siue *Coqueluchon de moine*. Dicitur & Thora. Caulem *Forma.*
mittit bicubitalem atque etiam tricubitalem, petiolósq̃ue graciles folia ferentes
Ranunculi maiora, è virore nigriora, supina parte nōnihil albicantia, numerosio-
ribus altioribúsq̃ue incisuris diuisa. Flores à medio caule ad summum vsque ordi-
ne prodeunt, colore cæruleo venusto, cuculli hiantis, aut galeæ parentis speciem
omnibus suis partibus referentes: quinque enim constant particulis, quarum ma-
ior & superior cucullo, aut cassidi, capitis cauo operimento similis, duæ medio-
res latera contegunt, reliquæ inferiores minores sunt, & angustæ, nonnullis ex
iguīs staminibus mediis, villosis, quibus extremis puncta lurida viridiæve insunt:
ex medio etiam duo paulum inflexi exoriuntur styli, non prius quàm eleuetur cu-
cullus se exerentes, quos sequuntur siliquæ, in quibus semen nigrum, angulosum
ac minutum, vt luteo Lycoctono: radix crassa, oblonga, Napi figura, foris nigri-
cans, intus candidior. In Alpibus Ananias & Rhetia, tum alibi in montibus spon- *Locus.*
te provenit. Apud Belgas quandoque in hortis reperitur. Maio aut Iunio, inter- *Tempus.*
dum etiam seriùs alsiosis locis floret, semen Augusto dat. Auicenna de Strāgula-
tore adib, & Strāgulatore leopardi, tum de Napello seorsum tractauit. De Napel-
lo verò hæc. Napellus venenum perniciosum, est in summo caliditatis & sicci-
tatis. Delet albaras linitum, & confectio eius dicta Alberzachali in potu sumpta
delet albaras, & similiter confert lepræ. Est venenum destruens bibentem se, maior
verò portio medietas drachmæ vnus, & secundum me, minùs hoc interficit.
Theriaca verò eius est mus Napelli, & ipse quidē est mus qui eo nutritur. Seman
verò (id est, coturnices) ex eo cibantur, & non moriuntur, & ex omnibus confe-
ctionibus Diamoschum magis ei resistit. Et alio
in loco. Napellus est de deterioribus. Et acci-
dit potanti ipsum, vt apostementur labia & lin-
gua, & egrediantur oculi eius, & frequens fit su-
per ipsum vertigo, & syncope: & non excer-
cere, seu non mouere potest crura, & est oppi-
dò malum. Et qui euadunt ex eo rarò euadunt
quin cadant in hecticam, aut phthysim, & quan-
doque facit epilepsiam odor eius. Et eius succo
imbibuntur sagittæ, & interficiunt quem vul-
nerant statim. Cura. Oporteret vt festinetur ad
faciendum vomere bibentem ipsum cum deco-
ctione seminis Napi & Rapæ, & detur in
potu vinum, & butyrum coctum vaccinum,
dando potum supra potum, & similiter deco-
ctio corticum glandium cum vino. Deinde cu-
ra eius principalis est Bezahar, & medicamē de
musco, & Algeduar (id est, Zedoaria) & Duha
seu bis mus buha, (id est, herba nascens cum
Napello, & Napellus Moyss, animal quod mo-
ratur in radice Napelli sicut mus, veluti ipsemet
interpretatur) & theriaca quandoquē *Lib. 2. c. 500*

NAPELLVS, Dodon.



Li. 2. fen. 6.
tract. 1. c. 1.

confert in eo vsque ad terminum. Et de melioribus rebus est vt in potu detur muschus in fricatione a bezahard, aut quantitas drachmæ vnius de medicamine muschi cum siliqua vna muschi. Et existimant quidam quod radices Capparis sunt Bezahar Napelli. Et omnia albezahard sunt bona ei, & propriè illud quod simulatur albumini, & habet fila sicut fila lithargyrij. Et animal nominatum mus Napelli, est contrarium Napello, & destruitur eius operatio cum comeditur ex ipso. Hæc Auicenna. Cuius Napellum esse plantam eam quam descripsimus Herbarijs persuaserunt sæua & atrocia illa symptomata, in quæ inciderunt qui sumpserunt. Tota quidem pernitiola est admodum, sed radix pernitiolior, adeo vt manu aliquandiu retenta, inquit Matthiolus, quousque concalescat, tenentem perimat. Quinetiam pastores necatos asserit, qui assandis auiculis Napelli caule pro veru temere vsi essent. Immanis illius in necandis hominibus facultatis exempla aliquot idem refert. Eandem euidenti sed perquam miserabili experimento Antuerpiæ olim compertam fuisse Dodonæus auctor est. Cum enim ab imperitis huius inter acetaria illata essent radices, quicunque eas ederunt, mox sæuissimis correpti symptomatis breui interiere. Inter remedia & antidota, quibus tam lethali veneno statim succurrendum, Auicenna murem Napelli radice nutritum refert, qui naturæ huius maleficæ tota substantia aduersetur, & fumentem ab omni liberet periculo. Matthiolus murem Napelli radicibus victitantem à se sæpius inuentum affirmat, qui Napellus Moyfi dicitur ab Auicenna. Petrus Aponensis etiam Napelli bezoar esse scribit murem nascẽtem in radice Napelli, qui exsiccandus est, & dandus in potu drachmarum duarum pondere. Sed Antonius Guainerius Papiensis, sua ætate celebris Medicus, in tractatu de venenis hunc non murem esse sed muscas existimat. Refert etiam quendam philosophiæ ac veritatis studiosum sollicitè admodum & diligenter murem huiusmodi quæsiuissse, neque vnquam vel murẽ, vel arrosam etiam Napelli radicem ab eo repertam, sed muscas abundè multas folia depascentes inuentas, quas philosophus ille muris loco accipiens antidotum ex eis confecit, quam & aduersus alia, sed contra Napelli venena vtilissimam ac efficacissimam comperit. Accipit hæc terræ Lemniæ, baccarum lauri, antidoti Mithridatis singulorum vncias duas, muscas Napelli vigintiquatuor, mellis & olei quantum satis est. In eadem planè sententia sunt Pena & Lobellius, scribentes accliuēs montium saltus Rheticarum Alpium Napello abundare. Iunio & Iulio mensibus, cui (omni illic arroso gramine) parcit pecus omne, nec ab vllò animali attingitur præterquam à muscis quæ gregatim aduolant, & illi insident, & floribus fortè innascuntur: sunt enim fermè concolores, maiores quàm communes, alis capitibusque ex lurido viridique vel castio virente quasi cantharides, vel cincedulæ. Hæc æiunt se attentius obseruasse quidem continenter flores rostello delibantes, cæterum murem Napelli frustra diu & multis auulsis plantis quæsiuissse, & an vidissent opiliones percunctatos, vsquã sibi visum negasse. Quare tum suspicatos Arabas ex *μύζα μύς* fecisse, id est, ex musca murem: *μύζα* enim musca est, *μύς* mus: nullum enim antidotum ex mure parant, ex muscis verò præstantissimum aduersus funestum Tarantæ morsum, & epidemicos morbos. Cuiusmodi hoc. Accipe muscas quæ pastum acceperunt de Napello viginti, Aristolochiæ, Boli Armeni ana drachmam vnam. Nec in vlla planta huic congenere muscæ hæc cæruleæ insident aut victitant. Quo certior est coniectura, istum Napellum esse Arabum, & vnum esse ex Dioscoridis Aconitis. Et verisimile est non murem esse qui Napello victitet, sed muscas quæ linctu eius viuunt: nam Aconitum, cuius Napellus est species, mures interimit, atq; inde *μυοφόνον* & *μυοφόνον*, id est, muricida dicitur. Plantam aliam hic depictã etiam Napellum vocant Herbarij ob venenatam facultatem, & Napellum leucanthe-

mum seu

NAPELLVS *racemosus,*
Dodonæi.



mum seu racemosum cognominant. Nascitur in saxosis, gelidis, & niuosis montibus cum Aconitis inter lapides & saxa: radice longa, lata, innumeris fibris nigris capillata, quæ in plerisque id genus plantis sic complicatur, ut retia temere congesta quis iudicet. Sub his fibris veluti sub fornice inter lapides, ex quibus radix proflit, cameratum spatium est, in quo mures occultati sæpius deprehenduntur. Caules multos emittit, sesquipedales, glabros, Filicis modo, nodosos, prope radicem nudos: folia Angelicæ similia, gustus amarissimi & abominandi, odoris tetri: floræ in caulium vertice albæ: fructum Hederæ corymbis similem, qui nouem aut decem acinis constat mollibus, nigris. Narrant montium, in quibus hæc planta frequens est, incolæ, ea sumpta lupos & homines necari præsentissimo exitio. Quidam venenatam esse negant, & Actææ Plinij esse volūt. Actæa, inquit, graui foliorum odore, caulibus asperis, geniculatis, semine nigro ut Hederæ, baccis mollibus, nascitur in opacis & asperis, aquosissq; Datur acetabulo pleno interioribus sceminarum morbis. Sed

Lib. 27. c. 7.

caules asperos Actææ tribuit Plinius, quos in hac nostra læues esse diximus. Quidam Plinij codices habent caulibus Anisi, falso. Cornarius legit caulibus angulosis, & Actæam Ebulum appellatam à Plinio videri ait, & apud Paulum Æginetam *ex Gelæ* radicem Sambuci radicem interpretatur. Dodonæus Christophorianæ nomine describit, & Aconitis adnumerat, propter periculosam & Aconito similem quam habere creditur facultatem: fertur enim exitialis ac non minùs noxia quam Aconitum.

Lib. 4. c. 2.

lib. 1. c. 1. purgare

ANTHORA.

CAP. XII.

QUONIAM pessimè consultum humano generi foret, si de venenis ageretur sine remediorum declaratione, huic de venenatis plantis libro postremam addemus plantam, quæ cum aduersus venena omnia, tum maximè aduersus Napellum plurimùm valet. Ea est Anthora vulgò dicta, quasi Antithora, seu potius Antiphthora, quod Thoræ aduersetur, & eius sit alexipharmacum. Ea, ut ferunt Herbarij, cum Napello vel prope Napellum crescit in Rhetia & Sabaudia alpibus, atque etiam alibi. Taurini Ligures atq; Lemani lacus incolæ aduersus exitiale Thoræ venenū diuinitus comparatam esse putant, qui radicem huius copiam Venetias deferendam curant. Caulem profert sesquipalmarem, interdum cubitalem, rotundum, firmum, in quo tenuia ac multifida profundisque incisuris fissa disparibus interuallis oriuntur folia, in latus sese diffundentia: flores Napelli æmulos, sed luteos pallentes & minores: siliquas & semen similia. Radices subsunt geminæ, solidæ, oblongæ, oliuis pares, sæpe maiores, cortice subnigricante, carne intus alba, cum siccatæ fuerint fractu contumaces, friabiles tamen. Scribit Auicenna Napellum Moyse buha herbam esse nascentem cum Napello, eique propinquam ita ipsum debilitat, ut non crescat, neque fructificet, nullum esse hac melius Napelli alexipharmacum, ad omnia

Nomina

Forma.

Lib. 2. c. 300.

NAPELLVS prior,
Matthioli.

ANTHORA, siue Anthiora,
Matth. Napellus Mosi.



Li 2. c. 745.

prodesse ad quæ Napellus, ad albaras & ad lepram, & theriacam esse viperæ & venenatorum animalium. Alio in loco tradit Zedoariam illam meliorem esse, quæ cum Napello crescit, atque eius vicinia illius vires retundi. Ex quibus colligere licet Anthoram esse Napellum Moyfi Auicennæ, & eiusdem Zedoariâ. Diuersam tamen Zedoariam habent Officinæ, de qua dicemus in Peregrinis. Amarissima est Anthoræ radix, & non solùm Napello & cæteris omnibus venenis aduersatur, sed etiam ad purgationes vtilis est: serosos enim & mucosos humores per inferiorem ventrem educit, lumbricos & ventris tineas pellit. Pena & Lobellio auctoribus. Hugo Solerius scribit hanc radicem ad fabæ magnitudinem in iusculo aut vino derafam propinari ad largas durorum corporum per superna & inferna purgationes. Antonius Guainerius in tractatu de peste refert Anthoram magnæ esse aduersus pestem efficaciam. Et quod ad experientiam, inquit, vidi consimilis cum Dictamno virtutis Anthoræ radicem esse. Et est herba quæ iuxta Thoram illam scilicet herbam nascitur, ex qua venenum conficitur, cum quo in Alpibus Salutianorum & Pinarolij capras siluestres venantur. Et hæc radix Anthoræ assimilatur nucleis oliuarum, & est bezoar illius Thoræ, quæ est adeo venenosa, vt omnia animalia sua interficiat venenositate. Hæc ille. In collibus prope Diam Allobrogum ea frequentissima nascitur. Indigenæ vocant *L'herbe de maclou*, id est, herbam colicis doloribus vtilem. Radicum geminarum altera quotannis, vt in Cynosforchi, flaccescit: altera fit vegetior. Credit in eo tractu Herbariorum vulgus, marcescentem radicem coli cruciatus excitare, grandiore & augefcntem sanare.



HISTORIAE OMNIVM PLANTARVM

LIBER DECIMVS
OCTAVVS.

(639)

In quo describuntur & ad vinum depinguntur Planta Peregrina.

GUAYACVM.

CAP. I.



VLTAE sunt stirpes quæ in remotissimis terrarum oris exoriuntur, tam excellentibus dotibus præditæ, vt iis in tanta nostrarum copia carere nec possimus, nec velimus. Raritas pretium & admiratione auxit, & discendi cupidos veteres Græcos, Latinos, Arabas ad earum notitiam comparandam ita stimulauit, vt maria traicere, in barbaras regiones proficisci, edita cõscendere, per saltus & auia vagari, omnia denique perlustrare, nulliq; labori parcere voluerint. Quare multi quidem multa & præclara de iis literis consi-

gnarunt, sed non omnes omnia quæ viderint, sed auditione duntaxat acceperint: ob id incerta quædam, nonnulla fabulosa tradiderunt. Nunc verò cùm regiones multæ illis prorsus ignotæ, & velut alter orbis detectus sit, iisdem discendi stimulis concitati seduli & industrij viri, multò plura quàm veteres obseruarunt, multòque veriora & certiora de aliis quæ ab illis tradita fuerant, literarum monumentis mādarent. Ex quibus ea promptissimus quæ studioso lectori satisfacere possunt. Sed multas peregrinas plātas, quæq; ex iis manāt, aliis libris exposuimus, vt in Silua Siliquam catharticam, Ficum Nigritarum, Populum Peruanam, Ahouai, Hairi, & plures alias: in Cathartici Aloën, Rhabarbarum, ordine & quadam cum aliis similitudine id postulante. Nunc de peregrinis arboribus, fruticibus, herbis agemus, quarum fructus, cortices, ligna, radices, semina, succi, resina, gummi magno ac quotidiano nobis vsui sunt. Exordiemur autē à Guayaco omnibus notissimo. Indi *Guayacan* vocant, nos Guayacum, siue Gaicum, alij Lignum Indicum. Hoc alij Ebenum esse dicunt, aut Buxi speciem, alij aliis nominibus appellāt. Sed nouum est arboris genus, nec in his regionibus aut vllis aliis toto orbe veteribus cognito visum, sed in eo solū qui nuper inuētus est, quā sic descripsit Nicolaus Monard. Magna est arbor, Illicis magnitudine, ramosa, marrice magna, nigricante, materie quàm Ebenus duriore, cortice crasso, gummoso siue pingui, & cū siccu est lignum facilè decedente: folijs exiguis & duris: flore luteo, cui succedit fructus rotundus, solidus, quo semina continentur veluti in mespilo. Frequens nascitur in insula S. Dominici. Aliud eius genus in insula D. Ioannis de portu diuite postea

Nomina

Forma

Locus

reperitum est, superiori ferè simile, sed minus omnino, & ferè sine matrice, odoratius & amarius superiore, quo uti desiere ut istud usurparent, ob admirabiles virtutes Lignum sanctum appellatum: experientia enim docuit altero præstantius esse. Quanquam vtriusque facultates in curanda lue venerea maximè sint efficaces: quare ad eam curandam siue coniunctim, siue separatim vtriusque propinatur decoctum. Secundum istud genus videtur esse, quod Pena Palmam aut Palum sanctum Indiæ occidentis vocat, quam speciem à Guayaco diuersam facit, etsi similis esse dicatur, nempe non vasta ut Fraxinus, sed minor, & concolore cortice: foliis Plantaginis, sed crassioribus, minoribus, pinguioribus, breuioribus: fructu iuglandis magnitudine, aluo subducendæ idoneo. Idem Pena Palmæ sanctæ similis ar-

PALMÆ sanctæ similis arbor.



boris à naucleris Angliæ, quæ rex India redierant, surculos se habuisse scripsit, quos depinxit & descripsit his ferè verbis. Rami sunt grandioris arboris, recti, cortice arboris ludæ, folio Citri carnosio, nudo, quàm Lauri latiore, breuiore, neruoso, in quorum summitate hærent folliculi pallidi, coriacei, circinata rotunditatis, admodum compressi, aureo nummo Gallico ferè pares: in quorum medio insunt semina lentis effigie & colore, compressiora, gustu amaricante. Hæc ex Pena. Quomodo autem & quando Guayaci vsus primùm innotuerit, ita narrant. Hispanus quidam magnis doloribus Hispanici morbi, quem ab Inda muliere contraxerat, torquebatur, cuius seruus in ea prouincia medicinam faciens decoctum Guayaci propinauit, quo non solum à magnis doloribus illum liberauit, sed etiam pristinae sanitati restituit: cuius exemplo multi alij Hispani eodem morbo infecti curati sunt. Eius morbi curatio Hispani statim euulgata fuit ab iis qui ex ea insula redierant: hinc per totam Hispaniam, inde per vniuersum orbem, quem hæc lues paulatim occu-

pauit. Atque hoc sanè medicamento nullum aliud aduersus eum morbum præstantius, sic volente Deo, ut vnde manarat morbus, inde remediū peteretur. Nam primùm ex India occidentali hoc malum duxit originem, præcipuè verò ex insula D. Dominici, quæ prima fuit noui orbis ab Hispanis occupata, vbi morbus hic tam familiaris est, quàm nobis papulæ, neque eius contagium magnopere quisquam reformidat. Hoc autem modo propagatus fuit. Anno à Christo nato 1493. eo bello, quod Neapoli gestum est à Carolo Gallorum rege, Christophorus Columbus ex prima illa protectione, quam noui orbis conquirendi causâ susceperat, cum rediisset, & inuentis S. Dominici alijsq; insulis inde Neapolin (ibi tum Rex Catholicus erat, pacemq; cum Gallorum rege fecerat) viros ac mulieres secum duxisset, commeantibus vltro citroq; exercitibus, Hispani primùm cum Indis mulieribus hac scabie correptis, & Indi cum Hispanis consuetudinem habuerunt: deinde ad Italos & Germanos, postremò etiam ad Gallos serpsit hoc malum, ac inde per vniuersum orbem. Ad huius perfectam curationem nullum aliud præstantius remedium, quàm Guayaci decoctum pro morbi magnitudine, ægri viribus, & totius corporis temperatura à medico præscriptum: est enim eius morbi antidotum, neque eum curat manifestis suis qualitatibus. Nam gustus ex Galeni doctrina

doctrina in lib. de Simpl. medicament. facultatibus tradita, sicca admodum & calida substantia esse demonstrat, quod amarum sit eius decoctum & acre, ut calidum ad tertiam vsque gradum esse censeatur, & habere partes *ερεσπογες*, nempe subtiles, in quibus acrimonia, & terrestres adustas in quibus amaritudo consistit: quare tantam sustinet decoctionem, adeo ut si decies decoxeris, paulo minus amarum, acre & spissum fuerit hoc decoctum quam primum, vixque virtus extrahi possit. Cum igitur iis qualitatibus præditum sit, non solum iis non curaret hunc morbum, qui ex calida & sicca oritur hepatis intemperie, imò potius exacerbaret. Ex quibus liquet occulta qualitate, & forma specifica, ut aiunt, id agere, quemadmodum & multa alia medicamenta. Conuenit etiam huius ligni decoctum incipienti hydropi, asthmaticis, epilepticis, morbis vesicæ & renum, articulorum doloribus, omnibus morbis qui ab humoribus frigidis & flatibus proueniunt, & diuturnis, quibus nihil profuerint cetera medicamenta quæ in usu sunt quotidiano, præsertim si morbi illi luem veneream subsequantur. Dentes etiam confirmat & dealbat, si sæpius eius decocto colluantur. Qua verò ratione præparandum sit ligni huius præstantissimi decoctum, quis eius usus, quæ eo ventibus victus ratio seruanda, non est quod hic explicemus, cum hæc omnia lippis & tonforibus iam sint notissima.

EBENVS.

CAP. II.

EBENOS, Græcis, Ebenus Latinis, Arabibus *Abanus*, & *Abenus*, Italis *Ebeno*, Gallis *Ebene*. Ebenus optima, inquit Dioscorides, habetur Æthiopica & nigra, nullo habens venarum discursus, factitio cornu læuore similis, cum frangitur densa, mordens gustu & subadstringens. Substitur iucundo odore super carbonem sine fumo. Recens igni admo a ob pinguitudinem accenditur, & trita ad cotem rufescit. Altera est Indica lineas albas habens & fuluas, item frequentes maculas: ceterum prior bonitate antecellit. Theophrastus in India tantum prouenire Ebenum scribit his verbis. Ebenus quoque Indiae peculiaris est, cuius duo sunt genera, vnum laudata materie pulchrumque, alterum ignobile. Quod præstantius, rarum, alterum copiosum. Coloris gratiam non recondita acquirit, sed statim sua natura habet: fruticosa est arbor Cytisi modo. Idem cecinit Maro.

Nomina
Lit. c. ii.
Forma.

- sola India nigrum

Fert Ebenum, solis est thurea virga Sabæis.

Hos secutus Plinius, Vnam, inquit, è peculiaribus Indiae Virgilius celebrauit Ebenum, nusquam alibi nasci professus. Herodotus eam Æthiopiam intelligi maluit, in tributum vicem Regibus Persidis è materie eius centenas phalangas tertio quoque anno pensitasse Æthiopes cum auro & ebore, prodendo. Et mox, Æthiopiam forma nuper allata Neroni principi, raram arborem Ebenum Meroen vsque à Syene sine imperij per nongenta xvi. m. passuum, nullamque aliam nisi palmarum generibus esse docuit. Accendi eam Fabianus negat: vratur autem odore iucundo. Duo genera eius, rarum id quod melius, arboreum, trunco enodi, materie nigri splendoris, ac vel sine arte protinus iucundi: alterum fruticosum Cytisi modo, & tota India dispersum. Theuetus scribit Indiam ferre & alere tantopere laudatam Ebenum, sed præcipue in insula quam Palmobotre vocant præstantissimam & nigram colligi. Ceterum an Ebenus quæ ad nos adfertur legitima sit, merito dubitari potest, quod suffitu nullum iucundum odorem emittat. At hic tempore & longo per maria itinere euanescere & perire potest. Eum Officina pro Xyloaloe habent. Nec obstat, inquit Pena, quin Officina Ebene species sit Guayaci. Nam præduræ assulæ, quæ in Officinis visuntur, & aquis merfae sident, tum pinguedo

Li. 2. Geor.

Li. 12. ca. 14.

To. 1. lib. ii.
cap. 21.

guedo, quæ exudat igni perinde atque è Guayaco, tum aspectus ipse, tum vires & sapor id testari videntur. Præterea odor ei inest Guayaci, & vires ad eadem quæ Guayacum commendantur. Quod si quis obiiciat solam Indiam nigrum ferre Ebenum ex Poëta, respondet Ebeno idem euenire posse quod Guayaco, quod nõ modò in Taprobanæ finitimis ad Orientem & Austrum, sed etiam in India occidua longissimè disita siluestris proueniat. Ebeni facultates has esse scribit Dioscorides. Caliginem oculorum deterget ad veteres destillationes pustula sç; mirum in modum pollet. Si quispiam facta ex eo coticula collyriis vtatur, melius proficiet. Ad oculorum medicamenta efficax est, si scobes ramentæ in vino Chio die noctuq; macerata in collyria digerantur. Nonnulli pertrita ipsa excolant. Alij pro vino aqua vtuntur. Vritur in fictili nouo, donec in carbones redigatur. Lauatur plûbi vsti modo, & ita siccis scabrisq; lippitudinibus cõducit Plinius aliter de eadem re disserit. Non omittetur Ebenus propter miraculum. Scobem eius oculis vnice mederi dicunt: lignoque ad cotem trito cum passo caliginem discutit. (Dioscorides dixit lignum vice cotis ad terenda collyria paratum vtilius esse.) Ex aqua verò radice, albugines oculorum: item tulsim pari modo Dracûculi radice adiecto cum melle. Ebenum Medici & inter erodentia assument. Quæ postrema, Ex aqua verò, &c, Dioscorides non habet, Galenus etiam prætermisit. Ebenus, inquit, ex iis lignis est quæ trita cum aqua in succum soluuntur, vt lapidum nonnulli. Vis ei inest calfaciendi, extergendi, & tenuium partium. Quamobrem quæ pupillas offuscant extergere creditur. Miscetur aliis remediis ocularibus, quæ ad vlcera vetera, fluxiones, & pustulas accommoda sunt.

T H V S.

CAP. III.

Nomina

Li. 2. ca. 532.
Lib. simpl.
cap. 175.
Lib. 1. c. 70.

Locus.
Electio.

RAECIS *Ἰσχυρός* & *Ἰσχυρόσις*, Latinis Thus, Auicennæ Conder, Serapioni Ronder corruptè, Italis *Incenso*, Germanis *Vueirauch*, Hispanis *Encienso*, Gallis *Encens*. Thus, vt refert Dioscorides, in ea Arabia gignitur quæ Thurifera cognominatur. Primatum tenet in eo genere, inquit, masculum Stagonias appellatum, natura rotundum, cùm frangitur intus pingue, in suffitu statim ardens. Indicum verò suffuluum est, & colore liuidum, sed rotundum industria factitant, nam in quadrangulares formas dissectum fictilibus versant, donec rotunditatem contrahat. Verùm huiusmodi Thus tempore flauescit, quod Atomum, aut Syagrum appellant. Secundum locum habet Arabicum, & in Smilo nascens, quod aliqui Copiscum vocant, minus multo & fuluius. Est & genus cui Amonitæ cognomen est, alioqui candidum, quod dum molitur, mastiches more digitis cedit. Adulteratur in itinere Pini resina & gummi: quod facile deprehendi potest, quod suffitum gummi flammam non eiacularur, & resina in fumum euanesceat, Thus verò statim ardet: idem maleficium odor prodit. Hæc de Thure Dioscorides, cuius historiam fusiùs ex Theophrasto & Plinio describere non iniucundum fuerit. Gignitur Thus præter Arabiam nullis, ac ne Arabiæ quidem vniuersæ, sed priuatim in medio ferè regionis, circa Aramitas pagum Sabæorum. Spectat is locus Orientem æstiuum vndique rupibus inuius, & à dextera maris scopulis inaccessus. Siluarum Thus proferentium longitudo est centum milia passuum, latitudo dimidium eius: quas & Minæi attingunt pagum alium incolentes, per quos Thus euehitur vno tramite angusto, à quibus etiam Thus Minæum dictum est: etenim hi primi commercium Thuris fecere, maximeque id exercent. Cæteris Arabibus videre Thuris arbores interdicitum est, his exceptis, ac ne Minæi quidem omnes has arbores videre possunt: ius enim in Thus & legendi potestas trecentum tantum familiarum esse dicunt, quæ id sibi per successionem vendicant, quæq; ob id sacræ vocantur, quia cùm incidunt has arbores, aut metunt, nec

feminarum,

Lib. 9. hist.
cap. 4.
Li. 12. ca. 14.

fœminarum, nec funerum congressu polluantur, atque ita religione merces au-
gentur. Quidam promiscuum ius iis populis esse tradunt in siluis, aliis per vices
annorum diuidi. Cæterum quâquam prisci Romani in Arabia bella gesserint, ta-
men arboris Thuris facies à nullo quod sciam, inquit Plinius, Latinorum tradita
est. Græci quoque variant. Alij enim, vt scribit Theophrastus, folio Pyri minore
duntaxat, & herbidi coloris prodidere. Alij Lêtisco similem, subrutilo folio. Iuba
tradidit contorti esse caudicis, ramis Aceris maximè Pontici, succum amygdalæ
modo emittere, talisque in Carmania apparere, & in Ægypto satas studio Ptole-
mæorum regnantium. Cortice esse Lauri constat: quidam & folium simile dixere.
Talis certè fuit arbor Sardibus, nam & Asiæ Reges ferendi causa habuere. Qui
mea ætate Legati, inquit Plinius, ex Arabia venere, omnia incertiora fecerunt,
quod iure miremur, virgis etiam Thuris ad nos commeantibus: quibus credi po-
test matrem quoque teretem enodi fruticare trunco. Meti semel anno solebat mi-
nore occasione vendendi. Deinde quæstus alteram vindemiam attulit. Prior atq;
naturalis vindemia, circa canis ortum flagrantissimo æstu, incidentibus qua
maximè videbatur esse prægnans, tenuissimisque tendi cortex. Laxatur hic plaga, nõ
adimitur. Inde profilit spuma pinguis. Hæc concreta densatur, vbi loci natura
poscit tegete palmea excipiente, aliubi terra circumpauita. Purius illo modo, sed
hoc ponderosius. Quod in arbore hæsit, ferro depectitur, ideò corticosum. Au-
tumno legitur ex æstiuo partu. Hoc purissimum, candidum. Secunda vindemia est
Vere, ad eam Hyeme corticibus incisis. Rufum hoc exit, nec comparandū priori.
Creditur & nouellæ arboris candidius, sed veteris odoratius. Quidā in insulis me-
lius gigni putant. Iuba in insulis negat nasci. Hæc de Thure veteres literis manda-
runt, quæ omnia recentioribus non probantur. Primum Garcias per vniuersam
Indiam Thus minimè prouenire certissimum esse ait, & quicquid Thuris hinc cõ-
sumitur, & hinc in Lusitaniam defertur, ex Arabia aduehi affirmat. Quare mira-
tur Dioscoridem & eum secutum Auicennam scripsisse Thus in India nasci. De
Arabibus tamen minùs mirum, qui nigricantem colorem Thuris Indici ex Diof-
coride, Indum ea ratione vocare possunt, quæ Myrobolanum nigrum, Indum.
Cæterum Thus Arabibus dici *Louan*, idem Garcias auctor est, nomine ex Giaco
deducto, eoque solo nomine ab omnibus vocari, à paucissimis *Conder*. Arborem
etiam quæ Thus producit *Louan* ab iisdem appellari, eiusque duo esse genera. Vnā
montanam, alteram in planis nascentem. Montana montibus confragosis proue-
nit, optimūque & laudatissimum Thus profert. In planis nascentem Thus profert
nigrum & improbum, quo cum aliis resinis permixto naues picant, vti nos pice.
Eæ arbores sunt Regis, nec cuiquam Thus colligere licet nisi Regis permisso.
Confluunt eo negotiatores ex Aden, Xael, & aliis Arabiæ locis, & cum Rege de
Thuris quantitate quam aueturi sunt, & de pretio conueniunt, modò laudatum
sit ac legitimum, quod nos masculum appellamus. ipsi *Melato*. Arbor Thuris hu-
milis est, & folia habet Lentisco similia, peculiarisque est Arabiæ. Ajunt tamen
Hispani in nouo orbe etiam Thus inueniri. Sed fides penes eos esto. Cùm autem
optimi Thuris satis vile sit pretium, improbi verò, quod interdum cum optimo
miscetur, & cui nonnunquam corticum fragmenta inhærent, multò vilius, id mi-
nimè adulteratum ad nos deferri putat Garcias. Quis enim, inquit, adulterare vel-
let, quod tam vili emitur? Theuetus à Garcia dissidet: scribit enim arborem Thuri-
feram Pinus resiniferas referre, & succum fundere, qui tempore durefcit, & Thus
vocatur, cum quo granula reperiuntur arenæ aut sabulo similia, quæ Mannam
Thuris vocant. Multas insulas & regiones huius esse feraces, non solam Arabiam,
& quibusdam in locis tam vulgarem esse, quàm Aurantiam malum in Galliæ Pro-
uincia. Thus tamen quod in Arabia crescit, & à Pecher & Fartach regni Aden
oppidis

Li. i. Arom.
Ind. cap. 6.

Nomina

Genera.

Forma.

To. i. Cos-
mog. lib. 4.

ARBOR *Thurifera*,
Theueti.

oppidis deferretur, vt olim, ita etiam hodie præstantissimū haberi, quod à priscis magna cum superstitione colligebatur. Id duplex esse. Vnū quod æstate, & quandiu Sol sub cane est, colligitur, candicans, purum, nitidum, pellucidum: alterum quod Vere rubescens, pondere, pretio, bonitate & viribus superiore multò inferius, quia illud maturius, & à Sole sub cortice suæ arboris magis excoctum esse videtur.

Arabes cultris arbores vulnerant; vt copiosior liquor esiliat, quem *Alboucor* vocant. Ex iis arboribus quædam sexaginta Thuris libras, & eo plus emittunt. Arboris iconem ex Theueto expressimus, & eliciendi Thuris rationem. Thus lymphidum & pellucidum, nitidumque ac puritatem succini affecutum se vidisse & habuisse scribit Pena, quod Dioscoridis notis quadrabat: nam dum adolebatur suauissimum spirabat odorem, & vulneribus tumoribusque discutiendi vi relicta aliqua adstrictione ad robur partis summo erat auxilio: se Rupellæ à docto Medico Launano gummi istius glebis, arboris fructu & folio donatum. Asserebat tamen nihil ille, sed sibi relatum à nautis vtrumque trunci Pino simili sobolem esse. At folium quia rarissimum, neque à quopiam vnquam expressum, pictum dedit, magis sciscitaturus sit ne plantæ resinifera, quàm asserturus. Est enim quod raro aliis contigit, ab imo pediculo ad summum vsque cuculli verticem duplicatum,

*THURIS lymphidi
folium, Pena.*

Lib. i. c. 70.
Vires.

quasi ex geminis tenuibus conflatum tunicis, vagina sesquipalmum longa instar infundibuli hiantis histrionis speciem præ se ferentis, supernè galeata, quod de floribus Nape'li & de Lonchitide, non de foliis vllis memorant auctores. Nunc explicandæ Thuris vires, & magnæ ac certissimæ aduersus varios morbos, tum internos, tum externos vtilitatis. Calefaciendi & adstringendi vi pollet, auctore Dioscoride, oculorum caliginem discutit, caua vlcera replet, & ad cicatricem perducit, cruenta vulnera glutinat, infrenatque cunctas sanguinis eruptiones, etiã si cerebri membranis effluat: vlcera quæ cacoëthe vocantur, & sedis & reliquarum partium permulcet tritum cum eo &

lacte linimentum: formicantes verrucas inter initia, impetiginēsque ex aceto & pice illitum tollit: ambusta igni pernionēsque cum suillo adipe, aut anserino, & vlcera in capite manantia cum nitro si infricetur sanat: paronychii cum melle, auribus fractis cum pice medetur: ad reliquos aurium dolores cum vino infunditur: inflammatæ à partu mammæ cum cimolia & rosaceo magna vtilitate perunguntur: additur ad arteriæ viscerumque medicamenta: prodest sanguinis excretioni potum: sed in secunda valetudine haustum insaniam mouet, & largiùs cum vino potum interficit. Cortici Thuris eadem vis quæ Thuri, sed validior, adstringentioreque. Quare potu cruentis excretionibus & vuluis fluxione laborantibus in

tibus in pefso confert, ad cicatrices oculorum, & caua fordéſque efficax eſt, toſtus ſcabris lippitudinibus auxiliatur. Manna Thuris (Sic micæ Thuris conculſu elifas vocamus, inquit Plinius) vim habet eandem quam & Thus, ſed inualidiuſculam. Fuligo Thuris oculorum inflammationes mitigat, fluxiones ſuſpendit, vlcera purgat, caua replet, carcinomata ſiſtit. Galenus diſtinctiùs eadem declarat. Thus excalfacit ordine ſecundo, deſiccatur primo, habet quoque adſtriſionem puſillam. Sed minimùm manifeſta adſtriſio eſt candido. Cortex eius euidenter adſtrin- git: quare ſtrenuè quoque deſiccatur, adeò vt ex ſecundo ſit ordine completo de- ſiccantium. Eſt autem craſſiorum partium quàm ipſum Thus, & minimùm ha- bet acrimonia. Ob has ergo tum facultates, tum qualitates, multus eſt eius vſus apud Medicos in hæmoptacis, ſtomachicis, cœliacis ac dyſentericis, non tantùm iis quæ extrinſecus applicantur ipſum admiſcentes, ſed & iis quæ intrò in corpus ſumuntur. Fuligo eius tum ſiccioris, tum calidioris eſt facultatis quàm ipſum Thus, adeò vt ad tertium vſque exceſſum perueniat. Habet verò etiam abſterſo- rium quiddam. Itaque eo nomine & repurgare, & implere quæ in oculis conſi- ſtunt vlcera videtur, veluti & myrrhæ & ſtyracis. Hæc Galenus. Quod verò Dioſ- corides dixit Thus in ſecunda valetudine hauſtum inſaniam mouere, nullus alius Græcorum ſcriptorum, quod ſciam, prædixit. Contrà Auicenna tradidit Thus conferre rationi, ipſamq; corroborare, & eſſe quosdam quibus præcipitur, vt eius inſuſum bibere aſſueſcant ieiuni, ſed eius vſum plurimum dolorem capi- tis excitare. Id tamen quod ille dixit Thus largiùs cum vino potum interficere, Auicenna etiam vſum eius plurimum cum vino interficere, ſimiliter cum aceto. Serapio locum Dioſcoridis ſic conuertit. Et quando bibunt de eo ſani, parùm meliorat eos, ſed ſi nimis cum vino biberint, inducit maniam, & amplius cum vino occidit.

Li. 7. ſimpl.

Li. 2. ca. 32.

Lib. ſimpl. cap. 178.

MYRRHA.

CAP. IIII.

MY'PNA Græcis, Latinis Myrrha, Arabibus *Ler Mur*, ſeu *Mor* appella- tur, *Mirrha* Italis, *Mirren* Germanis, *Myrrhe* Gallis. Myrrhâ ſcribit Dioſ- corides lacrymam eſſe arboris quæ in Arabia gignitur Ægyptiæ ſpina non diſſimilis, è cuius vulnere deſluit lacryma in ſubiectas tegetes, alia circum caudicem concreſcit. Deinde genera eius recenſet. Dicitur aliqua pedaliſſimos, præpinguis, qua expreſſa ſtacte emititur. Alia gabirea pinguiſſima, læto & pin- gui ſolo naſcens, ea copioſam ſudat ſtactem. Omnium prima eſt quæ Troglodyti- ca appellatur, accepto cognomine à loco in quo provenit, ſplendens, ſubuiridis ac mordens. Quinetiam legitur tenuis quædam, quæ à Troglodytica ſecunda eſt, Bdellij modo mollis, verùm odore grauiuſcula, apricis naſcens. Alia caucalis co- gnominaſtur, præter modum exoleta, nigra & retorrida. Omnium deterrima quæ Ergaſima dicitur, pingui carens, cano ſitu obducta, acris, ad gummi imaginem vergens, & viribus eius proxima. Improbatur Aminæ cognomine. Eligenda eſt recens, ſqualore obſita, levis, vndique concolor, quæ contracta venas vnguium modo candidas & læues oſtendit, minutis glebis, amara, acris, odorata, calfaciens: ſuperuacua & inutilis eſt ponderoſa, coloris picei. Plinius cùm de Thure ſcripſi- ſet, hæc de Myrrha literis mandauit. Myrrham in iſdem ſiluis permixta arbore naſci tradidit aliqui, plures ſeparatim. Quippe multis in locis Arabiæ gignitur. Conuehitur & ex inſulis laudata, petuntque eam etiam ad Troglodytas Sabæi tranſitu maris. Satiua quoque provenit, multùm ſilueſtri prælata. Gaudet raſtris atque ablaqueationibus, melior radice refrigerata. Arbori altitudo ad quinque cubita, nec ſine ſpina, caudice duro & intorto, craſſiore quàm Thuris, & ab radice

Nomina
Li. 1. ca. 67.
Forma.

Genera.

Electio.

Lib. 12. c. 35

etiam, quàm reliqua sui parte. Corticem læuem similémque vnedomi : scabrum alij spinosumq; dixere. Folium Oliuæ, verùm crispum & aculeatum. Iuba Oiusatri. Aliqui similem Iunipero, scabriorem tantùm, spinisq; horridam, folio rotundiore, sed sapore Iuniperi. Nec non fuere qui è Thuris arbore vtrumque nasci mentirentur. Inciduntur bis & ipsæ, iisdémque temporibus, sed à radice vsque ad ramos qui valent. Sudant autem sponte priùs quàm inciduntur, Stracem dictam, cui nulla præfertur. Ab hac satiuæ, & in siluestri quoque melior æstiuæ. Genera complura. Troglodytica siluestrium prima. Sequens Minæa, in qua & Atramitica est, & Ausaritis Gebanitarum regno. Tertia Danitis, Quarta collatitia, Quinta Sembrocena, à ciuitate regni Sabæorum mari proxima. Sexta, quam Dalaritin vocant. Est & candida non tantùm loco, quæ in Messalum oppidum confertur. Probatur Troglodytica à pinguitudine, & quòd aspectu aridior est, sordidæque ac barbara, sed acrior cæteris. Sembrocena prædictis caret vitis, ante alias hilaris, sed viribus tenuis. In plenum autem probatio est minoris glebis, nec rotundis, in concretu albicantis succi & tabescentis: atque fracta candidos vngues habens, gustu leuiter amara. Secunda bonitas intus variæ. Pessima intus nigra, peior si etiã foris. Hæc Plinius, qui magnam partem ex Theophrasto mutuatus est. Gignitur, inquit, Thus & Myrrha in regione Arabum media, circa Saba & Atramitica, & Citibæna, & Mamali. Nascuntur autem Thuris & Myrrhæ arbores aliæ in monte, aliæ in pede montis culturis propriis. Quamobrem aliæ coluntur, aliæ minime. Montem istum aiunt esse excelsum, & ningi solitum, amnèsque ex eo in plana fluere. Myrrhæ arborem minorem esse Thuris arbore, fruticosiorémque, caudice duro & contorto iuxta terram, crassiorémque sùra hominis, cortice læui, similique Andrachne. Alij qui se vidisse affirmant de magnitudine ferè non consentiunt: neutram earum arborum magnam esse aiunt, sed minorem Myrrhæ, humiliorémque: eius folium esse aculeatum, non læue, Vlmo simile (*ποροσμηπέρες τῇ ἀσπιδί*) habent vulgata exemplaria, Plinius legit *ἐλαία*, id est, Oliuæ) crispum tamen, in extremo aculeatum Ilicis modo. Alij Myrrhæ arborem Terebintho similem esse tradidere, sed scabriorem spinosiorémque, folium paulò rotundius, gustatu proximam Terebintho. Quidam, sed falsò, Thus & Myrrham ex eadem arbore nasci putauerunt. Hæc de Myrrha veteres prodidere. Ex recentioribus Garcias scripsit plurimam etiam adferri ex Arabia ad nos Myrrham, quæ Indis Bola dicitur, tum etiam ex regione Abexim quæ Æthiopix est. Qualis verò sit arbor, quæ eam profert, aut qua ratione eliciatur, nunquam se scire potuisse ait. Illud addit, quod à quodam sacrisco Æthiopix, & episcopo Armeniæ intellexit, genus esse quoddam hominum montanum & siluestre (*Bodoins* vocant, linguæque pura Arabica, quæ nonnihil ad Chaldaicam, aut Syriacam antiquam accedit, vti ferunt) quod Myrrham in Bratta & Magadaxo terrestri itinere adfert, & è Chaldaea regione sic illis vocata se deferre asserit. Theuetus falsum esse ait quod Plinius Sabæos petere Myrrham scribit à Troglodytis transitu maris: quia tum veterum, tum recentiorum auctoritate regio hæc eo loco sita est, qui mille, aut mille & ducentis leucis ab Arabum regione distet, qui omnium eorum, qui per hæc loca peregrinati sunt, testimonio nunquam tam longas peregrinationes aggrediuntur. Præterea constat nullum esse in Arabia tam diuitem, qui nauim adornare & instruere possit omnibus ad nauigationem necessariis, quæ ad Troglodytas vsque penetret, quorum situs esse creditur inter regnum Cefala, & deserta Paucal, ad altitudinem promontorij Bonæ spei, regionis frigida & ferè inaccessa ob indigenarum barbariam. Ad hæc eos erroris insinuat, qui putant Myrrham locis frigidis & humidis perfectionem suam adipisci, & arbores Thuris Myrrhæque feraces nusquam eodem

Lib. 9. hist.
cap. 4.

Lib. 1. Aromat.
Ind.
cap. 8.

eodem in loco prouenire, niuésque iis in locis in quibus nascuntur frequentes esse: nam se vidisse asserit duo penè millia huiusmodi arborum in eadem silua permixtarum. Perinde falsum esse ait Myrrham quam Arabes per mare rubrum in Alexandriam Ægypti camelis important, Indicam esse, cum ipsimet Indi & Insulares Asiatici eam ex felici Arabia petant. Cum verò Myrrha Dioscoride auctore quadantenus viridis sit, pellucida, gustu acri cum amarore, negant plerique Myrrham genuinam ad nos deferri, cum ne in Alexàdria quidem vix reperiatur quæ non adulterata sit, qui enim eam vendunt, multis modis corrumpunt ac vitiant, Christianos irridentes qui tam curiosè emunt. Quamobrem quæ publicè venit, tantùm abest, vt virescat, pinguis & gummosa sit, vt potius arida sit, exusta, nigra vel pallida, & facilè in puluerem dissiliat, & gustu vix amara cum acrimonia sentiat. At si talis sit Myrrha quæ passim in Officinis habetur, tamen nos vera non carere certum est: aduehitur enim quandoque quæ legitima, & probatissima sit, sed ea rara admodùm. Pena quod Bdellium putatur certò se scire ait, & à

*MYRRHA aut Bdellium
suo furculo spinoso ha-
rens, Pena.*



Rondeletio experimèntis persuasum fuisse optimè viribus Myrrhæ respondere: ideò Myrrhæ speciem esse credit, nec vulgare rationis momentum addit, Londinum allatas fuisse multas peregrinas merces, inter quas plurimos huiusce ligni furculos perquisiuit, solida substantia, cortice duro, nigricante, spinis multis rigidis & crassiusculis horrentes, in quibus multa copia Bdellij congesta, intus forisq; valde amari: cætera Dioscoridis descriptioni admodùm similia. Ad id quod de colore obiiciunt respondet se vidisse in Officina Gulielmi Driesch pharmacopœi Antuerpiensis fuluam, albescentem, viridem etiam Myrrham. Has eius vires Dioscorides recenset. Calfacit, soporem gignit, glutinat, siccatur, adstringit, vuluam emollit, & præclusam aperit: menses & partus celeriter extrahit cum Absinthio, lupinorum cremore, vel succo Rutæ admota: magnitudine fabæ deuoratur in vetere tussi, orthopnœa, in laterum pectorisq; doloribus, in alui profluuiò & dysenteria: horrores discutit duabus horis ante febrim accessiones, fabæ magnitudine pota cum pipere & aqua: subdita linguæ liquataque scabritiem arteriæ expolit, obrusam vocem ex-

Li. I. ca. 67.
Vires.

pedit: ventris tineas enecat, contrà grauem oris halitum manditur, & aduersus alarum tædia cum liquido alumine illinitur: gingiuas & dentes stabilit, colluto cum vino & oleo ore: vulnera capitis illita glutinat: medetur fractis auribus, ac ossibus nudatis peruncta cum cochleæ carnibus: item purulentis auribus inflammatisq; cum meconio, castorio & glaucio. Ad varos cum cassia & melle illinitur: impetigines ex aceto purgat: defluentes capillos cum ladano & vino myrteo illita firmat, oculorum vlcera complet, albugines tollit, caliginem discutit, scabritiam læuigat. Scribit Galenus Myrrham secundo esse ordine tum excalficientium, tum desiccantium. Quare capitum vulneribus illitum glutinare ea posse. Inest & amaritudo non pauca, per quam scetum & lumbricos tum enecat, tum eiicit. Inest ei & abstergendi facultas. Sic igitur ocularibus miscetur

Li. 8. simpl.

medicamentis, quæ ad vlcera & crassas cicatrices præparantur. Eadem de causa inditur & medicamentis quæ ad tussim veterem & asthma exhibentur: non tamen arteriam exasperat, sicut abstergentium nonnulla. Verùm adeò moderatam obtinet absterfionem, vt nonnulli eam arteriacis admisceant, tanquam sufficienter excalfaciens & desiccans medicamen, scilicet absterfionem proficiscentem ab amaritudine nihil verentes.

CARYOPHYLLVM.

CAP. V.

Nomina



ETERIBVS Græcis ignotus fuit fructus, qui καρύφυλλον seu καρύφυλλος dicitur, Latine etiam Caryophyllum & Caryophyllus, quod, si verbum verbo reddas, Nucifolium dixeris, quo nomine longè alia res designatur, nimirum fructus aut fructus rudimentum, qui folio Nucis nihil prorsus simile habet. Nostis, quod clauus modo capitatus sit, Clauus dicitur, *Clou de Gyrosle* & *Gyrosle*, Mauritanis *Carhumfel*, & *Charumfel*, Barbaris Gariophilus, Italis *Carofano*, Germanis *Nagel*, Hispanis *Clauo de especia*. Huius meminit Plinius his verbis. Est etiamnum in India Piperis grani simile, quod vocatur Caryophyllum, grandius fragiliusque. Tradunt in Indico luco id gigni. Aduchitur odoris gratia. Serapio de Caryophyllis scribens Galenum falsò citat, cum ex Paulo, vel Galeno recentiore aliquo scriptore illa mutuatus sit. De iis sic Paulus. Caryophyllum non eam habet substantiam, quæ nomine prætenditur, sed ex India veluti flores cuiusdam arboris, festucacei, & nigrescentes, longitudine ferè digitali, odorati, acres, subamari, calidi & sicci in tertio propemodum ordine, qui multiplicis sunt vsus ad opsonia, tum ad alia multa medicamenta. Recentiores de iisdem veriora ac certiora tradiderunt. Caryophyllum, inquit Garcias, Arabibus, Persis, Turcis, & omnibus ferè Indis *Calasur* vocatur, in Maluccis verò *Chanque*. Nomina autem quæ sunt in Pandectario, *Arumfel* & *Charumfel*, corrupta esse putat. Nascitur Caryophyllum in Maluccis tantum insulis, quæ sunt quinque, nec procul nimum à mari, nec etiam locis nimis mari vicinis. Nascitur etiam in Zeilan, nonnullisq; aliis locis, sed nullibi fructifera est arbor quam in Maluccis.

Lib. 12. c. 7.

Lib. 7.

Li. 1. Arom.
Ind. ca. 21.


Locus.

Forma.

Tempus.

Ea est Lauri forma & magnitudine, foliis etiam Laurinis, sed angustioribus, Salicis aut mali Persicæ simillimis auctore Clusio, ramis multis, copioso flore, primum candido, deinde virescente, postremum rufescente, qui induratus est Caryophyllum ipsum, clauum vocant, quod capitatum sit in modum clauus, exsertis quatuor denticulis sese stellatim decussantibus. Prouenit in extremis ramulis Myrti modo. Est autem flos is viridis adeò odoratus, vt flores omnes odoris suauitate superet. Clusius Caryophyllum non florem induratum, sed potius fructus rudimentum esse censet, quemadmodum in malis, pyris, punicis, atque aliis videre est. Nam flos ipse qui quaternis foliis constat, huic fructus rudimento infidet, multis fibris plenus, veluti flos Myrti ferè. Pediculi oblongi, ex quibus dependent flores, vulgò *Fusti* vocantur. Folia non tam odorata sunt quam Caryophyllum ipsum, sed neque rami ipsi nisi aliquantum siccati. Colliguntur Caryophylla à decimoquinto Septembris vsque in Ianuariam & Februarium, non manu, vt quidam volunt, sed violenta flagellatione: cultores enim flagellant altiores ramos, munito prius circa arborem solo, nullum enim genus graminis sub hac arbore nascitur, omnem succum siue humorem ea attrahente. Decussa Caryophylla biduum aut triduum siccantur, deinde asseruantur, & in Malacam aliasq; prouincias mittuntur. Quæ in arbore hærent & remanent, crassiora fiunt, neq; ab aliis

CARYOPHYLLI

aromatici, Matthioli.

ab aliis nisi vetustate differunt. Quare non rectè Auicenna hos fructus mates facit. Nascitur ipsa arbor sponte ex decidentibus Caryophyllis. Cum enim huic nunquam desit pluvia quæ fructui alimentum præbeat qui in terram decidit, enascuntur abusculæ, quæ intra octennium quidem adolescunt, in centesimum verò annum perdurant, quemadmodum ipsi incolæ testantur. Errant, inquit Garcias, qui Caryophylli & Nucis moschatae arborem eandem esse putant. Nam Nux rotunda ferè folia habet, Pini foliis similia: Caryophyllum folio est Lauri, angustiore. Præterea Caryophyllum deferitur in Bandam insulam procul inde disitam, quæ Nucem profert. Scribit Auicenna Caryophylli arboris gummi facultate simile esse glutini Albotin, id est, terebinthinæ resinæ: quod se vidisse Garcias negarunt qui Caryophylla ex Malucis deferunt. Clusius tamen inter Caryophylla, quæ Antuerpiam aduehuntur, ait inueniri interdum gummi ex atro rufescens, odorum sanè, & quod prunis iniectum Caryophyl-

Lib. 2. ca. 31.

Lib. 2. c. 30.

lorum odorem refert. Id fortasse gummi fuerit Auicennæ, quod tamen affirmare non audet. In Iaua insula crassiora illa & annotina Caryophylla magis expetuntur, à nobis verò tenuiora, quæ adhuc viridia aceto & sale apud Maluccanos condiuntur, sed ex his teneriora saccharo asseruantur, quæ mirum in modum palato grata sunt. Lusitanæ mulieres quæ istic habitant, ex Caryophyllis viridibus aquam stillatitiam eliciunt, mira odoris suauitatis fragrantem, & cordis affectibus vtilem. Nonnulli sudorem mouent iis qui lue venerea vexantur, Caryophyllis, Nuce moschata, Pipere longo & nigro. Alij Caryophyllorum puluerem capiti admovent aduersus capitis dolores à frigida causa prouenientes. Mulieres Indicæ atque etiam Lusitanicæ ea mandunt commendandi halitus gratia. Ea, auctore Serapione, iocinori, stomacho, cordi auxiliantur & ipsa roborant. Concoctionem adiuuant, & ventrem constringunt. Eorum puluis drachmarum quatuor pondere sumptus cum lacte venereum concitat. Præterea Caryophylla, ut tradit Auicenna, visus aciem acuunt. nubeculas & argema exterunt.

Vires.

L. 5. simpl. cap. 29.

Nomina

Nux, quæ Græcis recentioribus *μοσχάρδον* & *μοσχάρδιον*, & *χάρδον μυελικόν*, vel *χάρδον ἀρωματικόν* dicitur, Latinis etiam *Nux moschata*, & *Nux myristica*, Arabibus *leuzhane*, *Isibagua*, seu *Giangiban*, Gallis *Noix muscade*, Italis *Noce moscada*, Germanis *Moschat nusz*, Hispanis *Nuez de espete*. Ab incolis eius regionis in qua prouenit Palla, Macis verò *Bunapalla*, in Decan *Nux ipsa* lapatri, Macis verò *Iaifol*, ab Auicenna *Iaifiband*, id est, *Nux Bandensis*, Macis verò *Befbaf*. Vtrâque describitur à Garcia & aliis hoc ferè modo. Arbor, quæ Nucem myristicam & Macim fert, Persicæ malo similis est, breuioribus tamen foliis & angustioribus. Fructum adhuc immaturum Macis

N V X myristica, Math.



Locus.

est, quemadmodum nec ea quæ in *Zeilam* prouenit. Fuit hæc *Nux cum suo Maci* veteribus Græcis incognita, quamuis *Serapio* in *Macis* historia Græcos auctores citet. Septembri mense *Nuces* certatim legunt incolæ barbari, & quantam quisque potest copiam congerit, illic enim omnia sunt communia. Eligendæ sunt recentes, minimè cariosæ, graues, farctæ, pingues, ita vt adacta acu confestim exeat liquor. Inuenitur quandoque oblongum quoddam genus, mas vulgò appellatum, & à mulieribus alia Nuce longè vilius existimatum. *Nuces myristicæ*, vt Mauritanii scribunt, siccant & excalfaciunt ordine secundo completo, adstringunt, oris suauitatem commendant, & fœtorem ahelitus commansæ abolent, lentigines in facie emendant, visum acuunt, ventriculum & iecur roborant, lienem absumunt, vrinam cient, fluentem aluum sistunt, flatu discutiunt, & frigidis vteri affectibus mirè profunt. Ex recentibus contusis & in cacabo calfactis, prælo exprimitur liquor, qui refrigeratus ceræ nouæ instar concrefcit, fragrantissimum spirans odorem, neruorum & articulorum doloribus diuturnis à frigida causâ excitatis vtilissimus, qui & venerem stimulat. Mulcet mirificè *Nux myristica* ventriculi dolores, si trita decoquatur ex *rhodomellis* vnciis sex, & duabus aquæ vitæ, quousque

Li. 2, ca. 199.
Li. 1. Arom.
Ind. ca. 20.

Ca. 2. simp.

Electio.

Temper.
& Vires.

quousque aqua euanescat. Nam si huiusce colati liquoris cochlearia tria quotidie dentur ieiunis, & dolor à frigidis oriatur excrementis, aut à flatu, proculdubio iuuabuntur ægri. Maximè commendatur eadem ad vteri cruciatus à flatu genitos, hoc modo. Coquitur crassiusculè tusa cum Matricariæ radicibus ex sex vñciis vini albi generosi ad tertias. Percolatur decoctum, & additis Sacchari duabus drachmis propinatur.

NVX INDICA. CAP. VII.

NON solum inter Palmas, sed etiam inter arbores omnes Palma illa, quæ nucem Indicam fert, palmam obtinet: adeò multa vitæ humanæ necessaria suppeditat, nec est pro dignitate celebrata ne ab ipsis quidem Arabibus: priscis enim Græcis an cognita fuerit, plerique dubitant, in quibus est Garcias, tamen si Strabo eius meminisse videatur. Eius historiam ex eodem Garcia & aliis hîc conteximus. Arborē scribit ille à Serapione & Rhase

Li. 16. Geograph.

Lib. 1. Aro. Indic. c. 16.

Nomina

Li. 2. c. 498.

NVX INDICA,
Matthioli.

Iaralnare, id est, arborem nuciferam dici, Nucem verò Indicam ab Auicenna lausia lindi, quæ nomina in codicibus nostris vulgatis non reperiuntur, sed Neregit tantum, quam Nucem Indicam interpretantur. Vulgò vocatur arbor Maro, & fructus Narel, quod nomen Narel commune est Persis & Arabibus: in Malauar arbor ipsa Tengamaran, fructus verò maturus Tenga, sed viridis adhuc & immaturus Eleiri, & Goæ Lanha: in Malaio arbor Triccan, ipsa nux Nihor, cui Lusitani nomen Coccho indiderunt, ob tria illa foraminum vestigia, quibus cercopitheci aut similis alterius animalis caput repræsentat. Arbor est vastæ magnitudinis, foliis Palmæ aut Arundinis, aliquantò latioribus, flore Castaneæ, materie fungosa & ferulacea. Fructum parit capitis humani magnitudine, vel maiorem, vel magnis melonibus parem. Eius primus siue extimus cortex primum viridis est, deinde ex atro rufescens, subdurus, crassus, villosa materie compactus. Subest alius prædurus cornu instar, ferè triangularis, qui nucleum siue medullam continet albicantem, crassam,

Forma.

crassitudine digitali, sapore dulci, concauam, quæ in cavitatē suauem, dulcem & limpidam concludit aquam. Quantò autem tenerior nux, tantò suauior est liquor & copiosior. Maturior verò facta eundem liquorem quidem continet, sed minùs suauem, quique interdum acefcit, in inueterascente concrefcit. Gaudet arenoso solo & mari vicino, vt in mediterraneis haud facillè sit reperire. Seruntur ipsæ nuces ex quibus enatæ plantæ transplantantur, quæ paucis annis adolcfunt & fructifera sunt, præsertim si diligenter colantur. Nam Hyeme cinere aut stercore conspergi volunt, Æstate aqua rigari, latiores tamen euadunt, si secus ædificia pangantur, quia videntur luto & sordibus gaudere. Has in duo genera distinguunt, vt tradit Garcias. Alterum enim fructus ferendi causâ seruant. Alterum Suræ cogendę gratia, quæ est vinum mustum: decocta autem ab incolis Oтраqua vocatur. Sura verò hoc modo colligitur. Præcisîs ramis vascula alligantur ad liquo-

Locus.

rem, quem Suram vocant, excipiendum. Eum vt ex altioribus ramis colligant, arborem conscendunt aptatis ad pedes compedibus & laqueis, aut foramina quædam in corpore faciunt, vt facilius conscendant. Hęc Sura distillatur aquæ ardentis modo, vinumque extrahitur aquæ ardenti per omnia simile, vt etiam pannus lineus eo madefactus non secus ardeat, quàm si aquæ ardenti intinctus foret. Vocatur autem stillatitius hic liquor Fula, id est, flos, quod reliquum est Otræ aqua appellatur, admisto stillatitij liquoris momento. Ex Sura antequàm distilletur insolata fit acetum satis interdum acré. Sublato priore vasculo, si vultus in arbore factum Suram adhuc extillet, feruatur ea, & Solis æstu, vel igne densata sacchari modo coit. Id Iagra vocant. Optima censetur quæ in Naledina insula nascitur: nō enim nigricat, veluti quæ in aliis regionibus provenit. Materies ligni cum sit procera, ad plurima perquam utilis est, ita vt interdum in Naledina insula naues ex hac arbore fabricentur, atque clavis, molis, velis & rudentibus armentur. Ex ramis qui in Malauar Olla auctore Garcia nuncupantur, fiunt ædium tecta, & nauium tabulata & opercula. Hoc tamen nomine non huius arboris ramos, sed ipsa folia designari scripsit Ferdinandus Lopes in Historia Indica, quibus inscribere solent indices memorabiles & acta publica. Refert etiam simili ollæ seu folio Arabicis characteribus inscriptam fuisse epistolam, quam Rex Calecut ad Emanuelem Lusitanie Regem dedit, cum eò primum appulerunt Lusitani. Indi istarum Palmarum germinibus vescuntur, nam gratiora sunt palato, quàm aut castaneæ molles, aut humiles Palmæ, quas vulgo *Palmitos*, Itali *Cesaglioni* vocant. Quo autem vetustior est Palma, eo tenerius & odoratius germen producit. At eo sublato perit Palma: quare qui huiusmodi germen edit, non immerito Palmam edere dicitur. Hæc de arbore, nunc de fructu dicamus. Ex eius extimo cortice è villosa materia compacto fiunt rudentes & funes nauibus necessarij, qui incorrupti manent in aqua marina. Ex eodem stupæ loco naues obturantur & stipantur, ipsiq; stupis præstat, quod putredini minus sit obnoxius, & aqua marina imbutus infletur denseturque. Idem affirmat Clusius, qui omnes rudentes & funes liburnicarum regiarum Vlyssipone ex villis Coccozum siue nucum confectos esse scribit præsertim verò earum quæ in Indiam nanigant. Sed etiam ex iisdem villis fieri nodosa cingula, magno in vsu omnibus tenuioris fortunæ mulieribus Vlyssipone. Nulla verò ex hac villosa materie fieri aulaa testis est Garcias, id quod tamen persuadere conatus est Lacuna. Ex secundo cortice duro vasa in tenuiorum vsum tornantur, cuiusmodi Vlyssipone & aliis locis se vidisse ait Clusius ex Cocco de Maldina confecta, oblongiora plerumque, quàm quæ ex vulgari Cocco parantur, & nigriora nitidioraque. Sed ea paralyticos, si inde bibant, minimè iuuant, vt vulgò Lusitanorum creditum est: nihil enim in hoc fructu est quod neruis conferat præter oleum, de quo mox dicemus, nec ipsi Indi huiusmodi facultates his vasculis tribuunt, nec quisquam alius probatus auctor. Medulla sine nucleo recenti cum carne & piscibus vescuntur, non aliter quàm nos pane, nec amygdali dulcis saporis cedit. Ex eadem trita lac exprimunt, cum quo coquitur oriza, non minus suavis quàm si cum lacte caprino decoqueretur, aut ex ea & auium quadrupedumve carnibus edulia parantur, Caril illis nuncupata. Ex eadem exsiccata panem faciunt. Noces istæ recentes siccatæ, atque supremo cortice delibratæ & confractæ ab indigenis Copra vocantur, deferunturque in Ormuz, Balagnate, & in alias regiones, in quibus minor est earum copia quàm vt exsiccari possint, aut in eas prouincias quæ his omnino carent. Suaves sunt, iisque vtuntur tanquàm castaneis siccis, multoque sunt gratiores palato, quàm quæ integræ in Lusitaniam deferuntur. Ex iis nucibus duo olei genera exprimuntur. Vnum ex recentibus confusis calida affusa aqua, quibus expressis oleum aquæ supernatat. Hoc vtuntur,

inquit

inquit Garcias, ad purgandum excrementis ventriculū & intestina: purgat enim leniter & sine noxa. Multi Tamarindorum expressionem addunt: quod vtile esse medicamentum sapius se expertum fuisse ait. Si id oleum Auicenna & Serapio intelligunt, cum melioris succi esse dicunt quàm butyrum, rectè quidem eos sentire Garcias arbitratur, in eo verò falli, quòd ventrem minùs mollire aiunt quàm butyrum. Alterum olei genus est, quod ex iisdem recentibus siccatis, delibratis & contractis (Cupra vocari diximus) limpidissimum magna copia torculari extrahitur. Id non solum nervis vtile, sed etiam oryzae coquendae aptum est. Nervis autem admodum conferre, & nervorum contractionibus, & articulorum doloribus antiquis, se expertum fuisse testatur Garcias, ægrum eo inunctum in cupa grandi imponendo, ibique quiescere sinendo concalescētum. An verò lumbricos enecet, vt Auicenna & Serapio tradunt, nondum se expertum fuisse ait. Quod verò ipsam nucem eadem esse facultate præditam scribant, non modò rationi consentaneum non esse, sed quotidiana experientia manifestissimum esse, eius esu lumbricos generari. Id verius quod tradit Serapio ex auctoritate Mesarugie, Cocchi esu fisti aluum. Nam alienum à ratione non est, nucem, quæ terrestrium est partium, ventrem constringere, oleum, quod tenuiorum est partium & ærearū, ipsum lenire. Ex ipsa autem arbore nullum oleum elicitur, sed ex Coccho tantū: quamuis Lacuna scribat quosdam in ea opinione esse, vt credant dulce id oleum quod ex hac Palma stillat, Dioscoridis esse Elæomeli. Cocchus, quæ de Maldina appellant, nigro est cortice & nitidior quàm vulgaris, cui figura magna ex parte nec ita rotunda vt vulgari. Medulla interior, quæ siccata dura est admodum & candida, non nihil tamen ad pallorem inclinans, in superficie rimosa est, & valde porosa, nullo sapore præstans. Laudatur hic Cocchus, vt auctor est Garcias, sed præsertim eius medulla aduersus venena ab ipsis harum insularum incolis. Et à viris fide dignis se accepisse ait, ad coli dolores, paralysem, epilepsiam, aliòsque nervorum affectus prodesse. A coli quidem doloribus, quòd vomitum excitaret, ab aliis verò ægritudinibus liberari ægros, si aquam in nucibus aliquandiu conservatam ebiberint, adiecto medullæ momento. Quibus fidem ille non adhibet, vt pote quæ experimentis minimè sint confirmata, iisq; vtatur medicamentis quorum facultates iamdiu perspectæ sunt, & infinitis experimentis comprobatae. Auicenna scribit nucem Indicam calidam esse in principio secundi gradus, siccam in primo: inesse tamen in ea humiditatem excrementitiam: quare recentem humidam esse primo ordine, grauem quidem stomacho esse, sed non mali nutrimenti: oleum è veteri nuce conferre doloribus dorsi & genuum.

NUX VOMICA ET METHEL. CAP. VIII.



VX quæ Arabibus *Leuz alkei* seu *alke* dicitur, Officinis ac Barbaris Nux Vomica: quæ verò *Leuz atrachaha*, Nux Methel seu Nux Methella. Nucem Vomicam Serapio Abraam citans breuiter sic delineat.

Est nux colore inter glaucum & album, Auellana paulò maior, nodosa. Nucem verò Methel hoc modo. Est fructus similis Nuci Vomicæ, cuius semē Citri semini simile est. Et ex Hacse. Nux Methel similis est Nuci Vomicæ, semine Mādragoræ semini æmulo, cortice aspero, gustu suauis. Et Auicenna. Nux Methel inquit, est similis nuci, cortice aculeis crassis & breuib; testō. Nuci Vomicæ similis est: eius semē Citri semini simile est. Lonicerus arbitratur Nucis Vomicæ descriptionē Nuci Methellæ Officinarū conuenire, & contrā: vt Nucem Vomicā Officinarum pro vera Methella, & earundem Nucem Methellā pro legitima Vomicā Serapionis & Arabum accipiamus. Amatus Lusitanus in eadem est opinione, quod Nux Methella Officinarum colore sit glauco in album vergente, & ab utroque latere attollatur tuberculis quibusdam circularibus, oculos imitantibus, tum quòd quæ Methellæ assignantur notæ, omnes Vomicæ Officinarum conueniant,

Li. 2. c. 498.
c. 218. simpl.

Li. 2. c. 498.
c. 218. simpl.

Cap. 218.
simpl.

In c. 29. lib.
1. Diosco.

Li. 2. c. 498.

Nomina

Cap. 163.
simpl.

Forma

Cap. 163.
simpl.

T. 2. cap. 20
In cap. 161.
lib. 1. Dios.

quæ plana est utroque latere, cortice aspero, veluti piloso, sapore vinctuoso & pingui, canes interficiens. Quod verò eius semen semini Mandragoræ simile dicitur, id intelligit Amatus de virtute & effectu, non de figura, cum hæc etiam nux quarto gradu frigida sit. Id quod ante Amatam Lonicerus annotarat. At si Vomica vulgaris vera esset Methella, necesse foret, ut scribit Anguillara, huic inesse semen Citri simile, ut scribit Auicenna, ut Serapio, Mandragoræ, quibus tamen simile nihil in ea reperitur. Quare Methellam vulgarem, veram esse Methellam verisimilium fuerit, quam Vomicam. Ex cuius Methellæ descriptione ab Auicenna tradita, sunt qui coniiciant, nec id temere, esse Crateuæ Hippomanes cuius meminisse Theocriti scholiastes, ἰππόμενες κραλλέως φησὶ τὸ φύλλον ἔχειν καρπὸν ὡς σικύς (ὁ μελάγιερον δὲ τὸ φύλλον ὡς περ μήκωνος) ἀγανθώδη, sic enim legendum censet Anguillara.) Crateuas Hippomanes plantam esse dicit, quæ fructum habet Cucumeris siluestris modò (folia non nigriora veluti Papaueris) spinosum. Vomicam autem vulgarem nec veram Vomicam esse, nec Methellam putat Anguillara, nam eius historiæ à Serapione ex Abraam expositæ refragatur color, aliqua cum auellana similitudo, nodi in ea nulli. Præterea à viro fide digno, & rei herbariæ peritissimo se accepisse ait vulgarem Vomicam radicem esse non nucem, foliis rotundis, per humum repentibus, Matthiolus credidit aliquando quas Vomicas seplasiæ vocant, genuinas esse Methellas, quam sententiam tandem retractavit, seq̃ iis assentiri ait qui Nucem Methellam Strammonij fructum esse credunt. Etenim præterquam quod Nucis imaginem refert, etiam aculeis crass & breuibz riget, semen Mandragoræ simile habet, nec dubitat quin fructus ipse, ac tota etiã planta soporiferæ sit facultatis: qua de re in Horto diximus. Vomicam verò Nucem Officinarum non esse genuinam: quia (si Auicennæ & Serapioni credimus) Vomica Nux Methellæ similis esse debet, sed aculeorum vice nodos habere, quibus Vomica vulgaris caret: quinetiam nullam Nucis speciem refert. Scribit Auicenna Nucem Methel venenatam esse, stupefaciendi vim habere, somnum profundum inducere, cerebro & cordi noxiam esse, semisrupuli pondere sumptam inebriare, drachmæ verò vnius pondere deleteria facultate vna die interimere. Alij drachmæ vnius pondere inebriare aiunt, duarum drachmarum pondere necare. Auctore Rhase obstupefaciendi vim habet, dolores leniendi sedandisque, quandoque interimere, meatus farcire, vomitus excitare. Eos qui maiore quam drachmæ pondere sumperunt, interficit. Succurritur iis si butyrum calfactum continuo assumant, & extremas corporis partes in aquæ calidæ solium iniiciant. Præterea ad vomitum sæpissime cogendi sunt. Denique iis omnia auxiliantur, quæ aduersus Mandragoræ venenum valent. Nux Vomica per se, ut scribit Serapio, aut cum sale, aut aliis medicamentis trita drachmæ pondere, vomitum ciet. Idem præstat cum semine Anethi aut Fœniculi, & melle mixta, & cum aqua calida pota humores phlegmaticos biliososque expellit, & aluum mediocriter subducit. Vomica nostra vulgaris præsertim canes citò interimit.

In cap. 141.
lib. 1.

Li. 2. c. 501.

Vires &
Temper.

Cap 163.
simpl.

ANACARDIVM.

CAP. IX.

Nomina



ETERIBVS Græcis incognitus fuit hic fructus, quæ recentiores Græci Ανακάρδιον, Latini similiter Anacardium à cordis tum similitudine tum colore vocauerunt, Arabum vestigia secuti, quibus Balador dicitur, Indis Bybo, Lusitanis Fava de Malaga, quod viridis & in arbore pendens similis sit nostrati maiori fabæ, maior tamen. Auicenna de eo sic scribit. Anacardium est fructus similis ossi Tamarindorum. Et nucleus eius est similis nucleo anygdalæ dulcis, qui innoxius est. Et cortex ipsius est durus, habens foramina,

Forma.

ANACARDIVM.



foramina, in cuius raritate est mel viscosum habens odorem. Et sunt qui ipsum masticant, & non nocet eis, & propriè cum nuce. Serapio sic etiam describit. Balador, id est, Anacardus, est fructus arboris, similis cordi aui, cuius color est rufescens, parum ad ruborem declinans, sicuti est color cordis. Intus est res similis sanguini, & id quod administratur ex eo, & deferitur ex Sini. Nasctur ex

Cap. 46.
simpl.

Locus.

Montibus Siciliæ ignitis. Hunc fructum ex Clusio hîc pictum damus. Magna est eius in Cananor copia, auctore Garcia, tum in Calecut, & reliquis Indiæ provinciis, velut in Cambaya & Decan. Calidum sic cumque esse quarto excessu tradit Auicenna, vlcere, adurere sanguinem, & humores, delere radicitus verrucas, vitilignes albas & lepram, sanare alopeciam, commouere calida apostemata partium interiorum, aduersus neruorum affectus à frigida causa ortos & paralytim valere, memoriæ iacturam refarcire, maximè sumpta confectione anacardina, mentem tamen de statu deiicere & furorem excitare, eius suffitu hæmorrhoides exsiccare. Sed deleteria facultate non carere, humores adurere & interficere. Eius antidotum esse lac vaccinum potum, & oleum ex nucibus expressum. Eadem Serapio tradit, citatque Galenum, qui huius fructus meminerit, cui tamen planè ignotus fuit, atque noxium esse præsertim biliosis & iuuenibus. Quod illi Anacardium calidum & siccum statuunt quarto ordine, alij tertio, Garcia non probat: in virente enim perspicuum est hunc caliditatis & siccitatis gradum deesse, neque rationi consentaneum videri, eò caliditatis & siccitatis excessu constituere quò piper. Nisi fortè, inquit, quod in Sicilia nascitur iis sit facultatibus præditum. Præterea deleteria esse facultate negat, quòd experientia repugnet. Nam his in regionibus, inquit, è lactis sero maceratum asthmaticis datur, & aduersus lumbricos. Adhæc iis viridibus & sale conditis vtimur in cibariis, oliuarum conditarum modo. Fructu verò siccato caustici

Lib. 1. Arom.
mar. Ind.
cap. 30.
Lib. 2. c. 40.

Temper.
& Vires.

Cap. 346.
simpl.

Lib. 2. c. 30.
Arom. Ind.

CAIOVS, Clusij.

MEDIVS.

INTEGR.



vice vtuntur in strumis, totaque India huius cum calce mixti vsus est ad pannos obsignandos. Anacardij historiæ à Garcia descriptæ Clusius Scholias tes adiecit descriptionem & picturam fructus cuiusdam, siue nucis, quam aliquando Vlyssipponè adferri ait è Brasiliæ regionis: Caious vocant. Arbor est magna, folijs Pyri (in recens nata Lauri potius) fructu oui anseriri, forma & magnitudine, qui succo plenus est, veluti id Citrioru genus,

quod Limã vocant, quo quidè vtuntur Brasiliæ (licet Theuetus contrà asserat) vt ab iisdem se intellexisse ait Clusius. In extremo fructu prominet nux quædam, renis leporini figura, colore cinereo, interdum ex cinereo rubescente. Duplici hæc nux connecta est cortice, inter quos spongiosa quædam est materia, olei asperimi & calidissimi plena, intus verò nucleum continens, edulem, & Pistaciis gustus suauitati non cedentem, pellicula cinericia obductum, quem eximere oportet. Eo leuiter tosto vescuntur incolæ: sic enim grator est, & venerem stimulare fertur. Acri illo nihil præstantius esse ferunt ad lichenas & impetigines tollendas. Incolæ certè aduersus scabiem vtuntur. Sed illud mirum, primarium fructu nulla semina continere, & extrema illa nuce earum arborum genus conseruari debere. Nonnulli Anacardiorum genus esse arbitrantur, ob similitudinem acris illius humoris, quem corticibus inclusum habent.

Cap. 61. de
scrip. Ame.
ri.

Nomina
Lib. 1. cap.
Arom. Ind.
cap. 21.

Forma.

F AUFEL Arabibus dicitur, id est Auellana Indica, inquit Serapio, Auicennæ Filfel & Fufel, sed deprauatè auctore Garcia, in Malauar Pac à vulgo, à nobilioribus Areca, quo nomine vtuntur Lusitani qui in Indiis habitant: in Gazarate & Decan Çupari, in Zeilan Poaz, in Malaca Pinan, in Couchin Chacani. Arbor quæ fructum hunc parit, recta est, fungosa materie, foliis Palmæ, fructu Nucis moschata, minore tamè, aut iuglandibus exiguis similis, intus dura, & candidis rubentibusque venis respersa, non planè rotunda, sed altera parte sessili: quæ tamen notæ non omnibus Arecæ generibus conueniunt. Integitur inuolucro admodum lanuginoso, & foris sublauro,

ARECA siue *Faufel*, *Clusij*.



Locus.

Cap. 335.
simpl.

Cap. 335.
simpl.

Temper.

& Vires.

Li. 2. c. 156.


perquam simili Dactylis cum maturuit & antequam siccatus fuerit. Hanc nucem probè agnouit Matthæus Siluaticus: sic enim scribit. Faufel id est, Auellana Inda, est simillima Nuci muscata, nisi quòd pars vna est plana, altera eminentior, ita vt possit stare erecta, sicut calculus qui in ludo dicitur Pedes. In cæteris intus & extra Nuci muscata similis est, sine odore, & sine sapore. Nascitur inclusa in quadà lanugine simili folliculo serici. Multoties fertur inter alias species à Calecut. Et ego vidi ipsum in suo folliculo. Hæc ille. Nascitur Faufel plurimum in Malauar, in Guzarate & Decan pauca quantitate, idq; duntaxat in maritimis, sed laudatum, præsertim in Chaul, quod desertur Ormuz. Optimum verò prouenit in Mombaim insula. Laudatur etiam quod in regione Bacain prouenit, atque id desertur in Decan cum eo quod in Gauchin nascitur nigrum & pusillum, durum admodum, postquam siccatum fuerit. Prouenit etiam in Malaca, sed tam parua quâtitate, vt vix incolis sufficiat: item in Zeilan magna

copia, sed cæcidum, quod in eam partem regionis Decan desertur, quæ Catamaluco paret, tum etiã in Bisnaga. Desertur etiam ex Zeilan in Ormuz, Cambaya & insulas Maldinas. Scribit Serapio ex Haboanisa arborem istam in Arabia non prouenire, quod de mediterraneis locis & magna ex parte intelligendum esse censet Garcias: nascitur enim laudata sed exigua in Dofar & Xael portubus Arabicis.

Amat enim hæc arbor loca maritima, mediterranea respuit, alioqui magna diligentia fereretur, quoniam singulis diebus eam edunt cum Mauritani, tum Moalis (genus hominum id est, qui Ali generum Mahometi sectantur) etiam in ieiuniis suis cum à Betre abstinent: mandunt enim Arecam cum Cardamomo purgandi ventriculi & cerebri gratia. Scribit Serapio ex auctoritate Isaac Faufel parum excalfacere, & paucæ amaritudinis particeps esse. Sed se degustasse Garcias asserit, nullumq; in eo calorem deprehendisse, verum cum insipiditate adstrictoriam facultatem. Cui consentiunt quæ subiungit Serapio ex aliorum auctoritate, frigidum esse ac siccum, atque adstringens: ob id aduersus calidos morbos valere, doloribus dentium auxiliari, gingiuas & commotos dentes stabilire. Quibus accedit Auicennæ auctoritas, scribentis Fufel refrigerare atque adstringere. Immaturum Faufel stupefacit & inebriat, vt refert Garcias: ideò sic editur à nonnullis, vt veluti

luti ebrij dolorum cruciatus non sentiunt. Admiscentur Fauſel ſive Areca eadē quæ Betre admiſceri dicemus, tamen ſi Betre calidum ſit, Areca verò frigida & ſicca. Sed & admiſcetur Lyrium, quoniam vtrumque gingiuas confirmat, & dentes ſtabilit, ſtomachum roborat, & vtile eſt aduerſus ſanguinis reiectiones, vomitus

AVELLANA Indica,
Matthioli.



AVELLANARVM
Indicarum, Cluſij.



Mehenbethene.



Nucleus.



& alui profluuij. Sic autem parant. Contuſam Nucē Fauſel in tenuiſſimas partes cum Lycio & folio Betre, cui ſit exemptus neruus, mandunt, ſicuti in Betre dicitur, & priorem ſatiuā quæ cruenta eſt expuunt, eāque ratione cerebrum & ventriculum expurgant, gingiuas ſtabiliunt. Potēiores ex Fauſel, Lycio, Caphura, Ligno Aloës & Ambari momento paſtillos componunt, quos mandunt. Garcias ex Fauſel viridi aquam ſtillaritiā vitreis organis eliciebat, qua maximo cum ſucceſſu in bilioſis alui profluuiis vtebatur. Nucem Fauſel cum ſuo operimento ex Cluſio hīc depinximus, qui & aliam vidit nucem oblōgam, quæ Fauſel cum ſuo inuolucro magnitudine æquat, prædura & foris nigricans, quæq; per medium ſecta Nucem myrſticam proximē æmulatur. Fortē Fauſel genus erit, aut aliquid ſimile. Eius quoque iconem hīc ex eodem expreſſimus. Alias Auellanas indicas à Cortuſo dono datas depinxit Matthioli, & deſcripſit his ſerē verbis. Prior tum facie, tum magnitudine diſſert à Fauſel. Contegitur putamine extimo Cardamomi maioris putamini ſimili, ſed duriore, compactiore, & colore magis obſcuro, magnitudine iuglandis viridi adhuc putamine teſta. Eo Auellana concluditur oblōga, vtraque parte acuminata, dorſo arcuato, inferiore parte lata ac ſeſſili, oſſe cōteſta duro, læui, caſtaneorum colore, in quo nucleus concluditur ſolidus, eiſdem ſerē figuræ, tenui albāque membrana obductus, dulci intus medulla, albicante. Altera eſt ſuperiore longē minor, quæ è ſuo inuolucro exempta, quod læue mollēque eſt, colore ſubpallido, nec folio Palmæ craſſius, glandis acuminatæ aut myrobalani ſauæ ſerē figura eſt, duro putamine concluda, quod colore vulgaris auellane oblongum intus nucleum pumilam amygdalam referentem continet. Cluſius in Scholiis in Garciae Aromaticorū Indicarum hiftoriam aliquot Auellanarum Indicarum icones cum ſuis deſcriptionibus exhibuit. Prior exigua eſt tribus lateribus elatioribus, atque itidem tribus foraminum veſtigiis, vti Coccus conſpicua villoſo quodam inuolucro velut Fauſel ſerē teſta. Altera pollicari eſt longitudine, duorum verò

digitorum crassitudine, inferiore parte sessilis, rugosa scabritie & cinerea, superna autem & eminentiore parte laevis, subrusq; coloris, ita ut animalculum duro corio tectum videatur. Prægnans est, & aliam continet. Huic ferè simile genus inuenitur minus, nigricans, quod à Matthiolo priori generi Auellanarum Indicarum adscribitur. Tertia Mehenbethene nomine à Cortuso missa. Pollicem transversum longa est, forma triangulari, duro & ligneo putamine, fracta tres cellulas ostendens, in quibus nucleus oblongus, albus dulcisque inuenitur. Quomodo autem Mehenbethene nomen illi tribui possit non video, cum Auicenna de Mehenbethene tractans, nihil aliud quam Græcorum Lathyrim describat.

SANTALVM.

CAP. XI.

Nomina



Lib. I. Aromat. Ind. cap. 17.

Genera.

Forma.

Locus.

Electio.

Li. 2. c. 649.
Vires &
Temper.

Cap. 336.
simpl.

ETERIBVS Græcis ignotum fuit quod Santalum dicitur, Auicennæ, Serapionis, atq; Mauritanis omnibus corrupto nomine *Sādal*, in Timor insula, omnibusque Malacæ vicinis prouinciis *Chandama*, in Canara, Decan, & Guzarate, *Sercanda*, auctore Garcia. Santali tria sunt genera, rubrum, album, pallidum, quod Officinæ Citrinum appellant. Idem Garcias Santalum scribit in Nucis iuglandis magnitudinē assurgere, foliis esse admodum virentibus, Lætisci æmulis, flos ex cæruleo nigricat, fructus est Cerasi magnitudine, primum viridis, deinde niger, insipidus & facillè decidens. Inodoram ferunt esse arborem, nisi cum detracto iam cortice exsiccata fuerit. Tria huius genera vno in loco non proueniunt, sed in regionibus multum à sese distantibus. In Timor insula vndique portubus abundante plurimum album & pallidum reperitur, & in India ultra Sangem fluuium, quem Indi Hanga vocant, item in Verballi portu laue, vehementer quidem odoratum, sed quod breuè senescat, debeatq; post annum multo ligno adempto odor eius reuocari, qui in medio est. Præfertur id quod minimum ligni, plurimum cordis habet: rubrum in India intra Gāgem, videlicet in Tanasarin, & maritimis quibusdam Charamandel. Hoc à Brasilioliquo (quauis utrunque sit inodorum) differt, inquit Garcias, quod Santalum rubrum neq; dulce est, neq; inficit, quæ notæ in Brasilio perspicuè apparent. At rubrum Santalum vulgare Offinarum sæpe inficere comperias. Eius ea in regione, in aqua prouenit, rarus est vsus, quod Indi aduersus febres duntaxat eo vtantur. Reliquum in Lusitaniam & Occidentales regiones deferretur. Ex eo interdum idola sua eorumq; delubra fabricantur: qua de causa crassiora ligna magis expetuntur, maioriq; pretio redimuntur. Primum locum tenet pallidum, secundum album, tanta tamen inter vtriusque arbores est similitudo, ut hæc ab illa discerni non possit, nisi ab incolis, qui eas cascas mercatoribus vendunt. Vtriusq; magna copia per vniuersam Indiam absumitur: quoniam omnes ferè eius regionis incolæ, siue Mauritanii, siue Gentiles eo in mortariis lapideis confuso, & aqua macerato, vniuersum corpus inungunt, deinde siccatum sinunt, ad æstus corporis tollendos, vel ad odorem conciliandum. Est enim regio calida admodum, & incolæ plurimum odoribus delectantur. Garcias legitimum Santalum citrinum vix in Lusitaniam deferri putat, cum multo plurius apud Indos, quam in Lusitaniam delatum vendi possit. Ex quibus non sine ratione dubitandum genuinumne Santalum citrinum habeamus, an potius aliquod aliud lignum odoratum eius loco ad nos deferatur. In citrini tamen penuria, albi & rubri partes æquales præscribendas esse non putat Garcias, sed potius, solum candidum, multo magis enim cum citrino affine est album quam rubrum. Auicenna de Santalo scribens, Galenum, cui id incognitum fuit, falsò citat, statuitq; frigidum esse in fine secundi ordinis ad tertium usq; siccum in secundo. Serapio similiter ex multorum Arabum auctoritate frigidum in tertio gradu, siccum in secundo: rubrum tamen frigidius esse albo & citrino. Præsertim rubrum humorum fluxum inhibere, erysipellatis, inflam-

tis, inflammationibus, podagræ à bile ortæ ex succo Solani, aut Sedi, aut Portulacæ vitiliter illini. Candidum ac pallidum ex aqua rosarū fronti imposita capitis dolores à bile & caliditate mulcere. Omnia calidis febribus aduersari: epota æstuanti vetriculo auxiliari. Fiunt ex his & aqua rosarum epithemata, quæ vetriculo admota, eius feruorem in ardentissimis febribus extinguunt. Præterea Santalū, auctore Auicenna libro de viribus cordis, cordi amicum est, lætitiā enim adfert, & robur ei addit. Quare iis miscetur medicamentis quæ cordi & eius palpitationi succurrūt. Sed cum Santalū album & pallidum odorata sint, Mauritanorum sententia improbanda, qui Santalum tertio ordine refrigerare prodiderunt.

AGALLOCHVM. CAP. XII.

RISCIS Græcis ἀγάλλοχον, recetioribus etiam ἀγάλλοχον & ξυλαλον, *Nomina*
 Latinis Agallochum & Lignum Aloës, Arabibus *Haud, Agalugin*, seu
Agalugen, à Guzarate & Decan incolis, auctore Garcia, *Vd*, quod ex Lib. 1.
 Arabibus sumptum videtur in Malaca *Garbo*, selectissimum autem Arom. Ind.
Calambac. De eo sic Dioscorides. Agallochum lignum est, quod ex India, & Arab. 16.
 bia deportatur, Thuiæ ligno simile, maculatū, odoratum, gustu adstringens, cum Lib. 1. c. 21.
 quadam amaritudine, cute veriùs quàm cortice vestitur, aliquantum versicolore. *Forma.*
 Auicenna duobus diuersis capitibus de Agallocho tractat. De priore, nomine Agalugen siue Agalugin, de altero nomine Xyloaloës. Priore quidē ait Agalugin lignum esse Indicum, aut Arabicum, odoratū, cute aspera, diuersis & lineis colorata. Huic adstringēdi vis inest cum pauca amaritudine. Quæ omnia ex Dioscoride descripta sunt, in quo legit ἐσχυμένον, ἐνῶδες, quemadmodum & vulgaria exēplaria habent, id est, punctis maculatum, odoratum, pro quo Orbasius legit, ἐσχυμένον ἐνῶδες, id est, Est igitur odoratum. Deinde easdem, quas Dioscorides subiungit vires. Serapio Dioscoridis verba transcribens nec macularum nec punctorum meminit, nec Paulus. Posteriore loco Auicenna nomina & regiones enumerat, à quibus Xyloaloë deportabatur. Sed in omnibus verū & legitimū nō nascitur. Nam quod in promotorio Comorin, veteribus Cori dicto, & Zeilan inuenitur, lignum odoratum est, quod lignum Aloës siluestre vocant, cum tamen non sit. Legitimum in Malaca & Sumatra nascitur, vnde à Chinenfibus ferebatur. Serapio ex Dioscoride & Galeno omnia transcripsit, item multa eius genera, & plurima alia ex Arabibus. Garcias legitimum Lignū Aloës nō nisi in India nasci putat. Ex Arabia quidem adferri potuisse, priùs tamen ex India eò deportatum, vt plerasque alias merces. Nam in Arabia prouenire non arbitratur: nec cute vestiri, sed cortice, vt & alia ligna: neq; verisimile esse pro Thure ad suffimēta substitui, sed potiùs contrā, pro Agallacho Thus substitui debuisse, vt pote cuius maior copia fuit: non solemus enim rariora & inuentu difficiliora vulgaribus substituere, sed contrā. Est autem Agallochum eodem auctore arbor Oleæ instar, interdū minor. Nec florem nec fructum vidit, ob periculosam huius arboris diuturnam obseruationem, frequenter istic grassantibus tigribus. Ramos autem ex Malaca delatos vidit. Ferunt Agallochum recens dissectum nulla odoris fragrantia gratum esse, nec nisi siccatum odoratum, nec eum odorē per vniuersam ligni materiam diffundi, sed in ipsa matrice consistere. Crassus enim est cortex, & ligni materies odoris experts. Non negat tamen Garcias, quin putrescente cortice & ligno, oleosus ille & pinguis humor matrici sese insinuet, illamq; odoratiore reddat. Sed vt odor Agallocho conficietur minimè putredine opus est: nam tēpore aliud magis, aliud minus odoratum fit, quod multi experientia edocti probè norunt, vt etiam de recens dissecto statim iudicare possint, si ne odoratū futurum, annon. Nam in omni lignorum genere aliud alio præstātius est. Solent autē Malacæ incolæ Agallochum repur-

Locus.

Forma.

Electio. gare antequàm mercatoribus vendant. Præfertur multùm nigricans, cineris discurrentibus venis, pôderosum, plurimo pingui humore prægnans. Probatio erit, si igni accensum multũ humorem exudet, si in aquam iniectum nõ fidat: nam solidissimũ quodq; innatat. Guzarate & Decã incolæ præter supradictas notas, vt magna sint fragmẽta requirunt, quemadmodũ maiores gemmas & margaritas cæteris præferunt: sibi enim persuaserunt quo maiora sunt fragmẽta, eo maiore facultate prædita esse. Fabulam narrant qui Agallochi arborem à nemine visam referunt, quòd in terrestri tantũ paradiso proueniat, illiusq; lignum ferri fluminibus quæ ex eo manant. Hoc verò multò absurdius quod Pandectarius scribit Agallochum Chamelæa adulterari, cum tota ea regione Chamelæa nõ nascatur auctore Garcia. Illud quidẽ Serapio tradit ex quorundam auctoritate ramos Agallochi frangi, & in flumina decidere, cum iis vehi in eas regiones quas alluũt: præterea lignũ Aloës ex arbore sua excisum anni spatio sepeliri, ibiq; corrodi, ita vt remaneat lignum Aloës purum, nihilq; è ligno illo erodatur. Cui Symeõ Sethi subscripsit, nõ aliàs futurum odoratius scribẽs, nisi prius marcorem aliquem & terebinthem senserit. Quod ait Garcias Auicennam hallucinari cum scribit Agallochum ab incolis elixari, vt omnem odoris vim eliciant, id in nostris exemplaribus nõ reperitur. Verũ Agallochum Officinis omnibus, diu ignotum fuit, atq; etiam hodie à multis ignoratur aliud atq; aliud lignum ei substituẽtibus: quãquam verum à Lusitanis ex India Vlyssiponem & Hispaniam delatum sit, sed magno æstimatum: sunt interdum ex eo sphærolæ precatoriar, odoris iucunditate, & pretij magnitudine commendabiles. Frequentiores tamen sunt ex quæ ex Xyloaloë syluestri, cuius ex Garcia meminimus, sunt, tum ex alio ligni genere quod Agallochum proximè emulatur: in odorum tamè est. Venetiis etiam habent institores, inquit Pena, carissimum, & vsu probatissimum, gustũ astringenti, præficcò, non multũ amaro: suffitu suauiissimũ reddit odorem, & succum aut liquorem pinguem, odorẽ qualem in Ebena vel Guyaco percipias, cui concolor & fortè congener. Manditur Agallochũ, inquit Dioscorides, aut decocto os colluitur, commẽdandi halitus gratia. Sudores arcet toti corpori inspersum. Pro thure ad suffimenta substituitur. Radix epota drachmæ vnus pondere humida stomachi vitia, & imbecillitatẽ feruoremq; mulcet. Si lateris iocinorisq; dolor ex cruciat,

*AGALLOCHVM siue
Xyloaloë.*



Lib. 1. c. 21.
*Vires &
Temper.*

Lib. 2. c. 733; si dysenteriar aut tormina infestant, ex aqua bibere prodest. Agallochum auctore Auicenna calfacit atque exsiccatur ordine secundo. Facit ad cordis affectus: ob id inter ea medicamenta quæ cordi præsidio sunt ab eodem recensetur.

BALSAMVM. CAP. XIII.

Nomina
Lib. 1. c. 18.
Forma.



Locus.

Tempus.
Opobalsamum.

BALCE' Bân Quov, Latine etiam Balsamum dicitur, Arabibus *Balsam* *Balefma*, *Belsan*, Italis *Balsamo*, Gallis *Baume*. Dioscorides Balsamum esse tradit Leucoij, & vt in vulgaris exemplaribus habetur, Pyracanthæ magnitudine, folio Rutæ proximo, longè cãdidiori, semper exurẽte. In Iudææ solũ quadam valle, & Ægypto nasci, differẽs scabritia, proceritate, fragilitate: quòd igitur tenui & capillacea coma sit, Theriston vocari, quasi demelsile, fortassis quòd ob fragilitatem facillè demetur. Aestiuus sub ortu canis ardoribus arborem vnguibus ferreis incidi, manareq; è plaga succum siue liquorẽ, quem

quem Opobalsamum vocant, sed tam exiguo stillatu, vt annis singulis, non plures quàm seni septenive congi cogantur, inibiq; pondus duplo rependitur argento. Theophrastus paulò aliter delineauit his fere verbis. Balsamū in valle Syriæ nascitur, in hortis dūtaxat duobus, vt aiunt, alterum viginti esse iugerum, alterū multò minorem. Arbor magnitudine est Mali Punicæ magnæ, ramis valde multis, folio Rutæ simili, sed subcandidiore, perpetuo virente. Fructus similis est Terebintho, magnitudine, figura & colore, valde odoratus, & lacryma ipsa odoratior. Hæc ex plaga colligi tradunt, incisio vnguibus ferreis caudice circa superna, sub sydere cum maximè æstus feruet. Colligi verò æstate tota, sed multum nō esse quod fluit, vnam enim die concham duntaxat plenam colligi: odorem eius eximium esse & copiosum, adeò vt ex eius tantulo odor longum spatium permeet. Verum sincerū nullum ad nos aduehi, sed cum collectū est atq; permixtum: multarū enim rerum permixtione vitari, & quod in Græcia venditur, sæpe adulteratū esse. Quin & valde odoratas esse huius arboris virgas: & eas quidem amputari quotānis, partim vt reliqua valentiora seruentur, partim vt emolumenti plus comparetur: vèdi enim eas magno pretio posse. (ex qua Gazæ cōuersione sic legēda Græca in vulgatis codicibus deprauata. *δένδρα γὰρ καὶ γαλφὺν καὶ ἐκάστους ἐνιδύδεις, ἔτι τῶν ἄλλων ἔνευκα, ὥς ἐις χυρότερα σώζειν, καὶ πλεονέκτητος εἰσφέρειν, πωλεῖσθαι γὰρ τιμώσις.*) atq; huius arborum cultus causam ad imbrem referunt, (Lege, καὶ τῆς ἐργασίας πλεονέκτητος δένδρα χεδὸν τὴν ἄλλαν εἶναι &c.) Continud enim eum cadere: atq; etiam virgarum amputationem causam quandam esse aiunt, cur arbores magnæ non fiunt. Etenim quia frequenter tondentur virgas tantum producant, nec in vnū caudicem vires intenduntur. Nul- lum vsquam siluestre Balsamum esse audiuius: ex maiori horto vasa duodecim impleri, quæ dimidiū congi capiunt. Ex altero verò duo duntaxat. Sincerū vendi duplo ad argentum pretio, adulteratū proportionem mixtionis. Et Balsamum quidem odoris gratia videtur excellere. Plinius quædam alia scribit, alia ex vtroq; mutatus videtur. Sed omnibus odoribus præfertur Balsamum, vni terrarum Iudeæ concessum, quondam in duobus tantum hortis, vtroq; Regio, alterum iugerum viginti, nō amplius, altero pauciorū. Ostendēre arbusculam hanc vrbi Imperatores Vespasiani. Clarumq; dictū a Pōpcio Magno in triumpho arbores quoq; ductas. Seruit nunc hæc, & tributa pendit cum sua gente, in totum alia natura quā nostri externiq; prodiderūt. Quippe Viti similior est quàm Myrto. Malleolis feri creditur, nuper vineta vt Vitis: & implet colles vinearū modo, quæ sine adminiculis se ipsæ sustinent. Tondetur similiter fruticans, ac rastris mitescit, prope atq; nasci, intra tertium annum fructifera. Folium proximū Rutæ, perpetua coma. Sæuiēre in eandē Iudæi, sicut in vitam quoq; suam. Contrā defendēre Romani, & dimicatum pro frutice est. Seritq; nunc eam fiscus: nec vnquā fuit numerosior aut procerior. Proceritas intra bina cubita subsistit. Arbori tria genera. Tenui & capillacea coma, quod vocāt Eutheriston. Alterū scabro aspectu, incuruum, fruticosum, odoratius. Hoc Trachy appellāt. Tertiū Eumeces, quia est reliquis procerius, læui cortice. Huic secunda bonitas, nouissima Eutheristo. Semen eius vino proximū gustu, colore rufum, nec sine pingui: peius in grano quod læuius atque viridius. Ramus crassior quā Myrto. Inciditur vitro, lapide, ossisq; cultellis. Ferro lædi vitalia odit. (Theophrastus & Diosco. ferreis vnguibus scalpi dixēre) Emoritur protinus, eadē amputati superuacua patiens. Incidentis manus libratur artifice tēperamēto, ne quid ultra corticē violet. Succus è plaga manat, quē Cipobalsamū vocant, suauitatis eximia, sed tenui gutta: ploratus lanis parua colligitur in cornua. Ex iis nouo fictili cōditur crassiori similis oleo, & in musto cādida. Rubescit deinde, simulq; durescit è trāslucido. (Legēdum, & trāslucet) Alexādros magno res ibi gerēte, toto die æstiuo vnā conchā impleri iustum erat. Anni verò fecunditate è maiore horto con-

Lib. 9. hist. cap. 6.

Li. 12. c. 25.

gios fenos, minore singulos, cum duplo repēdebatur argēto. Nunc etiā singularum arborum largior vena, ter omnibus percutitur æstatibus, postea deputatur. Et sarmēta quoq; in merce sunt: Denariis trecētis amputatio ipsa surculuq; vānit. Intra quintū demum annum Xylobalsamum vocatur, & coquitur in vnguentis. Pro succo ipsum substituere Officinæ. Corticis etiā ad medicamēta pretium est. Præcipua autē gratia lacrymę, secūda semini, tertia cortici, minima ligno. Strabo etiā Balsami historiā sic descripsit. Hierichus est cāpus à montana quadā regione circūda-
 rus, q̄ in theatri speciē ad ipsum declinat. Hoc in loco est Palmerū Palmis abundās spatio stadiorū centū, & totū irriguum, & habitationibus plenū, vbi & regia est, & Balsami viridariū. Arbor odorata est & fruticosa, Cytiso & Cerebintho p̄similis. Eius corticē vulnerātes, succū in vasis suscipiunt tenaci lacti p̄similē. Alibi etiam nasci Balsamū testatur, cum scribit. Et apud Sabæos Thus & Myrrha, & Cinnamonum nascitur: in ora etiā Balsamū, & quadam alia planta odorata. Auicēna Balsamum in Ægypto nasci scripsit, eandemq; ferē omnia quæ Dioscori. de eo tradidit. Ait Theuetus se vidisse hortum non procul à Cairo Ægypti liquore illo raro & pretioso ex Balsamo arbore profluente celeberrimum, quam Prouinciæ præfectus adhibitis custodibus diligentissimē cōseruat, vt eius liquore colligat, quē quotannis ad Turcarū Imperatorem mittat. Itē à Græcorum Patriarcha & vrbis senioribus audiuisse eum qui hodie colligitur, neq; tam oleosum, neq; vulneribus vlceribusq; curādis tam vtilem, quā qui postremi Regis Ægyptij tempore colligebatur. Plures quidem clam Opobalsamū vendere, sed adulteratū. Narrasse Arabas ex historiis Cleopatram Ægypti Reginam ex Iudæa Balsamum primam in Ægyptum trāstulisse. Sed huic historiæ vix assentitur Theuetus, quod in alia vulgari Græca lingua cōscripta in Palestina legerit, Traians tēpore Balsami feracia fuisse montana Engadi, & quadā alia Asiæ minoris loca: quāquam re vera cum hæc lustraret, nullam reperire potuerit Balsami stirpem. Præterea Basiliāni montis Libani incolæ ex historiis suis referebāt, in quadam mōtis parte quę Solis ortū spectabat, Alexi Græcis imperāte, tantum Balsami colligi solitum, quantū in Ægypto. Sed regione à Turcarū tyrannide oppressa, & exactis inde Christianis, eius liquoris memoriā vnā cum planta ipsa exoleuisse. Ægypti Reges nihil pretiosius habebant, quod Regibus & Imperatoribus Persidis, Catax, Æthiopię, Græciæ, ceterisq; dondarēt, siue ad ineundā siue ad confirmādā cum eis amicitiam. Auctor descriptionis Africæ, in octaua eius parte tradit extra urbē Ægypti Milfruhetich primā in Ægypto à Mahumetanis cōditam ad Nilum, excellētes esse & magnificas sepulturas Regum Ægypti, qui eorum lingua Soldani dicūtur. Ab his sepulchris mille & quingētis passibus stare dignos dictos Almathria, in quibus est hortus vnicā alens arborē, quæ Balsamum producit, nec in toto orbe vlla alia est quā hæc sola. Plātula est in medio fontis instar putei. Nā est procera arbor. Folia eius similia sunt foliis vitis, & parua. Audiuisse se refert qui dicerent, si aqua fontis diminuat, plantam ipsam siccātā iri. Hortus cinctus est validissimis muris, in quem ingredi nemo potest, nisi maximo fauore aut dono custodiētibus dato. Multa quidē hæc illi de Balsamo. Nullus tamen notis omnibus delineauit eius imaginē, vt verisimile sit eam præsertim veteribus illis incognitam fuisse. Hanc ex amici cuiusdam oratione sic refert Pena: Humilis est frutex, aspectu deformis, cineracei coloris, flore pusillo Iasmini lutei simili, minore, perpetuis virgis. Folia horna exuit mense Decembri, quibus non nisi mense Maio noua substituuntur. In Cairo atque Babylone sata viget. Decembri mense ramuli præcindūtur, quibus cera oblitæ appenduntur amphoræ, excipiendo aureo liquori, qui moschum sapit. Nunc de tribus plantæ partibus dicamus, vt veras ab adulteratis discernamus, & earum vires perspectas habeamus. Succus probatur, auctore Dioscoride, recens, odoris validi, sincerus, non

Lib. 16.
Geogr.

Ibidem.

Lib. 2. c. 81.
To. 1. lib. 2.
cap. 3.

Succi E-
lethio.

Lib. 1. c. 18.

ad acorem vergens, dilui facilis, læuis, adstringēs, ac modicē mordēs linguam. Sed variē vitiatur misto ab aliquibus Terebinthi, Cypri, Lentisci, Balani vnguēto, item Sufino, Metopio, Melle, aut cerato Myrteo, aut Cyprino liquido, læui. Sed dolus facile deprehēditur. Nam purus in laneam vestem instillatus, si eluatur, neque maculam, neque notam relinquit: vitiatus autem inhæret, & lac instillatus coagulat, quod adulteratus nō efficit: Præterea sincerus in aqua, a lacte celeriter liquatur & lactescit, adulteratus olei modo innatat se cōuoluens, & in stellæ modū diffundens, Sincerus tempore crassescit, deteriorq; redditur. *Xylobals.* *Electio.* *Carpobal*
sa. Ele-
ctio.
Vires &
Temper.
Li. 6. simpl.
Balsamum
Indicum.
 Xylobalsamum probatur recēs, tenuibus ramulis, fuluum, odoratum, quadātenus Opobalsamum spirās. Semen eligitur flauum, plenū, grande, ponderosum, mordēs gustu, feruens, modicē Opobalsamū olens. Adulteratur semine Hyperico simili, quod ē Petra oppido defertur. Sed coarguitur magnitudine, inanitate, virium ignauia, sapore piperis. Efficacissima vis inest succo, & maximē calfaciens, abstergit quæ tenebras oculis offundunt, medetur perforiētionibus vuluæ cum cerato rosaceo appositus: mēses quoque secundas & partus extrahit, horrores illitu discutit, sordida vlcera expurgat, & cruda cōcoquit: vrinam potui ciet, ægrē spirātibus prodest: datur in lacte cōtra Aconitū haustum, ac serpētium ictus. Miscetur acopis, malagmatis & antidotis. In summa efficacissima vis inest succo, secunda semini, minima ligno. Semen cōmodē potui datur pleuriticis, peripneumonicis, tussi, ischiadicis, comitialibus, vertiginosis, orthopnoicis, vrinæ difficultati, torminibus, ac serpētium moribus: ad muliebres infusus vtile est: vuluā aperit in defēsiōnibus balnearum decoctū, & humorem euocat. Lignum easdem habet vires, aliquāto minores. Ex aqua potum cruditatibus, torminosis, venenatorū ictibus, vulsis opitulatur, vrinam cit, ad vulnera capitis cum Iri sicca conuenit, squamas ossium extrahit, & ad vnguentorum spissamenta additur. Balsamum, vt scripsit Galenus, desiccatur & excalfacit ordine secundo. Est autem tenuium partium, adeo vt odoratum sit. Sed liquor eius subtiliorum etiam partium est quā ipsa planta, non tamen adeo calidus, vt quidam existimant, tenuitate partiū falsi. Porro fructus eius per similes genere facultatis est, ceterum longē in subtilitate partium inferior. Cum hæ tres Balsami partes rarissimæ sint, imo potius cum his prorsus destitutæ sint Officinæ, succedanea tria excogitarunt. Liquori Balsama quæq; sua, quæ vocant artificialia substituerunt, quorum mirificas vires ad vulnera curanda omnes celebrant, & experimētis confirmant. Xylobalsamo Lētisci furculos, fortasse haud abs re, modō carioli non sint, sed recentes, nec odorem amiserint: ea enim sunt temperie, nempe modicē calfaciente, desiccante, moderatē etiam adstringente & aromatica, vt horum puluis stomacho commodus esse possit. Iisdem qualitibus denticulipia ex iis, dentes & gingiuas purgant & roborant. Hoc Pseudoxylbalsamo abundat Gallia Narbonensis & Italia. Carpobalsamum Officinarum prorsus reiciendum est, neq; enim Balsami fructus est, sed ignotæ cuiusdam plantæ, vietum, exoletum, inodorum. Quare eius penuria semine Terebinthi, vel Lentisci immaturi vtendum cēset Pena, quod eius vires Carpobalsami facultatibus planē respondere videantur. Quin ē Terebinthi pullulantibus botris atque flagellis tempore Verno lymphidissimus liquor extillans, odoratissimus, non parū tenax, digerendo, glutinando, dolorēque mulcēdo eadem quæ Opobalsamum præstare potest: cui suffragatur omnium consensus: nullus enim Balsamum confecit, qui non Terebinthinam vulgatam permiscuerit. Quare nullum ille succedaneum aptius arbitratur, cuius partes omnes omnibus partibus, liquori, ligno, semini respondeant, quā Terebinthus genuinus. Hodie ex Occidentali India præstantissimus liquor in Hispaniam defertur, quem ob excellentes & admirandas virtutes Balsamum nuncuparunt, veri illius Balsami quod in Iudæa & Ægypto nascebatur nomine. Quare Balsamum

Li. de sim-
plic. Ind.
Occident.

Forma.

Temper.

& Vires.

Indicum siue Occidentale nominetur. Nascitur auctore Nicolao Monard. in Hispania noua arbor Indis Xilo dicta, Punica malo maior, foliis Vrticæ similibus, serratis & tenuibus. Ex hac duobus modis liquor elicitor. Vno multis incisuris vulnerato arboris cortice, qui tenuis est. Liquor inde fluens tenax est, subalbidus, & præstantissimus, sed adeo paucus, vt totum sibi seruent incolæ, nec ad nos transferatur. Altero Indis admodum familiari in eliciendis succis ex quauis arbore. Ramos atque etiam truncos arboris assulatim & minutim cõcisos in amplissimū lebetem coniiciunt, multa affusa aqua. Bulliunt omnia quantum satis sit: sublato igne refrigerari sinunt, & conchis oleum supernatans colligunt. Id verò est Balsamum quod in Hispaniam aduehitur, & quo illic vulgò vtuntur, colore ex nigro rubente, odoris suauissimi. Vasculis argenteis, vitreis, stanneis, aut fictilibus vitratissis asseruatur, aliam omnem materiam penetrans. Gustu est acuto & aliquantulū amaro, vnde colligere licet adstrictionis particeps esse, calidum & siccum secūdo gradu. Tribus autem modis in vsum medicum recipitur. Aut enim intus sumitur, aut foris illinitur, aut chirurgicis remediis permiscetur. Intus sumptum manè ieiuno ventriculo asthmaticis vtile est, & vesicæ doloribus, menses ciet, vt & pessi modo subditum. Eius quatuor aut quinque guttulæ vino, aut aqua rosacea in cochleari exceptæ, & diluculo sensim in guttur instillatæ, sic vt linguam nō contingant (eius enim Balsami sapor in ore diutius hærens forsitan nauseam moueret) veteres stomachi dolores finiunt, eūque roborant: colorem commendat & anhelitum. Iocinori prodest, obstructions aperit, & iuuentutem conseruat. Phthificos iuuat, steriliū vterum expurgat pessi modo admotum. Foris calidum cum pluma illitum omnes cruciatus à frigidis humoribus ortos mulcet, præsertim si linteum liquore delibutum apponatur. Oedemata discutit & absumit: quamlibet corporis partem roborat. Capiti illitum cerebrum reficit & fouet, omnemq; noxiū humorem absumendo, dolores sedat. Paralyticis opitulatur, cerebro, ceruice, spina, & ea parte quæ paralyti tentata est inunctis. Eadem ratione ad omnes neruorum morbos & contractiones vtile est. Stomacho illitum eum roborat, concoctionem iuuat, & flatibus obstructionibusq; liberat, sicuti & lienem, quem etiam emollit. Nephritidem & ventriculi dolores à causâ frigida & flatibus prouenientes, calidum loco dolenti impositum sanat. Idem præstat pani calido inditum, sicq; appositum. Vrinam cit & expellit illitum. Summò pere laudatur in articulorum doloribus, præsertim coxendicum, quia omnem duritiem & tumorem resoluens discutiat. Chirurgicis medicamentis mixtum, mirum quantum valeat. Vulgò in recentibus vulneribus vtuntur: nam statim & sine suppuratione glutinat. Iis etiam prodest in quibus contusio adglutinationem impedit, quòd statim digerat, & reliqua præster quæ ad vulnus glutinandum necessaria sunt, vt non abs re pauperum chirurgia ceteri possit. Neruorum iuncturarumq; vulnera præ reliquis medicamentis ad cicatricem perducit, contractionemq; prohibet. Capitis vulnera sanat, modò cranium illæsum sit. Denique recetia omnia in quamlibet corporis parte, antiqua verò per se, aut cum aliis eò pertinētibus expurgat, & ad cicatricem perducit. In diuturnis febribus spina eo calente inuncta, dimidia hora ante paroxysmum, & illico quinque aut sex guttis eius in vino sumptis modo supradictò, horrores discutiuntur, si ter aut quater remedium id repetatur. Hoc Balsamum statim, atque in India innotuit, ab Hispanis vsu receptum fuit, Indorū exempla secutis, hoc succo vulnera sua curantium. Quare in Hispaniam delatū ob admirabiles eius dotes magno fuit in pretio: eius enim vncia modò decem, modò viginti ducatis æstimabatur, nunc libra non pluris quàm tribus aut quatuor ducatis valet. Romam quoque primū illatum in eo fuit pretio, vt vncia centum ducatis venderetur. Deinde magna eius copia ad nos delata cœpit vilescere.

Eodem

FRUCTVS *Balsami*,
Monardi.

Eodē Nicolao Monardo auctore, ex America siue Noui orbis cōtinenti magna copia deferri cœpit Balsamū aliud per incisionē extractū ex arboribus iis similibus quæ in noua Hispania nascūtur, vbi Balsamū decoctione colligitur. Sunt autem eæ arbores vastæ magnitudinis, & ad radicem vsque ramosæ, duplici septæ cortice, altero crasso, Suberum modo, altero tenui, interno, materiam arborum amplectente.

Li. de sim-
pli. Occid.
India.

Forma.

Ex eo quod inter vtrumque corticem est spatio, incisione Balsamum profluit, alba limpidifimāque lacryma, suauissimi odoris, qui insignes suas facultates statim prodit. Idem auctor affirmat eius guttulam, alterius quod decoctione elicitur libra præstare, eiúsque arboris fructum se habere, qui pro arboris magnitudine exiguus est, nempe Ciceris aut Pisi grano non maior, gustus aliquantum amari, inclusus extrema siliqua angusta, digitum longa, alba & tenui. Eo fructu sese suffiunt Indi ad capitis dolores & defluxiones. Auctor generalis Indiarum Historiæ narrat in India & insula Hispaniola plantam quandam sponte nasci, arboris magnitudine, vt pote quæ ad duorum hominum proceritatem interdum assurgat. Caulibus est cinereis, foliis viridibus superiore parte magis quàm inferiore, grandibus & amplis costa crassiore & elatiore per medium diuisis, foliorum pediculis non virentibus, sed rubescentibus. Fructus est racemosus, longus instar manus digitatæ. Acini eius rari, virentes, quandoque rubescentes, & qui maturescendo magis, ac magis rubescunt. Succum ex ea hoc modo extrahunt. Cymas & asparagos teneros huius plantæ colligunt, alij racemos addunt, & ex his succum exprimunt, quem in aqua coquunt ad dimidias, deinde magis ac magis ad sapæ aut mellis crassitudinem. Residere sinunt, & ad vsum reponunt. Vlceribus & vulneribus admovent: sanguinem enim reprimat, terget, & mirificè eis medetur, etiam vero Balsamo efficacius. Eius folium hîc ad vium est expressum, vtroque extremo acuminatum, sex digitos longum, latum quatuor cum dimidio. Reperitur in multis locis insulæ Hispaniolæ. Balsamum nouum vocant. Ex eius summitatibus

Usus.
Lib. II. 73.

BALSAMI folium.

destillatur aqua, præstantior aqua vitæ, vulneribus vtilissima, & morbis omnibus qui à frigore ortum habent, vti dolori ventriculi, aut partis alterius, si diebus aliquot bibatur.

MACER.

Nomina

Lib. I. c. 94.

Forma.

Lib. 12. c. 8.



T GRÆCIS μακέρ, ita Latinis Macer & Macir nominatur, Auicenna Talisafar, de quo breuiter sic Dioscorides. Macer est cortex flauescens, crassus, gustu perquam adstringens. Ex Barbaria aduehitur. Plinius non plura tradit. Et Macer ex India aduehitur, cortex rubens radice magnæ, nomine arboris suæ. Qualis sit ea incertum habeo. Plinius & Galenus ex India conuehi Macerem aiunt, Dioscorides ex Barbaria, quæ, Ptolemaeo auctore, in Indo fluuii insula est, vel vrbs. Illud maiore consideratione dignum, quod Plinius radice, alij alterius partis, vel trunci, vel ramorum arboris corticem Maceris nomine intellexisse videntur. Quis autem sit hic cortex, hodie ignoramus, nec etiam aliunde ad nos aduehitur. Attamen Pena scribit inter extremi Cæsariæ corticis magna fragmenta, de quibus dicemus, etiam repertum fuisse alium, qui ex cuiusdam arbusculæ stipitis imo exemptus, inferiore sui parte valde similis & concolor est superiori, sed minus crassus, ferè inodorus, aut quiddam Iuglandis aut Lauri redolens, gustu perparum caloris glutinisve mixti cum adstrictione habens. Quare Macer videri possit, cum Macer Dioscoridi & Galeno adstringens sit, & calfaciat, & arboris cortex esse videatur. Macim autem Officinarum non esse, integumentum scilicet Nucis myristicæ, multis rationibus demonstrari potest. Est enim Macis tenuis cortex, acris odoratus, & amariusculus: Macer verò Plinio cortex rubens, radice magnæ. Præterea vires & facultates plurimum à sese dissident. Nam Macer gustu valde adstringit, ut Dioscorides auctor est. Quare contra cruentas excreationes, dysenterias, & alui fluxiones bibitur. Et ex Plinio, Corticis melle decocti vsus ad dysenterias præcipuus habetur. Galeno verò Macer gustu est multum acerbo, cum leuicula quadam acrimonia odorata, iucundum sanè redolens. Videtur itaque ex mixta constare essentia, pleraque terrena frigida, paucula verò calida, & tenuium partium. Quamobrem valenter desiccatur adstringitque: ob id cœliacis & dysentericis miscetur facultatibus, in tertio desiccantium consistentis ordine, in caloris frigorisque differentia neutram insigniter efficiens. At Macis non ita adstringit, nec tam leui est acrimonia, sed linguam & fauces satis vellicat, odoratio est, & leuiusculum amarorem cum siccitate relinquit, ut dici possit calfacere & siccare in fine secundi ordinis, vel principio tertij. Maceris à Maci discrimen non ignorauit Serapio, qui cum ex Isaac dixisset Macim esse Nucis odoratæ operimentum, subiungit aliud esse de quo intelligit Dioscorides, scribens Macerem ligni corticem esse siue corium. Item Auicenna de Maci Nucis odoratæ inuolucro tractauit vno in loco, de Macere autem tanquam diuersa re, nomine Talisafar, alibi. Postremò Dioscorides & Galenus de Macere illa quidem quæ suprà diximus, literis mandarunt, de Maci verò vix potè incognito aromate, ne verbum quidem.

Vires.

Lib. 12. c. 8.

Li. 7. simpl.

Ca. 2. simpl.

Li. 2. c. 448.

Li. 2. c. 687.

MALABATHRVM BETRE. CAP. XV.

Nomina

Lib. I. ca. 11.

Forma.



ΜΑΛΑΒΑΘΡΟΝ Græcis & μάλλον, Latinis similiter Malabathrum & folium simpliciter, & folium Indicum. De quo hæc prodidit Dioscorides. Malabathrum quidam esse putant Indicæ Nardi folium, decepti quadâ odoris similitudine: multa enim Nardum olent, ut Phu, Alarum, Niris. Res autem non ita habet. Nam Malabathrum folium est sui generis, quod in Indiæ nascitur paludibus, Lentis palustris modo innatans aquis sine radice. Id collectum statim lino transsuetur, & siccatum reconditur. Ferunt siccatis æstiuo feruore aquis, humum aridis fruticibus vri. Quod si non acciderit, non amplius renasci. Probatur recens, ex nigro candicans, non fragile, integrum, odore

odore caput feriens, quod in sua odoris suavitate diù permaneat, vt Nardum sapore immiscetur, nullo satis gustu. Infirmū verò, & minutim concisum, cariosum, virus olens, improbat. De eodem sic Plinius. Dat & Malabathrum Syria, a bore folio conuoluto, arido colore, ex quo exprimitur oleum ad vnguenta, fertilior eiusdem Ægypto. Laudatius tamen ex India venit. In paludibus ibi gigni tradit Lentis modo, odoratius Croco, nigricans scabrumq;, quodam salis gustu. Minus probatur candidum. Celerrimè situm in vetustate sentit. Sapor eius Nardo similis esse debet sub lingua. Odor verò in vino sufferuesfacti antecedit alios. Hic Plinius diuersa Malabathri genera ponit, Dioscorides vnicum. Vnum in India laudatius, ibi in paludibus gigni Lentis modo, quod Dioscorides dixit Lenticulæ palustris modo aquis innatare. Quodam salis gustu, Dioscorides nullo, *μη ἀλμυρὸν*, id est, nauigationis tempore aqua marina non perfusum. Minus probari candidum, Dioscorides probat ex nigro candicans. Auicenna & Serapio quæ de Folio Indo tradiderunt, à Græcis mutuati sunt, qui cū Malabathrum non norint, ex eorum scriptis innotescere aliis non potuit. Quare veram Malabathri historiam ex García hic exponemus. Indi folium siue Malabathrum Tamalapatra appellant, ex qua voce Græci & Latini suum Malabathrum detorserunt, Arabes *Ladegi Indi*, id est Folium Indum, Actuarius à Mauritanis *Tembul* nominari perperam scripsit. Est autem Folium Indum folio mali medicæ simile, angustius tamè per extremū, colore viridi, tribus per longitudinem excurrentibus costis (qua nota faciliè dignoscitur) odoratum, Caryophylla quadantenus redolens, non tam vehementis odoris quàm Nardus aut Macis, neque tam subtilis & acuti quàm Canella. Non

Li. 12. c. 26.

Li. 2. ca. 23.

Cap. 63.

simpl.

Li. 1. Arom.

Ind. ca. 19.

Nomina**Forma**

TAMALAPATRA

cum suo ramusculo.



igitur aquis innatat hoc folium Lentis palustris modo, vt referunt Dioscorides & Plinius, sed nascitur in procera arbore procul ab aquis, cū multis aliis in locis, tum in Cambaya. Neque tam val di sunt odoris folia hæc quàm Spica Nardi, sed suauioris, neque eo modo colliguntur atque reponuntur quo Dioscorides ait, sed collecta in fasciculos colligantur, atque ita vaneunt. Dilutior viridi colore nitent, nõ ex candido nigricant, & præferuntur integra, quòd facultas in istis melius conseruari credatur. Odore nequaquam caput ferunt, vt reliqua odorata. Plinius in Syria, Ægypto & India nasci tradit, quod cū perquisiuisset Garcias à Medicis Memphiticis, Damascenis, & Alepinis, omnes vno ore negarunt in Syria aut Ægypto gigni, neque tam validi esse odoris quàm Crocum, neque Nardi esse sapore affirmat. Quod verò huius in vino sufferuesfacti odorem alios antecedere scribit, eius tempore verum id esse potuit, cū adhuc ignota essent Berzuinum, Ambarum, Moschus, Calambac, id est Agallochum præstantissimū, aromata odoratissima. Hoc folium quale à García describitur, eius Scholiastes ad nos, ipsis etiā tenuioribus ramis interdum adhuc inhaerens & integrum adferri ait, quale & hic pictura expresit, gustu Laurini ferè folij. His addit picturā fructus cuiusdam exigui, glandis ferè forma à Cortuso missi cum hac inscriptione, Fructus Canellæ quorundam sententia, ex aliorum verò sententia, *Tembul* conuoluoli in India.

Eum

Eum quoniam intellexerat aliquando vnà cum folio Indo ad nos adferri, atque id legitimum esse folium ex Garcie descriptione coniiciat. (Nam *Tembul* fructus longè diuersus est, vt in Betre dicitur) pingendum curauit ea magnitudine quam missus est, quem & nos hîc cum folio exhibemus. Falluntur, inquit Garcias, qui Malabathrum Caryo phyllorum folium esse putant: nam regio in qua Caryo phylla nascuntur, biennij ferè itinere distat ab ea in qua Malabathrum prouenit. Neque opus fore *ἐν ἱεραλλομῶν* ait, si diligentiores essent pharmacopœi & Medici Lusitani: tanta enim eius copia exportari posset, quæ vniuersæ Europæ satisfaceret. Eius autem penuria Canellæ folijs vtendum consulit, si ea nanciscantur, sin

Li. 2. ca. 23.

minus, Spica Nardi, non autem Maci, vt quidam voluerunt, Auicenna Thalifasar substituit aut Spicam, Bellunenensis autem Thalifasar, seu Thalifasar, seu Thaleffir interpretatur folia Oliuæ Indæ. Alij dicunt, inquit, quod est lingua aûis. Rectius opinor Clusius, qui Thalifasar Auicennæ Græcorum Macerem esse censet, de quo Thalifasar nomine scripsit Auicenna, vt diximus. Malabathrum, Dioscoride auctore, eandem quas Nardus vires habet, sed omnia efficacius præstat. Vrinam vehementius ciet, & stomacho magis prodest Malabathri vis. Oculorum inflammationibus tritum & in vino seruefactum commodè illinitur, subditum linguæ oris halitum commendat. Vestibus interpositum earum odorem seruat,

Li. 2. c. 687.

Lib. 1. ca. 11.

Vires.

Lib. 23. c. 4.

& ab etiosione tuetur. Plinius, Malabathri quoque naturam, inquit, & genera exposuimus. Vrinam ciet, oculorum epiphoris vino expressum vtilissimè imponitur item fronti dormire volentibus, efficacius si & nares illinantur, aut si ex aqua bibatur. Oris & halitus suauitatem commendat linguæ subditum folium, sicut & vestium odorem interpositum. Folio Indo Betre siue Betle adeò simile est, vt idè

Betre.

In cap. 11. li.

1. Dioscor.

Lib. 1. ca. 11.

gat.

esse credant multi, etià qui in India peregrinati sunt. Amarus Lusitanus vtrumque confundit. Item Odoardus Barbosa, scribens fluuium esse Betelle nuncupatum, in cuius ripis vici sunt aliquot, & horti amœnissimi ac paradisi, in quibus tanta Betelle copia colligitur (folium id est ad mandendum præstantissimum) vt iis nauigia paruula & scaphas onerent, quæ ad alias regiones & maris portus vendèda transfuehant. Hoc folium, inquit, Folium Indum vocamus, Lauri folio magnitudine par, eademque ferè specie. Hederæ modo alias arbores conscendit, & palis ridicisque fulcitur. Fructu seminèque caret. Folium istud in ore detentum roborandi vim habet. Quamobrem Indi omnes tam viri quàm fœminæ, noctu diuq; domi

Forma.

Vires.

& foris id perpetuò mandunt ita præparatum. Ex ostreorum testis calcem faciunt, in qua aqua dissoluta folium macerant, quibus adiungunt paruula quædam poma (*Areca* vocant) quæ permixta in ore tenent manduntq; nihil deglutientes, præterquam succum qui ex superioribus tribus commixtus elicitur, quæ semper os rufò colore, & dentes nigro inficiunt. His tradunt ventriculum à superuacuis humoribus expurgari atque exsiccari, cerebrum & cor mirè roborari, flatus discutiti, sitim sedari, vt nulla apud Indos res maiori sit in pretio. Non solum loco supradicto, sed etiam in tota India magna folij huius copia est. Persæ & Arabes *Tambul* vocant. Hæc Odoardus Barbosa. Sed hallucinantur, inquit Garcias, qui Betre folium Indum esse putant, in quo etiam errore se fuisse fatetur. Sed Nizamoxæ Regi medicamentum roborando stomacho iuuus componere, cum medicamenta ex quibus constaret enumerasset, adderetq; id folium quod manderet, folium Indum esse, risit ille, & Auicennam ostendit Arabica lingua conscriptum, qui diuersis capitibus de Folio & Betre agebat. De Folio quidem loco suprà citato, de Betre verò multò post, quod *Tembul* vocat corrupto, vt Garcie videtur, vocabulo, quod ab omnibus *Tambul* non *Tembul* vocatur. In Malauar, vt idem Garcias scribit, Betre vocatur, in Decan, Guzarate & Canam, Pam, in Malaio Siri. Nascitur in omnibus

Li. 1. Arom.

Ind. ca. 8.

Li. 2. c. 699.

Nomina

Locus.

Indiæ regionibus maritimis Lusitanis cognitis, in continenti non reperitur, nisi

c maritimis

è maritimis delatum. Verum quidem in Dultabado, vrbe opulenta, in Decan, in Bifnaga inueniri, sed minori certè quantitate quàm vt ad Perfās & Arabes deferatur. Supra Calaiate, quod octoginta leucis ab Ormuz distat, inueniri haud erit facile. Nam neque regionem frigidam amat, vt ex China, neque folibus nimium perustam, vt Mosambique & Sofala. Est autem Betre, inquit ille, folium simile ferè Mali Medicæ folio, oblongius tamen, & per extremū arctius, venas siue costas per longitudinem excurrentes habens. Optimum censetur bene maturum, colore fuluescente, tametsi mulieres nonnullæ præferunt quod immaturum est, quia maiorem sonum edit in ore dum manditur. Corruptur si recens à planta collectū diutius manibus tractetur. Fert Betre in Maluccis fructum quēdam cōtortum, lacerati caudæ similem, quem istic edunt, quod bene illis sapiat. Fuit id semen delatum Malacam, atque degustatū optimi saporis inuentum est. Seritur autem Vitis modo, addunturq; pedamēta, per quæ repens se sustineat nostratis Hederæ modo. Quidam maioris quæstus gratia Piperis, aut Arecæ arboribus id maritant, atque ita pulcherrimā vmbracula conficiunt. Multam verò curam & assiduam rigationem desiderat. Betre folium mansum amarum sentitur. Quā ob causam Arecam, calcem, atque alia admiscunt. Sunt qui addant Lycium, opulentiores Caphuram de Burneo, nonnulli lignum Aloës, aut Moschum, aut Ambarum. Sic autem paratum, adeo suavis est saporis, orisque halitum adeo commendat sua fragrantia, vt perpetuò ferè illud mandant ditiores, tum etiam alij pro facultatum ratione. In solitudinibus autem & remotioribus à mari locis carè venditur. Ideo fertur Nizamoxa singulis annis in id impēdere trigēses mille aureos Lusitanicos. Hæc sunt eorum tragemata, hoc abeuntem donant, atque Rex ipse interdum propria manu potentioribus largitur, aliis verò per manus famuli. Sed quia Betre venas habet per folij longitudinem discursantes, vngue pollicis (quæ ea de causa in acutū præsecant, non veluti nos in rotundum) eas eximunt: deinde admisto calcis momento (quæ tum ob exiguam quantitatem, tum quod ex testis ostreorum concrematis facta sit, nocere non potest) & Areca contusa aut confracta, folium Betre complicant, atque in os iniectum mandunt, priorem illum succum expuentes (quod tamen nonnulli non faciunt) qui cruentus videtur: deinde alia atque alia folia similiter præparata sumunt. Solent aliquem dimissuri, aut ipsi ab adstātibz discedentem his folijs præparatis plena bursula fericea abeuntem honorare. Nemo autem discedere sustinet, donec Betre sit donatus: id enim est dimissionis indicium. Præterea opulentiores adituri, hoc Betre manducare pro more habent, vt odore os commendent. Est enim apud eos valde indecorum odoratum non habere anhelitum: ita vt sitenuioris fortunæ aliquem cum potentiore fabulari necesse sit, manu ori admota id faciat, ne teter aliquis odor nares alterius feriat. Sic etiam mulieres cum viris congressuræ Betre mandunt, antequam colloquantur, existimantque ad lasciuia summam esse illecebram. Omnes eius regionis incolæ sumpto cibo mandere solent, alioqui cibos nauseam prouocatuos aiunt, & mandere assuetis oris halitum tetrum fieri si abstineant. Solent ab eius vsu aliquot dies abstinere, quibus obierūt sanguine iuncti, & in quibusdam ieiuniis. Ab eius etiam esu abstinent, & humi se abiiciunt Arabes & Moalis, id est, Ali sectatores, decem diebus quibus ieiunant. Auicenna tradit Betre gingiuas confirmare, in quem etiam vsum semper ab Indis manditur: & paulo post subiicit stomachum roborare, ob quam facultatem etiam ab Indis expetitur. Quod autem frigidam facultatem illi tribuat in primo gradu, & exsiccantem in secundo, putat Garcias exemplar vitiosum esse, aut (quod docti Arabes arbitrantur) Auicennæ in temperamenti ratione impositum fuisse. Fit enim plerumque, vt vulgus quæ calida sunt, frigida esse dicat, vt Piper, Cardamomum, Cepam. Calidum autem

Forma.

Vfus &
Vires.

Lib. 2. c. 699.

& siccum esse Betre ad finem secundi excessus Garcias expertus est, & ex sapore, ac odore iudicauit.

L A C C A.

CAP. XVI.

Li. 2. c. 432.

Cap. 81.
simpl.In cap. 23.
lib. 4. Diof.Li. 1. Arom.
Ind. cap. 6.
Nomina

ACCA Officinis, Italis etiam *Lacca*, quibusdam *Lachetta*, Auicenna Luch vocat, & Dioscoridis Pauli; Cancamum esse censet. Scribit enim ex Paulo gummi esse simile Myrrhæ, boni odoris, deberique adhibita cautione sumi. Deinde eos reprehendit, qui Caraben dixerunt esse Laccam, quamuis Carabe nonnullas facultates similes habeat. Serapio ex sententia Dioscoridis & Athabaris (quem nonnulli Paulum putant, quod eius verba transcribat) scribit Laccæ gummi esse arboris in Arabia nascentis, Myrrhæ simile. Deinde ex sententia Rhais, ex cælo decidere in ramos arboris Gubera, id est Mespili. Postremò ex Isaac, Lacca, inquit, res quædam rubra, quæ tenuibus lignis inhæret, saporis suavis. Coquitur hæc, & ex ea panni rubrò colore inficiuntur, quam insecturam Kermes vocant. Ex Armenia deferitur. Sed de Lacca longè aliter scripserunt recentiores. Amatus Lusitanus tradit Laccam hodie à Lusitanis ex India deferri, rubram, translucidam, insecturis præcipuè expectitam, ex qua etiã Officinæ compositionem præparant, quam Dialacca appellant. Hanc certum est non gummi esse, nec arboris plantæve alicuius lachrymam, sed potius formicarum alatarum stercus, fauaginæmve, veluti ceram apum. In Regno igitur Pegu apud Indos, cum terra pluuiæ, vel arte plus iusto irrigatur, formicæ alatæ ligna quædam tenuia ab incolis sic disposita conscendunt, in quibus Laccam generant: qua de causa in Lacca ligna visuntur, quæ proculdubiò arboris non sunt Laccam ferentis. Garcias tradit quam Officinæ Laccam vocant Arabibus, Persis, & Turcis *Loc Sumutri*, quasi dicas Laccam è Samatra, nuncupari, non quòd Samatra sit prouinciæ Pegu, vbi plurima Lacca nascitur, finitima, sed quòd Arabes & alij in Samatra gigni putarent. Idem nomen seruauerunt incolæ prouinciarum Balagnate, Bengala, & Malauar, quia à Mauritanis id dixerunt. Legitimum tamen in his

L A C C A cum suis bacillis.

Cap. 13.



prouinciis nomen est Lac, in Pegu verò & Martaban, vbi est præstantissima, Tree, atque istuc à Iamay adferri tradit. Non vocatur Aec, nec Aucusal, vt Pandectarj scribit, neque Sar, vt corruptè apud Serapionem legitur. Porro incolæ Pegu & Martaban eam Samatram deferrebant, vnde Piper in suam regionem reuehebāt. Quomodo autem illic nascitur, ita narrat. Vastam arborem illic inueniri, folijs quodammodo Pruni, in cuius furculis & minutioribus ramis magnæ formicæ in terræ visceribus alijsq; locis enatæ hanc Laccam elaborant (vt apes mel conficiunt) materiam ex ipsa arbore exsurgentes: hos deinde ramulos ab arbore reuelli, atque in vmbra siccare, donec decidētibus ipsis Lacca veluti in tubulos cōcreta maneat: interdum ligni fragmenta ipsi inhærent. Melior sincera, ligni & fragmētorum expers, deterior cui ligni fragmēta inhærent. Inuenitur etiam solida & minimè sincera, quā postea colliquāt, & in pollinem redigūt. Hæc vilior, quia multā terram admixtam habet. Non est autem arbor in qua

in qua Lacca prouenit, Myrto similis facie, aut magnitudine, vt aliqui putant, sed interdum in Nucis iuglandis magnitudinem accrescit, interdum minor est. Idem refert se in Balagnate vidisse ramulum ex arbore Betifera reuulsum, cui inhærebat Lacca: sed quia exigua admodum quantitate aduersante, cæli temperie prouenit, negligi: multi tamen se vidisse in iis arboribus affirmabant. Formicas autem Laccam conficere perspicuum esse, quod plerumque alæ formicarum Laccæ permixtæ reperiantur. Eligenda Lacca quæ præmansa pulcherrimo colore rubro inficit. *Electio.* Quæ etiam ad nos aduehitur, circa ramulos elaborata est, inquit Clusius, & quauis prædura & exsucca, mansa tamen sputum efficit sanguineum, quod probitatis est indicium. Ex his intelligere licet Laccam à Cancamo Græcorum diuersam esse, quod Lacca minimè odorata sit, Cancamum autem ad suffimenta usurpatur, quod boni odoris est indicium. Quare Auicennæ & Serapioni ignotam fuisse qui Cancamum Græcorum esse putarunt, quibus æquè incognita fuit. Non est autem Lacca Myrrha similis, quia hæc in exterioribus ramulis conficitur, & odorata non est, Myrrha ex ipso arboris trunco extillat, & odorata est. Fallitur etiam Auicenna scribens similes illi cum Carabe esse facultates: Carabe enim adstringit, Lacca obstructions aperit. Præterea Laccam in Arabia nasci falsum est, cum in Arabiam ex India deportetur. Neque in Sorbi ramulos delabitur, neque etiam Mespili, vt nonnulli perperam verterunt: cum nullæ sint, auctore Garcia, in vniuersa India Sorbi neque Mespili. Sed nec in Armenia prouenit, nec est Kerme Arabum, cum id nihil aliud sit, quam Coccus infectorius Græcorum. Lacca exalfacit ordine secundo, ventriculum & iccur roborat, & ab obstructionibus liberat, ictericis prodest, aquas pellit. Est alia Lacca artificialis, quam infectores vendunt: quæ ex fæce brasiliæ & croci constat, qua pictores maximè vtuntur in exprimendo colore rubro obscuro.

*Vires &
Temper.*

BENZOIN.

CAP. XVII.



ELZOE, vel Belzoim, vel Belzuinum vulgò, Garcie Benini, siue Belzuinum dicitur. Id ille veteribus prorsus incognitum fuisse scribit: neque enim apud Græcos, neque apud Arabas vllus eius descriptione legimus. Auerrhois quidem scribit Belenizan, siue Belanzan, siue petrosam exsiccantem & exalfacientem in secundo excessu habere facultatem, stomachum humidum & languescientem exsiccare & roborare, oris odorem commendare, partes corporis confirmare, & venerem excitare: quod nonnulli Beniui esse putant, quibus Garcias non assentitur. Veteribus etiam Iudæis incognitum fuisse ex eo conicit, quod neque Dauid, neque Salomon eius meminerint, qui tamen odores & suffimenta maximè celebrarint. Beniui genera multa Garcias recenset. Vnum à mercatoribus maximè expetitur, quod amygdaloides vocant, quia vngues seu maculas candidas amygdalorum instar admixta habet, & quo pluribus abundat, eo præstâtius habetur. Amatus Lusitanus hoc genus Myrrham Troglodyticam Dioscoridis, omnium præstantissimam esse censet. Maximè prouenit in Sian, & eius cotermina Martaban. Alterum genus nigrius inuenitur in Iaoa & Sumatra, quod vilius est. Est & genus nigrum in Sumatra, è nouellis arboribus profluens, quod ab odore grato Beniui de Boninas vocant: id superiori decuplo carius est. E nouellis autem plantis profluens amygdaloide odoratus esse ait Garcias, quia gummi multum natiuæ suæ fragrantie vetustate amittat, vt ferè reliqua huiusmodi. Sed quia candidum elegantius est, nigrum & nouellum odoratus, vtrumque permiscere solent, vt odoris fragrantie etiam elegantiam concilient. Beniui genera à Chinenfibus vocantur *Cominham*, ab Arabibus *Louaniaoy*, quasi dicas Thus de Iaoa, quod hæc regio primum Arabibus innotuerit: Arabes

Nomina
Li. 1. Arom.
Ind. cap. 5.
Collig. 5.
ca. 56.

Genera.

In cap. 71.
lib. 1. Diosf.
Locus.

Forma.

enim Thus Louan vocare diximus, Gazarate & Decan incolæ *Udo* nominant. Est autem Beniuiſera arbor procerâ, vaſta, pulchra, ymbra latè diſfundens ob ramorum copiam, quos venuſto ordine digeſtos, & in altè ſublatos, habet. Caudice eſt craſſo, materie pulchra & firmâ. Folia minora ſunt aliquantò Citri, ſeu Limonerae foliis, non tamen adeò virentia, ſed parte auerſa candicantia, quæ in maioribus ramis naſcuntur, ad Salicis folia magis accedūt, latiora tamen ſunt, ſed minùs longa. Naſcuntur interdum in ſiliis Malacæ. Vulgetur interdum arbores vt Beniui maiori quantitate effluat, nouella, vt dictū eſt, Beniui de Boninas emittit. Credidè per multi Laſerpiti j lacrymā, ſiue Aſam odoratam eſſe Benzui nū, quorum ſententiam Garcias improbat. Nullum enim, inquit, in condimenta vnquā Benzoinum recepiſſe certum eſt. Aſæ verò frequens eſt vſus in condiendis cibis apud Indos. Deinde maxima pars Laſeris ex India vltra Gāgem (Indi Ganga vocant) aduehitur. Benzoin verò quod in Indiam adfertur, quodq; Amygdaloides dicunt, naſcitur in Sumatra & Sian (non in Armenia aut Syria, aut Cyrene) eiùſque maxima pars in Indiam conuehitur, deinde in Arabiam, Perſiam, & Aſiam minorē, atque etiam in Palæſtinam Syriam, Armeniam, Africam.

BDELLIUM.

CAP. XVIII.

Nomina

Lib. 1. c. 69.



ΒΕΛΛΙΟΝ Græcis, μάλακον & βόλχαν, Latinis Bdelium. Eſt, auctore Dioſcoride, lacryma Sarracenicæ, ſeu Arabicæ arboris. Probatur guſtu amarum, translucidum taurini glutinis modo, intus pingue, facilè liqueſcens, ligni ac ſordis expers, ſuffitu odoratū, vngui ſimile. Eſt etiam Bdelij genus ſordidum, nigrū, vberioribus glebulis in offas conuolutū, Aſpalathi odore, ex India aduectum. Deferunt etiam ex Petra oppido ſiccum, reſinoſum, liueſcens, ſed facultate ſecundum. Adulteratur gummi, ſed ita vitiatum non perinde guſtui amaritudinem repreſentat, nec adeò ſuffitionibus odoratum. Lib. 12. c. 9. Dioſcorides hīc ſolūm gummi meminit, Plinius etiam arboris. Vicina eſt Baſtriana, inquit, in qua Bdelium nominatiſſimum. Arbor nigra eſt, magnitudine Oleæ, folio roboris, fructu capriſci naturæq; Gūmi alij Brochōn appellat, alij Malachrā, alij Maldacon. Nigrū verò & in offas conuolutū, Hadrobolon. Eſſe autem debet translucidū ſimile ceræ, odoratū, & cūm fricatur pingue, guſtu amarū citra acorē. In ſacris vino perfuſum, odoratiſs. Naſcitur in Arabia, Indiaq; & Media ac Babylone. Aliqui Peraticū vocant ex Media aduectū. Facilius hoc & cruſtoſius, amariſq; at Indicū humidius & gūmoſum. Adulteratur Amygdala nuce. In noſtris Lib. 2. c. 119. Auicēnæ exemplaribus cōfuſa eſt admodū & inepta Bdelij deſcriptio. Serapio duobus diuerſis capitibus de Bdelio tractat. In priore ſcribit Molechil de Machi, id eſt Bdeliū de Mecha eſſe arborē lunci, quæ maturatur in Mecha, & comeditur, eſtq; dulcis, cuius cor eſt Ceſilio, eſtq; ex genere Palmæ. In altero capite de Molochil agit, quod eſt Bdelium Dioſcoridis. Bdelij fructum à Cortuſo miſſum

Cap. 117.

ſimpl.

Cap. 194.

ſimpl.

BDELLII fructus Cortuſo.



rei herbariæ ſtudioſis cōmunicauit Cluſius, quem & hīc expreſſimus. Eſt nucis Iuglandis magnitudine, aut etiam amplior, triangulari forma, oblongiori tamen, & ad Ficū quodāmodò accedente, odoratus, colore ſubcinereo, durifiſſimo

risimo putamine, quod pręgnans est, & nucleum continere videtur. Bdellium calfacit auctore Dioscoride, & emollit duritias, & turgentia guttura, humidaq; hernias discutit, cum ieiuna salua dilutum: vuluę spiracula laxat appositum & suffitu, & partus humiditatesque omnes extrahit, calculos potu comminuit: vrinam mouet, rursientibus & a serpente percussis vtilissimę datur: valet ad rupta, vula, laterum dolores, & discursantes spiritus: malagmatis inseritur, quę contra duritias & nervorum nodos profunt. Contusum resoluatur affuso vino aut aqua calida. Dilucidius easdem facultates exponit Galenus. Bdellium quod Scythicum nominant, quod sanę & acrius est & resinofum magis, emollientis admodum & efficacis virtutis est. Arabicum, quod dilucidius est, magis desiccatur quęm emollientia. Igitur recens & humidum est, & contusum facillę mollescit, ad omnia ad quę Scythicum idoneum. At quod antiquum est, & gustu admodum amarum, & acre & siccum ab eorum quę indurata emolliunt mediocritate excidit. Vtuntur autem illis & potissimum Arabico, & ad bronchocelas, & hydrocelas salua matutina ieiunęque subigentes, vt emplastri consistentiam accipiat. Porro Arabicum & calculos renum in potu sumptum frangere apparet, tum vrinas ciere, & crudorum flatuum discursus, & laterum dolores, & rupturas perfanare.

Temper.
& Vires.
Li. I. ca. 69.

Li. 6. simpl.

CAPHURA

CAP. XIX.



CAPHOR seu *Chasur* Arabibus, recentioribus Gręcis καμφορα, vt etiam Latinis Caphura, nominatur, Officinis & Italis *Camphora*, Germanis *Campher*, Gallis *Campfre*. Serapio tradit Camphoram de Panzor esse de terra Panzor, id est, de insulis propinquis regioni Sarandin, & quibus annis hunt multa fulgura, tonitrua, & terrę motus, ibi generari multā Camphoram, & cōtrā. Aiunt etiam, inquit, in montibus Indię & Sim esse arbores Caphura. Deinde scribit ex Isaac, Camphoram deferri ex regione Saffella, & ex regione Calca, & Dhabe hac, & Harigi. Et Camphorā esse gūmī arboris nascentis in partibus illis, & esse gummi maculati coloris rubri, & lignū eius esse album, tenerū, quasi velit fieri nigrum, & Camphoram reperiri in corde ligni arboris, & in interueniēti ligni. Meliorem esse quę Camphora Riach appellatur, quę spōte ex ligno arboris manat, & coloris est maculati rubri, quę sublimatur, & fit Camphora alba, Riachina dicta à nomine Riach Regis, qui ibi primus regnavit. Nomen loci Panzor. Secundum bonitatis gradum obtinet Camphora de Sauzen, crassa, coloris obscuri, nec clara sicut Riachina, & vilior. Sequitur Camphora de Casal, fusca, vilioris etiam pretij quęm Riachina. Deinde Camphora Halonichi, fragmenta ligni admixta habens, pinguis, gummosa, ad suffitus, vtilis cum Costo, Myrrha & Thure in templis. Omnes hę species, inquit, clarificantur per sublimationem, & ex his prodit Camphora alba in laminis, figura paropsidum, & vocatur Camphora operata. Hęc ex Serapione. Auicennę species Camphorę sunt, Alkanfuri, & Ariagie, deinde Alzeid, & Alefcek: & est alba quę permixta est cum ligno suo. Quidam autem dixerunt quod est arbor magna, faciens vmbra multitudinī animalium valde numerosę, sub qua vmbra consueuerunt habitare aluemer, seu aluemer (supos ceruarios Bellunenensis interpretatur) & non peruenit ad ipsam arborem nisi in tempore noto anni. Lignum eius sæpius se vidisse ait, quod est album, frangibile, leue, in cuius cavitatibus quandoque continetur aliquid de vestigiis Camphorę. Hęc ferē Auicenna. Sed de hac tota re multo certius & enucleatius scripsit Garcias. Ac primū *Capur* seu *Casur* ab omnibus Arabibus nominari, quia apud eos literę p, & f, magnam habeant affinitatem. Quod si à quibusdam aliis alia imponantur nomina, aut mendosa esse exemplaria, aut auctores ipsos ea in re deceptos fuisse censet. Pręterea nomina locorum in quibus Auicenna &

Nomina:

Cap. 34. 4.
simpl.

Lib. 2. c. 33.

Lib. Aro-
mat. Ind. 1.
cap. 9.

Serapio nasci tradunt, magna ex parte corrupta esse. Nam ea, quam de Panzor vocat, est de Pacen in Samatra insula. Pro regione Calca ex qua aduehitur, è Malaca dicere deb ebat, quoniam in Bairros loco Malacæ vicino nascitur. Ea, quam Auicenna de Alfuz appellat, de Sonda esse potest, inquit Garcias, quæ est insula Malacæ vicina. In nostris tamen Auicennæ exemplaribus nō legimus Camphorā de Alfuz, sed Alkanfuri, Ariogix, deinde Alzeid & Alefchek, vt suprà diximus. Est autem Caphura nobile medicamentum, veteribus Græcis ignotum, & folis Arabibus acceptum ferendum, gummi quod in meditullium ligni cadens, deinde extrahitur, aut per rimas exudat. Id in aliquot lignis se vidisse Garcias affirmat. Principio verò exudat admodum candida, sine vllis rubentibus, aut nigricantibus maculis, non autem organis elicitur, neque ad candorem conciliandum decoquitur, vt Auicenna & Serapio tradidère. Duorum est generum, Caphura de Burneo, & quæ ex China deferitur. Caphura de Burneo nūquam ad nostras vsque regiones penetrauit: nec id mirum, inquit Garcias, quia huius libra tanti emitur, quanti centum libræ eius quæ ex China est, quæ secundū est genus, quæq; in Europam deferitur in panes orbiculares coagmentata, diametri quinque digitorū: quæ cum coagmentata sit, compositum medicamentum, nō simplex, videtur. Caphuræ de Burneo, quæ magnitudine est Milij, aut paulò maior, genera quatuor conficiunt Gentiles, Baneanes, & Arabes qui eam emunt. Nam diuidunt in caput, in pectus, in crura & pedes. Eius quæ ex capite est libra vanit Pardan octoginta. (Est autem Pardan monetæ aureæ apud Indos genus, quod cō ficit decem regales Castellanos.) Quæ ex pectore, aureis viginti: quæ ex cruribus, duodecim: quæ ex pedibus, quatuor, aut summum quinque. Nonnulli curiosiores quatuor instrumenta cuprea sumunt, inæqualibus foraminibus pertusa, per quæ Caphurā transmittunt. Ea quæ per instrumentum maiora foramina continens transmittitur, suum habet pretium, quæ per instrumentum mediocrium foraminum, aliud: sic de cæteris intellige. Multa nascitur Caphura in Burneo, Samatra & Pacen. Quæ ex Burneo adfertur, plerumq; admixta habet lapidum fragmenta, aut gummi quoddā Chonidretos illis vocatum, Succino crudo persimile, aut ligni cuiusdā scobem. Sed maleficio deprehenditur facile, nullamq; aliam adulterationē nouit Garcias. Nam si interdum rubentibus, aut nigricantibus maculis conspersa videatur, id ex sordidarum & impuratum manuum contrectatione, aut ex madore contrahi affirmat. Sed facile à Baneanibus id vitium emendatur. Nam in paño lineo colligatam, in calidam aquam clam demittunt, additis saponē & Limonium succo: deinde probè elorant in vmbra siccant, sic multò candidior redditur, pondere non multum imminuto. Id ab amico Baneane fieri vidit Garcias, qui & hoc arcanū docuit. A viris fide dignis sibi relatum fuisse idem Garcias narrat, Caphurā arborem Nuci iuglādi similem esse, foliis tamen candicātibz, Salignis similibz, fructum & florem haudquaquam se vidisse, fieri tamen posse vt vtrumque ferat. Illud autem certò se scire, materiem esse cinerei coloris, Faginæ ferè similem, interdum nigriorem, nec eam quidem leuem, aut fungosā, vt ait Auicenna (nisi fortè caducā, aut emortuā viderit) sed mediocriter solidam. Addūt pleriq; vastā & præaltā esse arborem, latissimè sese fundētem, aspectu perpulchrā. Fabulosum est quod ad eius vmbra omne animaliiū genus cōfugere aiunt, vt ferociora animalia deuient: item quod scribit Serapio largioris huius prouētus augurium esse, cum frequētibz fulgetris cælū coruscat, aut crebro tonitru cōstrepit. Nam cū Samatra insula (quā nonnulli Taprobanā putāt) & circūiacentia loca lineæ Æquinoctiali vicina sint, multis tonitribus subiecta sint necesse est, eamq; ob causā singulis diebus imbres, aut leues pluuias habēt. Quare singulis annis Caphura abundare debebant. Ex quibus perspicuum est tonitru largioris Caphuræ prouentus causā, aut indicium non esse.

Genera.

Locus.

Forma.

esse. Nonnullis Caphura ex China composita videtur ex eius parte quæ ex Burneo adfertur. Affirmarunt præterea Garcie panes illos orbiculares qui ex China deferuntur compositos esse, quoniam Caphura de Burneo in Chinam deferuntur, incolis expetita, ut eam alteri viliori permisceant. Cui opinioni suffragantur Baneanes de Cambaya, qui pro arcano dicunt deficiente Caphura de Burneo, solere se eius exiguam quantitatem cum multa Chinenſi commiscere, eamque falsò de Burneo nuncupare. Addunt item isti Baneanes Chinenſem Caphuram compositum esse medicamentum, quod tempore euaporet & corrumpatur, Caphura verò de Burneo minimè. Garcie verò compositum medicamentum non videtur, nisi ex duobus Caphuræ generibus constare dicamus. Quod Ruellius & Matthiolus Lib. II. c. 26. Serapionem secuti tradunt Caphuram cæteris bonitate præstare quæ à Rege Riach, qui primus eius dealbandæ rationem adinuenit, Riachina dicta est, vix credit Garcias, quia Indiæ Reges potentiores sunt, quàm ut huiusmodi mangonio operam dare velint. Rhafis Caphuram frigidam & humidam esse, Auicenna & Serapio, quos plerique sequuntur, frigidam & siccam ordine tertio constituunt. *Temper. & Vires.* Cùm tamen in aquam coniecta flagret, cùm sit odorata & tenuium partium, calida videtur ac incidens. In qua etiam sententia se aliquando fuisse ait Garcias, Sed cùm experimento didicisset, ophthalmiis & oculorum inflammationibus, atque etiam ambustis impositam non minùs quàm niuem refrigerare, sententiam retractare coactus est. Adde quòd omnes apud quos nascitur frigidam esse asserunt. Neque verò huic sententiæ repugnat, quòd odorata sit, quia ob tenuitatem partium facîle exhalat odor qui in superficie est. Potest & interdum factitia esse quæ ad nos adfertur, arte & mangonio caliditatem aliquam acquirens. Genuina autem capitis dolores à calore prouenientes illita mulcet, incandescentes inflammationes restinguit, præsertim iocinoris. Circumlitionibus imponitur ad cutis nitorem conciliandum, & ad arcendas vulnere & vlcere inflammationes, erysipelata extinguit, aduersus gonorrhœam & albas vuluæ fluxiones efficax est, cum Succino & aqua Nymphææ hausta. Idem præstat pubi, testibus & renibus illita, priùs seminis Psyllij spissamēto, vel Omphacio, vel Solani succo probè macerata. Sanguinem è naribus fluentem sistit, aut cum semine Vrticæ immixta, aut cum maioris Sedi & Plantaginis succo fronti circumlita. Collyriis ad calidas oculorum lippitudines vtiliter imponitur. Renibus ac testibus illita venerem extinguit. Scribit Auicenna Caphuram vigilias excitare. Qui autem id fieri potest cùm frigida sit ipsius etiam testimonio, & frigida somnum accersant? Somnum certè inducere ait Garcias, foris & intus exigua quantitate vsurpatam. Si quis verò sæpius odoretur, & naribus admoueat, cerebrum exsiccet & vigilias inducere potest. Magni est vsus his in regionibus in quibus nascitur multis in rebus, tum etiam in cibis. Legitimæ probationem hanc esse ait Ruellius. In calido pane ponatur, si humore madeat, sinceræ est argumētum, contrà si perarescat indita, spuria ac fictitia certitudo est. Nisi diligenter asseruatur in operculatis etiam capsulis nonnunquam euanescit. Tutò asseruatur in vase marmoreo aut alabastrino, Lini & Psyllij semine sepulta. Venetias Caphuram omnem rudem important, ibique arte, igne scilicet & vitreis organis elaboratur, ut candescat atque pelluceat.

IN Florida Noui orbis prouinci a Galli paucos ante annos ligni cuiusdam facultates admirabiles aduersus varios morbos experti fuerant, quas ab eius regionis incolis didicerant. Hos cum profigassent Hispani, & in similes morbos incidissent, ob prauī succi alimenta, aquarum insalubrium potationes, sub dio dormitiones, à quibusdam qui illic remanserant Gallis illius ligni virtutes edocti, eo vsi sunt, & sanitati restituti. Ob id recens in Hispaniam inuehitur, de quo Nicolaus Monard. hæc ferè tradit. Arbor hæc ab Indis *Panama* nominatur, à Gallis, quos imitati sunt Hispani, nescio quam ob causam

Nomina
Forma.

SASSAFRAS arbor,
Monard.



Sassafras. Arbor est magna, Pini mediocris magnitudine & forma (tamen si minores inueniantur) vnico trunco nudo: ramis in cacumine expansis, quales habet Pinus repurgata: cortice, quem integit cinerea quædam pellis ex cinereo nigricante, gustu aliquantulum acrised aromatico, nonnihil ad scæniculi saporem accedente, odorato, ita vt paruæ eius quantitas cubiculum suo odore compleat: materie trunci & ramorum alba, ad cinereum colorem vergente, non ad eodè aromatici saporis & odoris vti cortex: folio ficulneo, in tres angulos desinente, nouello verò folio Pyri folium æmulante, sed quod vestigia angulorum habeat, semper virente, hoc est, nouellis foliis semper iis quæ decidunt succedentibus, colore viridi obscuriore, odorato, præsertim si siccum sit. An florem habeat, adhuc incertum. Radicibus nititur nunc crassis, nunc tenuibus pro arboris magnitudine, læuibus, sed non ad eodè vt lignum, per summa cespitum vagantibus, vt facillè euelli possint, quod ferè commune est omnibus arboribus Indicis (imò referunt Hispanicarum arbores

eò translatas steriles fieri nisi in summa terra pangantur.) Cortex radici firmus inhæret cinereus, ipsiusq; arboris cortice magis aromaticus, ideòque radicis decoctum odoratius & præstantius est, & ab Hispanis istic vsurpatur. Nascitur in maritimis, & locis temperatis, hoc est, neque nimium siccis, neq; nimium humidis, vt in portubus S. Helenæ, & S. Matthæi: nam alibi per vniuersam Floridâ haud facillè inuenias. Istic verò sunt integræ siluæ, quæ ob suauissimum quæ spirant odorem, ab Hispanis eò primùm venientibus, arborum Canellæ esse existimabatur, nec immeritò: nam ad eodè odoratus est & actis huius arboris, atq; Canellæ cortex, & eosdem effectus præbet, quos Canellæ decoctum. Omnium optima est radix, deinde rami, tertio truncus, sed cortex omnibus præfertur. Arboris & ramorum temperamentum calidum & siccum est in secundo gradu, cortex aliquantò calidior, ad initium tertij gradus in calore & siccitate accedens. Quibusdam calidus videtur in fine primi gradus, siccus in tertio. Eius decoctum commendatur in omni morborum genere, præsertim verò in obstructionibus, & partibus internis roborandis ad tertianas febres & antiquas. Commodè ex saccharo propinatur defluxione laborantibus, asthmate, pectoris vitiiis ex frigidityte ortis, doloribus nephriticis & renum, è quibus calculos eiicit, & flatu discutit: quam etiam ob causam

Electio.

Temper.

Vires.

sum vterum ad conceptionem pręparat, & menses ciet. Vomitus inhibet, concoctionem iuuat, aluūque subducit. Decocti verò pręparandi hæc est ratio. Radicis cum suo cortice assulatim confractę vncia dimidia in tribus aquę sextariis, fictili nouo duodecim horas maceratur, lento igne ad duorum sextariorum consumptionem decoquitur, colatur, & fictili vitrato asseruatur. Postmodum iisdem fragmentis tātundem aquę superinfunditur, decoquitur ad dimidij sextarij consumptionem. Illud verò obseruandum est plus aut minus ligni in decoctionem iniiciendum pro morbi magnitudine, viribus & temperamento ægrorum: minori enim quantitate & minus cocta propinatur decocti aqua biliosis quàm pituitosis. Sed frequentius & vulgò quarta sextarij pars decocti prioris tepidi sumitur manē: deinde sudatur, vestis mutatur, nec quisquam eorū qui medicamentum hoc sumpsere lecto se continere cogitur. Prandium sit media gallina assa cum aliquot vuis passis & amygdalis. Cœna sit ē conseruis conuenientibus morbo qui curatur: potus secundū decoctum. Hoc sic propinatum asserit Nicolaus Monard. se singulari experimento compertum habuisse, vtilissimum iis esse qui pedes & manus ex podagra & chiragra sic contortos habent, vt iis vti non possint. Ad luem item veneream non minus vtile quàm Guayaci aut Chinę decoctum. Qui tam exquisita victus ratione vti nollent, aquā simplicem hac ratione decoquunt. Ligni assulatim confracti semuncia plus aut minus pro conditionibus iam enumeratis, in tribus aquę sextariis coquitur ad dimidias, ea aqua diu vtendum cum in prandio, tum in cœna, & interdiu. Qui vino abstinerere non norunt, eadem aqua id diluant: etenim saporis & odoris gratiam vino conciliabit. Ligni huius fragrantiam assidue gestare & odorari maximè prodest aduersus pēstis contagia, non neglectis aliis remediis. Denique ob ingentem siccitatem & moderatum calorem, remedium est excellens ad omnis generis defluxiones, quoniam eas absorbit. Sed iis qui extenuati sunt & imbecilles non conuenit. Eiusdem fragmentum præmansum eo dente qui dolet, & istuc retentum, dolorem sedat. Porro supradictus ligni & corticis vsus in medicinis duntaxat receptus sit, Indi tamen recentia folia trita vulneribus imponū, & sicca ad alios vsus medicos seruant.

MOLLE, Arbor.



MOLLE. CAP. XXI.



ARBORIS in Peru nascentis, quam vocant Molle, plantas duas ē semine natas vidit Clusius ante aliquot annos Mechliniæ, quarum historiā hanc tradit. Erant, inquit, ex arbusculæ trunco (quia tenellæ) ex viridi nigricante, multis consperso veluti maculis cinereis, foliis pēnatis vt Fraxini, sed multo minoribus, ex viridi nigricantibus, serratis, & sub extremum angustioribus, ab arbusculis reuulsa lacteo succo, eoque lento & viscido & odorato manabant, & ipsa folia trita Fœniculi odorem reddebant, gustata adstringentis facultatis non nihil habere videbantur. Fructus ex quo nata sunt, Piperis ferè est magnitudine, oleaginosus, pellicula rubescēte tectus, racematim coharens, vt ex eius icone hīc expressa perspicere licet.

Forma.

Quem

Locum.

Quem florem habeat adhuc incertum, nisi quòd tradunt quidam minutum esse, Viti similem. Hæc arbor copiosè nascitur in conuallibus & locis planis Peruanae regionis, vt referunt omnes qui Occidentalium Indiarum descriptionem dederunt, sed Petrus Cieca maximè, qui eius historiam hoc modo exponit prima parte Chronici. Toto hoc tractu conspiciuntur magnæ, quædam etiam parvæ arbores, quas *Molle* appellant incolæ. Folia habent minuta, odore Fœniculi, cortice adeò commendato, vt eius decocto crurum dolores & inflammationes summa cum utilitate foueantur. Ex ramulis fiunt dentiscalpia utilissima. Ex eius fructu cum aqua cocto pro cocturæ modo fit vinum, siue potio admodum bona, aut aceturum aut mel: tantòque in pretio sunt apud Indos hæ arbores, vt quibusdam locis eas consecratas suis idolis habeant. Addunt nonnulli eius arboris foliorum decoctum, doloribus ex frigida causa ortis auxilio esse, gummi verò eius, quod mumia modo candidum est, lacte dissolutum oculorum caliginem abstergere.

LIGNVM AROMATICVM, LIGNVM

ad Nephritidem.

CAP. XXII.



CREBIT Nicolaus Monard. ligni cuiusdam fragmentum sibi à Bernardino de Burgo pharmacopola fuisse ostensum, Ligno sancto ferè simile, cuius corticis sapor & odor adeò aromaticus est & excellens, vt Nucem myristicam longè superet, imò Canellam odoris suauitate, Piper acrimonia. Magna huius ligni quantitas in monte quodam cæsa fuerat & in nauim delata ignis struendi gratia. Vnde perspicere licet quàm multæ arbores & aliæ plantæ in Indiis inueniantur insigni facultate præditæ, cum ignis accendendi causa tam odoratis & aromaticis lignis vtantur, quorum cortice in puluerem redacto cor & ventriculus roborari, reliquæque membra foueri possint, & aromatum ex Moluccis insulis, Arabiæque & Perside vsque petitorum vires supplere. Mittit etiam noua Hispania aliud quoddam ligni genus crassum & enode, materia Pyri, cuius vsus iam diu receptus fuit in his regionibus ad renū vitia, vrinæ difficultates & incommoda. Postea experimento compertum est eius aquam in iecoris aut lienis obstructionibus vilem esse. Fit autem hoc modo. Lignum assulatim & minutim concisum in optima & limpidissima fontana aqua maceratur, atque in ea relinquitur, donec aqua à bibentibus absumpta sit. Dimidia hora post iniectum lignum aqua cæruleum dilutiorem colorem contrahit, qui sensim intenditur pro temporis diuturnitate, tametsi lignum candidum sit. Id adulteratur ligno illi simili, quod aqua croceo colore inficit. Hac aqua qui assidue vtuntur, ea vinum diluunt, & mirabiles experiuntur effectus sine vlla humorum commotione, neque alia opus est victus ratione quàm temperata: aquæ enim sapor non magis immutatur ligni iniectione quàm si pura esset, & nihil in ea maceratum. Calidum & siccum est in primo gradu.

FRVCTVS ET CORTEX AD

Dysenteriam.

CAP. XXIII.



ARRAT item Nicolaus Monard. ab adolescente quodam Hispano delatum ex Quito prouincia fructum, qui vt ex eius fragmentis (quæ altera parte læuia erant, & lutei coloris, altera aspera & admodum rubra, seu ex rubro nigricantia) conicere licebat, ex magna quadam arbore natus videbatur. Is ad dysenteriam mirum in modum confert. Quod experimento comprobatum vidit in puella quæ dysenteria miserè torquebatur, cui

cui adolefcens ille fructus tenuiffimè tritorum puluerem ex ftillatitio calicū rofarum liquore hauriendum dedit vefpere, tantundem pofttridie manè, ftatimq; fifti cœpit fluxus, ita vt breuī puella fanitati reftituta fit. Quis autem efferet hic fructus, aut ex qua arbore nafceretur Nicol. Monard. fcire non potuit. Idem refert in Nouo orbe prægrandem arborem foliis cordis effigie, nullo fructu prouenire. Eius corticem digiti craffitudine, aut ampliozem, folidum, durum & ponderofum tenui, candicante pellicula contegi. Is fimilis admodum eft cortici Guayaci, vti Gentiana amarus, adftictionis, & grati feu aromatici cuiufdam faporis particeps. Magno eft apud Indos in pretio, vt qui eo vtantur aduerfus omnis generis alui profluvia, eius puluerem drachmæ pondere, aut paulò amplius manè propinantes ex aqua conueniente, aut vino craffo & rubro. Ter aut quater id remedium reperitur, obferuatūque in reliquis victus ratio, quæ eiuſmodi morbo neceſſaria eft. Eius corticis fragmenti periculum iam bis feciſſe affirmat in alui profluuio inueteratis, magno ſucceſſu.

FRUCTVS CHOLAGOGVS, AVELLANAE,


¶ Nuclei pinci cathartici.

CAP. XXIIII.

FRUCTVS quidam ex maritimis Nicaragua & Nata (quæ ſunt in Noui orbis continenti) inuehitur in Hiſpaniam auctore Nicolao Monard. qui ex quadam vaſta arbore naſcitur, Caſtanæ ſimilis, ſed calice læui, non vt illarum echinato. Eo calice fructus continetur Caſtaneis non multum abſimilis, ſed ſine cortice, & ſerè quadratus, in duas partes diuiſus, medium intercurſante, & totum deinde ambiente pellicula. Editur hic fructus viridis, aut contuſus vino exceptus, ſi ſiccus, eius puluis ex vino aut gallinæ iuſculo ſumitur: datur etiam toſtus vt minus purget. Quocunq; tandem modo ſumptus ſine moleſtia purgat, obſeruatis iis quæ à purgandis obſeruari ſolent, & præparatis humoribus. Illud verò minimè ſilentio prætereundum, pelliculam illam exteriorem & internam abiciendam eſſe, alioqui grauiſa ſymptomata excitaturam, veluti magnos vomitus, animi deliquia, & periculofa profluvia. Calidus eſt in primo gradu. Narrat idem Nicol. Monard. Nouo orbe primum inuento inſulam

AVELLANAE

purgatrices.



D. Dominici quoddam Auellanarum genus mittere, quo ſe Indi familiariter purgabant: poſtea Hiſpanos neceſſitate compulſos iſdem ſeſe purgare cœpiſſe, non ſine vitæ discrimine. Colore & forma noſtris Auellanis ſimiles ſunt, putamine tenui, coloris ſpadicei, triangulares, medulla interiore alba & dulci, ſic vt multi dulcedine allecti decepti fuerint. Medicorū vulgus eas Ben magnū vocat, paruum autem quod Ciceris eſt magnitudine, ex quo Itali oleum odoratū conficiunt, quod Oleum

de Ben nuncupant. Validiſſimè pituitam & bilem ſupernè & infernè purgant. Nonnulli tamen eorum vehementiam aſtatione infringebāt. Coli doloribus præſens ſunt remedium, ſtatus diſcutiunt, & enematibus iniectæ mediocriter euacuāt. Doſis eſt à dimidia drachma ad drachmam vnam: ſed aſſandæ ſunt. Calidi ſunt temperamenti initio tertij gradus, & ſicci in ſecundo. Auellanas has ſe vidiſſe ait Cluſius. Cæterum hanc, cuius iconem hic exhibemus ex Cluſio, lentus & mollis integit cortex, partim ex cinereo candicans, partim nigricans: hunc ſequitur putamen minus ſolidum quàm in vulgaribus Auellanis, id nucleum continet Auellanae magnitudine, candidum, ſolidum, Auellanae vulgaris aut iligna glandis ſapore,

Vires &
Temper.

Pinci nucleici cathartici.

Forma.
Vires.

Temper.

pore, tenui membrana obductum. Integra nux altera parte sessilis est & coniunctim binæ nasci videntur, vt interdum castanæ. Transmittit etiam noua Hispania, vt idem Nicolaus refert, Pineorum nucleorum genus, quo Indi se purgant, quos imitati sunt plurimi Hispani. Nostris Pincis nucleis similes sunt, nascentes in strobilis magnis, quales sunt Mayzi spicæ muticæ, molliori putamine, & nigriore quàm nostri, rotundi, intus albi, pingues, & gustu dulces. Bilem, pituitam & aquas valenter admodum purgant, & licet auellanis mitiores, attamen vomitum cient, atque ventrem subducunt. Assi neque tam valenter, neque cum tantis torminibus purgant. Peculiari quadam facultate crassos humores expellunt. Quinque aut sex triti & vino diluti dantur pro virium robore, euacuando humore conuenientibus syrupis præparato, & recta victus ratione obseruata. Calidi in tertio, & sicci in secundo, pinguedine tamen quadam præditi quæ siccitatem imminuit.

RICINVS AMERICVS. CAP. XXV.

Forma.



RICINI genus ex America delatum pinxit Clusius, nostrate paulò maius, cuius siliqua triângula quæ semina continet tuberculis asperis caret, læuisque est & cinerei coloris. Ipsum semen nostrati simile, nigrum tamen & non maculosum, Curcas ab incolis nuncupatum.

Vires.

RICINVS Americus.



Arbor quoque nostrati similis, nisi ob soli vbertatem in maiorem altitudinem ex cresceret. Semen tanta purgandi facultate præditum esse referebat qui Clusio dabat, vt dimidia tantum grani vnus pars sumpta valenter supernè & infernè humores pellat. Ex eodem oleum elici tradit Nicolaus Monard. quod Oleum ficus inferorum Hispani vocant, quia Ricinus Hispanis *Figueira de l'Inferno*, id est, Ficus inferorum nominatur. Semine trito & in aqua decocto innatans oleum cochleari colligitur, qui solus modus olei parandi Americis notus est, alios non didicerunt. Duros tumores mollit, discutit. Sanat dolores à frigidis humoribus & flatibus exortos, præsertim ventris: ac ideò Anasarcam & Tympanitem curat inuncto ventre, aut tribus vel quatuor guttis sumptum ex vino, aut infuso mixtum. Aquas enim ducit, flatu discutit, pituitam crassam purgat. Doloribus colicis & ilei medetur sumptum, illitum, iniectum clystere. Articulorum morbis à causâ non admodum calida natis auxiliatur. Contractos artus molliter distendit. Aurium doloribus confert. Infantium aluû subducit, pube inuncta: lumbricos necat ac eiicit, maximè si eius vna aut altera gutta è lacte aut iure propinetur. Ad pforas & capitis vlcera manantia valet. Calidum est initio tertij gradus, humidum secundo.

LAC PINIPINICHI. CAP. XXVI.

Vires.



Temper.

IN omnibus continentis oris Noui orbis, vt refert Nicolaus Monard. lacteus quidam succus elicitur ex arbuscula Mali similitudine, quem Indi Pinipinichi vocant: ex cuius ramis recisis lacteus is humor statim manat, aliquatulum densus & viscosus, cuius tres aut quatuor guttæ sumptæ validissimè per aluum purgant bilem & aquas. Bibitur è vino, aut eius desiccati puluis deglutitur pauca quantitate propter nimiam vehementiam. Illud autem peculiare habet, quòd si quis eo sumpto, iusculum, vinum, aut aliud quid iniiciat, subitò eius facultas infringitur & cessat. Calidus & siccus est is liquor in secundo gradu.

COPAL,

DVo resinarum genera multum similia, teste etiam Nicolao Monard. ex Hispania noua afferuntur, quorum vnum Copal vocatur, alterum Anime. Copal resina est admodum candida, splendida, pellucida, magnis offis, Citri conditi & clari similibus, mediocriter suavis. Eam Americi in sacrificiis thuris vice adolebant. Vtilis est ad suffitus in frigidis capitis morbis. Calida ordine secundo, humida primo. Discutit ac emollit. Gomara in Mexicana Historia duo Copalis genera facit. Vnum rugosum, quod Xolochcolpasi vocari dixit, molle, thuri simile. Alterum multum praestantius Copalcahuuel, quod plerique Myrrham existimarunt. Vulnerata arbore guttatim stillat liquor albus, qui statim concreuit. Anime arboris praegrandis est resina candida, ad thuris colorem nonnihil vergens, magis oleosa quam Copal, granis siue guttis thuri similibus, grandioribus, quae fracta luteum colorem ostendunt resinae modo, & iucundissimum odorem spirant, & accensa facile liquefunt ac consumuntur. Est alia Anime resina orientalis, auctore Garcia, quam Lusitani ex Aethiopia Arabiae finitima in Europam deferunt. Candidior est & nitidior occidentali, magnis item offis adfertur; pellucidis, ita ut nonnulli Carabe seu Succini speciem esse suspicati sint, e quo sphaerulae precatoriae tornantur. Sed ij vehementer errant. Garcias hanc resinam orientalem, Cancamum Graecorum esse putat. Qua in re Amati Lusitani sententiam secutus videtur in commentariis in Dioscoridem capite de Cancamo, sic scribentis. Est igitur Cancamum gummi quoddam, quod ex Guinea, Mina, Africae, & insulis illi circumiacentibus Lusitani nostri adferunt, Aniimum appellantes: decedit enim gummi hoc, ut testantur illi, ex proceris arboribus, folia Myrti habentibus, quod album reperitur, & aliud subnigrum Myrrhae quodammodo persimile, odoratum, quod Dioscorides illis de causis inter Myrrhae species tanquam improbam commemorat, & Minxam a terra, vnde praecipue nascitur, eam appellat: quanquam Serapio Aminxam nominet, vnde Lusitani corrupta voce pro Minxa vel Aminxa Aniimum vocent, & eo mulieres maxime in suffitibus, & Medici contra dolores a frigiditate ortos praecipue vtuntur. Id vero primus asseruit Brisfortus Gallus, vir magna eruditione praeditus, qui quum apud Lusitanos ageret, ut inde ad Indos cognoscendarum rerum nouarum cupidus nauigaret, gummi hoc vidit, quod Cancamum esse dixit. Quare cum Cancamo opus fuerit, Lusitanorum Aniimum vtetur. Idem Amatus capite de Myrrha, Myrrha vero Minxa vel Aminxa dicta, inquit, hodie quoque in Lusitania, & vniuersa Hispania paucis mutatis literis habetur, ut capite de Cancamo diximus, gummi scilicet Aniimum appellantes: cuius duo genera habentur, album & nigrum, album Cancamum esse ex Brisfotto didicimus, nigrum vero, Minxa haec Dioscoridis Myrrha est, quae ex proceris arboribus decedit, nullo cogente artifice, aut vulnere in arbore facto. Clusius gummi illius quod Anime vocant, & Lusitanorum nauigationibus in Europam adfertur, tria inueniri genera scribit. Primum fuluescit, & pellucidum est, nobiliusque illud succinum crudum aemulatur. Hoc Cancamum esse Amatus a Brisfotto Gallo edoctus contendit. Alterum genus nigricat, & fere taurino glutini simile est, siue illi resinae quam Officina Colophonia vocant. Id Amatus Myrrham Aminxam Dioscoridis esse vult. Tertium genus pallidum est, & resinaceum retorridumque. Omnia vero iucundum in suffitibus odorem spirant, idemque videtur temperamentum sortita. Posteriora duo degustata magis siccare & amarescere deprehenduntur. Haec Clusius. Sunt qui Anime verum Bdelium esse putant, ob multas quas habet cum Bdelij historia notas communes, de quibus suo loco diximus. Anime Americum siue nouae Hispaniae colligitur, auctore Nicolao

Vires.

Temper.

Genera.

Lib. I. Aro.
mat. Ind.
cap. 8.In schol. in
lib. I. Aro.
Ind. Hist.
ria.

Monard. ex arboribus mediocris altitudinis vulneratis, non aliter quàm thus ac mastiche. Valet ad suffitus in dolore capitis à frigido, & defluxionibus post purgationes: aëris vitia corrigit, suffitu caput roborat. Miscetur emplastris & ceratis, quæ frigidos humores & flatus discutiunt, ac roborant: imponitur capiti & cerebro inualidis, item neruosis partibus. Idem temperamentum quod & Copal. Hoc Ani me occidentale Aminæam Myrrham esse putat Hermolaus.

TACAMAHACA. CAP. XXVIII.

Forma.

Vires.

Temper.

DEERTVR item ex noua Hispania, vt scribit Nicolaus Monard. aliud gummi siue resinæ genus, ab incolis *Tacamahaca* vocatum, quod nomen Hispani retinuerunt. Resina est proceræ arboris Populi similis, quæ fructum gerit similem Pæoniæ grânis. Elicitur arbore lauciata. Colore est Galbani (nec desunt qui idem esse putant) frustulis tamen quibusdam albis vt in ammoniaco, odoris saporisque ingrati. Suffitu vtero strangulatas mulieres reuocat: vmbilico imposita vterum ad suam sedem redire cogit, ventriculum roborat. Ad hos vsus totam ferè mulieres absumunt. Illita sic adhære scit, vt non nisi euanida cùm effectum suum præstiterit excidat. Coquit & discutit mirificè ægritudines ex flatu & succis frigidis natos. Fluxiones sistit: neruorū vulneribus medetur. Denique ad quosuis sedandos dolores nullum aliud præsentius remedium, si ab inflammationibus admodum calidis non oriantur. Sed & iis admodum utilis est in morbi declinatione, ad discutiendum qui superest humorem. Calfacit in principio tertij gradus, siccat secundo. Præterea vim satis adstringentem obtinet.

CARAGNA. CAP. XXIX.

Forma.

Vires.

Temper.

EX continentis parte interiore, per Carthaginem & Nomen Dei Americæ provincias deferri scripsit Nicolaus Monard. resinam coloris Tacamahaca, odorisque eiusdem, sed grauioris. Est & liquidior, glutinosior, splendidior, magis oleosa. Lingua Indica *Caragna* vocatur, quod nomen etiam Hispani adhuc seruant. Prodest ad omnia ad quæ Tacamahaca, sed effectū celeriore & certiore. Temperamenti est calidioris. Vulnerata arbore colligitur superiorum modo. Ex eadem Carthagine Noui orbis prouincia allatam fuisse ait Caragnam quandam puriorem, & Balsami modo limpīdam, superiore multò præstantiorem, vtiliorem & odoratiorem.

LIQVIDAMBAR, ET EIVS

Oleum. CAP. XXX.

Forma.

Vires.

RESINAM odoratam Liquidambar ad nos ex Hispania noua adferri referunt Nicolaus Monard. & Historiæ Mexicanæ auctor. Manat ex incisa vasta arbore, quam Americi vocant *Ocoçol*. Huic folium est hederæ, cortex crassus, cinereus, quo secto aut ex cauato Liquidambar hnt. Indigenæ huic corticem contractum admiscunt, quoniam ita suauiore odorem mittit dum vritur. Odor styracis, qui cælari non potest, præsertim vbi magna est Liquidambaræ copia, quoniam in ædes ac vias propinquas latissimè diffinitur. Ex ea resina recenti ac pingui in humido loco reposita stillat sponte Oleum pretiosissimum ob maximam odoris iucunditatem. Quidam machinis exprimūt, vt manicis inficiendis vnguentariis vendant. Sed id bonitate ac pretio longè inferius est. Vt præstantissima quæque fraude hominum adulterantur & interpellantur: quidam quæstus causa ex ramis arborum concisis, & in aqua feruefactis Liquidambar innotantem colligunt, altera longè deteriore. Liquidambar

dambat frigidis omnibus morbis opitulatur. Eadem vis & olei sui, sed cum maiore partium tenuitate. Calfacit propemodum tertio gradu. *Temper.*

GVMMI AD PODAGRAM, SVLPHV R

Quitense. CAP. XXXI.



EFERT Nicolaus Monard. se ab Episcopo Carthaginensi dono accepisse gummi genus quoddam (cuius arborem describere non poterat) ex cōtinenti Noui orbis delatum, quo se illic podagrici purgant hoc modo. Istius gummi fragmentum Nucis Ponticæ magnitudine *Vires.* stillaritio aquæ liquore totam noctem macerant, postridiè manè percolant & exprimunt, eam aquam ad duas vncias hauriunt, neque quicquam cibi sumunt ante meridiem. Eo medicamento purgatur humor qui podagram creat sine molestia. Inspidum est & inodorum. Calidum videtur in primo gradu. Mittit Quito prouincia Peruana Sulphur viuum præstantissimum, vitri modo pellucidum, colore auri purissimi, cuius fragmentum pusillum lucernæ admotum odorem maximum sulphuris eiacular, fumo viridi permixtum, sed antequàm incendatur nullum sulphuris odorem præbet. Huius puluis vino dissolutus, & per aliquot dies vespere faciei illitus (purgato prius corpore) inflammationes curat, scabiem delet oleo rosaceo mixtus. Drachmæ pondere cum oui luteo sumptus, coli doloribus, nephritidi, neruorumque contractionibus & ictero utilis est. Calidum & siccum esse hoc sulphur summo excessu ait Nicolaus Monard. Quare mirum non sine causa videatur eo inflammationes curari. Ex Nicaragna aliud sulphuris genus aduehi idem scribit, colore cinereo, densum, minimè transparens, nihilque cum alio commune habens præter odorem.

RESINA ABIEGNA INDICA.

Resina Carthaginiensis. CAP. XXXII.



X NOVI orbis continenti etiam asportari tradit Nicolaus Monard. liquorem siue resinam, quàm abiegnam vocant, ex arboribus spuris quæ neque Pinus, neque Cupressi dici possunt, sed Pino altiores sunt, & Cupressi modo rectæ. In harum arborum cacumine vesiculæ quædam enascuntur nunc magnæ, nunc parvæ, quibus contractis guttatim stillat liquor admirandus, quem Indi diligenter conchis excipiunt, sed tanto labore & molestia ut multi exiguam admodum quantitatem singulis diebus cogant. Ad eadem omnia, ad quæ Balsamo vtuntur: nam vulnera optime curat, dolores ex materia frigida & flatulenta progenitos mitigat. Item utilis est stomachi vitiis ab humore frigido aut flatibus sumpta ex modico vino albo, ut in Balsamo dictum est. Idem Nicolaus Monard. auctor est, nunc etiam mitti à Carthagine Noui orbis prouincia, resinam quandam purissimam & odoratissimam, abiegna aut Terebinthina Veneta multo præstantiorem, iisdem facultatibus seu maioribus præditam quàm sit selectissima Terebinthina. Experientia docuit vtiliter iniici neruorum, articulorum pedumque vulneribus, & antiquis vlceribus: magno etiam commodo ea elota & præparata matronæ sibi faciem oblinunt. *Vires.*

Lib. 2. Am.
Indic. hi-
stor. cap. 24.



CRIBIT Garcias Mungo semen esse viride, quod per maturitatem fit nigrum, Coriandri sicci magnitudine, pabulum equorum, interdum etiam hominum. Guzarate & Decan incolæ in febribus hoc modo vtuntur. Febricitans decem, nonnunquam quindecim dies cibo abstinet, post quos huius fructus decoctum illi propinatur, in quo nonnihil pulpæ remanserit: deinde cortice delibratum Mungo, & Orizæ modo coctum febricitanti exhibent: panem verò triticeum non nisi post multos dies: non quòd frumento careant hæ prouinciæ, nam etiam si non stercorentur & colantur agri, sed superficie tenus duntaxat arentur, natiua sua pinguedine & vbertate etiam interdum sine pluuia frumentum mense Nouembri sibi creditum, medio Ianuario maturum & colligendum exhibent. Nasci etiam ferunt hoc Mungo in

Li. 1. c. 488.

Palæstina, eiusque Auicennam meminisse, & vocasse Messe, Bellunensem interpretem, Mens. In nostris tamen publicis exemplaribus legimus Meisse, (& Pifa interpretantur) & in margine Mes. Mex autem debere dici ab eruditis Medicis Arabibus se didicisse ait Garcias. Alio in loco putat Auicennam eius mentionem fecisse, vbi prohibet auiculas cum Mex edi: in nostris tamen libris non Mex, sed Mest ex aratum est. Et Serapio, Mes, inquit, id est, Robiliæ est granum paruum sicut Orobis magna, viridis coloris &c. Caterùm Mungo à Garcia descripto optimè conuenit fructus à Clusio depictus & hîc expressus, nisi calidus esset, Mungo verò frigidus, quantû ex eius effectu colligere licet. Is fructus omis-

Lib. 1. fen.
3. cap. 7.

Cap. 116.
simpl.

sus à Valerando Duræo, inquit Clusius, ex Ormuz, exigui Piperis magnitudine, rotundus, striatus, qui Coriandri grana ita æmulatur, vt primò intuentibus Coriandrum videatur, maius tamen & nigrum: membrana superior

*MVNGO similis
fructus.*



granum continet nigricans calidi gustus. Præterea ex eodem Clusio pusilli cuiusdam fructus ab Alphonso Pautio Medico Ferrariensi missi iconem hîc exhibemus, quem Buna à nonnullis, ab aliis Elicano nominari tradit. Est igitur Buna Fagaræ magnitudine, aut paulò amplior, oblongior plerumque, colore ex cinereo nigricante, cortice tenui, & veluti sulcum quandam per longitudinem vtrinque habente, per quem facile in duas æquales partes diuiditur, quæ singula grana continent oblonga, altera parte plana, fuluescentia, gustu acido. Aiunt in Alexandria potionem quandam fieri ex iis, vim refrigerandi non mediocrem obtinentem.

BUNA.



gratum continet nigricans calidi gustus. Præterea ex eodem Clusio pusilli cuiusdam fructus ab Alphonso Pautio Medico Ferrariensi missi iconem hîc exhibemus, quem Buna à nonnullis, ab aliis Elicano nominari tradit. Est igitur Buna Fagaræ magnitudine, aut paulò amplior, oblongior plerumque, colore ex cinereo nigricante, cortice tenui, & veluti sulcum quandam per longitudinem vtrinque habente, per quem facile in duas æquales partes diuiditur, quæ singula grana continent oblonga, altera parte plana, fuluescentia, gustu acido. Aiunt in Alexandria potionem quandam fieri ex iis, vim refrigerandi non mediocrem obtinentem.

TUNA




VAE ex Indiis occidentalibus aduecta est tam planta hîc appicta, quàm fructus, Tune Indis vocatur & Tunas. In maris Peruani insulis, Hispaniola, & aliis, mirabile folium istud spinosum ruri ac sponte oritur, vnico folio, humi ad medium vsque defosso, productis ex sese radicibus, postea folia supernè ex ipso accrescunt, ex iis alia, ita vt continuata serie

Nomina

Locus.

Forma.

FICUS Indica, siue
Opuntia.



aliis ex aliis prodeuntibus foliis in arborem accrescat sine cortice, sine ramis. Folia ista crassissima sunt, aliquando pollicis crassitudine, ex quibus albae, tenues, longiusculae, acutaeque prominent spinæ, ex horum etiam summitatibus fructus, nostratibus Ficubus similes, sed crassiores, qui suprema parte in coronæ speciem desinant, colore ex viridi purpurascente, interiore pulpa Ficubus simili, sed ad eò succosa & rubente, vt sanguineo succo Mororum modo manus inficiat, & vrinam cruentam multo esci creet, quod multis tum primùm esitantibus & huius effecti ignaris magno aliquando terrori fuit. Ex Indiis folia permultis in locis Hispaniæ, Galliæ, & Italiæ sæta flores & fructus produxerunt, quales se vidisse & decerpisse, & maturas Ficus esitasse testatur Pena: vna cum ficuum rudimentis in paruo vmbilico calathi balauitij quadantenus effigie emicare luculentiore magnitudine & luteo colore, Ficus maturas Ficum magnam æquare, spinulis in ambitu horridam, cute purpurascente, succo intus cruento, grauis & pulpa ficulneis, sed gustu insuauiore. Hanc Theophras-

sti & Plinij Opuntiam esse, non sine ratione quis suspicetur. Sic enim Theophrastus. παραπλήσιον δὲ τῷ τῷ, μᾶλλον δὲ τὸ πῶς τινὰ θάλασσιώτερον, ἔστιν οἱ τῶν φύλλων ἀφῆσι ρίζαν. διὸν φασὶ πᾶσι δ᾽ ὡς ὅντα ποικίλον εἶναι, ὃ καὶ ἐὰν ἐλεῖται ἔστιν ἡδύ. Id est, Huic (Fico Indicæ) simile est, vel potius quodammodo mirabilius, si qua ex foliis radicem mittat, qualem circa Opuntem herbulam esse aiunt, quæ & esci suaui est. Et Plinius, Item circa Opuntem (Opus Locrorum Epicnemedorum oppidum lib. 4. cap. 7.) Opuntia est herba etiam homini dulcis. Mirumque è folio eius radicem fieri, ac sic etiam nasci. In iisdem insulis atque etiam in continenti sponte crescit arbuscula superiori valde cognata, quæ Indis Ferruminatrix vocatur, nobis Opuntia Ostocollos dici potest, quòd artuum fracturis & luxationibus mirè proficit. Ramos proferit foliis refertos aspectu deformibus, admodum spissis & spinosis, Tune foliis simillimis, vt describit auctor generalis Indiarum historiæ. Rami isti folia primùm fuere, ex singulis singula oriuntur, atque ex his alia, quæ demùm indurantur, & mutuò sibi ipsi succedente foliorum sobole in ramos abeunt, ac tandem arboris magnitudinem adipiscuntur, quæ perpetuò viret, caudice in imo & ramis cineritiis, asperis. Fructum fert superiore minorem & spinosiorẽ, purpureum, viscidum, succum remittentem, & ad inficiendos pannos insecturæ tenacissimæ. Folia spinis exemptis trita, & cataplasmatas modo imposita fracta ossa mirè glutinant & ferruminant. Sed illa prius locis suis aptissimè repo-

Lib. I. hist.
cap. 12.

Lib. 21 c. 17.

Ostocollos.

Forma.
Lib. 10. c. 1.


ni ac restitui oportet. Nam admotum cataplasma cùm agere in partem cœpit, ita parti hæret, vt auulsu perdifficile sit. Ea verò sanata statim sponte excidit.

ROSA DE HIERICHO, Loniceri.

CAP. XXXV.

Nomina

Forma.



ROSAM de Hiericho, siue Hiericunthis, siue Hiericunthinam vocant ab Hiericunthe Palestina oppido. Monachi & mulierculæ Rosam Mariæ. Hanc describit Lonicerus fruticem esse Labruscæ similem, sed minorem, venosum, odoratum, ramulis duriusculis, colore subflauo, baccis inter se racematim cohærentibus, flore violæ candido. Lonicerus & quidam alij Amomum esse falsò crediderunt. Quæ de re paulò post dicemus. Crescit haud ita difficile ex semine recenti, auctore Pena: hærent autem semina parua, complura, racematim vnà compacta, glumosa, Sorgi minora, & intra fruticis cancellatim reticulatimq; implexi glomum contenta. Hac Rosa vtuntur superstitiôsæ mulierculæ ad partus horam cognoscendam. Nam, vt aiunt, in aquam demissa non priùs fatiscit, quàm partus nasci incipiat.

CANELLA, CASSIA, CINNAMOMVM.

CAP. XXXVI.

Nomina

*Lib. I. c. 12.
& 13.*

*Cap. 91.
simpl.*



QUAE Græcis *καρδία* & *εὐκαρδία* nominatur, Latinis Cassia & Cassia lignea, Arabibus *Selicha*, *Seliche*, siue *Selihacha*, Italis *Canella* Hispanis *Canela*, Gallis *Canelle*, Germanis *Zimmet*, seu *Zimmet roezlin*. Cassiam autem Etymologicum dici vult *παρὰ τὸ καρδία*, quasi *καρμύσαν διὰ τῆς εὐσμουίας* *καὶ διορθώσεως*. Quod verò Græci *κιννάμωμον*, Latini quoque Cinnamomum dicunt, Plinius etiam Cinnamum, Arabes *Darseni*. De vtroque seorsum tractauit Dioscorides. Cassiæ multa sunt genera, quæ circa Arabiam aromatiferam nascuntur. Virgas seu ramulos habet crassi corticis, folia Piperis (alij *ἵρεως*, id est, Iridis legunt, & ita Serapio legit.) Eligēda est fuluescens, pulchri coloris, Coralli æmula, valde angusta, crassa, longa, fistulosa, gustu mordens, & cum multo feruore adstringens (non cum aliquanto feruore, vt Ruellius vertit, est enim *μῆν' πολλῆς πυρρόσεως*, quod & Plinius confirmat, à gustu, inquit, quàm maximè mordens) aromatica, vinoso odore, cuiusmodi est quæ ab incolis Achy nominatur, ab Alexandria negotiatoribus Daphnitis. Huic præfertur crassa, purpurea & nigricans Zigir cognomine, quæ Rosam odore imitatur, præcipui in medicina vsus. Secundum locum tenet antedicta. Tertia cui Mosylitico blasto, id est, germi cognomen est. Reliquæ viles, vt quæ Asyphenum dicitur, nigra, insuauis, cortice tenui ac rimoso: vt quæ Darca & Citto vocatur nomine barbaro. Similior huic est Pseudocassia, quàm vt explicari possit, quæ gustu coarguitur, cùm nec acris, nec aromatica sit,

fit, hæretémque medullæ corticem habeat. Inuenitur etiam lata quædam fistula, mollis, leuis, ramosa antedictæ præfertur. Damnatur candicans, scabra, hircinum virus olens, & quæ nõ habet fistulam crassam, sed scabram & tenuem. Deinde de Cinnamomo hæc scripsit. Cinnamomi genera plura patrium sibi nomen vendicantia. Præfertur tamé Mosyliticum, quod Calsiæ, cui Mosyliti cognomé est, aliquam referat effigiē: sed in eo genere recens, nigrum, ex vinoso in cinereum vergens, læue, tenuibus ramulis, ac frequentibus nodis cinctum, perquàm iucundè olens. Optimi ferè iudicium iucundi odoris proprietate constat: inuenitur enim cū optimo, eoq; quod peculiare est, odor Rutæ, aut Cardamomo proximus. Insuper acre, mordens, & cum calfactione quadatenus salsum, quod confricanti non citò asperum, & frianti puluerulentum, læuibus tamé internodiis appareat. Si certior fieri voles, vellito ab radice surculum, facilis est huiusmodi probatio: namque fragmenta miscellanea quædam esse videtur. Quæ autem melius spirant suo habitu cū nares primo consuluntur, olfactum expleant, deterioris dignotionē impediunt. Est etiam montanum, crassum, pumilum, fuluescens admodum. Tertium à Mosylitico perquàm suauiter olet, nigrum, fruticosum, paucis intercedentibus geniculis. Quartum fungosum, candicans, aspectu tuberosum, vile ac friabile, magnam habens radicem, quæ Calsiam repræsentat. Quintū genus odore nares ferreas, subrufum, & cortice fuluæ Calsiæ simile, tangēti firmum, minùs neruosum, densa radice firmatum. Iis quæ Thuris, Calsiæ, Myrti aut Amomi odorem spirant, minùs suauitatis inest. Deligito scabrum, album, rugosum: at læue, & lignosum circa radicem, vt inutile reicito. Est etiānum simile aliud, cui Pseudocinnamomo nomen est, vile, inualidi odoris, solutarumq; virium. Vocatur etiam Zingiber, cū tamen sit Xylocinnamomum, præbens quandam Cinnamomi faciem. Est autem lignosum Cinnamomum, sarmenta longa, robustaque ferens, odore longè Cinnamomo inferiore. Sunt qui Xylocinnamomum à Cinnamomo genere differre dicant, quod à natura eius abhorreat. Plinius recitatis iis quæ de Cinnamomo & Calsia fabulosa narrauit antiquitas, subiicit, Cinnamomum, idemq; Cinnamum nascitur in Æthiopia Troglodytis cōubio permixta. Ij mercatores id à cōterminis, vehunt per maria vasta ratibus, quas neque gubernacula regant, neque rami trahant vel impellant, non vela, non ratio vlla adiuuet, cū omnium instar ibi sint homo tantum & audacia. Præterea hybernum mare exigunt circa brumam, Euris tum maximè flātibus. Hi recto cursu per sinus impellūt, atque à promontorij ambitu Argeste deferūt in portum Gebanitarum, qui vocatur Ocila. Quamobrem illi maximè id petunt, produuntq; vix quinto anno reuerti negotiatores, & multos interire. Cōtrā reuehant vitrea, ahena, vestes fibulæq; cum armillis & monilibus. Ergo negotiatio illa sceminarum maximè fide cōstat. Ipse frutex duū cubitorum altitudine amplissimus, palmique minimus, quatuor digitorū crassitudinis statim à terra sex digitis surculosus, arido similis. Cū virescens, folio Origani, siccitate gaudēs, steriliore imbre, cædunt natura. Gignitur in planis quidem, sed desissimis in vepribus rubisque difficilis collectu. Metitur nõ nisi permiserit Deus. Iouem hunc intelligunt aliqui: Assabinum illi vocant, quadraginta quatuor boum caprarumq; & arietum extis impetratur venia cædendi. Non tamé aut ante ortum Solis, aut post occasum licet. Sarmenta hasta diuidit sacerdos, Deoque partem ponit, reliquum mercator in nallas condit (melius in naues.) Est & alia fama, cū Sole diuidi, ternasq; partes fieri, dein forte cremia discerni, quodq; Soli cesserit relinqui, ac sponte cōflagrare. Præcipua bonitas virgultorum tenuissimis partibus ad longitudinem palmi. Secunda proximis breuiore mēsurā, atque ita ordine. Vilissimum quod radicibus proximum, quoniam ibi minimū corricis, in quo summa gratia. Quæ de causa præferuntur cacumina, vbi plurimus

Li. 12. ca. 19.

cortex. Ipsum verò lignum infastidio est, propter Origani acrimoniam, Xylcinnamomum vocatur. Quidam Cinnami duo genera tradidère, candidius, nigriusq;. Quondam præferebatur candidum, nunc contrà nigrum laudatur, atq; etiam varium præferunt candido. Certissima tamen æstimatio, ne sit scabrum, atque inter sese tritum tardè frietur. Damnatur in primis molle, aut cui albet cortex. Ius eius à Gebanitarum Rege solo proficiscitur:is edicto mercatu vendit. Pretia quondam fuère in libras denariûm mille. Auctum id parte dimidia est, incensis, vt ferunt, siluis ira Barbarorum. Id accideritne ob iniquitatē præpotētium, an fortè, non satis constat. Austros ibi tam ardentes flare, vt æstatibus siluas accendant apud auctores inuenimus. Et mox, frutex & Calsia est, iuxtaq; Cinnami campos nascitur, sed in montibus, crassiore sarmento, tenui cute veriùs quàm cortice, quem contrà ac in Cinnamo leuari & exinaniri pretium est. Amplitudo fruticis trium cubitorum. Colos triplex. Cùm primùm emicat, candidus, pedali mensura, deinde rubescit addito semipede, vltra nigricans. Hæc pars maximè laudatur, ac deinde proxima: damnatur verò candida. Consecant surculos longitudine binûm cubitorum. Mox præsuunt recentibus coriis quadrupedum ob id interemptarû, vt iis putrescētibus vermiculi lignum erodant & excauent corticem tutum amaritudine (legendum & excauent, cortice tuto amaritudine.) Probatur recēs maximè, & quæ sit odoris mollissimi, gustûve quàm maximè seruēs potiùs, quàm lento tempore leuiter mordens, colore purpureo, quæq; plurima minimùm ponderis faciat breui tunicarum fistula, & nō fragili. Lactam vocant talem Barbaro nomine. Alia est Balsamodes ab odore simili appellata, sed amara, ideoq; vtilior Medicis, sicut nigra vnguentis. Hæc Plinius, quorum magnam partem ex Theophrasto exscripsit: sic enim de Cinnamomo & Calsia scribit. De Cinnamomo & Calsia ista referunt. Vtrûque fruticem esse non magnum, sed magnitudine Viticis (ἄγυς, non Amerinæ, vt vertit Gaza) multis ramis constantem & lignosum. Cinnamomum excisum in quinas partes diuidi: id optimum esse, quod germinibus proximum fuerit, quod ad palmi longitudinem cæditur, aut paulò maius. Secundum locum tenet quod sequitur, quod & breuiùs cæditur. Est & tertium, ac quartum: vltimum omnium deterrimum radici proximum, quod minimùm corticis habeat: is enim vtilis est, non lignum. Quam ob causam quod ex cacuminibus decerpitur, omnibus præfertur, quia plurimùm corticis habeat. Hæc quidam sic referunt. Alij fruticosum esse Cinnamomum aiunt: duo eius esse genera, vnum nigrum, alterum candidum. De quo hæc fabula narratur, ipsum in cōuallibus nasci, in iis esse serpentes, morsu necem inferentes, aduersus quos munitis manibus pedibûsque descendere, atque ita Cinnamomum legere, quod cùm exportauerint, eo in tres partes diuiso, cum Sole fortiri, & quæcūque illi sorte obtigerit, eam relinquere, abeūtesq; statim eam flagrantem cōspicere. Sed hæc planè fabula est. Calsiam autem ferunt virgultis esse crassioribus (παχυλέπας pro παλαιέπας rectè legit Gaza) valde nervosis, nec posse cortice exui, eum verò corticem esse vtilem. Cùm virgulta secât longitudine binûm digitorum (Plinius habet lōgitudine binûm cubitorum) aut paulò maiora abscindunt, recentiq; bouis corio ea consuunt, vt ex eo & lignis putrescentibus vermiculi gignantur qui lignum erodant, corticem verò non attingunt propter amarorem & odoris acrimoniam. Galenus Dioscoridem secutus lib. i. de Antidotis multa Calsiæ genera recēset, eamq; cæteris præfert, quæ Zizir cognominatur, Cinnamomi que adeò æmulam esse ait, vt essent suo tempore, qui eam Cinnamomi loco venderent. Idem eodem in loco tradit Calsiam sæpenuerò in Cinnamomum transmutari, seq; vidisse eximia Calsiæ ramulos omni ex parte Cinnamomum referētes. Contrà vidisse se Cinnamomi surculos Calsiæ prorsus persimiles, adeò vt asserat pro qualibet Cinnamomi parte in componendis medicamentis

camentis, duas selectæ Calsiæ adhiberi posse. Item describit quoddam aliud deterioris Calsiæ genus, quod iunior Andromachus Calsiam fistulam nominat, quod fistularum modo inanis cauâque sit, & crassi corticis, cuiusmodi in vulgari Cinnamomo frequentissima conspicitur. Eius verò historiam sic persequitur eodem in loco Galenus. De Cinnamomo contraria iis quæ de Opobalsamo diximus, compertum habeo: persuasum namque est mihi ipsum omnium cognitu facillimum esse illis, qui sæpe optimū viderunt. Optimum verò consequi nemo potest, nisi repositum ab Imperatoribus intueatur, sex generibus quodammodò distributum. Siquidem & in hoc ipso, velut & in Calsia, optimi ad deterrimū tam magna differentia est, vt optima Calsia à pessimo Cinnamomo parū distet. Neq; verò Cinnamomi virtus ad vsum apta longo tempore durat: ad triginta siquidem annos, quam à principio vim habuit, integram non conseruat. Nugantur autem qui Cinnamomum ex iis medicamentis esse dicunt, quæ senectutem non sentiunt. Atqui ego non centum, neque ducentū annorum interuentu, sed pauciorum, si quis ad tantum numerum conferat, iam aliquam mutationem vetultiori Cinnamomo factam obseruauī. Quo tempore enim Antonino Imperatori Theriacam paraui, vasa lignea in quibus eiusdem generis Cinnamomum inerat, multa cōspexi, alia Traiani, quædam Adriani, nonnulla Antonini, qui post Adrianū Imperator fuit, ætate reposita: omniaq; hæc sese & saporis & odoris imbecillitate vehementiaq; tantū superabant, quantū & tempore differebant. Olim è Barbarorum terris arca cubitos quatuor & medium longa, Romam perlata cū fuisset, in qua Cinnamomi primi generis integra arbor erat, ex eoque Marco Antonino Imperatori antidorum quandam composuissem, ipsum cæteris multū præstare deprehendi, adeo vt Imperator quoque ea degustata medicinæ cōcoctionem, velut in aliis fieri solet, expectare noluerit, sed etiam ea vsum sit, nondum integrè duobus mēsis elapsis. Antonino successit Commodus, qui nec Theriacæ, nec Cinnamomi curam vllam habuit, sub quo non solū arboris illius quod superfuerat omne dissipatum est, verū etiam quodcūque post Adriani tempora comportatum fuerat. Quo factum est, vt nunc Imperator Seuerus cū me sibi antidotum eo modo conficere iussisset, quo Antonino cōfeceram, ex Cinnamomo Traiani & Adriani tēpore reposito sumere coactus sim, imbecillioraq; planè visæ sunt, & tamen nondum triginta anni intercesserant. Hic tamen optimi Cinnamomi notas quasdam necessarias subiicere volumus, ipsum summopere bene olere, inexplicabilēque præ cæteris bonum quēdam odorem spirare, ac calidum gustantibus se multū exhibere, non tamen ita vt mordicando tristitiam palato inferat: colorem denique talem habere, qualem si quis lacti nigrum colorem admisceat, atque cerulei aliquantū addat. Ex hoc igitur quantū volebam, vt mos mihi fuit, cū accepiissem, ramusculos paucos apud me repositui ex apotheca, in qua res meas omnes pretiosas seruabam. Verū ipsa combusta, quo tempore & delubrum Pacis incensum est, & hæc & aliæ quinque Cinnamomi species, quas mihi conquisieram, periēre. Neque itaque cū Severo Imperatori Theriacam componerem, ex Cinnamomo Adriani tempore reposito quod optimum visum est elegi. Superfunt adhuc ibi multa vasa lignea, quæ omnia habent plurium radicū, vel plurium ramorum, vel Cinnamomorum differentias: nullum tamen veluti truncus in plures ramos diuisus attollitur, sed Veratri vtriusque figuram præ se fert, atque etiam magis Damafonij, quod è Creta ad nos adfertur. Quæuis autē Cinnamomi species ab vna radice, seu frutex quidam paruus confurgit, emittitq; hæc sex, illa septem virgulta, vel paulò plura paucioraq; non equali tamen omnia longitudine: verū quod maximum est, pedis Romani dimidium non excedit. Vniuersa autem Cinnamomi natura similis est quodammodò optimæ Calsiæ

Cassia. Hactenus Galenus. Strabo cum Theophrasto, Dioscoride, Plinio, Cinnamomum in Arabia gigni dicit, atque etiam in India, ea scilicet parte quæ ad Austrum vergit. Quia cum hæc Arabiæ & Æthiopiæ Sole persimilis sit, ea omnia, ut ipse ait, gignit aromata, nempe Cinnamomum, Cassiam; & alia, perinde ac illa.

Lib. 9. c. 33. Idem testatur Aristoteles in Historia animalium. In Arabia Cinnamomus avis appellatur, quæ furculos Cinnamomi portare, ac nidos ex iis cōficere aiunt. Nidificant in excelsis arboribus & ramis, sed incolæ sagittis plūbatis nidos petunt, atque ira decussum in terra Cinnamomum legunt. Quæ Plinius mutuatus, in Arabia, inquit, Cinnamologus avis appellatur, Cinnami furculis nidificat. Plūbatis eos sagittis decutiunt indigenæ mercis gratia. Aristoteli avis non *κινναμολόγος* dicitur, sed *κιννάμωμος* eodem cum planta nomine. Verum Iulius Solinus de eadem re scribēs, auem ipsam nō Cinnamomum, sed Cinnamologum appellat, atque etiam addit Cinnamomum hoc pretiis vendi amplioribus, quod magis, quā aliud mercatores portent.

Lib. 10. c. 33. Auicenna & Serapio nihil aliud de Cassia & Cinnamomo literis mādarent, quā quod ex Dioscoride & Galeno descripserunt. Ex quibus omnibus intelligit studiosus lector, quā fabulosa, varia, & incerta de Cassia & Cinnamomo à veteribus Græcis & Latinis auctoribus perscripta sint: tam longis enim difficultibusque navigationibus, ex regionibus tum parum notis petebantur hæc aromata, ut perfectam horum cognitionem sibi comparare non potuerint. Primum Dioscorides succinctè admodum Cassiam dixit esse virgultis crassi corticis, Piperis foliis: Cinnamomi verò descriptionem prorsus omisit. Theophrastus Cassiam & Cinnamomū magnitudine Viticis, multos ramos habere, lignosos. Plinius Cinnamomum dixit fruticem esse duorum cubitorum altitudine amplissimum, palmique minimum, & cætera quæ suprà posuimus. Cassiam fruticem esse amplitudine trium cubitorum, &c. Galenus arcam Romam delatam fuisse tradit è Barbarorum regione, longitudine cubitorum quatuor cum dimidio, in quo integra Cinnamomi arbor erat. Quibus indicat Cinnamomum esse arborem. Idem scribit vnāquamque Cinnamomi speciem, ab vna radice, seu fruticem quēdam parvū consurgere, adeo ut maiora eius virgulta dimidium Romanū pedē non excedant. Quibus innuit Cinnamomum in paruorum fruticum genere esse. Quid verò sibi vult Galenus cum dicit Cinnamomorū nullum veluti truncum in plures ramos diuisum attolli, sed Veratri vtriusque figuram præ se ferre, aut etiam magis Damasonij? Ad hæc cum Cassiam & Cinnamomū diuersas arbores esse statuit. Est & illud permirum, quod ait Cassiam sæpe in Cinnamomū trāsmutari, seq; vidisse eximiæ Cassiæ ramulos omni ex parte Cinnamomum referentes: contrā Cinnamomi furculos Cassiæ prorsus persimiles. Cassiæ genera Galenus recenset eadem quæ Dioscorides: item Cinnamomi sex, à Dioscoride etiam declarata. Theophrastus Cinnamomum in quinque partes diuidit, ut diximus. Eidem & Plinio duo duntaxat Cinnamomi genera sunt, candidum & nigrum. Iam verò prisca illi regiones & natales locos aperte & disertè non designant. Dioscorides Cassiam circa Arabiam odoriferam prouenire scribit, Plinius Cinnamomum in Æthiopia, mox subiungens Æthiopas mercari id à conterminis. Quod si apud illos nasceretur, cur ab aliis id emerēt? Multò absurdius quod sequitur, Æthiopes eas merces per vasta maria vehere. Nam si contermini sunt qui vendunt, tam longa navigatione quid opus est? ut nunc, ita & olim à Molucis in superiorem Indiam Cinnamomum veheretur, mercimonium id exercente quæ ad mare rubrum iacet Æthiopum gente, quos Aabyssinos vocamus, ob commodam Oceani propinquitatem. Quæ res Plinium fefellit, ut rectè Dalechampius annotauit. His fabulas addidēre non solū Herodotus, sed etiam Theophrastus & Plinius. Fabulosum enim est sectos furculos præfui recentibus coriis boum, ut iis putrescentibus vermiculi lignum erodant & excauent

& excauent cortice tubo amaritudine. His expositis nunc discutiendum an veram hodie Calsiam habeamus, sitq; ea quæ Canella vulgò vocatur. Deinde an ab ea Cinnamomum differat, an verò genuino careamus. Primùm recentiores omnes, qui doctrina & iudicio præstant, censuerunt Officinarum Cinnamomum, vulgò Canella dictum, legitimam esse priscorum Calsiam: cuius genera à Dioscoride & Galeno tradita internoscere poterit is: qui magnâ huius copiam in mercatorum apothecis diligentius perquisierit, & examinauerit. Quare ex Officinis omnibus reiicienda segmenta & frusta quædam, nec odore, nec sapore, nec viribus commendanda, quæ Calsiæ lignæ suæ odoratæ vice tum Medici, tum seplasiarij diu vsurparunt. Inter quæ cum sint nonnulla quæ præter odorem saporemque quibus ferè carent, Calsiæ Dioscoridis admodum similia videantur, eius Pseudocalsiam esse non temerè quis dixerit: medicamentorum verò compositionibus Xylocalsiam, id est, Calsiam ligneam, siue Calsiam odoratam postulantibus, Canella nostra adhibeatur. At cum hæc Calsia etiam Calsia fistula nominetur, quoniam ligno exempta tubuli seu fistulæ specie est, Mauritanique Siliquam Ægyptiam, siue Calsiam nigram, siue Catharticam vulgò dictam etiam Calsiam fistulam vocent siue sua, siue interpretum culpa, cauendum ne hac homonymia decipiamur, præsertim in medicamentis à Mauritanis inuentis, quæ Calsiam fistulam expectant, quæ Siliqua Ægyptia, siue Calsia cathartica, non illa odorata intelligenda est. Quantum ad Cinnamomum attinet, quidam credunt in capsis Canella siue vulgari Cinnamomo refertis, fragmenta veri, ac legitimi Cinnamomi reperiri posse ab iis qui & deligere & distinguere nouerunt. Pena scribit se Calsiam ad Cinnamomum proximè accedentem vidisse in Officina Gulielmi Driefsch pharmacopœi Antuerpiensis. Erat verò multorum iudicio furculus ille Cinnamomi, bacillo solido, fractu facili, Cinnamomi cortice obrecto, cui etiamnum cuticula pullo colore obducta fuit. Clusius in Scholiis in Historiam Aromat. Indic. Garcix, asserit se tres vidisse Cinnamomi furculos. Erant ij recti, non enodes, sed nodis quibusdam sine ramulorum vestigiis palmum à sese disitis insigniti. Cortex tenuis, subcinerei quodammodò coloris, iucundi odoris, suauis gustus, sed qui sua acrimonia aliquantulum linguam vellicet. Lignum certè inodorum est & insipidum, non minùs quàm Salicis ramus, cui perquam similis est. Retinet autem cortex suauem illam cum odoris tum saporis iucunditatem (tamen si totis quadraginta aut amplius annis à matre reuulsi sunt ramuli) atque eam etiam maiore, quàm nostra Canella. Istud autem hodiernum Cinnamomum neque idem cum Calsia, neque multum diuersum esse certum est, inquit Pena. Nam si vtriusque notas ex Dioscoride perpendas, videbis easdem ferè esse vires, non disparem vsus. Si recentioribus assentiariis & exploratoribus, eiusdem arboris non ita diuersas partes esse discas. Quod Galenus innuit, cum dicit Calsiam sæpe in Cinnamomum transmutari, scèq; vidisse eximix Calsiæ ramulos Cinnamomum prorsus referre. Còtrà se vidisse Cinnamomi furculos Calsiæ prorsus per similes. Quibus tanta horum cognatio significatur, vt Galeni auctoritate freti quidam putent Calsiam & Cinnamomum ex vna & eadem arbore provenire, sed ex diuersis eius partibus, nimirum Cinnamomum ex summis & tenerioribus furculis, Calsiam ex aliis. Alij nos verò Cinnamomo destitutos esse contendunt, idque quod Cinnamomum Officinis dicitur, nihil aliud esse quàm Calsiam ligneam, siue odoratam, quæ vulgò Canella nominatur, quos secutus est Matthiolus, qui contra veterum & recentiorum omnium qui de Cinnamomo & Calsia tractarunt sententiam, Cinnamomum lignum non corticem esse ait. Ex iis recentioribus Garcias horum historiam luculentè describit his ferè verbis. Propter locorum distantiam, inquit, & minùs frequentatas has regiones à negotiatoribus, probè cognita Calsiæ historia veteribus

Lib. 1. ca. 15.

Lib. 1. Arom.
Indic. c. 15.

non

non fuit. Nam qui eam Ormuz & Arabiam deferebant, Chinenſes erant. Ex Ormuz deinde in Alep emporium totius Syriæ nobiliſſimum ab aliis negotiatoribus transferebatur. Qui verò inde eam ad Græcos deportabant, aut apud ſe naſci, aut in Æthiopia dicebant, multiſque cum ſuperſtitionibus cædi diudivque à ſacerdotibus, ut ex Theophrasto & Plinio diximus. Cæterum neque Caſſiam, neque Cinnamomum apud Æthiopes aut Arabes naſci, Luſitanorum navigationibus palàm factum fuiſſe ait Garcias, qui totam illam oram circunlegerunt, magnâque ex parte terreſtri itinere peragravit: nullam autem Caſſiam aut Cinnamomum ſe viſiſſe affirmavit. Dicit aliquiſ Canellam quidem apud eos non naſci, & propterea ab Indis petere: ſed legitima Caſſia & vero Cinnamomo eos non carere, fortè autem à Barbaris & inconditis populis ignorari. Cui reſpondet Garcias, familiares ſe habere eruditos Medicos Arabes, Turcas & Coracones, qui omnes Canellam craſſiorem Caſſiam ligneam appellant. Prætereà nonnullos Luſitanos totam Æthiopiam ſub Ægypto (quam nunc Guineam vocant) non ſolùm ſecundùm mare, ſed in mediterraneis pergraſſe, alios ab inſula D. Thomæ uſque ad Sofala & Mozambique, & inde Goam penetrantes, pleroſque alios à promontorio Bonæ ſpei (cùm naufragium paſſi eſſent) uſque ad Mozambique & Melindam, ita ut utramque Æthiopiam, ſupra & infra Ægyptum perluſtrarint: nullam tamen ab his conſpectam illic fuiſſe Canellam vel Caſſiam. Neque credendum eſt ipſos incolas tam nobilia medicamenta ignorare, aut tacituros fuiſſe. Nam quemadmodùm barbariſſima gens, quæ inſulam D. Laurentij incolit, mercatoribus, qui eò interdum deferuntur, fructum quendam auellanae magnitudine oſtendit, quia Caryophylla redolet, eadem ratione credendum eſt Æthiopoſ Cinnamomum & Caſſiam, adeò odorata aromata Luſitanis demonſtratos fuiſſe. Porro Caſſia lignea Arabibus, Perſis, Indis *Salihacha* vocatur, à vulgo autem Indorum eodem nomine, quo Canella: nullum enim inter Canellam & Caſſiam diſcrimen faciunt. Neque reuerà quiſpiam Caſſiam à Canella differentem vidit. Cæterum quòd Canellæ diuerſa Cinnamomi & Caſſiæ nomina indita fuerint, occaſionem præbuiſſe putat Garcias mercatores Chinenſes, (nam annales urbis Ormuz produnt olim quadringentas naues à China vno eodemque tempore eò appuliſſe) qui cùm à ſua regione aurum, ſericum, vaſa murrhina, moſchum, margaritas, cuprum, aliâſque merces eueherent, nonnullas ex eis in Malaca vendebant, Santalum, Nucem myſticam, Macim, Caryophylla, lignum Aloës contra in ſuas naues inferebant. Quæ ruſus in Zeilam & Malauar diuendebant, indeque ſumebant Canellam, ex Zeilam, videlicet laudatiſſimam, ex Malauar minùs ſelectam: ſimiliter & ex Iaoa, unde etiam Piper Cardamomumque euehebant, eaque omnia deinde Ormuz, aut in Arabia oram maritimam perferebant. Interrogati autem iſti Chinenſes, quæ nam eſſent hæc aromata, & unde adueherent, fabulas illas narrabant quas recenſet Herodotus, ut iis commentis earum mercium pretia augerentur. Cùm autem eam, quæ in Zeilam proueniſſet, Canellam ab ea, quam in Iaoa & Malauar ſumpſerant, diſſerre conſpicerent, diuerſa illis indidere nomina, cùm tamen eiſdem generis eſſent cortices, pro ſoli caeliq; varietate duntaxat differentes, ut plerumque idem fructus pro regionum & caeli differentia ſuauior fieri, aut à naturali bonitate degenerare ſolet. Eminent ergo incolæ Ormuz eam Canellam à Chinenſibus, Darchini, quod Perſis lignum Chinenſe ſignificat, appellarunt. Deinde Alexandriam vehentes, ut eam Græcis eò confluentibus cariùs venderent, Cinnamomum vocarunt, quod ſignificat lignum odoratum, quaſi Amomum ex China delatum. Deteriori autem Canellæ, quæ ſcilicet ex Iaoa & Malauar delata eſſet, idem nomen quo in Iaoa

appellatur.

Nomina

appellatur, indiderunt, scilicet *Cais manis*, quod lingua Malaya dulce lignum sonat, duo diuersa nomina eidem rei imponentes. Græci corrupto vocabulo *Cassiam* dixere. Vfus est Auicenna cum Rhase & reliquis Arabibus vocabulo Persico *Darchini*, vt plerisque aliis Persicis solet. Nam *Canella* cuiuscunque generis Arabicè *Quersaa* & *Querse* dicitur. Reliqua verò nomina apud Arabas corrupta sunt, vt *Darshahen*, & similia. Vocatur in Zeilam *Cuurdo*, in Malaya, vt dictum est, *Cais manis*, in Maluuar *Camraa*. Nam quod Serapio *Darchini* arborem de China interpretatur, corruptum est, & ab interprete additum. Quare *Garcias Cassiam*, *Cinnamomum*, & nostram *Canellam*, vnum idémque medicamentum esse censet, atque ita depingit. Arbor est magnitudine *Oleæ*, interdum minor, multis onusta ramis, non iis quidem contortis, sed rectis fermè, foliis colore quidem ad *Lauri*, forma verò ad *Citri* folia accedente (non autem foliis *Iridis*, vt fabulosè quidam scripsere.) Floribus candidis, fructu nigro & rotundo, auellanae ferè magnitudine, aut exiguis oliuis simili. Est autem *Canella* nihil aliud quàm secundus & interior arboris cortex. Nam hæc arbor duplici cortice munita est, veluti *Suber*, non eo tamen adeò crasso & distincto. Hoc confirmat

Forma.

CANELLAE folium & bacillus.

XYLOCASSIA.



Pena, qui scribit Venetos institores Londini ostendisse corticem pollicem crassum, scabrum, callosum, foris llici aut *Oleæ* concolorem, interiùs verò conuexum mollius, superficie, odore, sapore, gustu quadantenus *Canellæ* vulgaris. Idcirco doctiorum Medicorum sententia, *Cassia* arboris extimum & crassissimum corticem iudicatum fuisse. Similiter adnotauit *Clusius* in *Scholiis* in *Garcia* historiam, interdum inueniri fragmenta, quæ non videntur interior ille cortex, sed omninò superior, cinerea quodammodo pellicula obductus. Exemptus ergo cortex crasso illo & exteriori libro repurgatur, deinde in laminulas quadrangulas sectus humi abiicitur, atque ita per sese conuoluitur, vt vnus rami integer cortex videatur, cum tamen partes sint duntaxat corticis in tubulos digiti crassitudine conuolutæ, truncus verò interdum femoris crassitie

Locus.

Li. 12. ca. 19.
Lib. 1. An-
tidot.

Cap. 143.

reperiatur. Roseum autem illum, siue ex cinereo vinosum colorem Solis calore contrahit: qui non probè paratus, candicans siue cinerei coloris sit, nimis verò Solis ardoribus adustus, niger. Exempto cortice tribus postea annis ab ea arbore abstinetur. Frequentes sunt hæc arbores in Zeilam, solèbātque vili emi Canella: sed triginta ab hinc annis nemo eam emere potuit præter Procuratorem regionum negotiorum, quem Factorem vocant. Zeilanici minores sunt ex arbores, quæ ignobiliorem Canellam ferunt in prouincia Maluar, & in Iaoa, siue Iaua, non tamen adeò pusillæ, vt Plinius & Galenus esse scribunt. Sunt verò omnes siluestres & sponte nascentes. Nusquam alibi, quod sciam, inquit Garcias, nascitur Canella, tametsi Franciscus de Tamara scribat in freto maris Erythræi Cinnamomi arbores & Lauros maris æstu interdum opertas inueniri. At Lusitani singulis annis per mare Erythraum nauigant, nullam tamen eiusmodi arborem se vidisse referunt. Præterea Occidentalis Indiæ Historia refert Canellam istic nasci, quod verisimile non esse Garcias arbitratur: eam enim narrat calices glandesque Suberis modo ferre, cum legitima Canella veluti oliuas tantum ferat. Quare alia erit sui generis arbor. Quotquot tamen Historiam Peruanam descripserunt, istius Canellæ, quam in prouincia Sumaco nasci tradunt, meminerunt. Est verò ex eorum descriptione, Canellæ arbor vasta admodum, folio Laurino, fructu racematim coherente, sed qui calice Suberino simili contineatur, ampliore tamen & magis cauo, colore nigrescente. Huius arboris fructui, foliis, cortici & radicibus (licet Canellæ saporem & odorem habeant) longè calices præferuntur, quorum duntaxat puluis in usu est. Nam si Canellæ modo cum cibis decoquantur, tantum abest vt suauitatem eduliis concilient, vt potius eorum faculas & saporis gratia decoctione euanescat. Horum puluere ad diuersos morbos vtuntur, sed præsertim aduersus coli, intestinorum, & stomachi dolores in potionibus eum propinant. Quamuis autem multæ sint huius generis arbores siluestres, diligenter tamen & magna cura eas in prædiis suis colunt (sit enim culta longè melior) atque in vicinas regiones deferunt, alias merces ad vitam humanam necessarias hoc aromate redempturi. Hæc Franciscus Gomara in Historia generali. Nec vti eadem Historia Occidentalis Indiæ narrat, in China Canella nascitur, nam è Malaca Chinam cum aliis mercibus deferitur. Intellexit verò Garcias plurimam etiam Canellam in insula Mindanao nasci, & vicinis insulis, sed ex procul à China absunt. Putarunt etiam nonnulli in Alep nasci Canellam, quòd apud aliquos auctores scriptum inuenerint Cinnamomum Alepinum. Sed sciant, non magis istic, quàm in Hispaniis nasci. Verùm cum ex illis regionibus Ormuz, & inde Alep deportabatur, factum est, vt incorruptam Canellam inde in Europam aduectam ab ipsa vrbe Alep denominarint. Quamuis autem Zeilanica cæteris præferatur, inuenitur tamen etiam interdum ignobilis, qualis est quæ crassiori cortice constat, minusque in tubulos conuoluitur, quòd non sit eiusdem anni: quo enim vetustior cortex, eo deterior. Quæ verò in Maluar nascitur, tota ferè est deterior, tantumque à Zeilanica differt, vt centenæ Zeilanicæ libræ decem aureos pendant, Maluaricæ verò libræ quadringenæ vnum duntaxat aureum. Ludouicus de Barthe-na in nauigatione sua scribit in Zeilam insula Indiæ nasci Canellæ arborem Laurum proximè referentem præsertim foliis: item baccas Lauri modo ferre, sed minores & candidiores. Hæc Canella siue Cinnamomum (nihil enim inter ea discriminis ponit) cortex est huius arboris, cuius ramos tertio quoque anno secant, & cortice spoliant: truncum verò illæsum relinquunt. Similiter Odoardus Barbosa scripsit in Zeilam Indiæ insula nasci optimam Canellam

locis

locis montosis ex arbore Lauro simili. Arrianus in navigatione maris rubri refert duorum dierum itinere ab Emporio Mordo dicto locum esse Mosillum. nuncupatum, in quo maxima Calsiæ copia prouenit. Idem ait Emporium esse Aromata dictum Orientem versus, in quo nascitur Calsia, Zigir & Asyphi, & alia aromata. In quam Arriani navigationem is qui scripsit, quod de Calsia & Zigir Canellæ generibus ab Arriano proditum est, diligenter expendendum esse annotauit, nempe ea nasci in Troglodytica parte, velut in Aromata & Mosillo, vnde mercatores emunt, & ad alias partes transportant. Similiter quod Plinius dixit, Cinnamomum nasci in Æthiopia Troglodytis contermina, quæ ob id ab antiquis auctoribus teste Strabone Cinnamomifera appellata fuit, quod etiam confirmauit Ptolemæus. At nunc tota Troglodytica & Æthiopia probè cognitis, certum est neque Cinnamomum, neque aromatum speciem vllam illic nasci, dempto Zingibere, quod in regno quodam Damute nuncupato prouenit. Theuetus partim Garciz assentitur, partim ab eo multum discrepat. Narrat insulæ quæ Monorique dicitur celebriores vrbes esse Cavit & Subanin,

ARBOR CANELLÆ,

Theueti.



prope quas optima Canella prouenit, quam Maluarici *Cais-mani* appellant, quæ vox dulce lignum significat, creditque Theuetus Græcos corrupto inde nomine Calsiam ligneam appellasse. Ac reuerà veteres plerique, inquit, existimarunt arborem, quæ Calsiam, & eam quæ Cinamomum & Canellam fert, eandem planè esse, quod falsum est, etiam si Garcias id asserere voluerit: tantum enim differt hæc ab illa, quantum glandifera arbor à Castanea arbore. Caterum Canellam Arabes appellant *Querfaa*, alij *Querfe*, Zeilam incolæ *Cuurde*, in Iauan insula *Cameaa*, in Ormuz *Darchini* dicitur, id est, Lignum Chinenfè. Arbor hæc in montibus nascitur, Lauro nostrati similis, cuius ramuli duntaxat, & tenuiores surculi stato anni tempore Regis iussu amputantur & vaneunt. Ramulis multum brachiata est, in quorum extremis flores sunt parui, quibus Solis feruore statim flaccescentibus & delapsis succedit fructus, ferè rotundus, Nucis auellanz magnitudine, ex cuius nucleo oleum exprimitur, inodorum, nisi sit igni excoctum, quo ægri neruos & ceteras corporis partes malè affectas illinunt. Canella quæ ad nos aduehitur, secundus est arboris cortex, qui dissectus in sese conuoluitur, & colorem mutat. Radix vtilis est, nec non succus qui ex arbore manat, isque confert maximè, qui sanguinis ex naribus profluuium obnoxij sunt, orisque halitum commendat. Scire autem licet nullam Canellæ arborem, neque in Africa, neque in Asia minore, neque in Peru, neque in Europa prouenire, quicquid scribant Plinius & Herodotus. Hæc ex Theueto. Superest vt Cinnamomi & Calsiæ vires ex veteribus explicemus. Calsia vim habet calfaciendi, inquit Dioscorides, vrinam ciendi, siccandi, & leuiter adstringendi. Conuenit ad medicamenta oculorum, quæ efficiendæ claritatis gratia concinnantur, & ad ma-

Tol. Cels.
mog. lib. 11.
cap. 7.

Temper.
& Vires.
Lib. 1. c. 12.

lagmata. Lentigines tollit cum melle illita, menses trahit, contra viperarum morsus pota auxiliatur. Aduersus intestinas inflammationes omnes, & renum vitia potu proficit. Fœminis in folio desidentibus aut suffimentis prodest ad dilatationem vulvæ. Ea duplo pondere medicamenti mixta Cinnamomi vicem supplet, si ipsum desit: nam eisdem effectus præbet, ad plurima perquam utilis. Cinnamomum omne, eodem auctore, excalfacit, emollit & concoquit, urinam ciet: tam menses quam partus potum, aut ex Myrrha impostum pellit, contra bestias quæ virus ei aculantur, venenæque conuenit: crassitiem extenuat, lentigines & vitia cutis in facie ex melle illitum deterget: contra tusses, defluxiones, hydropem, nephritidem, & urinæ difficultatem efficax est. Vnguentis pretiosis inferi solet. In summa magni ad omnia vsus. Garcias contra Dioscoridis & Galeni auctoritatem monet rogâtque Medicos & pharmacopœos omnes, ne Calsiam duplici pondere pro Cinnamomo compositionibus immisceant. Tum ne posthac Calsiæ loco Canellam deteriorem præscribant, sed selectissima vtantur, cum tanta sit eius copia. Galenus scribit Calsiam exsiccare & excalfacere tertio quodammodo ordine, sed & tenuium admodum esse partium, gustu verò plurimam in se acrem deprehendi, leuiter quoque nonnihil adstringere. Quamobrem ob hæc omnia incidere, simulque digerere quæ in corpore sunt excrementa: ad hæc robur etiam instrumentis addere. Idoneam verò etiam suppressis mensibus, cum videlicet à copia simul & crassitudine excrementorum quod sufficiat euacuari nequit. Cinnamomum verò summè tenuium esse partium, non summè tamen calidum, sed ex tertio ordine. Nihil autem æquè desiccare eorum quæ pari sunt excalfaciendi facultate, propter tenuitatem essentia. Garcias auctor est extillare ex Calsiæ radice liquorem Caphuram redolentem. Sed Rex vetuit radices vulnerari, ne arbores pereant. Præterea elici aquam vitreis organis ex ipsis floribus, sed quæ fragrantia & odoris suauitate ei cedat, quæ ex corticibus nondum resiccatis elicitur. Vtilis est hîc liquor stillatitius ad plurima. Nam stomachi imbecillitatem roborat, coli dolores à causa frigida provenientes illico lenit. Faciei colorem commendat & oris halitum. Præterea ad condiendos suauioresque efficiendos cibos perquam idoneus. Ex Canellæ bacis oleum exprimitur, quemadmodum ex oliuis, sebaceum quodammodo & saponi Gallico simile, inodorum, nisi calfactum sit, tunc enim Cinnamomum aliquantum olet, & vtuntur aduersus ventriculi, & neruorum frigidam intemperiem.

Lib.1. ca.13.

Lib.1. hist.
Arom. Ind.
cap.15.

Li.7. simpl.

TIPER.

QUOD Græci *πέπερ*, id Piper Latini dicūt, Arabes *Fulfil* & *Fulfil*, Itali *Pepe*, Germani *Pfeffer*, Hispani *Pimienta*, Galli *Pouire*. De eo Dioscor. hæc prodidit. Piper arborem tradunt nasci in India, breuem, quæ inter initia prælongum fructū veluti siliquam promit, quod est longum Piper, habens intus aliquid tenui Milio simile, quod tādē in perfectum Piper euadit. Id autem suis temporibus dehiscens, racemos emittit grana ferentes qualia videmus. Ea acerba candidū Piper faciunt, aptū ocularibus remediis, antidotis, & theriacis medicamētis. Longum verò vehementius mordet, & subamarū est, quia immaturum decerpitur, antidotis & theriacis medicaminibus expetitur. Nigrum verò candido suauius, acrius, ori gratius, & quod non nisi maturum colligatur, magis odoratum, nec non ad condimenta vtilius. Sed candidum & subacribum antedictis infirmius est. Piperis radix Costo similis est. Eligendum est grauisimum, plenum, nigrum, non valde rugosum, recens, nō fursurosū. Inuenitur etiam in genere nigri, nutrimento destitutum, inane, leue, quod vocatur brasma. Plinius, Pāsim verò, inquit, quæ Piper gignunt arbores, Iuniperis nostris sunt similes: quāquam in fronte Cauasi solibus apposita gigni tantum eas aliqui tradidere. Semina à Iunipero distant paruis siliquis, quales in Phaseolis videmus. Hæ priusquā dehiscant decerpitæ, tostæq; sole faciunt quod vocatur Piper longum: paulatim verò dehiscences per maturitatem ostendunt candidum Piper, quod deinde tostum solibus, colore rugisque mutatur. Dioscorides arborem Piperiferam neque delineauit, neque cuiquam alteri assimilauit. Plinius Iunipero comparuit: in cæteris haud multum dissentiunt. Theophrastus dixit tantum Piper fructum esse, cuius genera duo. Vnum enim rotundum Erui modo, cute carnēque constans, sicuti Lauri baccæ, subrubrum. Alterum oblongum, nigrum (contrā, rotundum *μέλεν*, nigrum, oblongum *ὑπέρφυρον* subrubrum dicendum videtur) semina parua Papaueris continens. Longè hoc validius altero. Auicenna & Serapio, quæ de Pipere tradiderunt, ex Græcis exscripsere. At Dioscorides, Theophrastus, & hos secutus Plinius Piperis plantæ formam, ac notas ignorarunt, vt ait Garcias, neque natales locos probè designarūt. Quod minùs mirum videri debet: regionis enim procul disitæ, ideóque minùs bene cognitæ, nec perlustratæ plantam non inspectione notam, sed auditione tantum acceptam, alienam fidem secuti describebāt. Illud magis mirum Arabas & recentiores in eundem errorem incidisse. Quare veram Piperis historiam ex aliis referemus. Ac primùm ex Garcia. Maxima, inquit, Piperis quantitas prouenit in Malauar, tota ea maritima regione quæ à promontorio Comorim ad Cananor vsque pertingit. Nascitur etiam in Malacæ maritimis, sed bonitate superiori cedens, & magna ex parte inane. Prouenit similiter in insulis Iauæ vicinis, & Sunda, & Cuda, aliisq; locis. Sed id in Chinarum regionem tantum deportatur, & loco natali consumitur, præter id quod in Pegu & Martaban deuehitur. Maxima etiam eius pars quæ in Malauar oritur, in vsum incolarum cedit, tamen regio ampla non sit: nonnihil etiam à maritimis eius regionis populis absumitur. Pars eius desertur in Balagate bubulis coriis. Et magna copia (quamuis edicto Regio veritum sit) à Mauritania per mare Erythræum exportatur, id suffurantibus ipsis incolis. Inuenitur etiam Piper supra Cananor, quæ Septentrionem spectat, sed adeò exigua quantitate, vt ipsis incolis non sufficiat, & externo importato opus habeant. Etenim non gaudet planta hæc locis desertis ac mediterraneis. Quantum verò distent hæc regiones à Cauaso monte, ex Geographiis satis liquet. Piper Maluatica lingua Molanga dicitur, Malacitana, Loda, in Guzarate & Decan, Meriche, in Bengala, Morois, longum Piper quod solum

Nomina

Lib. 2. c. 153.

Lib. 12. c. 7.

Lib. 9. hist. cap. 22.

Li. 2. c. 49. Cap. 37. simpl.

Li. 1. Arom. Ind. ca. 22. Locis.

Nomina

istic provenit Pimpilim, Arabibus medicis, tum vulgò *Filfel*. Tamen Auicenna Fulful & Fulfel appellat, quem secutus est Serapio. Seritur Piperis planta ad radices alterius arboris (magna ex parte iuxta arborem Faufel, aut Palmam satam Garcias vidit) ad cuius fastigium vsque sese conuoluendo conscendit, foliis raris, Mali Assyrij effigie, sed minoribus, in extremo acutis virentibus, gustu aliquantùm calidis, & folij Betre sapore. Fructus vuarum modo racematim cohæret, minores tamen sunt Piperis racemi, & fructus ipse minor, semperque virens, donec siccetur, & perfectam maturitatem consequatur, quæ incidit circiter medium Ianuarium. Radix pusilla, nõ Costo similis, vt vult Dioscorides, quia Costus radix non est, sed lignum. Verùm inter plantam quæ Piper nigrum fert, & eam quæ candidum, tam parua est differentia, vt à nemine quàm ab incolis dignosci possit, quemadmodùm Vitem quæ vuam fert nigram ab ea quæ candidam non dignoscimus, nisi cum vuas habent, & eas quidem maturas. Quæ autem Piper longum edit, longè alia est planta, quæq; non plus habet similitudinis cum superioribus quàm faba cum ovo. Præterea Piper longum in Bengala provenit, quæ regio quingentarum leucarum spatio à Malauar distat, vbi nigrum & candidum gignuntur. Quare Galenus Dioscoridem secutus eandem plantam Piper longum, candidum & nigrum

Li. 8. simpl.

ARBOR Piperifera, Theueti.



PIPER nigrum & album.



proferre falsò credidit. Candidi plantæ rariores sunt, nec nisi certis Malauar & Malacæ locis rarè nascuntur. Condiuntur aceto & sale recentes adhuc, & immaturi Piperis nigri racemi, & vsui afferuantur, cuiusmodi racemos interdum cum Zingiberis radicibus muria conditis Antuerpiæ reperiri ait Clusius, oblongos quidem & graciles, neque ita farctos, vt sunt vuarum racemi, ex quo eorum iconem expressam hic exhibemus. Arabes & Persæ Medici Piper calidum tertio ordine statuunt. Sed empirici cuiusmodi sunt maxima pars Indicorum Medicorum, frigidum Piper faciunt, vt & pleraq; alia aromata, quæ reuerà excalfaciunt. Solent magnates candido Pipere vti quemadmodùm nos sale. Venenis resistere, & ocularibus medicamentis vtile esse asserunt, quod & Dioscorides annotauit. Vis omnium,

Li. 1. ca. 13.

omniū, inquit, exalfacit, vrinam ciet, cōcoquit, trahit, discutit, absterget quæ tenebras oculis offundunt. Piper horribus febrium periodicis siue potu, siue illitu subuenit: serpentium morfibz auxiliatur, partus extrahit, conceptum adimere creditur statim à concubitu suppositum: tussi omnibzque pectoris vitiis siue eclegmate, siue potu succurrit: angina eo & melle vitiliter perunguntur. Potum cum recētibus Lauri foliis tormina discutit. Cum vua passa commanducatum pituitam à capite elicit: dolores sedat, appetentiam mouet, concoctionem adiuuat ad intinctus esculentorum additum. Strumas cum pisce discutit, vitilignes cum nitro terget. Radix ora gustantium accendit, saluam ciet, lienem reprimit cum aceto illita, aut pota. Caput etiā purgat cum semine Staphisagria manducata. Garcias candidi Piperis loco, quod calidius est & odoratius, nigrum præscribendum esse non consulit, nisi in candidi penuria. Similiter nec longum Piper candidi aut nigri loco, cum prorsus diuersæ sint plantæ, & nigrum cum candido

Lib. 2. c. 13

PIPER, Math.



PIPER Aethiopicum, Math.



magis conueniat. Idem aliū generis Piperis meminit, ꝑ lingua Maluarica à Canara Canaricum nuncupatur. Est autem id inane, cōque vtuntur ad pituitam à capite eliciendam, ad dentium dolores, & in cholerico affectu. Annotauit Clusius Scholiastes Antuerpiam inuehi solitum aliud Piperis genus, quod Lusitani Pimienta delrabo, id est, Piper caudatum vocant. Sed veritus Rex Lusitaniæ ne legitimum Piper alterius inuectione vilesceret, id ampliùs deferri edicto vetuit. Erat id Cubebis ferè simile, pediculo subnixum exiguo, rotundum, plenum, aliquantulum rugosum, nigricans, eadem acrimonia qua Piper præditum, aromaticum, racematim cohærens. Amomum esse nonnulli perperam existimarunt. Est & aliud Piperis genus quod Aethiopicum vocatur, à Serapione Granum Zelim & Piper Nigrorum, atq; ita describit. Habzeli, inquit, id est, Granum Zelim, granum est pingue, magnitudine Ciceris, foris flauum, intus album, boni saporis. Adfertur ex Barbaria, vbi vocatur Croni, Piper etiam Nigrorum nuncupatur: quam reuerà Piper Nigrorum sit aliud. Specie Phaseolis simile est, sed granis &

Piper Canaricum.

Piper Caudatum.

Cap. 37. simpl.

corticibus minoribus, colore nigro, sapore acri sicuti Piper. Ex regione Nigrorum defertur, & doloribus dentium confert. Hęc Serapio. Hoc Piper sic depictum dedit Matthiolus. Sunt qui perperam Carpesium esse opinentur. Nicolaus Monard. aliud Piper longum Americum depinxit, cuius toto continentis tractu, in

PIPER longum.



quo Nata, Carthago, atque etiam in nouo Regno magnus est vsus. Id oblongum est, maiori acrimonia præditum Orientali, magisq; aromaticum, ac iucundiore odore quàm Capsicum: quinetiam Piperi ni-

gro tum sapore, tum suauitate præferendum. Altc cuiusdam plantæ fructus est, oblongus est, crassitudine quidem funiculi, & dimidij pedis longitudine, veluti granulis multis constans, circa pediculum oblongum, cõtinuo & coniuncto ordine dispositis, veluti in semine plãtaginis, quibus adeptis pediculus nudus conspicitur. Recens viridis est, sole maturefcit, & nigrescit. Calidus est tertio gradu.

CARDAMOMVM. CAP. XXXVIII.

Nomina
Lib. 1. c. 5.



ΑΡΔΑΜΟΜΟΝ Græcè, vt Latine Cardamomum, Arabicè *Cordumeni* vocatur. Dioscorides de Cardamomo tractans id non describit, sed duntaxat quibus in locis nascatur optimum, qualèque illud sit, docet his verbis. Cardamomum optimum est, quod ex Comagene, Armenia, Bosphoròque deuehitur. In India quoque & Arabia provenit. Eligi debet plenum, frangenti contumax, occlusum fæctumq; (Quod enim huiusmodi non est, exoletum iudicatur) & gustu acre, subamarum, & odore caput feriens.

Lib. 12. c. 13.

Plinius de eodem aliter hæc scripsit. Simile his (Amomo & Amomidi) & nomine & frutice Cardamomum, semine oblongo. Metitur eodẽ modo & in Arabia. Quatuor eius genera. Viridissimum ac pingue, acutis angulis, contumax fricanti, quod maximè laudatur. Proximum è rufo candicans: tertium breuius atq; nigrius. Peius tamen varium, & facile tritu, odorisque parui, qui verus Costo vicinus esse debet. Hoc & apud Medos nascitur. Quod semine oblongo dixit Plinius, de seminis conceptaculo siue calice intelligendum videtur. Ex quibus verò auctoribus quatuor eius genera faciat, nescio. Dioscorides enim, Galenus & cæteri Græci vnus tantum Cardamomi meminerunt. Quod maximè laudari ait viridissimum ac pingue, acutis angulis, Dioscorides requirit occlusum plenumque, & *Αυστροπρωτον*, id est, frangenti contumax, quod Plinius contumax fricanti, vt fortasse legendum sit contumax frianti. Auicenna de Cardamomo duobus distinctis capitibus tractauit. Priore de Cardamomo, id est, Sacola, de quo postea dicemus: altero de *Cordumeni*, id est, Cardamomo. Quo capite easdem planè vires ei assignat, quas suo Cardamomo Dioscorides. Ex quo perspicuum est, de Græcorum Cardamomo Auicennam hęc verba facere. Item Serapio nomine Cardamomi eadem prorsus refert quæ Dioscorides & Galenus de suo Cardamomo. Sed Cardamomumne Græcorum sit quod vulgò in Officinis habetur, id in cõtrouersia est.

Li. 2. c. 156.

Genera.

Matthiolus tria Cardamomi genera ad nos adferri scribit, maius, medium, & minus. Maioris inuolucrum fici faciem refert, materia compactum tenaci, lenta ac læui, Indicę nucis inuolucro, aut Palmæ elates non absimili, staminibus multis per longitudinem discurrentibus. Intus semine fæctum est subrubro colore, granis inæqualibus, multis intercurrentibus membranis albicantibus, quibus semina conteguntur, quæ Melegettas quidam appellauere, quod Milium Indicum referant, quod Itali Melegam vocant, saporis acuti, odoris iucundi ac suauis, vnde Grana Paradisi à multis vocitantur. Medium folliculo contegitur oblongo, triquetro, striatòque, retuso in summitate cacumine, in quo semen conditur, membranis quoque

CARDAMOMI species, Matth.



quoque obuolutū, oblongum, pressum, canaliculo quodā altera parte diuisum, multis transuersim intersecantibus lineis, colore ex albo rufescente. Minus folliculo constat breui, facie triangulari, fagini ferē nucleī effigie, obtusioribus tamē angulis, media intus dissepiente

membrana. Vtrinque semen est altera parte caua linea diuisum, subrotundum & tactu subasperum. Omnium semen est fractu facile, acre, cum quadam odoris saporisque suauitate, & sine vlla amaritudine. Maius tamen acrius est, & aromatis quid magis respiciens. Minus vt medium acrimoniæ vehementia superat, ita & odoris fragrantia. Maius Cardamomum videri possit, inquit Matthiolus, id esse quo veteres Græci vsi sunt, quod suo ē Cardamomo apud Galenum folliculos abiiciat Zeno, & quod in Theriaca carmine descripta folliculorum Cardamomi mentio fiat. Præterea alio in loco Galenus ex Pamphilo myropola transcribens Cardamomi delibrati meminit. At repugnat sapor, in quo nulla prorsus amaritudo percipitur, quæ in Galeni Cardamomo adeo euidens est, vt eo vermes intestinorum necari affirmer. Adhæc illius sapor suauis est, nec caput tentat, nec frangenti contumax est, sed dentibus facillimè cedit. Quare maius illud Matthioli Cardamomum, veterum Græcorum Cardamomum minimè fuerit: neque etiam medium, neque minus, id quod ex sequentibus perspicuum fiet, quibus de Cardamomo vulgari Officinarum dicemus potissimum ex Garcia. Quod Cardamomum vocant, inquit, aroma est in India notissimum, ob frequētem eius vsum, cuius etiam magna pars in Europam, Africam, & Asiam deuehitur. Quam verò rectè sit illi Cardamomi nomen inditum, aliis disceprandum reliquit. Certè Auicenna peculiare scripsit caput de Saccolaa, quod duūm generum esse tradit. Alterum Saccolaa quebir, id est, magnum, alterum Saccolaa ceguer, id est, minus. His nominibus cognitum esse vtrumque Cardamomum cum Medicis Arabibus, tum mercatoribus. In Malauar vocatur *Eremelli*, in Zeilan *Ençal*, in Bengala, Guzarate & Decan interdum *Hil*, interdum *Elachi*, idque inter Mauritanos: nam à gentilibus indigenis omnium suprà dictarum provinciarum *Dore* nuncupatur. Quæ diuersitas & nominum confusio multis errandi occasionem præbuit: alij enim Indicis vocabulis, alij Arabicis vsi sunt. Nam quod Serapio alterum Saccolaa, alterum Hilbane vocat, mendosum est, & Hil duntaxat scribendum. Quod si Bane quis adiici velit, potius Bara dicendum censet Garcias, quod lingua Canarina magnum significat. At Serapio nomine Hilbane Cardamomum minus intelligit. Nihil igitur aliud est Saccolaa omnium Arabum, aut Sacculæ Auicennæ, aut Elachi, quam quod vulgo Cardamomum vocant Officinæ, veteribus tum Græcis, tum Latinis incognitum, de quo sic Auicenna. Saccolaa quid est? Aliud est magnum sicut Cicer nigrum, quod cum frangitur, interius habet granum album, mordicans linguam sicut Cubebæ, in quo est aromaticitas. Et aliud est paruum sicut Lens, aromaticum etiam. Serapio etiam de vtraque huius Cardamomi specie ex auctoritate Isaac fusiùs agit. Nascitur, & seritur auctore Garcia, leguminum modo, altitudine quando summa, cubiti, in quo dependent siliquæ paruæ granula interdum vsque ad viginti continentes.

Lib. 2. Antidot.

Lib. 7. comp. med. loca. cap. 3.

Lib. 1. Aro. Indic. c. 24.

Nomina

Cap. 64. simpl.

Lib. 2. c. 155. Forma.

nentes. Prouenit vtrumq; in India, præsertim ab Emporio Calecut vsque ad Cananor: tamen aliis etiam locis Malauar, & in Iaoa nascitur, non tamen adeò copiosum, neque cortice tam candido. Optimum censetur minus, quod odoratus est altero, & facultate maius dici potest. Id veterum Græcorum Cardamomum esse nequit. Nam Galenus scribit, Cardamomum non esse tam calidæ facultatis, quàm Nasturtium, sed suauius & magis fragrans cum quadam amaritudine. Quas notas omnes, præsertim amaritudinem Cardamomo nostro non conuenire experientia docet. Dioscorides verò commendat quod ex Comagene, Armenia, Bosporoque adfertur (tamen si in India quoque & Arabia prouenire dicat) eligendumque plenum, frangenti contumax, gustu acre, subamarum, odore caput tentans. Nostrium contra in regiones illas deferitur, ex quibus Dioscorides suum deferri scribit. Sed neque id frangenti contumax est, neque caput tentat, neque amarum, neque gustu adeò acri vt Caryophylla. Neque vllum ex Plinij Cardamomis cum nostro conuenit, quod fragile esse debet, siliqua candicante, granis intus nigris. Ex iis etiam satis liquet errasse eos qui Capsicon siue Siliquastrum pro Mauritani Cardamomo exhibuerunt. Item eos qui Melegetam Cardamomum Dioscoridis esse putant, nam Melegeta Dioscoridi ignota fuit: quique Cardamomum maius coloris esse cinerei aiunt, Nigellæq; id tertium genus, quod in Officinis habetur, quoniam Nigella in his omnibus prouinciis non nascatur. Quod verò Melegeta Cardamomum minus non sit, satis ex vtroq; genere quod in India nascitur perspicuum est, quorum alterum Cardamomum, vt vocant, maius est, alterum minus, eiusdem tamen formæ, & magnitudine duntaxat differentia. Multi vsus est in his prouinciis in quibus prouenit. Etenim cum Betre (vt iam diximus) manditur, pituitaq; caput & stomachum expurgat, & Serapiis admiscetur. Hæc ex Garcia. Scribit Auicenna Saccola calidum & siccum esse tertio gradu, cum calore adstrictionem illi inesse, præcipuè in cortice. Conferre vomitui & nausæ cum mastiche & aqua vtriusq; Granatorum. Serapio verò tradit Cardamomum maius minore minus esse acre, & maiore adstringendi vi præditum, præcipuè cortices & folliculos. Calidum siccumque esse primo gradu, resolueret, ventriculū roborare, concoctionem iuuare, valere ad syncopem & vomitus maximè cum suo cortice & folliculis, cum mastiche, ligno Aloës, succo Menthæ & vino Granatorum. Minus eodem gradu calidum, & iisdem viribus præditum, sed subtiliorum partium: quare concoctionem magis iuuare, gutturis, pectoris & ventriculi superuacuos humores magis exsiccare. Græcorum verò Cardamomum, auctore Dioscoride, calfaciendi vim habet. Potum ex aqua facit ad comitiales, ischiadicos, tussis, neruorum resolutionem. Item ad rupta, vulsa: latas ventris tineas excutit. Ex vino autem potum renibus, difficultati vrinæ, à scorpione ictis, neque non omnibus venenum vibrantibus auxilio est. Cum cortice radice Lauri epota drachma calculos comminuit: partus suffitu enecat, scabiem ex aceto illitum adimit. Et ad vnguentorum spissamenta additur. Galenus, Cardamomum, inquit, est facultatis admodum calidæ, non tamen vsque adeò vt Nasturtium, sed quantò suauius, magisque fragrans est Nasturtio, tantò & imbecillius ei calida facultas inest: nec enim vlcerare idoneum est, vel ipsum per se illitum. Porro adiunctum habet quiddam etiam amaritudinis, qua lumbricos interficit, & cum aceto valenter psoras deterget. Apud Indos solo, eo, aut cum Beetele mixto ad oris fœtorem, pituitam purgandam, & stomachum roborandum maxime commendatur.

*Locus.**Electio.*Ruell. lib.
1. cap. 5.Lacun. in
6. cap. lib. 1.
Dioscori.*Vsus.**Temper.**& Vires.*

Lib. 1. c. 5.

Lib. 7. sim.



ACTUARIUS κομβέβας fructus vocat, quos nos Cubebas, Arabes Me-
dici *Cubbe* & *Quabebe*, vulgus *Quabebechini*, in Iaoa ubi frequens na-
scitur *Cumuc*, reliqui Indi præterquam in Malayo *Cubabchini*. Non
est autem nomen huic fructui inditum quòd in China nascatur, quia
ex Cunda & Iaoa, ubi plurimus est, in Chinam perferatur, sed quia Chineses qui
Oceanum Indicum nauigabant, hunc fructum, quem in supradictis insulis eme-
rant cum aliis mercibus, in alios maris Indici portus & emporia transuehebant.
Siluestris est planta & sponte nascens, neque multorum generum, ut quidam pu-
tauerunt, Malo vulgari similis, minor tamen, foliis Piperis, sed angustioribus, per
arbores Hedera, aut verius Piperis modo repens, non Myrto effigie, neque foliis
Myrto similibus. Fructus racematim coheret, non ut in vua coaceruatus, sed
singulis granis ex singulis pediculis pendentibus. Flos est odoratus. Piperis ge-
nus non est, quoniam plurimum Piperis ex Cunda aduehitur, quod nihil differt à
Maluarico, hic verò fructus minima quantitate istic nascitur, qui cum ipsa planta
diuersi generis est. Cubebarum rarior vsus est in Europa, nisi in medicamento-
rum compositionibus: apud Indos verò frequens est earum in vino macerata-
rum vsus ad excitandam venerem, tum etiam in Iaoa ad excalfaciendum ventri-
culum. Tanto autem in pretio est hic fructus iis in locis in quibus nascitur, ut
eum incolæ decoquant, antequàm efferri sinant, veriti ne alibi satus nascatur.

Hinc fortasse sit, ut corruptioni magis sit obnoxius in Europa. Id quod à Lusitani-
s fide dignis se accepisse ait Garcias, qui longo tempore in Iaoa insula habi-
tauerant. Multi Auicennæ, Serapionis, Actuarius auctoritate nixi, Cubebas le-
gitimum Galeni Carpesium esse censuerunt. Etenim Auicenna de Cubebis scri-
bens, ea omnia ferè exscripsit quæ à Galeno de Carpesio dicuntur. Serapio Myr-
tum siluestrem siue Ruscum Dioscoridis, & Galeni Carpesium eodem Cube-
barum nomine, eodémque capite descripsit. Actuarius Mauritanorum nomi-
na secutus in quibusdam medicamentis Carpesium miscet, quod Barbaris κομβέ-
βας vocari ait. At illorum Cubebæ à vulgaribus & Officinarum nostrarum Cu-
bebis permultum differunt: neque enim iis Rusci historia conuenit, neque fru-
ctus cum sint Galeni Carpesium dici possunt, de quo scribit, λεπτά δὲ ἔστι τὰ
κάρφη, παραπλήσια τοῖς ἀκρέμωσι τῷ κινναμώμῳ, id est, tenuia esse samenta, Cin-
namomi virgultis similia. Et alibi, Carpesium simile esse Phu, non gustu tan-
tum, sed & facultate. Nec minùs errarunt qui Cubebas Vitis semē esse asserue-
runt, cum vtriusque historia & facultates plurimum dissideant. Cubebæ no-
stræ cum odoratæ sint, & præter odoris gratiam gustu acrimoniam & amaro-
ris tantillum relinquunt, dicere possumus eas excalfacere initio tertij ordinis, &
in fine eiusdem exsiccare. Quare languentem ex pituita ventriculum, vel ex
flatibus roborare, pectus à lentis crassisque humoribus expurgare, lienem iuuare,
status discutere, & frigidis vteri malis auxiliari. Diu cum mastiche mansæ
pituitam à capite trahunt, & cerebrum roborant.



RACIS ἀμωμον, Latinis etiam Amomum dicitur, Arabibus *Hame-
nus* siue *Hamana*. De hoc breuiter sic Dioscorides. Amomum par-
uus est frutex, ex ligno sese conuoluens in racemi modum: florem ha-
bet paruū ceu Violæ albæ. Folia Bryoniæ similia sunt. Id in Arme-
nia, Media, & Ponto nasci innuit Dioscorides, cum dicit. Optimum Armeniacum
aureo

Nomina

Forma

Vfus.

Cubebæ
non sunt
Carpesiū.
L. 2. c. 134.
Lib. 7. sim.

Temper.
Vires.

Nomina
L. 6. c. 14.
Forma.

Locus.

aureo colore, ligno subrufo, valde odorato. Medicum, quia in campestribus & aquosis nascitur, infirmius est. Magnum autem & subviride est, tactu tenerum, frutice vinoso, odore Origani (*ὀρυγανίζον* expresse- runt vetus interpres & Hermolaus. Codices vulgatiores habent *πρυγανίζον*, odore Rutæ:) Ponticum verò subrufum, parvū, fragile, racemosum, fructu plenum, & odore nares feriens. Adulteratur herba simili, quæ Amomis vocatur, sed sine odore, sine fructu. Nascitur in Armenia flore Origani. Plinius de eodē hæc tradit. Amomi vna in vſu est, Indica Vite Labrusca (rectius fortasse ex Indica Vite) vt alij existimauere, frutice myrroso (fibroso Dioscorides) palmi altitudine, carpiturque cum radice, manipulatim leniter componitur protinus fragile. Laudatur quàm maximè Punici mali foliis simile, nec rugosis, colore rufo. Secunda bonitas pallido. Herbaceum peius, pessimūq; candidum, quod & vetustate euenit. Pretium vna in libras. x. l. x. friato verò Amomo. x. l. viii. Nascitur & in Armeniæ parte, quæ vocatur Otene, & in Media, & in Ponto. Adulteratur foliis Punicis, & gummi liquido, vt cohareat, conuoluaturque sese in vna modum. Est & quæ vocatur Amomis, minùs venosa atque durior, ac minùs odorata: quo apparet aut aliud esse, aut colligi immaturum. Idem quod Dioscorides Amomum Plinius intellexisse videtur, cum Indicā Labruscam esse ait, cui folia Vitæ albæ tribuit, atque eodē natales. Theophrastus, Cardamomum, inquit, atque Amomum, alij ex Media, alij ex India cum Nardo & reliquis, aut plurimis aduehi narrant. Sed de Amomo magna est inter auctores contentio. Alij verò Amomo nos carere existimant, eiq; ex Galeni præcepto Acorum substituunt, Alij Hierichuntinam rosam Amomum esse contendunt, magno sanè errore, quòd folia Bryoniæ non habeat, nec odorata sit adeò vt nares feriat, neque Origanum respiciat, sicuti Amomū. Quidam, inquit Matthiolus, ex Gargano Apuliæ monte pumilum quoddam semen deferunt, colore nigro, odore Melanthij, paululū aromaticum, gustu acre, quod pro legitimo Amomo vendunt. At Dioscorides seminis Amomi non meminit, sed Amomum racemosum, id est, ex ligno se conuoluens in racemi modum dixit. Quare nos vero Amomo carere peritiores censuerunt. Garcias historiæ Aromaticum Indicorum auctor, de Amomo scribens narrat se percontatum aliquando à quodam pharmacopœo Hispano, sed religione Iudæo, qui Hierosolymis habitabat, quid esset Amomum. Eum respondisse Arabicæ lingua *Hamama* nuncupari, quod pedem columbinum significat, stirpem hanc nouisse, quam tamen apud Indos non vidisset. Postea se euocatum à Nizamoxa Rege in Decan potentissimo, Medicos eruditos tum Persas, tum Turcas, quos semper magnis stipendiis domi alebat, interrogasse num Amomum haberent, dixisse illos istic quidem non nasci, sed inter alia aromata quæ ad Regem ex Asia, Persia, & Arabia conficiendis alexipharmacis perferrentur, Amomum etiam aduehi: cuiusque ramulis se ab eis donatum, id cum Dioscoridis descriptione contulisse, & venustissime quadrasse, ac, licet iam ficcum, pedem columbinum repræsentasse. Sed eius figuram nec prolixiore oratione, nec pictura Garcias expresseit. Eius verò Scholiastes nobis vt hîc picta est exhibuit, ad Valerandum Doræum diligentem & eruditum pharmacopœum Amomi, item Amomidis

Lib. 12. c. 13.

Lib. 9. hist. cap. 7.

Lib. 1. c. 31.

AMOMVM (t) Amomis.



Amomum.



Amomis.

ritiores censuerunt. Garcias historiæ Aromaticum Indicorum auctor, de Amomo scribens narrat se percontatum aliquando à quodam pharmacopœo Hispano, sed religione Iudæo, qui Hierosolymis habitabat, quid esset Amomum. Eum respondisse Arabicæ lingua *Hamama* nuncupari, quod pedem columbinum significat, stirpem hanc nouisse, quam tamen apud Indos non vidisset. Postea se euocatum à Nizamoxa Rege in Decan potentissimo, Medicos eruditos tum Persas, tum Turcas, quos semper magnis stipendiis domi alebat, interrogasse num Amomum haberent, dixisse illos istic quidem non nasci, sed inter alia aromata quæ ad Regem ex Asia, Persia, & Arabia conficiendis alexipharmacis perferrentur, Amomum etiam aduehi: cuiusque ramulis se ab eis donatum, id cum Dioscoridis descriptione contulisse, & venustissime quadrasse, ac, licet iam ficcum, pedem columbinum repræsentasse. Sed eius figuram nec prolixiore oratione, nec pictura Garcias expresseit. Eius verò Scholiastes nobis vt hîc picta est exhibuit, ad Valerandum Doræum diligentem & eruditum pharmacopœum Amomi, item Amomidis

Amomidis nomine ex Ormuz celebri sinus Arabici emporio missam. Neutram tamen cum Plinij & Dioscoridis Amomo conuenire ille putat, nisi id forte sit quo se Garcias donatum, quodque pedem columbinum referre asserit. Nam hæc fragmenta, aliquot sunt ramuli, foliolis quibusdam adeo frequentibus onusti, vt ex folis foliis constare videatur (veluti in Tithymalo paralo videre licet) quæ in extremo ita sunt disposita, vt flosculum aut rosulam efforment. Ramuli isti simul compacti non ineptè pedem columbinum (qualis columbarum est, quæ pedes, vt ita dicam, plumatos habent) referre videntur, nullo tamen singulari odore aut sapore præditi sunt. Cæterum cum auctor hic pedem columbinum memorat, atque etiam Serapio, minimè intelligunt id Geranij genus, quod Herbarij Pedem columbinum vocant, sed Amomum ipsum, vt ex Serapionis descriptione perspicere licet. Quare ineptissimè faciunt, neque ex Serapionis aut aliorum Arabum auctoritate, qui Pedem columbinum vulgarem Herbariorum, Amomo substituunt. Huius vires Dioscorides his ferè verbis explicat. Vim habet calfaciendi, adstringendi, exsiccandi. Somnum allicit, & illitum fronti dolorem sedat. Inflammationes & meliceridas concoquit & discutit. Iuuat quos scorpius percussit ex ocimo illitum: podagricis confert: inflammationes oculorum viscerumque lenit ex vua passa: ad vuluarum vitia in pessis aut in fessionibus vtile est. Decoctum iocinorosis, nephriticis, podagricis potu conuenit. Antidotis miscetur, & preciosissimis vnguentis. Amomum, inquit Galenus, Acorum similem facultatem obtinet, nisi quod Acorum siccus sit, maiore autem concoquendi facultate Amomum.

Cap. 169. simpl.

Lib. i. c. 14.

Lib. 6. sim.

ASPALATHVS. CAP. XLI.



ΣΠΑΛΑΘΟΣ Græcis & ἐρυσίσκεπρον, Aspalathus Latinis dicitur & Erysisceptrum, Arabibus *Darschichahan*. Aspalathus, vt describit Dioscorides, frutex est lignosus, multis spinis horrens. Nascitur in Istro, Nisyro, Syria & Rhodo, quo ad vnguentorum spissamenta vnguentarij vtuntur. Optimus est grauis, detracto cortice rubescens, aut purpurascens, densus, odoratus, gustatu amarus. Est alterum genus candidum, lignosum, inodorum, quod deterius habetur. Plinius non eadem omnino tradit. In eodem tractu Aspalathus nascitur spina candida (& lignosa, Dioscorides) magnitudine arboris modicæ (Dioscoridi frutex est) flore Rosæ (id prorsus omisit Dioscoride.) Radix vnguentis expetitur (lignum Dioscor.) Tradunt in quocunque frutice curuetur arcus cælestis, eandem quæ sit Aspalatho suauitatem odoris existere, sed in Aspalatho inenarrabilem quandam. Quidam eum Erysisceptrum vocant, alij sceptrum. Probatio eius in colore rufo, vel igneo, tactuq; spisso (rubescente vel purpurascente Dioscor. tactuque denso & graui) & odore castorei. Dioscorides *εὐωδὴς* habet, id est, odore iucundo. Idem alibi oscitanter Orientale alium à Rhodio facit, his verbis. Per Hispanias quidem multi & inter odores, & ad vnguenta vtuntur illa (melius, alia) Aspalathū vocantes. Est sine dubio hoc nomine spina siluestris in Oriente, vt diximus, candida, magnitudine arboris iustæ. Sed & frutex humilior, æquè spinosus in Nisyro, & Rhodiorum insulis (legendum ex Dioscoride in Nisyro, Istro, & Rhodiorum insula) quæ alij Erysisceptrū, alij Adipsatheon, siue Diphacon, siue Diacheron vocant (fortè melius Adipsacon, quoniam locis sitientibus gaudet, & Diareton, id est, eximia magnificq; virtutis.) Optimus qui minimè ferulaceus (grauis & densus Diosco.) rubens, & in purpuram vergens detracto cortice. Nascitur pluribus locis, sed non vbiq; odoratus. Auicenna etiam à Dioscoride dissentit, cum ait Aspalathum arborem esse crassam, quæ spinas grandes habet, qua vnguentarij ad vnguentorū spissamenta vtuntur. Aspalathū quidā Santalum rubrū esse crediderunt. Sed eos falli constat tum ex iis quæ de Santalo

Nomina

Lib. i. c. 19.

Forma.

Locus.

Electio.

Lib. ii. c. 24.

Lib. 24. c. 13.

diximus, tum ex multorum qui ad Orientales Indias aliasq; Nōui orbis terras nauigarunt scriptis, qui omnes vno consensu affirmant se cōtinuas Santalorum rectorum & procerorum siluas vidisse. Aspalathus verò humilis est frutex, suauiter odoratus, amaricante gustu. Quæ notæ Santalo non cōueniunt, neque enim odoratum est, nisi odorem ex albo pallidōque & aliis aromatis, quibus permixtum fuerit, contraxerit, qui breui euanesceat, neq; amarum est. Alij pro vero Aspalatho id vsurparūt quod Rhodium Oleastrum appellant, quo olim pharmacopœi Agalochi vice utebantur: cuius materies cū partim nigra sit, partim ex nigro flauōque venosa, neque rubra, neq; subrubra, præterea cū ex Olearum sit genere, vt Rhodij narrant, in Rhodo insula frequens, & oliuas ferat, cū etiam nullis spinis armata sit, neque detracto cortice rubescat, Aspalathus dici nullo modo potest. Ac, vt verum fateamur, Officinis olim omnibus hodie quoque permultis incognitus fuit geminus Aspalathus. Verū recentiorum diligenti peruestigatione factū est, inquit Pena, vt tres lignorum differentiæ nobis innotuerint, quarum quælibet Aspalathi nomine digna sit. Primam vidisse se ait Veronæ, & dono accepisse à doctis pharmacopœis Francisco Calceolario & Andrea Bellicoco, qui eam Theriacis suis miscent & doctorum Medicorum Veronensium consilio, frustum illud quod habuit, densum, solidum & compactum esse, quasi ex cuiusdam fruticis imparte resectum, radiatis fibris, graue, colore buxeo, sed saturatiore, suauissimo odore & pertinaci, sapore non ita amaro, nec gustu insuauis. Alteram speciem Venetiæ aduectam Rhodo, missam Nicolao Comasco erudito Medico, apud quem tum maximum truncum vidisse, detracto cortice rubentem, Taxo concolorem, odore adeò fragrantem, vt quā latè patebat cœnaculum, eximio imbueret odore. Tertiam albicantem foris, intus torulo subflauo, aut citreo, Santali albi & citrij simillimam: Rosam sapore nullam gustanti exhibere manifestam qualitatem, nisi tantillum calidi, quod vix gustu discerni possit. Hanc alij Aspalathi speciem, alij Oleastri Rhodij aut Santali arbitrantur. Aspalathi vires hæ sunt ex Dioscoride. Vim calfaciendi habet cum adstrictione. Vnde decoctum cum vino ad tetra oris vlcera colluenda conuenit, ad nomas genitalium, & fordida narium vlcera infunditur, subditum in pello partum extrahit, aluum sistit eius decoctum, & sanguinis reiectionem potu cohibet: vrinæ difficultatem inflationēque discutit. Plinius eadem ferè tradit. Sanat tetra oris vlcera & ozenas, genitalia exulcerata aut carbūculantia (vlcera fordida & depascentia genitalium, Diosco.) item rhagadia: inflationes potu discutit, & strangurias cortex. Sanguinem reddentibus medetur decoctū eius. Aluum sistit cortex. Dilucidius verò Galenus hæc declarat. Aspalathus gustu quidem acris simul & adstringens est, facultate verò ex dissimilibus constat, nempe partibus suis acris exalfaciens, partibus verò aliis, austeris scilicet, refrigerans. Quare vtriusque ratione desiccat, atque hac ratione aduersus putredines & fluxiones est utilis. Auicenna calidum esse in primo gradu, siccum in fine secundi vsque ad tertium scribit. Cætera ex Galeno & Dioscoride transcripsit.

COSTVS.

CAP. XLII.

Nomina
Lib. I. c. 15.



ΚΟΣΤΟΣ Græcis dicitur, Latinis Costus, Arabibus *Costos* siue *Chosf*. Dioscorides eius genera & delectum declarat omiſſa descriptione. Præcellit, inquit, Arabicus, candidus, leuis, eximia odoris suauitate. Secundum locum sibi vendicat Indicus, plenus, & niger, & leuis vt Ferula. Tertius est Syriacus, grauis, colore buxeus, & odore feruens. Optimus est recens, albus, abunde plenus, densus, aridus, à teredinibus non exesus, sine grateolen-
tia, gustu calidus ac mordens. De eodem Plinius hæc breuius scribit. Radix & foliū
(lege

Lib. II. c. 12.

(lege, radix Costi & folium) Indis est maximo pretio. Radix gustu feruens, odore eximio, frutice aliàs inutuli. Primo statim introitu amnis Indi in Patale insula duo sunt eius genera, nigrum, & quod melius, candicans. Auicennæ species sunt tres. Arabicus est, inquit, albus, leuis, aromaticus. Alter est Indus, qui est magis leuis. Tertius est amarus, grauis odoris, qui nominatur garyophyllata. In quo à Dioscoride dissentit, scribente tertium esse Syriacum, grauem, colore buxæ, & odore feruentem. Serapio de Costo omnia ex Dioscoride & Galeno exscripsit. Officinæ Arabes secutæ Costum fecere duplicem, dulcem & amarum. Dioscorides tamen & Plinius neque dulcis, neque amari mentionem ullam fecerunt. Galeno verò omnis Costus amarus est, & ex Græcis qui Costum quandam dulcem esse dicat, reperiens neminem, nisi si ex recentioribus sint, qui Arabas hac in re & permultis aliis sint imitati, in quibus est Aëturius, qui dulcis Costi meminit. Hos tamen Pena excusat, quòd Costus dulcis collatione quadam cum acriore & amariore vocetur, vt eadem plantæ radix cum recentior est, mitior multò, vetustior verò amarore & feruore ingrator facta, amara, aut inamœna dicatur. Aliam huius diuisionis causam ex Garcia in sequentibus proferemus. Vt sit, Officinarum Costus adulterinus est: neque enim vlla est odoris suauitate, neque gustu mordens & feruidus, neque ita acris & calidus, vt etiam exulceret, vt ait Galenus, sed fusca radix, grauis, inodora, Helenij compacto concretione ignota. Quamobrem sunt qui Zedoariam legitimum Costum esse contendunt. At hæc minùs odora, minùs aromatica est, gustuque grata. Alij Angelicam nigrum Costum siue Indicum faciunt, propter odorem suauem & insignes vires. Sed non est peregrina planta, imò Europæ familiarissima, nihil adstrictionis habens, neque exulcerans. Arabici Costi radices omnibus ad stipulantibus notis se habere Matthiolus ait, à Francisco Calceolario pharmaco-
pæo Veronensi ad se missas, Indici verò frustum à Cecchino Martinello mis-
sum, quod secum ex India detulerat, quæ cum forma tum substantia differunt:

Lib. 2. c. 161.

Cap. 308. simpl.

In cap. 15. lib. 1.

COSTVS Indicus.



quin tamen Costi genera sint non dubitat, cum ex Dioscoride Arabicus ab Indico non parum differat, hic quoque à Syriaco. Arabicum tamen alteri præfert. Garcias Costi historiam paulò aliter descripsit. Costus, inquit, Arabibus dicitur *Cost*, aut *Cast*, in Guzarate *Uplot*, in Malaca, vbi eius plurimus est vsus, *Pacho*, & inde vehitur in Chinarum regionem. Græci & Latini ab Arabibus nomen mutuati sunt: nam in Serapione & aliis *Chost* & *Chast* corruptum est, legendumque *Cost*, *Cast* & *Costi*. Huius etiam tria genera veteres constituent, vt diximus, tamen Garcias vnicum duntaxat Costi genus esse tradit, atque se à negotiatoribus perquisiuisse. Arabibus, Persicis & Turcis, vbi nam tanta Costi copia consumeretur, quæ apud eos ex India exportaretur. Respondisse maximam partem in Asia minori & Syria consumi, atque etiam apud Arabas & Persas. Rursus interrogatos an alius quispiam Costus apud eos nasceretur, id negasse. Idem percontatum fuisse à Nizamabuci Medicis, sed ne-

Lib. 1. Aro. Ind. cap. 45. **Nomina**

Cap. 308. simpl.

Costigenus vnum

gasse se Costum alium vidisse vnquam, quàm qui ex India ad eos deferretur. Quòd autem tam diuersa nomina sortitus sit, in causa fuisse negotiatores putat, qui ex variis regionibus oriundi erant. Quòd autem Arabes eius duo genera faciant, amarum & dulce, id euenit, quòd istud medicamentum cum recens est, & incorruptum, nullius amaritudinis sit particeps, candidiùsque persistat: cùm autem verustate corrumpi incipit, amaritudinem contrahit, sitq; nigricans. Describunt autem Costum qui viderunt Sambuci effigie, & Arbuti aut Azimbri magnitudine, (Quid sit Azimbri nescio. Clusius Iuniperum suspicatur intelligi, quod Zimbri Lusitanis sit Iuniperus) florem odoratum ferens. Præcellit qui intus candidus est, cortice cinereo. Inuenitur etiam colore Buxi, cortice pallescente. Tanta odoris fragrantia pollet, vt plerisque nares feriat, & dolorem capitis excitet, gustu nec amaro, nec dulci, tamen iam senescens interdum amarescat: nam recens acri gustu est, vt reliqua aromata. Nascitur circa Guzarate, inter Bengala, Delli & Cambaya, in Mardon & Chitor. Inde multi currus Vplot, Spica, Chryfocolla, aliisque mercibus onusti aduehuntur in Regni metropolim Amadabar, quæ in desertis sita est, & in Cambayete urbem non procul à mari: vide postea per maiorem Asiæ, aliquam Africæ partem, & vniuersam Europam deferuntur. Hoc vtuntur in multis medicamentis Indici Medici. Nec mirum si eius loco vtuntur adulterino Officinæ procul à Lusitania disitæ, quoniam exigua admodum quantitas in Lusitaniā defertur. Sed hic obseruandum est, quod & annotauit Clusius, veterum Costum radicem fuisse, non lignum. Plinius enim radicem disertè appellauit. Dioscorides cum Helenij Comageni radicibus adulterari scripsit, radicem esse innuit: nam trunci aut rami lignum tantam non habet cum radice affinitatem, vt radice adulterari possit. At Garcie Costus, vt descriptio indicare videtur, nihil aliud ferè quàm lignum est, suo cortice contextum, aut

Lib. I. c. 22.

certè minimùm corticis habet. Et de Pipere scribens Costum radicem non esse, sed lignum asserit. Quare aut veterum Costum non describit, aut Arabum Costus (si is quem describit illorum Costus est) à Græcorum veterum Costo diuersus videtur. Costi genus Antuerpiam è Lusitania adfertur, vt & affirmat Clusius, solidum, cortice cinereo, intus candicans, interdum cinerei coloris. Odorata est admodum radix, violaceum seu irinum spirans odorem, præsertim dum manditur. Ei caulis fragmentum, quod è terra extat, sæpe inhaerere, conspicitur, ferulaceum quiddam referens, & fungosam medullam continens, vt perspicuum sit Costo Garcie bellè conuenire.

COSTVS Syriacus,

④ Arabicus.



Eius iconem ex Clusio, qualis ex sicca radice exprimi potuit, hic appinximus. Paucis ab hinc annis è Syria & Ægypto Venetias aduehi cœpit radix Zedoariæ aut Zingiberis effigie, quam Valerandus Douræus materia medicæ peritissimum verum Costum esse iudicauit. Radix est intus candida, inquit Pena, læuis, minimè grauis, pollicem crassa, vnciam & sesquiunciam longa, hinc inde tubericulis oblongis altrinsecus donata, odora, gustu acri, odore intenso & iucundo Cupressi, aut Cedri Libani quadantenus. Interdum buxea visitur, vti vulgata odore & sapore similis, subamara vtraque, cætera similes. Initio nomine Zingiberis siluestris vendebant. Hæc radix si genuinus Costus

Costus non est, inquit Pena, tamen quia radix est, & eximia odoris saporisque acris gratia aromatica pollet, parem Costo laudem & gratiam merito adepta est. Pictam ex Pena hic exhibemus. Idem Pena duas alias radices Costum admodum similes depinxit à Rupellensi Medico Launaio donatas, quas

COSTVS Moluccensis

corticofus.



ille à nauleris è Moluccis redeuntibus acceperat. Horum altera maior arboris maiusculæ cortex videtur, & figura Sambuci adultioris & cineracei, rugis & plicis frequens, sapore & odore æque vehementi. Altera minor radice Solani siluestris valde similis, colore pullo diluto, gustu vrente, vt vix ardorem lingua ferre queat. Illis persuasum erat Costi speciem esse, etsi parum odora esset.

Quod vt non inficiatur Pena, ita priorem vt potiore retinet, & hasce ambas Moluccenses minùs odoras iudicio studiosorum sic pictas subdidit. Costo vis excalfactoria, auctore Dioscoride. Vrinam ciet, menses pellit,

*Vires &
Temper.
Lib. i. c. 15.*

vulvæ morbis tam imposito quàm fori & suffitu auxiliatur. Contra viperarum morsus vncias duas bibere prodest: item aduersus pectoris dolores, conuulsa, inflationesque ex vino & Absinthio. Venerem ex mulso stimulat, latus ventris tineas pellit ex aqua: horroribus ex oleo ante febrium accessiones, & neruorum resolutionibus oblitur: vitia cutis in facie cum aqua vel melle illitus emendat. Additur in antidota & malagmata. De eo sic Galenus. Costus leuiculam planè amaram, plurimam autem acrem, & calidam in se qualitatem, simul & facultatem continet, adeò vt etiam exulceret. Vnde ipso cum oleo perfricant corpus ante accessiones in rigoribus per circuitus redeuntibus. Sic verò etiam in resolutis & ischiadicis, atque in summa in quibus excalfacere partem quamuis, aut ex alto in superficiem attrahere aliquem humorem opus est, ad Costum confugitur. Eadem de causa vrinæ mensesque prouocat: & ad rupta, conuulsa, ac laterum dolores conuenit. Porro ob amaritudinem quæ illi inest, lumbricos latos enecat. Ob eandem & ad contractas velut à Sole maculas cum aqua aut melle vsurpant. Inest item flatuosa illi humiditas, per quam & venerem excitat cum vino mulso.

Lib. 7. simi.

NominaCap. 172.
simpl.**Forma.****Locus.****Temper.****& Vires.**

Li. 2. c. 734.

Cap. 743.

Cap. 736.

Cap. 161.

simpl.

Lib. 7. c. 3.




V AE Officinis Zedoaria, Græcis recentioribus *Ξαδύρα* dicitur, iisdem Officinis Zurumbet & Zerumbet. Quæ duæ radices peregrinæ, ex facultatibus potius quàm ex ipsarum plantarum partibus notæ notis, Græcis veteribus incognitæ fuerunt. Quare ex aliis petendæ descriptiones. Serapio de iis sic scribit ex auctoritate Isaac. Zurumbet, id est, Zedoaria, sunt radices rotundæ, similes radicibus Aristolochiæ rotundæ tum facie, tum magnitudine, verùm sapore & colore Zingiber æmulantur. Deferuntur ex Chinarum regione. Excalfacit & siccatur ordine secundo. Flatus discutit, & propria quadam facultate impinguat. Pòst sumpra graue virus animæ, quod allium, cepa, vel vinum excitauerit, abigit. Venenatorum animalium moribus confert, aluum sistit, vteri abscessus resoluit, vomitiones reprimat, coli dolores à flatu ortos mulcet. Auicenna Zedoariam dixit esse portiones similes Aristolochiæ, minores tamen. Addit meliorem esse illam quæ cum Napello crescit, eiusque vicinitate Napelli vires plurimum debilitari. Aliquantò pòst Zeduar siue Algieduar Zedoariam esse opinatur. Alio capite Zurumbet ait esse lignum simile Cypero, sed maius, & minus odoratum, easdemque eius vires recenset, quas Serapionem ex diuersis auctoribus suo Zurumbet, id est, Zedoariæ assignare diximus. Hoc tantum distat, quòd Auicenna Zurumbet calidum & siccum esse ordine tertio ponit, Aben Mesue apud Serapionem calidum & siccum secundo duntaxat. Hic conferre moribus venenatorum, ille valde conferre moribus venenatorum vermiu, ita vt ad Zedoariam proximè accedat. Quibus verbis innuit aliquid esse inter Zurumbet & Zedoariam discriminis. Serapio alio capite Zurumbet aliud describit hisce planè verbis. Zurumbet est ex speciebus odoriferis, & propter hoc admiscetur cōfectionibus aromaticis, & est calidum & siccum prope tertium gradum, & est in virtute sua simile Cassiæ lignæ & Cubebis. Et dixit Cassidonium. Si non habes Cinnamomum, pone pro eo Zurumbet. Hæc se ex Galeno & Paulo transfulisse ait, ne detracta quidem aut addita vna litera. In quibus vt falsò Galenum citat, ita Pauli orationem, qua de Arnabone agit, ad verbum conuertit. Sic enim ille. Arnabo ex aromaticis est, vnde maximè in vnguenta miscetur, vt quòd calidæ ac siccæ sit facultatis in tertio ordine, Cassiæ aut Carpesio similis. Vnde etiam Possidonius (perperam in Serapione Cassidonium legitur pro Possidonius) Cinnamomo nō præsente, hoc vsum se esse dicit. Perspicue videre licet Serapionem Zurumbet cum Pauli Arnabone eundem statuere. His subiungit descriptionem Zurumbet auctore Isaac. Est arbor magna quæ nascitur in montibus, in Oriente, nullum ferens fructum, folia verò longa in viridi citrina, foliis Salicis similia, ramos eiusdem coloris: odore est Citri, calida & sicca, adstringens. Resoluit & aluum sistit. Inest & ei partium subtilitas. Ex quibus perspicere licet Serapioni Zurumbet & Zedoariam easdem esse radices, nisi deprauata sint eius exemplaria, item aliud Zerumbet arborem: Auicennæ verò diuersas esse plantas, vt qui Zedoariam radices Aristolochiæ radicibus cōpararit, Zerumbet lignum Cypero nisi hic sit interpretum error, qui Zurumbet Aristolochiæ radicibus, Zedoariam Cypero cōparasse debuissent, præsertim cum ei quæ Cypero similis est, easdem prorsus tribuerit vires quas Serapio Zedoariæ, vt ostendimus. Quod & indicat Bellunensis, cum scribit. Zedoaria apud Arabes quosdam appellatur Cyperi Indi, quia nascitur in India, & assimilatur Cyperis. Hæc Arabes de Zedoaria & Zerumbet literis mandarunt. Ex quibus expendere oportet, an duæ radices, quæ in Officinis Zedoariæ & Zerumbet nomine veniunt,

næunt, eæ sint quibus vsi sunt Arabes. Qui dubitât, imprimis descriptionē competere negant, quòd nostra vulgaris radix sit oblonga, lauis, foris candicans, intus ex flauo rufescens, aromatica, amara, figura Zingiberis, valde acris. Matthiolus radicem hanc ob id non esse Zedoariam non censet, quòd longa sit: esse enim quassdam radices longas, alias rotundas Aristolochiæ similes, quales à Calzolario pharmacopœo Veronenſi se accepisse narrat, quæ Zedoariæ nomine comprehenduntur, quòd eiusdem sint saporis, coloris, & odoris, nec nisi forma differât, vt quemadmodum Aristolochiæ, ita Zedoariæ duo sint genera, alterum longum, alterum rotundum. Pena & Lobellius hac de re ita statuunt. Zedoariam & Zerumbet vt

In cap. 154.
lib. 2.

ZERUMBET Serapionis, & Zedoaria eiusdem radices partes.



nominis, sic eiusdem radicis partes esse, nec secus inuicem differre, quàm Cyperum rotundum vel longum à suis coherentibus radicibus: cuiusmodi videndi & habendi copia fuit Antuerpiæ in Myropolio simplicium ditissimo Francisci Pennini. Eoque Serapionem Zedoariam eandem cum Zurumbet dixisse, vt quemadmodum Doronicis, Aristolochiis & Oenanthis euenit, variam nancisci radicis molem, aliàs oblongam, teretem, aliàs orbiculatam & nodosam, sic euenisse Zedoariæ, cuius naturæ, sicut & nominis particeps est Zerumbet, quia amaror, feruor, odor, color, ingratus vehementior gustus, modus, durities, duratio eadem, & vsus ad colicos cruciatus, præsertim aduersus venena certissimus. Vnde Zedoariæ nomē fluxisse ingeniosè cōiectatur Pena. Indeque videtur Auicenna, Serapio, ac Arabes nonnulli designasse antidota multa, ampliore, vt solent, nominis Zedoariæ ambitu, vt quemadmodum Bezardica generatim vocarunt quæ vitam tuentur, ita celebrem quandam arborem foliis salignis, odore Citri, eodē Zedoariæ aut Zerumbet nomine donarint. Eo etiam significatu Auicenna dixisse meliorem esse Zedoariam, quasi dicat

Li. 2. c. 734.

Antidotum, quæ radicibus Napelli adnascitur, eiusque & aliorum venenorum esse Theriacum, qualem se expertum fuisse ait, & copiosam eruisse in variis montibus, quod fabulosum esse Garcias dixit. Ergo triplicem Zedoariam Arabes innuere voluisse Pena existimat, oblongam vulgariorem ad Cyperum propius accedentē, & huius speciem Zerumbet rariorem nobis rotundam dictam, tertiam egregiam illam arborem, hodie incognitam. Non desunt qui Zedoariam Officinarum Costum Arabicum, vel Syriacum Dioscoridis esse opinentur, quòd, multæ ei Costi notæ satis quadrare videantur. Diuersâ prorsus Zedoariam nobis enarrat Garcias, quam Geiduar vocat Auicenna, magnitudine glandis, eiusdem ferè formæ, colore sublucido. In regionibus Chinesum prouinciæ finitimis nascitur. Ait magno emi, nec facile inueniri, nisi apud circūforaneos quosdam & circulatores, qui peregrinationibus, & stipem emendicando vitam sustinent. Ab his (quod mirum videri debet) Reges & magnates Geiduar emere. Hoc Dioscoridi incognitum fuisse, atque etiam Auicennæ. Porro ad plurima vtile esse, præsertim aduersus venenâ, & venenatorum animalium ictus morsusque. Id Europæ quoque hodie ignotum esse ex descriptione liquet, nec facile cognosci posse ob has quas adfert causas. Nam

Li. 1. Arom.
Indic. c. 43.

Li. 1. Arom.
Ind. ca. 42.

Lib. I. Aro.
Ind. ca. 43.

Zedoaria nostra nihil minus est quàm hoc Geiduar. De Zerûbet verò hæc tradit. Arabibus, Persis, & Turcis *Zeruba* vocari, in Guzarate, Decan, & Canara, *Cachorra*, in Malauar *Cua*. Copiosè prouenit in Malauar prouincia, videlicet in Calcut & Cananor, tum sata, tum sponte in siluosis earûd. in regionum locis, vnde à multis Zingiber siluestre dicitur, nec id sine ratione, inquit, quoniam eius folia Zingiberis foliis similia sunt, maiora tamen, & magis aperta, radix Zingibere maior. Radicem erutam ait concidî & siccari, deinde in Arabiam, Persiamq; deferri, in Gida & Alexandriam, inde postea Venetias, & alias regiones transferri. Conditi etiam saccharo, & præstantiorem esse Zingibere candido. Ex quibus ille colligit Auicennæ ignotam fuisse Zedoariam, vt iam diximus, solam verò Zerumbam aut Zerumbet cognitum. Cùm enim vidisset radices quasdam in frustra rotunda, alias in oblonga sectas ad sinum Persicum vehi, duo genera existimasse, Zerumbam, de quo nomine Zedoariæ priùs tractat, & Zerumbet, de quo postea. Hac de causâ folia quæ nō viderat prætermisisse, radices quales ex India in alias regiones transferebantur duntaxat expressisse. Serapionis verò emendatos codices scribit additâ expositionem Zerumbet, id est, Zedoaria, nō habere, sed ab interprete adiunctam, qui differentiam inter Zedoariam & Zerumbam, siue Zerumbet ignorabat. Quâ ex eo perspicuè deprehendi ait, quòd Zedoariam ex Chinarum regione conuehi dicat Serapio. Certum enim esse Zedoariam in Chinarum regione nasci, raram autem in India reperiri: Zerumbam autem copiosè in India nasci. Sed quid de Zedoaria & Zerumbet sentiendum sit, item de Garcie Zedoaria iam fusiùs diximus. Reprehendit etiam eos Garcias, qui Pauli Arnabonem eundem esse cum Zerumbet opinantur: quia Arnabo Pauli, arbor sit procera, suauis odore fragrans. Zerumba verò graminea planta. Quam in re ipsèmet reprehendendus est, cùm apud Paulum de Arnabone scribentem nulla arboris mentio fiat, ac ne stirpis quidem, sed ex aromaticis esse, ideò in vnguento addi, & cætera quæ suprà posuimus. Annotat Clusius inueniri Antuerpiæ apud quosdam aromatarios Zedoariæ genus, illis *Bloczenaar*, quod tuberosam Zedoariam significat, nuncupatum, rotundum instar Aristolochiæ rotundæ, foris nigricans, interdum cinerei coloris, intus candidans, gustu vulgaris Zedoariæ. Eam radicem quoniam multum cum

Li. 2. c. 734.
Cap. 736.

ZERUMBET Serapionis, Clusio.

Lib. 7. ca. 3.



Serapionis Zerumbet conuenire curauimus.

TERRA MERITA.

CAP. XLIIII.

Nomina
Lib. I. ca. 4.



REGINA hæc radix, Curcuma Officinis dicta, Gallis *Terra merita*, Cyperus Indicus Dioscoridis esse creditur. Sic enim ille. Aliud Cyperi genus tradunt in India nasci Zingiberis effigie, quod manducatum Croci vim reddit, gustu amaro sentitur, & illitum præsentem Psilothri vim exhibet. Quæ omnes notæ Curcumæ Officinarum aptissimè conueniunt. Est enim radix Zingiberis effigie, crocei intus coloris, quæ manducata croceum colorem reddit, amara, cuius & in psilothris vsus est. Sed cùm Dioscorides Zingiberi radicem hanc comparet, & reuerà Zingiberi propior sit quàm Cypero, mirum est cur Cyperi speciem fecerit. Quare verisimile est eum quæ de Indico Cypero scripsit, ab aliis auditione accepisse, & speciem Cyperi esse apud quosdam

Forma.

quosdam legisse, eoque fortasse minùs aptè dixisse, vt annotauit Pena, Zingiberis radices paruas, candicantes, odoratas Cyperi modo. Est enim Curcumæ valde exigua cū Cyperis similitudo, cum Zingibere magna. Præterea vires quasdam similes habet (præter croceum succum quem mansu emitti) cum Zingibere, tametsi gustu ingnauiore, ingratiore, facultate verò viscera ab obstructione liberandi potiore. Idè, inquit Pena, cursores & mulierculæ cum Zingibere miscent ad icterū. Vis autem illa pſilothi videtur elanguescere, longo temporis & locorum intervallo, atque tereidine, cui obnoxia est, minùs tamen quàm Zingiber. Picſtoribus & chymistis quàm medicamentis hodie frequentior est, attamen in electarium assumitur Diacurcuma nuncupatum aduersus ægritudines inueteratas, hydropem, & cachexiam perutile. Hic non omittendū quod prudenter animaduertit Matthiolus, Curcumam Serapionis non esse eam de qua hic agimus. Illa enim nihil aliud est quàm Chelidonium Dioscoridis. Quod vel Serapionis ipsius, vel interpretis errore accidit: nam Curcuma neque Mauritanum, neque Græcum est vocabulū. Mauritani enim Chelidonium *Kauroch* vocant: ex quo perspicuum est Curcumam pro *Kauroch* in Serapione deprauatè legi. Quod cū tum Medici, tum seplasiarij non animaduertissent, & cuiusnam plantæ hæ radices essent ignorarent, eas Chelidonijs maioris radices esse crediderunt, ob crocei succi similitudinem, quæ sunt Cyperi Indici. Quare deprauatam Serapionis lectionem secuti, has Curcumam nuncuparunt.

*Vires.*In cæs. lii.
Cap. 296.
simpl.

CHINA RADIX.

CAP. XLV.

CHINA, vt scribit Nicolaus Monard. Orientalis Indiæ prouincia est, Scythiis atque Sericanis finitima. Est Chinaram regio vastissima, vt refert Garcias ab Horto, quæ ad Moscouiam vsque extendi creditur. Li. i. Arum
Ind. ca. 38.
Addit Chinenses esse Asiaticos Scythas: & quamuis barbari esse existimantur, in negotiatione tamen, & in artificijs quæ manu perficiuntur esse admodum industrios, neque cuiquam regioni in literarum cognitione cedere: habere etiam leges scriptas Imperatorio iuri similes, & apud eos doctrinæ esse gradus & præmia, eruditissq; viri Regis, totiùsque regni moderationem committi. His addit artem Typographicam tam vetustam apud illos esse, vt omnem hominum memoriam superet, & semper apud illos vsurpatam fuisset. Hæc Garcias. Scuit in tota hac prouincia, atque in Iapā lues venera, cui malo vt succurrerent, benignus Deus radicis vsum dedit, quæ apud eos nascitur, à nobis à loco natali China nuncupata, quemadmodum Guayaci Noui orbis incolis, qui eodē morbo infestantur. Scribit idem Garcias plantam ab indigenis vocari Lampatan, trium aut quatuor cubitorum altitudine assurgere, cauliculis tenuibus, quos rara cingunt folia, Mali Assyrij iunioris similitudine radicem palmi longitudine, interdum crassam, nonnunquam tenuem, quæ recens enata admodum tenella est, & cruda & elixa mandi potest. Vnicam duntaxat plantam in Goasè vidisse, eamque perpusillam, quæ siccitate perit antequàm excreuisset. Si seratur ea radix, iuxta arbores serendam esse aiunt, quoniam Hedera modo eas scandit & amplectitur. Aliter describit Nicolaus Monard. Chinam Arundinis maioris radici similem esse, nodosam, intus albam, interdum rufescentem, foris rubram. Optimam esse recentem, ponderosam, solidam, pinguem, non cariosam, insipidam. Eius figura ex recentissima, & suis propaginibus adhuc coherente hic expressa est, quæ demonstrat eam sub terra serpere, ac variis ex locis teretes, ac lignosos processus emittere, quibus noua radicū altarum soboles adnascitur, & incrementum capessit, multis & tenuibus alioqui fibris capillata, quibus nutrimentum attrahit. Est autem grandior & adultior radix scabris & inæqualibus nodis tuberosa, cortice obscurius virente Galangæ

Electio.

CHINA radix.



- Locus.** Nascitur hæc radix in China Orientalis Indiæ regione, vt dictum est, maritimis locis, Arundinis aut Vluæ palustris modo. Nicolaus Monard. auctor est etiam in Occidua India provenire, seq; vidisse huiusmodi radices alias paruas, alias magnas, in Hispania noua à D. Frâncisco de Mendozza collectas, & recētissimas inde delatas. Decocti ex China radice propinandi, & eius vtendi hæc est ratio. Obseruat is iis quæ in omnibus morbis obseruare decet, nimirum natura morbi, anni tempore, regione, sexu, ætate, temperamento ægri, atque exquisitè purgato corpore, radice vncia minutim concisa fictili nouo imponitur: huic infunduntur aquæ sextarij tres, maceratur viginti horas fictili obturato, coquitur lento igne ex prunis accenso ad dimidias, frigescit, colatur, atque in fictili nouo aut vitreo vase asseruatur. Eius aquæ calidæ vncias decem æger hauriet, duas horas aut paulò diutius sudabit: sudore deterso indusum & linteamina mundis & calfactis mutabit, postea in lectulo duas aut tres horas perdurabit: deinde vestitus calidè se in cubiculo continebit. Circiter vndecimam prandebit. Prima mensa iusculum sumet, deinde pullum coctum, aut gallinæ quartam partem, aut veruecinam aliquando elixam, aliquando assam cum pauco sale: pro bellariis carnes Cotoneorû, aut quid simile. Poterit & sumptio iusculo passas vuas, aut pruna passa cocta edere. Cum cibis panis bene cocti crustis, aut biscocto vescetur. Potus erit eadem aqua quam ieiunus sumpsit, aut dilutior. Si inter pastus bibere velit, eadem aqua cum conserua aliqua propinabitur. Qui igitur hac radice vtuntur, tenui illa victus ratione non egent, qualis in Guyaci vû requiritur. Abstinendum tamen est à bubulis & suillis carnibus, piscibus, crudis fructibus, tametsi ne à piscibus quidem in China regione abstineant, quoniam magni sunt helluones. Aliquando tenera tantum radice Chinenfes vtuntur cum carne elixa, quemadmodum & nos nasis, aut rapis cum carnibus elixis. Mirabiles sunt eius virtutes ad luis venereæ curationem: efficaciorq; est in inueteratis morbis, in quibus videlicet magni sunt tumores & vlcera maligna, quàm in recentioribus. Nec solum ad eos morbos valet qui cum contagio luis venereæ commune aliquid habent, sed etiã ad tremores, paralyses, articulorum
- China decoctû.**
- Vires.**

Galangæ ferè modo vestita, cùm recēs est succulenta, cùm exaruit fungosa, & intus laxa, è rubro dilutè pallida, quæ diutius seruata carie & teredine facillè vitiat. Quod si acciderit, mercatores foramina à teredinum erosione aut carie facta obturât bolo Armenia aqua diluta, velut cemento quodam, obducuntq; extrinsecus pari fraude totam radiceis molem: quæ fraus & natium illius colorem ementitur, & ei pondus addit. Illam præferunt quæ ponderosa est, & quæ quantum in eius arida natura fieri potest, maximè succulenta est, quæ à teredine, carie, putredine est illæsa: quibus vitiis obnoxia est, quæ recondita fuit, & in longum tempus seruata. Saporis est fatui, perinde ac Suberis cortex citra omnem adstrictionē, aut oleosa pinguisve substantiæ occursum. Est & eius decoctû prorsus insipidum, nō aliter quàm Hordei integri, colore subrubrum, seu colore vini gilui. Eam ob causam *ατροιον* radicem hanc quidam vocauerunt, quemadmodum & olim Græci aquam salubrem omnis qualitatis expertem.

articulorum dolores, ischiada, podagram, tumores scirrholes & œdematodes. Strumas etiam extirpat, succurrit ventriculi imbecillitati, inueterato capitis dolori, calculo, & vesicæ vlceribus. Primum innotescere cœpit huius radicis vsus post annum 1535, adferentibus eam in Indiam Chinenfibus quibusdam ea lue infectis, qua se intereâ dum illic negotiarentur curarent. Postea Lusitani reliquo orbi communicarunt.

*RADIX CONTRA VENENA, CARLO SANCTO,
RADIX S. HELENÆ. CAP. XLVI.*

RX CHARCIS Peruana prouincia, ita referente Nicolao Monard, radices quædam aduehuntur Iridis radicibus valde similes, sed minores & ficulnei folij odore. Hispani Indias inhabitantes *Contrayerua* appellant, quasi dicas alexypharmacum, quoniam earum puluis ex vino albo sumptus, aduersus omne venenum, cuiuscûque sit generis, præsentissimum est remedium (vno sublimato excepto, quod sola lactis potione extinguitur) vomitione illud reiicere faciens, aut per sudores euacuare. Sed & amatoria pocula, eo puluere hausto, reiici ferunt. Ventris etiam animalia pellit. Gustata radix aromaticum quiddam sapit cum acrimonia coniunctum. Quare calida videtur in secundo gradu. Nicolaus Monardi narrat ante triennium ex prouincia Mechioacan delatam esse radicem quandam *Carlo sancto* dictam, cuius insignes facultates prædicant. Nostro Lupulo similis est, & perticis se conuoluit illius more,

*RADIX Carlo sancto,
Monardi.*



re, quibus si careat, per humum spargitur & diffunditur: folia etiam Lupulo similia, colore viridi, sed obscuriore, odore graui: neq; florem, neq; fructum fert. Radix crasso capite est, ex quo aliæ radices oriuntur digiti maioris crassitudine, colore candicante: cortex qui facile separatur, cuiusque vsus est, odore aromatico, gustu amaro cum quadam acrimonia: neruus radicis cortice spoliatus, multis quasi fibris, seu tabellis tenuissimis constare conspicitur, quæ singillatim separari possunt. Nascitur temperatissimis prouinciæ Mechioacan locis. solo neque nimium siccò, neque humido. Calida & sicca initio secundi gradus. Radicis cortex manet aliquanto tempo-

Locus.

*Temper.
& Vires.*

re commanducatus, multam pituitam, aliosq; humores ex capite elicit, eamq; ob causam rheumatismos & capitis dolores & defluxiones curat: in nonnullis etiam vomitu multam bilem & pituitam ex stomacho expellens, sed illius decoctum maxime, cuius gratia ventriculorum noxiis humoribus liberat, eumq; roborat, purgationem tamen præcedere necesse est. Idem commanducatus gingiuis abscedentibus auxilio est, dentesque stabilis, eosque à scabritia & corruptione liberat, orisq; halitum commendat: sed postea vino os eluendum ad amaritudinem tollendam. Pulueris exigua quantitas ex vino albo, aut Adianti, aut Canellæ decocto sumpta vuluam obstructionibus liberat, menses prouocat, flatu discutit, purgato prius corpore, & aluo (dum eo remedio vtetur) ex aquis partibus Liquidambar, & vnguenti Dialthææ inuncta. Cordis affectibus, iis præsertim qui ex vteri sympathia oriuntur, auxilio est puluis vt antè sumptus, aut illius decoctum hoc modo præparatum. Radicis minutim concisæ drachmæ duæ in aquæ sextario & dimidio coquantur ad dimidias, corticis Citri in puluerem reducti drachmæ quatuor, pulueris Canellæ drachmæ duæ statim iniiciuntur, ac denuo feruent, deinde colantur.

Istius

Istius decocti sex vnciæ singulis diebus manè addito saccharo propinquantur, purgato tamen prius ut decet corpore. Eundem pulverem & idem decoctum nonnulli in morbi Hispanici affectibus, atque in epilepsia commendant. Narrat idem *Radix S. Helena.* Nicolaus Monard. ex portu S. Helenæ, qui est in Florida provincia, adferri radices quasdam prælongas, sed nodosas admodum, pollicari crassitudine, foris nigras, intus albas, sapore aromatico, Galangæ ferè simili. Resectis his nodis & perforatis fiunt precatoriæ sphaerulæ, quas milites Hispani & Indi è collo suspendunt, & multum illis tribuunt. Hi siccati rugantur, durique & quasi cornei fiunt. Planta ramos suos per terram diffundit, foliaque ampla & viridia admodum profert. Nascitur

PATER noster, vel Radix S. Helena, Monardi.



Locus. locis humidis. Sicca initio, calida in fine secundi gradus existimatur. Has radices Indi lapidibus conterunt, totique corpori inducunt balneaturi: quoniam cutim constringunt, & membra, ut inquit, suo grato odore roborant. Illius pulvis cum vino haustus in ventriculi doloribus, urinae difficultatibus & nephritide commendatur. Hæc planta, sicut annotat Clusius, ut ex eius descriptione facultatibusque colligere licet, ad Cyperi genus aliquod referri poterit.

PERSEA,

CAP. XLVII.

Nomina



RBOR περσεα Græcis, similiter Latinis Persea nominatur. Quidam Persion ipsam etiam appellant. Qui hanc arborem eandem esse existimant, & Malum Persicam vulgò notam, de qua iam tractavimus, certè hallucinati sunt, ut ex Theophrasti, Dioscoridis, Galeni, Plinij testimoniis perspicuum fiet. Perseam veram Theophrastus his verbis de-

Lib. 4. hist. cap. 2. Formæ.

PERSEA America, Matthioli.



pingit. Est in Ægypto alia arbor Persea vocata, aspectu magna, & pulchra, sed maxime similis Pyro, & foliis, & floribus, & ramis, & tota figura, præterquam quod hæc folio perpetuo est, illa deciduo. Fructum autem fert multum, ipsumque omni tempore maturum edit, nouo semper veterem occupante. Maturat autem sub Etesiarum flatum. Reliquum crudiorum tollunt & reponant. Est autem Pyro magnitudine par, figura oblongus, Amygdali specie, colore herbis. Intus nucem habet quem admodum Prunum, sed multò minorem, & molliorem, carnem verò valde dulcem, iucundam, & concoctum facilem: nihil enim lædit eos, qui multum ederint. Arbor hæc radicem excellitum longitudine, tum crassitudine, tum etiam multitudine. Materia est robusta, aspectu pulchra, nigra Loti modo, ex qua simulacra, lectulos, mensulas, atque alia huiusmodi conficiunt. Persea Dioscoridi arbor est in Ægypto, fructum ferens cibo idoneum, stomacho vtilem, in quo phalangia Cranocolapta nomine inveniuntur, præsertim in Thebaide.

Arida

Arida folia in farinam redacta, illitu sanguinis eruptiones sistunt. Arborem hanc prodiderunt aliqui in Perside exitiosam esse, translatamque in Ægyptum mutata natura in cibos receptam. Hæc Dioscor. cum antea alio capite de Persicis egisset. Galenus duobus locis de Persica malo, & Persea seorsum tractat. Persicam, inquit, vidi in Alexandria: ex magnis & ipsa est arboribus. Narrant autem fructum huius apud Persas adeo esse noxium, ut eos qui ederint interimat, qui tamen si in Ægyptum transferatur, sit esculentus, manditurq; non aliter quam pyra & mala, quibus etiam magnitudine conuenit. Idem cum dixisset Persicæ folia vincentem habere amarā qualitatem, & cætera, multo post scribit, Persea folia adstringentem vim modicam participare, adeo ut queant etiam nonnunquam vtiliter sanguinis eruptione affectis partibus imponi: ac rursus, In sola Alexandria, inquit, Persea arborem vidi, at non in alia Romanis subdita gente. Quidam Persion ipsam etiam appellant, aiuntq; in Persis lethalem eius arboris fructum esse, cum tamen in Ægypto innoxius sit. Quare cum Persea historia Persicæ Malo nullis notis conueniat, cum Dioscorides & Galenus diuersis locis de iis tractauerint, scripseritque Galenus se in Alexandria solum Perseam vidisse, Persica verò in Asia, Græcia, Italia notissima esse, aperte demonstrauit Persicam à Persica plurimum differre. Iam verò Plinius Perseam à malo Persica perspicue diuersam facit his verbis. Persicæ arbores serò, & cum difficultate transire, ut quæ in Rhodo nihil ferant, quod primum ab Ægypto earum fuerat hospitium. Falsum est venenatam cum cruciatu in Persis gigni, & pœnarum causa à Regibus translatam in Ægyptum terra mitigatam. Id enim de Persea diligentiores tradunt, quæ in totum alia est, Myxis rubentibus similis, nec extra Orientem nasci voluit. Eam quoque eruditiores negauerunt ex Perside propter supplicia translatam, sed à Perseo Memphi satam: & ob id Alexandrum illa coronari viatores ibi instituisse, vel ut in manuscripto legimus, coronam victoriæ sibi instituisse in honorem atque sui. Semper autem folia habet, & poma, subnascentibus aliis. Quod autem Plinius hinc non ex Perside translatam, sed à Perseo Memphi satam ait, Nicander Perseum Mycenis, non Memphi Perseam plantasse his verbis cecinit.

Li. 2. Alim.

Li. 7. simpl.
Li. 8. simpl.Lib. 2. c. ph.
par. c. 2.

Lib. 12. c. 12.

In Alexi.

Καίτε χαλαρὰ φθένει, μετ' ἀρρήνιος ἐλαίς,
Σιληρὸν ἀπὸ περσεΐνης χάρυα βλαβὸς διὸν ἐρύξῃ.
Περσεὺς ἦν ποτὶ πρὸς σιληρῶν κηρήδα γούαν,
Αὐχέν' ἀποτμήξας ἀρπῆ γονόεντα μεδύσης
Ρέει μυχὸν ἄρσιν ἐνηξήσιν ἀρέρης,
Κηφῆος νεῖ δ' ἄρσιν.

Quos sic Gorraeus conuertit.

Tunsa quoque interdum qua Persea protulit ossa
Palladio noxam depellent mixta liquori
Hanc olim Perseus postquam Cephæa liquit
Arma, & fecunda prædidit colla Medusa,
Cephæi noua dona, Mycenis intulit armis.

Nicander autem hoc loco aduersus cerussæ venenum remedia docens, Persea nunc pro Persicorum nucleis intelligere videtur. Nam Dioscorides contra cerussam περσεϊκῶν ὅτ' α' exhibet. Paulus verò, sicut hinc Nicander, περσεΐνης χάρυα ad id laudat, ut ipse Nicander inter Perseam, & Persicam Malum nihil discriminis nouisse videatur, & contra ipsum imprimis dictum esse credibile sit, quod ex Plinio supra memorauimus. Præterea idem Nicander octauum phalangij genus phalanæ muscæ circa faces noctu volitanti simile esse ait, & Persea foliis innutriti.

Lib. 6.
Lib. 5. c. 19.

In Theria.

Τὸ μέλος περσεΐνης ὑπολέφει) πτερόλοισι.

Hoc Phalangij genus à Nicandro nominatim non expressum, Cranocolaptam esse scribit eius Scholiastes, quem & κεφαλοκράτην appellari scribit, utroque nomine, ab eo quod caput impetat, sic nuncupatum, quod etiam Dioscorides de Persea tradit, ἐφ' ὃ τὰ λεγόμενα κρανοκόλπια φαλάνγια δέονται. Idem Scholiastes hoc loco Sofstratum citat, qui scribit Perseam Rhodacencam vocari, & ex Æthiopia in Ægyptum transplantatam fuisse. ἰστέον δὲ, inquit, ὅτι σώτρασος ἐν τῷ περὶ βλησίων, ἢ δακτύλων τὴν περσεάν, ἢ ροδακηνεάν χαλᾷσι, φησὶν ἀπὸ αἰθιοπίας εἰς αἴγυπτον μεταφύλακθαι. At Rhodacencam ostendimus, nihil aliud esse quam Malum Persicam, & Rhodacena, Persica Mala. Gorraeus itidem Nicandri interpretes, iis versibus quos modò citauimus subiungit. Persea ossa Persicorum ossa, siue nuclei, euidentem habent amaritudinem. Proinde calfaciunt, & detergent. Est autem Persea arbor, à Perseo dicta, & cetera. Ex quibus intelligitur, Nicandri interpretes & Sofstratum aperto errore Perseam, & Malum Persicam eandem arborem putasse. Fructus eius figuram hîc damus affabre expressam, quem fructum ex Ægypto Dalechampsius habuit, cum Theophrasti descriptione optimè congruentem. Nam pyri maiusculi formam præ se fert (pendebat enim vncias quatuor & semissem) sed statim à superiore parte qua pediculo hæret, multis locis tuberosam, in mucronem obtusum sensim desinentem, colore, cum diu exsiccatus fuerit, qualis erat is quem vidimus, foris saturatè rufo, pulpa semidigitum crassa, dulci, & gustu suauis, intus nucem coercente, totius fructus seu pyri specie, foris rufescētem, intus cornu pellucidi prorsus colore & duritiæ cum inaruit: in medio eius cauo nucleum nullum vidimus: aquam enim suauem eo concludi putamus quæ tempore absumitur.

*PERSEA America, Clusij,
cum fructu, Dalech.*


Lib. I. ca. 2.

Forma.



Fructus is aliquandiu aqua maceratus mucaginem in ea emisit succumque valde viscidum, & valde suauem. Annis aliquot ante quàm liber Clusij stirpium per Hispanias obseruataram prodiisset, hæc descriperamus: ex quo diuersam, ut arbitror, à superiore Perseam hîc apponimus, quam in solo Valentino vnicam vidit in monasterio D. Virginis, cui cognomen de Iesu, primo ab vrbe Valentia lapide. Ex America eò delata fertur. Pyro similis est, in latum diffusa, perpetua coma virens, ramis ex viridi pallefcentibus, foliis Lauri latifolia, parte superna virentibus, inferiore cinereis, firmis, nervis aliquot per obliquum discurrentibus, odore & sapore commendatis, cum adstrictione linguam mordicantibus. Flos illi est Lauri ferè, copiosus, racematim compactus, pallidus, sex foliolis constans: fructus per omnia pruno similis, deinde tempore pyri modo oblongus, nigro colore, iucundo sapore, nucleum cordis effigie continet, gustu castaneæ, aut dulci amygdalæ haud absimili. Vere florentem vidit. Autumno fructum ferre intellexit. Hæc Clusius.

CEREVS



portionis & figuram sortita. Intus torulus ligneus, carpi crassitie, obductus est callosa carne, & succo Aloës: gummeo enim turget, perquam amaro lentore: flores in vestigio summo promit, referente qui attulit, digitalis purpuræ fructus: hilari purpura miniata rubet, ficus ferè effigie, gustu non insipido.

PERUVIANA ALIA FACIE ARBORIBVS ITEM
INNASCENS.

CAP. XLIX.



IDEM cælo & natalibus ramorum arborum Indicarū debemus hanc vnde auulserunt qui Morgano miserunt, cespite latiore, sessilis caudicibus incumbit, fibrillis cepaceis radicata: vnde proximè surgunt folia inuicem conuoluta, tunicea, inferiùs fermè palmum lata, numerosa, quadantenus Aloës, aut Scyllæ: & superne in ligulas prætenues, mucronatas definentia: purpureum, striatum, concauum. alis donatum scapum Hastulæ regię, aut Aloës, duorum & trium cubitorum ambientia, quæ multis glumosis siliculis spicantur, Auenæ situi: magnitudine verò & sericeo tomento candido Apocinum, vel Asclepiadem repræsentant, & semine, sed Conisæ exili gustu salso, ingrato, nitroso, fortè quia in aura maritima adoleuit, vt Aloës illic in sabuletis.



POPVLVS America.



VISCVM Indicum ait Pena in Peruvianis insulis nusquam nisi in ramis & truncis arborum nasci solitum nostratis modo, multumq; adumbrare Sessili, sed transuersim excurrente radicis cespite: gramineis geniculis, & Polypodij quadatenus, sed albicantibus culmis, ex pallido virentibus, à medio summo tenus crassioribus, fungosis, striatis, sesquipedem longis, in quibus folia semper virent, Visci effigie, sed duplo maiora, crassiora, fungosiora secundum neruum folium medium intercurrentem: circulis vtrinque senis, veluti scalpro impressis, non parum admirandis.

POPVLVS AMERICA.

CAP. LI.

EX NOVO orbe elegantes ramos ac prægrandes mercatores Anglos illinc reuersos attulisse testis est Pena, ex quo effigiem hanc exhibemus. Virgulta sunt aliquantulum flexuosa, & per sesquipalmum palmumque crebra, geniculata, veluti infectione, commissuræque partium nodosa: vnde exeunt, singulo pediculo singula folia, ora exquisitè rotunda, nec vsquam nisi quâ pediculus hæret intercisa, crassa, rigida, latiora, arboris Indæ, cui flosculi alternatim exeunt, prælongis loculis, stipati acinulis multis, exiguis, planè Populi modo. Quare & hanc Populum Peruvianam vocare illi visum fuit: gustu perquam adstringente, aliquantulum calfaciente, subfalso.

PALMACEA, SEV ARVUNDINACEA PINNATA SPINOSA. CAP. LII.



SUNT huius plantæ indidem aduecti rami foliosi, illis affines, nec minùs intuenti effigie peregrina: quippe sambucini, aut ferulacei sunt, fistulosi & medullæ pleni, recti, rotundi, octonum aut denum cubitorum: sed per longitudinem triplici cartilagine, digium lati, pinnati aut alati instar telli: & oris extremis modicè fimbriis sinuata sunt cartilagineis, stellulisque spinosis ornata, solertis opificis sapientiam arguentes. Alterius etiam illic natæ arboris

PALMACEA *pinnata*
spinosa.

NERII facie arbor, Pena.

arboris truncum aut bacillum hîc proximè exprimendum curauimus qualem vnâ accepimus: quod carpi crassitie est longa hasta & cortice nigro, densoque vestitur, tuberculis crassis, fenticosis, creberrimis in clauæ modum muricato, solido, graui & præduro ligno.

NERII FACIE ARBOR
Pena. CAP. LIII.


ARBORIS peregrinæ Nerij facie ramulum, cuius perpulchræ sunt siliquæ, pingendum curauit Pena, & paucis descripsit. Propendent siliquæ de ramis & surculis Sambuci palustris, medullosis, pallidis, pullis, nodosis, sequipalium & pedem longis vaginis, cutaceis, vno cohesu septenis aut nouenis, singulis gracilem lampetram exprimentibus. Intus farciuntur pelliculis cepaceis & tomentosis, adeò exuium serpentis emittentibus, & quiddam cadaueruli anguini simile inuoluentibus, vt pueris terrori sit: consimili florum exortu oblongi exeunt caliculi, Herbar sanctæ aut Stramonix.

FAGARA Auicenna. CAP. LIII.



MAHALEB meminit Cladius in Historia Aromat. Indicorum de Fagara Auicennæ hæc scribens. Fagara fructus est Ciceris arietini magnitudine, cortice tenui cõstans ex cinereo nigricante, cui subest tenue putamen nucleum continens satis solidum, & tenui nigraq; membrana obductum. Integer fructus cum magnitudine tum forma & colore adeò similis est ei

FAGARA, Auicenna.



quem Officinæ Coccū Indū, Galli *Coque de leuant* appellant, vt primo aspectu fallere, & pro eo sumi possit. Meminit huius Auicenna, ca. 260. hoc modo. Fagara quid est? Granū simile Ciceri, habens granum Mahaleb, & in concauitate eius est granum nigrum, sicut Schehedenegi, & asportatur de Sofala. Collocat verò eam in tertio calefacientium & siccantium ordine, atque stomachi & hepatis frigiditati vtilem esse, concoctionemque iuuare, & aluum constringere scribit.

Forma.
Theuetus
cap. 12. lib.
sing.
Vires.



VLTAE sunt aliæ siluestres & peregrinæ plantæ admirabiles, quarum nonnullæ folijs descriptionibus nobis notæ esse potuerunt, quod ij qui in exterâs illas regiones nauigarunt, in quibus proueniunt, earum figuras non expresse- rint Inter arbores in Regno Senegæ vna est glandiferarum nostrarum crassitudine, fructum ferens dactylis parem, ex cuius nucleo oleum exprimunt miris virtutibus præditum. Aquæ permistū croceo colore planè inficit, quo tingunt pocula, ac pileos quosdam ex iunci, vel orizæ paleis contextos. Præterea id oleum odore est Violæ Martiæ, olei nostri sapore. Quamobrem multi pisces, orizam, aliósque cibos eo condiunt.

PALMAPINVS, SIVE CONIFERA.
CAP. LVI.



VLGARIS Palmæ congeneres esse multas siluestres in sinu Guineæ Oceani occidui, quæ steriles sunt, nec nisi exilitate à satius absunt, Pena inrellexit ex mercatoribus Gallobritonibus, qui illuc quotannis ferè commercij causâ adeunt. Inter quas & alij Angli institores non parum venustam & miram hanc iconem hîc expressam ibi oriri illi affirmarunt,

PALMAPINVS
siluestris.



PALMAPINVS, sive
Conifera, Pena.



Forma.

eiusdemque ramos luculenta conorum fœtura onustos attulerunt: quorum arborem quasi quandam ex Palma & Pino hybridam naturam ludibunda videtur constasse. Lignum ipsum fungosa est Palmæ prorsum textura, in villos totum dehæscens, & squamosa cute loriatum, fastigiato termitum numerosis & in orbem exortis furculosis ligulis quadraginta, aut quinquaginta, compacti verticillorum & squamarum serie pyxidatim articulatis, pedem longis, rotundis, parum compressis, quarum singulis commissuris singuli numerosi coni altius inseruntur triceni, aut quadrageni, qui mediocrem conum Cedri ementiuntur, puluillis in quincuncem digestis, reticulatoq; & imbricatim extuberante ventricoso nuci cortice fusco, nitido, polito, crassitie & concretionem nucis Indicæ, intus nucleum glandemve oblongam sesquiunciam, aut duas uncias longam, præduro, & in farinam ægre friatili, gustu glandis & castanæ, quæ sunt ei genti panis supplementum.

GENIPAT

GENIPAT. CAP. LVII.



MAGNI æstimatur in America arbor, quæ Genipar dicitur, maximè fructus eiusdem nominis causa: non quòd esculentus sit, sed q̃ alios vsus Barbaris præbeat. Arboris folia Nuci iuglandi similia sunt, fructus ferè in ramorum extremo prouenit, aliis aliis impositis mirando quodam modo. Is magnitudine, colorèque Persicis nostris similis est, ex cuius succo vniuersum corpus inficiunt hoc modo. Miseri illi, & bruti homines, cum succum ex hoc fructu aliter exprimere nesciant, illum mandunt, ac si voraturi essent, deinde ore reiciunt, & manibus veluti spongiam exprimunt, vt succum emitat, qui admodum limpidus est. Profecturi igitur illi aut ad stragem aliquam edendam, aut ad inuisendos amicos, aut ad solenne aliquod, totum corpus hoc liquore madefaciunt. Is quo magis in corpore exsiccat, eo magis natuum colorem acquirit, qui vix verbis exprimi potest: est enim quodammodo inter nigrum & cœruleum, siue eum colorem qui vulgò azurus dicitur, medius. Hoc insecti Barbari incedunt, non minùs ornatos sese existimantes, quàm nos nostros coccineis, ac fericis vestibus. Est alia arbor etiam Genipar appellata, cuius fructus maior est, & edulis.

Forma.
Theue us
cap. 32. lib.
sing.

Vsus.

HYVOVRAHE. CAP. LVIII.



SILENTIO non prætereunda arbor, quam ob raras dotes Barbari Hyuourahe appellant, id est, rem raram. Arbor est procera, cortice coloris argentei, ligno rubescente, gustu ferè salso, aut ligni glycyrrhizæ. Corticis mira est virtus, & mirandus effectus. Quare eodem est in pretio apud Barbaros, quo Gaiaicum apud nos. Fuerunt etiam qui Gaiaicum verum esse existimauerint, à quibus dissentit Theuetus. Quicquid enim similes Gaiaco vires habet, Gaiaicum dici non oportet. Nihilominus Christiani hoc cortice Gaiaci loco vtuntur ad curandum morbum Indicum hoc modo. Corticis huius, qui recens ab arbore sua auulsus lacteum succum emittit, quātum fatis sit in particulas concidunt, tres quatuorve horas in aqua decoquunt, donec vini rubelli colorem acquiserit. Hoc decocto quindecim vel viginti diebus vtuntur continuis, cum tenui victu. qua ratione, vt audio, curatur optimè morbus Indicus, nec is modò, sed quiuis alius, qui à frigidis & pituitosis humoribus pendet, qui huiusmodi decocto attenuantur, ac probè exsiccantur. Eundem Americi in morbis vsurpant. Estq̃ huius potio etiam sanis suauis ima. Est etiam aliud in hac arbore præstantissimum, nimirum fructus ipsius pruni nostri mediocris magnitudine, auri obryzi colore, nucleum concludens mirè suauem & delicatum, agris, & iis quibus prorsus deiecta est appetètia vtilissimum. Præterea hæc arbor quindeno quoque anno tantum fructum profert, quod plerisque incredibile videri posset: id tamen affirmare asseueratione possum, quod curiosi perscrutatus sum, didicique à senioribus Americis, quorum vnus arborem mihi ostendit, mihiq̃ asseruit se toto vitæ tempore ter quaterve solùm huius fructum gustasse.

Forma.

Theuetus
cap. 50.

Vires.

PENOABSOV. CAP. LIX.



PENOABSOV. ST etiam in America arbor Penoaabsou dicta, cortice odoris planè admirandi, foliis Portulacæ, valde spissis, perpetuò virentibus. Fructus edit magnos, grandioris pomi magnitudine, orbicularos, pilæ lusoriæ modo, minimè edules, imò venenatos. Singuli senas nuces intus habent, amygdalis nostris similes, nisi quòd latiuiculae sunt, & magis com-

Forma.
Theuetus
cap. 8.

pressæ in singulis singuli nuclei conduntur, qui ad sananda vulnera mirificè faciunt, quibus etiam vtuntur Barbari sagittis icti, aut quouis alio modo in præliis vulnerati, ex his contusis oleum exprimentes rufum, eoque vulnera illinentes.

PALMA VINIFERA. CAP. LX.



PROMONTORIUM Æthiopum, nunc Promontorium viride, vt infinitis arboribus, fruticibusque maximè fructiferis, ita etiam Palmis tum ob aëris naturam, tum summam soli fertilitatem abundat. Est autem ex Palmarum genere arbor pulcherrima, siue proceritatem, siue perpetuam viriditatem, atque alias speciosæ arboris dotes contempleris. Hanc instrumento aliquo incidunt, & aperiunt, tanto hiatu, vt in eum pugnus immitti possit, qui à terra pede vno, aut plurimum duobus absit. Inde manat succus, quem vasis terreis excipiunt ad hiatum vsque pertingentibus. Ex Palma Cichorin eiusmodi succum elici gustu suauissimum postea dicemus. Hinc in alia transfundunt, reponuntque in quotidianam potionem, quam Mignol appellant. Vt autem integrum diutius cōseruent, modicos sales, vt nos in omphacium nostrum, iniiciūt, à quibus consumpto humore crudo & immaturo liquor incorruptus permaneat. Colore verò & consistentia vinis albis Campaniæ nostræ, & Andium similis, gustus suauissimi, ad refrigerandum & ad sedandam sitim, cui incolæ ob continuos & summos æstus maximè obnoxij sunt, conuenientissimus, quique non minore apud eos est in pretio, quàm apud nos vina nostra præstantiora, quamuis eiusdem arboris fructus, qui parui sunt dactyli, sint gustui acerbi, nec edi faciliè possint.

ARBORES VENENATAE. CAP. LXI.



NTER Peru & Canibales multæ sunt insulæ, quæ vnus imperio parent, quem Calsique nominant, in quarum maxima, in qua sapius Rex habitat, Gaiacum arbor copiosissimè prouenit. Item alia fructum ferens pilæ magnitudine visu speciosum, sed venenatum. Huius succo sagittas Barbari imbuunt, iis aduersus hostes in præliis vsuri. Est etiam alia ex qua scarificata succus emanat mortifer: radices tamen sunt esculentæ, ex quibus farinam faciunt, qua vescuntur. Hæc in gratiam eorum qui rerum naturæ variorum, nouarumque cognitione delectantur, ex Theueto descripsimus. Qui & hæc de Baxama tradidit. Ab insula Ormuz decem miliaribus distat ea quæ Queionne nominatur, è regione illius sita, olim Principum quorundam delitiæ, nunc inculta & deserta, tum quòd magna ex parte diruta sit ob vehementes terræ motus, tum ob viperarum, aspidum, colubrorum, qui colore à nostris valde differunt, atque serpentium omnis generis copiam, quæ illic stabulantur, ex quibus tam venenata & pestilens aura exhalat, vt non solum homines perimat, qui vel aliquantulum moram illic fecerint, sed etiam stirpes ipsas inficiat, in quibus est arbor Baxama, cuius fructus vel minimùm degustatus, mox suffocat, id quod ipsius etiã vmbra præstat, si quis vel quadrantem horæ sub ea moretur. Cum tamen aliis in regionibus eiusdè arboris radix venenorum omnium sit antidotus, illic lethalis, nec non & folium ipsius, & fructus qui Rabuxit vocatur.

ARBOR FINIVM REGVNDORVM. Cap. LXII.



VASDAM alias nobilissimas ex Æthiopia, Arabia, Troglodytica, India, Sarmatia, Scythia plantas ex Scaligero recensendas esse duximus, etiam à nauigatoribus, & Historiæ Indicæ scriptoribus memoriarum proditas. Ab arbore finium regundorum incipiemus. Nominis oblitus Ioannes Balada familiaris meus, inquit Scaliger, qui multos annos In-

dias pera

Forma
Theuetus
Cap. II.

Vires.

Theuetus
Cap. 61.
lib. Sing.

T. i. Cosm.
lib. 10. c. 3.

Lib. Exot.
Exerc. 15.
Exerc. 181.

Exerci. 181.
3.

dias peragrauit, faciem modo narrabat arboris. Paruam esse frequentibus virgulis, veluti Punicā, folium Pruni, fructus qualis Castaneæ cum erinaceo. Intus coccus ruber, quo vtuntur ad tincturas & picturas. Non enim literas habet Mexicij, apud quos nascitur, sicuti neque olim Ægyptij ante Theuth. Sed in tabellis pictis seruant agrorum facies, finisque prædiorum. Quæ fuit causa vt eam Scaliger appellarit finium regundorum arborem, donec alius felicior nomen apponat verum.

MANGA. AMBA. CAP. LXIII.



ST in Malauar Manga arbor Pyrifacie, cuius fructus Persico par aut maior. Corticis color viridis immaturo: Augusto mense cum maturitate recipit luteum: simul acquirit splendidum nitore. Caro, vt pruno, mellei saporis. Os intus sicut amygdalo. Immatutum conditum tradidit. Cætera planè eadem habet. Garcias in Aromat. Indico. historia tradit omnium qui apud Indos nascuntur fructuum præstantissimum esse eum quem ipsi Mangas vocant. Colligi in regionibus calidioribus mense Aprili, in aliis Maio & Iunio, interdum tamen Octobri & Nouembri, cæterum pro regionum natura & diuersitate variare etiam saporis bonitate. Habere se in prædio suo quod est in Bombaim arborem huiusmodi fructus ferentem, quæ bifera est. Nam Maio mense fructum fert saporis quidem & odoris gratia excellentem, sub finem verò Autumnii alium superiori magis commendabilem. Colore est is fructus ex viridi rubescens, & odore gratissimo. Exempto cortice editur, aut sine vino, aut generoso aliquo vino maceratus, veluti Persica. Conditur etiam saccharo, interdum verò & aceto, & oleo, & sale, inspersis in eius meditullio gingibere & aliis. Nonnunquam editur cum sale, & nonnunquam elixus. Frigidus verò est & humidus, quæ admodum Persica. Eius ossiculis assatis alui profluuiâ sisti aiunt, quod verum esse Garcias deprehendit. Nucleis verò recentibus lumbricos & ventris tineas necari dicunt, quod rationi consentaneum est obeorum amarorem.

Forma.

Exerc. 181.

Theuet. T.
1. Cosmog.
lib. II. c. 16.

Locus.

GVANABANVS. CAP. LXIIII.



VANABANVS arbor Pini stipite, procera, folio magno, oblongo, fructus Melonis magnitudine. Corticis color viridis, splendor Cydonij, digitalis crassitudo. Caro intus candida, dulcedine lactis coacti, semina continet phasiolacea. Generalis historia Indiarum auctor tradit fructus corticem viridem tenuem esse vt Pyri, superficièque squamulis distincta. Hic Guanabanus planè conuenire videtur cum

Exerc. 181.

c.

Forma.

Lib. 8. c. 17.

GVANABANI
fructus, Ouiedo.



Ouiedi Guanabano, & vterque ab eo diuersus esse cuius ex Scaligero meminimus. Sic in Historia sua suum describit Ouiedus. Guanabanus procera arbor est, & formosa, folio ferè Mali citriæ virente: fructu pulcherrimo, mediocris Melonis magnitudine, qui tamè interdum in capitis pueri crassitudine excreseat. Cortex huic fructui viridis, & qui quibusdam squamis distinctus videatur, vt strobilus, lauioribus tamen, neque ita tumentibus, quandoquidem totus cortex tenuis sit, neque crassior quam in Pyris. Caro candidissima, saporisq; delicatissimi, quæ facile cremoris lactis instar in ore resoluitur. Per eius carnem sparsa sunt semina magna, Cucurbitarum seminibus aliquantò maiora & nigricantia. Frigidus est hic fructus, & per ætus vtilis. Nam tamen quis integrum Guanabanum deuoret,

Lib. 8. c. 17.

deuoret, nullum inde sentiet nocumentum. Infirma est ligni materies. Hæc Ouiedus. Scholiastes verò historiæ Aromat. Indic. Scaligeri Guanabanum eum esse putat, qui superioribus annis ex Æthiopie Mozambique Antuerpiam allatus est fructus crassus, sesquipedali longitudine, cui densus durusque cortex, tenui mollique vt in Cydoniis, sed viridi lanugine obductus, aliquot per lōgitudinem excurrentibus venis, siue potiùs sulcis, vt in Melonibus, extrema parte in mucronem desinit, superiori verò quæ è ramis dependet, pediculo inhæret firmo, duro, & fibroso. Continet hic fructus pulpam candicantem, qua Æthiopes in februm ardoribus vtuntur sitis sedandæ gratia: iucunda etenim aciditate prædita est. Hæc siccata friabilis est, sic vt digitis trita in pollinem resoluatur, remanente tamen perpetua aciditate. Per hanc sparsa sunt semina renibus, aut Anagyridis legitime fructui simillima, nigro tamen colore nitentia, ac ex vmbilico fibris quibusdam suspensa. Huic simillimum, foliis tamen ab hoc diuersis, ex Theueto suprà descriptum no mine ficus Nigritarum.

MAMEI. CAP. LXV.

Exer. 81. 8.
Forma.




MAMEI arboris tum facies tota Castaneæ, tum magnitudo. Idè folium, sed maximum, fructus non solum ingentis Persici, sed etiam maximi Cydonij superat globum. Nuculas duas habemus, inquit Scaliger, quas intus fert, quarum altera penè æquat Persicum, altera longè maior. Ex qua possumus addita aut circumiecta pulpæ corpulentia totum ambitum animo metiri. Rubro colore pulpa est. Corium fructui fuluum. Sapor Persici. De eadem

Lib. 8. c. 20.

arbor hæc ex Ouiedi historia decersimus. Mamei arbor est speciosissima, ma-

MAMEI
folium.



gnæ Nucis iuglâdis proceritate, foliis paribus aut maioribus, crassioribus, altera parte viridioribus, palmum longis, & ad proportionem latis. Huius fructus est omnium qui in insula Hispaniola dicta proueniunt gustui suauissimus, quandoque perfectè, quandoque imperfectè rotundus, pugnos duos magnitudine æquans, aliquando minor, cortice contegitur fuluo, modicè aspero, Pyrorum siluestrium ritu, nisi durior crassiorque esset. Sunt qui vnum, alij duos tresve concludunt nucleos in pomi medio interstitiis distinctos, acinorum ritu membranula tenui opertos, delibratæ castaneæ colore, quorum pulpam si secueris, iudicabis castaneæ, præterquam sapore, similem, sed interior acinus fellis est amaritudinè, delicata tunicula contextus, quam inter & priorem illam membranulam caro sine pulpa intercedit ferè fulua, Persici duracini gustu, aut meliori, non tamen tam succulenta est, neque tam odora. Pulpa isti digitalis est crassitudo in maioribus, minor in minoribus pomis.

GVAIAVA. CAP. LXVI.

Exer. 181. 9.
Forma.



Lib. 8. c. 19.

GVAIAVA est arbor, tum fructus, Mali facie. Sed color fructui cæcidus. In quo semen nigrum, minutum, rotundum eximit ipsum ex illorum natura. Paulò fusiùs hæc arbor ex Ouiedo describenda. Guayabo, inquit, arbor est Indis omnibus vulgarè cognitiōis, Aurantiis arboribus magnitudine par, sed ramis rarioribus, foliis minùs viridantibus, laurinis, sed paulò latioribus, crassioribus, & venulis eminentioribus. Poma profert aut longiuscula, aut rotunda, alia intus rubra & punicantia rosarum modo, alia candida, sed foris omnia viridia, aut lutea cum prorsus maturuerint. Horum quædam ea sunt magnitudine qua quæ Palsipoma Galli vocant, quædam minora, pulpa in quatuor

quatuor partes distincta est, quarum singulae granulis sunt repletae durissimis, quae tamen quo minus deglutiantur non impediunt, cortex Pyri muscatelli cortici similis, eodem modo eximitur, flos quadatenus Aurantiae aut Citriae mali florem refert, in quibusdam florum Gelsemini odore, eoq; suauiore. Huius arboris quaedam siluestris est, alia satiuarum fructus esu suavis, concoctu facilis, alui profluuiis utilis, nam astringit, praesertim si paulum immaturus & duriusculus edatur, ut arbor Guyabo, ita fructus Guyaba dicitur.

BRVSATHAER. CAP. LXVII.



DChinarum sinum marinae sunt arbores visenda vastitate: tanta, inquam, ut in eis immensa magnitudinis auiibus stabulari liceat. Etenim tam grandes sunt, ut eis etiam grauiora animalia integra sustollatur, atq; auferantur. Has arbores vocant incolae Brusathaer: fructus ferunt anguriis non minores. Eadem scripsit M. Anton. Pigafetta in Itinerario suo.

Exer. 181.
10.

CACHI. CICCARA. CAP. LXVIII.



PINOSA est arbor in Malauar, cuius folium non pingunt. Ipsa Cachi, fructus Ciccara dicitur, longitudine pedali, humanae coxae crassitudine. Pondus fidem superat. Cortici color primum viridis: maturescens in luteo fuscus. Corpus firmiusculum, compressioni tamen ita cedit, ut frangatur. Temporis quoque suapte natura impatiens. Haud enim ita multo postquam detractus sit, fit rugosum. Totius forma ut Pineae Nucis. Intus enim camerulae membranis distinguuntur, ut in Punica. Pulpa odor suauissimus. Sapor mistus ex Melone moschato, Persico arantio dulci, & melle. Intus poma ducena quin quagena ad trecentena usque, ficorum tum specie, tum dulcedine, sine cortice, ut aiunt. Membranulis tamen distingui necesse est, quibus segregantur, ut ouorum vitella. In his pomis fructiculus est alius, figura castaneae, qui ad eundem quo castanea modum inter coquendum crepitat, esculentusque est. Etiam bubus in pastum datur. Exit e trunco fructus, sicut & lumeiz, id est, Sycomoro, inter spinas & frondes: interdum, quod magis mirum est, e radice subtus terra, unde prodit. Hic longe praestantior regibus dono datur. Legitur mense Decembri. Eadem prorsus scripsit Ludou. Bonon. in Itiner. suo, nascique in Calicuto. Etiam Nicolaus Costin. in Itiner. nisi quod non fructus ait bubus pro cibo praebere, sed eorum cortices. Praeterea arborem grandi Fico similem esse, foliis diuisis Palmae modo, ligno buxoe, ad multa utilis.

Exer. 182.
12.
Forma.

Tempus.

MELO CORCOPALI. CAP. LXIX.



CORCOPAL Indiae provincia est, in qua Cydonij magnitudine & foliis arbor. Praegrandem gerit fructum, Melonis figura, eodemque sulcatum modo. Iota quem terna, quaternave grana, acinorum vuae facie, acore cerasi. Melo hic & edendo est, & ad medicinas utilis. Ibidem mespilum colore albo, mali magnitudine. Eadem Ludou. Bono. in Itiner. Theuetus in Promontorio Comari fertilissimo prouenire tradit arborem Malo Cydoniae magnitudine & foliis similem, cuius fructum Corcopal vocant, esu gratissimum, gustu suauissimum, quo etiam agrotantes utuntur, quia prauos humores per aluum expurget.

Exer. 183.
13.
Forma.
Ufus.

Theuet. 1.
Cosm. lib.
11. cap. 17.

DARIAN. CAMALANGA. CAP. LXX.



UPERIORI Meloni similis Taprobanae, quae nunc Sumatra, fructus, qui Darian dicitur. Anguriae magnitudo, cortex viridis. Eius in visceribus quini fructus Arancij quantitate, & figura, sed oblonga: butyri sapore suauissimo. Haec etiam Nicol. Costi. in Itinerario. In

Exer. 184.
14.
Forma.
Ufus.

eadem

eadem Carcopal Camolaga fructus esitatur, sesquipede maior, Cucurbitæ colore. Humi iacet vt Melo. Pulpæ plurimum. Condimenta ex ea vel cucurbitinis, quas Carabassadas Hispani vocant, vel Citriis meliora, atque sapidiora. Eadem Ludou. Bonon. in Itinerario suo.

ET TALCH. CAP. LXXI.

Exerc. 181.
19.

Forma.

Vires.



RANDIOREM Iuniperū quæ Cedrum maximè æmulatur, Harar vocant Arabes, Afri nominant Ettalch. Eius medulla in Numidia candida, in Æthiopia nigra, in Libya purpurea: qua in scobem comminuta dicuntur Afri Medici felicissimo successu vice Gaiaci ad morbum Indicum profligandum vti. Hunc morbum tres nationes, Galli à Neapoli, vbi se inuenisse putant: Itali à Gallis in quibus primùm aiunt sese illum conspexisse: Germani ab Hispanis, qui ex India tam pretiosam mercem conuexerunt, nominant. Ego, inquit Scaliger, meritò ac iure Indicum. In descriptione nonæ partis Africæ legimus Ettalch grandem & spinosam esse arborem, foliis Iuniperi, quæ gummi mastiche simile emittit, quo Afri mastichen adulterant, quòd colore & nonnihil odore mastichen referat. Cætera prorsus eadem. Ea prorsus videtur esse Oxycedrus suprà descripta. Meminit Theuetus arboris Etachche, quæ in insula Cuoue provenit valde spinosa, & Iunipero similis.

GOR, ARANCIA, LIMONES, AMBULON.

CAP. LXXII.

Exerc. 181.
20.



D fluuium, qui Niger dicitur, nullæ arbores fructiferæ præter paucas admodum. Inter quas vna, cuius fructus castaneæ similis, sed amarus. Gor vocant incolæ. Ioannes Leo lib. i. descriptionis Africæ tradit has arbores mirandæ esse proceritatis, satis procul à mari, in continente. In Indiæ insula Zeilam cortex Aranciis dulcis est, & suavis. Limones autem proveniunt ibi, sua specie, pusilli, qui nullum porrò capiunt incrementum, sapore dulcissimi. Siluestrium Limonū arbores in Syria, Ægypto, Africa, frequentes pomis admodum exiguis, acidissimis. Aruchet insula fert arborem, cuius è cortice fructus exit candidus, saccharati specie, & magnitudine coriandri. Ambulon ei nomen est.

Exerc. 181.
24.

ARBOR ΜΗΤΡΟΣΙΔΗΡΟΣ. CAP. LXXIII.

Ex. 181. 27.



RÆCYM fortasse nomen à nobis inditum, inquit Scaliger, plus historiæ conueniet, quàm ingenio nostro. Tam enim est prope mendacium, quàm nos à voluntario mendacio alieni. Animi tamen gratia reponentur hîc. In Iaua maiore aiunt raram esse arborem cuius medulla ferrea sit: exilis illa quidem, cæterum porrecta ab imo ad summum plantæ fastigium. Ex ea frustum qui gerat, ferro esse impenetrabilem. Eadem refert Nicol. Costin. in Itinerario suo, vt & ea quæ sequuntur.

MUSA ARBOR. CAP. LXXIIII.



ALMARVM quoque generis quidam putant esse arborem illam, quæ in Ægypto Cypròque, & Syria non procul ab vrbe Alep vulgò nominata provenit, quam qui illuc nauigant Musam appellant. Arabibus vt Serapioni & Auicennæ Musa Maum, & Amusa dicitur, in Syria Mose. Græci Christianique qui Syriam incolunt, & Iudæi, arborem eam esse aiunt, cuius fructus edit Adam. Quod ridiculum esse scribit Garcias in Aromaticum Indicorum Historia. Id verò multò magis, quod scribit quidam Franciscanus,

Nomina
Li. 2. c. 491.
Matth. lib.
1. in Diof.

scanus, fructum hunc laudabilem Musa vocari, quod Musis dignus sit, aut quod earum sit cibus. Nascitur in Canara, Decan, Guzarate & Bengala, vocaturq; illis Quelli. Nascitur etiam in Malauar, vbi Palan, & in Malayo, vbi Pican, & in ea Africa parte quam Guineam appellant, vbi Bananas dicitur. Arbor est quinum scenumve cubitorum proceritate, quæ ex stolonibus alterius feritur, foliis arundinaceis, longè latèque sese diffundentibus, adeò

MUSA arbor.



MUSA cum fructu.



vt ternum cubitorum longitudinem quandoque excedat, latitudine sesqui cubitum æquent, lata crassaque per medium excurrente costa. Ea Aestate vel natura sua, vel solis ardore, sic arrescunt, & veluti torrentur, vt mense Septembri nudæ tantum remaneant costæ, decidente foliorum materia, quod admodum sit tenuis. Cau dice vnico constat sine ramis, squamoso cortice vestitos, Palmæ vel Arundinis modo. Ex vertice germen emergit molli corpore, longitudine ferè cubitali, à quo alia prodeunt, ternum quaternumve digitorum interuallo, ex quibus circummement fructus parui cucumeris magnitudine, per maturitatem quodammodò flavescentes ficum instar cortice contexti, eodè quoque modo quo ficus spoliantur. Substantia pulpæ melopeponibus similis nullo intus osse, neque semine. Li principio gustantibus insipidi esse quodammodò iudicantur, nec ita gustui suaues: sed qui iis vesci perseverant, magis ac magis in dies oblectantur, occulta quadam saporis suauitate ita allecti, vt nunquam iis saturari posse videantur. Musæ meminit Auicenna, vt diximus, item Serapio his verbis. Musæ exalfacit in medio primi abscessus, humectat autem in eius fine. Pauca præber alimentum. Priuatim prodest thoracis, pulmonis, ac vesicæ ardoribus. Aluum emollit, verum liberalior eius vsus stomacho aduersatur, ac iecur obstruit. Quamobrem si quis cum frigidi sit temperamenti ea copiosius vescatur, subinde aqua mulsam, oxymeli, aut zingiber conditum sumat necesse est. Fæctum in vtero alit, renibus opitulatur, vrinam ciet, & venerem stimulat. Hæc Serapio. Si Musæ hæc Palmæ genus est, quodnam id sit ex tot generibus quæ ex Theophrasto recensuimus, dictum difficile est, nisi quis id esse iudicet, quod Theophrastus in Cypro nasci prodidit, folio cæteris ampliore, & folio longè maiore, magnitudine Mali Punici & figura oblongo. Carolus Clusius in ea est opinione vt existimet Musam Arabum eam esse plantam, cuius Plinius meminit his verbis. Maior alia poma, & suauitate præcellentior, quo sapientes Indorum

Li. 2. c. 491.
cap. 84.
Pres. ff.
Temper.

Lib. 2. hist.
cap. 8.

In Arom.
Indi histo.
cap. 10. li. 2.
Lib. 12. c. 6.

M V S A Pacouera Theueti.

Lib. 5. c. 15.
Lib. 8. c. 1.
Cap. 33. sin.
Ame.
Theuet.
Cosmog.
T. 1. lib. 5.
cap. 2.

Mauze.

T. 1. Cosm.
lib. 12. c. 19.
Photel.

Theuet.
cap. 46.
singul.
Americ.

Lib. 7. c. 12.
Yayama
Indorū.


viuunt. Folium alas auium imitatur lōgitudine trium cubitorum, latitudine duūm: fructum cortice emittit, admirabilem succi dulcedine, vt vno quaternos satiet. Arbori nomen Palæ, pōmo Ariens. Plurima est in Sydracis, expeditio- num Alexandri termino, &c. Nam ferē omnia, inquit ille, pulcherrimē ad Musæ descriptionē quadrant. Huc accedit quōd in Prouincia Malauar, quæ supra Indum flumen est, intra verō Gangem, Palan adhuc nomen retinear, à quo Latini suum Pala mutuati videntur. Caterūm meminit huius fructus Ludouicus Rom. in lib. Nauigationum suarum. Ouiedus nomine improprio Platanum appellat. Theuetus arborem hanc Paquouere Americis vocari tradit, fructum Pacoua. Arborem Mauze in Ægypto vocatam describit non maiorem ficu mediocri, cuius folia quinque aut sex pedes longa sunt, duos lata, fructus in caule coaceruatus, non secūs ac dactyli in Palma, crassus & longus mediocris cucumeris instar, delicatissimus atque suauissimus quem domi suspendunt

vt nos uvas pensiles eoque saepe solo tanquam optimo vtuntur alimento. Arbor tenella est & fragilis, adeō vt nisi maxima truncum haberet coxæ hominis crassitudine parem, minima tibiæ, in cremiorum non in arborum numero recensenda foret. In America semel aut summūm bis fructus fert. In Æthiopia & Arabia vicinisque insulis etiam triferæ est. Idem Theuetus in regione Catay nasci arborem fert quæ Photel nominatur Fructū edit magnum, Musæ Ægyptiæ fructui parem, sed paulō breuiorem: quam ob causam nonnulli ficum Pharaonis vocitarunt. Is præter cæteras dotes, ad sedandam sitim & febrium ardentium æstus refrigerandos perutilis est: folium Plantaginis habet, sed paulō spissius. Arbor octo cubitorum altitudinem vix superat. In ramorum eius vtraque parte fructus prouenit, ligno ipsi hærens, sub foliis occultatus, quæ arthritidi mirè profunt.

N A N A. C A P. LXXV.



FRUTEX in America prouenit, folium habens lato Iunci folio simile: fructus Nana à Brasilianis nuncupatur, citruli mediocris magnitudine, toto ambitu Pineæ nucis specie, fuscus cum maturuit. Mirè excellit hic fructus tum dulcoris, tum suauitatis gratia quouis saccharo præstantior, non maturus tam insuauis vt os vlceret. Semen nullum profert: quare surculo feritur. Non nisi conditus ad nos deferri posset, quia post maturitatem diu seruari nequit. Hoc ægri frequentius vescuntur, quàm vllō alio cibo. Hunc fructum describere videtur Ouiedus nomine Yayama his verbis à Clusio traductis. Nascitur in Hispaniola, cæterisque vicinis insulis fructus, quem Hispani à Pineæ nucis similitudine Pinas appellant, non quōd eiusmodi squamas lignosas habeat, sed quōd eius cortex simili modo distinctus videatur, tamen si non squamatim, sed peponis modo cultello integer auferatur. Vt autem succi bonitate & suauitate reliquos fructus hic antecellit, ita color illi pulcherrimus ex luteo virescens, paulatim per maturitatem virore euanescente. Odor ei iucundissimus, qualis ferē

NANA fructus, siue
Yayama.

ferè in eo Persicorum genere, quod à malis & cotoneis nomen apud Italos & Hispanos inuenit: magnitudo illi vulgaris melonis. Nascuntur verò singuli fructus ex Cardui genere aspero & spinoso, cui folia oblonga, ex quorum medio prosilit caulis rotundus, vnicum ferès fructum, qui post decimum aut duodecimum mensem demum maturescit. Eo sublato nullus præterea in planta nascitur fructus, ideoque ea velut inutilis abiicitur. In extremo fructus, interdum etiam in extremo caule sub fructu enascuntur veluti germina & turiones quidam, qui fructui magnum addunt ornamentum: hi sunt tanquã semen: panguntur enim tribus sub terra digitis, sic vt media turionum pars extra terram extet, atque radices agunt, suoque tempore fructum perficiunt. Varia sunt eius genera, quæ pro linguarum varietate diuersis nominibus nuncupantur: tres vero distinctæ species notantur. Prior Yayama ab incolis appellata, altera Boniama, tertia Yayagua. Postrema carne est candida, gustu vinoso, sed acido & acerbo. Boniama carne est candida, gustu dulci, & quodam-

modo satuo. Yayama reliquis oblongior est, & bonitate illis præstat, carne fuluescente, gustu dulci & suau. Per omnium tamen carnem sparæ sunt fibræ quædam tenuissimæ, quæ tametsi palatum inter edendum non offendant, gingiuas tamen lædunt, si quis crebrius eis vescatur. Quibusdam locis nascuntur etiam hæc genera spontè in agris copiose, at quibus cultura accessit longè sunt iis suauiores, & cultoris beneficium abunde pensant. Huius fructus abundantia auctoritatè eius minuit. Sed tamen & his insularibus cum bonitate, tum magnitudine præstant qui in continenti nascuntur. Maturus fructus quindecim tantum aut viginti diebus conseruari potest. Hactenus Ouiedus. Narrat etiam Theuetus Necumere maris Indici insulam innumeris fructibus abundare, inter quos qui ipsorum lingua Melenken nominatur, magnus est nucis pineæ specie, cortice luteo, quo spoliata carnem & in particulas confectam si degustaueris, saccharum ore continere dixeris cum pauxilla nucis muscata portiuncula permixtum. Hoc Barbari præsertim ad sedandam sitim vtuntur. Fructui Nana satis similis est, nisi quod Melenken in arbore prouenit Mori ferè proceritate, nigro cortice vestita, folio quadatenus rubescente, longitudine & latitudine folij Angelicæ. Nana autem planta est foliis Iunco similis, nunquam ad tantam altitudinem accrescens.

ARBOR GEHVPH. CAP. LXXVI.

ALIT Taprobana insula hodie Sumatra nuncupata arborem admirandæ facultatis, vt refert Theuetus, quæ illic Gehuph, in India Cobbam dicitur. Foliis est paruis, quemadmodum & arbor quæ siliquam cathartica fert, ramis breuioribus, cortice flauescente, siue croceo: fructu crassiusculo & rotundo pilæ lusoriæ instar, in quo nux auellana par coercetur, quæ nucleum includit valde amarum, qui lingua admodum radicis Angelicæ saporem refert. Fructus ad sedandam sitim commodissi-

Cosmog.
T. lib. 12.
cap. 1.
Forma.

ARBOR *Gehuph.*

FICVS Nigritarum.

*Forma.*

Theuetus
cap. 10.
lib. sing. &
T. 1. Cosm.
lib. 3. cap. 4.

Lib. 8. c. 4.

ni leporino figura simile, magnitudine fabæ. Alij eo simias nutriunt. Sunt qui ex eo maturo, & tempestiuè exsiccatò pulchra monilia conficiunt. Huic arbori similem ferè, sed folio valde diuersam arborem describit Ouiedus in Indica Historia, quam Higüero vocat nomine tetrasyllabo. Arbor est prægrandis, inquit, velut Morus nigra, fructum ferens cucurbitæ rotundæ, interdum verò oblongæ similem. Ex rotundo pateras & alterius generis vasa conficiunt. Materie est robusta,


mus. Eo tamen nucleus quamuis amarus longè præstantior: ex eo enim indigenæ oleum eliciunt, seduloq; cõseruant, quia ad hepatis & lienis dolores maximè confert: quibus doloribus cum affliguntur, primùm dies aliquot parcissimò vtuntur victu: deinde octo dierum spatium oleum sumunt: quo tempore morbus paulatim minuitur, & tandem curatur. Quod si qui oleum sumere noluerint, veluti pueri & mulierculæ, eo ventriculum, spinam dorsii, latera inungunt. Idem articularis morbi, cui huius insulæ incolæ valde obnoxij sunt, summum est remedium. Ex eadem arbore gummi manat vtilissimum. Ex eo enim cum mediocri oleo supradictò dissolutò, cataplasmata conficiunt quæ pellibus illinunt, & partibus laborantibus applicant. Hanc arborem diligenter prope ædes suas, & in hortis colunt.

FICVS NIGRITARVM.

CAP. LXXVII.

NUNC siluestres plantæ dicuntur quæ peregrinæ sunt, non illæ quidem in Syria, aut Ægypto genitæ, sed in Nouo, & veteribus Cosmographis incognito orbe, scilicet in America, seu Francia Antartica, quas illic Andreas Theuetus vidit, obseruauit, aut à peritioribus curiosius didicit, & literarum monumentis consignauit. Ac primùm in Regno Senegæ promontorium est, ab incolis lalont, à nostris qui primi illuc nauigarunt Cap Verd, id est, promontorium Viride nuncupatum, ab arborum fruticùmque toto ferè anno illic virescentium copia. Iuxta hoc promontorium tres sunt paruæ insulæ continenti propinquæ, pulcherrimarum arborum feraces, à nullis tamen habitatæ. In vna harum prouenit arbor quæ folia fert Ficus nostratis similia, fructum pedes duos, aut circiter longum, proportionem crassum, ad longitudinem crassitudinẽque Cypriarum cucurbitarum accedentem. Quidam hunc esitant, non aliter quàm nos melones nostros. Intus semen est re-

atque

FOLIVM dictum
Higüero.

scuntur, id est, eius carne, quæ cucurbitæ carni cum adhuc viret, similis est. Corticis color & forma cucurbitæ. Vulgaris est hæc arbor in Hispaniola, reliquisque insulis, & huius Indiæ continente. Priori similiorem fructum non tamen eundem memorat Theuetus, qui in insula Zipangu provenit magno meloni par, cui nomen Chiuef, quod Syriacè ficum significat. Fructus is suavisissimus est, cum manditur mannæ modo in ore liquefcens. Semina intus continet qualia in cucumere nostro reperiuntur, cortice cum matruit croceo, folio arboris eximiè viridi exquisitè rötundo, aureo numo Gallico pari.

Cosmog.
T. I. lib. II.
cap. 10.

AHOVAI.

CAP. LXXVIII.



ARBOR hæc in America etiam provenit, ea ferè proceritate qua Pyrus nostra, foliis tres quatuorve digitos longis, duos latis, toto anno virentibus. Cortice integitur candicante, succum album, si ramulus abscindatur, & quasi lacteum fundente. Arbor ipsa concisa vehementer tetrum abominandumque odorem spirat. Quare nullus eius omnino apud

Forma.
Theuetus
cap. 36. lib.
sing.

AHOVAI.



Barbaros vsus, ne ad ignem quidem accendendum. Fructum profert castanæ mediocris magnitudine, album, Græcæ literæ Δ figura. Huic, præsertim nucleo, venenata & mortifera vis inest, quo Barbari ex leuissima quaque occasione vxores iis irati necant, & contrà vxores viros suos. Quam ob causam exteri à Barbaris hos fructus recens collectos, nec precibus, nec pretio impetrare possunt, imò filios suos ab illis prorsus abstinere iubent, priusquam nucleum exemerint, quo exempto ex corticibus tintinabula conficiunt, tibiisque applicant, æquè bene ac nostra tinnientia. Clusius rei herbariæ peritissimus, & stirpium exoticarum obseruator diligentissimus, cum de Guanabano disseruisset, fructus eius iconi, quæ paulò post expressa est, hæc subiicit. Porro apud me seruo ex huius fructus, aut huic similis seminibus, quibus exempta est medulla, lora duo filo xylino contexta: alia item bina è fructu quodam anguloso. Constant verò singula lora duplici aut triplici filorum xylinorum ordine reticuli modo contextorum, ex quibus de-

Vires.

Vsus.





pendent vacui fructus eo quem exprimi iussimus modo. His Canibales ad crura alligatis in suis saltationibus vi solent, quemadmodum apud Mauritanos atque etiam Hispanos nolarum & tintinabulorum vsus est: mirum enim quantum hi fructus ex mutua collisione sonitum edant. Posterioris meminit The-

FRUCTVS Higüero,

ex Clusio.

AHOVAY Theueti,

ex Clusio.



uetus cap. 36. singular. America: deinde subiungit eadem de Ahouai, quæ hoc capite retulimus: tum icones duas, priorem sine inscriptione, alteram cum hac Ahouay Theueti. Lobellius priorem inscribit nomine fructus Higüero apud Clusium.

HAIRI.

CAP. LXXIX.

Forma.

Theuetus
cap. 38. lib.
singul.

Vus.

Lib. 8. c. 15.

HAIRI in America arbor est, folio palmeo, ligno marmori nigro simili, quamobrem multi Ebenum esse existimant: quorum sententiam Theuetus non approbat. Nam Ebeni lignum nitidius splendet. Deinde arbor hæc tota spinosa est, minime verò Ebenus. Postremò Ebenus in Æthiopia & Calicut nascitur. Lignum istud ferri modo ad ima aquæ sidit: quare Barbari ex eo enses conficiunt, atque monilia. Adeoque durum ac validum est, ut ex eo sagittæ quasvis ferreas loricas penetrare possint. Fructum edit pilæ lusoriae magnitudine, altero extremo quodammodo acutum. Intus nucleus est niuei candoris. Huic quantenus similem fructum nomine Yayama descripsit Oquiedus, de quo suo loco dicemus.

VHEBE



AEC arbor excellissima est, ramis in sese per tranuersum insertis, vt non natura, sed arte id fieri existimare possit, qui arborem contemplatus fuerit. Folio est Brassica, fructu in quibusdam ramis pedis vnus longitudine, quo apum examina nutriuntur, quæ in cauum arboris sese recipientia, illic mel ceramque conficiunt. Mel hoc magno apud Barbaros est in pretio, quò deo ægros alant, cum farina recenti permixto, quam ex siccatis tussisq; radicibus in vsus reponunt. Est animal nomine *Heyrat*, id est, Bestia mellis, fuscum, felis nostri domestici magnitudine, quod vndique ad huiusmodi arbores accurrit, mellis, quod in iis reperitur, avidissimum. Id ea arte ex cauis arborum vnguibus educit, vt apes non lædat, neque ab iis lædatur.

Forma.
Th uetus
cap. II. lib.
singul.

Usus.

COHYNE.

CAP. LXXXI.



NAMERICA regio est *Morpion* nominata, quam hodie incolunt Lusitani. Ea plurimum & optimorum fructuum ferax est, eius præsertim quem *Nana* appellari diximus. In iis etiam est fructus eius arboris quam *Cohyne* vocant, quæ folium habet Lauri, fructum Citrulli mediocris magnitudine, cui sthrutocamelis figura qui edulis nõ est, aspectu tamè pulcher, præsertim in ipsa arboe ramis eo onustis. Barbari ex ipso pocula faciunt: præterea arcanum quoddam, & planè stupendum mysterium. Excavatam hunc fructum milio, seminibusve aliis implent. Deinde baculo parte vna in terram defixo, altera in fructum inserto, eum toto ambitu speciosis plumis exornant, singulisque in singulis tuguriis binos ternosve huiusmodi fructus seruant, magnosque habent in honore: quod iis miseri idololatrar diuinitatem quandam inesse existiment, nihilq; aliud quod sensu percipiatur adorant quàm hoc instrumentum, quod cum tangitur, percussitve tinnitum reddit: adeoque sunt vecordes, vt cum tinnit, & percussum resonat summum illum Deum esse putent, quem sua lingua *Toupan* nominant, qui loquatur, quique ipsis, maxime verò ipsorum prophetis omina præfagiat. Recitatur eadem Historia à Clusio in scholiis cap. II. lib. 2. de Aromatib. Indiciis, vbi ait fructum huius arboris vocari *Maraka* & *Tamaraka*.

Forma.
Th uetus
cap. 4 lib.
sing.
Usus.

COHYNE.



Nomina
Forma.
Theue ns
cap. 19 lib.
sing. & T.
2. C. fmo.
lib. 2. cano.



QUAE arbor Brasilia, Gallicè *l'Arbre du Bresil* nominatur, ab Americæ incolis *Oroboutan* dicitur. Specie est pulcherrima, procera, recta, tam crassa quàm quævis alia, foliis Buxo similibus, æquè parvis, sed densis & perpetuò virentibus: cortice cinereo, ligno rubro, maximè eius intima parte, siue corde, quod præstantius est, cuiusque maior copia à mercatoribus coëmitur, ita vt ex tam crasso caudice, quem vix tres homines amplecti possint, nō excindatur matrix hominis coxa crassior. Arbor hæc neque fructum, neque gummi vllum profert. In Barbarorum regione, qui Canibales appellantur, prouenit: multò præstantior in regione Morpiū, & promontorio Frie dicto. Inodora est, & infecturis tantum dicata. In eadem America nascuntur arbores quædam ligno luteo, ex quo enses fiunt, aliæ ligno purpureo, ex quo pulcherrima tinctura fieri posset, aliæ ligno candidissimo & tenerrimo, nulliusque apud Americanos pretij.

ACAIOV.

CAP. LXXXIII.

Forma.
Theuet. c.
61. l. sing.



PARS illa Americæ quā Anthropophagi illi tenent, quos Canibales appellant, maximam copiam fructuum, herbarū, radicum suauissimarum, earumque arborum producit, quas *Acaiou* vocant. Est autem arbor Acaiou folio Pyri nostræ, paulò magis acuminato, & extremo rubescente. Fructum edit pugni magnitudine, oui anserini figura, ex quo nonnulli portionis genus quoddam parant: quanquam is edulis non sit, sorbo nondum maturitatē perfectam adepto gustu similimus. Huius extremo adnascitur veluti nux, maioris castaneæ magnitudine, leporini renis figura. Nucleus inclusus esui suauissimus est, modò ignem leuiter attigerit. Cortex oleo totus mader, gustu acerrimo, ex quo Barbari maiorem olei copiam, quàm nos ex nucibus nostris, elicere possent. Hic aliæ reperiuntur arbores quarum fructus perniciosi sunt, in quibus est illa quæ *Haounay* nominatur.

DRACO

DRACO ARBOR. CAP. LXXXIIII.

IN INSULA à Lusitanis Madera dicta, veteribus incognita, crescit arbor auctore Theueto, ab incolis & Lusitanis Draco dicta, quæ stato anni tempore optimum gummi fundit, quod sanguinem Draconis appellant (rectè ne an secus, dubitat) perforato arboris stipite propè radicem satis lato & profundo hiatus. Præterea fructum profert luteum, cerasi nostratis magnitudine, refrigerando corpori, & leuandæ siti, in febre, ac in summis ardoribus vtilissimum. Succus is siue gummi, simile est, inquit, Cinnabari, sed diuersitate nascendi distat: illud enim liquor est, hæc fossilis, & ex Africa solum defertur, magnoq; constat, quoniam vix reperitur, quæ pictorum intentis coloribus satisfaciatur. In ea tamen re statuenda multum hæsitat. Hoc enim gummi sanguinem Draconis esse haud diffitetur, etsi ratio id admodum non suadeat, nisi Africa barbari, vnde primùm deferebatur hic liquor, arborem hunc fundentē, lingua sua Draconem appellarint: non audet tamen affirmare plantam quæ hoc gūmi emittit, eam esse quæ in Africa nascitur, cum figura differant. Tandem vtrumque idem esse illi persuadent facultates & vires planè eadem, vt ab iis didicit, quos diligenter percontatus est. Sed nemini dubitandum sanguinem Draconis arboris siue gummi, verum esse Cinnabari, quod nos hodie ex insulis Canariis, quæ olim Fortunatæ dictæ sunt, habemus, quodque Officinæ sincerum & minimè adulteratum vocant sanguinem Draconis in lacrymis, à factio, quod in offas panis modo cogitur, distinguentes. Prius illud etiam Dioscori sanguinem Draconis à quibusdam existimari dixit, de quo & Plinius hæc falsò tradidit. Milton vocant Græci minium, quidam Cinnabari: vnde natus error Indico Cinnabaris nomine. Sic enim appellant illi saniem Draconis elisi elephantorum morientium pondere, permisso vtriusque animalis sanguine. At Cinnabari minium non est, sed liquor arboris quæ diximus, neque sanguis siue sanies Draconis & elephanti: iam enim priscorum temporibus Arrianus in Periplo nouit Cinnabari lacrymam esse arboris. Et Cadamostus in libro Nauigationum narrat in insula Portus sancti, vna ex Canariis, colligi sanguinem Draconis, qui lacryma est arboris, quæ stato anni tempore ferro vulnaretur, ex qua plaga anno proximo fluebat gūmi, quod athenis decoctum & defæcatum, sanguis efficitur,

Cofia. T. 1.
lib. 3. ca. 14.

Li. 5. c. 109.

Lib. 3. c. 76.

Cap. 4.

DRACO arbor.



FOLIUM arboris sanguinis Draconis.



quem

FOLIUM arboris Draconis ex Indiis delatum.

Vires.
Lij. ca. 109.

FRUCTVS Sanguinis Draconis.

Lib. J. stirp.
Hispa. ca.

Forma.



quem Draconis appellant. Fructum edit Cerasi instar, gustu suauem, coloris cærulei (aliis lutei) Eius insulæ incolæ siluam Draconum vocant, & aduenas eam adeûtes huiusmodi nomine per iocum deterrent. Pena eius arboris folium depinxit, quale hîc intueri licet, ex Occiduis Indiis delatum, coriaceum, cui simile aut par latitudine aut crassitudine vix vllum est. Ex Palmæ congeneri arbore euulsum videtur: quin ipsa tota textura asserem bicubitum latum, quaternos, aut quinos cubitos longum refert, tegulæ modo fornicatum, media secûdum longitudinem costa, semidigitum crassa, carinatum, superna ora quasi præfectum esset, margine digitali, tenuiore, duriore clauditur. Vniuersum folium à summo ad imum in villos quadâtenus similes iis qui obducunt nucem Indicam, aut capillitiû texendis funibus aptum discerpitur, quemadmodum totum est testoriis ædium & storeis accommodum. Vim habet sanguis Draconis auctore Dioscoride, hæmatite lapillo eandem: conuenit ad oculorum medicamenta, verûm efficacius: magis enim adstringit, & sanguinem cohibet: ambustis igni & papularum eruptionibus excepta cerato medetur. His quæ dudum de hac arbore commentati fueramus, adiungere libuit ea, quæ de eadem Clusius obseruauit & nuper edidit. Hanc arborem primûm Olyssipone se vidisse ait, anno salutis humanæ, 1564. post monasterium D. Virgini sacrum, cui nomen à Gratia, monachis ignotam & neglectam. Est Draco procera arbor, inquit, Pinum procul intuētibus referens, adeò æquales semperque virentes ramos habet. Huic truncus crassus, valde scaber, multis ramis dehiscens, octo aut nouem bicubitales ramos æquales & nudos sustinet, qui rursus in summo finduntur in alios ternos aut quaternos ramos cubitales, aut paulò ampliores, brachialisque crassitudinis, etiam nudos, ex quorû capitibus folia prodeunt cubitalia, maiusculi pollicis latitudine, in medio densiora, & eminentiore quodammodo costa, veluti Iridis folia, tenuia & rubentia in lateribus, mucronem planè referentia, semper virentia. Fructum profert colore flauescentem, sapore aliquantulum

acido, magnitudine exigui Cerasi. Ex trunco per Caniculæ æstus humor emanat, qui in rubram lacrymam densatus, sanguis Draconis appellatur, ob ipsam arborem Draconem. Materia trunci firma est, ferrumq; difficilè admittit, quod veluti fibris transversim & obliquè excurrentibus confit. At rami cû multo succo prægnâtes sint, facilè cædi possunt. Hæc Clusius, qui folium quale Olyssipone vidit,

vidit, descripsit Pena multò grandius & habitius, ex India delatum. Iis fabulam, opinor, affinxit Nicolaus Monardis, cum scripsit ex Noui orbis cōtinenti allatum ab Episcopo Carthaginienſi fructū arboris ex qua manat lacryma illa, quàm sanguinem Draconis vocant, cuius fructus sublata cute illico Dracunculus apparet, tanto artificio à natura fabricatus, vt à peritiſſimo aliquo artifice in marmore ſculptus videatur, collo oblongo, ore hianſe, ſpina aculeis horrida, cauda oblonga, & pedibus conſpicuis. Id quod in fructu eiufdem arboris ſe vidiffſe negat Cluſius, qui fructum aſſerit ſe habuiſſe Ceraſi magnitudine, rotundum, læuem, tenui pelle contectum, qua ſublata nucleuſ totuſ offeuſ conſpiciebatur, ſine vlla animalis, nedum Dracunculi effigie. Adhæc idem Nicolaus arborem ſcribit eſſe cortice ſatis tenui, & qui facilè incidi poſſit, cui proruſ repugnat à Cluſio tradita deſcriptio.

Lib. ſimpl.
Occid.

In Schol.
in Nucl.

AGNVS SCYTHICA, BORAMETZ. CAP. LXXXV.

SUPERIORA ludum putes, prævt eſt admirabilis Tartaricus frutex, inquit Scaliger. Tartarū horda primaria Zauolha eſt, vetuſtiſſimæ nobilitatis commendatione. In eo agro ſerunt ſemen, ſeminis meloniſ ſimilimum, ſed minùſ oblongum. Ex eo ſatu planta exit, quam Borametz, id eſt, Agnum vocant. Creſcit enim agni figura, ad pedum ſerè ternūſ alitudinem: quem pedibus, vngulis, auribus, toto capite, præter quàm cornibus repræſentat. Pro cornibus pilos gerit ſingularis cornu ſpecie. Obducitur corio tenuiſſimo: cuiuſ detracti vſuſ ad tegmina capitum incolis. Ferunt internā pulſam gammari referre carnes. Cæterūſ è vulnere quoque ſanguinem manare. Dulcedine eſſe admirabili. Radicem humo exertam ſurrigere ad vmbilicum vſque. Illud miraculi fouet magnitudinem. Quandiu vicini obſidetur herbulis, tandiu viuere, quaſi agnum in lato paſcuo. Abſumptis illiſ tabeſcere, atque interire. Idq; non ſolūſ vel caſu, vel tractu temporis, ſed etiam experiundi gratia, ſubtractiſ, atque ablatis euenire. Quin illud auget admirationem, appeti à lupiſ eam, non item ab aliis beſtiis, quæ carne veſcantur. Hoc quaſi condimentum, atq; intritum, ad fabulæ & agni alluſionem. Illud ſcire velim, inquit Scaliger, ab vno ſtipite quatuor diſſita crura cum ſuiſ pedibus, quā poſſint prouenire arque produci. Eadē Sigifmunduſ Liber refert in ſuiſ cōmentariis De rebus Maſchouitarū.

Exer. 182.
29.

Forma.

ARECA PALMA SCRIPTORIA, TAL,

Arbor maximis foliis. CAP. LXXXVI.

EST Palmæ ſpecies gracilior, procera, foliis læuiſſimis. Inter quæ racematim hærent poma, nucum magnitudine, alba. Fructuſ iſ pro bellariis manditur à potentiſſimis. Areca nomen eſt. Fertur in mercatuſ, magna æſtimatione recens. Seruatur & in modum palmarum ſiccata. Vartomanuſ Areca vocat arborem, fructum Coffol, Ludouicuſ Romanuſ lib. Nauigat. 5. cap. 7. Chofolo vocat, Garciaſ lib. 1. cap. 25. Hiſtoriæ Aromaticum Indic. Fauſel & Arecam, de quo multò plura ſuprà hoc ipſo libro dixim. Sunt & humilia Palmeta, inquit Scaliger, folio tam politæ ſuperficiæ, vt eo pro chartiſ vtantur ad ſcribendum. In Prouincia Mangi arboreſt Tal nomine, folio grandi quod chartæ vſum præbet in tota India. Fructuſ profert magniſ. Napiſ ſimileſ. Quod cortici ſubeſt tenerum eſt, dulce, eſu gratum: cortex tamen melior & ſuauior à quibuſdam Vguetal nominatur. Nicolauſ Coſtinuſ prodidit haud procul ab vrbe Cæſiſ reperiri vnioneſ. Ibidem naſci arborem ſine fructuſ, cuiuſ folia ſex brachia ſunt longa, toridem lata, ad eò tenuia, vt compreſſa com-

Exer. 183.
6.

Forma.

Vſuſ.

Exer. 186.
Nic. Coſt.
itine.

Forma.

Theuet. T.
1. Coſmog.
lib. 1. ca. 23.
In iciner.

Forma.

Vſuſ.

pluuiam

pluuiam arcendam: folio enim expasso, tres quatuorve in itinere ita operiuntur, ut pluuias non metuant.

GUIABARA, COPEY. CAP. LXXXVII.

Lib. 3. ca. 13.
& 14.
Nomina
Forma.



LIAS duas papyraceas arbores hîc describimus ex Ouiedo, quæ in insula Hispaniola proueniunt. Minor *Guiabara* Barbaris dicitur, Hispanis *Uuero*, ab uua, quod pro fructu uuas ferat. Materia est rubescente, rotunda, densa, atque ideò optima, præsertim ad carbonem ramis expansis. Uuas edit rariùs sparsas, atque à sese disitas, rosæ aut mori concolores, exigua earum parte esculenta: nam acini sunt auellanæ nucis magnitudine,

FOLIUM *Guiabara*.



FOLIUM *Copey*.



nucleum tam crassum cõcludentes, ut parum carnis superfit. Folij figuram hîc depictam videtis, ab aliarum arborum foliis planè diuersam, atque ideò memoratu dignam: maximum palmæ manus magnitudine par est, dempto pediculo. Id Hispanis in insula Hispaniola & finitimis bellum gerentibus papyri & atramenti vsum præbebat: tota enim hæc regio charta ad scribendum & atramento prorsus caret. Folium istud viride est, aliquando rubrum, crassum & æquè spissum ac duo *Hederæ* folia simul iuncta. In parte tam prona quàm supina literas pingebant acicula, aut stylo aliquo, modò recens esset, & eodem die decerptum, quæ candidæ apparebant, aut ita diuersi à folio coloris, ut faciliè legi possent: neque enim folium literas transmittit, & costa per medium eius excurrens etsi crassiuscula sit, tamen venulæ ab ea deductæ sunt tenues: ut scribentis manum nihil aut parum remorentur. Altera papyracea arbor *Copey* nuncupata in eadem insula crescit, *Guiabara* procerior, folio specie quidem simili, sed duplò maiore, crassiore, & ad scribendum aptiore cum acicula, aut stylo aliquo, venulæq; exiliores sunt quàm superioris, & minùs scribenti impedimentum adferunt. Quamobrem cum Hispaniolam & ceteras insulas Hispani subiugarent, iis foliis chartarum lusoriarum vice utebantur, quòd in iis Regum, Reginarum, equorù, & aliorum huiusmodi figuras faciliè imprimerent, nec faciliè rumpantur.

ARBOR FOLIIS AMBVLANTIBVS.

CAP.

LXXXVIII.

Pigafet. in
itin.
Forma.
Vis mi-
ra.



IN SVLAE Cimbubon vicina est alia, in qua nascitur arbor, cuius folia, cum in terram deciderint, gradiuntur perinde ac si viueret. Ea Mori foliis multum similia sunt, parte vtraque binos pedes breues, & acutos habent, quibus abstractis sanguis minimè manat. Statim atque folium quis attigerit, illud mouetur & abit. M. Anton. Pigafetta octo dies vnum in scutula habuit, quod cum tangeret, circa scutulam ibat: nullaque alia re quàm aëre viuere existimabat.

LN medicamentis & stirpibus Indicis nobis incognitis non abs re fore duxi, inquit Garcias lib. 2. Arom. Hist. cap. 1. initium facere ab arbore quadam, quæ nō nisi à Solis occasu vsque ad eius ortum floret, interdiu minimè. Arbor est Olea magnitudine, foliis Pruno similibus, flore noctu (dum scilicet floret) odoratissimo, nullius quod sciam vsus propter teneritatem, nisi quod florum pediculis, qui lutei sunt, huius vrbs incolæ vtuntur cibus tingendis, siquidem Croci modo inficiunt. Et volūt etiam nonnulli aquam stillatitiam florum, oculis vtilem esse admoto lineo panno hac intincto. Peculiaris est hæc arbor Goæ, quam è Malaca allatam asserūt. Eam sane nusquam alibi per Indiam vidi. Hanc Goæ *Parizataco*, in Malayo *Singadi* vocant. Arboris tristis nomen illi inditum, quòd duntaxat noctu floreat. Fabulantur autem indigenæ, Satrapæ cuidam nomine Parizaraco elegantem fuisse filiam, quæ cū Solem deperiret, eam ille compresserit. Cū verò postea illam relinqueret alterius amore irretitus, Parizataci filia præ amoris impatientia sibi ipsi mortem consciverit. Ex cuius crematæ cineribus (nam adhuc vruntur in hac regione cadauera) hæc nata est arbor, cuius flores adeò Solè exhorrent, vt eum videre non sustineant. Hactenus Garcias. Pretium verò operæ fuerit audire quæ de eadē planta Christophorus Acoſta Africanus, Medicus, refert. Is igitur libro Aromatum & medicamentorum in Orientali India nascentium, Arboris Tristis natales & qualitates ita describit, & quam damus icone repræsentat. Nonnullis Indiæ locis, præsertim verò in Malabar frequentissima nascitur arbor quædam, magnitudine & forma ferè Pruni, multis prædita ramis tenuibus, & certa per spacia nodulo distinctis, è quo vtrinque singularia folia enascuntur Pruni foliorum magnitudine, mollia & lanuginosa parte auersa, quemadmodum fere Saluix folia, & viridia nonnihilq; aspera parte interiore, nō adeò serrata in circuitu, vt Pruni folia, neque tam multis venis prædita. E' singulorum foliorum sede nascitur pediculus quinque capitula summa sui parte sustinens, quæ quatuor foliolis subrotundis cōstant, è quorū medio quinque flores exiliunt candidi, elegantes, Auræ mali floribus magnitudine & figura pares, tenuiores tamen, elegantiores, & odoratiores, pediculo magis ad rubrum quàm ad flauum colorem tendēte, quo in illis regionibus edulia tingunt, quemadmodum apud nos vulgò fit Croco: fructus magnitudine lupini est, virescens, cordis effigie, per medium secundum longitudinem sectus, continens in vtraque parte quoddam receptaculum, in quo semen ocluditur, magnitudine seminis Ceratij siue Siliquæ, cordis effigiem retinens, album, tenerum, membrana subuirente rectum, nonnihil amarum. Vocatur hæc arbor in Canatin *Parizataco*, in Malayo *Singadi*, in Decan *Pulab*, à Arabibus *Guart*, à Persis & Turcis *Gul*. Res est profecto obseruatione dignissima, conspiciere hanc elegantissimam arbore nocte pulcherrimis, suauissimèq; olentibus floribus onustam & hilarem, & simul atque à Solis radiis illustratur, non modò flores omnes in terram abiicere, sed totam arborem cum suis foliis quodammodo marcidā apparere. Inter omnes sanè quos vnquam odoratus sum flores nullum meo iudicio memini cum hoc comparandum, præsertim initio dum quis repentè locum ingreditur vbi hæc arbor est constituta: nam postquam manu contacti sunt, exiguus & euanidus est odor. Indigenæ istos flores cor reficere censent, sed amariusculi sunt: nam recenter ex arbore collectos & in cibus degustauimus, & nonnullam amaritudinem semper deprehendi. Gentiles etiam medici eius semen inter medicamenta cor reficientia recensent. Multi proreges, tribuni, atque alij priuati hanc arborem in Lusitaniam transferre voluerunt, sed irritò conatu. Noui etiam quosdā qui semē cōmodo tempore collectum

Forma
ex Gar-
cia.

Nomina

Acoſte
descriptio

Nomen
latina
varia.

Odor.

Florum
vires.

ARBOR *Tristis*, *Acosta*.ARBORIS *Tristis* rami
cum flore & fructu, *Clusij*.*Mogli*.

ris *Indicæ* cuius flores odoratissimi aperiuntur, & oriente Sole decidunt: quibus notis maximè ad arboris *Tristis* historiam accedit.

& maturum, vasculis figulinis vitratis atque bene obturatis, item argenteis, pyxidibusque ligneis in Lusitaniam detulerunt, ibique cum omni cura & diligentia seuerunt, sed nunquam nasci voluit. In Malabar autem & Goa, locisque vicinis cum tanta facilitate nascitur, ut quilibet rami in terram depacti comprehendant. Hæc ille, ut Hispanica eius quidem verba interpretatus est Clusius. Qui & ipse harum rerum studiosissimus, quæ ab ornatissimo viro multisque peregrinationibus claro, Dn. Fabricio Mordente Salernitano, qui aliquot annis Goæ vicinisque in India locis vixit, familiaribus sermonibus acceperat, quia publicè omnibus communicauit, eorum te hinc etiam vsu & voluptate fraudare nolumus, præsertim cum ex rami cum suis floribus ab ipso expressis collatione cum *Acostæ* delineatione facta, non parum tota huius plantæ historia illustretur. Assurgit, inquit, ea arbor interdum ad trium hominum altitudinem, iustamque crassitiem acquirit: ramos habet multis alis concauos, & foliis Myrti foliis quàm similimis onustos: in tenerioribus ramis nascuntur flores pediculis ex foliorum interna sede prodeuntibus inhærentes, copiosi, hoc est, terni, quaterni, aut plures simul ferè congesti, candidi, lasmini floribus forma magnitudinèque pares, foliisque mucronatis, ut illi, constantes, sed pleniores multiplicique foliorum textura, odoris fragrantissimi, & haud multum à lasmini florum odore dissimilis, noctu autem solent ij flores explicari, & oriente Sole, simulatque ab ipsis radiis illustrari incipiunt, ilico decidere, vel antipathia quadam, vel præ nimia succi tenuitate, quem solares radij absorbunt: nam quos Sol non attingit, diutius in arbore hæreere solent. Studiosè verò colliguntur ij flores propter odoris fragrantiam, & vitreis organis odoratissima ex illis aqua elicitur, quæ aqua de Mogli dicitur asserente Fabricio, quoniã Malauarica lingua arborem Mogli vocant, floresque idem nomen mutuati sunt. Eius fructum obseruasse negat: quem verò adpingi iussimus, sub finem anni 1579. missus est Viennensi cuidam mercatori pro fructu arboris



ADMIRATIONE prorsus dignum est, quod se ab eodem Fabricio Clusius accepisse ait de arbore, quam Ficum Indicam ipse appellat: quàmque nos, vt ab illo depicta est, hîc repræsentari curauimus. Sed quandoquidem, inquit, in Indicarum arborum narrationem incidimus, silentio minimè premendam duxi miraculo verè dignam eam arborem, de qua idem Fabricius apud me verba fecit. In magnam altitudinem vnico trunco eoque admodùm crasso assurgere solet: ramos deinde in omnia circùm latera expandit, qui tenues quâsdam fibras siue filamenta (qualia in Cuscuta vulgò nuncupata conspiciamus) coloris, dum recentia sunt, cerei siue aurei demittunt. Iis, vbi terram attigerint, firmantur, nouamq; quasi prolem generant: etenim magnam crassitiem paulatim acquirunt, & veluti in nouos arborum caudices transeût, qui nouos rursus summa sui parte in latera ramos spargentes, nouis denuo fibris deorsum missis sese propagant. Sic alij deinceps rami in infinitum, vt interdum vnica arbor suis propaginibus integrum ferè miliare Italicum in ambitu occupet, sitq; difficile, quæ primaria sit arbor, siue omnium istarum prolium parens diiudicare, præterquàm ex trunci amplitudine, quæ nonnunquam in matre tanta est, vt trium virorum vlnis vix apprehendi queat. Verùm non modò inferiores rami similes fibras spargunt, sed etià in arbore summi: ideòque vnica arbor densissimam siluam efficit. Sub eas autem arbores aditum sibi paraturi incolæ, fibras iam in truncos conuersas, tenuiores scilicet, excindere solent, atque ea ratione veluti concamerationes & vmbracula facere arcendi caloris gratia: adeò enim densis ramulis reliqui maiores rami luxuriât, vt Solis radij nulla ratione penetrare queant: imò concaui istarum fornicum multiplicésque sinus scindunt inæqualiter inde resulat: ætem aëra, quæ causa est vt Echo multis in locis ter atq; etiam sapius humanas voces reddat. Vidit verò, qui mihi referebat, interdum octingentos aut mille viros, quo in numero ipse fuisset, vnus huiuscemodi arboris umbra regi: atq; affirmabat terna etiam hominũ milia sub tali arbore latere posse. Folia fert in nouellis ramis Mali coronei folijs similia, supernè viridia, infernè candicantia, & lanugine, vti illa, pubescentia, quæ mirum in modum ab Elephantis expectantur, ideòque in eorum pabulum cedere solent. Fructus extremi pollicis articuli magnitudine, sicubus exiguis similis, colore foris & intus sanguineo, granisq; vti vulgares ficus, plenus, dulcis quidem & edulis, verùm saporis minus grati quàm illæ: nascitur autem inter folia, quemadmodum vulgares ficus, hoc est in nouellis ramis, qua parte folia illis inhaerent. Prouenit in insula Goa, locisq; vicinis. Dispicendum superest an veteribus cognita non fuerit hæc arbor, eiũve historia literarum monumentis tradita, quandoquidè illam Indiæ partem Alexandri Macedonis victoriæ Europæis etiam hominibus aperuerunt. Q. Curtius lib. 9. Histor. rerum ab Alexandro gestarum, refert, Alexandrum Poro rege, & Hydaspæ amne superato, ad interiora Indiæ processisse. Siluas

Forma.

Ficus Indica mira amplitudo

FICVS Indica.



Fructus.

An veteribus cognita fuerit.

autem fuisse prope immensum spatium diffusas, procerisque & in eximiam altitudinem editis arboribus umbrosas: plerosque ramos instar ingentium stipitum flexos in humum, rursus quas se curuauerant erigi, adeo ut species esset non rami resurgentis, sed arboris ex sua radice generatæ. Plinius verò lib. 12. naturalis Hist.

Ficus Indica Plinij.

cap. 5. de Indicis arboribus agens, in hæc verba scribit. Ficus ibi exilia poma habet. Ipsa se semper ferens, vastis diffunditur ramis: quorum imi adeo in terram incurvantur, ut annuo spatio insigantur, nouamque propaginem faciant circa parentem in orbem quodam opere topiario. Intra septem eam æstiuant pastores, opacam pariter & munitam vallo arboris, decora specie subter intuenti, proculve, fornicato ambitu. Superiores eius rami in excelsum emicant siluosa multitudine, vasto matris corpore, ut sexaginta pedes pleræque orbe colligant, umbra verò bina stadia operiant. Foliorum latitudo peltæ effigiem Macedonicæ (quæ à Xenophôte Hederæ folio comparatur) habet; ea causa fructum integens crescere prohibet, rarissime est, nec fabæ magnitudinem excedens, sed per folia solibus coctus prædulci sapore, dignus miraculo arboris. Gignitur circa Acesmem maximè æmne. Meminit & lib. 7. cap. 2. Hæc (inquit) facit vbertas soli, temperies cæli, aquarum abundantia (si libeat credere) ut sub vna Ficu turmæ condantur equitum. Strabo item Geograph. lib. 5. similem etiam arborem describit, tametsi nullo nomine insigniat, his verbis.

Indica arbor admirabilis.

India multas quidem admirabiles arbores fert, è quibus est, cuius rami ad terram propendent, foliis non minoribus clypeo. Onesicritus curiosius ea persequens quæ sunt in Musicana terra Indiæ australissimæ, refert arbores quasdā ingentes esse, quarum rami cum ad duodenos cubitos ereuerint, reliquum incrementum pronum faciant, deflexi quousque terram contingant, deinde terram subeant, ac radices agant veluti traduces, mox rursus in truncum exeant, à quo postquā aucti fuerint, eodem modo flectantur, & aliam propaginem efficiant, rursusque aliam: & sic deinceps, ut ab vna arbore longum vmbraculum fiat, tabernaculo multis columnis nitenti simile. Ex quibus descriptionibus facile cuius colligere licet, eam arborem, de qua nobis institutus est sermo, illos auctores intelligere voluisse. Sed diligentius presciusque Theophrastus, qui Alexandri coætaneus fuit, quiq; haud dubiè eorum narrationes curiosè excepit, qui sub Alexandro in Indica expeditione militarunt. Is enim simili planè modo, paucis duntaxat notis variatibus, Ficum Indicam describit, qualis illa arbor est, cuius historiam ex Fabricij narratione dedimus.

Ficus Indica Theophrasti. Cap. 12.

Plantarum igitur historiæ lib. 4. cap. 5. sic ait. Indica autem regio arborem Ficum vocatam sortitur, quæ è ramis radices demittit singulis annis, ut primo volumine retulimus: demittit autem non ex nouellis, sed ex anniculis, atque etiam vetustioribus. Illæ se terræ coniungentes, seu septem circum arborem faciunt, ita ut veluti tabernaculum condatur, quo etiā morari homines solent. Radices autem nascentes euidentissimè à ramis discernuntur: sunt enim candidiores, hirtæ, (διαστέται) tortuosæq; binæque fronde foliaræ (διφυλλαι). Item arbor comam supernam lasciuam gerit, (ἔχει δὲ τὴν ἀνω κόμην πολλήν) totaq; fornicato ambitu pulchrè orbiculatur, & magnitudine vehementer excellit: quippe vmbram bino stadio facere fertur: & crassitudine caudicis plerasque ultra quàm sexaginta graduum (βημάτων, pedis vestigiorum) orbem colligere, magna verò ex parte quadraginta. Folium pelta non minus habet, (potius ad similitudinem quàm ad amplitudinem referenda hæc comparatio) fructum admodum paruum, magnitudine ciceris, fici cui similem: quamobrem Græci Ficum eam arborem appellabāt. Paucos verò admodum fructus fert, non tantum pro arboris magnitudine, sed etiam omnibus rebus. Nascitur arbor hæc circa Acesmem æmne. Hactenus Theophrastus. Cum itaque tam multis notis Ficus Indica à veteribus descripta, cum admirandæ huius arboris in India nascentis (cuius nomē vulgare sibi excidisse seriò dolet Fabricius)

historia

historia conueniat, eo audaciùs illi Ficus Indicæ nomen indidi, præsertim cum illam ipsam esse certò mihi persuadeam. Garciam autem illius nullam mentionem facere inter tot exoticas arbores locis Goanæ insulæ vicinis nascentes, quarum descriptiones in Aromatum historia aspersit, satis mirari nequeo. Nos porro iconem ex Fabricij narratione, quàm concinnè ex ipsius etiam iudicio fieri potuit, adumbrare iussimus in studioforum rei herbariæ gratiam. Cæterum cum hac arbore cognationem habere videtur, quam Ouiedus Indicæ historiæ lib. 9. describit his verbis Latinè ex Italico expressis. Mangle arbor est inter eas quæ in occidentali India vulgò nascuntur selectissima, cum ad ædificiorum fabricas, tum ad reliqua fabrilia opera. Crescit vlginosi locis, littore maris, & ripis fluminum torrentiumq; qui in mare dilabuntur: folia habet Pyri maioribus foliis similia, crassiora tamen, & aliquantum longiora: siliquas duorum palmorum longitudinis aut maiores, crassaq; Calsiæ solutius fructui pares, fusci coloris, pulpam medullæ ossium similem continentes, qua Indi aliorum eduliorum penuria vescuntur: etenim satis amara est, salubrem tamen cibum esse ferunt. Ego eius nihilominus esu in morbum incidi, licet adeo delicati palati non sim, nec ab iis cibis abstineri in penuria soleam, quibus alios vesci video: imò etiā nulla vrgente penuria degustare soleo, vt commodiùs describere queam: eaq; ratione hunc fructum degustavi, sed brutorum animantium & siluestrium hominum potius cibus est. Admiranda est eius natura, plurimæ enim simul crescunt, multive eius rami deorsum vergere & in radices conuerti videntur: nam præter plurimos quos erectos folisque onustos atq; ab inuicem seiunctos vt reliquæ arbores habet, multis etiam aliis cum crassioribus tum tenuioribus aphyllis sese ad aquam vsque demittentibus, & sub terra aut arena radices figentibus prædita est, qui vbi apprehenderint, alios ramos sursum vergentes proferunt: non enim minùs firmiter hærent quàm primarius arboris truncus, sic vt arbor multis caudicibus simul connexis constare videatur, egregio sanè spectaculo, & singulari huius arboris natura.

Magle historia.


ARBOR FARINIFERA. CAP. XCI.



NOTISSIMA est & omnium ore celebrata nobilis illa Francisci Drake Angli recens vniuersi orbis circūnauigatio. Is cum superioribus annis ab ea expeditione reuersus felicibus auspiciis in Angliam omnium stupore, nec minori cum fauore & gratulatione appulisset, Carolus Clusius, qui ea in insula tunc temporis fortè agebat, & ipse rerum nouarum audiendatum studio & cupiditate incensus, his, qui eundem in illa nauigatione comitati erant, sese vt applicaret operâ dedit, adq; ipsum adeo præfectum Drake sibi parauit aditum: à quo exceptus perhumaniter, quorum addiscendorum desiderio tenebatur, omnia ea beneuolè & pleraq; alia scitu dignissima ipsius ex ore accepit, quæ cum eiusdem comitû & grauiû altoquin & fide dignorum relatione omnino consentirent. Horum ego omnium, tum aliorum quorundam exotico- rum fructuum, quos in Britannica ista peregrinatione acquisiui, breues descriptiones, & nonnullorum etiam icones in rei herbariæ studioforum gratiam exhibere, inquit, volui, non minùs gratas eis futuras sperans aliis lucubrationibus priùs in lucem à me editis. Hæc de nouis suis plantarû aliquot descriptionibus Clusius, quas nos pro instituto nostro ex Notis, quas in Garcie Aromatum historiam post tertiam editionem idem conscripsit, desumptas ipsius Clusij verbis aliquot capitibus hic apposuimus: quibus Arboris, quæ Farinifera vocat, Fructus Beretini, Cacao, Vvinterani corticis, Drakenæ radicis, Variorû præterea fructuû peregrinarum iucundissima continetur historia. In Tarenate ergo, inquit, insula

Beretini fructus historia.

*ARBORIS Farinifera,
Panis fragmenta.*



Æquatori proxima ad Arctici polum vergente nascitur arborea quædam planta, cuius truncus humanæ coxæ crassitiem æquat, decem pedum altitudinem attingit, summo fastigio in orbiculatum caput Brassicæ capitatae instar extuberans, in cuius meditullio natura quandam candidam farinam produxit ad illius insulæ homines tenuioris fortunæ sustentandos : eam etenim diligenter colligunt, deinde adfusa, siue inspersa potius modica aqua fermentant, pin-sunt, & in formulas quasdam coctili latere constantes immittunt longa serie, atque prunis accensis circūquaque admotis & superetiam impositis coquunt. Sunt verò ij panes siue placentæ interdum palmares, vnciali crassitie, quibus illius insulæ incolæ calidis & recenter coctis vescuntur at vbi induruerunt tepida aqua macerantes pulvis modo edunt. Insuper saporis esse, cum degustarē, hic panis mihi visus est : verū iniecto Piperis aut Cinnamomi momēto cum saccharo, nonnullis deliciæ esse queat. Eiusmodi panis bina fragmenta qualia nostri Morgani opera accepi, hac tabella exprimi curauimus.

FRUCTVS BERETINVS. [CAP. XCII.]

*Arboris
Beretini
Forma.*



IN EADEM insula cellissimas inuenerunt arbores Quercu maiores, foliis laurinis, crassis, splendentibus, & minimè in ambitu serratis, quæ oblongiusculum fructum ferūt, exiguis iligneis glandibus similem, nullo tamen calice, vt ipsi referunt, inclusum, cortice tenui cinereo, interdum atro, tectum, nucleum continentem oblongiusculum, candidum, nullo (dum induruit) manifesto sapore præditum, tenui membrana tectum.

FRUCTVS Beretinus.

*Fructus
Vsus.*



Similibus arboribus abundat Beretina insula illi vicina, ad quam postea delati sunt : à cuius in collis illarum arborum fructum, quem prius non attigerant, edulem esse didicerunt. Eo deinde more leguminum elixo, aut in farinam cōtuso, & pulvis modo cocto & inspissato, alterius cibi penuria cum in ea insula, tum in naui famē subleuarunt. Eam arborem etiam alunt omnes Moluccæ insulæ. Eum porro fructum, cuius iconem hac tabella exprimimus, cum C. V. Dn. Richardus Garth Cancellariæ Londinensis Primicerius,

vir insigni pietate & doctrina præditus, atque humanissimus, & optimè de me meritis, tum noster Morganus, mihi liberaliter communicarunt. Eorundem munere librum arboris habui, tenuissimæ membranæ instar candidum, quo omnis generis scriptura perinde atque vulgari papyro excipi queat. Eum in Iaua insula aliarum mercium permutatione Drake comites acceperant.

*Papyrus
ex Iaua.*

C A C A O .

CAP. XCIII.

ELEBREM etiam per vniuersam Americam multiq; vsus fructum, Perüanæ provincie litora legentes, secum detulerunt, *Cacao* appellatum, cuius cum luculenta descriptio apud Benzonem extet, qui miles aliquot annis Noui orbis provincias peragrauit, ipsius verba, vti ab Urbano Caluete Latino facta sunt, hic subiicere libuit. In Nicaragua Noui orbis provincia pomi quoddam genus peculiare est, neque Hispaniolæ, neque vlli alteri Indiæ parti concessum. Pyri nostri specie ferè est, ligno interiore rotundo, nucis crassitudine, & dimidio amplius, optimi & iucundissimi saporis: arbor procera, exiguis foliis vestitur. Hispani cum primùm eam provinciam subegerunt, propter vberissimam omnium rerum ibi repertam copiam, eam Paradisum Mahumetis nuncuparunt. Duo inter cætera fert hæc tellus nulli præterea Indiæ regioni concessa, excepta Guattimala, Hondurensis provincie & Mexici finibus, totòque nouæ Hispaniæ tractu. Vnum pauonum quoddam genus est, qui in Europam translatus vulgò Gallinæ Indiæ vocantur. Alterum, id quod *Cacauata* vulgò vocant, quod monetæ vsus illis præbet. Id fert arbor modicæ magnitudinis, nec nisi calido loco & opaco viuut. Simul ac sole tactum est contabescit: itaque ferè in siluis vmbroso & humido loco feritur: neque id satis, sed iuxta eius generis arborem aliam editiorem plantant: quæ simulac adolescere cæpit, eius cacumen ita concinnant aptantque, vt adulta ea arbor Cacauatem inumbret, defendatque ita ab æstu, vt Solis radiis lædi non possit. Fructus amygdalarum specimen referens, siliquis quibusdam velut cucurbitis includitur, crassitudine & latitudine Cucumeris, annuo spatio maturascit. Maturas eas vbi legere, excussum folliculis fructum super storeis expassum ad solem exponunt, donec humorem exudauerit. Potum ex eo confecturi, in testa fictili ad focum exsiccant: mox lapidibus, quibus pinsitur panis, contusum & comolitur, fustumque in pateras (quæ cucurbitæ specie è certis arboribus per omnem Indiam enascuntur) paulatim aqua temperant, atque interdum paululo pipere, quali vulgò vtuntur, condiunt, eoque in potu vtuntur. Porcorum ea veriùs col-

Pomū Nīcaraguz.

Paradisus Mahumetis.

Cacao hīstoria.

C A C A O .



luues quàm hominum potio. Quum eam provinciam peragrarem, plusquàm integrum annum ab tali lora abhorruui: sed quum mihi vini copia non esset, ne semper aquam bibere cogerer, alios imitari didici. Ea cælia sapore aliquantum amaro, satiat & refrigerat corpus, minimè tamen inebriat hæc præcipua & carissima merx earum regionum est: neque quicquam aliud Indi maiore in pretio habent, vbi quidem in vsu est. Hactenus Benzo. Amygdalæ planè similis est hic fructus suo putamine exemptæ, membrana tectus tenui, nigra, nucleo, qui in binas aut ternas partes diuidatur, subfusco & cinereis venis distincto, adstringentis & ingrati gustus: quare non mirum est, si qui primùm degustant à potione ex eo confecta abhorreant, ego profectò puram aquam longè prætulerim. Eam tamen claris hominibus propinant, vt nos aromatites viuum solemus, referentibus iis qui pauculos fructus retulerunt, è quibus binos habui.

Vvinterani
corticis
historia.

Forma.

VVINTERANVS cortex.



Vires.



admodum dissimilem, plerumque tamen crassiore, & parte externa vel cinereum, vel aliquando etiam fuscum, & vlmei corticis modo scabrum, interna nonnunquam dissectum & multis rimulis hiantem vt Tiliæ cortex, interdum etiam admodum solidum & durum, odore non ingrato, sed gustu perquam acri, & linguam faucisque non leuius vrente quam piper. Illius facultates nullas exploratas habuit: sed eo, dum recens esset, partim melle condito, vt acrimoniam deponeret, partim resiccato & in pollinem trito, vt in eduliis Canellæ aliorumque aromatum vicem præberet, vsi sunt qui ea naui vehebantur. Postea tamen intellexi aduersus stomachacis siue scorbuti morbum, quo eorum nonnulli in illa nauigatione affecti fuerant, optimo successu vfos esse. Plurimum mihi accedere videtur ad Ligni aromatici corticem, cuius D. Monardes in Simplicium historia meminit, tametsi singularem illam odoris fragrantiam, quam suo cortici tribuit, in hoc deprehendere non potuerim.

DRAKENA RADIX. CAP. XCV.

Drakenz
radicis
historia.

Forma.



EMVNCIALI plerunque crassitudine prælongaque hæc radix est, subinde in nodos & inæqualia capita extuberans, & in summis capitibus, veluti è crassis squamis contexta, Dentariæ enneaphylli (quam in Pannonicis describo) modo, foris nigricans, & rugosa duraque cum resiccata est, intus alba: fibris tenuibus sparsim nascentibus prædita, interdum maiusculis fractisque contumacibus, è quibus alij nodi depèdent. Nullo manifesto odore polere deprehendi: sed gustu nonihil adstringente & linguam exsiccante initio esse videtur, deinde diutius præmanfa, tenuem suauemque acrimoniã in ore relinquit. Magnam affinitatem habere videtur cum Radice S. Helenæ, de qua D. Monardes in lib. Simpliciu è Nouo orbe delatorum. Sed cum M. Eliot qui Dn. Drake comes fuit, Hispanos in Peru maximo in pretio habere, nec pretio redimi posse referat, ab iisque didicisse folia præsens venenum esse, ipsam autem

autem non modò illius, sed reliquorum etiam venenorum antidotum esse, atque cor & vitales facultates roborare, si pollinis modo trita, mand ex pauxillo vino albo hauriatur, ex aqua verò febris ardores mitigare. Earum facultatum ratione, valde conueniret cura radicibus venenis aduersantibus, de quibus eodem libro Monardes: in his tamen aromaticum saporem & caloris gradum desidero quem iis radicibus tribuit. Ipse Drake sanè cum mihi eas, quas hîc exprimo, cum Perùano lapide Perar donaret, summæ esse estimationis apud Perùanos asserbat.

VARIi FRUCTVS PEREGRINI. CAP. XCVI.

DONATOS sibi ab amicis, cum Londini esset anno 1581. peregrinos aliquot fructus, refert idem Clusius. Horum, inquit, maior ex eo genere est, quod in annotariuncula ad caput 26. lib. 1. Historiæ Aromaticum secundo loco descripsi, sed longè amplior, utpote qui ternas vncias longitudine superet, crassitie vnam, altitudinæ duas ferè æquet, alioqui forma & colore eidem planè similis: nempe crasso cortice seu putamine constans, inferiore parte sessili, rugoso, scabrôve & cinereo, superna autem & gibba læui, subrufo, vel potiùs spadiceo, ita ut anima culum duro corio tectum videatur. Pregnans est, & nucleum intus continet duas vncias longum, vnam latum, germen, extrema parte simul coherentem, tenui cinereaque membrana tectum, materie firmæ ut amygdalæ aut castanæ recentes, subfusca, pingui, & oleaginosa, odore satis iucundo prædita, & gustu non ingrato. Eum accepit Lusitanus quidam mercator Petrus de Frias nuncupatus à proninciæ Peru Prætege, pro fructu illius arboris in Nouo orbe nascentis, ex qua Balsamum elicitur, cum ipsò Balsami oleo. Verùm, si D. Monardis descriptioni credendum est, longè minor est Balsami fructus. Consule finem capituli 8. ipsius Hist. Simpl. ex Nouo orbe delatorum, quam pridem Latinam fecimus. Alter nucis iuglandis ferè magnitudine est, extrema parte latiuscu-

Balsami fructus.



BALSAMI fructus.



lus, totus rugosus, atque ut nucis iuglandis putamen inæqualis, niger, sed magna ex parte veluti crusta quadam durissima & cinerea tectus: levis est & minimè ponderosus, tamen si admodum solidus sit, & sæpe duritie præditus, nec minùs in aqua subsidat quàm lapis: confractus crasso durissimoque cortice constare deprehenditur, & nucleum candidum, succulentum, grati saporis, iucundique odoris, oleum ferè Macis referentis continere, in binas partes sectum & tenui candidaq; membrana diuisum, alia insuper paulò crassiore firmiorque inclusum. Eiusmodi ante plurimos annos Antuerpiæ inter aromata inuentos memini. Magnam similitudinem habet tertius cum prima nuce in adnotationibus ad 26. cap. 1. lib. Hist. Aromaticum descripta, sed paulò minor est, angulosus, niger, crassioribus quibusdam firmisque villis ipsi incumbentibus & firmiter in hærentibus oblectus, altera parte tribus foraminum vestigiis insignitus, quorum tertium maiusculum est & infra spectat. Præduro putamine constat, & pregnans


III.

*U A R I I fructus
peregrini, Clusij.*



NVX FAVFEL

Alij fructus peregrini Clusij.



II.

III.

prægnans est, nam concussus crepitat & sonitum edit. Quartus, nucis auellanae magnitudine, & eiusdem colore, putamine duro, veluti in duas partes diuiso, nucleum intus continens.

Similes aliquando Granatæ in Hispaniis accepti ab Ill. Dn. Didaco ab Stuniga, recēs ex Aphrica (*Elpenon de Velezarce* ab Hispanis occupata) delatos, nucleum cōtinentes album, dulcem : quas ad Vnguentariæ nucis genus aliquod referendas existimabam. Quintus, duntaxat nucleus est suo putamine siue cortice exemptus, firmus, tenui membrana fusca & multis venis distincta, firmiterque ipsi nucleo inhaerente reclusus: ipsa materies firma est, candida, pulpæ nucis Indicæ siue Cocci similis, nullo quidem odore prædita, sed satis grato sapore. Calidum in primo gradu, aut secundi initio arbitror. Sextus, orbiculari ferè rotunditate & tanquam torno elaboratus est, ouo passerino minor, flauus omni ex parte, nisi in altera extremitate subfusca macula insignitus esset, solidus, lapideæque duritie, & in aqua subsidens. Priores quinque à Iacobo Gareto iuniore Aromatario, viro integerrimo accepti : sextum ab humanissimo doctissimoque viro Dn. Ioanne Rizio Seren. Regina Angliæ Elizabethæ pharmacopœo, qui multis beneficiis dum Londini essem me affecit. Eum verò à C. V. Nicolao Rasio accepisse fatebatur. At postquam Viennam redij, inter multos exoticos fructus, quos, ut alia pleraque rariora, suis capsis inclusos adseruo, alios inueni quos à nemine adhuc descriptos existimo.

Rem itaque minimè ingratam studiosis me facturum arbitratum sum, si illorum breues descriptiones, atque icones superioribus adiicerem. Prior, alteri iam memorato non admodum dissimilis est, sed minor, & Ponticam nucem non excedens (tamen iuglandi ferè æquales videre meminerim) læuis, splendens, cinerei coloris, & fæxa duritie præditus, licet in aquam demersus supernaret, inæqualis aliquatulum, & compressus, uti pisæ quæ in eadem siliqua nata sese mutuo contigerunt. Alter, ovalis, Iudaico lapidi magnitudine par, & eius formam exceptis striis

pulcherrimè exprimens, ex rufo nigricantis coloris est, ut maiores nonnullæ gallicæ læuis, & aquæ impositus supernatans, duro putamine constans, ac nucleum continens. Tertius, illo minor, & mediocrem nucem auellanam non excedens, orbicularis ferè, nisi infima parte paulò augustior in triangularem veluti cuspidem desineret, colore alteri similis est, & tamen læuis, in aqua subsidens & imum petens, duro crassoque putamine constat, & nucleum candidum tenui fusca mem-

brana


brana tectum continet. Vtrumque hunc anno humanæ salutis 1579. Londini natussum à nostro H. Morgano, qui ex ea Nigritarum in Aphrica regione quæ vulgò Guinea appellatur, & circiter quinque gradus ab æquatore distat, eodem anno delatos afferebat: eam ob causam initio subsequēntis anni, maiorem vnum,



.VIII.



.IX.



.XI.



.X.


& minores duos, quorum alter suo putamine exemptus erat, terræ in fictili credidi: sed neuter natus est, quemadmodum nec sequentium nonnulli, quos cum in Belgio, tum hæc terræ commisi. Quarto sphaerica penè est figura, magnitudo ferè vncialis, putamen crassum admodum & durum, perpetuis tuberculis vndique oblitum, coloris flavescentis, linea eminentiore transversum secante, quam, vt in iuglandibus, putaminum coniunctionem & commissuram esse arbitror. Quinto planè sphaerica est forma, magnitudo vulgaris globuli bombardici, putamen eiusdem cum superiore coloris, & perpetuis similiter tuberculis, at non adeo crassis oblitum, nullaque linea cinctum. Sextus, officinarum Nuce vomica maior est, planus idem atque similis coloris, nempe cinereus, superna parte paulò eminentior, & in ambitu quodammodo sinuosus, infima verò, quinque grana inter se disuncta, & veluti ipsi impetella ostendens, mespilorum setaniorum osticulis non valde ab similia, quæ exempta, satis alta lacuna-

rum vestigia relinquunt. Totus linea duritie præditus est. Septimi forma etiam plana est, sed à superiore discrepans, rugosa & nonnullis locis intumescens, color ex cinereo nigricans, qualis in nonnullis *Caïum* fructibus, quorum iconem & historiam libro Aromatum cap. de Anacardio dedi. Is per medium sectus nulla grana, sed splendentem quendam nigrumque succum iam coactum & induratum duxat continere deprehenditur: itaque inter fructus potius vitia quam inter fructus numerandum censeo. Hos omnes cum Acaciæ veræ siliquis & seminibus, parvis quibusdā cochylis, & aliis quicquid in Piperis repurgatione & delectu aliquando inuentos memini. Sequētes verò olim nouo orbe delatos ex Hispaniis accepimus. Octauum, Pinei alicuius generis nucleos esse existimo, adeò nostratis pineæ nuci siue strobili nucleos referunt, licet plerumque nostris sint & longiores & crassiores: durum similiter putamen & idem color. In nono quædam est varietas: nam alter altero maior & amplior est, licet color & forma propemodum eadem. Planus est & oblongiusculus, altera parte latior, altera angustior, glaber & lævis, totus fusci aut interdum spadicei coloris, nisi linea quædam candicans, qua parte suo fructui adhæsit (nam altero inclusus fuisse videtur) varium faceret: prægnans est, & sonitum edit. Hi duo *Pepitas del Peru*, id est, acinorum Peruanorum nomine insignes missi fuere. Decimus *Cassia* solutivæ, aut Ceratiorum semen magnitudine æquat, cui etiam forma persimilis est, sed tumidior aliquantum, & colore differens, qui in hoc egregiè rubet vt in *Oxyacanthæ* fructu, solidus & durus, atque in aqua subsidens & imum petens: siliqua aut alio fructu inclusum fuisse arbitror. Eum nomine *Mates* accepi. Postremum locum occupabit Phasiosus ille color, *Macouma* simili, hoc est, ex spadiceo nigricante, sed planiore longioræque forma, hi lo non admodum magno, cuius ad epistolam Petri de Osma Nicolao Monardes inscriptam,

inſcriptam poſtrema editione memini, quique Diuo Maximiliano II. feliciffimæ memoriæ Cæſari ex Hiſpaniis miſſus fuit, *Haba de India muy larga*, id eſt, Fabæ Indicæ prælongæ nomine. Aqua merſus imum petit.

CORV.

CAP. XCVII.

Locus.  N prouinciis China, Iapan, Malaca & Bengala, inquit Chriſtophorus Acoſta, præter Macer arborem, de qua nos huius libri cap. 14. naſcitur duæ aliæ arbores plurimū inter ſe differētes, ſed quæ iſdē facultatibus cum Macere ſint præditæ. Harum prior (de qua hoc capite agemus) vocatur in Malabar *Curodapala*, & *Curo*, in Canarin *Coru*, à Brachmenis *Cura*. Eſt verò hæc arbor pumilæ Malo aureæ ſimilis, cui etiā perſimilia habet folia, ſed quæ medium neruum craſſiorem habeant, aliis octo aut nouem in latera excurrentibus: flos luteus eſt, odoris ferè expers: radicis cortex diluto virore præditus eſt læuis & tenuis, qui ſi frangatur aut vulneretur, multo lacteo ſucco manat, lentiore & magis viſcido quàm qui ex ſuperiore fluit, guſtu inſipido, amaritudinis tamen alicuius participe, frigidus & ſiccus, plus tamen ſiccitatis quàm frigiditatis poſidens, in quo ordine Medici illius prouinciæ etiam conſtituunt. Huius virentis corticis ſucco, licet admodum ingrato, plurimū vtuntur incolæ cum gentiles tum Chriſtiani ob admirandos quos præbet effectus in omni genere profluuij, cum in lenteria tum in diarrhœa & dyſenteria è quacunque cauſa prognata. Luſitanitamen Medici methodum in eo exhibendo ſeruant. Vtuntur etiam eo ſiccò veluti priore: ſed prioris cortex longè præſtat. Diſtillant verò atque vtuntur in hunc modum. Corticis in puluerem triti vncias octo, ammeos, apij, coriandri ſicci, cumini nigri nonnihil toſtorum & in puluerem redactorum ſingulorum drachmas tres, corticum Myrobalanorum Cepulorum drachmas ſeptem, butyri vaccini non ſaliti vncias duas, lactis acidi quantum ſatis eſt ad pulueres iſtos excipiendum, ſumunt in diſtillatoriam ollam vitream (ſi delicatioſibus paratur) aut vulgarem (vt maxima ex parte fit) imponunt, & ſtillatitium liquorem eliciunt, cuius quatuor vel quinque vncias cum aquæ auellanæ Indicæ, vulgò *Arcca* nominatæ, aut aquæ è pediculis roſarum vnciis duabus propinant alui profluuiio laborantibus, (interdum, ſi neceſſitas vrgeat, trochiſcos de charabe vel de Lemnia terra admiſcent) ſemel in die, vel bis ſi opus ſit, illico autem poſt eius ſumptionem, orizam cum oxygala exhibere ſolent. Clyſteres etiam ex eo conſecti præſertim ſub noctem iniiciuntur. Licet verò hic liquor admodum commendabilis ſit, longè tamen præſtantior eſt Maceris cortex viridis, licet multò ingratior, & ſumptu difficilior. Vtilis etiam hæc eſt radix ſeu cum orizæ decocto ſumpta, ſiue inuncta aduerſus hæmorrhoides & ani ſciſſuras. Foliorum eius cum Tamarindorum foliis decoctorum vapore crura tumentia vtiliter fouentur: ipſo autem decocto madentes panni commodè in tympanite applicantur.

PAVATE.

CAP. XCVIII.

Nomina

LTERA iſtarum ſtirpium, tertium videlicet genus earum quæ ad alui profluuium vtilis ſunt, vulgò in Malabar dicitur *Pauate*, à Brachmenis & Canarinis *Vaſaſeli*, à Luſitanis *Arbol contra las erisipolas*, hoc eſt, Arbor eryſipelas curans. Frutex eſt non admodum ramoſus, octo aut nouem pedum altitudinis, cui rara ſunt folia, Mali aureæ minoribus foliis ſimilia, excepta appendice qua carent, vtrimque eleganti virore prædita: flos exiguus, candidus, quatuor foliolis præditus, è cuius medio exit alba fibra cuſpide viridi inſignis, odore floris Periclymeni, cui procul aſpicientibus perſimilis videtur, ro

Forma.

PAVATE, *Acosta.*

to vulnere labia circumquaque inungi solent ad inflammationes prohibendas, & humorum defluxus cohibendos. Quoniam verò iis in provinciis multò maiore quantitate hoc tertium genus quàm secundum *Coru* nuncupatum crescit, inco-
læ eo vtuntur.

MAMBV, *sive arbor Tabaxir.*

CAP. XCIX.



NVENIUNTUR interdù hæ arbo-
res siue arundines, vocatæ *Mam-
bu*, in quibus nascitur *Tabaxir*, tan-
tæ amplitudinis & crassitie vt ex
ea cymbas faciant, quæ binos viros capere pos-
sint, non quidem eas excavautes, sed relictis sol-
lùm duobus internodiis excidentibus. Conscen-
dere verò solent similes cymbas bini Indi, iiq;
nudi (nam nudos incedere in iis regionibus mo-
ris est) sederéque singuli in eius extremitatibus,
iunctis cruribus, tenentésque singulis manibus
remos trium aut quatuor palmorum longitudi-
nis, quibus eas cymbas impellunt tanta dexteri-
tate, vt etiam aduerso rapidoque flumine sum-
ma celeritate nauigare possint, quæadmodùm
meis oculis conspexi in flumine *Crâganor*, in
quo plurimus est vsus cymbarum ex hac arun-
dine confectarum, quoniam qui eis vehuntur
securiores sese existimant à *Crocodilis*, quos illi

*Ampli-
tudo.*

*Crâganor
flumen.*

Crocodili.

Caymanes vocant, magno numero in eo flumi-
ne versari solitis. Nam cùm ij ferocissimi sint, sæpenumero in naues maiusculas &
minusculas impetum facere solent, vt eos qui illis vehuntur apprehendant. Si enim

aut in flumīe, aut in litore hominē, bouem, bubalum, aprum, porcum, aut quodcumque tandem aliud animal comprehendere possint, illico deuorant. Indigenæ autem affirmant nunquam compertum esse, vt eos qui cymbis ex Mambu confectis vehuntur appetant, sed sæpenumerò conspectos esse natantes proxime illas, at tamen eas præterire sine noxa.

LIGNVM MOLVCCENSE. CAP. C.

Forma.



Nomina

LNVENITVR in Moluccis arbor quædam domestica Mali cotoneæ magnitudine, cuius folia Maluæ vulgaris foliis sunt similia, fructus verò auellanis, sed minor, molliore cortice & nigricante. Seritur coliturque in hortis diligenter, nec alibi facillè inuenias: tanti enim ab incolis æstimatur, vt peregrinos ne ad eius quidem conspectum admittant. Incolæ *Panaua* appellant. Cum verò istic Régis nomine gubernaret prudētissimus & animosissimus Dominus Ludouicus de Tayde, ipsius nomine hæc arbor dicta fuit, quoniam ille primus nobis eius insignes facultates aperuit. Accidit enim vt nobilis quidam Lusitanus, Henricus de Lima vocatus, dum in Moluccis versaretur, animaduerneret quanta cura & diligentia incolæ hanc arborem colerent, quantūque æstimarent, atque ideò illius facultates apprimè intelligere cupiens, nonnullas tandem edoctus est. Nactus igitur trunci huius arboris partē, eam obtulit Proregi, bonarum rerum, & naturæ secretorum studiosissimo, tãquam medicamentum valde necessarium, cognitūque dignum, & nostris hominibus hætenus inauditum. Anno autem sexagesimo primo supra millesimum & quingentesimum interrogans me Prorex, an aliquid de hac arbore inaudissem, aliquot eius facultates retuli quas ab aliis didicissem, conquerēs arborem nondum licuisse videre: tum ille eius quod habebat fragmento me donauit, imperans vt cum iudicio & ratione experirer, nec vllius vitam periclitarer, deinde rerum successum illi significarem: quod me facturum recepi. Eius itaque ligni periculum feci, cum in nonnullis ægris quorū curam habebam in nosocomiis, tum in variis morbis qui in longa nauigatione plerumq; oriri solent dum in Lusitaniam redirem, partim adiutus facultatum relationibus quas intellexerā, & vtendi methodo, partim iis quæ nobilis ille in Moluccis didicerat. Illius semen iam antè videram mihi donatum ad aues capiendum: etenim eo in aucupiis vtuntur non modò in illa regione, sed etiam in multis Indiæ prouinciis, ad quas eius rei gratia venale defertur. Eius pauxillum cum oriza cocta mixtum auibus siluestribus exponunt: quæ degustāt, illico decidunt sopitæ & stupide, quæ verò auidius id edūt, moriuntur antequam illis auxilium præberi possit, quod est, vt frigida caput perfundatur. Graculi omnium citissimè eo degustato extinguuntur. Nunc ad salubrem huius arboris materiem accedamus, cuius pauxillum hodie plurimi facio. Intus sumptum, aut foris appositum, omnibus venenis resistit. Intrò assumitur magno commodo ex aqua rosacea vel vulgari, autiūmque iuscūlo eius pulueris apta quantitas pro necessitate, & ægri natura, modò decem grana non excedat, sed infra id pondus consistat. Ad viperam, Regulorum (qui serpentes pileati appellantur, & admodum noxij sunt) aliorūque similibus aspidam aut serpentum morsus bibitur hic pulvis ex aqua, ipsiq; moribus pulvis inspergitur. Eadem ratione præbent in vulneribus quæ à sagittis toxico illitis facta sunt, quibus illius regionis incolæ plurimū vtuntur. Puluerem verò ex hoc ligno sibi parant lima è pelle marinæ caniculæ confecta, aut tenui aliqua ferrea lima. Robustissimo cuique dimidius eius scrupulus ex aqua limpida tepida aut rosacea, aut gallinarum iuscūlo tepente, summo mane datur: cœna autem diei præcedentis parca esse debet euacuat enim omnes humores, præsertim crassos, lentos, & melancholicos: conuenit quartanis, diuturnis, febribus con-

Vfus.

Vires.

bus continuis, iliacis, colicisq; doloribus, flatibus, hydropisi, arenulis, renum calculis, vrinæ difficultatibus, fræuissimæ colericæ passioni, aliisq; morbis, veluti articulorum & tibiæ inueteratis doloribus, scirrhis & scrofulis. Omnis generis lumbricos necat, & appetentiam deiectam reuocat; & si nimia fiat euacuatio, bibat æger dimidium cyathum *Cania*, hoc est, decocti orizæ, aut auiculam comedat: subito cessabit, quod sanè multa laude dignum est, paucisq; medicamentis vulgare, vt in potestate sit medici aut ægri, purgari quantum cupierit. Huc accedit quod neque fœtorem, neque tedium, neque metum dum sumitur pariat, possitque sine diætæ obseruatione, etiam iis qui sua negotia foris peragunt, propinati, vt ex iis deprehendi qui vnà mecum eadem nauì uehebantur, nullum sentientes incommodum, tamen si dum purgarentur nulla diætā vterentur, viuerentq; solutissimè. Obseruaui etiam illius præstantiam in inueteratis capitis doloribus, hemicrania, apoplexia, aurium tinnitu, arthritide, ventriculi & vteri affectibus & asthma. Propterea fidens illi plurimum, sapius in diuersis naturis, ætatibus & locis, feliciter vsus sum, & sine vlla molestia, nisi quod in biliosis naturis, calidisq; ventriculis nonnihil molestia pareret donec cibum sumerent, & in nonnullis vomitum excitaret; sed biliosis hunc puluerem nonnunquam dedi syrupo acetoso aut camæbola condita exceptum, aut in catapotia cum saccharo rosato efformatum. Exhibendus est summo mane, neque cibus aut potus concedendus donec purgati sint quantum necessarium videtur, tum demum cyathus iusculi gallinarum tepidi datur, dimidiaq; aut integra hora post conceditur pullus gallinaceus, & paululum vini aqua bene diluti, deinde toto illo die potu abstinet ad cenam vsque, quæ parca erit, & facilis concoctionis. Subsequenti die sumitur saccharum rosatum cum aqua buglossi, aut borraginis, aut communi, atque iniicitur clyster ad aluum eluendam. Solet verò interdum in nonnullis ani pruritus & excoarationem excitare, atque in aliquibus (sed paucis admodum) hæmorrhoides. Hæc sunt quæ de hoc ligno Panayæ conspexi & intellexi. Nunc verò in illis regionibus magnus est eius vsus, tantaq; æstimatio, vt sine metu in multis morbis supra enumeratis vsurpent. Ego bis illud sumpsi in coli dolore & hemicrania, mihiq; salutare esse deprehendi. Ceterum cum propter eius insignes facultates incolæ plurimi faciant, easq; quantum in ipsis est, celare nos studeant, quæ proculdubio longè plures sunt quam quas nouimus, sperandum est temporis (quod omnia reuelat) successu reliquarum, quæ nobis adhuc ignotæ sunt, notitiam nos consequuturos; easq; in libro quem præ manibus habemus fideliter enarrabimus, si, antè quam in lucem prodeat, intellexerimus.

MORINGA. CAP. CI.



MENTISCI magnitudine est Moringa, cui per similia habet folia; paucis prædita est ramis, eamque ob causam exigua præbet umbram, multis nodis scatet, adeoq; fragilis est, vt facillimè cum ipse frutex, tum rami confringantur; folia saturatiùs virent, viuidiq; sunt coloris, saporis verò foliorum napi; fructum fert pedalem, raphani crassitie, octo angulis insignitum, colore dilutiore inter viridem & cinereum, intus candidum, medullo sum, & in certa receptacula distinctum, quibus continentur rotunda semina. Eruo similia, virentia, & admodum tenera, sed sapore quam folia acriore. Editur hic fructus cum carnibus coctus, aut alio modo paratus. Huius arboris radix Vnicor-nu, & lapidis Bezar vices supplet, veraque theriaca est qua vulgò incolæ vtuntur cum aduersus omnis generis venena, tum morsus serpentum maximè noxiorum, vulgò *Culebras de Capillo* dictorum, aliorumque insectorum, & virulentorum animalium, cum intrò sumpta; tum foris applicata. In colericâ quam vocant passio-

Forma

MORINGA, *Acofta.*

Locus.

Nomina

Negundo
mas.Negūdo
femina.

Forma.

Temper.
& Vires.NEGUNDO mas,
Acofta.

ne singularis efficacix esse deprehendi. Miscetur remediis melancholicos humores purgantibus: & probè nota est elephantiasi laborantibus, quorum plurimos eius continuo vſu ſanari perhibent. Abunde nascitur variis India locis, ſed præſertim tota prouincia Malabar, ſecundum flumen Mangate, vbi admodum luxuriat, multoſque fructus proſert, qui vulgò in foro venduntur perinde atque fabæ in Hiſpania. Arabes & Turcæ *Morian* appellant, Perſæ *Tame*, Guzaratenſes *Turiam*.

NEGUNDO. CAP. CII.

DVAE arbores multis India locis, præſertim verò prouincia Malabar inueniuntur, in vſu medico adeò commendatæ, vt multis morbis vtiles eſſe deprehendantur. Earum prior mas cenſetur, & à Canarinis *Varalo Nigunda* appellatur, Amygdalæ magnitudine, foliis ſupernè virentibus, infernè hirsutis, foliorum Saluix modo, & in ambitu ſerratis, quæ procul aſpicientibus Sambuci foliis ſimilima videntur. Altera Negundo femina nūcupata, aut *Norchita* à Luſitanis, vulgò in Canarin *Nyergundi* dicitur: in Balagate *Sambali*, in Malabar *Noche*. vtraque verò tam mas quàm femina Arabibus, Perſis & Decan incolis *Bache* vocatur, Turcis *Ait*. Eadem magnitudine qua prior aſurgit, folia verò habet ampliora, rotundioraque, neque in ambitu ſerrata, foliis Populi albæ perquam ſimilia. Vtriuſque generis folia Saluiam odore & ſapore referunt: deguſtata tamen magis amara & acria deprehenduntur: in plurimis foliis parte auerſa ſummo mane inhærens conſpicitur ſpuma quædam candida, quæ nocte ex illis emanat. Vtriuſque flos cinerei coloris eſt, plurimumq; ad Roriſmarini florem accedit. Vtriuſque fructus admodum ſimilis eſt Piperi nigro, acris guſtus quidem, ſed minimè vrentis vt Piper, at Zingiberi propemodum paris. Arborem moderatè calidam faciūt, & ſemini paulò plus caloris tribuunt. Folia, flores, fructus contuſa, aut in aqua decocta, vel in oleo friſta vtiliter imponuntur omnibus doloribus ex quacumque cauſa prouenientibus: præſertim verò articulorum doloribus ex frigida cauſa natis, atque in tumoribus & cōtuſionibus, mirabiles præbet effectus. Vlceribus etiam vetuſtis folia trita imponuntur felici ſucceſſu, quandoquidem eorum materiam digerunt, eaq; emundant & ad cicatricem perducunt, modò corpus non ſit impurum. Et ſanè in vulneribus, apoſtema-

tibus.

NEGUNDO *femina*,
Acosta.NIMBO, *Acosta.*

tibus & contusionibus adeo vtiliter experiuntur, vt chirurgorum operam minimè requirant. Mulieres horum foliorum decocto omni tempore vniuersum corpus lauant: tantàque inuasit persuasio apud illas, Negundo folia, flores & fructus vtilia esse ad iuuandum conceptum, vt eum qui contrarium persuadere conetur, lapidibus obruturæ sint. Obstericibus etià, quas illi *Dayas* vocant, apprimè nota est hæc arbor. Adeo frequens est huius arboris vsus ad medendum in illis regionibus, vt nisi Deus præcisos ramos multiplici fœtura renasci faceret, iam diu fuissent consumptæ arbores, aut certè maximi pretij nunc essent: sed quò magis præciduntur rami, eò feliciùs renascuntur, perpetuàque fronde virent.

NIMBO. CAP. CIII.



ALIA est arbor medico in vsu admodum commedata à Christianis & Gentilibus, reliquisq; earum Indiae prouinciarum incolis, rara tamen admodum: sed qui eam cognoscunt *Nimbo* appellant, Malabareses *Bepole*. Magnitudine est Fraxini, cui procul aspicientibus persimilis videtur: folia vtrinque viridia sunt, nec ab altera parte incana lanugine pubescunt, in ambitu serrata & mucronata: rami multis foliis luxuriant, floribusque abundant exiguis, albis, quinque foliolis constantibus, flauis in medio staminulis, Lotiq; siluestris siue Trifolij odorati odorem referentibus: fructus est parvis oliuis similis, subluteus, cortice admodum tenui præditus, nasciturq; ex ramulorum alis. Huius arboris folia nonnihil amarificant, saluberrimàque sunt trita & cum succo limonũ imposita vulneribus sordidis, cuniculosis, callosisq; cum hominum tum iumentorum: digerunt enim, emundant, sarcotica sunt, & ad cicatricem perducunt. Foliorum item succus perutilis est siue per os sumptus solus, aut ex vino, aut aqua, aut gallinæ iuscùlo, siue vmbilico impositus solus, aut cum fellis bubuli momento, aut aceto, aut aloë, ad necandos & expellendos omnis generis lumbricos: quamobrem familiare admodum, & per-

Nomina

Forma

Temper.
& Vires

quàm salubre medicamentum est omnibus illius regionis incolis, præsertim Malabar prouinciæ, quoniam lumbricis valde sunt obnoxij. Magnus est etiam eorum vsus tum florum & fructus in articulorum doloribus, tumoribus, membrorum debilitate, & apostematibus. Oleum item ex eius fructu expressum, multo

est in vſu in neruorum doloribus. Eoq; vulnera, neruorum puncturas, & contra-
ctiones curant Malabarenſes.

IACA. CAP. CIIII.

NASCITVR arbor in nonnullis Indiæ inſulis ſecundùm aquas, quæ
licet nullum medicum vſum præbeat, propter amplitudinem tamen
& fructus elegantiam minimè prætermittenda eſt. Eam Malabaren-
ſes *Iaca*, Guzaratenſes *Panax*, Canarini *Panaſu*, Arabes *Panax* & *Iaca*
nuncupant, Perſæ mutato p. in f *Fanax*. Vaſta eſt arbor, foliis palmaris ampli-
tudinis prædita, dilutè virentibus, neruo craſſo &
duro per longitudinem excurrente: malum fert
non è germinibus aut foliorum ſede, quemad-
modum aliæ arbores, ſed ex ipſo trunco mai-
oribusque ramis naſcens, longum, craſſum, ob-
ſcurius virens, craſſo duròque cortice tectum
vndique veluti adamantum cuſpidibus ſepto,
quæ in ſpinam breuem, viridem, nigròque acu-
leo præditam deſinunt, admodum ſimilem Du-
rionis ſpinæ, ſed minimè acutam aut pungen-
tem, tametſi minitari videatur. Horum fru-
ctuum minimus eſt maximæ cucurbitæ ampli-
tudine atque etiam maior, præſertim in Mala-
bar, vbi præſtantes naſcuntur: nam qui in
Goa proueniūt, minores & peiores ſunt atque
magis inſipidi. Cùm maturus eſt hic fructus,
bonum odorem ſpirat, eiùſque duas differēti-
as cōſtituunt, vnā *Barca* appellatam, & præſtanti-
orem, alteram *Papa* aut *Giraſal* dictam, minùſque
bonam: deprehenditur poſtrema ex mollitie,
quoniam ſi manu apprehendas, digitis cedit.



Fructus
duo gene-
ra.

Vires.

Præſtantiſſimi verò fructus pretium quadra-
ginta marauedis non excedit, hoc eſt, paulò plus regali caſtellano. Per longi-
tudinem ſecti hi fructus, intus candidi, & denſa carne præditi apparent, ac velu-
ti in capsulas aut receptacula diuiſi, plena caſtaneis longioribus & craſſioribus
quàm ſint dactyli ſiue palmulæ, cinerea tunica tectis, & intus albis caſtaneorum
vulgarium modo, guſtu terreſtri & aſpero, ſi virides edantur, multòſque ſtatus
generantibus: at ſi vti Hiſpanicæ caſtaneæ aſſentur, guſtu ſapido & venerem ex-
citantibus, ob quam ſolam rem plebs frequentius vti ſolet. Sunt autem ſingu-
læ hæ caſtaneæ pulpa ſlaueſcente & aliquantulum lenta inuolutæ, & pulpam Du-
rionis nonnihil referente, tametſi ab eo differat. Grati ſaporis eſt, præſertim quæ
in *Iaca Barca* cognominata continetur, optimi Melonis pulpæ admodum ſimi-
lis: duræ tamen concoctionis eſt, & admodum grauatur ventriculum: atque, vt
illarum prouinciarum medici aiunt, ſi in ventriculo corrumpatur, noxios & ve-
nenofos humores generat: quique frequentius hoc fructu veſcuntur, facilè in
peſtilentem illum & peſſimum morbum *Morxi* appellatum incidunt.



RVERTVS est in Malaca adeò grati saporis & odoris, vt reliquis qui in ea prouincia gignuntur, tametsi plurimi sint & boni, præferendi videantur. Cuius præstantia, & quoniam Doctor ab Orta illius etiam meminit capite de Datura, licet eum non vidisset, me impulit vt de eo scriberem tanquam oculatus testis, tametsi in medicina nullum locum obtineat. Vocatur hic fructus in Malayo (quæ prouincia est vbi gignitur) *Duriaon*: ipsius flos *Buua*: arbor ipsa *Batan*. Prægrandis est hæc arbor, materie valida & solida,

Nomina

Forma.

DVRIONES, *Acosta*.

crasso cinereoque cortice tecta, multis ramis luxurians, & copiosum fructum præbens: flores habet ex albo nonnihil flauescentes: folia, dimidij palmi longitudine, duorum aut amplius digitorum latitudine, in ambitu tenuiter serrata, parte externa dilutius virentia, interna verò saturiore virore, & quodammodo ad rufum tendente prædita: fructum Melonis magnitudine, denso cortice septum, eoque multis breuibz crassissq; & pungentibus aculeis horrente, foris viridi & veluti striis quibusdam quemadmodum Melo secundum longitudinem distincto: intus verò cōcamerationes quatuor secundum longitudinē habet, singulas tria aut quatuor receptacula cōtinentes, quibus singuli fructus insunt admodum cādidi vti lactis pingue, magnitudine oui gallinacei, gustu suauiore odoratioreq; quàm sit cōdimentum illud ab Hispanis *Maniar blanco* appellatum, nō tamen adeò molles aut glutinosi: nam qui cādore illo non sunt præditi sed flauescū, putridi sunt, aut aëris iniuria pluuiæ corrupti. Optimi cēsentur qui tres dūtaxat fructus in singulis concamerationibus, deinde qui quatuor obtinent: nam qui quinque habet, improbi censentur, quemadmodum & illi qui fissuras aliquas habet: non solēt verò in singulis malis plures quàm viginti fructus cōtineri, iiq; singuli inclusum habet nucleum, mali Persici nucleo similem, non rotundum, sed oblō giusculum, gustu insipido, quicquē guttu exasperet, veluti mespila viridia, propterea nō eduntur. Calidus & humidus est hic fructus: & qui edere volunt, pede leuiter comprimere & frangere solent propter spinas quibus oblitus est. Qui nunquam his fructus ederunt, cum primū illos olfaciunt, videntur putridas cepas odorari: sed postquā degustarunt, præ reliquis cibis bene olere & sapere censent. Est verò tanta in existimatione, apud eos qui gulæ dediti sunt hic fructus, vt putent neminem eo posse saturari, propterea varia dant illi epitheta. Memini videre quādam Epigrammata ab eleganti Poëta in laudem eius conscripta: quæ (si hic locus ferret vt adscriberentur) non dubito quin lectori plurimū essent placitura. Tanta tamen est huius fructus in Malaca abundantia, vt singuli non pluri quàm quatuor marauedis veneant, præsertim mensibus Iunio, Iulio, & Augusto: nam reliquis pretiū intenditur pro hominum arbitrio. Admiratione porro digna est Betele cum hoc fructu antipathia quæ profectò tanta est, vt si quis in nauem Durionibus plenam, ædēve aut concamerationem, vbi obseruentur, aliquot Betele folia reponat,

Fructus
delectus.Tempor.
Usus.

Pretium.

corrumpantur & putrescant omnes. Et, sicut ex Durionum immodico esu ventriculus inflammetur & grauetur, folio Betele supra ventriculum imposito, subito mitigatur inflammatio, tumorq; tollitur. Et, si à Durionum esu ingeratur aliquot Betele folia, nullam noxam sentiet, quantumvis multos ederit. Inde fit, tum etiam ob eius gustum suauem, vt vulgò dicatur, neminem eorum esu posse satiari.

MANGAS.

CAP. CVI.

Forma.



ASTA hæc est arbor & multis ramis prædita, fructumque fert magna ex parte anserino ouo maiorem, nonnullis interdum Indiæ locis binas libras, aut amplius pendente. In eadem verò arbore persæpe colore differentes isti fructus conspiciuntur: alij enim dilutè virent, alij flaunt, quidam etiam ex viridi rubescunt: grati admodum saporis odorisq; est, & quando non est corruptus, Duracinis Perficis (quæ à carne firmiore flauâque

Locus.

MANGAS, Acosta.

Nomina

Temper.
& Vires.

Melocotonea vulgò appellantur) præstat. In multis provinciis nascitur, vti in Malabar, Goa, Guzarate, Balagate, Bengala, Pegu, Malaca, aliisque Indiæ locis, & in Ormuz vbi reliquis præcellit. Nominatur *Mangas*, in Canarin *Ambo*, à Persis & Turcis *Amba*: permanetque in arbore ab Aprili in Nouembrem vsquè interdum, pro locorum natura & situ. Editur hic fructus in laminas sectus aut sine vino, aut vino maceratus. Conditur etiam saccharo vt commodius adseruari possit, atque interdum cultello aperitur, & in eius meditullium zingiber recens, allia, sinapi, sal, cum oleo & aceto insperguntur, vt vel cum oriza edant, vel oliuarum conditarum modo. Saliunt etiam & elixant, atque in forum venalem proferunt. Frigidus & humidus est, tamen vulgus calidum constituat, & multas mordicationes in eorum qui vescuntur vetriculo parere affirmet. Quin & indigenæ medici calidum faciunt, & vituperant, dicentes serpiginem, erysipelas, biliosas febres, phlegmonas, & scabiem generare. Quod forte accidit ab eius in ventriculo corruptione: sed eo tempore quo inuenitur hic fructus, propter immoderatum æstum, in

similes morbos incidunt etiam nonnulli qui illo abstinent. Antequàm probè maturus sit, gustu adstringente est, & ea pars quæ oficulo vicinior est, acerbior: sed maturus dulcis & sapidus est. Præduro putamine, vndique tomæto, aut duris fibris transuersim & obliquè excurrentibus operto tegitur nucleus longiusculus & crassiusculus, magnitudine iligneæ glandis, candidus & candida cute tectus, gustu amaro dum crudus est, ideòque aduersus lumbricos & alui profluuia utilis: tostus verò iligneas glandes sapit. Inuenitur etiam huius genus sine oficulo, palato admodum gratum. Aliud eius genus siluestre reperitur *Mangas brauas* nuncupatū, adeò præsentis veneni, vt indigenæ illo sese mutuo perimant: nam si quis paululum ederit, ilicò moritur: interdum oleum admiscet ad exacuendam eius vim, vtq; celeriolem perniciem adferat: sed quocūque tandem modo sumptum, adeò celeriter perimit, vt hætenus nullum sit repertum antidotum ad eius vim compescendam. Dilutè viret, & aliquantulum splendet, lacteo succo abundat, paucàque

Mangas
siluestre al-
iud genus.
Vires.

paucâque carne præditus est, nam crasso cortice solummodo integitur ossiculum prædurum & cartilagineum, Cotonei tamen mali magnitudine est. Per vniuersam prouinciam Malabar prouenit copiosè hæc arbor, domestica siue satia minor, breuioribusque & crassioribus foliis. Pueri his fructibus, aureorum malorum loco sese mutuò petere consueuerunt.

ANANAS SILVESTRIS. CAP. CVII.



LTIVS assurgit Nanâ à nobis descripta suprà huius libri cap. 75. quæ Ananas silvestris nuncupatur: namque truncum habet hastæ magnitudine læuem admodum, rotundum & Mali aureæ crassitie, spinis horridum: folia spinosis cuspidibus prædita, & per ambitum mollibus spinis septa. Singulæ arbores secundû radicem summa tellure magnam foliorum comam fundunt, maiorum quàm quæ in arbore sunt, quæq; procul intuentibus Aloës foliis similima videantur, tenuiorum tamen, pluribus spinis horridorum, & dilutè virentiû: adnatis se propagat, aliæq; stirpes ex aliis enascuntur, præsertim in sepibus & hortorum ambitu quos egregiè muniunt. Rami foliorum simul glomeratorum capita proferunt flauentium admodum, & tenerorum, suauissimi odoris, quæ nihil aliud sunt quàm flos ipse: ex horû singulis spica prodit Arundinis spicæ non absimilis, sed crassior, cōpactior, & elegantior, odore Cedri. E ramis dependent fructus, *Ananas bravo*, id est, Ananas silvestres dicti, quoniâ cum domesticis nonnullam habeant similitudinem, Melonis magnitudine, coloris rubri elegantis & oculos oblectâtis, toti in partes diuisi quemadmodum cupressini strobili, seu nuces exsiccatæ, sed tuberculis foris obfiti, vt procul spectantibus magni pinei strobili appareant. Capitum teneriora folia seu flores crudi eduntur carduôsque sapiunt, sed exiguum alimentum præbent. Fructus (quem pauci degustant) sapore vtcumque suauis præditus est, adstrictionis tamen austeræ, & palato parum gratæ particeps.

Forma.

ANANAS silvestris, Acoſta.



Succi plena est tota planta cum suis radicibus. Huius sex vel octo vnciæ ex saccharo summo manè sumptæ præsentissimum certissimûq; censentur esse remediû aduersus iecoris & renum calores, renum vlcera, purulentas vrinas, & penis exco-riationem: nam magna ex parte post tertium diem sanantur. Vtilem etiam in diabete esse ferunt: at non sum expertus. Arabes admodum laudant aduersus eodem morbos & erysipelas: & *Queura* vocant, quemadmodum in Decan, Persæ *Ananasa*, & *Angali* florem (qui caput illud foliorum odoratum est) Arabes *Chuxtaid*, Persæ *Pixcorbuith* dicunt: Turcis est ignota. Habere hanc plantam aliquot notas non dissimiles Aloï Americana, annotat Clusius.

Virg.

Nomina

CARAME

Nomina

Forma.

Fructus.

Vfus.



RECTVS quem Malabares & Lusitani *Carambolas* appellant, in Decan *Camarix*, in Canara *Camarix* & *Carabeli*, in Malayo *Bolsmba*, & à Pertis *Chamaroch* dicitur, nascitur in arbore Cotonæ magnitudine, foliis Mali, paulò longioribus, coloris viridis saturatoris, & gustus amaricantis: floribus parvis quinque; foliolis constantibus ex albo rufescētibus, nullo quidem odore gratis, sed aspectu elegantibus, & gustu oxalidis acetoso. Ipse verò fructus maiusculi oui gallinacei magnitudinem æquat, oblongus, flavescent, atque veluti in quatuor partes diuisus, sulcis illis paulò altius impressis magnam gratiam addentibus: in meditullio continet semina tenera saporis aciditate palato grata. Multi vsus est in medicina & in cibis; namque maturum exhibent in biliosis febribus, & saccharo conditum syrupi acetosi loco præbent. Canariini eius succo, cum aliis medicamentis istic nascentibus, collyria parare solent ad oculorum

nubeculas tollendas. Obstericæ (quæ illis *Daya* dicitur) videtur fructu sicco & in puluerem contrito, & foliis Betele utentem ad secundinas à partu expellendas, scetumq; mortuum educendum. Eius etiam muria conditi frequens est vsus, cum gratissimi sit saporis, & appetentiam excitet.

IAMBOS ACOSTÆ.

CAP. CIX.

Forma.

Fructus.



LIVS est in India fructus, qui ob aspectus elegantiam, suauemq; odorem & saporem, tum etiam ob eius in medicina vsus, dignus est cuius historiam hîc apponam. Arbor verò quæ hunc fructum præbet, vasta est, maximam Malum auream quæ in Hispaniis nascatur æquans, multis ramis in latum expâsis, multamq; umbram præbentibus prædita, aspectûque pulcherrima, caudex maiorêsq; rami cinereo cortice integuntur: folia pulcherrima sunt, læuia, palmû aut amplius longa, crassiore nervo per longitudinem, multis autem obliquis venis in latera excurrentibus, parte superna saturatiùs, inferna verò dilutiùs virentia: flores ex rubro purpurascētes, viuidi admodum coloris, multis staminibus in medio præditi, aspectu pulcherrimi, gustu capreolorum vitis simili. Fructus magnitudine est Pyri quod à Rege cognomen accepit, eiusque duo sunt genera: vnus enim adeò obscure rubet vt niger videatur, magna; ex parte ossiculo caret,

caret, & succi bonitate præstat: alter ex candido rubescit, & osculum continet album, durum, non admodum rotundum, osculi quod in Persico malo est magnitudine, læue, & candida hirsutaq; membrana tectum, qui licet superiori bonitate cedat, dignus tamē est delicatissimorum etiam hominum palato. Vtriusque odor suauissimam rosam refert, frigidus & humidus est, & admodum tener, cortice adeo tenui & molli tectus, ut cultello auferri non queat. Altr̃ suas radices terræ infigit hæc arbor, & post quartum annum fit fructifera: fructū sæpius eodem anno perficit, & nunquam sine flore aut fructu conspicitur, cum iidem rami floribus, fructu viridi & maturo semper ferē onusti sint, decidentibusque quotidie floribus (sic ut solum rubro colore tinctum quandoque videatur) noui subnascantur, fructusque alij primū enascantur, alij maturecant, alij iam maturi colligantur. Succus a arbore maturi facili decidunt: comprehensi verō rami ad fructus colligendos, faciliē ab arbore reuelluntur. Ante reliquos cibos initio mensæ edi solent atque interdium. Malabares & Canarini hunc fructū *Iamboli* vocant, Lusitani istic habitantes *Iambos*, Arabes *Tupha*, Indi, Persæ *Tuphat*, Turci *Alma*: Lusitani arborē *Jambeiro* appellant. Flores & fructus saccharo condiri solent, iisq; frequenter vtuntur in biliosis febribus, & extinguendæ sitis gratia.

MALA INDICA, ACOSTAE.

CAP. CX.



MAGNA est arbor multis foliis & floribus prædita, & copioso fructu: folia minùs rotunda sunt Mali foliis, tametsi ea æmulentur: supernè saturatè virent, infernè candicant & pubescunt vti Saluix folia, gustu adstringente: flores exigui, candidi, quinque foliolis constantes, inodori. Fructus luitubis, seu Ziziphis similes, alij aliis maiores & suauiores, nunquam verò tam probè maturescunt vt conseruari queant & in alias regiones transferri vti Zizypha, & perpetuò non nihil adstrictionis retinentes: vnde colligitur minimè pectori vtiles esse quemadmodum Zizypha. Huic arbori nomen est in Canara *For*, in Decan *Ber*, & in Malayo *Vidaras*, apud Lusitanos *Mançanas de la India*, id est, Mala Indica. Præferuntur fructus in Mal'aca nati Malabaricis: sed iis adhuc præstantiores quos Balagate profert. Conspicitur hæc arbor ætate alaris formicis perpetuò onusta, quæ in ramis eius Laccam elaborant.

Forma.

Fructus.

Nomina

IAMBOLINS.

CAP. CXI.

HVIS arboris materies cortice integitur coloris ferē eiusdem cum Lentisci cortice: folia Arbuti similia habet, sed Myrti virentis foliorum sapore: fructus Cordubēsis oliui maturis similes, adstringentis gustus, & fauces contrahentis. Nullum vsum in medicina obtinent, sed eduntur cum oriza cocta, nam appetentiam excitant. Vulgus *Iambolins* appellat.

ALIVS est fructus, *Iangomas* nuncupatus, Sorbis ferè similis colore, & immaturis prunis sapore: quibus & arborem similem habet, (sed spinis obsitam) & folia & flores. Nascitur cum sponte in agris, & in hortis etiam colitur. Fructus licet maturus digitis prius emolliendus est

AMBA RE, *Acosta.*

antequàm edi possit: attamen adstrictionem illam haud mediocrem, nequaquàm adhuc deponit: eaque de causa illius usus est ubi adstrictione opus habent.

AMBA RE. CAP. CXIII.

Forma.



Nomina

PINEI nuclei Malucani, *Acosta.*

CRASSA magnaq; est hæc arbor, foliaq; habet Iuglandis foliis magnitudine respondentia, sed non eius formæ, dilutiùs virentia, & multis venis elaborata, quæ illis magnam gratiam addunt: flores exiguos candidos, fructus Iuglandis nucis magnitudine dilutiùs virentes, & cortice quàm illa leuiore: odoris grauis & gustus acerbis dum adhuc virent, coloris verò flauis in maturis, gratioris odoris, & gustus grata aciditate commendabilis, medullam continentes cartilaginosa & duram, è duris nervis oblique intertextis constantem. Hanc arborem appellant Canarini *Ambare*, fructum *Ambares*, Persæ *Ambereth*, Turci *Harb*, Lusitani *Ambares*, quemadmodum Canarini. Propter fructus gratam aciditatem eum omphacij, seu agrestis loco cibis admiscunt: maturum ex sale & aceto edunt, excitat enim edendi appetitum. Indi aduersus biliosos humores vtilem esse perhibent. Sale & aceto conditus, diu conseruari potest.

PINEI NUCLEI MALVCANI.
CAP. CXIII.

Forma.



Usus.



LITVR in hortis quibusdam Malabar, tum etiam in nonnullis siluis sponte nascitur arbor magnitudine Pyri, cuius folia infernè diluto virore prædita sunt, supernè autem saturo, admodum tenella & mollia, quæ gustata valde acria deprehenduntur, & linguam diu vellicant: fructus triangularis, auellanae magnitudine, interius in multa receptacula distinctus, in quibus semen est album, solidum, rotundum, Pineo nucleo suo putamine exempto par. Eo fructu frequenter vtuntur Indi, cum in curandis quibusdam morbis, tum etiam in suis nequitiis. Binos eiusmodi nucleos tenui membrana quæ illos contegit

contegit liberatos terunt, & clysteribus vulgaribus admiscēt aduersus schiaticam, & vrinæ difficultatem: seu propinant cum gallinæ iusculo ad educēdos putridos, lentos, crassosq; & frigidos humores, & asthmaticos curandos, aduersus quē morbum plurimū commendant, & frequenter vtuntur. Ex aqua tritis impetigines inunctæ primū tamen diligenter confricatæ & abraſæ, probē & breui temporis spatio curantur: sed admodū vrunt, vt experientia didici. Improbæ etiam mulieres illarum prouinciarum suis maritis parum aquæ, quatuor grana siue nucleos edendos præbent vt eos interimant. Vulgò appellatur hic fructus *Pinones de Maluco*, hoc est, Pinei nuclei Malucani, quòd isti frequentes sint arbores hunc fructum ferentes, multūque & familiaris admodū sit illius vsus in purgationibus: à Canarinis *Gepalu*.

CHARAMEI.

CAP. CXV.



H V I V S arboris duo sunt genera. Vnum Mespili amplitudine, foliis Pyro similibus, dilutè virentibus, fructu auellanis simili, admodū flauo, eleganter in multis angulos desinente, sapore Omphacij, & grata aciditate, quem vel immaturum vel maturum, vel sale conditum vulgariter edunt. Alterum genus eiusdem est magnitudinis, foliaq; habet

Forma.

CHARAMEI, Acoſta.



Malo minora, fructum verò priore maiorem, cuius decocto cum Santalis aduersus febres vtuntur Canarini Medici. Crescit in siluis & montibus procul à mari disitis. E primi generis, quod secundū aquas nascitur, arboribus, seligunt Decanini & Canarini eam quæ longius à mari abest: eius radicis corticem (cui lacteus succus inest) quatuor digitorum longitudine sumentes cum diachma sinapi probē terunt, & asthmaticis exhibent: valenter enim purgat per aluum & vomitum. Quod si immodica subsequatur euacuatio, Carambolas fructum vnum viridem edunt, vel aceti Canarini haustū sumunt (quod nihil aliud est quàm aqua decoctionis orizæ vno aut altero die reseruata donec aceſcat, Canarinis aceti vices præbens, & medicum vsū præstans) &, si profluuium nō cessat, agris caput frigida abluunt. Magnus est horū Charameis vsus in illis prouinciis, & ad orexim ciendam edere solēt immaturos, maturos, salitos, vel sale & aceto conditos vt antè dixi, aut aliis eduliis quibus aciditatem conciliare volunt, admiscēt. Vocantur in Canara, Decan, & vulgò Charameis, Arabibus, Persis & Turcis *Ambela*.

Locus.

Vires.

Vfus.

Nomina

ARBORIS CORTEX AD RHEVMATISMOS
UTILIS.

CAP. XVI.



N I C O L A V S Monardes lib. 3. Historiæ simplicium medicamentorum ex Nouo orbe delatorum, quorum in medicina vsus est, Peruani cuiusdam corticis, quem ad rheumatismos ab Indis efficacissimè adhiberi ait, his verbis meminit. Inter reliqua mihi ex Peru missus est crassius quidam cortex, quem ex vasta arbore Vlmo simili cū amplitudine tum

Locus. forma detractum ferunt. Nascitur ad ripas fluminis cuiusdam vigintiquinque leucis à Lima distantis: nec alibi in India facile reperias. Indi capitis defluxionibus, rheumatismis, aut alioqui capitis grauedine laborâtes, huius arboris corticem in tenuissimum puluerem comminuunt, & naribus imponunt: humores enim insigniter educit, qua ratione liberantur: quod verum esse nos ipsi experti sumus. Secundum caloris gradum excedere videtur.

PACAL.

CAP. CXVII.

AD EIVSDEM, inquit idem, fluminis ripas nascitur altera arbor, quam Indi *Pacal* vocant, iam descripta multò minor. Huius ligni vsticineribus cum sapone mixtis, Indi ad tollendos lichenes etiam fœdissimos vtuntur, cum qui in capite nascuntur, tum qui reliquas corporis partes occupant: sed & vetustas cicatrices emaculare dicitur. Paululum huius ligni etiam accepi, cuius facultates experiemur.

CACHOS.

CXVIII.

*Forma.**Vires.*

MISVSVM præterea sibi idem Monardes fuisse ait plantæ semen, plurimæ apud Indos æstimationis, *Cachos* vocatæ. Nascitur arbusculi modo, insigni virore prædita est, folio rotundo & tenui: fructû fert Malo infano similem, altera parte sessilem, altera turbinatum, cinerei coloris, grati saporis & acrimoniæ expertis, minutum admodum semen continens. Inuenitur duntaxat in Perûianis montibus. Magnæ est apud Indos, vt dixi, æstimationis, ob insignes facultates. Nam vrinasciet, arenulas & calculum in renibus pellit, quòdque præstantius est, illius vsu calculum in vesica comminui ferunt, si mollis adhuc sit, vllisque medicamentis comminui queat: eiûsque rei tam multa proferunt exempla, vt admirationem mihi pariat: nam ea est mea opinio, vesicæ calculum haudquaquam expelli posse, solamque exemptionem illius remedium esse, nullum autem medicamentum adeò efficax esse, vt eum confringere valeat: aiunt tamen illius semen tritum ex aqua aliqua ad eam rem vtili sumptum, calculum in lutum dissoluere, quod excretum denuo concreascet, & in lapideâ duritiem conuertatur. Adolescentem vidi, cui hoc obtigisse scio. Is cum vesicæ calculo torqueretur, idq; à lithotomis qui calculum deprehenderant intellexissem, & ex symptomatis quæ patiebatur agnoscerem, hominem veris initio ad fontem qui de petra cognominatur ablegauit, vbi cum duos menses hæsisset, à calculo liber rediit, & omne lutum, quod paulatim eiecerat, denuo in lapidea fragmenta concretum secum in charta detulit. Pauculum semen quòd habemus terræ committemus, & si nascetur vtemur, vt eius facultates quas in hoc morbo adeò prædicant experiamur.

FRUCTVS SVB TERRA NASCENS.

CAP.

CXIX.

*Forma.**Locus.*

MISVS eidem etiam est ex Peru fructus sub terra natus, pulcher admodum aspectu, & grati saporis, qui & radice caret, neque aliquam plantam profert, aut ab vlla planta producitur, sed solummodo sub terra enascitur quemadmodum tubera: dimidij digiti magnitudinem æquat, rotundus est & contortus, & affabre elaboratus, coloris spadicei, nucleum intus continens, resonantem dum siccus est, amygdalæ similem, cortice fusco, intus album & in duas partes diuisum vt amygdala. Grati saporis est, & auellanam gustu refert. Inuenitur apud flumen Maranon, nec vsquam alibi per vniuersam Indiam

Indiam: editur recens & exiccatus, sed torreri præstat: apponitur secundis mensis bellarior loco, quoniam ventriculum admodum exsiccat & roborat: sed si liberalius edatur, capitis grauedinem generat. Eum admodum æstimant cum Indium Hispani, nec immerito, quoniam eos qui ad me missi sunt degustans, grati esse saporis deprehendi. Temperatus esse videtur.

FRUCTVS LEUCOMA NVNCVPATVS.

CAP.

CXX.



ARBORIS etiam fructum inde accepit, quem Indi *Leucoma* nuncupant: similis est nostrati castaneæ cum colore, tum magnitudine, tum etiam sessili illa & albicante parte quam castanea obtinet. Prægnans esse videtur, sed quoniam binos duntaxat accepi, confringere nolui, cum alterum seuerim & non prodierit, alterum in aliud sationis tempus seruem. Arbor in qua prouenit vastæ est magnitudinis, materiæq; firmæ & robustæ, folia Arbuti obtinet. Fructum edulem gratiq; saporis esse aiunt, & alui profluuiâ sistere quoniam adstringit: temperatum asserunt.

Forma.

Arbor.

SAPONARIAE SPHAERVLAE. CAP. CXXI.



ASSVLA ipsi præterea missa fuit subere contexta, plena sphaerulis admodum rotundis & nigris atque splendentibus, sic vt ex Ebena confectæ viderentur. Eæ verò constabant ex fructu in pumila arbore nascete magis incurua quàm recta, veluti Ruscus, cuius folia filici sunt similia. Ferunt ij frutices rotundum fructum nucis magnitudine lenta quadam pulpa tectum, qua sublata relinquitur sphaera quædam maximè rotunda, coloris nigri, adeò dura, vt nisi malleo, aut alia quapiam re solida & dura confringi queat. Saponis vicem præbent hi fructus, quoniam si binis, aut tribus cum calida aqua vestes eluantur, multò nitidiores redduntur, quàm si saponis librali pondere elotæ forent: plurimam etenim spumam excitant, eosdè que effectus præbent quos sapo, paulatim liquefcentes, donec solæ sphaerulæ super sint, quæ nucleus sunt huius fructus: perforantur deinde hæ sphaerulæ, fiuntque ex iis precariæ coronæ adeò elegantes vt ex Ebena confectas dicas, tum diutini vsus, quoniam difficulter confringuntur. Est verò is fructus adeò amarus, vt nulla quadrupes, aut auis eum degustent. Aliquot ex iis terræ credidi, quæ enatæ sunt, foliaq; gestant admodum elegantia, & viridia: fructum suo tempore prolaturas existimo, paruulæ enim adhuc sunt plantæ. Describit quoque hunc fructum Ouiedus Indicæ Historiæ lib. 9. quod & ad Monardem annotauit Clusius. Sūt, inquit Ouiedus, in his insulis (Hispaniola videlicet) & cōtinenti quædam arbores, quæ à precariis sphaerulis & à sapone cognomen acceperunt, quarum folia Filicis folia non nihil referunt, licet minora sint. Celsæ sunt & formosæ, fructum ferentes auellana, aut cerasij magnitudine, corolla insignitum, minimè edulem, qui sole exsiccat subflauum colorem retinet, is ossiculum intus continet globulo bombardario æqualem, rotundum, nigrum, at si solis radiis opponatur, subrutum, quod semen exiguum & amarum habet. Ex his ossiculis perforatis sunt precatoriæ corollæ, non inelegantiores quàm si ex Ebena confectæ essent, imò iis præstant, cum quòd leuiiores sint, tum non adeò fragiles. Fructu integro cum aqua calida panni expurgantur perinde atque sapone: at si quis frequentius eo vtatur, pannos vrit & corrumpit: semel duntaxat necessitatis causa eluisse sufficiat. Pulpa ossiculum ambiens ea est quæ saponis vicem præbet.

Arbor.

Fructus.

Exerc. 181.
28.

Forma.



CTONVM circiter pedum est arboris proceritas, quæ nascitur in prouincia Pudifetam. Ea rerum accessum videtur sensu percipere.

Appropinquante homine, aut animali, ramos constringit: recedentibus pandit. Hoc vero simile est. Idem quoque spongiam facere confessum ac receptum est. Quare nemo nescit, genus hoc à Philosopho zoophytm appellari. At hæc etiam tactum præuenit, tum sensu, ut putant, tum sui, ut palam videtur, subtractione. Quapropter aut afflatum percipere dicendum est, aut radicis propter soli motum, compressionem, agitationemve. Hac de causa nominant incolæ Arborem pudicam. De eadem scribere hæc videtur Garcias

Lib. 2. c. 27.

in Aromatum Indic. Historia. Nascitur in Malauar planta miræ naturæ: nam si quis manū admoueat, illico contrahitur. folia Polypodij, flores verò luteos habet. Nullus veterum huius, quod sciam, mentionem fecit. Eam verò intelligere videtur qui Americam descripsit: quoniam in Peru prouincia plantam nasci asserit, cuius folia solo contactu siccantur. Sunt qui putant eandem à Theophrasto descriptam his verbis: οἰδῆμα δὲ ἰδόντι φύσαι πρὸς μέμφιν (lege ὕλημα, ut & Gaza) ὁ καὶ φύλλα ἢ βλαστῆς, καὶ τὴν ὅλην μορφήν ἔχει ὅτι ἰδίον, ἀλλ' εἰς τὸ συμβαῖνον πρὸς αὐτὸ πάθος. ἢ μὲν γὰρ πρὸς οὐσίς ἀγαθῆς ἐστὶν αὐτῇ, καὶ τὸ φύλλον παρόμοιον ταῖς πτερούσι (Gaza legit πτεροῖσι, id est, Filicibus, Plinius πτεροῖσι, id est, pennis) ὅταν δὲ τις ἀψῇ τῶν κλωνίων, ὥστερ ἀφ' ἡλυνόμην τὰ φύλλα συμπίπτειν φασὶ (Gaza legit ἐπαμειβυνόμην, sed legendum ἀραυανόμην, vel φανιζινόμην) ἔστι μετὰ τινὰ χρόνον ἀναβιώσκει τὸ πάλιν, καὶ θάλλει. id est, Nascitur peculiaris quædam arbor circa Memphim, non foliis vel ramis, vel tota forma peculiare quid sortita, sed euentu: facies enim eius spinosa, folium Filici simile ut vertit Gaza, vel pennis, ut Plinius: sed cum ramulos quispiam contigerit, folia veluti arefcentia & languescientia cōtrahi aiunt, deinde paulò post ad vitam

Lib. 4. hist. cap. 3.

red re. & virere. Quæ Plinius sic conuertit. Siluestris fuit circa Memphim regio, tam vastis arboribus, ut terni nequirent, vel circumplecti, vnius peculiari miraculo, nec pomum propter, vsumve aliquem sed euentum. Facies enim spinæ, folia habet ceu pennas, quæ tactis ab homine ramis cadunt protinus, ac postea renascuntur. Huic arbori affinem herbam prodidit Apollodorus Democriti discipulus, quam iccirco Aeschynomenen appellabat, quia admotam manum refugeret foliorum contractione.

Lib. 13. ca. 10.

PAPYRVS.

CAP CXXIII.

Nomina

Lib. 1. c. 98

Lib. 4. hist.

ca. 9.

Locus.

Forma.



ΠΑΠΥΡΟΣ Græcis, Latinis similiter Papyrus, Arabibus *Burdi*, siue *Berdi*.

Dioscorides Papyri ut vulgò cognita descriptionem prætermisit. Theophrastus & natales & faciem quadatenus delineauit, & varium eius vsum exposuit. Nascitur Papyrus, inquit, non in altis gutgitibus, sed ad duos circiter cubitos profundo vado, alicubi etiam minore. Radix crassitudine est carpi robusti

hominis, longitudine decem cubitos excedente. Crescit super terram ipsam, radices obliquo in imum demittēs tenues & densas. Sursum Papyros producit, triangulos, quaternum ferè cubitorum magnitudine, quos in multas diffundit partes, coma inutili, inualida, fructu prorsus nullo. Radicibus pro ligno vtuntur, non ignis solum gratia, sed ad diuersi generis vasa ex ipso conficienda: multam enim materiam habent, bonamq. Papyrus ipse ad multa utilis est: ex eo enim nauigia fiunt, ex libro vela tegetesque texunt, vestes quædam, itragula, funes, alia plura. Ac externis quidem notissimæ sunt chartæ (βιβλία dicit scapitænia, ex quibus chartæ fiunt, scilicet apud ipsos παπύρις, aliquando plantam totam πᾶπυρον, aliquando caulem) maximè verò suppetitando alimento plurimum confert: mandunt enim incolæ

Vfus.

incolæ Papyram & crudū, & elixum, & assū, succum deuorāt, & quod mansum est expuunt. Talis igitur est Papyrus, & tales vsus præbet. Nascitur & in Syria circa lacum in quo & Calamus odoratus, vnde & Antigonus nauium funes faciebat. Eadem ferè Plinius tradit ex eodem Theophrasto. Papyrum ergo nascitur in palustribus Ægypti, aut quiescentibus Nili aquis, vbi euagatæ stagnant, duo cubita non excedente altitudine gurgitum, brachiali radice obliquæ crassitudine, triangulari lateribus, decem non ampliùs cubitorum longitudine in gracilitatem fastigiatum (legendum videtur ex Theophrasto, Brachiali radice obliquæ crassitudine, decem non ampliùs cubitorū longitudine, triangulari lateribus. Theophrastus tamen radicem carpi robusti hominis crassitudine esse ait, longitudine decem cubitis maiore.) thyrsi modo cacumen includens (sic Gaza reddidit quod Theophrastus *κρίνον* dixit, Strabo *χαίτην ἐ' ἑλκυσσας ἀσθενή*, quod aptius conuertisset, Comam siue iubam inutilem habent & inualidam: thyrsus enim à coma differt.) Semine nullo, aut vsu eius alio quàm floris ad deos coronandos. Radicibus pro ligno incolæ vtuntur, non ignis tantum gratia, sed ad alia quoque vtensilia vasorum. Ex ipso quidem Papyro nauigia texunt, & è libro vela tegetesque, necnon & vestem etiam stragulam, ac funes. (Ex biblo Theophrastus eadem texti scripsit, nimirum ex Papyro siue Papyri caule, id est, caulis tenuis & philuris, non autem libro siue extimo cortice. Sed omisit Plinius mortalibus maximè necessarium huius plantæ vsū à Theophrasto positū, nempe ex biblo texti biblia, id est, chartas etiam externis notissimas, cum Græci longè plura chartis tradiderint, quàm ipsimet Ægyptij, apud quos Papyrus nascitur, memorabilium rerum monumenta faxis, obeliscis & pyramidibus inscribere soliti.) Mandunt quoque crudum decoctumque, succum tantum deuorantes (Dioscorides & eum secuti, vt Pierius in Hieroglyphicis, falsò putarunt radicem ἐ' ἑλκυσσας τὴν τροφὴν, id est, alimenti nonnihil præbere, ideoque Ægyptios διαμασσωμένους ἀποχυλίζειν, mandere exugereque, succum, τὸ διαμασσωμένα ἐπιπασθόσας. Nam præter Theophrasti perspicuam hac de re narrationem, Herodotus in Euterpe apertissimè refert Ægyptios Papyri è palustribus collectæ annua messe partem superiorem præcisam in alios vsus quàm alimentorum vertere, inferiorem autem cubiti longitudine & mandere & comesse, eximia quadam suauitate, cum in luculento furno torretur. Ante fruges inuentas præcis Ægyptijs vsitatissimum & frequentissimum eum cibum fuisse ex Oro cognoscimus: scribit enim Ægyptios antiquissimam, & omni memoria priorè originem suam significantes, Papyri fasciculum pinxisse, quoniam eo primum vscerentur.) Nascitur & in Syria circa quem odoratus ille Calamus lacum. Neque aliis vsus est quàm inde funibus Rex Antigonus in naualibus rebus, Sparto nondum communicato. Nuper & in Euphrate nasci circa Babylonem Papyrum intellectum est eundem vsū habere chartæ. His subiungit Plinius chartarum genera, earumque conficiendarum rationem explicat, oratione quidem satis obscura & perplexa, vt in re antiquissima, & nobis ignota, quam ex doctissimis eruditissimi Dalechampij in Plinium obseruationibus, & ex Guilandino perspicuam reddere & enucleare conabimur. Preparantur, inquit Plinius, ex eo (Papyri scapo) chartæ, diuiso (scapo) acu in prætenues, sed quàm latissimas philuras (rectius fortasse longissimas, Guilandinus mauult latissimas.) Principatus medio (subaudi Papyro, ex vetusto codice, mediis scilicet philuris) atque inde scissuræ ordine. Hieratica (idest princeps & primaria) appellabatur antiquitus religiosis tantum voluminibus dicata, quæ ab adulatione Augusti nomen accepit, (ablutione ex vetusto codice & Isidoro, Hieratica, inquit, subcolorata, Augustea facta abluendo candidior,) sicut secūda Liuiæ à coniuge eius. Ita descendit Hieratica in tertium nomen. Proximū Amphitheatricæ datum fuerat à consecraturæ loco (Guilland. Arthritica, ab

Lib. 13. c. 11.

Lib. 13. c. 11.
& 12.

Lib. 5. c. 10.

Arthribica præfectura, cuius meminerunt Strabo, Ptolemæus, Stephanus. Arthribin etiam memorat auctor. Quidam Amphitheatricem dici potuisse suspicantur, quod in Amphitheatris Ægypti, Alexandriaeque potissimum, à concursu populi vacuis cōficerentur, ut solent mercenarii opifices in locis publicis à vulgi turba non occupatis artem suam exercere. Fortassis & id Romæ factum in aliquo Amphitheatro, vnde nomen. Excepit hanc Romæ Fannij sagax officina, tenuatamque curiosa interpolatione principalem fecit è plebeia, & nomen ei dedit. Quæ non esset ita recurata, in suo (nomine) mansit Amphitheatrica. Post hanc Saitica ab oppido (Sai) ubi maxima fertilitas (Papyri suba.) ex vilioribus rametis (philuris) propriorque etiamnum & cortici Tæniotica à vicino loco (Guillandinus legit Tanica à Tani ciuitate, hodie Damiata) pondere iam hæc non bonitate vernalis. Nam Emporetica inutilis scribendo, inuolucris chartarum, segestriumque mercibus usum præbet (Quidam legunt stegestrium, ἀπὸ τῆς ἐγφῆς, σκεπάζει, καὶ γὰρ πῆφιν. Varroni tamē segestria dicuntur stramenta è segete, quibus lecticas inuoluebant, ut ab imbre, puluere, & externis quibusuis iniuriis defenderent. Alij quauis ἐν δόλῳ μέλαι & inuolucra sic appellari putant, quod iis segerantur, seponantur ac separantur quæ occultant. Sunt etiam segestria vela aut tegumenta cilicia, ex pilis caprarum aut hircorum contexta Procopio lib. 2. belli Persici, & Suidæ. Suetonius in Augusto, segestrio aut lodicula inuolutus, non ut vulgò sesterio. Cuiacius 13. Obseruat. idèd à mercatoribus cognominata. Post hanc Papyrus est, extremumque eius scapo simile, ac ne funibus quidem nisi in humore utile. Vetusti codices habent extimū, quod probat Dalechampius, pro extimo ac supremo cortice. In hoc Plinij loco Guillandinus Turnebum acriter insinuat, tres chartæ species inuehentem, Hieraticā, Augustam, Liuiam, cum una eademque sit Ægyptiis dicta Hieratica, quoniā religiosi & sacris tantum voluminibus dicata esset, Romanis adulatione prima Augusta, adulatione secunda Liuia, ut obscurius & ignotius, ordinēque tantū tertium eius nomen fuerit Hieratica. At qui totum hac de re Plinij sermonem diligentius expenderit, Turnebum & Ruellium à Guillandino iniuste reprehēsos fuisse iudicabit. Cum enim chartarum genera pro latitudinis differentia recenset perspicue plures eius species constituit. Emporeticā digitos sex esse vult, Saiticā pauciores nouem, Amphitheatricā nouem, Fannianā decem, Hieraticā vndecim, optimis verò duabus, id est Augustā & Liuianā (ut paulò post ostendemus) tredecim. Prætereā Augustā & Liuianā eandem non esse apertissimè demonstrant hæc Plinij verba. Augustā in Epistolis auctoritas relicta. Liuiana suam tenuit, cui nihil è prima erat, sed omnia è secunda. Hæc ad Guillandini opinionē refellendam, tuendamque Turnebi & Ruellij sententiam satis valent, sed multò magis quæ sequuntur, in quibus ex Dalechampi iudicio & deprauata quædā corriguntur, & obscura declarantur. Verba Plinij sunt. Textuntur omnes tabulæ madentes Nili aqua. Turbidus liquor vim glutinis præbet, cum primo supina tabula schedæ adlinitur, longitudine Papyri, quæ potuit esse sefegminibus (alias segminibus) utrinque amputatis. Transuersa postea crates peragitur. Premitur (alias premuntur) deinde prælis, & siccantur Sole per agulā, atque inter se iunguntur, proximarum semper bonitatis diminutione ad deterrimas. Nunquam plures (philuræ subaud.) scapo quàm vicenæ. Hic Guillandinus Turnebum & Ruellium ignorantia accusat, quod locum non intellexerint, nec viderint tabulas hic dici Papyri schedas, quæ auulsæ compinguntur, non autem asseres philuris subditos, super quibus glutinantur. At contra hi rectè, ille perperam sensisse videtur. Nam dum charta fiebat, necesse fuit tabulā subici, super qua distenderentur rectæ & transuersæ philuræ, quæ glutino, vel aqua Nili turbida cōmitterentur, quod Plinius his verbis indicat. Textuntur omnes tabula madente Nili aqua: sic enim ex manuscripti codicis fide legendū censet Dalechāpius.

Idem

Ca. 12. li. 12.

Ca. 12. li. 13.

Li. 13. ca. 12.

Idem ex iis verbis perspicuū fit (cum primo supina tabula scheda adlinitur). Quæ sic accipit Guilandinus, cum primo scheda, id est, philura adlinitur & infernitur tabula supina, auferēdi casu, id est, exporrecta in longum eadē philura. Quod sanē repetitionis genus insulsum minimē cōuenit succinctæ Plinij breuitati, cūm presfius dici potuisset & aptiūs (cum primo supina scheda adlinitur) quibus verbis nihil clarius, nec cōgruentius esse potest. Supinam schedā idem exponit recto situ positam, quomodo Liuius supinas manus dixit erectas, matronis in publico dolore ad cælum & Deos tendētibz. Dalechampius verò supinā schedam interpretatur, cuius pars quæ in scapo vergebat introrsum, cūm super tabula distenditur, extrorsum vertitur, nec tabulæ lignum tāgit: sic enim posita, quia mollior, humidior ac tenerior est, faciliūs superiniectā aliam amplexatur & retinet. Idē Guillādinus legēdum putat (trāsuerfa postea cute peragitur.) At manuscripti codicis integritas vulgatam lectionem nihil immutādā esse suadet: cōmodiūs enim & cōcinnius appellari nō potuit chartarum textus, quā cratis nomine, ob rectas transuersasq; philurās sibi mutuō superinēubentes, quæ cratis vel clatrorū figura est. Porro plagula est charta iam cōfecta, ac suis philuris, siue schedis, siue ramentis texta velut lamina, quam chartæ nostræ ex linteis tritis cōfecta folium vulgus vocat. An verò in apricis locis chartæ siccarentur an vmbrosis & perflatis, nō est indignum scitu quod id pertineat ad Plinij literam vel emēdandam vel cōfirmandam. Verum id quidem est, quæ solo a quæ humore glutinātur disilire, cūm vapore solis inarescūt. At quæ luto pingui, aut pollinis flore aqua diluto cohærent, solis tepore & æstu, atq; ad eodē ignis calore tenaciūs cōmittuntur. Itaq; qui chartas densas libris compingendis, aut tegēdis mercibus cōficiunt, vbi prælo chartæ quadratam plagulam satis presserint, insolatū siccāt, & librarij voluminū quæ confluunt posteriora glutine oblita, vel igni admouēt, vel soli exponunt, vt citiūs rescicētur. Quamobrem & olim chartas insolatū durari siccariq; solitas vero absimile nō est. Deinde Plinius

Lib. 13. c. 12.

chartarum species ex latitudinis differentia, & earum ordinem exponit. Magna in latitudine eorum differētia, tredecim digitorum optimis. Duæ detrahūt Hieratica, Fanniana denos habet. Et vno min⁹ Amphitheatrica. Pauciores Satitica: nec malleo sufficit. Nam Emporetica breuitas sex digitos nō excedit. Præterea spectantur in chartis, tenuitas, densitas, cādor, læuor. Præmarum mutauit Claudius Cæsar. Nimia quippe Augusta tenuitas tolerādis non sufficiebat calamis. Ad hoc trāsmittens literas lituræ metum adferebat aduersis, & aliās indecoro visu per trās lucida. Igitur & secundo corio statumina facta sunt è primo subtegmine. Auxit & latitudinem. Pedalis erat mēsurā, & cubitalis macrocolis. Sed ratio deprehendit vitium, vnus schedæ reuulsione plures infestāte paginas. Ob hoc præclara omnibus Claudia: Augusta, in epistolis auctoritas relicta: Liuiana suam tenuit, cui nihil è prima erat, sed omnia è secūda (cui nihil primum erat, sed omnia secūda, ex vetusto codice.) Scabricia læuigatur dēte cōchāve, sed caducæ literæ fiunt. Min⁹ sorbet politura charta, magis splēdet. Rebella sapē humor incuriosē datus, primoq; malleo deprehēditur, aut etiam odore, cūm fuerit indiligēti⁹. Deprehēditur & lentigo oculis, sed inserta mediis glutinamētis tænia, fungo Papyri bibula, vix nisi litera fundente sextantū inest fraudis. Alius igitur iterum texendis labor. Glutinum vulgare è pollinis flore temperatur feruente aqua, minimo aceti aspersu. Nam fabrilis gummique fragilia fiunt. Diligentior cura molli panis fermētati colato aqua feruente. Minimū hoc modo intergerij: atque etiam Nili lenitas superatur. Hæ sunt ex Plinio Chartarum species. Prima est latitudinis decem digitorum, quales sunt Augusta & Liuiana: alia enim esse nō potuerunt quā hæ, ab adulatio ne Augusti & Liuiæ principem locum nactæ, reiecta in tertium bonitatis & nobilitatis locum Hieratica, quæ secunda est digitorum vndecim. Tertia Fāniana, de-

cem. Quarta Amphitheatrica, nouem. Quinta Saitica, pauciorum nouem, nempe octo, quæ nec malleo sufficit, vel quòd tam angusta sit, vt malleum qua parte ferit, latiore non admittat, vel tam fragilis sit, vt malleo percussa disrumpatur. Sexta Emporetica, sex digitorum. Taniticam cortici propiorè, & venalem pondere non bonitate in hoc censu nō reposuit. Hæ fuerūt chartarum differētiæ dum vixit Augustus, mutatæ postea à Claudio. Nim ia enim Augustæ tenuitas tolerādis non sufficiebat calamis, quo minùs pertunderent ac perforarēt, & transmittens literas, id est, literarum atramētum, lituræ metum afferebat auersis. Sic enim legēdum ex vetusto codice. Nam aduersa charta est exterior, & oculis nostris obiecta, quam scribētes intuemur, in qua calamus properat. Auersa posterior, & à tergo posita. Litura verò effusi sparsiq; atramēti in bibula charta est macula, ei similis quam penna scripturam delētes inducimus. Apparet certè ea magis in auersa chartæ facie, illuc subeunte atramēto, vt cum aduersa iam aliquid scriptum est, in auersa maculis nigris fœdata præterea nihil pingi queat. Igitur & secundo corio statumina facta sunt, è primo subtegmīne. Vetustus codex habet, Igitur & secundo corio stammina facta sunt, vt primo subtegmīna, sensu nihil discrepāte, etiā si statumina legamus. Stamen id est quod colo obuolutum mulieres nent. Est & in textrinis filum telæ directum, intra quod subtegmē siue trama currit trāuersim. Statumen verò ridica siue palus quo vitis fulcitur. Auctoris ergo sensus est. In charta Claudij sicut primo corio è rectis philuris cōfecto additum est secundum velut subtegmē siue trama ex schedis trāuersis textum, sic huic impacta pro tertio corio siue statumina sursum è rectis philuris composita, velut in primo corio. Auxit & latitudinem. Pedalis erat mēsurā, & cubitalis macrocolis. Sed ratio deprehēdit vitium, vnus schedæ reuulsioē ampliores infestāte paginas. Sic vetustus codex. Macrocola ἀπὸ τῶν μακρῶν κολλῶν dicta putat Guilandinus, Dalechampius ἀπὸ τῶν μακρῶν κόλλων, à longis velut artubus, & mēbris. Mensura pedalis & cubitalis, id est, sesquicubitalis harum chartarum an in lōgitudinem an in latitudinem exporrigeretur, Plinius non statuit: in latitudinem potiùs existimat Dalechampius, de latitudine enim hīc agitur: & scapi Papyri, vnde schedæ distrahebantur, nota est lōgītudo ex superioribus, circiter quatuor pedum, quæ ad pedis vel cubiti mēsuram contrahi nō potuit: quamuis μακροκόλλας nomē longitudinem potiùs indicet quàm latitudinem. Cū autem vnus schedæ reuulsione ampliores vel plures infestari paginas dixit, docet nos plagulas chartæ cōfectæ, siccata, malleata, lauigata plicari solitas in paginas, vt fit & in nostris linteis, quæ quo complures essent, magis scriptura conturbaretur ac laderetur, si quis vnā philuram vel improbitate ac malitia, vel corruptam ac vitiosam exemisset. Augustam epistolis laudatam testatur Martialis, salutatricēque vocat.

Lib. 9.

Marcus amat nostras Antonius Attice musas,

Charta salutatrix si modò vera refert.

Ex his pro æstimationis ac pretij ordine, & latitudinis varietate, quoniam par ferè esset omnium longitudo, chartas numerare, & in suis classibus recēdere possumus. Augusti tempore Macrocolas primas, pedem aut sesquipedem latas, Augustam & Liuiam optimas, digitos tredecim, Hieraticam vndecim, Fannianā decem, Amphitheatricam nouem, Saiticam, & quam omisit auctor Taniticam pauciores, nempe septē vel octo, Emporeticā sex: quas omnes antequam & bonitate & dignatione Claudia, principatu Claudij texta, ex duobus staminibus siue statuminibus, & interiecto vno subtegmīne optimis, nempe Augusta & Liuiana aliquatò latior, vt suspicari licet, ad digitos quatuordecim vel quindecim. Ex his cuius per spiciū esse potest, Guilandinum non rectè affirmasse Augustam & Liuianam, Hieraticam eandē esse chartam. Hīc nō sunt omittēda chartarum vitia quatuor, quæ auctor

auctor ponit, scabritiam, rebellem cōtumaciam, lentiginem, tæniā vnā vel plures. Scabritia, inquit, laeuigatur dēte, &c. Id est, Scabritiæ remediū est dente vel concha politura, moderatione tamē adhibita, ne vehemētius atteratur. Nam quamuis ex cōplanatione & erugatione splēdeat magis, fulgentēq; nitore oculis placeat, validiore tamē attritu nō sorbet atramētum sed respuit, & si quæ literæ appiētæ sint, instabilis & fugax est scriptura, nec permanet. Alterum vitium est rebellio. Rebellat humor incuriosē datus, cū artificis operæ & studio reluctatur pertinaciū, nec omne corij spatiū ex æquo rigat & oblitit, sed alicubi subsistit copiosior, alicubi parcius affunditur, vnde plagularum fit inæqualis & superficies, & resiccatio. Nam cū probē curatam, subactam, tractatamq; chartam esse putat artifex, neq; quicquā aliud operæ suæ præterea desiderare, tum cōtra eius spem vitium id detegitur, & tanquā recrudescit, quod eius diligētia negotiū faciat. Itaq; retexēda charta, & eodē labore domanda, atq; peruincēda quo prius. Malleo deprehēditur id vitium, aut quod percussus laceret, aut quod eminentiora tubera, depressioresq; lacunas plagularum inæquali percussu tundat, & inuenusta deformitate tūas ostendat. Prodit eam labē etiā odor, charta præsertim negligētius prælo cōpressa & siccata, mucidus fœtidusq; putrescente ac situm olente humore, qui nec prælo est elisus, nec insolatu dissipatus. Deprehēditur & lentigo oculis, &c. Lentiginē in charta Plinius appellat nauos, fordes, decolores punctorum notas, & maculosas velut aspergines, quæ siebāt dum cōpingerētur coria, si quid illaberetur impurius, quod

*PAPYRVS Aegyptia,
Pena.*



natiūū colorem inquinaret, aut si quid in schedis cōtortum & conglobatum chartam infuscaret. Oculis id cognoscebatur, vel conspecta statim charta, si maculæ in aperto forēt, vel ad solem explicata, si altius insiderēt (Sed inserta mediis glutinamentis tania.) Quartum ac postremum vitium est tænia, non, vt Guilandinus arbitratur, philura vel scheda, sed oblongus & angustus in plagulis ductus, nullo glutine, aut pingui humore litus & opertus, in quo sola Papyri fungosa & bibula raritas absque vlllo testorio calamis scribētium occurrit, & literam siue atramēti picturam dum haurit diffundit. Quod nec ictu mallei, nec oculorū conspectu exploratum sed scriptura tantum, tum picta litera liquecēs vtraq; parte cōbibitur, & tam aduersam quā auersam partem inquinat. Hac de Papyro & veterum chartis ex Plinio & Dalechampij observationibus studioso lectori fortasse nō iniucunda exponere voluimus. Papyrus Niloticam siue Aegyptiam ex Aegypto delatam, & qualē describunt Theophrastus & Plinius, Pena in horto Pisano florentem se legisse ait, quam Cypero

cōgenerem facit & similitimā, verū elegantiorē multò, iunceo, arundinaceo ve triquetro caule, medulla farcto tomētitia, stipitibus multis, proceris, lanibus, nitidis surrectis, senū, interdum septenū cubitorum altitudine, quibus ad imum tantū folia insunt Cyperi aut Sparganii repanda, radicibus arundinaceis, fibrosis, floribus valde speciosis, luculētam in ambitu cæsariem referentibus, numerosis gracilibus thyrsulis, dēso & æquali comarum stipatu, & apicibus prominentibus, Ferulæ in modum collectis, nō vt in Cypero sparsis, quos circa ortum ambiunt radiatim

foliola

foliola multò minora illis quæ sunt ad imū, vt in Cypero. Quare veri simile est, inquit Pena, hæc veram esse Theophrasti Papyrū, cuius descriptio apud Pliniū neq; mutila, neq; ex duabus diuersi generis cōfusa, nempe hac Ægyptia, & Babylonia, vt cēset Pena, sed eadē planē est quæ apud Theophrastum, vt suprà citatos vtriusq; locos cōferenti faciliē innotescet. Præterea cū scribit Pena Pliniū vsum tum funium tum chartæ obscuriùs tradētem his verbis, Texuntur omnes tabula madēte Nili aqua, quod de funibus quis fortē interpretetur, inquit: & mox, Turbidus liquor vim glutini præbet, &c. cū scribit, inquam, medullæ gluten in chartas duci solitum innuere videri. Ad hæc cū antè dixerit caulis medullam tomētitiā tūsam, glutinifq; in speciem subactā, ductā olim fuisse in bractæas Papyraceas, quæ mutuò sibi appressæ folia crassiora cōflabant, scribendo apta, quemadmodū etiam sit ex laciniiis linei panni cōfusi, & in candidum redacti, neq; chartarum priscarum, neq; nostrarum conficiendarum rationem intellexisse videtur. Neq; enim medulla vlla Papyri in laminas ducebatur, quæ mutuò appressæ folia cōficerent, sed scapi Papyri philuræ super tabula exporrigebantur rectæ & transuersæ, ex quibus plagulæ & chartæ fierēt, vt prolixè & dilucidè ex Plinio declarauimus. Neque panni linei in gluten rediguntur, vnde chartæ nostræ fiant, sed ex lineis pannis tritis & aqua dissolutis folia compinguntur, quæ postea glutine accepto solidescunt. Nunc de medico Papyri apud veteres vsu dicamus. Ad aperiendas fistulas, inquit Dioscorides, madefacta lino inuoluitur, vsque dum inaruerit: constricta enim atque immissa in hiatus, humore completur, & intumescendo fistulas aperit. Crematæ Papyri cinis nomas cū omnium partium, tum oris maximè cohibet; verū id meliùs combusta charta præstat. Quæ verò addit de radice Ægyptiis alimentum nonnihil suppeditante, id iam refutauimus. Galenus de eadem ita scriptum relinquit: Papyrus ipsa quidē per se in vsum medicinæ non venit, at macerata aut vsta utilis efficitur. Igitur oxycrato vinòve macerata recētia vulnera glutinat, maximè in circulum circumposita. At vsta medicamentum est exsiccans, velut & chartæ combustæ cinis, nisi quia infirmior est quàm Papyri. Plinius, cognata in Ægypto res est Arundini Papyrus, præcipuè utilitatis cū inaruit (Dioscorides prius madefacit, & imbuit, mox circumdato ligno constringit, quoad compressa exsiccetur) ad laxandas siccandasque fistulas (ad aperiendas siue recludendas fistulas tantū dixit Dioscorides) & intumescendo ad introitum medicamentorum aperiendas. Charta quæ sit ex ea, cremata inter caustica est. Cinis eius ex vino potus somnum facit (de ea re nihil planè Dioscorides) ipsa ex aqua imposita callum sanat.

IVNCVS ODORATUS. CAP. CXXIIII.

Nomina



XOÏNOS & χοῖνος ἀρωματικός Græcis, Latinis Iuncus odoratus, Cornelio Celso Iuncus rotūdus, vt distinguat à Iunco vulgari & Cypero, Iuncus cotriāgulari, Officinis Squinanthum, dictione ex χοῖνος & ἄνθος, id est, ex Iunci flore deprauata, quo Schœnanthi nomine olim vocabatur à multis tempore Galeni à præstantia rosæque fragrantia, Serapioni Adher, non Adcher, vt in excusis codicibus legitur, Auicennæ Adhar, non Adchar, Hispanis *Paya de la Mequa*, siue *Paya de Camelhios*, Gallis *Pasture de chameaux*. Dioscorides locos natales, & præstantioris notas potius, quàm totam eius figuram descripsit his ferè verbis.

Lib. i. c. 16.

Locus.

Iuncus odoratus in Africa & Arabia nascitur. Laudatissimus ex Nabathæa, proximus Arabicus, quem aliqui Babylonicum cognominant, alij teuchitin: pessimus ex Africa. Eligendus est rufus, recens, floribus refertus, tenuis, purpurascens, fissilis, qui manibus confricando rosæ odorem emittit, igneæ mordacitatis ad linguam. Breuius hæc Plinius dixit. Ob id & odorati Iunci medicinæ dicentur,

Præstantia

Lib. 21. cap.

quoniam

quoniam & in Syria Cœle (vt suo loco retulimus) nascitur. Laudatissimus ex Nabathæa, cognomine teuchites, proximus Babylonius, pessimus ex Africa, ac sine odore. Est autem rotundus, vinosæ mordacitatis ad linguam. Syncerus in confricando odorem rosæ emittit, rubentibus fragmentis. Quæ si cum Dioscoride conferas, quædam manca, alia perperam notata perspicies. Neque enim ex Dioscoride luncus ex Nabathæa teuchites cognominatur, sed Babylonius. Quare sic Plinij locus explendus videtur. Laudatissimus ex Nabathæa, proximus Arabicus, quem aliqui Babylonium cognominant, alij teuchitin, pessimus, &c. Est autem τευχος, ἀγγεῖον, vas, vnde τευχίτης χοῖνος, quod vasis afferretur. Neque vinosam mordacitatem luncus huic inesse ait Dioscorides, sed linguam mordere μὲν πολλῆς πυρρώσεως, id est, cum multo feruore: neque rubentia fragmenta, sed χιζμὲν καὶ ἐμπόρφυρον, id est, fissilem & purpurascentem. Quod vterque de rosæ odore dixit, id negat Garcias: nam tritum quidem ait iucundum odorem spirare, sed non rosæ: annotatque Dioscoridem in his aromatis sæpe incertis comparationibus vti. Auicenna duo lunci genera statuit, vnum Arabicum, & boni odoris, alterum in Agiami natum, quo vocabulo Damascum ait intelligi Garcias. Alij luncum Agiami accipiunt luncum vulgarem, de quo Dioscorides lib. 4. vt eo capite Auicenna duo capita Dioscoridis commisceat, vnum de luncus odorato, alterum de luncus vulgari, qui locis humidis nascitur: nam Agiami exponit Bellunensis natum in loco humido & palustri. Illud verò æquè absurdum quod subiicit ex Dioscoridis auctoritate, luncum odoratum duarum esse specierum, quarum vna est quæ non habet fructum, altera quæ fructum habet nigrum: neque enim Dioscorides ita distinxit, neque fructus lunci odorati vsquam meminit. Serapio ex Abohanisa tradit luncum odoratum radicem habere similem Chulem, latiore tamen, cum minoribus tuberibus, ramulos tenues, qui fructum ferunt similem floribus Arundinis, sed gratiorem & minorem. Quid autem Serapioni sit Chulem nescio, nisi fortasse sit gramen, aut herba vulgaris Græcis πῶτα dicta. Pandectarius

Lib. 2. cap. 191.

Cap. 42. 1

Cap. 18.

IVNCVS odoratus,
Matthioli.



SCHOENANTHI flores,
Lobellij.



Vocat

In cap. 16.
l. b. 1.

Forma.

Lib. I. c. 34.

Locus.

Lib. I. c. 34.

Nomina

Lib. I. Anti.

vocat Chulem herbam capillarem. Recetiores accuratius & magis signatè Schœnanthi speciem expresse-
 runt. Matthiolus, qui se arculam florum Schœnanthi plenam habere ait, folia ei Caricis vel Zeæ tribuit, robustiora tamè, sursum spectantia, ex quibus culmi geniculati, & in horum summitate flores exeunt odorati Radix subest ima parte villosa odoratæque, sed odor tempore perit. Clusius in scholiis in Garcia historiam refert natas sibi fuisse Iunci odorati plantas ex semine Italia misso. Is teneris multis culmis assurgit, tenerioribus foliis quàm Gramen, siue *poa*, quam plurimùm refert, linguam mordicantibus iucunda & aromatica quadam acrimonia, quæ trita gratum quidem spirant odorem, sed in quo Rosæ odor non appareat: nam manducata potiùs Rosæ præsertim saccharo conditæ odorem æmulari videtur. Nullum protulit florem, quod seriùs prouenerit. Radix fuit numerosa, capillacea, non, vt dixit Serapio, nodosa, gustu feruido & aromatico. Tandem frigore periiit, vt annua planta esse videatur. Eius iconem ex eodem Clusio hîc proponimus, cui addidit Lobellius flores spicatum è glumis secundum caulem Lilij ritu hærentes, quos etiam hîc appinimus. Nascitur in Mazcate & Calaiæ Arabiae prouinciis maxima copia Garcia teste, non aliter quàm Gramen vulgare in Hispania, quo pascuntur animalia. Ab incolis vocatur *Sachbar*, à nonnullis *Haxis cachule*, id est, herba lotoria, siue lotionibus idonea. Aliis etiam nominibus Arabes Schœnanthum nuncupant, vt Aicenna Adhar, Serapio Adher, vt diximus, quos sequuntur Arabici omnes & Persici Medici. Florem verò vocant Foca, Persæ qui ad supradictas vsque prouincias pertingunt, Alaf, quod herbam significat. Apud Indos Herba Mazcatensis appellatur. Sunt qui Paleam de Mequa vocant, alij Pastum camelorum, nec immeritò. Non sunt tamen istic adeò frequentes cameli, vt totum gramen cum floribus depascentur. Sunt enim etiam asini, muli, equi, boues, capræ & oues, quæ nullum aliud pabulum norunt, quàm hunc Iuncum. Quare non temere scribit Galenus nescire se quomodo Schœni anthos, id est, Iunci odorati florem vocent, cum floris copiam non admodum suppeditet. Nam etsi tota adferatur herba, sunt tamen eius superiores partes à camelis sæpe depastæ: vescuntur enim ea, & delectantur maximè, non quòd tantus sit illic camelorum summitates depascentium numerus, vt nullus vnquam flos nobis compareat, sed quòd trunca sæpe adferretur herba, nempe radix, folium, caulis, flores autem ferè nulli, quemadmodum hodie videas in emporiis magnam plantæ copiam, flores autem perpaucos, tum quia plurimæ illic animantes iis vt cæteris graminibus vescendo summitates absumunt, tum quia flores papposi tenuésque facillè dilabuntur. Huic florum paucitati accedit institorum negligentia, qui nullos adferunt, medicis hos non postulantibus, quòd eorum vsus deserit. Desertur quidem in Indiam in medicum vsum vsurpandus. Maxima tamen copia in fasciculos colligatos nauibus inferunt equatij mercatores, vt equis substernant, ne stercoreis & vrinae pædore offendantur: nam simul atque maduerit in mare abiiciunt, & recentem substernunt. Sed & nautæ fasciculos aliquot secum aduehere solent, quos in India vendunt. Refert idem Garcias se in insula Dio vili emississe multos Iunci fasciculos, quos in Lusitaniam cum aliis aromatibus mitteret, nullum tamen florem se vidisse. Sed nec ab incolis in pretio habebatur, nec eius vllus apud eos vsus nisi in lotionibus: eo enim se & iumenta sua lauant. Arabes verò & Persæ Medici ad medicamenta duntaxat vsurpant. Schœnanthum nostrum ex Alexandria Egypti ad nos aduehitur, eò importatum ex locis antedictis. Sed in eo deligendo diligentia magna est adhibenda: id enim pæcarum quarundam & herbarum festucis impostores adulterant. Ad hæc ne vetustate vires amiserit diligenter expendendum Hæc enim vitia multis persuaferunt Schœnanthum Officinarum spurium & illegitimum esse. Sed sal-

luntur

luntur illi, quoniam tum descriptio, tum vires perspicuè eos refutant. Nam quod radices primùm medico vsui conuenientes illi non inesse contendunt, sed capillorum modo tenues, deinde paleas ipsas nullam gustantibus acrimoniam relinquere, postremò Schœnanthum vulgare Iuncum non proferre, sed calamos geniculatos Triticici vel Hordei modo, in iis vehemèter errant: siue enim tenues sint radices, siue crassæ, nihil ad historiam attinet, modò iis viribus præditæ sint quæ eis tribuuntur, quibus idèò destitutæ non sunt quòd sint capillaceæ, nam Dioscorides eas non descripsit. Quod Schœnanthum nostrum acrimonia careat, id falsum est: id enim quod vetustate euanidum & exoletum non fuerit, linguam mansu vellicat. Quod Iuncum ferat, non calamos quos ferre debeat, apertè Dioscoridi refragatur, scribentis: *χρῆσις δὲ τῆς ἄνθης, καὶ τῶν χαλάρων, καὶ τῆς ῥίζης*, id est, Vfus est floris, calamorum, & radicis. Illud verò absurdissimum, Galangam Iunci odorati radicem esse, cùm Galanga auctore Garcia in China nascatur, quæ bis mille leucis ab Arabia distat, & plurimùm à Iunco odorato differt tum foliis, tum radice, nec nisi sata proueniat, Iuncus autem sponte nascatur, nec seratur. Alij aliis rationibus nostrum Schœnanthum vt adulterinum improbât. Primùm quòd caulem Cyperi non habeat, vt Dioscorides in Cypero testatur: deinde quòd radices nostro Phu similes non sint: præterea quòd antiquis florum, caulis, radicum vsus tantùm fuerit, non foliorum, quibus hodie tantùm vtuntur: adhæc quòd in nostro Schœnanthi tum caule tum radice nullus prorsus calor percipiatur, nec sapor, sed in foliis quibus Dioscorides non vitur. Quæ faciliè refelluntur. Dioscorides enim Cyperi caulem nulla adiectione dixit esse *ῥοίνω*, id est, similem esse Iunco, vulgari scilicet. Quare Ruellius perperam caulem Iunci odorati vertit: Cùm enim Dioscorides Schœnantho calamus tribuat, Cyperi autem caulis calamus non sit, nec rotundus, nec geniculatus calami instar, sed angulosus, vt ad huius discrimen Iuncus ille odoratus rotundus cognominatus sit à veteribus, quonam pacto Dioscorides capite de Cypero ei Iunci odorati rotunditatem assignasset? Idem nuspiam Phu radicem Schœnantho similem dixit: sic enim capite de Phu, *ρίζα δὲ ἡ μὲν ἀνωτέρα περὶ δακτύλου μοῖρς τὸ πάχος, πάλαια δὲ ἐπιπρίζια ἔχει καὶ ὑπὲρ ῥοίνω, ἡ μέλας ἐλλέβορος*. Id est, radix Phu superior digiti parui crassitudinem æquat, ex obliquo fibras seu radículas habens Iunci & Ellebori nigri modo. Hic fibras radicis Phu fibris radicis Iunci simpliciter comparat, vt hic quoque Ruellius malè Iunci odorati verterit. Quod autem: schœnanti nostri caules & radices minimè in medicina vsurpentur, sed folia duntaxat, nō euenit, quòd partes illæ sapore, odore, viribusque careant, (sunt enim omnes odoratæ & efficaces) sed quia post Dioscoridis tēpora incuria Medicorum ita inualuerit vsus, proculdubio reuocandus, vniuersaque planta vtendum in posterum, quod testatur Galenus his verbis. Ego quidem mihi testis esse possum, habere me nunc ad manus aliquot Iunci odorati plantas, quarum calami ac radices non minùs sunt acres quàm folia. Quare qui Schœnanthi nostri natales ac facultates diligentius examinauerit, id ex Arabia in Alexandriam, inde ad nos importari ex negotiatoribus certò intelliget, ac legitimi facultatibus præditum esse testabuntur Medici omnes, qui id sæpe in medicamenta vsurparunt. Eas autem facultates Dioscorides ita declarat. Iunci odorati floris, calamorum, radicis est vsus. Vim vrinæ faciendæ habet, menses pellit, inflationes discutit, caput aggrauat, modicè adstringit, comminuit, concoquit, & venarum spiracula aperit: flos eius in potu utilis est sanguinem reiicientibus, doloribus stomachi, pulmonis, iocinoris & renum. Miscetur antidotis. Radix adstringentior est: idèò fastidiis stomachi, hydropicis, conuulsis drachma vna cum pari pondere Piperis per dies aliquot datur. Decoctum vuluæ inflammationibus, ad desidentium foras vtile est. Plinius aliter de iis

Lib. i. c. 4.

Lib. i. c. 10.

Lib. 8. sim.

Lib. i. c. 16.

Vires & Temper.

Lib. 21. c. 18.

scripsit. Discutit inflationes, ob id stomacho utilis, bilémque & sanguinem reiicientibus. Singultus sedat, ructus mouet, vrinam ciet, vesicæ medetur. Ad muliebres vsus decoquitur, opisthotonicis cum resina arida imponitur. Dioscorides florem duntaxat stomacho utilem esse dixit, & sanguinem tantum reiicientibus. Quod Plinius ad muliebres vsus decoqui, ille decoctum ad inflammationes vuluæ fœminis insidentibus utile. Vterque vrinam ciere. Reliqua, quæ Plinius habet, Dioscorides prætermisit. Galenus de iisdem hæc prodidit. Schœni anthos modicè calfacit, modicè etiam adstringit, nec planè à tenuitatis natura alienus est. Quare vrinam mouet, mensesque ciet, adhibitum siue in fotum, siue in potionem. Prodest & stomachi, & iecoris, & ventris inflammationibus. Magis adstringit radix. Flos calidus est. Porro in omnibus sui partibus, in aliis magis, in aliis minus gustantibus apparet adstrictio. Quare hæmoptoicorum medicinis admiscetur. Hæc Galenus. Etsi in Officinis verus odoratus Iuncus reperiatur, tamè odor & sapor adeò euanuerunt, virésque tempore ita imbecilles factæ sunt, vt putent nonnulli hunc non aliam esse plantam, inquit Pena, quàm quæ passim in Adriaticis frequens, & nonnunquam in mediterraneis, litoribus, & sabuletis occurrit, planè specie, magnitudine, culmòque concolori similem Iuncus odorato: meminitque ille hanc sibi obtrusam à pharmacopœis Venetiis & Monspelij, qui affirmarent veri esse congenerem. Verùm ab illius præstantia longius abest, quàm Cannæ vulgaris à Calamo aromatico deinde folijs est gramineis, & longè dissimilem florem profert. Coniicere possit quispiam Iuncum esse odoratum, quem in Campania inueniri memorat Plinius.

CALAMVS AROMATICVS.

CAP. CXXV.

Nomina

Lib. 2. c. 17.

Cap. 265.
simpl.

Lib. 1. c. 17.

Lib. 2. c. 22.



ΚΑΛΑΜΟΣ ἀρωματικὸς, Latine Calamus aromaticus, potius quàm odoratus. Auicenna & cæteri Arabes omnes Cassab & Aldirira vocant. Cassab enim Calamus est, Aldirira ex aromatibus. Dirire enim idem quod aroma. Serapio corrupto vocabulo Hassabel-derire. De

CALAMVS aromaticus,
Matthioli.



hoc Dioscorides sic breuiter. Calamus aromaticus in India nascitur. Melior est fuluus dense geniculatus, & qui in assulas multas frangitur plena araneorum fistula, albicans, viscidus in mandendo, & astringens cum aliquâ acrimonia. Et Plinius, Calamus, inquit, in Arabia nascens, communis Indis atque Syriæ est: in qua vincit omnes, à nostro mari centum quinquaginta stadiis. Inter Libanum montem, aliùmque ignobilem, non (vt quidam existimauere) Antilibanum in conualle modica iuxta lacum cuius palustria æstate siccantur, tricenis ab eo stadiis Calamus & Iuncus odorati gignuntur. Nihil ergo à cæteris sui generis differunt aspectu. Sed Calamus præstantior odore statim è longinquo inuitat, mollior tactu, meliòrque qui minus fragilis, & qui assulosè potius quàm Raphani modo frangitur. Inest fistulæ araneum, quod vocant florem (aliàs, araneus, quem vocant florem.) Præstantior cui numerosus (aliàs, numerosior.) Reliqua probatio, vt niger sit (Dioscoridi κῆπος, id est, fuluus.) Damnatur aliubi (quidam legunt, alius.) Melior quo breuior & crassior,

crassior, lentiusque in frangendo. Quæ ferè ex Theophrasto Plinius transcripsit. Lib. 9. hist. cap. 7.
 Sic enim ille. Calamus & luncus trans Libanum montem, inter ipsum Libanum & alium quendam montem paruum (ignobilem Plinius dixit) in conualle parua, non, vt quidam dixere, inter Libanum & Antilibanum. Etenim inter hos campus est amplius & pulcher, quem Aulonem vocant. Vbi verò Calamus & luncus proueniunt, lacus magnus est, iuxta quem palustribus siccatis isti enascuntur. Occupant locum triginta stadiis ampliorem. Virides nequaquam esse videntur, (Sic legit Gaza, vt & vulgata exemplaria, & διοξσι δὲ χλωροί: Guilandinus legit, & ὄξουσι δὲ χλωροί, id est, virides inodori sunt) sed siccati facie nihil ab aliis differunt. Locum ingredienti protinus odor sentitur, non tamen longius expirat, vt quidam referunt. Sequitur in Græco, ταῖς προσφερομέναις ἔναι πρὸς τὴν χύραν: quæ omisit Gaza, & reuera deprauata sunt, ac sic restituenda. ταῖς προσφερομέναις ναυσὶν πρὸς τὴν χύραν, id est, à nauibus quæ eò cursum tenet sentiri. Hic enim locus à mari pluribus quàm centum quinquaginta stadiis abest. Sed Arabiæ regionis afflatum odoratum esse aiunt. Hæc Theophrastus, qui quæ de loco illo narrat, ex aliorum sermonibus & fide narrat. Is campus est, auctore Guilandino, vallis quem interfecat Iordanus. Lacus verò Genesarethicus, D. Matthæo mare Galileæ, D. Ioanni mare Tyberiadis. Serapio & Auicenna magnam partem eorum, quæ de calamo tradiderunt, ex Græcis describere. Quæ omnia quia graphicè Calami aromatici partes omnes non depingunt, dubitandi occasionem præbuerunt, num radices, quæ passim in Officinis prostant hoc nomine, pro legitimo Calamo habendæ sint. Brasauolus has pro vero calamo habet. Fuchsius easdem veri Calami aromatici radices esse putat. At plures, iūq; rei herbariæ peritissimi, has vulgares radices Acori veri radices esse statuerunt, & perperam in Officinis pro Calamo vsurpatas fuisse. Qui non solum odore, ceterisq; facultatibus, sed etiam natura & tota effigie ab Acoro dissidet. Primum quæ Calami feruntur esse radices, Iridi persimiles sunt, geniculatæ, reflexæ, subalbidæ, acres, odore præstantes, & vt ait Galen. etiam subamaræ. Deinde folia quæ nonnunquã cum planta ipsa adferuntur, planè sunt Iridis. Quæ omnia Acorum planè referunt, quale Dioscorides depinxit. At Calamus verus eodem auctore fuluus est: assulatim frangitur, tubum arundinaceum seu fistulam habet araneorum plenam, lentus est in mandendo, adstringens & subacris. Ad hæc ex Arundinũ est genere Theophrasto & Plinio testibus, id quod etiam ipsum nomen demonstrat, atque etiam ipsius caulem seu arundinem non radicem in medicum vsum assumi. Sed vulgaris Calami radix, quã Acori esse probauimus, neq; assulatim frangitur, sed transuersim Iridis, vel Raphani modo, neq; fistulam seu arundinem fert, sed caulem Iridis, graciliorem tamen, & longiorẽ, neq; adstringit, neque subacris est, sed planè acris, neq; amaritudine caret auctore Galeno, quæ Calamo vero deest. Garcias Calamum aromaticum quo Officinæ in Lusitania vtuntur, eundẽ esse Lib. 1. Aro. Ind. cap. 32.
 In Guzarate vocari ait *Vas*, in Decan *Bache*, in Malabar *Vazabu*, in Malayo *Dirim guo*, in Persia *Heger*. Scitur, inquit, per vniuersam Indiam, plurimus verò in Guzarate, & Balagnate, Goæ etiam, vbi multus est eius vsus, in hortis satus prouenit, sed perpaucus. Sciscitatus est Garcias à multis Coracone incolis & Arabib⁹, num apud eos nasceretur Calamus: item an esset eis cognitus, eoq; vteretur. Negarunt omnes apud se inueniri, nisi ab Indis aduectum, probeq; sibi cognitũ, vtpote cuius apud eos plurimus esset vsus. Non falli tamen eos ait qui Arabicum vocant. Nam ex India in Arabiam defertur, & inde in alias regiones, neq; qui Alexandrinum appellant, quoniam hinc Alexandriã, deinde Barut & Tripolim Syriæ defertur. Is verò quo se in India vti Garcias ait, radix non est (pusilla enim est eius radix) sed ipsius Calami cum aliquatula interdum radices parte fragmentũ. Ex iis perspicuum

est, Calamum, cuius meminit Garcias, lōgè alium esse à Calamo Officinarum nostrarum, quin potius eius Calamum legitimum videri à veteribus descriptū. Quare quāplurimī in ea perseverant sentētia, Calamum nostrum vulgarem Acori esse radices, nosq; legitimo Calamo carere. Quem si quis nactus sit, sciat has eius vires ex Dioscoride. Calamus aromaticus urinā potu ciet: quare cū Graminis aut Apij semine coctus & potus, utilis est hydropicis, nephriticis, stillicidio urinæ, ruptisq; Menses & potu & appositu pellic: tussi suffitu medetur per se, aut ex resina terebinthina hāusto per arūdinem fumo: ad muliebres infēsus decoquitur, & clysteribus imponitur. Suffitionibus, malagmaticisq; odoris gratia cōmiscetur. Ex Galeno. Calamus leuiculam quādam adstrictionem, ac minimam acrimoniam habet. Magna ex parte essenāia eius terrena est & aërea, in frigiditatis caliditatisq; cōiugatione tēperata. Quamobrem moderatè urinam mouet, & facultatibus, quæ iecori & stomacho imponuntur, misceri potest. Tum in fomenta quoque vteri, quæ phlegmones gratia, aut irritandis mensibus assumuntur, admiscetur. Habeatur igitur secundi ordinis eorum quæ excalfaciunt & desiccant, valentiùs tamen desiccent quàm ex calfaciant. Inest quoque ei quādam partium tenuitas.

ZINGIBER. CAP. CXXVI.

Nomina

Lib. 2. c. 154.



RÆCIS voce barbara ζγγίβερ, & ζγγίβερ, & γγγίβερ dicitur, Latinis Zingiber & Gingiber, Arabibus Zingibel, Italis Gengeno, Germanis Ingber, Hispanis Ginguire, Gallis Gingenure. Dioscorides vsum potius quàm plantæ speciem expressit his verbis. Gingiber sui generis planta est, in Troglodytica Arabia magna ex parte nascens, qua virente ad multa perinde atq; nos Rura vtrūtur, & in primis potibus & eduliis admiscēt. Huius radices Cyperi modo parvæ sunt, candicantes & odoratæ, atq; Piper sapore imitātur. Eligi debent quæ teredinem nō senserunt. A multis tamen ob id cōdiuntur, quòd celeriter cariem sentiant. Breuiùs etiam Plinius de Pipere scribens. Nō est, inquit, huius arboris radix, vt aliqui existimauere, quod vocāt Zimpiberi, alij verò Zingiberi, quanquā sapore simile. Id enim in Arabia atq; Troglodytica in villis nascitur, parvæ herbæ radice candida. Celeriter ea cariem sentit, quāvis in tanta amaritudine. Dioscorides omīsa reliqua delineatione, radículas tantum memorat vt Cyperi, cui tamen admodum similes nō sunt, & maiores, nec pendulæ Cyperidis ritu. Plinius dixit tantum parvæ herbæ radicem esse candidam. Quare ampliorem eius descriptionem ex Garcia & aliis hīc ponemus. Zingiber, vt docet Garcias, appellatur Arabibus, Persis, & Turcis, Gīngibil, non Lengibel, vt corruptè legimus in Serapione: in Guzarate, Decan, Bengala cū adhuc recens est & viride, Adrac, siccātū verò Suſte, in Malabar tam viride quā siccum, Imgi, in Malayo, Aliaa. Est autē Zingiber foliis Iridi aquaticæ aut Gladiolo (nō Arundini) similibus, magis tamen nigricantibus: caule cum foliis duorum aut trium palmorum altitudine, radice etiam Iridis, multò minore quā Cyperi, nō serpente, vt volunt quidam, nec admodum acri, præsertim eius quod in Bacaim

Lib. 12. c. 7.

ZINGIBER, Pena.



Lib. 1. Aro.

Ind. c. 41.

Nomina

Cap. 326, simpl.

Forma.

beri, natum

natum est, ob nimiam quæ in ea exuperat humiditatem. Ludouicus de Barthe-
 ma scribit erui radicem quatuor, & octo, & duodecim vnciarum pondo, neque enim
 omnibus eadem est amplitudo: caulem trium, aut quatuor palmorum longitudi-
 ne: cum eruitur Zingiber, relinqui internodium in scrobe, terræque operiri, seu
 semen eius radices proximo anno producturæ alium fructum, id est, Zingiber. Et
 Antonius Pigafetta narrat in insula Thidore nasci Zingiber, idq; recens edi pa-
 nis modo, quod recens acre non sit veluti est siccum. Arborem non esse, sed par-
 uam plantam, quæ caules ferat palmum altos, Arundini similes, folia item similia,
 sed angustiora & breuiora, quorum nullus vsus, sed radices tantum quæ est Zin-
 giber. Nascitur id in omnibus Indiæ prouinciis cognitis, semine aut radice satum.
 Nam quod sponte nascitur, exigui est momenti. Optimum & frequentissimum
 est Maluaticum, Arabibus & Persis maximè expetitur. Secundum locum obti-
 net, quod in Bengala crescit. Tertium, quod in Dabul, & Bacain, totæque ea ora
 maritima. In solitudinibus & mediterraneis vix inuenitur, neque inde ad nos
 adfertur. Prouenit etiam in insulis D. Laurentij, & Comaro, quæ Æthiopix sunt
 conterminæ. Vnde sumpta occasione dixere nonnulli apud Æthiopes & Arabas
 nasci. Galenus è Barbaria conuehi scripsit. Si per Barbariam Indiam intelligit,
 inquit Garcias, rectè quidem. At si per Barbariam eam Africæ partem, quæ ho-
 die Barbaria nominatur, malè. Dioscor. in Troglodytica Arabia nasci tradidit.
 At apud Troglodytas quidem & Æthiopes nascitur, sed adeo exigua quantitate,
 vt vix incolis sufficiat, in Arabia verò minimè: nam ad Arabes ipsos importatur.
 Quod idem dixit Zingiber primis eduliis admisceri, id verum esse confirmat
 Garcias, quod idem hodie quoque apud Indos obseruetur. Hæc etiam radix mi-
 nutim concisa, & aliis herbis admixta, in acetariis additur cum aceto, oleo & sale:
 ac etiam cum carnibus ac piscibus coquitur. Quare rectè Dioscorides dixit Zin-
 giber cibo conueniens esse, & cum condimento assumi, excalfactoriam vim ha-
 bere, & concoquentem, aluum leniter mollire, stomacho vtile esse, efficax aduer-
 sus ea quæ oculis caliginem offundunt, in antidota addi. Quod autem aluum
 mollire ait, id intelligendum si recentes & teneræ adhuc radices edantur, multa
 adhuc in iis humiditate aluum molliènte, & lubricante: nam vetustiores & ex-
 hausta humiditate sicca aluum potius adstringunt. Galenus de iisdem hæc prodidit.
 Zingiberis radix utilis est, quam vtrique ex Barbaria ad nos conuehit. Excalfacit
 potenter, sed non primo statim occurso velut Piper. Vnde sanè & minùs esse sub-
 tilium partium quàm Piper existimandum, siquidem in tenues solueretur partes,
 & celerimè actu vt illud fieret calidū. Apparet enim adhuc illaboratam, & cras-
 siorem quandam ei inesse substantiam, nec eam siccam & terrestrem, sed humi-
 dam potius atque aqueam. Quo fit vt facile perforetur, cum scilicet excremen-
 titia insit humiditas. Hæc Galenus. Succulentæ adhuc & recens conditæ radi-
 ces ex Indiæ variis locis adferuntur maximè commendandæ, longè minùs verò
 hæc quas iam siccas, & vi emolliente exoletas, lixiuio maceratas saccharo condiunt
 Venetiis. Describit paulò aliter Christophorus Acosta Zingiber, qui in Noni
 orbis regionibus simplicium cognoscendorum studio peregrinatus, oculis mul-
 ta & ipse subiecit, in quibus non rarè ei cum Garcia & aliis non satis conuenit.
 Planta hæc igitur est, vt is vult, ad trium quatuorve cubitorum altitudinem assur-
 gens: folia habet quàm similia foliis Lachrymæ Iob, seu Milij Solis: caulis crassi-
 tudine Asphodeli, quam & Hastulam regiam appellant. Tota foliorum quodam
 quasi congestu velut compacta est, vt humiles Arūdines virides referre illam vel-
 le dicas. Radices eadem ferè Lirij Cardeni siue Iridis radicibus. Frequentissima
 tota India Orientali nascitur, veluti in Bengala, Dabul, Becain. Fert & vniuersa
 prouincia Malabar, vbi eius longè est maximus prouentus. Zingiber quod boni-

Locus.

Electio.

Lib. 6. sim.

Lib. 1. c. 14.

Vires.

Temper.

Lib. 6. sim.

Zingiberis
ex Acosta
descriptio.

Forma.

Locus.

ZINGIBER, *Acosta.*

tate præstat, è semine vel radice, vti iis qui terræ mandant visum est, provenit. Sed & plerisque locis non satum, sponte nascitur, mediterraneis tamen rarum, maritimis copiosius. Toto anno viret. Id vt asseruent, Decembri & Ianuario mensibus legunt, siccant, terræque pingui & argillacea operiunt, vt obturatis ea poris & foraminibus quibus id totum ocellatum est, difficilius corrumpatur: recentius enim ingesta humo perdurat, conseruatque quod habet humoris, atq; ita à teredinibus tutius defenditur. Etiamnum viride gustatum leuiter adurit, minusq; quam cum siccum est mordicat: quoque vda magis & humecta sunt in quibus nascitur loca, eo minus retinet acrimoniæ, qua viceversa molestius est quo sicciora illa magisq; inopia aquarum sitientia. Primis mensis virens adhuc commendatur, & dapes vice accetarij inchoat. Neq; edendi modò causas affert, stomachum acutens, verum etiam aluum sollicitat, eiusque idem profluvia ex cruditate orta sistit. Hæc radices saccharo condiuntur, bene

contusa prius, multisque aquis macerata & elota quo magis magisq; dulcescant. Quæ verò ex iis tempestiuè lectæ sunt, diligenter accurata, mundata, præparataq; antè quàm saccharo incoquantur optime sunt, gratiorisq; gustus, & cum maduntur, teneriores: vt quæ filamenta in ore relinquunt & amaricant, malæ. Improbatur idem Dioscoridis & Galeni sententiam de Zingiberis locis natalibus, quod & iam ex aliis antè notauimus. Neque magis illi assentitur, eius radices Cyperi modo paruas tradenti, cum planè, inquit, cum nostra icone conueniant. Neq; verò est, addit, quòd aut minoris faciat, aut reiiciat quisquam Zingiber quod terra obductum videat, quasi id eo consilio factum sit, vt prauis & carie corrupti vitia ea arte dissimulentur & obregantur. Alia longè est eius ratio, quàm vt vel hac de causâ, vel quo inde aliquid ad pondus accedat, ita procurent: nempe ea quam iam retulimus, conseruandi gratia. Hæc quidem de Zingibere *Acosta*. Alia porro est ra-

MECHINVM,

Pena.Mechinū
rarius.

dix Zingiberi cognata, quæ Zingiber fuscum & Mechinum Officinis dicitur. Id nō solum à Zingibere differt quòd eo immaturius sit aut improbius, vt etiam declarat *Pena*, sed potius specie & concretionem (caren enim fibris & filamentis) perspicuitate, fuscinedine, soliditate & acriore gustu, nec teredine exedi solita. Id etiam conditur. Ex eodem *Pena* pictam exhibemus raram Mechini speciem, & nuper adferri ceptam. Vulgatum Zingiber aut Mechinum refert, sed elegantiore aspectu, colore Mechini, cortice Zingiberis albi, sed squa-

matim geniculato, & ferè articulado veluti *Doronicum*, aspectu pellucido, gustu quàm Zingiberis multò acriore & sicciore, carie non exeso.



QVÆ recentioribus Græcis γαλγγα, vulgò etiam Galanga dicitur, vteribus incognita videtur fuisse, nisi Arabes, vt ait Pena, Galaticum Acorum, quod cæteris Dioscorides præfert, in Galauge, siue Galangæ nomenclaturam deprauarint, vt qui fortè Galangam Acori speciem esse putarent. Arabes omnes *Caluegiam* vocant. Quare Serapio & Mauritani omnes corruptè *Kalangen* & *Galungen* scribunt. Est autem Galanga duplex. Vna minor, odorata, quæ ex Chinarum regione in Indiam, inde in Lusitaniam deferitur. Eam incolæ *Lauandon* appellant. Altera maior, crassior priore, ignauior tamen, & viribus infirmior. Nascitur in Iaua, & ab incolis *Lancuaz* nominatur. Tamen in India *Lancuaz* vtraque appellatur. Serapioni & Auicennæ, auctore Garcia, non satis perspecta fuit vtriusque Galangæ historia. Nam Serapio nec maioris, nec minoris meminit, & ineptè describit. Est vena, inquit, in crassitudine Cæsie Igneæ, & cortex eius est ruber, & intèrius eius est puluerulentum. Auicenna diuersis capitibus de Galanga scripsit. Vno nomine *Calungiam*, dicitque frusta esse inuoluta rubra & nigra, quibus hæsitans subdit. *Mefangne* dicit esse *Casurudar* ipsum, de quo *Casurudar*, siue, vt Garcias vocat, *Caserhendar* alio capite dixerat, & Galangam ex *Mefangne* interpretatus est. Sed quo nomine Galangam minorem, siue Chinesem, quæ præstantior est, quo item maiorem Iauanensem, quæ ignobilior, intelligat, non exponit, cum tamen hæc ab illa non solum facultatibus, sed etiam forma differat, vt ex descriptionibus perspicuum fiet. Galanga maior binum ferè cubitorum altitudine attollitur, foliis mucronatis, cuspidis lanceæ modo, vt ait Garcias, vel, vt Pena, foliis Iridis aut Xyridis, nigricantibus, angustioribus tamè, flore candido, radice crassa, nodosa Arūdinis modo, vel Acori palustris vulgaris, vt ait Pena,

Nomina

Genera.

Li. 1. Arom.
Ind. ca. 40.
Cap. 332.
simpl.

Li. 2. c. 314.

Li. 2. c. 192.

Forma.

GALANGA maior & minor, Pena.



ex fusco intus forisque rufescente. Minor duorum palmorum altitudine fruticat, foliis Myrti, vt ait Garcias, quibus à Galanga maiore plurimum dissidet, quam alioqui radice nodosa, & similiter colorata (nisi quod minor est) viribus, odore, sapore, colore & nomine proximè refert. Hæc aliis Cyperi species, aliis Acori videtur. At quamuis radices aspectu, duritie, odore, sapore, & nonnihil figura Cyperum longum repræsentent, certè folia, si Myrti sunt, ab vtroque illorum plurimum distant. Non defuere etiam qui Galangam Acorum Dioscoridis esse cõtenderunt. At diligens radicum inspectio & collatio facile ipsorum sententiam refellet. Nam Acori (quod verum ac genuinum nos habere demonstrauimus) radix est albida, odora, amaricans etiam tem-

ste Galeno, fractu facilis, colore & concretionem Iridi similibus. Galangæ radix ex fusco intus forisque rufescit, frangenti est contumax. Præterea reclamant vires. Minor enim odorata est, sapore admodum acri, adeo vt mansa Piperis vel Zingiberis modo linguam & fauces vellicet, aromatico, minimè amaro: crassior viribus est imbecillior, colore etiam dilutiore, minus odorata, adstringit, quæ vis Acoro non inest. Quare Iridi aduersus vuluarum vitia substitui non potest, quod tamen requirunt Dioscorides & Galenus. Galanga itaque calfacit & exsiccat ordine tertio. Ventriculum roborat, eius dolores vel à frigore, vel à flatibus ortos sedat. Naribus admota refrigerato cerebro vtilis est: ore retenta anhelitum commendat.

Temper.
& Vires.

Galangæ ex
Acoſta hi-
ſtoria.

Genera.

Forma.

Nomina

Vſus.

Facit & ad cordis palpitacionem. Coli dolores mulcet, ſi à flatibus proueniant. Prodeſt flatuofis vteri affectibus: venerem roborat, refrigeratos renes calfacit. Denique frigidiſ omnibus morbis aduerſatur. Multò verò ineptior eſt eorum opinio, qui Galangam Schœnanthi radicem eſſe volunt. Nam Schœnanti radix inutilis eſt, Galanga vtiliſſima ad ea omnia quæ diximus. Adhæc Schœnanthū in Mazcate, Calaiate Arabiæ provinciis naſcitur, Galanga in China & Iaua, ſive Iaoa regionibus procul ab Arabia remotis. Age verò, quando vſibus humanis hoc medicamentū apprime neceſſariū eſt, dignūque vel eo quod pharmacopola in ſuis officiis perpetuò habeant, cum ſuperiore deſcriptione nouam Acoſtæ etiam hîc conferre libet. Habet enim nonnulla quidem illis non diſſimilia: ſed multò conſideratione digniora ea ſunt, à quibus, nobis ex illorum auctoritate traditis, omnino diſſentit. Indieta & iſdem quædam haud prætermittenda refert, quæ nos vnà cum ipſius quam vides Galangæ icone eo libentiùs mutuabimur. Verba eius, Aromatum hiſtoria, hæc ſunt. Duplex eſt Galanga. Vna minor & odorata, quæ cum Rhabbarbaro ex Chinarum regione in Indiam aduehitur, & inde in Luſitaniam deferitur, incolis *Lauandou* dicta. Altera maior, plurima naſcens in Iaua

G A L A N G A, Acoſta.



& Malabar, cuius deſcriptionem, quod maiore ſit in vſu, hîc damus. Ea duorum cubitorum altitudine creſcit, nonnunquam amplior, ſecundiore præſertim ſolo: folia habet Orchidi Dioſcorid. lib. 3. deſcriptæ ſimilia, longiora tamen & latiora, ſupernè ſaturatiùs infernè dilutiùs virentia: caulem ex foliorum inuolucris conſtantem, vti in Orchidum generibus: ſorem candidum, inodorum: ſemē exiguum, neglectum, radicem ſecundum caput craſſam & bulbolaſam, reliqua ex parte Zingiberi ſimilem, ſed maiorem, nonnunquam capitula Haſtulæ regiæ modo proferentem. Seritur radice quæ mirum in modum ſeſe propagat. Appellatur à Canariis & Brachmenis (quibus maximo eſt in vſu cum in hominum tum iumentorum morbis, quique eam ordinariè cum Oriza, vel piſcibus, vel in acetariis edunt) *Caccharu*, ab Arabibus *Caluegian*, in Iaua *Lancuax*, in Malabar *Cua*. Adeò autem vulgaris eſt apud Malabarenſes huius radicis vſus, vt non modò in medendis morbis eam vſurpent, ſed in farinam etiam cōuertant, ex qua Cocci ſeu nuciſ Indicæ lacte, nonnun-

quam Sura, au Iagra excepta, certum quoddam panis genus pinſunt in tenuium placentularum formam: *Apas* vocant. In deliciis eſt hic panis, præbentq; iſ qui ventriculi debilitate, & frigidityte laborant, in alui doloribus, vteri affectibus & vrinæ difficultatibus: quo poſtremo in morbo miram eius efficaciam experiuntur, ſive ob humores craſſos & pituitoſos, flatûsve, aut arenulas in vtericibus aut collo veſicæ congeſtas, vrinæ difficultas orta ſit, vel etiam ex carniſ excreſcentia in ipſo veſicæ collo aut meatibus nata. Præbent verò edendum hunc panem, deinde hauſtum Nimpæ (quæ veluti aqua ardens eſt) concedunt, in inguinibus verò ſupràque pubem & collum veſicæ folia Nymphææ decocta in aqua & macerata atq; adhuc calentia applicant. Cluſius tamen, qui illa Acoſtæ hæcenus Latinæ conſuetudini tradidit, neque Acoſtam, neque Garciam ab Orta ſibi ſatisfacere in Galangæ maioris

maioris descriptione, ait: præsertim ſicæ, quæ Europæ Officinæ vtuntur, legitima eſt Galanga maior. Etenim eius radices maiorem ſimilitudinem habere cum Iridis (folia duntaxat foliis Iridis ſimilia facere Penam ſuprà retulimus) quàm cum Aſphodeli aut Zingiberis radicibus. Sibiq; omnino perſuadet, Galangam noſtram maiorem Iridis genus eſſe, huic fortè ſimile, quod ipſe in ſua Pannonicarum ſtirpium hiſtoria primum poſuit. Nihil tamen ſtatuit.

PETVM.

CAP. CXXVIII.



VEMADMODVM hortis omnibus magno eſt ornamento, ita facultatibus inſignitus celeberrima eſt herba, quam Petum ab Indis vocari reſert Theuetus, Nicolaus Monard. *Picielt*, Ouiedus in Hiſpaniola inſula *Petebecenuc*. Hiſpani *Tabaco* nominarunt ab inſula quadam eius nominis, in qua frequentiffima reperitur. Galli, quòd Ioannes Nicotius, regius aliquando in Luſitania orator, eius ſemen primus ad Reginam Regis Galliæ matrem detulerit, illiusque facultates docuerit, Nicotianam & Herbã Reginæ nuncuparunt. Alij Herbam ſanctam ob admirandas eius virtutes. Alij Bugloſſum antarcticum. Ad magnam altitudinem aſurgit, & Limoniam malum æquat: in Gallia, Belgio, Anglia, trium cubitorum eſt proceritate, ſæpiſſime quatuor aut quinque cum maturè ſemen ſatum fuerit in calidioribus tractibus Aquitaniæ & Linguagothiæ: caule recto, craſſo, multis & grãdibus ramis brachiato, tam pingui, maxime cum adoleuit, vt melle illitus videatur: foliis numeroſis, longis, amplis,

Nomina

Forma.

NICOTIANA ſive
Tabacum.



Symphyti magni foliis latioribus, & torundioribus, Perſonatæ vel Hippolapathi ſatiui ſatis ſimilibus, carnoſis, pinguibus, aliquantùm hirsutis, colore viridi dilutiore, iniucundo odore, acri admodùm guſtu cum quodam lentore. Florem fert in ſummis ramis copioſum, oblongum, tubæ modo cauum, extrema parte latum & pentagonũ, ex albo dilutè purpurascentem. Huic ſuccedunt caliculi ſive capitula oblonga, exigua, ſemine plena ex rufo nigricante, puſillo, Papaueris multò minor. Radix eſt ſatis craſſa, multifida, lignoſa, intus crocea & amara, quæ facilè cortice ſuo ſpoliatur. Alterum Tabacum minus pinxit Lobellius, foliis Hyoſcyami lutei mucronatis, anguſtioribus, pediculo hærentibus, floribus minoribus aliquantò, non abſimilibus, ſaturatioribus & purpurantibus. Item aliud minimum. Dodrantalis eſt herba, facie non diuerſa, eodè etiam feruido vrentèque guſtu. Floſculi Hyoſcyami lutei multò minores, ex ſtauo herbacei. Folia Doronici aut Plantaginis anguſtiſolia, minora & anguſtiora Pulmonariæ. Radix puſilla, fibrata. Naſcitur Petum plerique Indiæ locis,

humidis & vmbroſis, & ex culto læuiq; ſolo. Non multis ab hinc annis ex Heſperix Indiæ nouo orbe, Luſitaniæ, Galliæ, Belgij, Angliæ facta fuit inquilina. Seritur illic omni tempore. In frigidioribus regionibus Auguſto aut Septembri ſerenda, quia ſemen exiguũ diutiſſimè ſub terra latet antequàm germinet: deinde à primis frigoriſus

Tempus.

SANNA sancta, sive Tabacum minimum, Lobelij.

*Temper.
& Vires.*



frigoribus læditur. Semel autem sata, & semen ad maturitatē cum perduxerit, seipsam deinde ferit, nec opus habet alia satione. Floret in calidioribus regionibus Iunio & Iulio mensibus: semen Septembri maturefcit. Foliorum duntaxat vsus est, eaq; vt asseruari possint, auctore Nicolao Monard. filo traiecta in vmbra suspēduntur, & siccantur: deinde iis aut integris, aut in puluerem tritis vtuntur. Calidam esse & siccam plantam hanc in secūdo gradu idem Nicolaus Monard. tradit, idēd calfacere, resoluerē, abstergere, & aliquantū adstringere, vt ex sequentibus facultatibus colligere licet. Folia eius, inquit, calfacta & imposita cephalæ & hemicrania præsentī sunt remedio, si morbus à causā frigida, aut à flatibus ortus fuerit. Sæpius verò sunt repetenda ad perfectam vsque curationem. Sunt qui caput oleo florum Maliantie prius inungunt. Idem remedium tetano vtile est, & totius corporis doloribus ab eadem causā ortis. Dentium dolores à causā frigida non modò finit dente prius deteriso aliquo linteo eius succo delibuto, & pilula ex

eius folio confecta denti indita, sed etiā ne putredo serpat prohibet. Pectoris vitiis, vt tussi veteri, asthmari, & similibus ex frigido humore prouenientibus morbis, foliorum decoctum ex aqua, & eclegma ex eius decocto vtilia sūt. Serapium ex saccharo & foliorum eius decocto paratum, & parua quantitate sumptum, putres humores ex pectore eiicit. Asthmaticis interdum fumus eorū ore exceptus opitulatur: sed necessarias euacuationes præcedere oportet, si morbus inducias dederit. Sub cineribus calfacta folia, & sordida non excusis cineribus, calidāque sæpius imposita dolori ventriculi qui fit à frigida causā, aut à flatibus in ipso generatis auxilio sūt. Viridia folia alij manibus oleo inunctis confringunt, & sic imponunt. Ventriculi & lienis obstructionibus folia paxillo aceto intrita, diūq; illita vtilia sūt: quibus deinde folia calefacta aut lineus pannus succo foliorū calenti intinctus superimponuntur. Foliorum inopia puluis communi vnguento obstructiones aperienti excipitur, & pars obstructa, aut tumore affecta diu illinitur. Indicæ mulieres in puerorum, atque etiā grandiorum stomachi cruditatibus valde commendant. Nam ventre prius inuncto oleo lucernarum, & foliis sub cineribus calefactis, altero regioni ventriculi, altero tergori, quā ventriculum spectat, impositis, eas cruditates cōcoquunt, & aluum emolliunt, si quoties opus erit renouentur. Latas & teretes ventris tinea expellit foliorum succus cum saccharo coctus & depuratus parua quantitate sumptus. Vmbilico tamen etiā folium tritum imponendum, & alius enemate eluenda. Nephriticis doloribus folia sub cineribus, vt dictum est, calfacta, & quā calidè fieri potest apposita, magnum adferunt doloris leuamentum, idem remedium quoties opus fuerit repetendo. Commode etiā clysteribus iniiciuntur, atque etiā fomentationibus & emplastris admiscētur. In suffocationibus vteri folia probè calfacta, & vmbilico vteriq; regioni imposita præsens adferunt remedium. Quod si animi deliquium subsequatur, eorūdem fumus naribus obiectus illico illas liberat. Quod remedium Indicis mulieribus adeo vulgare est, vt ea de causā huius plantæ folia diligenter asseruent.

afferuent. Articulorum doloribus (si ab humoribus frigidis, vel non nimium calidis fiant) efficacissimè folia calida adhibentur, aut eorum succo pannus lineus inunctus: humores enim digerunt & resoluunt, ideoq; tumoribus etiam ædematodis, foliorum succo calido prius elotis, vtilissimè imponuntur Perniones sanare, si ter aut quater huius plantæ foliis fricentur, deinde pedes aqua calida cum sale abluantur, experientia docuit. Venenis & toxico perniciosissimo, quo Cannibales sagittas inficiunt, hac ratione resistere didicerunt Hispani (nam ante sublimatum vulneribus inspergebant.) Cùm Cannibales ad D. Ioannem de portu diuine nauigassent, Indos & Hispanos nonnullos qui illic erant, telis suis venenatis conficiebant, plerq; vulnerabant, qui cùm sublimato carerent, à quodam Indo edocti sunt Tabaci succum expressum vulneribus imponere, deinde folio ipsius trita. Illico sedati dolores, & ea symptomata quæ huiusmodi venena subsequi solent: tandem veneno superato vulnera curata. Eadem de causa venenatis pestiferisque carbunculis imposita crustas inducunt, deinde curationem adferunt: & ad ictus morsusque venenatorum animalium plurimum conferunt. Recentibus vulneribus imposita sanguinem sistunt, eaque glutinant. Quod si maiuscula sint, vino prius eluantur, & labiis vulnerum coniunctis succus foliorum inspergendus, & ipsa folia trita supra vulnus alliganda: postmodum reliquisq; diebus sequentibus eadem facienda: victusque ratio necessaria obseruanda. Vetera vlcera gangrænâque succus instillatus, & folia trita imposita detergunt, curant, & ad cicatricem perducunt, purgato videlicet prius corpore, & missione sanguinis, si necessaria fuerit, facta, obseruata etiam conueniente victus ratione. Porrò non modò in hominibus eiusmodi vlcera curare, sed etiam in animalibus experientia ipsa docuit. Nam per vniuersam Indiam frequentia vlcera vaccas, boues, & alia animalia infestant, quæ faciliè ob summam regionis humiditatem putrescunt & vermibus scatent, quibus solebant inspergere sublimatum, melioribus remediis destituti. Sed cùm magno istic vaneat, plerumq; quod vulneribus inspergebatur, pluris costabat, quàm animal quod curabatur æstimari potuisset. Quare Tabaci facultates in hominibus experti, illius etiam vsum ad putrida, foetida, vermibusque scatentia animalium vlcera transtulerunt, atque adeò compererunt succum eius instillatum non modò vermes necare, sed etiam vlcera mundare, deinde ad cicatricem perducere: prodest etiam iumentorum exulcerationibus, ideoque Indi Tabaci folia semper circumferunt. Scribit Nicol. Monard. se quendam nouisse narium vlcere laborantem, è quo sanies manabat non sine contagij suspitione, consuluisseque foliorum huius plantæ succum instillari, à secunda instillatione vermes multos excidisse, deinde pauciores, & post aliquot dies sanatum fuisse vlcus, sed quæ erosa erant non restituta. Illius etiam foliis impetigines & capitis scabies confricantur. Fuit ista planta ab Indicis sacerdotibus celebrata ad responsa danda. Etenim moris erat apud Indos sacerdotes de bellorum euentu, aliisque magni momèti negotiis consulere. Sacerdos consultus istius plantæ folia sicca vrebat, & eorum fumum tubulo quodam in os excipiebat, deinde quasi in ecstasin quandam raptus cadebat omni motu priuatus, & sic aliquandiu permanebat. Discussa eius fumi facultate ad se redibat, referebaturque negotium cum dæmone contulisse, responsaq; dabat ambigua, vt, vtunque euentus succederet, illis faciliè persuaderet, sic se prædixisse, eoque modo Barbaros illos miserè decipiebat. Vulgus etiam Indorum eundem fumum per os & nares excipit animi gratia, cùm somnia videre, & extra se quasi rapi volunt, atq; etiam de suorum negotiorum euentu ex insomniis quæ illis apparuerint pronuntiatum. Præterea Indi oneribus ferendis, aut aliis laboribus defatigati eiusdem plantæ fumum hauriunt, & illico quasi mente alienati corruunt, excitati verò refocillatos eo somno, & vires recuperatas sentiunt. Eadem vtuntur sitis famisque sedanda

sedandæ gratia hoc modo. Testas cochlearum quarundam vrunt, & terunt calcis modo: huius & foliorum æquas partes mandunt diu, donec ex vtriusque massa fiat, quam in pilulas pîso maiores conformant, in vmbra siccant, & in vsum reponunt. Facturi iter per desertâ, in quibus neque cibum, neque potum inuētuos se putant, eas pilulas secum deferunt, ex quibus vnâ inter labrum inferius & dentes repontes, eius liquorem assidue sorbent; ea absumpta aliam reponunt, atque item aliam, donec peregrinationem absoluerint triduamam interdum, aut etiam quadriduamam, quo tempore neque famem sibi molestam esse, neque sitim asserunt. Horum exemplo naucleri plerique istinc redeunt gestant pusilla infundibula ex folio Palmæ, aut storea confecta, quorum vni extremo inserta sunt conuoluta & comminuta huius plantæ folia siccata: istud igni accendunt, atque altero extremo hianti ore quantum plurimum possunt, inspirando fumum hauriunt, vnde sibi famē sitimque sedari, vires instaurari, spiritus exhilarari asserunt: sopiriq; iucunda ebrietate cerebrum distant, incredibilem pituitæ copiam plerumq; educi. Sunt qui eius folia singulis diebus manē à ieiunis mandi iubent, vt podagra liberentur, quoniam multam pituitam in os attrahunt, eamque in partes inferiores defluere prohibent. Carolus Stephanus in Prædio rustico experientia comprobatum esse scribit, folia strumis vtiliter illini, eiusq; stillatitium liquorem asthmaticis auxilio esse. In summa, Panacea quædam est ad omnis generis morbos. Quidam Nicotianæ speciem esse putant plantam, quam Hyoscyamum luteum vocant, quia vidissent non paucos huius fumo hausto temulentos fieri. At non rectè sentiunt, quia Nicotianæ fumus, vt se expertum fuisse ait Pena, non citò inebriat, nec frigore dementat, vt Hyoscyamus, sed quodam aromatico vapore ventriculos cerebri imbuat.

ZARZA PARILLA. CAP. CXXIX.





EX NOVI orbis, siue Americæ prouinciis etiam prodiit Zarza parilla, & Chinæ radici successit: eique laudem eripuit, quod non nisi cariola & longa vectura euanida, atque marcida ad nos peruenire soleat Zarzam parillam Hispani, qui primi eius vsum in Europam ex Peru inuexere, breuiore itinere, atque ideò integrioribus viribus ad nos transmittant, ad multos variosq; morbos præstantissimum medicamentum. Qui primi illic viderunt, Zarzæ parillæ nomen indiderunt propter magnam similitudinem quam habet cum Zarza parilla Hispanica, id est, Smilacæ aspera, quasi dicas Rubû viticulâ, nec Hispanis, inquit Marthiolus, Zarza parilla aliud est, quam Rubus viticulosus: *Parra* enim Hispanis vitis dicitur, *Parilla* viticula, & *Zarzæ* rubus. Eius apud indigenas nomen spinosam vitem Latinis significare, Lopus Lusitanus auctor est. Planta est, vt describit Nicolaus Monardes, quæ multis radicibus nititur, duos cubitos, aut eo amplius longis, colore cinereo diluore, tam altè interdum demissis, vt qui integras eruere velit, ei profundè admodum fodere opus sit, ramis nodosis & lignosis, qui facillè desiccantur: florésne an fructum proferat, ignorat. Hac quæ in Hispania noua prouenit, multò meliorem & efficaciorẽ postea protulit prouincia Honduras, à superiore differentem, quod illa candidior est ad pallorem accedens, & gracilior, hæc verò cinerea, nigrior atque crassior. *Electio.* Deligitur nigrior, recens, non cariola, fractu contumax, quæq; assulatim frangitur, & ponderosa: nam quæ cariem sensit, & dum frangitur puluerulenta est, inutilis existimatur. Gustu insipidam esse ait, & sine acrimonia, nec eius aquam hordeacea sapidiorem. Hanc credunt multi nihil aliud esse quam Smilacem asperâ Dioscoridis: quibus assentitur Marthiolus eiusque sententiæ auctorem citat Lucam Ghinum, qui se vidisse affirmavit apud Florentiæ Ducem Zarzæ parillæ integram plantam

Nomina

Forma.

ZARZA parilla,
Matthioli.

ZARZA parilla,
America.



plantam ex Hispania delatam, quæ omnibus suis partibus ac notis nihil ab aspera Smilace differebat, imò nihil aliud esse censuit, quàm genuinam Smilacem asperā. Id quod paulò post experientia deprehendit, quia asperæ Smilacis radicem decocto multos curauit lue venerea affectos. Idem quoque ab aliis factitatum fuisse, præsertim Romæ. Alij diuersas plantas esse contendunt, maximè Pena, de harum differentia differens his penè verbis. Smilacis radices geniculatæ sunt, articulis segmentis, candidæ, foris nitentæ, Graminis aut Arūdinis vallatorix modo. At in Zarza parilla ab vno radicis trunco magno, præduro, strumoso, rugosiq; capitibus hinc inde, subtus, vt in Asparago, vel Rusco oriuntur numerosa eiusdè coloris flagella, æquabilia, & sine geniculis, vel nodis recta, flexilia, cortice duriusculo, pullo, magis striato in longitudine, interdum vicinū pedum, farinacea intus medulla, non ita ingrata, sed viscida, nonnihil emplastica, amaricante, nec tamen calore prodente. Quare perspicuum est non magis esse radices Smilacis, Rubi, Clematidis alterius Viornæ dictæ, quā sint Cinnamomi, vti nec arbores quædam tum Indiæ Orientalis, tum Occidentalis sunt nostra Laurus, tamen si hæc eadem quæ illæ præstent. Neque si Colutea similima est Sennæ, ideò statim eadè astruenda. Idem de Zarza & Rubo dicendum. Nam stipites Zarzæ ex eodem radicis grandi & capitato nodo, lignoso, intus flauescente, Aristolochiæ rotundæ tuberosæ magnitudine & colore exeuntes, pollicem aut maximum Rubum crassitie superant: sed præduri lignosiq; crebros nodos admodum extantes circa articulas commissuras crebriorum vncialium, frequentiumq; interuallorum, atque aculeos aduncos deorsum versus nonnihil depressos & rigidos habent, & Rubo valde similes sunt aspectu potiùs quàm Smilaci. Verum gustu non sunt adstringente, sed fermè insipido, nec vt radicis emplastico, eoque minùs efficaci. Folia intellexit ille ab amicis qui viderunt non multum abesse à Smilaceis. Hæc sunt Zarzæ pa- Temper.
rillæ à nostratibus aliquatenus similibus discrimina. Nicolaus Monard. illam ca- & Vires.

In cap. III.
lib. II.

lidam & siccam esse in secundo gradu tradit. Primum circiter viginti ab hinc annis nobis innotuit. Hodie in multis morborum generibus frequens eius est usus, videlicet in defluxionibus, flatibus, frigidis utriusque morbis, & aliis plurimis, modo acuti non sint, aut iis febris accesserit. Certum est tamen iis qui calida præsertim hepatis intemperie laborant, non convenire: nimium etenim excalfacit: sed ventriculos frigidos fouet, & flatus mirifice discutit. Vis illi excalfaciens, & extenuans, inquit Matthiolus, & quæ valenter sudorem prouocet. Valet autem non solum ad lueem veneream curandam, sed ad quosvis articulorum dolores, ad omnia cutis vitia, vlcera contumacia, lichenas. Auxiliatur iis qui cedemate laborant. Peculiariter verò frigidis capitis & cerebri affectibus medetur. Hac Indos sic uti solitos refert Nicolaus Monard. Zarzæ parillæ selibram minutim concisam aqua mace- rant, dein in mortario tandiu tundunt, donec in muccaginem quandam resoluatur, quam deinde colant & exprimunt. Eius liquoris ita expressi satis capacem cyathum calidum manè hauriunt, deinde stragulis sese operiunt, & duarum horarum spacio sudant. Quod si interdum sitis urgeat, idem liquor illis est potus. Sub noctem alium eiusdem calentis cyathum hauriunt, & tantūdem temporis quantum manè sudant. Hic ordo triduo integro obseruatur, ut nihil aliud edant, aut bibant, præter eum humorem expressæ Zarzæ parillæ. Eadem ratione præparatam ait Nicolaus Monard. se plerumque initio propinasse, multoque melius sic morbos curasse quàm nunc, cum ob seculi nostri delicias eodem quo Guyacum modo propinetur. Videlicet duæ eius vnciæ lotæ, contrafactæ, & minutim concisæ in nouum fictile cum tribus aquæ sextariis iniiciuntur, 24. horas macerantur, obturato fictili coquantur lento igne è prunis accenso, quoad sextarij duo fuerint consumpti, refrigerantur, colantur, & fictili vitrato, aut vase vitreo reconduntur. Eadem deinde Zarzæ parilla fictili aqua pleno maceratur, aliquantulum feruet, frigida colatur, & fictili vitrato asseruatur. Purgatus æger ut decet, manè decem vncias prioris decocti hauriet, sudabit duas horas: deinde omnia ea perficiet, quæ in sumendo Guyaci aut Chinæ decocto facienda præcipere solent. Similiter etiam tenui victu utetur, habita semper virium ratione. Nam post sudores vnas passas, pruna cocta, amygdala, & panem biscoctum edet. Si vires imbecilles fuerint, conceditur usus carniū pulli asini, aut auicularum montanarum, & de secunda aqua bibet. Quindecim dies, aliquando viginti, nonnunquam triginta, interdum quadraginta huius medicamenti usum continuabit pro morbi magnitudine & virium robore. Matthiolus eius vncias quatuor in libris quindecim aquæ (in quibus 24. horas macerata prius fuerint) decoquit ad dimidias. Pena non minoris quantitatis instituenda esse decocta censet, quàm decem aquæ librarum ad vncias duas, vel tres, vel quatuor radicis: nam citius, ait, diffarit aqua (nisi in diplomate decoctum faciendum præceperint) quàm radicū vires bulliendo eductæ fuerint: radicis enim corculum lori instar durum tam citò vires non deponit. Nicolaus Monard. cum vncias duas in tribus aquæ sextariis, id est, in libris quinque decoquendas decernit, de recentiore, opinor, intelligit, & quæ, quòd succulenta satis & tenera adhuc sit, facilius aquæ vires suas impertiat, quàm quæ ad nos longiore itinere defertur, & ob id magis arida & exsucca cum sit, longiore tempore, atque ideo in copiosiore aqua decoquenda: paucior enim aqua longiore decoctione exhalaret.



PN TERTIO volumine navigationum, libro vndecimo generalis Historiæ Indiarum, legimus in insulæ Hispaniolæ locis multis copiosissimam nasci herbam, quam Perebecenuc vocant, mirabilis aduersus vlcera efficaciam. Multa folia fert, in extremo acuminata, lanceolæ ferro similima, vt natura nobis indicare voluisse videatur herbas curandis

Forma

PEREBECENVC.



vulneribus ferro factis perutiles. Folia ista satis tenuia sunt, viridia, & in summo cæssa, petioli quibus sustententur similiter cæssij coloris. Quædam folia sunt non acuminata, sed rotunda, sed & hæc & illa coloris sunt ex cinereo cæssij. Flores edit rubros & lōgos in vmbella Fœniculi modo, sed magis dispersos, tenues. Ad hominis proceritatem tota planta assurgit, admirandi effectus: facillè enim & citra dolorem vlcibus omnibus medetur, etiam si cacoëthe sint & admodum contumacia. Huius manipulum in aquæ sextario decoquunt, quoad tertia pars supersit. In eo decocto penè refrigerato lineum pannum intingunt, quo vlcus abluunt, exsiccat herbæ crudæ succum infundunt, aut linamenta succo intincta admouent. Id bis die repetentes facillè vlcera quantumvis ma-

ligna curant, non autem vulnera recentia manu illata.

MECHIOACAN.

CAP. CXXXI.




IN INDIIS maris Oceani prouincia est quadraginta miliaribus supra Mexicum, Mechioachâ dicta, cuius præcipua & fecundior pars vernacula Indorum lingua *Chincicila* nominatur, ab Hispanis totius regni nomine *Mechioacan*. Omnium harum Indiarum auri & præfertim argenti fertilissima regio est: præterea temperato & salubri fruitur aëre, multarum & salubrium plantarum feracissima, adeo vt has ob causas vicini Indi ægri eò se transportandos curent, morborum remedia quæsituri, & sanitatem recuperaturi. Ad hæc frumento, fructibus, siluestribus animalibus abundat: multi in ea aquæ dulcis fontes scaturiunt, quorum nonnulli optimorum piscium copiam alunt. Quare incolæ cæteris Indis vegetiores, alacriores, melius colorati degunt. Hanc subiugauit Ferdinandus Cortesius anno salutis humanæ 1524. quò statim appulerunt Franciscani, & monasterium condiderunt: cuius primas cum longo & periculoso morbo affligeretur, & Gazoucin Cacique, id est, dominus totius regionis medico suo Indo curandum tradidisset, quod iam summam cum Franciscano illo amicitiam contraxisset, cōsiderato morbo dixit medicus curatum iri ægrum, si radicis cuiusdam farinam vellet sumere, quam recuperanda sanitatis audivissimus Franciscanus perlubenter cum modico vino sumpsit, qua ita purgatus sine dolore & molestia vlla fuit, vt eadem die melius habuerit, atque tandem sanitati pristina restitutus fuerit. Huius exemplo cæteri Frāciscani, atque Hispani quidam cum in morbos incidissent, eodem remedio sæpius vsi sunt, tam felici successu, vt iis visum fuerit cæteris fratribus qui in Mexico erant tam excellens remedium communicare: vnde rursus ob mirabiles effectus, eius fama per nouam Hispaniam & omnes Indias ita peruagata est, vt spretis Rhabbarbo, atque aliis vsitatis remediis, hac sola radice in purgandis ægris vterentur. Hinc in Hispaniam, inde in

MECHIOACAN, *Pena.*

Nomina.

Forma.



MECHIOACAN,

Dodonæi.

Electio.

Temper.

Vires.

Galliam, Germaniam, Italiam delata est. Nomine totius ptouinciæ, in qua prouenit, Mechioacã nominatur, ab Indis vulgò Rhabbarum Indicum. Nicolaus Monard. plantam vidit Hispali apud Franciscanos ex ipsa prouincia Mechioacan delatam, multis ramis luxuriantem, supra terram expansis, colore cinereo, qui vicinas perticas, aut pergulas scandunt, & multiplici nexu amplectuntur, foliis rotundis in mucronem desinentibus, secundum pediculum amplis, fibrosis, adeò verò delicatis, ut humore carere videatur: fructu Coriãdri sicci magnitudine, racematim coherente, qui Septembri maturefcit: radice crassâ, Bryoniæ modo, ut non defuerint qui eandem plantam esse putarent, aut saltem ei congenerẽ. Sed multum differunt: nam Bryoniæ radix & viridis & sicca admodum acris est, Mechioacan verò insipida, & sine acrimonia vlla. Pena quoque eos qui sunt in ea opinione perinde falli censet, atque illos qui Laurum, Cinnamomum, & Smilacem asperam Zarzam parillam, aliasque multas exoticas eadem specie cum nostratibus faciunt. Eam radicem ab Hispanis acceptam sic ille pingendam curauit. Ea integra ad nos raro defertur, sed in laminas grãdes & taleolas confecta, ex quo magnam esse radicem, solidam, & sine matrice. Hanc, inquit Pena, non visam qui nosse cupit, intueatur Bryoniæ radicem: sunt enim cortice eiusdem coloris, rugis & ferè magnitudine iisdem. Sed huius taleolæ transversim sectæ siccandi causa, intus multis circulis à centro ad ambitum parallelis distinguntur, mādendo sapore farinaceo, nec acri: odore non ingrato est, ceterum albida & friabilis ut Bryonia. Optima recens, non cariōsa, intus candida: vetustior enim nigrescit, foraminulenta, cariōsa & leuior euadit. Milij semine obruta seruatur, aut lino picato siue resinato inuoluta. Calida videtur esse primo gradu, sicca secundo, constareque partibus subtilibus aëreis cum quadam adstrictione. Pituiram maximè & aquas euacuat: icterum, cephalæam, ltrumas & epilepsiam curat: veteres defluxiones sistit, articulorum, coli, & renum doloribus utilis est.

Conuenit etiam vteri doloribus, asthmati, tussi veteri, & lue venerea vexatis. In febribus diuturnis, compositis, phlegmaticis, quotidianis, erraticis, iis quæ ex viscerum obstructione pendent commodissimè datur, in ardentibus & acutis minimè. His assentitur Pena, qui huius radices puluisculo solo drachmæ pondere, ex vino albo aut iusculo propinato commodissimè qualibet die, hora & ætate,

nulla

nulla molestia, aut incommodo, quinquies, sexies, aut septies flauas hydropicorum aquas eductas, pituitasve quasuis se comperisse affirmat. Molestus non est huius radices usus, quia nullius ingrati saporis particeps est: ideo pueris, senibus, & iis qui cetera medicamenta auersantur utilis. Eius autem sumendæ ratio talis est. Præparatis humoribus qui euacuandi fuerint, purgato etiam corpore enematis & sanguinis missione ex medici consilio, huius radices leuiter contusæ puluis vino albo maceratus, aut aqua Anisi, Fœniculi, aut Cinnamonomi (si quis à vino abhorret) summo manè propinatur, dimidiæ drachmæ pondere pueris, vnius drachmæ iuuenibus & adolescentibus, duarum verò drachmarum viris & mulieribus. Nec inutiliter datur ex syrupo rosato cathartico. Post sumptum hoc medicamentum breuis somnus conceditur, iis præsertim qui vomitibus obnoxij sunt. Facta purgatione datur iusculum, ac paulò post cibis, qualis dari solet iis qui purgantur. Fiunt nonnunquam ex eodem puluere catapotia Coriandri sicci magnitudine cum syrupo aliquo, vel electario. Auctor est Nicolaus Monard. in potestate esse medici, aut eius qui Mechioacan sumpserit, eam quàm velit humoris quantitatem purgare: sumpto enim iusculo, vel quouis alio cibo, eius vim purgatricem illico sisti atque infringi, id quod negant alij, quoniam ei opinioni quotidiana experientia refragatur. Alia nunc ex continenti adfertur radix Mechioacan, quæ circa Nicaragua

Genera.

*FLOS Mechioacan,
Monardis.*



gna & Quito nascitur, vbi diligenter colitur, & magno in usu est ob admirandas eius vires, longè præstantior ea quæ ex noua Hispania deferri consuevit, cuius, flos semen, & ramuli etiam delati sunt. Erat verò is flos quasi Mali aureæ, quinque foliis constans maioribus, è cuius umbilico protuberat calix, siue vesicula quædam auellanae magnitudine, membrana tenui operta, albicante, quæ in duas cellulas tenuissimæ pellicula secretas diuiditur, & in singulis bina grana Ciceris magnitudine, colore per maturitatem nigro, gustu insipido contine-

bantur, quæ molli & spongiosa terra commodè nascuntur. Mittit etiam Promontorium D. Helenæ, quod in eodem quo Nicaragua tractu est, aliud Mechioacan genus siluestrius, quod graua symptomata excitat, vt vomitus immodicos, tormina, alui profluuium. Quam ob causam Scammonea nuncupatur, sed nemo periculo semel facto vitur. Simile est alteri cum folio tum sarmen- tis, tum radice, sed per omnia minoribus: ipsa etiam radix acrimoniae nonnihil habet. Memorat Petrus Cieca in prima parte Peruanæ Historiæ in prouincia Quimbaya, cuius metropolis Carthago magna, nasci tenuès quasdam radices digiti crassitudine inter arbores, quarum si fragmentum brachiali longitudine aquæ sextario per noctem maceretur in vase aliquo, maiorem aquæ partem ea nocte absumi. Ex ea quæ supererit aqua, qui tres uncias sumpserit, adeò benignè purgatur, ac si Rhabarbaro purgaretur, & aliquoties periculum se fecisse scribit, magno purgatorum commodo.

Radix
Quim-
baya.

T. I. Cofin.
lib. 3. ca. 2.

Forma.



EFERT Theuetus in vtraque ora
fluuij Senega multa esse Regna,
præsertim in ea quæ meridiæ spe-
ctat, Regnum Mely, in ea quæ Se-
ptentrionem, Regnum Tombotu. In his periti
sunt Medici multi, quos *Bisfrains* appellant: mor-
bus qui illic frequentius grassatur *Borogail* no-
minatur, aut *Zail* Ethiopum lingua, qui ex im-
modicâ venere, cui multum obnoxij sunt, ortum
habet. Genitales partes potissimum is occupat,
in homine Asab, in scemina Asâbatas nomina-
tas. Ad huius morbi curationem decoctis mul-
tis vtuntur, sed potissimum decocto herbæ, quæ
Achanaca dicitur. Huius folia bifurcata & acu-
minata sunt, Brassicæ amplioris folijs similima,
sed non ita crassa, & tenuiore costa. In horum
medio fructus nascitur, oui magnitudine, colore
luteo, quæ *Alfard* nuncupant, alij *Lefach* nomine
serpentis còcoloris. Fructus is magno apud eos
est in pretio. Tota planta tibie hominis crassi-
tudine. Ea in morbis curandis vtuntur, perinde ac nos Guayaco.


FABAE PURGATRICES. CAP. CXXXIII.

Forma.



NOMINE Dei & Carthagine continentis prouincijs Fabæ pur-
gatrices nascuntur, vt narrat Nicolaus Monard. quæ nostris similes
sunt, sed minores, eiusdem cum nostris formæ & coloris, pellicula
quadam tenui, qualis est Ceparum tunica exterior, illas per mediū
intersecante, quæ cum cortice abiicienda est, alioqui tanta vehemētia supernè &
infernè purgans, vt in vitæ discrimen sumentem coniciat. Assandæ verò sunt, vt
illarum acrimonia infringatur, deinde in puluerem comminuēdæ. Datur hic pul-
uis vino, aut saccharo exceptus ad cochleare vnum, deinde haustus vini sumitur.
Apud Indos hoc medicamentum celebre est, ob sumendi facilitatem: nam sine
molestia bilem, pituitam, & serosos humores multò leuius & facilius quàm supe-
riora medicamenta purgat. Dantur hæ Fabæ in febribus diuturnis, in coli dolo-

Vires.


FABAE Purgatrices,
Monard.Phaseolus
Ind. Clus.

ribus, & articularum morbis. Dosis assatarum
esto à quaternario numero ad senarium, plu-
riumve aut pauciorum pro egri viribus. Clusius
aliquot peregrinos fructus se accepisse scripsit
Fabæ purgatricis nomine, sed nullum habuit
qui Fabæ purgatrici à Nicol. Monard. descriptæ
conueniret. Quare potius inter Phaseolos re-
censendos putauit. Prioris iconem hanc exhi-
bit. Orbiculari fermè est forma, sed planus
vtrinque & quodammodò puluinatus, digiti
vnius crassitudine, duorum verò latitudine aut
ampliore, vno latiore aliquantulum cauo, quo
videlicet hilus esse solet, & siliquæ in qua con-
tinetur adharet: cortex durus & lignosus, lævis,
ex rubro

ex rubro nigricans : quod intus continetur album, firmum, & in duas partes natura sectile, vt sunt omnia Phaseolacea, sapore primū quali sunt omnia ferē legumina, sed illico linguam mordicante & acri : quo fit vt purgandi facultate præditus esse possit. Nascitur in insula D. Thomæ dicta, & cordis effigiem quale vulgò *Locus.*

*PHASEOLVS alter**Indicus, Clusij.**PHASEOLVS Brasili-
nus, Clusij.*

pingi solet imitatur: idcirco à quibusdā Cor D. Thomæ nuncupatur. Eius obiter meminit Petrus Cieca prima parte Chronici. Alter Phaseolus vulgari haud dissimilis est, sed minor, densior, nigricans, hilo prominente, & renis formam minimè referente. Idē Clusius cum Vlyssipone esset, habuisse se scribit aliud Phaseoli genus ex Brasilia Americæ prouinciæ delatū, admodum recens, pollicari latitudine, crassum, colore rufescente, magno hilo, & parte extrema veluti sessili. Eiusmodi quatuor aut quinque siliquis prægrandibus continentur, qui recentes & virentes adhuc tusi & impositi bubones venereos curare dicuntur. Flore traditur ex rubro pallescente. Clusius iuniore duntaxat plantam vidit è semine natam, quæ foliis Phaseolo vulgari ferē similis erat, nisi quòd minora erāt, & auersa parte hirsuta, præsertim teneriora folia, & extremi caules tenui mollique lanugine fuluescente obfiti. Brasiliani *Maconna* vocant. Similes planè, & colore, qui ex cinereo candicans est, duntaxat differentes ex Africa Mauritania delatos se vidisse Clusius ait. Lobellius se

*SILIQUA Phaseoli Bra-
siliensis, Lobel.*

vidisse & habuisse scribit purgatrices Fabas, & Phaseolos, quales expressit Clusius. Siliquam etiam pictam dedit, quæ dodrantalis est, admodum elegans, duas uncias lata, quaternis & quinis loculis ventricosa, carnosa, corticosa & coriacea, siliquæ Carobiæ vulgò dictæ concolor, innumeris rugis exarata, qualis icone delineatur.

*PHASEOLI parvi ex
America.*



Idem Clusius vidit non procul Olyssipone in monasterio quodam Phaseoli genus vulgari nostrati adeò simile, ut nostrum putares. Pergulas istic vestiebat opere topiario, flore purpureo: at siliquæ scabræ sunt, breviores, & duplò latiores quam nostri vulgaris: fructus exiguus, pisi vulgaris magnitudine, intus niger, nisi qua parte siliquæ adhæret, quæ candida est. Brasiliensis frequentem esse aiunt, & Lusitanis istic habitantibus Faba braua, id est, Fabam siluestrem nuncupari. His appinxit Lobellius Phaseolos paruos ex America delatos.

HERBA IOANNIS INFANTIS, GVACATANE,

Hordeolum. CAP. CXXXIIII.



Forma.

Vires.

VI in Hispania Noua primi militarunt, eamque subiugarunt, herba quadam vsi sunt in curandis vulneribus, ut refert Nicolaus Monard. quam primus ostendit Indus quidam Hispani famulus nomine Ioannis infantis, à quo illa nomen accepit. Exigua est planta, foliis exalidis, aliquantulum villosis. Viridis præmansa aut trita, vulneribusque imposita sanguinem sistit atque conglutinat. Neruorum aliorumque partium vulnera digerit & mundat, tandem ad cicatricem perducit. Iisdem viribus pollet sicca in puluerem redacta. Idem Nicola. Monard. refert ad se missam fuisse ex Hispania

Forma.

GVACATANE,

Monardis.

Vires.



Noua plantulam quandam sine radice (Indi Guacatane nuncupant) nostro Polio montano haud absimilem, sed inodoram. An florem, an fructum proferat, ignorat. Ad hæmorrhoides commendatur hac ratione. Eius plantæ decocto ex vino (si calor absit) alioqui ex aqua hæmorrhoides abluuntur, deinde blandè siccantur, postmodum eiusdem plantæ puluere insperguntur. Dolores ex frigore & flatibus

ortos in quacunque corporis parte sedat, si locus resina prius inunctus, tenuissimo eius puluere inspergatur, & pannus lineus superimponatur: nam illico adhærebit cerati modo, nec inde amouebitur nisi dolore sedato. Eius puluis leuibus vulneribus impositus præfertim inguinum, ea mundat, & ad cicatricem perducit. Præterea narrat Nicola. Monard. ad se perlata esse cum aliquot aliis plantis ex Hispania Noua, semina cuiusdam plantæ, quæ *Cenadilla* istic vocatur, id est, Hordeolum, à similitudine quam cum Hordeo nostrate habet, in spica & vaginulis quibus semen includitur, sed minus, & Lini semine neutiquam maius, verum longè aliis facultatibus præditum. Etenim nunquam auditum est aliquam aliam plantam adeò vrente & caustica vi præditam, ita ut vbi cauterium necessarium est in gangrænis, & impuris putridisque vlceribus, eisdem præbeat effectus, quos non modò sublimatum, sed etiam ignis præstare posset. Etenim vermes in vlceribus necat, putridaque vlcera expurgat puluis eius sensim inspersus, maiore minorève quantitate

HORDEOLVM, Monard.



in signibus facultatibus donata, quæ cum tempore *αὐτῆς* innotescunt, diligentia & industria illorum, qui non sibi se, sed in commune natos meminerunt.

HETICH AMERICVM.

CAP. CXXXV.



EXTERNAS etiam quasdam hortenses plantas adscribamus atque in primis Hetich, quæ radix est Rapis magnis, quales apud. Lemo uices nascuntur, similes, cuius duæ reperiuntur species eiusdem crassitudinis. Vna quæ coctura flavescit, altera quæ albescit. Vtraque folium habet Maluæ, semen nullum. Quare barbari Americi ipsam radicem in taleolas concisam pangunt, quæ sic copiosissima prouenit. Hanc magno cuidam propheta (Chariabe prophetam vocant) acceptam referunt, qui puellæ cuidam obuius dono dedit, eamque serendi, vrendique modum docuit, itaque successit, ut ad posterum continuato eius usu, nullo ferè alio nunc vescantur cibo, sitq; iis adeò vñtatus, ac nobis panis, cum antea, ut narrant, herbas, radicesque siluestres beluarum more depascerentur. Hetich Oetum esse Plinij putat Dalechampsius, pro quo apud Theophrastum mendosè legimus Vingum. Sic Plinius. Mandunt & Oe-

Nomina

Genera.

Forma.

Lib. 21. c. 15.
Lib. 1. hult.
cap. 11.

tum, cui pauca folia minimaque, verum radix magna. Theoph. verò. *ἡμοίως δὲ καὶ ὅτι ἐν ἀγρῶνισι καὶ γὰρ φάλαγξ μεγάλη, καὶ ὁ βαλάντιος αὐτοῦ βραχὺς, ἢ ὁ ῥίζα μακρὰ, καὶ ἔστιν ὡς περὶ καρπὸς, διαφέρει τε, ὅτι οὐδὲν αὐτῶν ὁ ποταμὸς*

ποταμὸς ἀποβῆ, τέφοντες βωμὸς. Id est, Similiter & quod in Ægypto Oetum appellat. Folia eius magna, germen breue, (non, vt Gaza, pusillum) radix longa, sapore præstanti, cibo idonea, quæ pro fructu colligitur, cum amnis in alueum redierit, eo que deorum aras coronant. Quæ Theophrastus folia ampla, Plinius pauca & minima dixit.

MANIHOT.

CAP. CXXXVI.

Forma.



Vfus.

LI. A radix hæc est, brachij crassitudine, pedis vnus & dimidij, aut pedum duorum longitudine, sæpius tortuosa, & obliqua. Hanc emittit frutex parvus, quatuor pedes circiterve altus. folia habet ei plātæ quæ vulgò ab herbariis Pata leonis dicitur similia, in ramusculorum vertice sena septenave, quorum singula dimidium pedem longa sunt, tres digitos lata. Barbari ex radice, quam Manihot appellant, hoc modo farinam conficiunt. Radices siccas siue recentes tundunt, siue radunt lato arboris cortice plurimis durissimisq; lapillis conferto. Dein incerniculo cribratas in vase cum aqua igni imposita commouent, ita vt hæc farina in grumulos coëat, mannæ granatæ similis, quæ recens optima est, & plurimum succi corpori suppeditat. Huius parandæ negotium totum mulieribus committitur, perinde ac viris indignum. Scire autem licet à regione quæ Peru dicitur, Canada, & Florida insulis, tota continente inter Oceanum & Magellanicum, scilicet in America, & eorum regione qui Canibales appellantur, vsque ad fretum Magellanicum, id est, quater mille miliariorum spatio, nullum cibum vsitatiorem frequentiorémque esse, eaque farina cum carne & piscibus omnes vesci, non aliter quàm nos pane, admirando quodam modo, nunquam admouentes manum ori, sed procul longioréque quàm pedis vnus spatio, magnaque dexteritate in os conientes, ac Christianos irridentes, si aliter comedant. Quidam Arachidnam Theophrasti, Manihot esse putant, Ignæ verò, de quo proximo capite agitur, eiusdè τὸ ἀραχιδνὸς siue ἀράκη ὁμοιον,

Lib. i. hist.
cap. ii.

MANIHOT.

TVCA.



non

non, vt apud Plinium legitur, Aracidnam, & Aracum. De quibus hæc Theophrastus. *οιον αἰτε τῆς ἀραχίδνης καὶ τῶ ὀμβύτι τῶ ἀράκου. φέρουσι γὰρ ἀμφοτέρω κερπὸν ἐκ ἐλευθέρου τῆς ἀνω, καὶ μίαν μὲν ρίζαν τὸ Ἰερικώδες τὸ τοῦ παχέϊαν ἔχει, τὴν καὶ βάθους. ἡ δὲ ἄλλα, ἐφ' ᾧ ὁ κερπὸς, λεπιοτέρας, καὶ ἐπ' αἰρώ, καὶ χιζομένης πολλῆς. φιλεῖ δὲ μάλιν χροῖα καὶ ὑφαίμα. φύλλον δὲ ὑδρότερον ἔχει τούτων, ὅδ' ὅμοια τοῖς φύλλοις, ἀλλ' ὥσπερ ἀμφίχερτα μᾶλλον ἐστὶ, καὶ φαίνεται θαυμασίον.* Id est, veluti Arachidnæ radix, cuiusque quod Araco simile est. Vtrumque enim fructum fert non minorem eo qui in supernis plantæ partibus nascitur. Et radicem quidem vnam carnosam & crassam, quæ in altum demittitur, ceteras, in quibus fructus, tenuiores, & summo cespite & quaquauersum diffusas. Locis gaudet arenosis. Neutrum folium habet, neque foliis quicquam simile, sed potius quasi vtrinque fructum edant, quod mirum videtur. Plinius. Aracidna quidem & Aracos cum habeant radices ramosas ac multiplices, nec folium, nec herbam vllam, aut quicquam aliud supra terram habent. Satis igitur conuenit historia radice, nisi Theophrastus scriberet neutrum folium habere, neque foliis quicquam simile. Nam vtrumque radicem vnam habet crassam & carnosam, quæ in profundum recta descendit, alias præterea tenuiores, in summa terra, multifariam diuisas, quibus fructus, id est, noua soboles, inhaeret ac innascitur, vt in herba quam Dodon. Chamæbalanum vocat. Auctores huius sententiæ aiunt peregrinæ vtriusque plantæ historiam Theophrasto sua commentanti parum integre fide recitatam fuisse.

Lib. 5. c. 33.

IGNAME, BATAT, AGIS. CAP. CXXXVII.



IN Brasilia, & Hispaniola insula vocata, Batat dicitur quod in terra Themistitam Agis, in Sancti Thomæ insula, Igname. Radix est Napi figura aut Rapi, nigro cortice, infernè sparsa quasi in brachia. Ei castaneæ sapor, sed suauior ac tenerior. Sub cineribus assa atque elixa vescuntur. Medullæ color haud vnus omnibus. Itaque in species varias digesserunt. Prima est quæ ab Hispanis Igname cicorero dicitur. Solâ hæc annum durat incorrupta: quocirca in naues imponunt pro comæatu. Tres præterea species, temporis omnes impatientes. Excellentissimo sapore illa quæ nascitur in agro Benim. Quæ à Manicongo minus nobilis. Vltimo in pretio lutea est, colore quasi Carotæ dictæ. Eius satio mira, quippe non radice feritur, sed talea sicut Olea. Sarmenti fructum fissum in partes aliquot, modò quidpiam corticis seruatum sit, deponūt, ridicam propter pangunt. Eius namque stipes aduoluitur Lupuli more. Folium vt Citrio, æquè nitidum, sed minus ac tenuius. Quinto mense messis tempestiua. indicium vbi folia siccantur. Radix vt Arundinis, aut Dracontij, quaternas quinâve soboles edit. Siccata seruant. Hæc Scaliger. Eadem planè reperies apud auctorem navigationis ad Insulam S. Thomæ. Primus opifex qui ad panis vicem accedere iussit hanc radicem, cuiusque vsum supplere famelicæ regioni, cavit & id, vt non in futuram messem radix auulsa fereretur, sed in annonam potius seruata, cederet pactorum sarmentorum fructificationi: vnde soboles succresceret in futurum prouentum.

Forma.

Genera.

Exerc. 182.

17.

Scalig. ibi.

BATATAS Cusj.

CAP. CXXXVIII.



SCRIBIT Pena ad Sisaram non parum accedere radices illas quæ in insulis Nouo orbe non procul disitis suapte sponte oriuntur. Batades. vernaculè tum indigenæ tum Hispani illic vocat, Angli Porades, quibus illi tum vt cibo, tum vt veneris irritamento frequenter vtuntur. Singuli bulbi teretes, oblongi Napum vtrinque obtusam æquant, color pulchellus illis foris, albidus intus, sapor gratus valde & tener quasi Milij delicatioris, aut Fabæ fresæ, còque gustu insulsæ sint nisi condiantur: cum sale, aceto, & oleo

Batades.

Forma.

Ignames. oleo interdum eduntur, & vino perfunduntur, nonnunquam coctæ prunis. Hæc congeneres sunt & perfimiles quæ ab Hesperia, Æthiopia, & Guinea afferuntur, Ignames vocatæ: folia vtriusque hederacea & maluacea esse dicuntur. De his plura in horto diximus. Integram tamen plantæ iconem & historiam ex Clusio adscribere opera pretium fuerit. Veteribus plâta hæc ignota fuit, ideo nullum nomē Græcum aut Latinum proditum. Hispani & indigenæ, ut diximus, vocant Battades, atque etiam Camotes, & Amotes, quidam etiam Aies, tametsi nonnihil, ut aiunt, inter se differant, sitq;

Cap. 60.

BATATAS, Clusij.



Battatas radix longè & suauior & tenerior. Tria plantæ huius genera in Betica se obseruasse ait Clusius, colore externo inter se differentia, atque etiam gustus suauitate. Nam aut cortex externus rubescit siue purpurascit (& hoc genus præstantissimum censetur) aut pallet, aut candidus est: omnes verò radices intus albæ. Producit autem Cucumeris satui modo sarmenta, per humum sparsa, satis crassa, & succulenta, & læuia, in quibus folia utcumq; carnosa, ex viridi cædantia, Ari foliis, seu potius Spinachij haud dissimilia: radix dodrantalis est, Raphani prægrandis nonnunquam amplitudine, vtrinque obtusa. Sponte nascitur in Nouo orbe vicinisque insulis, vnde primum in Hispaniam delata est: nunc verò multis Bæticæ maritimis locis seritur in taleolas dissecta: principatum autem obtinet Malacæ nata Editur ab ipsis incolis aut cruda, aut cocta: nunc Hispanis etiam in deliciis, ob saporis iucunditatem & teneritatē, præsertim si in cineribus cocta, & exteriore pelle repurgata, & in taleolas secta ex pauculo vino, stillatitiiq; rosarum liquoris & sacchari momento edatur.

*F A A L I M,
Theueti.*



*Cosmo. T.
lib. 4. c. 7.*

F A A L I M Theueti. CAP. CXXXIX.

ELENTIO, ut narrat Theuetus, foliis præsertim similis est herba quæ Faa lim vernacula lingua nuncupatur in Mombaze insula, olerum optimorum & simplicium medicamentorum omnis generis feracissima, atque eorum potissimum quæ venenis serpentium omnium, quibus regio hæc abundat, aduersantur. Huius herbæ experimentum se vidisse ait in duobus cômorsis à serpente partim in aquis, partim in terra degente, quam illic *Alefah* vocat: cuius morsus adeo lethalis est, ut nisi statim succus huius herbæ admoueat, necesse sit hominem interire.

LIGNO

LIGNVM COLVBRINVM. CAP. CXL.

BINAE stirpes tradente Acoſta in Malabar inueniuntur plurimùm diſſimiles cùm forma, tum naſcendi modo, vno tamen eodemq; nomine nuncupatę Lignum Colubrinum, quòd ſingulę mirum, in modo dum vtiles ſint aduerſus colubrorum morſus. Prior naſcitur Hederae modo, colore Dracunculi maioris, ſiue Serpentariae; folia illi ſunt Bryoniae ferè ſimilia, integra tamen initio, neruoq; prædita per longitudinem excurrente, & quinque aut ſex venis in latera vergentibus: ſucceſſu temporis accedunt exigua foramina, quę paulatim cum foliis incrementum ſumunt donec tandem omnino folia ſcindant, eaq; vitis foliis ſimilia reddant: conſpiciuntur enim interdum in eadem ſtirpe folia integra, alia exiguis, nonnulla maioribus foraminibus prædita, omniaq; adeò inter ſe diſſimilia, vt minimè eiufdem plantę folia eſſe videantur. Tantam verò habet hoc lignum cum colubro ſimilitudinem, vt qui non norit, aut de die viderit, ſi ad Lunę ſplendorem noctu conſpiciat, viuum colubrum eſſe exiſtimet. Vulgò cenſetur præſtantiffimum remedium aduerſus colubrorum & viperarum morſus: incolę ſanè, dum in agros tendunt, magna ex parte circumferre ſolèt hoc lignum (ſunt enim in ea prouincia multę viperę, varięque ſerpentũ genera) aiuntque ſolo eius odore ſerpentes fugari: & ſi dum colubros venantur, eos attingere hoc ligno queant, ilicò rumpi & extingui. Altera admodum breuis eſt & tenuis,

LIGNVM Colubrinum

I. Acoſta.



LIGNVM Colubrinum

II. Acoſta.



triaq; ſolummodò folia habet mollia, læuia, ſaturatiùs virentia: ſtorem aut fructum non conſpexi, nec quenquam inueni. qui ſe vidiffè aſſereret: radix oblonga & tenuis eſt, minimo digito minor, hinc inde nonnunquam extuberans, & ſumma tel lure ſerpens: exterior eius cortex valde tenuis eſt & cinereus, nullo, dum guſtatur, manifeſto ſapore præditus, deinde tamen guſtum in ore relinquens ſuauem, & vti Moſchus odoratum. Fiſſus eſt vndiq; hic cortex, & ſponte ſeſe expedit ab alio craſſiore flauoq; cortice ſubtus naſcente, qui odorem Loti ſilueſtris ſiue Triſolij odo-

Zzz

LIGNVM Colubrinum,
Acosta.*Vires.*

rati vulgaris refert, & saporem Glycyrrhiza dulcior: præmansus autem odore admodum suauis, nec iniucunda mordicatione, momentanea tamen præditus esseprehenditur. Ipsa materies lignosa est, candida, dura & insipida: folia Napi saporem referunt: germen producit hæc radix supra terram circiter quatuor uncias longum, in caput extuberans. Nomen huius plantæ apud Canarinos est *Duda Sali*. Trita radix cum aqua rosacea aut vulgari, vel cum vino (indifferenter enim vtuntur) præfens certumque asserunt remedium aduersus omnis generis serpentum morsus. Plurimus etiam eius est vsus in febribus continuis, tertianisque, syncope, ventriculi debilitate, & cordis tremore: daturque aduersus omnis generis venena. Multi mihi sanctè affirmarunt dummodò manu hanc radicem tenerent, nullos serpentes, vel alia similia virulenta insecta formidare, & certissimum esse serpentes & vipersas eius aspectum minimè ferre posse, sed fugere, celerrimèque in aliam partem sese proripere, si quis ante serpentes eam proiceret. Perutilis etiam censetur iis quibus anhelitus ab ore vitato aut dentibus corruptis foetet, modò eam continuò mandant, dentiumque cauis gestent. Prouenit locis humidis, & inter arbores, præsertim verò secundum eas quæ

Angelins nuncupatur, nec procul à mari. Inuenitur & tertium Colubini ligni genus in eadem prouincia, vastæ arboris magnitudine, de quo in alio libro agemus. Neutrum verò, inquit Clusius ad superiora Acastæ, horum ligni Colubri generum cum Garcie ligno colubrino còuenire facillè animaduertet, qui vtriusque descriptiones diligenter conferet. Secundi verò generis Garcie scripti fragmentum quinque unciarum longitudinis, quòdque, vt conicere licebat, duarum unciarum crassitudinem æquarat, mihi non modò ostendit Londini anno 1581. C. V. D. Hector Nunez Medicus Lusitanus, sed etiam dimidia eius parte liberaliter donauit. Eius porrò materies firma est, candida, venis quibusdam distincta, non dissimilis Fraxini ligno, cortex autem qui eam integit candicans, & quasi cineus. Vtraque verò, si quis degustet, amaro sapore prædita esseprehenditur. Eius fragmenti iconem lectoris oculis subieciimus.

DATVRA.

CAP. CXLI.

Genera.

I sunt huius plantæ genera, quorum quo frequentius vtuntur, primo loco describemus: eius enim adeò vulgaris est vsus, vt pauca sint meretrices, quæ inter sua *κερμυλια* illud non recondant, ob eas quas postea subnectemus causas. Primum Altheæ magnitudine caulem habet, nec admodum illi dissimilem, in plures tamè ramos diuisum: folia cum magnitudine tum forma Stramonie foliis similima, verum magis in circuitu serrata, vti ferè Xanthij folia: flores albos, Smilacis læuis (quam Hispani *Correguela mayor*, hoc est, Conuoluulum maiorem appellant) floribus omnino respondentes: fructum Stramonie, rotundum, nucem Iuglandem magnitudine æquantem, viridi colore præditum, & spinis mollibus, minimeque pungentibus vndique septum, plenum semine Lenticulæ simili, eiusdemque coloris, cordis humani effigie, gustus amari: radicem albam, Raphani odore, quæque si diu naribus admoueat, sternutamenta ciat, cuius cortex non nihil amaricat, minùs tamen eo qui caulem & ramos ambit.

DATVRA, Acoſta.



ambit. Nascitur vmbrosis locis, & secundum *Locus.*
 aquas. Nomen huic plantæ in Malabar est *Vn-*
mata caya, in Canara *Datiro*, apud Arabes *Mara-* *Nomina*
na, apud Persas & Turcos *Datula*, apud Lusita-
 nos *Datura* & *la Burladora*, hoc est, faceta. Litera-
 ti pleriq; atq; etiam maxima pars Medicorum
 istic degētium, legitimam Nucem Methel Ara-
 bum esse censent, frigidamq; excessu tertio, & sic
 cam secundi sine constituunt. Mala inualuit cō-
 suetudo apud impudicas mulieres, vt huius se-
 minis in puluerem triti dimidiam drachmā ex
 vino, aut alia quæ magis arridet materia præ-
 beāt: miser qui eum hausit diu velut mente alie
 natus remanet, aut ridens, aut eiulans, aut dor-
 miens, plerumq; etiam alteri colloquens & re-
 spondens, vt interdum etiam sana mente prædi-
 tum esse credas, tametsi mentis non sit compos,
 neque eum agnoscat cum quo sermones cōfert,
 & colloquij habiti planè sit immemor, postquā
 ad se rediit. Sunt verò nōnulla adeo exercitata
 in hoc medicamento exhibēdo, idq; sic tempe-
 rare norunt, vt ad certas, easq; quot velint ho-

*Temper.**& Vires.*

ras, quibus id propinant, mentem adimant. Multa sanè eius rei exempla, quæ vel
 ego ipse vidi, vel ab aliis audiui, huc adducere possem, sed cum ad rem nihil faciāt
 prætermittenda esse duxi: illud solū addam, neminem qui simile sumpsisset, ne-
 catum vnquam comperisse, tametsi nonnullos conspexerim per aliquot dies per-
 turbatos ferri, quod fortè acciderat ob immodicam quantitatem exhibitam: quæ
 si fuerit nimia, interimit, quoniam hoc semen pernicioſa qualitate non caret, li-
 cet Gentiles ad prouocandas vrinas cum Piper & foliis Betele id exhibere soleāt,
 & perutile esse dicant. Ego verò nunquam obseruaui, nec experiri volui, cum alia
 medicamenta ad eam rem vtilia non desint. Porro si ad eorum qui hoc semē hau-
 serunt curam euocentur Hispani Medici, medicamēta vomitum cientia exhibēt,
 vt quidquid in ventriculo hæsit reiciant, acres deinde clysteres iniiciunt ad eua-
 cuandum, fortēq; ligaturas adhibent ad diuertēdum, tum etiam cucurbitulas ad-
 ponunt & venam secant. Gentiles verò Medici & Christiani indigenæ cum à cu-
 curbitulis & venæ sectione abhorreant, nihil aliud quàm vomitum prouocant,
 fortēq; ligaturas & fricationes adhibent, quæ si non sufficiant, balnea ex aqua ca-
 lida præscribunt ad eliciendum sudorem: porro à vomitu vinum propinant, cui
 Piper & Cinamomum admiscunt. In cibis verò audaciores sunt Hispanis: namque
 euacuata materia gallinas edendas præbent, & vinum dulce, aut passum exhibent.
 Radicis Daturæ drachma ex vino pota somnum profundum inducit, in quo varia
 insomniā, & miræ rerum facies obuersantur. Semine verò per noctem in aceto
 macerato, deinde exactè trito, vtiliter illinuntur herpes miliares & erysipelata
 serpentina: nam breui sanantur. Quantum ex superiore Daturæ primæ descriptio-
 ne colligere licet, eandem esse cum Turcorum, qui Constantinopoli viuunt, *Tau-* *Tatula.*
la, cuius vsus illis perquam familiaris est, existimat Clusius. Reliqua duo genera
 facie & fructu superiori ferè respondent, sed flores colore variant: etenim secundi
 flores, licet forma priori sint similes, colore tamen flauo sunt, & secundum pedi-
 culum nonnihil rubent: tertij flores Hyoscyami floribus magis accedunt. Cate-
 rùm neutro ex postremis duobus vtuntur, nisi ad necem inferendā. Nihilominus

tamen Brachmenes Medici ex secundi semine (quod floribus est flauis) catapotia faciunt, granorum Piperis magnitudine, magnæ sanè efficacix ad sistenda alui profluvia, quibus adiuncta sit febris ardens, atque etiam in dysenteris. Fiunt verò hunc in modum catapotia. ℞. seminis secundi generis drachmam vnam, Piperis nigri & longi, Sandali albi, Atincar, radicem *Bisa* (adfertur ea ex Bengala & Patanne montibus) foliorum Banguæ, singulorum dimidiam drachmam: omnia ista diligenter cum aqua terunt in marmore, quo pictores suos colores terere solent, deinde catapotia efformant, è quibus exhibent quantum commodum videtur. Mea est cum aliis plerisque opinio, ut nucem Methellam Stramonix fructum esse credam, qui per omnia similis est fructui Daturæ: atque si nonnihil ab eo differt, id locorum varietati adscribendum censeo.

BANGVÆ.

CAP. CXLII.



ANGVÆ simile ferè est Cannabi, cuius Dioscorid. lib. 3. meminit. Caullem habet quinque palmorum longitudine, quadrangulum, colore dilutiùs virente, fractu contumacem, nec adeò concavum, ut cannabis caulis, cuius cortex non minùs quàm illius in fila diduci potest: folia cannabina supernè virentia, infernè incana lanugine pubescètia, gustu terre-

BANGVÆ.



stri & insipido: semen cannabino minus, neque adeò candidum. Indi semine & foliis vescuntur, cum ut validiores in re venerea fiant, tum ad excitandam cibi appetentiam. Fit ex hoc Banguæ compositio vulgaris admodum vsus in iis regionibus, ad varios effectus: etenim magnates & militiæ præfecti, ut laborum oblitii securiùs & liberiùs dormiant, seminis & foliorum in puluerem redactorum quantum videtur sumunt, illique addunt Aream siue auellanam Indicam viridem, opij nonnihil pro arbitrio: omnia saccharo excepta deuorant: si verò in somno varias rerum species sibi obuersari cupiunt, addunt præterea selectissimam camphoram, caryophyllos, nucem moschatam & macis: si verò hilares esse volunt & faceti, & præsertim in venerem procliuiores, ambato & moscho additis saccharo excipiunt, & electarium faciunt. Multi mihi affirmarunt huius semen & folia ad libidinem ciendam miræ esse efficacix: vnde colligere licet, nihil affinitatis habere cum Cannabi, licet illi admodum similis sit, quandoquidem

auctore Dioscoride loco suprà dicto Cannabis calida & sicca est, & genituram extinguit. Dicitur Arabibus *Axis*, Persis, Decan & plurimarum aliarum regionum incolis *Banguæ*, Turcis *Asarath*. Sed & hoc Banguæ, ut scribit Clusius, plurimam affinitatem habere videtur cum Turcorum Constantinopoli degentium *Asiaticæ*, quo ad varios effectus vtuntur: nonnulli etiam vescuntur excitandæ venis gratia.

HERBA VIVA. CAP. CXLIII.



ONNVLIS Asiæ locis planta quædam inuenitur, vulgò *Herba vi-*
ua nuncupata, à circumforaneis illis *Iogues* appellatis *Herba amoris*, ab
 Arabibus & Turcis *Suluc*, & à Persis *Suluque*. Exiguam habet radi-
 cem, è qua supra terram exiliunt octo ramuli duos digitos longi, fo-
 liis vtrinque in ordinem digestis & inter se respondentibus onustis, quæ plurimum

Nomina

Forma.

HERBA VIVA,
Acosta.

Locus.

ad Erui tenella folia accedunt, nec dissimilia
 sunt foliis prioris Polypodij, cuius iconem La-
 cuna exhibet lib. 4. cap. 187. sed longè tenuiora,
 & vtrinque læuia, & grato virore oculos pa-
 scentia, vti Tamarindorum folia: è medio radi-
 cis capite exiliunt pedunculi (nam caule caret)
 quatuor, singuli suum florè sustinentes flauum,
 aspectu pulcherrimum, minoribus Caryophyl-
 leis similem, sed sine odore. Nascitur calidis &
 humidis locis. Ad eò mira est huius plantulæ na-
 tura, vt eam humana ratio assequi nequeat.
 Nam cum maximè viret, gratissimæque est aspe-
 ctu, si quis illà apprehendere cupiat, illicò folia
 contrahit, atque sub tenues ramulos recondit:
 si verò apprehendat, subito ad eò marcida con-
 spicitur, vt exsiccare putet: sed quod maiore ad-
 miratione dignum est, si manum retrahat, illicò
 nitorem recuperat, & toties marcescit aut reui-
 rescit quoties comprehenditur, aut manus ab
 ea retrahitur. Mihi autem relatum est Philo-
 sophum quendam in Malabar, dum nimis cu-
 riosè huius plantæ naturam obseruare cupit,
 amentem esse redditum. Plantam ego conspe-

xi, eamque cum suo cespite, ipsam minimè contingens, erui, & in hortum quen-
 dam transtuli, vbi permansit, at fatuum minimè vidi. Interrogat à me nonnulli
 indigenæ Medici, an aliquas huius plantæ facultates perspectas haberent, illam-
 que in vsum medicum adhiberent, affirmarunt vtilem esse ad virgines corruptas
 in integrum (si credere fas est) restituendas & ad reconciliandum amorem miræ
 esse efficaciam. Gentilis Medicus, & pro ea regione satis doctus, cum ad eò cupidum
 cognoscendi huius herbæ facultates conspiceret, ait, vnam se edocuerum ad eò
 compertam & certam, vt ceruicem pro pignore deponeret, nisi eam sic se habere
 comperirem. Nempe vt illi cuiuspiam mulieris, qualiscunque etiam status, nomē
 modo indicarem, se effecturum vt illa in omnibus mihi obsequeretur, dummodò
 ex ipsius præscripto herba vterer. Sed conditionem respui quādoquidem res ad eò
 illicita esset. Nihil igitur aliud post diligentem inquisitionem de hac planta intel-
 ligere potui, quàm apud Gentiles, præsertim verò Brachmenes Canarinos & Io-
 gues in magna æstimatione esse. Quodam die mihi accidit plantas conquirenti
 non procul à flumine Mangate, vt Gentilem quendam humi sedentem, & verba
 quædam obmurmurantem, tanquam oraret, fortè conspicerem, quem cum com-
 pellassem, nihil respondit, sed meo interpreti, quem comitem duxeram, manu
 duntaxat innuit: is hominem intelligens, celeriter sese inde proripuit, meque se-
 cedere iussit, inquit Gentilem illum incantatorem esse cuiusdam illius regionis
 Capitanei quem *Caymal* appellant, & istic sortes iacere supra Herbam viuam, id

fieri solere repurgato prius circa ipsam plantā solo ad hominis longitudinē, recitariq; quædā concepta verba, & expectari primā auct aut rem animatam quæ istā plantā prætergrederetur dum verba obmurmuraret, cuius sanguine (si cōprehendi posset) perluenda esset, sin minùs alterius eiusdem speciei, idq; cum multis ceremoniis, quas prætermitto, cum indignæ sint vt scriptis mandentur. Conspecti deinde istam plantam siccam inter supellectilem mulieris prostitutæ pudicitia.

HERBA MIMOSA. CAP. CXLIII.

Locus.

Forma.

Nomen.



LIA planta inuenitur in quibusdam hortis, quinque palmorum longitudinis, & vicinis arbutis aut parietibus incumbens, tenui caule, eleganti virore prædita nec admodum rotundo, per interualla exiguis & pungentibus spinis obsito, foliis superioribus haud absimilibus, Filicis sceminae foliis minoribus. Gaudet humidis & petrosis: & *Herba mimosa* nuncupatur, quoniam manu admota senescit & marcescit, manu verò remota pristinum virore recipit, sed non adeò celeriter vt prior. Naturam habet plurimum ab Arbore tristi differentem: nam singulis noctibus Sole occidente senescit & siccatur quodammodò, sic vt contabuisse videatur: oriente verò Sole vigorem denuò recipit, quantòque Sol magis feruet, eò magis viret, totòque die folia ad Solem conuertit. Odore & sapore est Glycyrrhizæ: vulgoq; ab indigenis folia manduntur aduersus tulsim,

ad pectus repurgandū, & vocem clariorē: renum etiam doloribus utilis esse censetur, & recentia vulnera glutinat. Multis notis (annotat Clusius) hæc planta cōuenit cum Fœnogræco siluestri Tragi, siue Polygalo Cordi & Glycyrrhizæ siluestri Gesneri, cuius folia & radices degustata Glycyrrhizā sapiunt: nam eius folia noctu interdū contrahuntur (quod in multis leguminaceis plātis vsu venit) at spinis caret caulis, nisi pro spinis sumere libeat tenues illas & mucronatas appendices sedis foliorum alatorum inhaerentes.

HERBA MALVCANA. CAP. CXLV.

Forma.

Nomina



VORVM aut trium cubitorum longitudinem acquirit hæc planta, nonnunquam etiam locis vberioribus & humidis, quinque cubitos superans, eleganti virore prædita, caule tenui, tenero, nonnihil conuoluto, imbecillo, & nisi vt Iasminum pergulis sustineatur, humi sese diffundente, quemadmodum Hedera, & multos ramos spargente, qui subinde radices agunt vt Mentha & Melissophyllon, adeoque serpunt, vt planta sola vel ramus transpositus breui temporis spatio magnum locum occupet: folia habet tennella & mollia, in ambitu serrata, magnitudine & forma Sambuci foliis respondentia: florem croceum Chamæmeli flori admodum similem, paulò tamen maiorem. Toto anno viret & luxuriat. Vulgò nuncupatur Remedium pauperum, & Destructio Chirurgorum, Canatini *Brungara aradua* appellat, id est, quæ flore est croceo. Frequenter viuuntur cum in Maluco (vnde primam originem traxisse creditur, quod istic abundè nascatur, & plurima admisceatur chirurgicis remediis) tum in omnibus Indiæ prouinciis, in quibus diligenter colitur, & in pretio habetur, nec iniuria. Coquuntur huius plantæ folia in oleo, & cum cera inspissantur

tur vnguenti modo. Mirificè curat id vnguentum omnis generis vlcera cùm recentia tum antiqua, etiam si sanguinolenta, sordida, cuniculosa, maligna & putrida sint: mirè esse efficacè deprehendi in tibiis vulneribus inueteratis, & recentibus vulneribus. Alia est præterea huius stirpis vtendæ ratio. Eius enim caulem & ramos superiore cortice denudant, & sumunt membranam illâ tenuem quæ media est inter exteriorem corticem & caulem, quæq; facilè, vti in Cannabi, reuellitur: eam oleo nucis Indicæ madentem, ipsius plantæ foliis inuoluunt, & sub

MALVCANA, Acofta.



cineribus calidis recondunt: vbi incaluerit & emollita fuerit, conterunt, & recentibus cruentisque vulneribus imponunt seu grandia sint, seu minora: & paucis diebus non sine admiratione conglutinant absque vlla inflammatione aut apostemate: lenit enim dolorè, sanguinèq; fluxû cohibet, breuiter, nullo alio medicamento adhibito omnino ad cicatricem perducit: singulare etiam perhibent esse remedium aduersus neruorum punctiones, & vulnera. Eodè præterea modo adhibetur in apostemate aperto ad emundandum, carnem generandum, & ad cicatricem perducendum: item in inueteratis vlceribus & cuniculosis, in quibus ea solummodò trita interdum apponitur. Porro quoniam ista remedia huius plætæ certissima sunt, vulgariter iis vtuntur in vniuersis illis prouinciis, & magna habent in æstimatione: multi præterea alij qui inde nauigant vnguentû ex hac herba cum oleo & cera confectû, secû cfferre solent, tantâ fiduciâ in eo collocantes, quasi omnia chirurgica remedia, apud se haberent: itaq;

quacunque occasione in qua chirurgorum opera requiri posset, subito ad vnguentum ex herba Malucana confectû confugiunt, tanquam indubitatum remedium.

SARGAÇO.

CAP. CXLVI.




IN CELEBRI illa nec minùs metuenda nauigatione del Sargaço (sic enim totum illud Oceani spatium à decimo octauo gradu ad trigessimum quartum ab æquinoctiali ad Septentrionem tendens, qui in Indias nauigant, appellant) cõspicitur profundû & spatiosum æquor rectum herba quadam Sargaço nuncupata, palmum longa, tenuibus ramulis in glomos conuoluta, foliis angustis, tenuibus, & dimidiam vnciam longis, in ambitu admodum serratis, colore subrufo, gustu insipido, siue insensibili mordicatione prædito, qui potius ex aquæ falsugine contractus, quàm ipsi plantæ innatus videatur. Ad singulorum foliorum exortus inhaeret semen rotundum vti granum Piperis vani & vacui, tenui corallio albo, interdum autem corallio rubro & albo omnino elaboratum, tenerum admodum dum primùm ex aqua educitur, & durum si exsiccare sinatur, sed propter tenuitatem admodum fragile, salsa aqua plenum. Nulla radix in hac planta cõspicitur, sed sola rupturæ vestigia apparent, atque in profundo arenosoq; maris alueo nasci, tenuesque radices obtinere credibile est, tamen nonnulli opinentur rapido aquarum, quæ ex multis insulis in Oceanum influunt, cursu istam herbam euelli & simul trahi. Cùm eam opinionem pertinaciter tueretur nauculus illius naus qua vehebat, subortæque esset inter nauigandum hoc mare malacia, quantum acies oculorum extēdi potuit, id vndiq;

Locus.

Forma.

SARGAÇO, *Acosta.*

Vires.



ista planta contactum vidimus, demissisq; nonnullis iunioribus nautis qui eam herbam à naui propellerent, aquàmque repurgarent, aperte conspeximus eius herbæ glomos simul implexos ex alto mari emergentes, vbi demissa bolide nullus fundus tentari potuit. Hæc planta aceto & sale condita eiusdem saporis est cum Crithmo, siue Fœniculo marino, & in eius penuria sumi posset, tum etiam Capparum loco à nauigantibus edi. Iussi illam recenter è mari sumptam capris quas in naui vehebamus obijci, & auidè sanè vescébantur. Nullas eius facultates comperi, sed quidam è nostris nautis vrinæ difficultate laborans, & arenulas crassosque humores eiiciens, crudam eam & coctam fortè edit, quoniam illi bene saperet paucos post dies affirmavit mihi, magnum ex illius esu se sentire commodum, secùmque detulit, vt peracta nauigatione in continenti vteretur. Considerandum Clusius admonet, an non sit Lenticula marina serratis foliis Lobellij, cuius iconem inter marinas stirpes ad Observationum calcem exhibet.

GRANADILLA.

CAP. CXLVII.

Nomen.



LLATVS mihi ex continenti herbæ fructus est (ait idem) quæ in Peruanis montibus, vbi sponte nascitur, *Granadilla* appellatur, quod nomen illi imposuerunt Hispani ob similitudinem quam cum nostris Malis granatis habet, nam eiusdem ferè est amplitudinis, atque etiam coloris, quando maturus est, nisi quòd corona careat: nunc in siccato, si agitetur, sonitum edit semen intus oclusum, quod Pyri semini simile est, aliquantò maius, tuberculis quibusdam eleganter elaboratum, & aspectu iucundum: pulpa candida est, & saporis expers. Planta hunc fructum ferens Hederæ similis est, eodémque modo repit & scandit quocunque loco ponatur. Elegans est cum fructu onusta cōspicitur, propter eius amplitudinem: florem habet albæ Rosæ persimilem, in cuius foliis aliquæ veluti passionis Christi figuræ delineatæ conspiciuntur, quas magna diligentia istic pictas existimes: eam ob causam elegantissimus est flos. Fructus ipse sunt Granatula iam dicta, quæ matura acidulo liquore abundant, & semine plena sunt: aperiuntur vt oua, & liquorille cum magna voluptate sorbetur cùm ab Indis, tum ab Hispanis: nec etiam si multos sorbeas vllam ventriculi grauedinem sentis, sed potiùs aluum emolliri. Herba rara est, quæ duntaxat vno in loco inuenitur. Fructus temperatus esse videtur, & aliquantulum humidus.

Forma
planta.

FLOS SANGVINEVS. CAP. CXLVIII.



SEME N ex Peru delatum terræ commisisse, vt eius elegantiam potiùs conspiceret, quàm quòd vlla medica facultate præditus esset, scribit Monardes. Ipsa planta duos circiter palmos assurgit, ramis rectis, quos ambiunt rotunda & tenuia folia admodum virentia: flores in summis ramis nascuntur aureo admodum colore fulgentes, quinque foliis cōstantes, in quo

in quorum singulis sanguinea & maximè rutilans macula impressa est, oblongo cucullo extremos flores occupante & longè prominente. Elegans est flos, ad penfiles hortos exornandos aptissimus: nam & semine & furculis facillimè nascitur. Gustatus eodem sapore & odore quo Nasturtium esse deprehenditur: insigniter calidus est.

PAYCO.

CAP. CXLIX.



ED & herba quædã ipsi ex Peru missa est, istic Payco nūcupata, cuius folia Plantaginis foliis cū forma, tum colore sunt similima, quæ siccata, admodū tenuia sunt, & gustata valde acria calidāque deprehenduntur. Eius puluis ex vino sumptus, nephreticum dolorem & flatibus, aut frigida causā prouenientem tollit: ipsa verò planta cocta, & emplastri in modum dolenti loco imposita, eundem effectum præbet: quod certissimum esse ipsa experientia didicisse testatur.

Vires.

HERBA AD RENVM MORBOS
UTILIS. CAP. CL.



LIA item, inquit, missa est, admodū vtilis ad renum affectus: calida causā naros, illito parti dolenti eius succo cum rosaceo vnguento mixto, & foliis ipsius plantæ superimpositis: in erysipelate & inflammationibus succus impositus valde confert: nam inflammationem tollit, & dolorem mitigat. Sunt verò ea folia quasi Lactucæ primū enata & tenerioris, similiq; virore prædita, quæ gustata insipida deprehenduntur, sic vt herba perfrigida videatur.

LACTVCA SILVESTRIS PYMILA.
CAP. CLII.



LIA præterea herbam attulerunt, Lactucam siluestrem vocatam: cuius folia Lactucæ foliis sunt similia, ex atro virentia. Vires idem subiungit. Dentium enim, ait, dolorem tollit foliorum decoctum, & diutius in ore, qua parte dentes dolent, retentum. Idem præstat foliorum succus dentium cauis instillatus, herba trita superimposita. Sapore admodū amaro est: calidiorem existimo, quàm in primo gradu.

HERBA AD RVPVRAS UTILIS.
CAP. CLIII.



AVLVLM cuiusdam plantæ sibi idem missum fuisse narrat, cuius formam, quòd ob siccitatem omnino contracta & comminuta esset, obseruare non potuit. Hanc, inquit, scribunt miram habere facultatem in rupturis cū puerorum tum adutorum, & rem ita se habere asserunt. Ea vtitur Indus quidam recenti contusa & rupturæ imposita, adhibito deinde miro quodam ligaturæ genere: quoniam etiam sine braccis non minùs firmiter ligati incedunt, quàm si braccati essent, vt mihi retulit quidam qui simili morbo liberatus erat eius plantæ & ligaturæ vsu. Talem ligaturam (si adeò firma sit vt ille referebat) solam sufficere posse existimo, nulla herba aliāve re imposita: quoniam hīc quendam Cordubensem conspexi, qui omnes herniosos sola ligatura curabat, nullis adhibitis braccis: quod verissimum est, & hīc adhuc viuunt qui ab eo curati fuere.

VERBE

Locus,

Forma,

Vires,



CRIPSIT mihi (verba sunt Monardis) nobilis ille vir ex Peru, secundum flumina è montibus eorum regnorum delabentia plurimam Verbenam crescere, illi quæ in Hispania nascitur similem, perpetuò virentem, qua Indi in multis morbis curandis vtuntur præsertim aduersus omnis generis venena, & in his qui in cibis toxicum aut simile aliquid hauserunt. Nobilis quædam matrona ex Peru rediens mihi asseruit se multis annis ægram fuisse, cumque plurimorum medicorum opera vfa fuisset, Indum tandem quandam accessisse, qui in plantarum scientia celebris habebatur, quique inter Indos Medicum agebat, Verbenæ succum depuratum illi propinasse, à cuius vsu post paucos dies lumbricum eiecisset (colubrum ipsa nuncupabat) hirsutum, pede longiorem, crassum, cauda bifida, deinde omnino conualuisset. Ipsam porro nobili cuidam viro in Peru, qui continuè agrotabat, singulis diebus manè eundem succum saccharo permistum sumere persuasisse, (ita enim ipsa hauserat ob amarorem) illum deinde plurimos lumbricos reiecisse longos, tenues, atque inter ceteros vnum albi cinguli instar longissimum, & tum demum integram valetudinem recepit. Id postea consilium plurimis aliis qui malè affecti erant, & lumbricos habere suspicio erat, dedit, qui omnes sumpto Verbenæ succo, multas ventris tineas eiecerunt, & sanati sunt. Illud remedium adeò certum affirmabat, vt vnum è suis famulis ostenderet, qui ob morbi grauitatem philtrum, aut medicata pocula hausisse diceretur, quique epoto Verbenæ succo, vomitu multa variis coloribus distincta ex ventriculo reiecisset, quæ medicata pharmaca esse asserabant, deinde conualuisse. Quod verò ad incantationes & medicata pocula attinet, quod ego vidi hîc subiiciam. Ioannis de Quintana Dueñas primarij ciuis famulus vomitu reiecit me præsentem magnum tenuium & spadiceorum capillorum glomum, adseruabitque in papyro inuolutos plures alios quos binis horis antè euomuerat: quibus reiectis nulla amplius molestia torquebatur, præter eam quam vehementer vomitus induxerat. Ioannes Langius Medicus Germanus vir doctissimus refert mulierem se vidisse plurimum de ventriculi dolore conquerentem, reiectis multis vitri & murrhinorum vasorum fragmentis atque piscium spinis, sanitatem esse adsequutam. Aliud simile exemplum refert Beniuenius, libro de Morbis mirandis. Sed quod maiorem mihi admirationem parit, est: Agricolâ, grauissimis ventris doloribus afflictum, cum nullis medicamentis mitigari dolor posset, sibi cultro guttur præcidisse: eius deinde cadauer cum secuissent & aperuissent, inuentam in ventre fuisse magnam similitum capillorum, quales superiorem vomitu reiecisse dixi, quantitatem, & ferrea fragmenta. Has ego res dæmonis præstigijs tribuo: nam ad naturalium classem referri minimè possunt. Clusius tamen non dissimilia superioribus, nec minùs mira, duo exempla affert, ne quis tantum illa Monardi credat. Accepisse verò primùm se ait à Francisco Zinnig Serenifs. Principis Matthiæ Archiducis Austriæ, &c. pharmacopœo cum in sua arte peritissimo, tum diligentissimo: alterius ipse est testis. Lucas Farel, inquit, eiusdem Principis coquus, qui primùm apud D. Mariam Hungariæ reginam, deinde apud Margaretam Parmensem ducem in simili ministerio fuerat, singulis interdum annis, nonnunquam semestribus, vel trimestribus interuallis, per annum eiicit renuem quandam lentamque materiam, angusti cinguli instar oblongam, candidam & crispam, non eam quidè continuam & integram, sed quam per fragmenta sex, duodecim, atque etiam quindecim vlnas longa eximere cogitur. Solet verò ante symptomata plerumque grauem in pectore sub dextra mamilla dolorem perpeti, quem vt leuet, aggregatiuis catapotijs corpus purgat, eamque, quam dixi,

materiam

materiam excernit, tum demum morbo liberatur. Is verò, quoniam plerumque tanta capitis grauedine afficitur, vt domo egredi, aut quoquam prodire nequeat, ex quorundam consilio Verbenæ radicem collo appensam gestat. Et mox de capillorum eiectionis glomis. Simile, inquit, exemplum ante multos annos accidere memini Iureconsulto N. Vlierden celebri apud Antuerpianos causarum patrono, qui certis anni temporibus materiam in multos veluti muliebrium capillorum glomos congestam per alium excernere solebat, qua reiecta meliùs habebat: nam alioqui macilentus pallensque semper cum esset, aduersa valetudine ante ista symptomata plerumque corripiebatur.

HERBA MORTEM AUT VITAM IN MORBIS
PRAEVENIENS. CAP. CLIIII.

ANNO 1562. Comite de Nieua in Peru commorante, in eius familia mulier quadam illi inseruiens maritum habuit graui morbo decumbentem, cuius causa cum ipsam admodum tristem Indus quidam primarius conspiceret, interrogauit an scire cuperet, vtrum ex eo morbo periturus esset, an superstes futurus maritus, herbæ ramum se illi missurum, quem in mariti sinistra manu poneret, eamque deinde diutius comprimeret: nam si superstes futurus esset, quamdiu eam herbam manu teneret, alacrem & lætum, sin moriturus, mœstum & anxium fore. Missum ab Indo ramum marito in manum dat, comprimereque iubet: sed illico tanta mœstitia & anxietas ipsum oppressit, vt illa, metuens ne subito exstingueretur, ramum ex manu tolleret & abiceret: is deinde paucos post dies extinctus est. Cupienti mihi, inquit Monardes, an ista vera essent perscrutari, nobilis quidam, qui multis annis in Peru vixerat, certum esse affirmabat, & vsitatum esse apud Indos in agitudinibus id facere, quod sanè magnam mihi admirationem attulit.

COCA.

CAP. CLV.

SCRIBIT idem, cum tam multis annis celebrem illam apud Indos plantam, quam *Coca* nuncupant, & tanta cura & diligentia serunt, atque colunt, quoniam omnes eam in quotidianos suos vsus & oblationes conuertunt, videre cuperet, ad se perlatam esse. Est verò ea, vt tradit vlnæ magnitudine, foliis Myrti paulò maioribus (quæ veluti aliud folium simili forma in meditullio delineatum habent) mollibus, dilutiùs virëtibus: fructu racematim cohærente, vti Myrti fructus rubente quando maturefcit, eiusdemque magnitudinis, quando verò plenam maturitatem adeptus est, nigricante: tum verò herbæ est mæsis, quæ collecta in canistris, aliisque rebus, ad exsiccandum reponitur vt meliùs conseruari & in alias partes transferri queat: nam è montibus in alios montes defertur mercimonij gratia, proque aliis mercibus commutatur, vestibus, gregibus, sale, & aliis rebus, quia illis pro pecunia est. Reconditur semen in Mastiche, atque inde exemplum alibi seritur in terra bene culta, per suos ordines & series, vti apud nos Fabæ, aut Pisi. Vulgaris est eius vsus inter Indos ad multas res, tum ad eas quæ ad iter necessaria sunt, tum quæ ad voluptatem in suis ædibus seruiunt, hoc modo. Conchyliis, aut ostreorum conchas vrunt, & calcis modo comminuunt: folia deinde Cocæ dentibus atterunt, & subinde puluerem illum Conchyliorum vstorum admiscunt, & simul quasi fermentant, vt tamen minor sit calcis quàm foliorum quantitas: ex hac massa trochiscos, seu or

Forma.

Vfus.

feu orbiculos conficiunt, & siccandos exponunt. Quando iis uti volunt, vnum orbiculum in ore sumunt, eumque exugunt, subinde in ore nunc hac, nunc illac versantes, & quamdiu possunt retinentes, vno absumpto alium sumunt, deinde tertium, sic pergentes toto tempore quo iis in longis itineribus conficiendis opus habent, præsertim si per loca fiant, ubi nulla, aut cibi, aut aquæ copia est, quoniam horum orbiculorum sorbitione, famē, sitimque sibi leuari, & vires sustentari asserunt. Si duntaxat voluptatis gratia uti volunt, solam Cocam mandunt, eamque in ore versant, donec omnis facultas absumpta sit, deinde aliam sumunt. At si inebriari, aut aliquantulum extra se rapi, & veluti mente alienari, Cocæ Tabaci folia admiscunt, atque simul mandunt & sorbent: ea ratione extra se feruntur veluti homines ebrij, magnam voluptatem inde capientes. Et profectò res admiratione non caret, inquit, conspiciere quàm isti Indi oblectentur mente & sensu quasi priuari, quandoquidem eius rei gratia Cocam cum Tabaco sumant, aut solum Tabacum, ut in secundo huius Historiæ libro de Tabaco diximus. Hæc Monardes. Sed & Benzo lib. 3. cap. 20. Cocæ in hanc sententiâ meminuit, Peregrè profecturi (de Peruanis loquitur) rubro quodam bitumine faciem oblinunt, herbamque ore clausam (*Cocam* ipsi appellant) velut panchrestum quoddam pharmacum circumferunt. Quippe eius præsidio freti, integrum diem, nullius nec cibi, nec potus egentes iter faciunt. Atque hoc quidem herbæ genus, earum rerum, quibus mercaturam exercent, præcipuum est.

TVBULI AD ASTHMA VTILES.

CAP.

CLVI.



QUAE DE Tubulis quoque ad asthma vtilibus, qui ex Hispaniola adferuntur, narrat eodem lib. simpl. medic. 3. Monardes, nullius melius quàm ipsius verbis, ut ea Clusius interpretatus est, intelligere potes. Adueruntur è noua, inquit, Hispania Tubuli quidam Cannarum, interiore & exteriori parte quodam gummi illiti, quod meo iudicio Tabaci succo infectum est, & caput tentat: eo, ni fallor, cannam inungunt, utq; tenax est, firmiter inhaeret, colorisq; nigri est, induratum autem non est tenax: incenditur Tubulus ea parte qua bitumen est, altera verò in ore sumitur, fumusque excipitur, qui omnem pituitatem & purulentos humores è pectore educit: eo verò vtuntur cum asthma se premi & veluti suffocari sentiunt. Primatam quendam, qui sæpius asthma laborabat, eius vsu plurimum vtilitatis consequutum obseruau: simile commodum ante ex Tabaci fumo percipere solebat: propterea à meo Tabaci succum admixtum esse oportere: tutum autem vtriusque esse vsu ipsa experientia in multis docet. Nonnullos ægros & asthma vexatos ex India redeuntes obseruau Tabaci folia viridia mandentes, & succum inde promanantem sorbentes ad purulentas materias expellendas, qui licet inebriarentur, plurimam tamen vtilitatem sensisse apparebat cum ad pus, tum ad pituitam pectori inhaerentem propellendam. Mirum est quàm insignes & variæ Tabaci facultates singulis adhuc diebus deteguntur: nam præter eas, quas secundo libro descripsi, tantumdem adhuc proferre possem, quas postea & referentibus aliis intellexi, & ipse obseruau.

BALSA



INDEX HISTORIÆ

PLANTARVM LOCVPLETISSIMVS,

LATINVS, GRÆCVS, ARABICVS, GALLICVS,

ITALICVS, HISPANICVS, GERMANICVS,

BELGICVS, BOEMICVS,

ANGLICVS:

Quo non arborum modò & fruticum, subfruticum, herbarum, radicum, corticùm que, verùm etiam fructuum, succorum, lacrymarum, oleorum, aliorùm que id genus nomenclaturæ ordine alphabetico diligentissimè recensentur, appositis fideliter suo quoq; loco paginarum arithmeticis numeris: vt nullo labore summa eorùm omnium capita, quæ fusè libris his totis xvi. explicantur inueniri possit.



A

BALZEMER

Perfis, quæ

Senna vul-

go. pag. 218

Abhel, Saba-

ne aut gene-

ris ipsius fructus est, non luni-
peri. 184

Abies. 53

Abietis album, ἄβρις Gracis. 54

Abietis lacryma. ibid.

Abiga unde dicta. 1161

Abrotonum odoratum humile,

Lobellij. 939. Indorum, eius-

dem. ibid.

Abrotonum. 936. fæmina &

mas, Matth. 937. fæmina

& mas, Dodonæi. 938

Abrotonum fæmina Fuchsj, Ab-

sinthium Ponticū Dodon. 945

Absinthium. 940

Absinthium vulgare. 943. Pon-

ticum, Matth. ibid. Ponticum

Tridentinum, Herbariorum,

Lobel. ibid. Seriphium seu

marinum, Matth. ibid. Seri-

phium Aegyptium, Matt. 944

Seriphium Dodonæi. ibidem.

Seriphium verū, Pene & Lob.

ibid. Ponticum Dodonæi. 945.

arborescens, Lob. 946. album

capitulis scabris, eiusdem. ibi.

angustifolium Dodo. ibid.

Aburilon Auicenna. 592

Acacia. 160. eis duo gene ra. ibid.

& 161. 162

Acacia, omnis acrimonia prorsus

expers. 163

Acacie vera ἄρρικα ἁγία.

Acaiou. 1846

Acanos Plinij. 1480

Acanthice Mastiche. 64

Acanthis. 575

Acanthium. 1445. Matth. 1446

Acanthium montanum Dale-

champj. ibid.

Acanthium Spine alba alterum

genus. 1462

Acanthium spina alba sylvestris,

Fuchsj. 1466

Acanthus & Acathia. 1442. 1443

Acanthus sativus Matth. 1443

Acanthus sylvestris, Carduus

pratensis, Tragi. ibid.

Acanthus sylvestris Dalech. 1444

Acanus quid. 1453

Acarna, Carlina sylvestris minor,

Clusj. 1484

Acarna Theophrasti, Anguillare,

Lobellj. ibid.

Acarna Valerandi altera. ibid.

Acer, vel Aceris, & eius genera.

94. & 95

Acer album. 220

Aceris radix. 95

Acerabulum. 1608

Acerabulum alterum. 1322

Acetosa Officinatum. 605

Acetosa rotunda vulgi. 602

Aetum ex malis. 289

Achanapa Theueti. 1904

Achillea. 772

Achillea montana, Pene. ibid.

Achillea sideritis, Matth. ibid.

Achillea sideritis Dioscor. 1278

Achras. 308

Acidula. 602

Acilaci Gracis hodie quid. 24. 26

Acinus quid. 598

Acinus. 919. Matth. ibid.

Acinus, sue Clinopodium syl-

vestre. ibid.

Aconitum. 1732

Aconitum aliud, Dalech. ibid.

Aconitum candidum ἄκανθον, Da-

lechampj. 1743

Aconitum lycoctonū 11. & 111.

Matth. 1739. 1111. eiusd. 1740

Aconitum v. vi. vii. Matth. ibi.

Aconitū vii. & ix. Mat. 1741

Aconitum lycoctonū luteū maius,

Dodon. ibid. minus eius. 1742

Aconitum lycoctonum Dodon. ex

cod. Casareo. ibid.

Aconiti lycoctoni genus aliud, Da-

lecham. 1744

Aconitum monococcon Cordi 1312

Aconitum pardalianches Diosco-

ridis, Fuchsj. 1312

Aconitū pardalianches Dod. 1203

Aconitum pardalianches, Mat-

thioli. 1735

Aconitum pardalianches minus,

Matth. 1737

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Aconitum pardalianches</i> Plinij.		<i>Agis.</i>	1909	<i>Alcea vulgaris</i> L. obellij.	1593
ibid.		<i>Aglaophotis.</i>	855	<i>Alch. milla.</i>	175
<i>Aconitum pardalianches</i> Theophrast. ex Matth.	1638	<i>Agnum quidem esse censent</i>	133	<i>Alch. milla.</i>	1281
<i>Aconiti noxæ.</i>	1744	Theophr.		<i>Alch. milla.</i>	1302
<i>Acopos.</i>	105	<i>Agnus Castus officinarum.</i>	280	<i>Alc. biadion.</i>	1100. 1101
<i>Acorum & Acorus.</i>	1617	<i>Agnus Scythicus, Borametz.</i>	1849	<i>Alcibiadium.</i>	1104
<i>Acorum verum, Matthioli.</i>	1618	<i>Agrestia omnia propemodum sui generis domesticis valentiora sunt.</i>	530	<i>Alcibien.</i>	ibid.
<i>Acorum cum flore Robini, regis Francorum Herbarij.</i>	1618	<i>Agrestia omnia hortensibus acriora & siccora.</i>	1544	<i>Alocas'us.</i>	1436
<i>Acorus luteus falsus, Matthioli.</i>	1619	<i>Agriacantha.</i>	1480	<i>Alectorolophos.</i>	1073
<i>Acori veri radices perperam necne in officinis pro Calamo usurpate.</i>	1889	<i>Agrifolium officinarum.</i>	46. 146	<i>Alexadrinam ruscæ vocat Plinius quam Theophrastus Idæa</i>	191
<i>Acori radix.</i>	1893	<i>Agrimonia officinarum.</i>	1251		1569
<i>Acorna.</i>	1483. Theophr. ibid.	<i>Agriocardamm.</i>	665	<i>Alga.</i>	
<i>Actæa</i> Plinij, <i>Ebulus nec ne sit.</i>	269	<i>Ahouai.</i>	1843. Théneti, ex Clusio.	<i>Alica 84. unde dicta 85 ex quibus frugibus fiat ibid. & 86</i>	
<i>Actæa</i>		<i>Aithales.</i>	1128	<i>Alica gypsum & arenam miscere soliti veter. s.</i>	387
<i>Acula.</i>	712	<i>Ainga seu A biga.</i>	1159	<i>Alimus.</i>	264
<i>Aculeosa.</i>	1473	<i>Ainga adulterina Clusij.</i>	1161	<i>Alisma Dioscoridis quorundam falso.</i>	1358
<i>Aculeosa.</i>	1480. <i>Aculeus.</i>	<i>Aizoon, Iouis Barba officinis.</i>	194. 1128	<i>Alk. h.</i>	1377
<i>Acutella.</i>	447	<i>Aizoon dasyphyllum, Dalechampi.</i>	1123	<i>Alleluia Officinarum.</i>	504
<i>Acus muscata.</i>	1275. 277	<i>Aizoon maius, siue Semperuium minus Dodonæi.</i>	129	<i>Alleluia.</i>	1354
<i>Acus pastoris.</i>	72	<i>Aizoon minus, siue Semperuium Dodonæi.</i>	ibid.	<i>Alliaria siue Alliaris. 911. Matthioli & Dodonæi.</i>	ibid.
<i>Acus pastoris.</i>	1275. 1277	<i>Aizoon minus Matthioli, idem cum proximo.</i>	ibid.	<i>Allium.</i>	1545
<i>Adacra.</i>	999	<i>Aizoon minus, siue Semperuium Dodonæi.</i>	ibid.	<i>Allium anguinum Matthioli.</i>	1547
<i>Adelphides Palmae.</i>	354	<i>Aizoon minus Matthioli, idem cum proximo.</i>	ibid.	<i>Allium caninum Dodon.</i>	1501. 1511
<i>Adiantum.</i>	1208	<i>Aizoon minus Matthioli, idem cum proximo.</i>	ibid.	<i>Alium iuncum.</i>	1544
<i>Adiposus Palma in Aegypto.</i>	365	<i>Aizoon minus semina Fuchs.</i>		<i>Allium sativum & sylvestre Matthioli.</i>	1546
<i>Palma fructus immaturus.</i>	366.	<i>Crasula minor seu Vermicularis.</i>	1130	<i>Allium ursinum latifolium Fuchsj & Dodonæi.</i>	ibid.
<i>Adonidis flos.</i>	841	<i>Aizoon minimum repens, tertium Dioscoridis.</i>	ibid.	<i>Allium ursinum Matthioli.</i>	1546
<i>Adonis siue Anthemis, Matthioli.</i>	970	<i>Aizoon Telephium Dalechampi.</i>	131	<i>Alnus.</i>	95. 96. 97.
<i>Adoreum.</i>	374. 375			<i>Alnus nigra baccifera.</i>	97.
<i>Aegilops.</i>	10. 403. 405	<i>Aizoon montanum.</i>	ibid.	<i>Aloe.</i>	1692
<i>Aegilops Dodonæi.</i>	406	<i>Aizoon arborescens. ibid. Matthioli.</i>		<i>Aloe Americana, Clusij.</i>	1697
<i>Aegilops Idæorum.</i>	3 & 6			<i>Aloe Matthioli.</i>	693. cum floribus ibid.
<i>Aegilops Lobellij & Penæ.</i>	406	<i>Aizoon marinum.</i>	1386	<i>Alopecuri genus.</i>	1358
<i>Aegilops secunda Matthioli, radice & folijs diuersa ibid.</i>		<i>Aizoon vulgus hodierni Græcorum.</i>	1693	<i>Alopecuros Dodonæi.</i>	431
<i>Aegilops Plinij.</i>	1625	<i>Alabastrites.</i>	1256	<i>Alopecuros graminæ Da'echampi.</i>	431. 432
<i>Ara.</i>	416. 417	<i>Alabastrites altera.</i>	1140	<i>Alopecurus montana.</i>	1357
<i>Aeraria.</i>	1480	<i>Alaternus Clusij.</i>	158. 159	<i>Alopecuros Plinij.</i>	430
<i>Aethiopsis.</i>	1305	<i>Alba spina.</i>	139	<i>Alopecuros Theophrasti.</i>	641
<i>Afrodilus Officin.</i>	1388	<i>Albucum, siue Albucus.</i>	1588	<i>Alfine.</i>	1132
<i>Agallochum.</i>	1769. siue Xyloaloe.	<i>Alburnum Plinio quid.</i>	216	<i>Alfine corniculata Clusij.</i>	12. 2. & 1534
<i>Agallochum verum officinis signatur.</i>	1770	<i>Albus Spinus.</i>	134. 135	<i>Alfine lutea.</i>	1232. 1233
<i>Aganicum.</i>	11	<i>Alcanna officinar. 252. quam illa arbor sit.</i>	25	<i>Alfine maior Dodonæi.</i>	1232
<i>Agaricus 1703. vel Agaricum.</i>		<i>Alcane radices officinarum.</i>	1100	<i>Alfine minor siue minima, Dodon.</i>	1233
<i>Agaricus Matthioli.</i>	1704	<i>Alcea.</i>	593	<i>Alfine Matthioli.</i>	1232
<i>Ageratum.</i>	777	<i>Alcea Matthioli.</i>	ibid.	<i>Alfine maxima.</i>	1233
<i>Ageratum secundum & tertium, Matthioli.</i>	778	<i>Alcea Officinarum.</i>	497	<i>Alfine media, siue minor Dodon. maior Fuchsj.</i>	1232
<i>Ageratum aliud quorundam ibid.</i>		<i>Alcea peregrina solis sequa.</i>	595	<i>Alfine muscosa.</i>	1232. 4. 33
<i>Ageratum Dalech.</i>	1184	<i>Alcea Veneta Dodonæi.</i>	594	<i>Alfine nodosa Da'echampi.</i>	234
<i>Ageratum Ferulaceum Dalech. ibid.</i>		<i>Alcea vesicaria.</i>	595	<i>Alfine purpurea.</i>	1231. 1232
<i>Ageratum purpureum Dalech. ib.</i>		<i>Alcea villosa. ibid. Dalechampi.</i>	594	<i>Alfine</i>	

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Alfine repens</i> , Clusij.	1429	<i>Ameos Officinarum.</i>	694	111. 1111. eiusdem.	843
<i>Alfine verna.</i>	1214	<i>Amerimnon.</i>	1128	<i>Anemone V. Matthioli.</i>	844
<i>Althea.</i>	589	<i>Amerina salix.</i>	274	<i>Anemone hortensis</i> Tragi.	ibid.
<i>Althea altera Matthioli.</i>	592	<i>Amerina duplex.</i>	278	<i>Anemone I. Dodon. latifol. I. Lobel. & Clus.</i>	845
<i>Althea arborea Lobelij.</i>	593	<i>Ammi.</i>	694	<i>Anemone II. Dod. tenuis fol. III. Clus. sue Gegamifolia, Lobel. ibid.</i>	846
<i>Althea frut. ex. Clusij.</i>	ibid.	<i>Ammi Fuchsi.</i>	695	<i>Anemone III. Dod. angustifolia, Clusij.</i>	846
<i>Althea lignosa Dalechampij.</i>	592	<i>Ammi Matthioli.</i>	ibid.	<i>Anemone latifolia prima, Clusij. ibid.</i>	848
<i>Althea palustris, Pene.</i>	1012	<i>Ammi vulgare.</i>	436	<i>Anemone III. Dodon. multiplex rubra Clusij.</i>	ibid.
<i>Althea Theophrasti.</i>	592	<i>Amomum.</i>	1813	<i>Anemone V. & VI. Dodon. 847</i>	
<i>Altcrum, sue Altercangenum Arabum.</i>	1716	<i>Amomum & Amomis.</i>	1814	<i>Anemone latifolia flore multiplici, Clusij.</i>	ibid.
<i>Alum. seu Alus.</i>	1074	<i>Amomum Plinij.</i>	600	<i>Anemone trifolia, Dodonai. ibid.</i>	848
<i>Alum.</i>	1174	<i>Ampeloprasum Matthioli.</i>	1543	<i>Anemone tenuifolia flore multiplici, Clusij.</i>	848
<i>Alumen catinum.</i>	1378	<i>Ampeloprasum, sue Porrum sylvestre Lobelij.</i>	1544	<i>Anemone, flos venti.</i>	970.
<i>Alpum & Alypia.</i>	1680	<i>Ampelos agria.</i>	1414	<i>Anemone corniculata maior Pene. 1713, 1714. minor eius. ibid.</i>	
<i>Alypum Matthioli.</i>	ibid.	<i>Amurca.</i>	346	<i>Anemone Ga'eni latea lib. 2. varietas in eadem sit germanica.</i>	1715
<i>Alypum Pene, Herba terribilis Narbonensis.</i>	ibid.	<i>Amygdala ex amaris ut dulces fiant.</i>	316	<i>Anethum.</i>	691
<i>Alysson quorundam, Cytisi facie.</i>	264.	<i>Amygdala presumpta ebrietate prohibent.</i>	318	<i>Angelica.</i>	724
<i>Alyssum. 1141. Dodonaj.</i>	ibid.	<i>Amygdalarum duo genera.</i>	316	<i>Angelica sativa Matthioli.</i>	ibid.
<i>Dalecham. ibid. Matth. 1142</i>		<i>Amygdalarum facultates.</i>	317	<i>Angelica sylvestris Fuchsi.</i>	728
<i>minus Dalechamp.</i>	ibid.	<i>Amygdalus.</i>	316	<i>Angelica sylvestris Dodon. ibid.</i>	
<i>Alysson Italarum, perperam.</i>	1183	<i>Amygdalus prima omnium floret.</i>	317	<i>Angelica sylvestris Matthioli.</i>	ibid.
<i>Alyssum Germanicum Echiioides Lobelij.</i>	1143	<i>Amylum & Siligine.</i>	375	<i>Angina Lini.</i>	1683
<i>Alyssum Trigonum Dalechampij.</i>	ibid.	<i>Anacardium.</i>	1764	<i>Anguria.</i>	619. 620
<i>Amamelides.</i>	99	<i>Anagallis.</i>	1226	<i>Anguria, Citrus officinarum.</i>	615
<i>Amaracus.</i>	881	<i>Anagallis aquatica. 1090. Dodonai. ibid. altera Lobelij.</i>	ibid.	<i>Anime.</i>	1791
<i>Amaracus sue Maiorana, Matthioli. 882. tenuifolia, eiusd. ibid.</i>		<i>Anagallis aquatica Dodon.</i>	1346	<i>Anisum.</i>	692
<i>Amaracus Fuchsi.</i>	ibid.	<i>Anagallis mas.</i>	1216	<i>Anonis.</i>	447
<i>Amara dulcis.</i>	1338	<i>Anagallis femina.</i>	1217	<i>Anonymos.</i>	993
<i>Amara dulcis.</i>	1413	<i>Anagallis lutea Lobelij.</i>	ibid.	<i>Anonymos.</i>	270
<i>Amarago.</i>	561	<i>Anagyris Dioscorid. Laburnum necne.</i>	103. 104	<i>Antheon.</i>	264
<i>Amarantus.</i>	870	<i>Anagyris. 105. Ananas sylvestris.</i>	1871	<i>Anteuphorbium. 1690. Dodonai.</i>	1692
<i>Amarantus angustifolius, Lobelij.</i>	871	<i>Anaxyrus.</i>	600	<i>Anthemides.</i>	968
<i>Amarantus holosericeus, Lobel. ibid.</i>		<i>Anchusa.</i>	1100	<i>Anthemis chrysanthemos Dodonai. 969. Pene & Lobel. ibid.</i>	
<i>Amarantus luteus.</i>	779	<i>Anchusa prima Matthioli.</i>	ibid.	<i>Anthemis eranthemos, Dodonai.</i>	970. Dalechampij.
<i>Amarantus purpureus Matthioli.</i>	871	<i>Anchusa II. Matth.</i>	1101	<i>Anthemis eranthemos, sue Consolida regalis Fuchsi.</i>	970
<i>Amarantus tricolor.</i>	540	<i>Anchusa III. Matthioli.</i>	1102	<i>Anthemis leucanthemos. Matthioli.</i>	969
<i>Amarina.</i>	133	<i>Anchusa lignosior Pene.</i>	ibid.	<i>Anthemis leucanth. niuea Anglorum, flore multiplici.</i>	969
<i>Amba & Ambo.</i>	1870	<i>Anchusa lutea Dalechamp. ibid.</i>		<i>Anthemum foliosum.</i>	438
<i>Ambare, Acosta.</i>	1874	<i>Androsaces.</i>	1361	<i>Anthemois. Nespilus.</i>	198
<i>Ambilij in Guzarate quid.</i>	1689	<i>Androsaces alterum, Matthioli.</i>	1362	<i>Antheram qui flores Rosarum apellant, errant.</i>	126
<i>Amblatum Cordj.</i>	1296	<i>Androsacem.</i>	1153	<i>Anthericus.</i>	1588
<i>Ambrosia.</i>	1118	<i>Androsacem.</i>	1156		
<i>Ambrosia.</i>	1147	<i>Androsacem album Dalech. 1157</i>			
<i>Ambrosia prima, Matth.</i>	1148	<i>Androsacem Dodon. II. Fuchsi.</i>	1156		
<i>Ambrosia altera, Matth. ibid.</i>		<i>Androsacem Matthioli.</i>	1156		
<i>Ambrosia hortensis procerior, Lobelij.</i>	ibid.	<i>Androsacem aliud Dodonai.</i>	1157		
<i>Ambrosia montana Dalechampij.</i>	ibid.	<i>Andryala maior Dalechampi.</i>	593		
<i>Ambubeia.</i>	555-556	<i>Andryala minor Dalechampi.</i>	ibid.		
<i>Ambulon.</i>	1838	<i>Anemone</i>	841		
		<i>Anemone I. Matthioli. 842. II.</i>			

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Anthora.</i>	1747	<i>Apium, & Apium hortense, aut sativum.</i>	700	<i>Artemisia prima vulgaris.</i>	550
<i>Anthora, siue Anthora Matth.</i>		<i>Apium montanum.</i>	701	<i>Leptophyllos montana. ibid.</i>	
<i>Napellus Mofis.</i>	1748	<i>Apium montanum Dalech. ibid.</i>		<i>tertia Leptophyllos, Pene ibi.</i>	
<i>Anthoxanthofi.</i>	603	<i>Apium palustre, Fuchsj. ibid.</i>		<i>Monoclonos alia. 951. Monoclonos quorundam, aliis Ambrosia. ibid. Marina, Lob. ibid.</i>	
<i>Anthriscus, Plinij.</i>	791	<i>Apium palustre, Matth. ibid.</i>		<i>Artemisia Tragentes, aut Tagetes.</i>	955
<i>Anthyllis.</i>	1148	<i>Apium risus, seu Apium sylvestre. 1028. 1029. 1032. & 1036.</i>		<i>Articocus. 1436. Articocalus. ibid.</i>	
<i>Anthyllis, 1380. Plinio Anthyllis, alijs eodem referente Anticellion. ibid.</i>		<i>Apium saxatile.</i>	702	<i>Arum</i>	1596
<i>Anthyllis clauiculata.</i>	492	<i>Apium sylvestre, Dalech.</i>	700	<i>Arum Ægyptium cum flore, Myconi.</i>	1598
<i>Anthyllis II. Herbariorum. 1149</i>		<i>Apium sylvestre, Dodonai.</i>	701	<i>Arum, Matthioli. 1597. aliud minus, eiusdem. ibid.</i>	
<i>Anthyllis altera Italorum, Lobellij.</i>	1150	<i>Apocynum.</i>	1730	<i>Arundo.</i>	985
<i>Anthyllis maior.</i>	509	<i>Apocynum Matth. 1731. repens, eiusdem. ibid.</i>		<i>Arundo domestica Matthioli. 999</i>	
<i>Anthyllis marina Narbonensis, Alfines folio, Pene.</i>	1381	<i>Apolonium Eubæensium.</i>	1666	<i>vallatoria, Dodonai. 1000. pulchris Matthi. ibid. epigeios. ibid. minima 1001</i>	
<i>Anthyllis marina altera Narbon. Pene.</i>	1382	<i>Apollinaris.</i>	1715	<i>Arundo seu Canna Indica, Clusij. ibid. Dalechampi. ibid.</i>	
<i>Anthyllis montana.</i>	1150	<i>Apronia vitis.</i>	1411	<i>Arundo saccharifera. 1002</i>	
<i>Anthyllis Porthandiae lentifolia, Pene.</i>	1381	<i>Aprona Punica.</i>	303. 304	<i>Asa officinarum.</i>	731
<i>Anthyllis prior Dodonai.</i>	1380	<i>Aqua ex Ligustri floribus.</i>	255	<i>Asa fetida magnus apud Indos usus.</i>	733
<i>altera, eiusdem. ibid.</i>		<i>Aqua ex Sambuci floribus.</i>	266	<i>Asarina, Matthioli. 915. Lobellij. ibid.</i>	
<i>Anthyllis Valentina, Clusij.</i>	1381	<i>Aquifolium.</i>	46. 146	<i>Asarum 913. Matthioli.</i>	914
<i>Anetivricon Sefamoides.</i>	1668	<i>Aquilegia, siue Aquilina.</i>	820	<i>Asarum muri.</i>	1134
<i>Anticyricus elleborus.</i>	1669	<i>Aquil. g. minor, Dalech.</i>	821	<i>Ascalia.</i>	1440
<i>Antipathes, siue corallium nigrum.</i>	1376	<i>Aquilina plenis & multis floribus, Lob.</i>	ibid.	<i>Asclepias. 1144. Asclepias nigra Dalechampi.</i>	1145
<i>Antirrhinum.</i>	1339	<i>Araba seu Arabis, siue Draba. 663</i>		<i>Ascyron, Ascyron, Ascyroides, 1155.</i>	
<i>Antirrhinum magnum Dodonai.</i>	1341	<i>Arabis, seu Draba, Dodon. seu Thlaspi Creticum.</i>	664	<i>Aspalathus.</i>	1815
<i>Antirrhinum paruum Dodonai, siue Orontium. ibid.</i>		<i>Arabi, seu Draba, Matth. ibid.</i>		<i>Aspalathus I. Monspefulanus. 283.</i>	
<i>Antirrhinum Matth.</i>	1340	<i>Arisarum cum flore Miconi, angustifolium.</i>	1600	<i>Aspalathus II. Hispanus, quibusdam alter scorpius. ibid.</i>	
<i>Antirrhinum II. & III. Matth. ibid. 1111. eiusdem.</i>	1341	<i>Arista quid.</i>	377	<i>Asparagus.</i>	609
<i>Antirrhinum Tragi.</i>	1342	<i>Aristal. hea.</i>	589	<i>Asparagus spongiam in radicibus habet.</i>	610
<i>S. Antonij herba.</i>	1336	<i>Aristidia qua, & cur dista.</i>	428	<i>Asparagi marini species quorundam.</i>	1393
<i>Asargia.</i>	562	<i>Aristolochia, Aristolochia Officinaria.</i>	976	<i>Asparagus sativus.</i>	610
<i>Asargia Dalech. Heracium minus primum Dodon. ibid.</i>		<i>Aristolochia femina, siue rotunda.</i>	977	<i>Asparagus sylvestris Matthioli. ibid.</i>	
<i>Aparine.</i>	1330	<i>Aristolochia longa Matth. Clematis, Pene & Lob. ibid.</i>		<i>Asparagus sylvestris & petreus. 1473.</i>	
<i>Aparine Plinij.</i>	1142	<i>Aristolochia rotunda Dod. & Clusij. 976. longa eorundem.</i>	977	<i>Asperu acarulea, Lobellij</i>	870
<i>Aspate Dalech.</i>	561	<i>longa Fuch. ibid. Sarracenia Dod. Clematis prior, Clusij. ib.</i>		<i>Asperula Dodonai, siue Aspergula. ibid.</i>	
<i>Aphaca.</i>	478	<i>Clematis Dodon.</i>	978	<i>Asphaltion.</i>	503
<i>Aphaca vera, Vicia Matth. ibid.</i>		<i>Aristolochia rotunda quorundam herbariorum.</i>	1293	<i>Asphodelus.</i>	1588
<i>Aphace Dalechampi.</i>	562	<i>Armeria.</i>	808	<i>Asphodelus bulbosus, Galeni. 1589</i>	
<i>Apharca.</i>	158	<i>Armeria Vetonica coronaria. ibi.</i>		<i>Asphodelus luteus, Dodon. 1590</i>	
<i>Apharce quare Plinius non meminert.</i>	ibid.	<i>Armeria prima Dodonai siue Caryophyllus minor sylvestris, Lobellij. ibid.</i>		<i>Asphodelus luteus minor, Lobel. 1589</i>	
<i>Aphrocorodon.</i>	1545	<i>Armeria secunda siue sylvestris, Dodonai.</i>	809	<i>Asphodelus palustris.</i>	293
<i>Aphyllanthes. 864. primum, secundum, tertium. ibid.</i>		<i>Armoracia, siue Armoracii.</i>	634	<i>Asplenium.</i>	1215
<i>Apiana Brasica.</i>	519. 523	<i>Arnabo Pauli.</i>	1822	<i>Asplenium</i>	
<i>Apiana recentiorum quorundam. 1430</i>		<i>Arnoglossum.</i>	1154		
<i>Apiastrum.</i>	957. 1027. 1037	<i>Arrethabonis herbariorum.</i>	447		
<i>Apj vires & temperam.</i>	704	<i>Ariemisia.</i>	949. & 1148		
<i>Apios isthas.</i>	618	<i>Artemisia cinerea.</i>	1383		
<i>Apios. 1595. Matthioli. ibid.</i>		<i>Artemisia fatida.</i>	576		
<i>Fuchsj.</i>	1596				

HISTORIÆ PLANTARVM.

B	B
<i>Baccharis radix.</i>	1729
<i>Baccar, Baccarius, Baccarius</i>	
<i>Officinarium</i>	913
<i>Baccharis 915 Matthioli.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Baccharis Monspeliensium, ony-</i>	
<i>za major Matthioli.</i>	917
<i>Baccharis & Monspeliensium & Mat-</i>	
<i>thioli quæ.</i>	1045
<i>Baccifera arbores.</i>	35
<i>Balani.</i>	31
<i>Balanitis caſſanea.</i>	354
<i>Balanus terreſtris.</i>	1347
<i>Balanus Myreſfica.</i>	366
<i>Balaustiſm quid. 304. eius gene-</i>	
<i>ra ibid. vires.</i>	305
<i>Ballaria.</i>	814
<i>Ballota.</i>	1152
<i>Ballote criſſa.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Ballote criſſa maior.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Ballote & Matthioli.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Balsamine ſive Baſſamina.</i>	629.
<i>& 1277</i>	
<i>Balsamina cucumerina punicea.</i>	
629	
<i>Balsamina Fuchſij.</i>	631
<i>Balsamina Matth.</i>	610
<i>Balsamine offi. inarum.</i>	676
<i>Balsaminum ſeu Baſſamina ſe-</i>	
<i>mina; Matthioli.</i>	60
<i>Baſamita.</i>	677
<i>Baſamita Dodonæi.</i>	678
<i>Baſamiſolium.</i>	1775
<i>Baſamiſfructus.</i>	1819
<i>Baſſamum.</i>	1770
<i>Baſſamum Alpinum.</i>	270
<i>Baſſamum criſſum, Lobellij</i>	672
<i>Baſſamum Indicum ſive Occi-</i>	
<i>dale.</i>	1773:1774
<i>Baſſamum Italicum & vulgare.</i>	192
<i>Baſſamum nouum.</i>	1775
<i>Baſſas Cluſij.</i>	1909:1910
<i>Batis.</i>	766

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Banque.</i>	1914	<i>Betula vel Betulla:</i>	92	<i>Brassica rubra aliquot species.</i>	523
<i>Baptifacula.</i>	436	<i>Bifolium, siue Ophrys Plinij.</i>	1260	<i>Brassica sativa alba vulgaris, le-</i>	
<i>Barba capre.</i>	1080	<i>Bipinella seu Bipenula.</i>	1087	<i>uis sativa.</i>	250
<i>Barba hirci.</i>	1078	<i>Bislingua.</i>	208	<i>Brassica sativa genera.</i>	520. 521.
<i>Barbarea.</i>	650	<i>Bismalva officinarum.</i>	590	522. 523. 524	
<i>Barbarea, vulgi.</i>	1094	<i>Bistorta, 1285. Matthioli. ibid. ma-</i>		<i>Brassica sylvestris.</i>	524
<i>Barbana.</i>	806	<i>ior. ibid.</i>		<i>Brassica sylvestris due species Cor-</i>	525
<i>Bardana minor.</i>	1056	<i>Bistorta quorundam, falso.</i>	1082	<i>di.</i>	
<i>Basilica minor Gemma.</i>	1561	<i>Blaptifacula. 436. Blataria. Matt.</i>		<i>Brassica tenuifolia laciniata.</i>	523.
<i>Basilicum sylvestre quorundam.</i>		1305.		524	
912		<i>Blechnon.</i>	1222	<i>Brassica tertium genus Fuch.</i>	524
<i>Bardana officinarum.</i>	1054	<i>Blitum.</i>	538	<i>Bria sylvestris.</i>	179
<i>Batat.</i>	1909	<i>Blitum album maius.</i>	538	<i>Britanica. 1081. vera, Dalec.</i>	1082
<i>Batisfocele.</i>	436	<i>Blitum rubrum maius.</i>	539	<i>Britanica Dioscoridis.</i>	1285
<i>Batrachium.</i>	875	<i>Blitum rubrum minus.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Britanica Plinij.</i>	1320
<i>Batrachium.</i>	1027	<i>Bolbocastanum. 773. mas. Trallia-</i>		<i>Briza:</i>	395
<i>Batrachium Apulej.</i>	1029. 1034	<i>ni. ibid. famina, Dalechampij.</i>		<i>Bromus herba Lobellij. 404. 405.</i>	
<i>Bauca officinarum.</i>	719	<i>ibid.</i>		<i>altera sterilis, eiusdem.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Baxama arbor.</i>	1834	<i>Bolbocastanum grandius, Dodo-</i>		<i>Brunella.</i>	1310
<i>Edellium.</i>	1757. 1782	<i>nai. Bunium.</i>	774	<i>Brusabaer.</i>	1837
<i>Edellij fructus Cortuso.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Boletii de quercu.</i>	10	<i>Bruscum.</i>	95. 166
<i>Edellij secundum genus.</i>	368	<i>Bombax officinar.</i>	221	<i>Bruscum officinarum.</i>	242
<i>Bechion.</i>	1049. 1050	<i>Bonyama.</i>	1841	<i>Brutes arbor.</i>	183. 184
<i>Bechium.</i>	879	<i>Bonifacia:</i>	208	<i>Bryon.</i>	1083. 1314
<i>Bedegar Seplastiariorum.</i>	127	<i>Bonus Henricus planta. 602. vi</i>		<i>Bryonia.</i>	1194
<i>Behen album. 1186. rubrum. ibid.</i>		<i>res.</i>	608	<i>Bryonia & Bryonias Colu.</i>	1409
<i>Behen album Salmantinum.</i>	817	<i>Boramet.</i>	1849	<i>Bryonia nigra.</i>	1411
<i>Behenrubrum seplastiarum, falso.</i>		<i>Borassus.</i>	362. 367	<i>Bryonia nigra quorundam.</i>	1605
1024		<i>Borda.</i>	1380	<i>Bubonium.</i>	859. 860
<i>Bellerregi.</i>	1687	<i>Borroga. 578. nostra, veterum est</i>		<i>Bugla & Bugula.</i>	1775
<i>Bellis. 853. maior, Fuchsj.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Buglossum.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Buglossa, & Buglossum.</i>	578
<i>Bellis cerulea Pene.</i>	805	<i>Borrage minima, Herbariorum.</i>		<i>Buglossum Antarcticum.</i>	1895
<i>Bellis lutea Dalechampij.</i>	1349	581		<i>Buglossum magnum, siue Italicu,</i>	
<i>Bellis maior, media, minoris spe-</i>		<i>Botrys.</i>	952. 1147. 1148	<i>siue Romanum.</i>	582. 583
<i>cies tres, Matth.</i>	814	<i>Branca vrsina.</i>	1443	<i>Buglossii minus satini Dod.</i>	580
<i>Bellis sylvestris minor.</i>	855	<i>Branca vrsina aculeata Lobellij.</i>		<i>Buglossum minus sylvestre Dodo-</i>	
<i>Ben album officinarum.</i>	683	1445		<i>nai. ibid.</i>	
<i>Ben magnum & paruum.</i>	1789	<i>Brassica 518. unde dicta ibid. Bra-</i>		<i>Buglossum sepe virẽs, Pene.</i>	581
<i>Benedicta.</i>	685	<i>ssica agrestis genera. 524. 525</i>		<i>Buglossum sylvestre.</i>	1104
<i>Benzooin.</i>	1789	<i>Brassica curcrapulam sedet. 529</i>		<i>Buglossum sylvestre Matth.</i>	589
<i>Berberis officinarum.</i>	134. 137	<i>Brassica alba crispata. 520</i>		<i>Buglossum vulgare.</i>	579
<i>Bericoca.</i>	297	<i>Brassica Asparagodes Dalechamp.</i>		<i>Bulapathum.</i>	601. 606
<i>Beta.</i>	531. 1255 1261	522		<i>Bulbina.</i>	1502. 1503
<i>Beta agrestis Lapathus dici potest.</i>		<i>Brassica canina. 1 628. 1730.</i>		<i>Bulbine Plinij.</i>	1511. 1512
601		<i>Brassica campestris Clusij.</i>	525	<i>Bulbi proprie qui dicantur.</i>	1501
<i>Beta candida.</i>	531. 532.	<i>Brassica capitata albida.</i>	521	<i>Bulbi esculenti genus maius Do-</i>	
<i>Beta erythrorrhizos Dodonci.</i>	532	<i>Brassica capitata polycephalos.</i>		<i>donci. Hiacinthus Matth. 1502</i>	
533		<i>ibid.</i>		<i>minus eiusd. ibid.</i>	
<i>Beta nigra.</i>	531. 532	<i>Brassica crispa Tragi.</i>	523. 524	<i>Bulbonac seu Bulbonac officina-</i>	
<i>Beta a πατάριον & Dalecham</i>	532.	<i>Brassica marina toto genere dif-</i>		<i>rum.</i>	805
533		<i>fert à Brassica, nec aliud quã</i>		<i>Bulbus.</i>	1500
<i>Beta romana.</i>	531	<i>nomen commune habet. 526</i>		<i>Bulborũ genera multa olim nota</i>	
<i>Betarubra vulgatio Lobellij.</i>	532	<i>Brassica marina, Soldanella offi-</i>		<i>nobis hodie incognita. 1501</i>	
<i>Betarubra Matthioli.</i>	533	<i>cinarum. ibid.</i>		<i>Bulbus estiuus Dalech. Tiphym</i>	
<i>Beta sylvestris, Plinij.</i>	1024	<i>Brassica marina sylvestris, monos-</i>		<i>Theophrasti.</i>	1503
<i>Betonica.</i>	1282	<i>permos Pene. 527</i>		<i>Bulbus agrestis & strangulato-</i>	
<i>Betonica aquatica.</i>	1366	<i>Brassica nigra Dodon.</i>	523	<i>rius.</i>	1570
<i>Betonica rauli.</i>	1318	<i>Brassica Pompeiana, aut Cypria,</i>		<i>Bulbus eriophorus Dodon.</i>	1504.
<i>Betonica species altera Fuchsj.</i>		<i>Brassica florida Dod. 521. 522.</i>		<i>Clusij. ibid.</i>	
806		<i>Brassica pratensis.</i>	1444	<i>Bulbus marinus crinitus.</i>	1505
<i>Betre, siue Betle.</i>	1778	<i>Brassica Raposa.</i>	522	<i>Bulbus paruº visifoliº Pene.</i>	1505

Bulbus

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Bulbus fluestris Fuchsj & Dodonai.</i>	1502	<i>Calamagrostis Lobellij, vulgo Leche.</i>	434	<i>Cannabis mas.</i>	497
<i>Bulbus vomitorius Matth.</i>	1503	<i>Calamintha.</i>	904	<i>Cannabis femina.</i>	ibid.
<i>Bumelia Fraxinus.</i>	82	<i>Calamintha II. & III. Dios.</i>	907	<i>Cannabis fluestris Dalech.</i>	497
<i>Buna.</i>	1794	<i>Calamintha aquatica, Matt.</i>	606	<i>Cannacorus quorundam.</i>	1001
<i>Bunias à Bunio plurimum differt</i>		<i>Calamintha montana Matt.</i>	805.	<i>Cantrabrica Plinij.</i>	1426
644		<i>Calamintha altera eiusdem.</i>	ibid.	<i>Caphura.</i>	1783
<i>Bunium.</i>	774	<i>Calamintha montana prestantior</i>		<i>Capillaris.</i>	1211
<i>Bunium Dioscor. Dodonai.</i>	773	<i>Pene & Lobellij</i>	ibid.	<i>Capillus Veneris.</i>	1208
<i>Buphthalmum.</i>	862	<i>Calamintha II. incana, Lob.</i>	906	<i>Capita Rosarum quid.</i>	126. 128
<i>Buphthalmum.</i>	1128	<i>Calaminthe.</i>	675	<i>Capnos.</i>	1292
<i>Buphthalmū alterum, Pene.</i>	863	<i>Calamita.</i>	115. 116	<i>Capnos alba latifolia, Lobellij</i>	
<i>Buphthalmum, Dodonai.</i>	863	<i>Calamus aromaticus. 1888. Matt.</i>		1294. 1295	
<i>Buphthalmum Dodo. & Auguil.</i>		<i>ibid.</i>		<i>Capnos Fabacea radice, Pene & Lobellij.</i>	1294
lar	1638	<i>Calamus aromaticus officinarum.</i>		<i>Capnos tenuifolia Clusij.</i>	ibid.
<i>Buphthalmum verum, Dalech.</i>	863	1618		<i>Capparis.</i>	155
<i>Bupleuron.</i>	435	<i>Calathiana Viola.</i>	824	<i>Capparis leguminosa.</i>	456
<i>Bupleuron alterum latifolium, Lobellij.</i>	436	<i>Calathiana Verna, Dalech. ibid.</i>		<i>Capparis vires & usus in medic.</i>	
<i>Bupleuron Dodonai.</i>	ibid.	<i>Calceolum Marie.</i>	1146	156. 157	
<i>Bupleuron Plinij.</i>	694	<i>Calcifraga Plinij.</i>	1671	<i>Cappares prestantissima ex Alexandria Aegypti Venetias asferuntur.</i>	157
<i>Buprestis Plinij.</i>	436	<i>Calcitrapa offic.</i>	1473	<i>Caprificus.</i>	335
<i>Bursa pastoris.</i>	1097	<i>Calendula.</i>	811	<i>Caprificus.</i>	1086
<i>Butomum Theophr.</i>	1519	<i>Calix.</i>	1100	<i>Caprifolium.</i>	1427
<i>Butomum, Dodon.</i>	1018	<i>Calion.</i>	596	<i>Caprio'a.</i>	414. 413
<i>Buxi radices in Gallia Narbon.</i>	95	<i>Callitriche Plinij, quorundā.</i>	1021	<i>Caprella.</i>	660
<i>Buxus, seu Buxum.</i>	165	<i>Callitriche Plinij, quorundā.</i>	1091	<i>Capiscum.</i>	631
<i>Buxus aspinus.</i>	1471	<i>Callitrichon.</i>	1209	<i>Capiscum Brasilianum Clusij.</i>	633
<i>Buxus, quod quidem volūt, Gaia cum non est.</i>	166	<i>Calomache.</i>	699	<i>Capiscum latum Dodonai.</i>	632
C		<i>Caltha hortensis.</i>	811	<i>Capiscum maius & minus, seu Piper maius & minus Mat. ibid.</i>	
<i>Aballina Aloe.</i>	1695	<i>Caltha palustris.</i>	1049	<i>Capiscum oblongius Dodon. ibid.</i>	
<i>Cacalia.</i>	1308	<i>Caltha palustris quorundam Herbariorum.</i>	1013	<i>Capiscum rotundum Dalech.</i>	633
<i>Cacani.</i>	ibid.	<i>Caltha poetarum.</i>	811	<i>Caput gallineum Belgarū.</i>	489
<i>Cacao.</i>	1857	<i>Camomilla satua seu inodora.</i>	1345	<i>Caput monachi.</i>	564
<i>Cacauae.</i>	ibid.	<i>Camomilla fætida & canin.</i>	1344	<i>Caput simia quorundam.</i>	1341
<i>Cachj Cicara.</i>	1837	<i>Camomilla & Camomilla Romana.</i>	988	<i>Carabe.</i>	5780
<i>Cachrys quercus Alibanotidis diuersa.</i>	10	<i>Camomilla vulgi & officinarum.</i>		<i>Caragna.</i>	1792
<i>Cochos.</i>	1876	1344		<i>Carambolas Acosta.</i>	1872
<i>Cachrys quid.</i>	ibid.	<i>Camos.</i>	1343. 1344	<i>Carbunculatio.</i>	418
<i>Cachrys verior, Libanotis Ga.</i>	764	<i>Campana siue Campanula cerulea siue hortensis.</i>	826. 817. minor rotundifolia, Lobellij ibid	<i>Cardamine.</i>	658
<i>Cacti Siculi.</i>	1440	<i>laefcens maior, eiusd. ibid lutea limifolia, Pene.</i>	818	<i>Cardamine Aetij,</i>	665
<i>Cactus. 1437. Cactus Matth.</i>	1438	<i>Campanula siue Cernicaria Fuchsj.</i>	1197	<i>Cardamine altera siue Simfbriū.</i>	659
<i>Cacubulus.</i>	1419	<i>Campanula pratensis.</i>	814	<i>Cardamine IIII. Dalech. minima aquatica.</i>	ibid.
<i>Caditas.</i>	1683	<i>Camphorata.</i>	1200	<i>Cardamine V. Dalec. odorata. ibi.</i>	& 660
<i>Capa & Cape.</i>	1536	<i>Camphorata maior.</i>	1364	<i>Cardamine trifolia Lobellij.</i>	660
<i>Capa Asculonia.</i>	1501	<i>Camphorata minor, Herbar.</i>	1179	<i>Cardamomum.</i>	1810
<i>Cepa fistilis Matt. 1539. Ascaonia eiusdem.</i>	ibid.	<i>Canaria Plinij.</i>	426	<i>Cardamomi species Matth.</i>	1811
<i>Cepa marina.</i>	1475	<i>Cancamum Græcorū Garcia.</i>	1791	<i>Cardiaca Herbariorum.</i>	1119
<i>Cepa nouitate quadā insigni à Dalech. animaduersa an. 1557.</i>	532	<i>Candelaregis & Cadellaria.</i>	1298	<i>Cardiaca. 1249. Matthioli. ibid.</i>	
<i>Cepa fatiua Matth.</i>	1538	<i>Canella.</i>	1796	<i>Cardopatum.</i>	1452
<i>Cepa scitilis Matthioli. II. & Capula Columella.</i>	ibid.	<i>Canella arbor, Theueri.</i>	1805	<i>Carduncellus Pene</i>	1469
<i>Caton, Clusij.</i>	1765	<i>Canella folium & bacillus.</i>	1803	<i>Carduus Anaxilos Septentrionalis, Lobellij.</i>	1454
<i>Catile Serapionis, Lobellij.</i>	1395	<i>Canina lingua.</i>	1261	<i>Carduus aculeat. 1438. lacte. ibi.</i>	
<i>Calabrina.</i>	1221	<i>Canirubus, seu Rubus canin.</i>	121	<i>Carduus altilis Cynaragine capiti</i>	1440
<i>Calamagrostis. 1006. I. II. III. & IIII.</i>	ibid.	<i>Canna.</i>	998	<i>bus acuta, Dodon.</i>	
		<i>Cannabis.</i>	496		

HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Carduus araphyllus</i> , Dalech. 1471	<i>Caryophyllus Indicus</i> . 839. maior	Cedrelate. 36
<i>Carduus benedictus</i> , Cnicus sylvestris alter. 1450	& minor, Matthioli. ibid.	<i>Cedria</i> & <i>Cedrium intermedium</i> ab
<i>Carduus bulbosus</i> Möspeliensium. 1465	<i>Caryophyllus mōtanus</i> alter nonnullorum. 1190	aut foribus confunduntur. 38
<i>Carduus Chondrillodes</i> , Dalech. 1470	<i>Caryota</i> . 364 367	<i>Cedria</i> siue <i>resina</i> ex <i>Cedro</i> . 37-
<i>Carduus echinatus</i> Gesneri. 1481	<i>Cassia</i> & <i>Cassia lignea</i> . 1796	18. 41 & 42
<i>Carduus eriocephalus</i> seu <i>tomento</i> sus. 1488	<i>Cassia cathartica</i> . 113	<i>Cedrides</i> sunt <i>Oxycedri</i> bacca. 36.
<i>Carduus ferox</i> , Lobellij. 1489	<i>Cassia fistula</i> . ibid. & 1799	& 39
<i>Carduus fullonum</i> . 1447	<i>Cassia lignea maritima</i> . 1385	<i>Cedri</i> genera tria. ibid.
<i>Carduus lacteus</i> . 1474	<i>Cassia nigra</i> . 113	<i>Cedri</i> ad varias fabricas usus. 42
<i>Carduus lacteus</i> Matthioli. 1464	<i>Cassia solitaria</i> . ibid.	<i>Cedrium vinum</i> . ibid.
<i>Carduus Leimonia</i> Theoph. 1444	<i>Cassia vires</i> . 114	<i>Cedrinum</i> siue <i>Cedria</i> . 74
<i>Carduus Mariae</i> . 1462. 1464. 1474. & 1475	<i>Cassiam</i> veram hodie habemus necne. 1801	<i>Cedro digna</i> . 42
<i>Carduus Pitahaya</i> fructum ferēs. 1442	<i>Cassutha</i> . 1683	<i>Cedromela</i> . 298
<i>Carduus pratensis</i> Tragi. 1443. & 1444	<i>Cassutha</i> Matthioli. ibid.	<i>Cedrorum</i> & <i>Cedridum vires</i> . 41
<i>Carduus Spherocephalus acutus</i> Dodon. 1482	<i>Castanea</i> . 30	<i>Cedrula</i> . 36
<i>Carduus stellatus</i> . 1473	<i>Castanea equina</i> , nouum <i>Castanea</i> genus, Matth. 33	<i>Cedrus</i> . 35
<i>Carduus stellatus</i> Dalech. 1470	<i>Castanea Humilis</i> , Ioannis Caulij. ibid.	<i>Cedrus Atlantica</i> Plinij. 61
<i>Carduus varius</i> & <i>suarius</i> . 1452	<i>Castanea</i> genera, forma, locus, tempus, vires. 31. 32	<i>Cedrus cariem</i> & <i>vetustatem</i> non sentit. 42
<i>Carduus Veneris</i> . 1447	<i>Castanea</i> glandium praestantissima. ibid.	<i>Cedrus Cretica</i> . ibid.
<i>Carex</i> Tragi. 1007	<i>Castanea</i> glandium praestantissima. 22	<i>Cedrus Lycia</i> , <i>Thuia</i> Bellonio. 59
<i>Carica</i> . 1651	<i>Castanea</i> populares & coctina à Plinio dicta. 31. 32	<i>Cedrus</i> nullas fert vias sed muscum odoratum. 88
<i>Carice</i> . 335	<i>Castanea</i> quomodo coqui debeant. 33	<i>Ceslio</i> Serapioni quid. 369
<i>Carlina</i> . 1452. 1453. 1454. & 1458	<i>Castanea</i> vt afferuntur. ibid.	<i>Celastris</i> Plinius non meminit quare. 158
<i>Carlina</i> . 1464. 1475	<i>Castanea</i> vt afferuntur. 1085	<i>Celastrus</i> Theophrasti. 158. 159
<i>Carlina sylvestris</i> . 1483	<i>Castanea</i> vt afferuntur. 848	<i>Celidonia</i> Officinarum. 1249
<i>Carota</i> . 534. 719	<i>Castanea</i> vt afferuntur. 1366	<i>Celidonia minor</i> , Officinarum. 1048
<i>Carota</i> . 721	<i>Castanea</i> vt afferuntur. 1670	<i>Celtis</i> . 347
<i>Carota Matthioli altera</i> . 722	<i>Castanea</i> vt afferuntur. 1190	<i>Cemos</i> . 1342
<i>Carota vulgaris</i> . ibid.	<i>Castanea</i> vt afferuntur. 1630	<i>Centauraea</i> Officinarum. 1286
<i>Carpinus Aceris</i> genus est, non Vimi. 81	<i>Castanea</i> vt afferuntur. 1657	<i>Centauraea minor</i> officin. ibid.
<i>Carpinus</i> . 94	<i>Cate</i> siue <i>Cato</i> arbor apud Indos. 150	<i>Centaurium</i> . ibid.
<i>Carpobalsamum</i> officinarum. 1773	<i>Cattaria</i> quorundam. 905. 906	<i>Centaurium luteum</i> prius Dalechampi. 1290
<i>Carthamus</i> officinarum. 1449	<i>Cattaria</i> . 908	<i>Centaurium luteum alterum</i> Dalechampi. 1291
<i>Carum</i> & <i>Careum</i> , officinis Carini. 693	<i>Caucalis</i> . 714	<i>Centaurium maius</i> . 1287
<i>Carum Matthioli</i> . 694	<i>Caucalis</i> , Dodonaei. 715	<i>Centaurii</i> maius alterum Clu. 1288
<i>Caryophyllata</i> . 685	<i>Caucalis</i> , Matth. 714	<i>Centaurium minus</i> . 1289
<i>Caryophyllatum</i> Veronensium flore Saniculae vsine Lob. 1269	<i>Caucalis</i> , Pene. 715	<i>Centaurium notium</i> , Dalech. 1291
<i>Caryophyllata</i> Matthioli. 686	<i>Caucalon</i> quidam vocant Moly Indicum. 3594	<i>Centifolia</i> Rosa. 124
<i>Caryophyllata montana</i> Dalechampi. ibid.	<i>Caudaequina</i> officinarum. 1069	<i>Centimorbia</i> . 1062
<i>Caryophyllata mōtana</i> Matthioli. 687	<i>Cauda muris</i> . 1328	<i>Centrum galli</i> . 965
<i>Caryophyllata</i> siue <i>Geum alpinum</i> , Pene. 687	<i>Caulis</i> . 518	<i>Centumcapita</i> . 1458
<i>Caryophyllum</i> & <i>Caryophyllus</i> . 1758	<i>Caulis capitatus</i> . 521	<i>Centumculus</i> & <i>Centumularis</i> herba. 1115
<i>Caryophylli aromatici</i> Matthioli. 1759	<i>Caulorapum</i> . 522	<i>Cepea</i> Dodonaei, non recte. 1090
<i>Caryophylli nostrates</i> . 806	<i>Ceanothus</i> , <i>Acanthus</i> Anguillare. 1489	<i>Cepea</i> Matthioli. 1346
<i>Caryophyllus altilis</i> & <i>sylvestris</i> . 807	<i>Ceanothus lenis</i> Gesneri. 132	<i>Cerasa aspera</i> Matthioli. 310
	<i>Ceanothus spina</i> Theophrasti. 131	<i>Cerasa canina</i> vulgo <i>Helucetiorum</i> que dicantur. 272
	<i>Cedrela</i> . 38	<i>Cerasa ex uno pediculo plura</i> 310
		<i>Cerasa indiana</i> . 600
		<i>Cerasa racemosa</i> . 310
		<i>Cerasa sylvestris</i> . ibid.
		<i>Cerasa a Macedonia</i> . 202
		<i>Ceraforum</i> ex sapore, colore, locis, que sumptis differencia. 311

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

Ceraforum facultates.	313	176	Chamaeifce, Dalechampij.	ibid.
Ceraſus.	309	Chamaeiris, ſeu alia perpuſilla	Chamele -Ipinancana, Pe.	1665
Ceraſus quando primum, vnde,		Iris latifolia, Lobellij.	Chamele Dodonæi & Monſpel-	ibid.
& à quo in Italiam inuecta.		Chameleonis duo genera.	ſum vera.	ibid.
ibid.		Chameleon. 1452. albus & niger.	Chamelea. 1664. Matthioli.	1612
Ceraſus Trapeſuntia.	350	ibid.	Chamelea Germanica.	210
Ceratia.	113	Chameleon albus quare à quibuſ-	Charamei.	1875
Ceratia Plinij, quorundam.	1047	dam Ixia dicatur.	Chelidonia Aetij.	1292
Ceratonia.	112	Chameleon albus Matth.	Chelidonioides.	1112
Ceratonia ſylveſtris.	210	Chameleon exiguus Tragi, Dale-	Chelidonium maius.	1249
Cercis.	216	champ.	Chelidonium maius Matthioli.	1250
Cercis ſiliquata Theophraſti.		Chameleon niger verus Dalechā	Chelidonium minus.	1048
220		pj.	Cher officinarum.	683
Cerebrum in Palma. 367. 368. 369		Chameleon niger Matthioli &	Chermes Arabum & Græcorum	
Cereus ſpinofus.	1819	Fuchſij.	Coccus Baphica idem.	29
Cerinthe Plinij.	1145	Chameleon niger alter, Matth.	Cheruilla.	722
Cerofolium, Gingid. multorum,		ibid.	Chia ſimpliciter (nempe Reſina)	
Chærephyllon Matthioli.	711	Chameleon Salmanticenſis, Plā-	pro Maſtiche.	63
Cerrus ſamina.	6. & 7	nij.	Chiai Catai, herba.	1702
Cerrus.	6	Chameleonta Officinarum.	Chiliodynamis.	1186
Cerucaria Fuchſij.	1197	Chameleuce Plinij, quorundam.	China radix.	1823. 1824
Cerucaria Geſneri.	1164	1049	Chironium.	1186
Cerui ocellus.	720	Chamaelinum, ſive Linum terpen-	Chironium Theophraſti.	1273
Ceruſia.	402	fillum.	Chondrilla.	517. 558
Ceſtrum.	1282	Chamamelum.	Chondrilla, Chondrillon, & Chon-	
Cetrach & Ceterach officinarum.		Chamamelum maritimum.	drile	566
1215. ubi præſtiſſimum.	216	Dalechampij.	Chondrilla prior Cluſij.	568
Chærephyllon. 710. Chærephyllum		Chamamelum ſylveſtre.	Chondrilla rara purpurea, Lobel-	
noſtrum, quorundam.	791	Chamamelum ſylveſtre, Dodon.	lij.	567
Chalcios.	1480	1345	Chondrilla prior Matthioli.	566
Chalcetum Plinij.	554	Chamamelum vulgare ſive ſylve-	Chondrilla altera Matth.	ibid.
Chaliſ arbor.	111	ſtre Matthioli ſive Anthemis.	Chondrilla viminea viſcoſa Pe-	
Chamaeotis, Sambiniſpecies.	266	1344	ne.	568
Chamaeatis Tragi, Rubus Idaus		Chamamepilus.	Chondris quorundam.	893
non ſpinofus.	124	Chamemyſine.	Chondrus qui optimus.	388
Chamaebatos, ſeu humilis Rubus,		Chamemyſine quorundam Dale-	Chonidretos, gummi ſpecies.	1784
Hamirubus Gaza.	12	lechampij.	Chriſtophoriana Dodonæi.	1747
Chamaeceraſus.	201	Chamenerion.	Chryſa.	876
Chamaeceraſus.	310	Chamenerionum.	Chryſanthemum latifolium Do-	
Chamaeceraſus altera.	311	Chamepeuce Cordi.	dodonæi.	1358
Chamaeceraſus montana.	200	Chamepeuce Cordi non ſine erro-	Chryſanthemum Matthioli.	873
Chamaeciſſos.	1309	re.	Myconi.	ibid.
Chamaeciſſos Oribaji.	422	Chamepeuce maritima. 1393. Dale-	Chryſanthemum Peruvianum, ſi-	
Chamaeciſſos quorundam.	1309	lechampij.	ne Planta maxima.	874
Chamaepariſiſus.	940	Chamepeuce Plinij Campherata	Chryſippea Plinij, quorundā.	1085
Chama cypariſiſus Tragi.	1164	minor Dalech.	Chryſocarpos Hedera 1419 1420	
Chamaedaphne.	210. 212. 213	Chamepeuce quorundam.	Chryſocome lanuginosa Dalechā-	
Chamedrops.	1163	Chamepytis.	pj.	1125
Chamadrys.	1162	Chamepytis. 1159. prior Matthio.	Chryſocome Dioſcoridis.	685
Chamadrys montana Dalecham-		ibid.	Chryſocome Germanica.	1344
pj.	1164	Chamepytis altera.	Chryſocome Dodon.	602
Chamadrys ſamina Dodon.	1163	Chamepytis prima, Dioſcoridis,	Chryſomela.	290
Chamadrys vulgaris, mas Fuch-		Pene, & Lobellij.	Chryſothales.	1128
ſij.	1162	Chamepytis tertia ſive altera	Chulem.	1885. 1886
Chamadrys vulgaris ſamina		Matthioli.	Ciborium, aut Cibolium.	457.
Fuchſij.	1163	Chamariphes ſeu Palma humilis	460	
Chamadrys Matthioli.	1162	Matthioli.	Cicera.	471
Chamadrys altera Matth.	1163	Chamerops Plinij.	Cicerbita.	571
Chamael x marina Anglica, Lo-		Chamaſpartium Tragi.	Cicer. 451. eius genera.	ibid.
bellij.	1166	Chamaſyce arbor.	Cicercula.	ibid.
Chamaegeniſta peregrina Cluſij.		Chamaſyce.		Cic
		168. 1660		

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Cicer Ervum quorundam.</i>	462	<i>Cistus folio S. psuchi, Clusij. ibid.</i>		<i>Coca.</i>	1911
<i>Cicer orobizum.</i>	462	<i>Cistus folio thymi, Clusij. ibid.</i>		<i>Coccalon vocant Coni fructu.</i>	48
<i>Cicer sativum.</i>	461	<i>Cistus annu' uterque Clusij. 226.</i>		<i>Cocchos.</i>	1761
<i>Cicer sylvestre 1. Dalech.</i>	464	227		<i>Coccus.</i>	364
<i>Cicer sylvestre 1. Dalech. ibid.</i>		<i>Cisti duo, Pene.</i>	232	<i>Coccus.</i>	27
<i>Cicer sylvestre Matthioli.</i>	463	<i>Cisti Ledi genera decem, Clusij.</i>		<i>Cocci insectorij arbuscula Mat-</i>	
<i>Cicer sylvestre Pene. ibid.</i>		231. 234. 235. 236		<i>thioli.</i>	28
<i>Cichoriacea.</i>	554	<i>Cistus marinus, Dalechampij.</i>		<i>Cocci nisi tempestivè legatur, vi-</i>	
<i>Cichorion.</i>	566	1361		<i>tia ibid. aut probè accretur.</i>	
<i>Cichorium bulbosum.</i>	1392	<i>Citonia Malus officinar.</i>	290	<i>Coccus baphica.</i>	29
<i>Cichorium Constantinopolitanum</i>		<i>Citrageo.</i>	957	<i>Coccus à Cramesino, quod appel-</i>	
<i>Matthioli.</i>	559	<i>Citria, Citrea, Citromela.</i>	298	<i>lant, differt. ibid.</i>	
<i>Cichorium fetidum.</i>	577	<i>Citria mala Theophrasti seculo in</i>		<i>Cochlearia.</i>	1320
<i>Cichorium luteum Dodon.</i>	562	<i>ciboru' vsum nò venerat. 299</i>		<i>Co hlearia Britannica, Dodonai.</i>	
<i>Cichorium strumosum Myconi.</i>		<i>Citria cruda in cibis hodie cū car-</i>		1082	
559. 560		<i>nis assatis. 301</i>		<i>Cochlearia Britannica, Lob.</i>	1320
<i>Cichorium sylvestre Pene.</i>	557	<i>Citrij mali an apud antiquos fa-</i>		<i>Cochlearia, Dodonai. ibid.</i>	
<i>Cici.</i>	1630. 1631	<i>cta fuerit mentio. 299</i>		<i>Coffo! vel Choffolo.</i>	1849
<i>Cicuta.</i>	788	<i>Citrium, Mali Medica fructus.</i>		<i>Coggeryia Theophrasti, siue Cog-</i>	
<i>Cicutaria.</i>	760	301		<i>gyria.</i>	193
<i>Cicutaria. 789. alba, & rub. ibid.</i>		<i>Citrus Officinarum.</i>	625	<i>Cohyne.</i>	1845
<i>Cicutaria latifolia fatidissima cū</i>		<i>Citrum, Thuion Homeri Macro-</i>		<i>Coix. 1624. Myconi.</i>	1625.
<i>flore, Lobel.</i>	790	<i>bio.</i>	61	<i>Coix Theophrasti.</i>	1179
<i>Cicutaria altera latifolia fatidifis-</i>		<i>Clematidis species.</i>	832. 833	<i>Colchicum Anglicū Lobellij.</i>	1571
<i>sima. sine flore, Lobel. y. ibid.</i>		<i>Clematis.</i>	976. 977	<i>Colchicum Ephemerum.</i>	1570
<i>Cicutaria maxima fatida, Lobel-</i>		<i>Clematis altera Batica. 1433. 1414</i>		<i>Colchicum Illyricum, siue Gra: u</i>	
<i>ly.</i>	790	<i>Clematis altera minor longifolia,</i>		<i>nò venenatum, Lobellij. 1174</i>	
<i>Cicutaria palustris, Lobellij.</i>	1093	<i>Lobellij.</i>	1434	<i>Colchicum montanum cum flore,</i>	
<i>Cincinalis.</i>	1209	<i>Clematis altera vrens.</i>	1171	<i>Clusij.</i>	1572
<i>Cineraria.</i>	1383	<i>Clematis III. Matthioli.</i>	1407.	<i>Colchicum montanū minus, Clu-</i>	
<i>Cinna.</i>	420. 424	1408		<i>siy ibid.</i>	
<i>Cinnabari.</i>	1847	<i>Clematis prior.</i>	211	<i>Colchicum Orientale Matthioli.</i>	
<i>Cinnamomi vice, Sabine duplū</i>		<i>Cleonicium.</i>	930	<i>1571. alterum eiusdem. ibid.</i>	
<i>substituitur.</i>	184	<i>Clinopodium. ibid. prius, & alte-</i>		<i>Colocasia 457. & Colocasion vi-</i>	
<i>Cinnamomū. 1796. & Cinnamū.</i>		<i>rum Matthioli.</i>	931	<i>res.</i>	461
<i>Circa.</i>	1413	<i>Clinopodium sylvestre.</i>	912	<i>Colocyntha.</i>	614
<i>Circa 1338. Dalechamp.</i>	ibid.	<i>Clymenum Discor. quorundam.</i>		<i>Colocynthis. 1675. Matthio. 1676</i>	
<i>Circa Tragi.</i>	871	1336		<i>Colocynthis species sex Cordi.</i>	
<i>Circium.</i>	1726	<i>Clymenum Matthioli.</i>	470	<i>1676 1677</i>	
<i>Cirsium.</i>	579	<i>Clymenum minus.</i>	1357	<i>Colocynthis Pyriformis Lobellij.</i>	
<i>Cirsium.</i>	582	<i>Coccus.</i>	1449	<i>ibid.</i>	
<i>Cirsium Anglicum.</i>	583. 584	<i>Cneoron.</i>	270	<i>Colophonias Resina.</i>	72
<i>Cirsium Dodonci.</i>	583	<i>Cneoron.</i>	1667	<i>Colubrina.</i>	1285
<i>Cirsium aliud Dodonci. ibid.</i>		<i>Cneorum.</i>	1363	<i>Colubrina.</i>	1601
<i>Cirsium Germanicum Loniceri.</i>		<i>Cneorum album Dalechampij.</i>		<i>Columbaris, Columbaria, Colūbi-</i>	
583		<i>ibid.</i>		<i>na.</i>	1334
<i>Cirsium luteū Sequanorum. 1483</i>		<i>Cneorum album Matthioli 1364</i>		<i>Columbina.</i>	810
<i>Cirsium maius singularibus capi-</i>		<i>Cneorū aliud Theophrasti, Mat-</i>		<i>Colus Iouis, Lobellij.</i>	966
<i>tulis.</i>	584	<i>thioli.</i>	1365	<i>Colutea scorpiorides.</i>	217
<i>Cissarion.</i>	231	<i>Cneorum Alfonf. Pantij.</i>	1669	<i>Colutea Vesicaria.</i>	214
<i>Cistus siue Cistius.</i>	222. 223	<i>Cneorum nigrum Myron</i>	11364	<i>Colymbades Olinæ quæ.</i>	344
<i>Cisti sp. ciest.</i>	869	<i>Cneorum nigrum quorundā. 1201</i>		<i>CoLytea & Colutea diversæ plan-</i>	
<i>Cisti vves.</i>	224	<i>Cnefrum</i>	1656	<i>ta.</i>	215
<i>Cisti maris species quinque, Clu-</i>		<i>Cnicinum Triphyllum.</i>	504	<i>Colytea tertia Theophrasti.</i>	220
<i>siy. ibid. & 225. 226</i>		<i>Cnicus</i>	1449	<i>Comarus.</i>	196
<i>Cistus femina, eiusdem.</i>	226	<i>Cnicus alter, Clusij.</i>	ibid.	<i>Comarus.</i>	613
<i>Cistus Halimi folio, Clusij. ibid.</i>		<i>Cnicus sativus, Matthioli. ibid.</i>		<i>Comoricha Illyrici gentibus dici-</i>	
<i>Cistus alter folio Halimi, proce-</i>		<i>Cnicus sylvestris prior, Atrachilis</i>		<i>tur quam i hilycam Greci vo-</i>	
<i>rior priore, Clusij. ibid.</i>		<i>Dalech.</i>	1450	<i>cant. 257</i>	
<i>Cistus folio Lananula, Clusij.</i>		<i>Coagulum terre, Plinij.</i>	1073	<i>Comphena, vel Cremphena, vel</i>	
<i>ibid.</i>		<i>Cobbam.</i>	1841	<i>Comphana.</i>	540

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM

Conlex Aucenna Thus. 1732	Corchorus Dalechampi. 565	Cotyledon secunda. ibid.
1733.	Coriandrum. 735	Cotyledon 11. Matthioli. ibid.
Condrudum Plinij. 515	Coriandrum alterum minus odorum, Lobe'l. ibid.	Cracca. 479
Cofera Plinij & Lobellij. 1023	Coriandrum officinarum. ibid.	Crambe. 519. 524
Conferua trichodes. 1022	Coriandrum fatuum, Matthioli. ibid.	Crapula. 73
Conferua trichodes, fme Trichomanes aquaticum Dalechampi. 1023	Coriadrum fme fte Myconij. 736	Crafinenum, Aceris genus. 94
Conifera arbores. 35	Corion & Corianum. 715	Crafula & Crafula maior. 1315
Coniferas arbores fex generu fci Plinius. 48	Coris. 1158. Matthioli ibid. Monfpelienfis Dalechampi. ibid.	Crafula minor, feu Vermicularis. 1130
Coniferas omnes arbores non bene notas habuit Plinius. 43.	Cornu cerui Herbariorum. 668	Crafula officinarum. 1128
Coni, Cedri fructus. 39	Cornu femina. 197	Cratægus, Sorbus terminalis Tra gi & Matthioli. 99
Confligo. 1637. 1638	Cornu mas. 329	Cratægonum. 420
Confolida altera. 1639	Corona Imperialis, Dodon. 1495	Cratægonum fecundum quorundam. 1168
Confolida aurea nemorum, Pena. 1271	Corona fratrum, Herbariorum. 1488	Cremphena, vel Comphena. 46.
Confolida maior officinarum. 4107	Corona Regis. 511. 618	Crepis Dalechampi. 562
Confolida media fme Symphytum. 1075	Corona Veneris. 676	Crespina vva. 134. 135
Confolida minor. 130	Coronopus. 668	Crespinum vinum. 134
Confolida minor quorundam. 813	Coronopi Mafilienfiu Pena. 670	Crefsiobortenfis Herbariorum. 654
Confolida regalis, Fuchfj. 970	Coronopus Matthioli. 669	Crefio nofter feu vulgaris. 658
Cofolida Regia, fme Regalis, Herbariorum. 698	Coronopus quorundam. 1254	Creta marina officinar. 767
Confolida Sarracenica. 1270	Coronopus repens Lobe'lij. 671	Crias Apulej. 1206
Cofolida Sarracenica maior. 1271	Coronopus Ruellijex Dodon. 670	Crimita. 1209
Confolida Sarracenica tertia, Tra gi. ibid.	Coronopus fylueftris fme Serpentina. 669	Crista gallinacea Dodonai. 1073
Conuoluulus. 1423. 1424. 1425. maior, minorque. ibid.	Corrago à Lucanis dicta, quæ vulgo Borrigo. 578	Crista galli altera, feu Phthirion. 1074
Conuoluulus folio Althææ Clufij. 1426	Corruda. 609. 1473	Crithmij fpecies Matthioli. 1379
Conuoluulus minimus Clufij. ibid.	Corruda altera Clufij. 612. 611	Chriftum Chryfanthemum Dodonaj. ibid.
Conus. 4352	Corruda tertia Clufij. ibid.	Crithmum Diofcoridis. 264
Conyza marina Dalechampi. 1366	Corruda Dodonai. 611	Crithmum Matthioli. 767
Conyza montana Myconi. 1201	Corruda Pena. 611	Crithmum Matthioli, Batis Plinij. 768
Conyza tertia quorundam. 1681	Cofium. 1077	Crithmum 11. Matthioli. 1396
Conyza. 1043. maior & minor, Matthioli 1044. media, eiuſd. 1045. minima, Lobellij. ibid.	Cortex Vinteranus. 1858	Crithmus Diofcoridis. 52
Conyza magna Pena. 1046. minor vera, eiuſdem. ibid.	Cortices Roſarum quid. 125	Crithmus quartus Matthioli. 1460
Copal. 1791	Cortufa. 1169	Crocodiium. 1475
Copra. 1762	Coru. 1862	Crocus. 1531
Cor ndicum. 597	Corydalis Galeni. 1292	Crocus abſque flore Matth. 1532
Cor Oſundæ. 1225	Corylus fatua. 319	Crocus montanus, Clufij. 1535
Cor D. Thomæ. 1905	Corylus fylueftris. 101	Crocus fatius Matthioli. 1532
Corallina 1367	Corymbe. 814	Crocus ferotinus cum flore, Lobelij. 1535
Corallina Britannica Pena. 1371	Corymbi. 1416. 1417	Crocus fylueftris I. & 11. Dalechampi. 1533. 111. eiuſdem. 1534
Corallij frutex. 1374	Coſtus hortenfis. 678	Croc° vernus maior Clufij. ibid.
Corallij viues. 1376	Coſtus Illyricus. 758	Crocus vernus minor I. & 111. Clufij. 1534
Corallium vnde dictum. 1375	Coſtus Indicus. 1817	Crocodilium, Carlina caulem habens. 1476
Corallium album & rubrum Lobe'lij. ibid.	Coſtus Moluccæſis corticoſus. 1819	Crocodilium Monfpelienſium Dalech. ibid.
Coralloides fme Corallij albij varietas. 1376	Coſtus Syriacus & Arabicus. 1818	Croton. 1630
Coralloides altera. 1110	Cotinus Plinij. 194	Cruciata alia. 1342. 1343
Corchoros Lobellij. 555. 566	Cotonea. 294	Crupina Belgarum. 567
Corchorus. 1263	Cotoneam Malum primus Caro nominauit. 296	Cruciata, fme Gentiana minor, Matthioli. 1259
	Cottana. 335	Cruciata, fme Gentiana minima, Matthioli. ibid.
	Cotula. 1395	
	Cotula fetida. 954	
	Cotula fetida. 1144. Dodon. 1345	
	Cotula non fetida, feu inodora Buphtalmum Fuchfj. ibid.	
	Cotyledon. 1321. 1608	
	Cotyledon aquatica. 1090	
	Cotyledon 3. Dalechampi. 1322	

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Cruciatâ minima</i> , Matth. 1260	<i>Cyclamens Officina.</i> 1604	<i>des, Gemme.</i> 1564
<i>Cubeba</i> 242. 243. 1813	<i>Cyclaminus.</i> <i>ibid.</i>	<i>Cynoforchis palustris platyphylla,</i>
<i>Cucubalus Plinij. sive Ocimoides</i>	<i>Cyclaminus altera Dodonei.</i> 1413	<i>Gemme.</i> 1562
<i>repens.</i> 1429	<i>Cyclaminus altera orbicularis, Do</i>	<i>Cyperus efculenti.</i> 1584
<i>Cuculata.</i> 1206	<i>donei,</i> 1606	<i>Cyperus & Cyperus.</i> 991
<i>Cuculus.</i> 596	<i>Cyclaminus altera Hederaceis fo-</i>	<i>Cyperus Indicus Dioscor.</i> 1822
<i>Cucumer agrestis Mathioli.</i> 1672	<i>lis, Lobelij.</i> <i>ibid.</i>	<i>Cyperus longus odorator, Lobelij</i>
<i>Cucumer, vel Cucumis sativus.</i> 619	<i>Cyclaminus altera Luca Ghiri.</i>	<i>992. aquaticus eiusd. rotundus</i>
<i>Cucumis anguinus.</i> 621	1429	<i>inodorus, eiusd. ibid. Grami-</i>
<i>Cucumis Indicus.</i> 614	<i>Cyclaminus prior Matth.</i> 1605	<i>neus seu Miliaceus, Pene.</i> 993
<i>Cucumis longus.</i> 621	<i>Cyclaminus tertius Plinij quorum</i>	<i>Cypressus Officinarum.</i> 57
<i>Cucumis puniceus.</i> 619	<i>dam.</i> 1738	<i>Cypria amygdala.</i> 316
<i>Cucumis sativi icon.</i> 620	<i>Cyclaminus vulgaris Lob.</i> 1604	<i>Cyprus arbuscula, eadem ne cum</i>
<i>Cucumis Turcicus Fuch.</i> 616. 617	<i>Cyma in Brassica quid.</i> 528	<i>Ligustro.</i> 252. 253
<i>Cucumis sive Iris, erraticus, &</i>	<i>Cymbalaria Matth.</i> 1322	<i>Cytinus.</i> 223. 224
<i>anguinus, asinus Officin.</i> 1672	<i>Cymbalion.</i> <i>ibid.</i>	<i>Cytinus quid.</i> 304. 305
<i>Cucurbita.</i> 614	<i>Cyminum Officinarum.</i> 696	<i>Cytini appellatio quibus compe-</i>
<i>Cucurbita cameraria longa.</i> 615	<i>Cynara.</i> 1436	<i>tat.</i> 327
<i>Cucurbita cameraria maior.</i> 616	<i>Cynara non aculeata Matth.</i> 1419	<i>Cytisus.</i> 258
<i>Cucurbita cameraria minor. ibid.</i>	<i>Dodonei.</i> <i>ibid.</i>	<i>Cytisi diuersi diuersi auctoribus:</i>
<i>Cucurbita Indica longa, Cucumis</i>	<i>Cynara vulgaris Matth.</i> <i>ibid.</i>	<i>Cytisus Matth. Tragi, Gesneri,</i>
<i>Turcicus Fuchij. ibid. & 617</i>	<i>Cynia.</i> 1628	<i>Alpinus Dalech. vnus & alter</i>
<i>Cucurbita Indica rotunda.</i> 616	<i>Cynocephalis Apuleij.</i> 1339	<i>Pene, primus, secundus, ter-</i>
<i>Cucurbita laciniata.</i> 618	<i>Cynocephalus.</i> 810	<i>tius, quartus Hispanus Clusij,</i>
<i>Cucurbita syluestris.</i> 1675	<i>Cynocrambe.</i> 1628	<i>Cytisi facie Alysson quorundam</i>
<i>Cucurbita verrucosa.</i> 617	<i>Cynocrambe, Matth.</i> <i>ibid.</i>	<i>dam Lobelij</i> 259. 260. 261.
<i>Cuminum satiuum.</i> 656	<i>Cynoglossos.</i> 181	262. 263. 264
<i>Cuminum satiuum Matth.</i> 697	<i>Cynoglossum, Officin. Cinoglossa.</i>	
<i>Cuminum sive stre t. Matth. ibid.</i>	1261	
<i>Cuminum syluestre II. Matth. ibid.</i>	<i>Cynoglossum pusillum Narbonne-</i>	
<i>Cuminum syluestre alterum, Mat-</i>	<i>se.</i> 1262	
<i>thioli.</i> 698	<i>Cynoglossum vulgare floridum</i>	
<i>Cuminum syluestre siliquatum,</i>	<i>Matth. secundum Plinij. ibid.</i>	
<i>Pene.</i> <i>ibid.</i>	<i>Cynoglossum Matth.</i> <i>ibid.</i>	
<i>Cunila.</i> 886	<i>Cynoglossum vulgare Matthioli,</i>	
<i>Cunila bubula.</i> 744	<i>Lycopsis Lacuna.</i> 1263	
<i>Cunila. 8. 6. gallinacea, bubula,</i>	<i>Cynomorion.</i> 485	
<i>cephalote seu capitata. ibid.</i>	<i>Cynomoron.</i> 1750	
<i>Cunila & Cumilago.</i> 1044	<i>Cynorhodon.</i> 1492	
<i>Cupressus.</i> 57	<i>Cynorhodon Polyacanthon vna</i>	
<i>Cupressus cariem non sentit.</i> 59	<i>imagine expressa.</i> 127	
<i>Cupressus Cretica.</i> 182	<i>Cynorhodon vniuersæ Rosam o-</i>	
<i>Cupressus humilis seu pumila.</i> 940	<i>mnem syluestrem Plinius ap-</i>	
<i>Cupressus in Creta quocunque lo-</i>	<i>pellat.</i> 125. 126	
<i>co terram mouerit quæspiam,</i>	<i>Cynorhodos quid.</i> 122	
<i>nisi seratur alia, gignitur, ac</i>	<i>Cynorhodos Rose duo genera, syl-</i>	
<i>protinus emicat.</i> 58	<i>uestria Rosa vulgaris, & Cy-</i>	
<i>Cupressus pumila, sive hortensis,</i>	<i>norrhodos Polyacanthas.</i> 125	
<i>Gallorum.</i> 938	<i>Cynosbati in re medica vires.</i> 123	
<i>Cupressus triseria est. 58. eius tem-</i>	<i>Cynosbati cum Chamabato con-</i>	
<i>peramenta & vires. ibid.</i>	<i>fundit Plinius.</i> 122	
<i>Curcuma Officinarum.</i> 1822	<i>Cynosbati quidam Capparin ap-</i>	
<i>Cusculum.</i> 27	<i>pellarunt.</i> 115	
<i>Cuscuta Herbariorum & Offici-</i>	<i>Cynoforchis.</i> 1549	
<i>narum.</i> 1683	<i>Cynoforchis Conopsea.</i> 1563	
<i>Cyamos.</i> 460	<i>Cynoforchis Dracotias Gême. ibi.</i>	
<i>Cyamus.</i> 436	<i>Cynoforchis leptophylla Gemma.</i>	
<i>Cyanus maior 437. minor. ibid.</i>	1564	
<i>Cyanus repens. ibid.</i>	<i>Cynoforchis maior Lobel. Serapias</i>	
<i>Cyanus supinus. ibid.</i>	<i>Dioscor Gemma.</i> 1556	
<i>Cycas quid vocent.</i> 364	<i>Cynoforchis palustris altera lopho-</i>	

D

<i>Dactyli.</i> 362. 364	<i>Dalmatica maior Iris.</i> 1613
<i>Damasonium.</i> 1250. 1261	<i>Damasonium, seu Alisma Dios-</i>
<i>Damasonium, seu Alisma Dios-</i>	<i>coridis verum, quorundam.</i>
1017	
<i>Damasonium, seu Alisma, Mat-</i>	<i>thioli.</i> <i>ibid.</i>
<i>Damasonium stellatum.</i> 1058.	<i>Alpinum.</i> <i>ibid.</i>
<i>Daphnoides.</i> 210. <i>eius historia</i>	<i>obscura est. ibid.</i>
<i>Daphnoides planta acerrima &</i>	<i>feruidissima.</i> 212
<i>Dardana, Apuleij.</i> 1054	<i>Darian. Camalarga.</i> 1837
<i>Datura, Acosta.</i> 1913	<i>Daucus, Daucum, & Daucium.</i>
716	
<i>Dauci alterum genus Fuch.</i> 765	<i>Daucus I. genus Dalech.</i> 717
<i>Daucus I II genus Dalech. ibid.</i>	<i>Daucus I. Matth.</i> 716
<i>Daucus I. I. Matth.</i> <i>ibid.</i>	<i>Daucus Officinarum.</i> 719
<i>Daucus pratensis Dalech.</i> 718	<i>Delphinium Plinij.</i> 866
<i>Dendrobium.</i> 36	<i>Dendromalache.</i> 588. 592
<i>Dens caninus.</i> 432. 434. 564	<i>Dens caninus Belgarum.</i> 1567
<i>Dens leonis.</i> 559 564	<i>Dentaria</i>

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Dentaria maior</i> Matth. 1296. minor. <i>ibid.</i> & 1297	<i>Draba.</i> 663. 664. 1182	<i>Elemmi lacryma seu Gummi Elzni officinar.</i> 153
<i>Dentellaria</i> 1045. 1139. <i>Dalecham</i> p <i>j.</i> <i>ibid.</i> altera <i>Dodonai. ibid.</i>	<i>Draco arbor.</i> 1847	<i>Eleoselinum.</i> 700. 701
<i>Dentellaria</i> rubra <i>Dalecham</i> p <i>j.</i> 1297	<i>Dracanea minor.</i> 1596	<i>Elicano.</i> 1794
<i>Dentellaria</i> Rondeletj. <i>ibid.</i>	<i>Dracantium.</i> 1601	<i>Elichrys.</i> & <i>El. iochrisum.</i> 775
<i>Denticula canis.</i> 1189	<i>Dracunculus.</i> <i>ibid.</i> & 1285	<i>Elichrisum.</i> Matthioli. 776. <i>Italicum.</i> eiusd. <i>ibid.</i>
<i>Denticulata</i> <i>Dalecham.</i> 1296	<i>Dracunculus hortensis.</i> 685	<i>Elipbacos.</i> 879
<i>Destitutio Chirurgorum.</i> 1916	<i>Dracunculus. siue Serpētaria maior.</i> <i>Dodon.</i> 1602	<i>Elleboraster maximo flore & semine pregnans.</i> 1638
<i>Diospensa.</i> 1263	<i>Dracunculus palustris.</i> 1602	<i>Elleboraster Belgarum.</i> Lobelij. 1639
<i>Dictamni in Creta legendi cautio.</i> 116	<i>Drakenaradix.</i> 1838	<i>Elleborine.</i> 1111
<i>Dictamnium.</i> 168	<i>Drum Cordj.</i> 1281	<i>Elleborine ferruginea</i> <i>Dalecham</i> p <i>j.</i> 1146
<i>Dictamnium album.</i> 872	<i>Drupa oleæ quæ.</i> 342. <i>oleum ex his;</i> 345	<i>Elleborine Dioscoridis.</i> 1126
<i>Dictamnium & Pseudodictamnium.</i> 892	<i>Dryophanon</i> <i>Plinij.</i> 664. 1126	<i>Elleborine Dodonej.</i> 1312
<i>Dictamnium verum.</i> 893	<i>Dryopteris.</i> 1227. Matthioli. <i>ibid.</i>	<i>Elleborine siue Epipactis.</i> quorundam. 828
<i>Digitalis.</i> 831. purpurea. <i>ibid.</i> purpurea aut alba Lobell. <i>ibid.</i>	<i>Dryopteris Dalecham.</i> 1228	<i>Elleborine.</i> Matthioli. 1312
<i>Digitellus.</i> 1128	<i>Dryopteris alta</i> <i>Dodon.</i> 1227	<i>Ell borine Punicea.</i> 146
<i>Digit citrini</i> <i>Auicenna.</i> 1569	<i>Dryopteris nigra</i> <i>Dodon.</i> 1228	<i>Elleborine quorundam.</i> 1260
<i>Dilegi siue Delegi</i> <i>Auicenna.</i> 1687	<i>Drypis.</i> 1479	<i>Ellebori nigri vires.</i> 1639
<i>Diomphas.</i> 1156	<i>Drypis Lonicerj.</i> 1480	<i>Elleborum vel Elleborine vocatur in Aulycira quod aliis Sesamoides.</i> 1638
<i>Diospyros siue Faba Græca.</i> angustifolia seu Lor ^o <i>Africana.</i> 349	<i>Drypis Tgeophr.</i> <i>Anguillare.</i> <i>ibi.</i>	<i>Elleborum nigrum.</i> Matth. flore purpureo. 1634
<i>Diospyros siue Faba Græca.</i> latifolia. <i>Pseudolotus</i> Matth. <i>ibid.</i>	<i>Dulcamara.</i> 1338	<i>Elleborum nigrum quorundam.</i> 1268
<i>Dipcad candidis floribus</i> Lobelij. 153	<i>Dulcamara Cordi.</i> 1605	<i>Elleborus a'bus.</i> 1631
<i>Dipcad Chalcedonicum.</i> Bulbus vomitorius Matthioli. <i>ibid.</i>	<i>Dulcamara Herbariorum.</i> 1407	<i>Elleborus albus.</i> Matthioli. 1632
<i>Dipsacus.</i> 1447. Matthioli <i>ibi</i> <i>facinus a'fer.</i> eiusd. <i>ibid.</i>	<i>Dulcamara siue Vitis sylvestris.</i> Matthio. 1413	<i>Elleborus niger.</i> 1633
<i>Dipsacus vnaquodvis dictus.</i> 1471	<i>Dulcichinum.</i> 1584	<i>Elleborus niger II. Dodonej.</i> 1636
<i>Dipsacus sylvestris maior</i> Fuchsj. 1448	<i>Dulcis radix.</i> 247	<i>Elleborus niger III. Dodonai.</i> <i>ibi.</i> & 1637
<i>Dipsacus sylvestris minor</i> seu <i>Virga pastoris.</i> Matthio. <i>ibid.</i>	<i>Duraciria vnde dicta.</i> 293. 294	<i>Elleborus niger adulterinus</i> sy'ue stris. Fuchsj. 1637
<i>Diræa.</i> 1338	<i>Duriones.</i> 1869	<i>Elleborus niger III. Matthioli.</i> 1635
<i>Dolichus.</i> 473. 474		<i>Elleborus niger Matthioli.</i> flore herbaceo. 1639
<i>Donax.</i> 1002		<i>Elymus.</i> 411
<i>Dorea siue Herba aurea</i> <i>Narbonensium.</i> <i>Pena.</i> 1273		<i>Embelgi.</i> 1687
<i>Doripetron.</i> 1344		<i>Empetrum.</i> III. 1671
<i>Doronicum.</i> 1201		<i>Empetrum phacoides.</i> Herba terribilis <i>Narbonensium.</i> 1771
<i>Doronicum brachiata radice.</i> <i>Aconitum pardalianches</i> <i>Plinij</i> & Matth. 1203		<i>Empetrum Rondeletj.</i> 767
<i>Doronicum minus</i> <i>Officinarum.</i> <i>Pena</i> & Lobelij. 1202		<i>Empetron quorundam.</i> 1213
<i>Doronici Rom.</i> <i>Aconitum</i> <i>par dalianches antiquorum.</i> <i>Dod.</i> 1737		<i>Empetrum Tragi.</i> 1126
<i>Doronicum radice scorpj figura.</i> <i>Dalecham.</i> 1203		<i>Endiuia vulgarior officinarum.</i> 546
<i>Dorycnium cognere planta</i> <i>Clusij.</i> 1724		<i>Endiuia Tragi.</i> 564
<i>Dorycnium Monspelienfe</i> <i>Dalecham</i> p <i>j.</i> <i>ibid.</i>		<i>Ennecephylon</i> <i>Plinij</i> quorundam. 1637
		<i>Ennecephylon</i> <i>Plinij.</i> 1140
		<i>Ensis siue Enficulus.</i> 1620
		<i>Enula Campana.</i> officinarum. 867
		<i>Ephemerum.</i> 1570
		<i>Ephemerum non lethale.</i> Matthi. 1574

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Ephedron.</i>	1069	<i>Eryngium aliud montanum, Da-</i>	tum in medicamentis. 453. 454.
<i>Epimedium.</i> 1094. <i>Dodonæi.</i>	1095	<i>lech.</i>	1460
<i>Epimelis arbor.</i>	196	<i>Eryngium planum Matth. ibid.</i>	455
<i>Epimelis.</i>	198	<i>Eryngium pusillum planum Mu-</i>	<i>Fabæ quare abstinendum censue</i>
<i>Epimelis altera, Cotonaster Gesne</i>		<i>toni, Lobellij.</i>	1461
<i>ri.</i>	199	<i>Erysimum.</i>	652
<i>Epimelis, Mespili genus.</i>	333	<i>Erysimum Dodonæi.</i>	542
<i>Epipactis.</i>	1311	<i>Erysimum Theophrasti.</i>	383
<i>Epipactis Anguillare.</i>	1126	<i>Erysimum verum.</i>	653
<i>Epipactis, quorundam.</i>	828		1815
<i>Epipetron.</i>	912	<i>Erythrodanum.</i>	1329
<i>Epithymum.</i> 1681. <i>Matthiæ.</i>	1682	<i>Erythrodanum marinum.</i> 1385. &	
<i>Epithymum Græcorum & Arabu</i>			1386
<i>Libellij.</i>	ibid.	<i>Esculum eandem cum Palyphyl-</i>	<i>Fabæ Pontica.</i>
<i>Equapium Gazæ.</i>	703	<i>lo quidam faciunt, Plinius tan-</i>	1315
<i>Equisetum, Equiseta, Equisetis,</i>		<i>quâ diuersarum utriusque mē-</i>	<i>Fabata seu Fabatapuls.</i>
<i>Equinatis.</i>	1069	<i>minit.</i>	8
<i>Equisetis 1 asparagus, Dodo.</i>	1069	<i>Esculus mas & fœmina. 5. unde</i>	<i>Faba crassa.</i>
<i>Equisetum 1.</i>	ibid.	<i>dicatur. ibid. & 6</i>	1315
<i>Equisetis minoris flores.</i>	1070	<i>Esula siue Ezula.</i>	1652
<i>Equisetum alterum siue minus</i>		<i>Esula maior Dodonæi Hist. purg.</i>	1653
<i>Matth.</i>	ibid.	<i>Esula minor Dodon. Hist. purg.</i>	ibid.
<i>Equisetum tertium & quartum,</i>		<i>ibid.</i>	
<i>Matthioli.</i>	1071	<i>Esula minor Italicorum.</i>	1648
<i>Equisetum Iuncum Tragi. ibid.</i>		<i>Esular rotunda officinar.</i>	1658
<i>Eranthemus.</i>	568. 969	<i>Esula maior Germanica, Pene.</i>	1654
<i>Ereuthedantum Theophrasti, quo-</i>		<i>Esulara Pene & Lobellij.</i>	1655
<i>rundam.</i>	1062	<i>Esulara à Lio Venetorum Insu-</i>	
<i>Erica.</i> 185. eius quindecim species.		<i>la Pen. alia.</i>	ibid.
<i>ibid. & 186. 187. 188. 189. 190</i>		<i>Esula dulcis, Tragi.</i>	1656
<i>Erica.</i>	1482	<i>Esula minima, Tragi.</i>	ibid.
<i>Erica Alexandrina Cortusi.</i>	1669	<i>Esula sylvestris Tragi.</i>	1655
<i>Erica primæ & quartæ Clusij ica-</i>		<i>Ettalch.</i>	1838
<i>nes.</i>	284	<i>Elymodrys Macedonum.</i>	4
<i>Erica prius genus.</i>	1200	<i>Euhoice glandes.</i>	30
<i>Ericæ quæ & Myrice.</i>	181	<i>Eufrafia.</i>	1166
<i>Erigeron, Latinus Senerio.</i>	574	<i>Eufrafia secunda Dodonæi & Lo-</i>	
<i>Erinacca Clusij.</i>	1485	<i>bellij.</i>	1167
<i>Erinæ siue Erineos.</i> 1086. <i>Matt.</i>		<i>Eufrafia Lacuna.</i>	422
<i>& Dalech.</i>	1086	<i>Eufrafia Matth.</i>	1167
<i>Eristihal'es.</i>	1128	<i>Emonymus.</i>	270
<i>Eristihales, Dalechampi.</i>	1094	<i>Eupatorium, siue Hepatoriū.</i>	1151
<i>Eristihales.</i>	1128	<i>Eupatorium officinarum.</i>	1038
<i>Eruango.</i>	484	<i>Eupatorium vulgare.</i>	1063
<i>Eruca.</i> 649. <i>fatua.</i>	ibid.	<i>Eupetalos.</i>	210
<i>Eruca cinerea.</i>	1383	<i>Euphorbium.</i> 1690. <i>Dodonæi.</i>	1691
<i>Eruca cinerea Dalechampi.</i>	651	<i>Euphrasia.</i>	1168
<i>Eruca maritima.</i>	1394	<i>Euphrosyon.</i>	578. 581
<i>Eruca muralis, Dalechampi.</i>	1134	<i>Euplea, vel rectius Euclea.</i>	1340
<i>Eruca palustris.</i>	650	<i>Exacon.</i>	1286
<i>Eruca peregrina Clusij.</i>	651		
<i>Eruca sylvestris.</i>	650		
<i>Eruca sylvestris angustifolia.</i>	651		
<i>Eruilia, siue Ochrus.</i>	465		
<i>Eruilia sylvestris Dodo.</i>	462		
<i>Eruum.</i>	468		
<i>Eruum sylvestre.</i>	469		
<i>Eryngium.</i>	1458		
<i>Eryngium, & Eryngium luteum.</i>	1438		
<i>Eryngium pumilum Clusij.</i>	1461		

F

F Aalim, Theueti. 1910
 Fabæ seu Fabulum. 451
 Fabæ diuersis in terris maiores & minores producantur & alia atque alia forma. 452
 Fabæ usus & vires, cum in cibis, 337. 338
 Ficus qua arte parua admodum fiant ut in vasculis super fenestris spectentur. 540
 Ficus Aegyptia. 113. 140
 Ficus idæa. 199
 Ficus

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

Ficus Idæa Theophrasti, Alexan-
drina Plinij. 191
Ficus Indica. 1853
Ficus Indica, sive *Opuntia*. 1795
Ficus inferorum. 1790
Ficus Nigritarum. 1842
Ficus nostras sativa. 336
Ficus Pharaonis. 1840
Filago. 1115
Filicula & Felicula. 1111 1229
Filipendula, *Cenante multorum*.
782
Filipendula Alpina. 1138
Filiquastrum. 1225
Filix ante patrem fructus Lyssimachij purpurei siliquati. 1060
1069
Filix. 1222
Filix aquatica, Dodon. 1225
Filix arborea, Tragi. *ibid.*
Filix florens, Tragi. *ibid.*
Filix mas, Matth. 1222. *femina eiusdem*. *ibi.*
Filix querna & Filix quercus.
12. 7
Filix saxatilis, Tragi. 1226
Fistici officinar. 160
Flammula 1171. Dod *ibid.* Matth.
ibid.
Flammula aquatica. 1041. 1042
Flammula, vulgi. 1035
de Floribus & Coronis. 792
Flos amellus, Virgilij. 1048
Flos amoris, Herbariorum. 870
Flos Aquilegie. 1408
Flos cancri, quorundam. 1001
Flos Coccineus. 876
Flos Constantinopolitanus, alij
Hierosolimitanus, alij *Creticus*. 819
Flos coronarius Herbariorum. 355
Flos cuculi. 659
Flos cuculi, Tragi. 1068
Flos S. Iacobi, Eufhsij. 575
Flos Iouis. 1408
Flos Mechioacan, Monardis. 1901
Florum regium multi opinantur esse Delphinium. 1743
Flos sanguineus. 1918
Flos Solis. 869
Flos Solis minor, Lobell. 874
Flos solis, Matth. 740
Flos tigridis. 1624
Flos Trinitatis. 800
Flos Trollius. 1034
Flos veni. 970
Feniculum. 668
Feniculum marinum. 1671
Feniculum sylvestre Loniceri. 689
Feniculum vulgare. 689

Feniculum aquaticum, Dalecha. 1023
Feniculum porcinum. 745
Feniculum tortuosum, Dalec. 749
Fenumgracum. 480
Fenumgracum alterum Dodon. 481
Fenumgracum sativum Matthi. 480
Fenumgracum sylvestre Dalech. 481
Fenumgracum sylvestre Tragi. 250
Folium arboris sanguinis Draconis. 1847
Folium arboris Draconis ex Indijs delatum. 1848
Folium Copey. 1850
Folium dictum Higuero. 1843
Folium & folium Indicum. 1776
Folium masetum. 717
Folium odoratum quorundam. 982
Fraga. 613
Fragaria. *ibid.*
Fragula Matthio. 200
Fraxinella, seu *ictamnium albu*, a quibusdā *pumila* *Fraxinus*. 872
Fraxinus & eius genera. 82
Fraxini fructus & pilula. 84
Fraxinus quibus locis gaudeat, eiusque *vires* *ibid.* & 85
Fraxiniligni usus, extrema pag. 99
Fraxinus bubula. 1330
Fritillaria 1330
Fructus Balsami Peruviani, Monardi. 1775
Fructus cholagogus. 1789
Fructus & Cortex ad dysenteria. 1788
Fructus higuero ex Clusio. 1844
Fructus leucoma nūcupatus. 1877
Fructus Sanguinis Draconis. 1848
Fructus sub terra nascens. 1876
Fructus varij peregrini. 1859. 860
Fruges quid. 371
Frugis nomen frumento, frumentum tritico latius patet. 371
Frugum morbi. 513
Frugum morbi verius quam pestes, quæ. 47
Frumentacea quæ dicuntur. 371
Frumenti genera. 372 373 374
Frumentum Canariense. 415
Frumentum italicum ante cuncta laudatum. 373. quæ cui ab eo dotes. *ibid.*
Frumentum Seracenicum Erythrum Theop. & Iruo Plinij. 383

Fucus sive *Alga Intybacea*. 1373
Fucus sive *Phucus marinus* & *Alga*. 1369
Fucus, sive *Alga marina graminæa*. 173
Fucus, seu *Alga marina*, Lobellij. *ibid.*
Fuci marini temperamenta & vires. *ibid.*
Fucus, sive *Alga tinctoria*. 1372
Fucus capillaceus sive *Corallina*. 1371
Fucus Ferulaceus Lobellij. 1373
Fula. 1762
Fumaria. 1295
Fumaria bulbosa Matthioli. 1192
Fumaria lutea sive *montana Corydalis* Matthioli. 12. 11292
Fumaria phragmites, Dod. 1192
Fumaria species Myconi. 1293. 1294
Fumus terra officinarum. 1291
Fungi & quercu. 10
Fungi & Tubera. 1585. 1586 1587
Fungus non est quæ hypocistis. 1224
Fusanum & Fusaria. 270
Fuserna Abietis pars superior. 1153.
Fusus agrestis. 1467

G

Gaiacum quale. 166
Galacton. 487
Galanga. 893. maior & minor, *Pena*, *ibid.* *Acosta*. 1894
Galaxias. 1474
Galbanifera Ferula, Lobell. 754.
755
Galbulus, ita vocatur *Cupressi nux*. 571
Galea. 9. 5976
Galea montana Dalecham. 1139
Galeopsis, Eufhsij. Cordi. Do. 1085
Galeopsis lutea Dalecham. 1248
Galeopsis, vel *Caltopsis*. 1247. Matth. *ibid.*
Galeopsis purpurea, Lobell. 1248
Galium. 1088. *luteum*, Matthio. *ibid.* *album*, quorundam. *ibid.*
Gal'a. 15
Galle excrements quercus. 8. & 9
Galla quercus fructus a Diosc. appellatur. 15
Gallarum duo genera, *Ospharitis* & *innocens*. 15. 16
Galla animal ex se ignit. 17
Ex Gal'a annone pestilentis aurea, bellorum, hyemis, præsagia ducuntur. *ibid.*
Galls crus Apuleij. 426

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Gallitricum.</i>	965	<i>Glandes Platyphilli perfectæ & imperfectæ.</i>	3	<i>Gramen:</i> 1003. <i>aquaticum.</i> <i>ibid.</i>
<i>Gallitricum, siue Sclarea.</i>	966	<i>Glandes Sardiæ.</i> 30. <i>Touis, ibid.</i>		<i>aculeatum. ibid.</i> <i>Arundina-</i>
<i>Garosmum.</i>	543	<i>Euboica.</i> <i>ibid.</i>		<i>ceum.</i> 1004. <i>nigrum ibid. trian-</i>
<i>Garum olens.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Glandifera quædam arbores Smi-</i>		<i>gulum. ibid.</i> <i>Parnasi</i> 1005 <i>Par-</i>
<i>Gelofia Tragi.</i>	540	<i>lacs appellata.</i> 24		<i>nasi duplicato flore, Lobellij.</i>
<i>Gelseminum.</i>	1430	<i>Glandiferarum arborū varia ge-</i>		<i>ibid. aliud Parnasi. ibid.</i>
<i>Geminalis.</i>	964	<i>nera.</i> 1		<i>Gramen aculeatum Matthio.</i> 435
<i>Genicularis.</i>	814	<i>Glandis calix.</i> 15		<i>Gramen bulbosum, nodosum.</i> 434
<i>Genipat.</i>	1833	<i>Glandis nomine latinis omnis</i>		<i>Gramen Cyperoides.</i> 432. 433
<i>Genista.</i>	167	<i>fructus continetur.</i> 1		<i>Gramen anthoxanthum Dalech.</i>
<i>Genista nominis ratio.</i>	168	<i>Glandis nomine permulta fructuū</i>		<i>425. 426</i>
<i>Genista angulosa, siue vulgaris.</i>		<i>genera comprehenduntur.</i> 310		<i>Gramen aureum Dalech.</i> 430
172		<i>Glandium esus apud varias gen-</i>		<i>Gramen bulbosum Dalechampij.</i>
<i>Genista humilis, siue Tinctorius</i>		<i>tes.</i> 13. & 14		427
<i>flor.</i>	174	<i>Glandium præstantissima Casta-</i>		<i>Gramen echinatum Dalechamp.</i>
<i>Genista minima.</i>	173	<i>nea.</i> 32		432
<i>Genista lluensis.</i>	174	<i>Glans quæ proprie dicatur.</i> 1		<i>Gramen glumofum Dalechamp.</i>
<i>Genista spinosa.</i>	164	<i>Glans Cerri.</i> 7		429
<i>Genistatinctoria Clusij.</i>	175	<i>Glans Suberi pessima.</i> 23		<i>Gramen iuncum Dalechampij.</i>
<i>Genista in medic. correctio.</i>	170	<i>Glans vnguentaria.</i> 365. 1684		424. 425
<i>Genistella.</i>	173	<i>Glandis vnguentariae siliqua cū</i>		<i>Gramen lanatum Dalechampij.</i>
<i>Gentiana.</i>	1158	<i>fructu, Pen.</i> 1685		<i>ibid.</i>
<i>Gétianella.</i> 818. <i>minima latifolia.</i>		<i>Glaſtum.</i> 499. 500		<i>Gramen leucanthemum Dalech.</i>
<i>ibid. angustifolia.</i>	829	<i>Glaſſificatio & cultus.</i> 500		425. 426
<i>Germanicum Echiorides.</i>	1142	<i>Glaſtum montanum, Dalec.</i> 1203		<i>Gramen minimum Dalechamp.</i>
<i>Geranium.</i>	1275	<i>Glaucium Dioscoridis.</i> 618		424
<i>Geranium batrachoides.</i>	1279	<i>Glaux.</i> 487		<i>Gramen murorum Dalechamp.</i>
<i>Geranium batrachoides alterum</i>		<i>Glaux Clusij.</i> 488		428
<i>longius radiculatum, Lobellij.</i>		<i>Glaux Dodonæi.</i> 487		<i>Gramen nemorum Dalechamp.</i>
1280		<i>Glaux vulgaris.</i> 250		429
<i>Geranium I. quorundam, Dalech.</i>		<i>Glinon Aceris genus.</i> 94		<i>Gramen pinnatum Dalechampij.</i>
1275		<i>Globularia.</i> 865		431
<i>Geranium gruinalæ Dodon.</i> 1278		<i>Gluma quid.</i> 377		<i>Gramen pratense Dalecham.</i> 424.
<i>Geranium tuberosum Dodo.</i> 1276		<i>Gluten Albolin Auicenna, Resina</i>		425
<i>Geranium hemaiodes.</i> 1278. 1279		<i>Terebinthina.</i> 62		<i>Gramen spicatum Dalecham.</i> 427
<i>Geranium fuscum Lobellij.</i> 1279		<i>Glycyrrhiza seu Glycyrrhizon.</i>		<i>Gramen triglochin, seu vermicu-</i>
<i>Geranium I. Matth.</i> 1275		247		<i>latum Dalechampij.</i> 431
<i>Geranium aliud secundum, Matt.</i>		<i>Glycyrrhiza Echinata Dod. ibid.</i>		<i>Gramen exile.</i> 432
1277		<i>Glycyrrhiza Echinata Matt. ibid.</i>		<i>Gramen filiceum, seu polianthes.</i>
<i>Geranium II. Dioscoridis, III.</i>		<i>Glycyrrhiza non Echinata, Scythi</i>		428
<i>Matthioli. Pes columbinus.</i>		<i>ca herba.</i> 248		<i>Gramen hordeaceum, Holcus Pli-</i>
1276		<i>Glycyrrhiza quibus locis vel plu-</i>		<i>nij.</i> 427
<i>Geranium III. Matth.</i> 1280		<i>rima vel optima noscatur.</i> 250.		<i>Gramen Iſchemon Plinij, siue Da-</i>
<i>Geranium VI. Matthioli.</i> <i>ibid.</i>		<i>vires.</i> 251		<i>ctylon.</i> 426
<i>Geranium tertium Plinij, Acus</i>		<i>Glycyrrhiza radix pro polu Sey-</i>		<i>Gramen Iuncum vel Arundi-</i>
<i>muscata.</i> 1277		<i>is in aquarum penuria.</i> 250		<i>naceum, quorundam.</i> 1001
<i>Geronto pogon, siue Saſſifica Italo</i>		<i>Glycyrrhiza sylvestris. ibid. & 251</i>		<i>Gramen Leucanthemum.</i> 422
<i>rum.</i> 1079		<i>Gnaphalium.</i> 1115		<i>Gramen Manne.</i> 414
<i>Gethyum.</i> 1538		<i>Gnaphalium Matth.</i> <i>ibid.</i>		<i>Gramen Manne prius Matthio.</i>
<i>Geum Alpinum Pene</i> 687		<i>Gnaphalium marinum.</i> 1387. <i>Da-</i>		414
<i>Geum Plinij.</i> 685		<i>lech. ibid. tomentosum. ibid.</i>		<i>Gramen Manne prius Dodonæi.</i>
<i>Gingiber.</i> 1890		<i>Gnaphalii montanū Dalech.</i> 1116		<i>ibid.</i>
<i>Gingidium.</i> 709		<i>Gnaphalium vulgare, Fuchsij.</i>		<i>Gramen Manne secundum Do-</i>
<i>Gingidium folijs Baucis, Syriacū</i>		1115		<i>don. ibid.</i>
<i>Lobellij.</i> 710		<i>Gnaphalium, siue Linum pratense,</i>		<i>Gramen minimum.</i> 432. 433
<i>Gingidium Matth.</i> <i>ibid.</i>		<i>Tragi.</i> 1026		<i>Gramen nodosum.</i> 429
<i>Gith.</i> 444. 812		<i>Gomphana.</i> 540		<i>Gramen, Oxyagrostis maritima.</i>
<i>Githago.</i> 438		<i>Gor.</i> 1838		1391
<i>Gladiolus.</i> 1620. <i>Matthioli. ibid.</i>		<i>Gossipion seu Gossipium.</i> 221		<i>Gramen panniculofum Phalarioi</i>
<i>Gladioli species à nostrate diuersæ.</i>		<i>Gramen.</i> 420		<i>des, Lobellij.</i> 432. 433
1625				<i>Gramen Parnasi.</i> 425
				<i>Gramen</i>

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Gramen Parnasti, Cordi & Loniceri.</i>	1260	<i>Gummi ex Rhu.</i>	109	<i>Helianthe.</i>	ibi.
<i>Gramen polyanthes, Aegilops Plinij</i>	428	<i>Gupalu.</i>	1875	<i>Helianthemum, sive flos solis, Hyssopus nemorensis, Dado.</i>	869
<i>Gramen tertium Plinianum.</i>	1128	<i>Gymnocrithon.</i>	398	<i>Helianthis species, Pene.</i>	ibid.
<i>Gramen tomentosum, Alopecurus vera Plin. & Theophrasti.</i>	430	<i>Gynecanthe.</i>	1411	<i>Helicen Arcades quid vocet.</i>	174.
<i>Gramen vulgare Matth. Dalech. Lobell. Dod.</i>	421				
<i>Gramen vulgatum pratense</i>	422				
<i>Gramen sulcatum.</i>	434				
<i>Gramen Typhinum.</i>	432. 433				
<i>Granadille.</i>	1918				
<i>Grana Iuniperi.</i>	66				
<i>Grana tinctorii officinis quid.</i>	27				
<i>Grana Paradisi.</i>	1810				
<i>Grana tinctorii duo genera Monachis in Mesuem.</i>	29				
<i>Grana tinctorii vires & facultates.</i>	30				
<i>Granum.</i>	27				
<i>Granum quid.</i>	377				
<i>Granum Cnidium non est Chameleae fructus.</i>	1666				
<i>Granum Gnidium perperam vocata Laureolabaccae.</i>	213				
<i>Granum Nil.</i>	1425				
<i>Granum regium</i>	1630				
<i>Granum tinctorium, aut flavum.</i>	151				
<i>Gratia Dei.</i>	436 869. 1085				
<i>Gratia Dei Germanicæ.</i>	1279. 1281				
<i>Gratiola, Matthio.</i>	1085				
<i>Gratiola, recentiorum.</i>	869				
<i>Grossularia, alba. 131. rubra. 132. nigra.</i>	133				
<i>Grossus.</i>	335				
<i>Gruina & Gruinalis.</i>	1275				
<i>Gruinalis, Dod.</i>	1278				
<i>Guacatane Monardis.</i>	1906				
<i>Guaiacum Patavinum.</i>	350				
<i>Guaiana.</i>	1836				
<i>Guanabanus.</i>	1835				
<i>Guanabani fructus, Ouedo. ibid.</i>					
<i>Guayacum seu Gaicum.</i>	1749				
<i>Guibara Copey.</i>	1850				
<i>Gulicola, Fesfo culeolus, in Nuce quid.</i>	321				
<i>Gummi ex Acacia electio.</i>	162				
<i>Gummi Arabicum officinis dilutum.</i>	ibid.				
<i>Gummi dragaganti.</i>	1477				
<i>Gummi tlemntis officinarum.</i>	153				
<i>Gummi Iuniperinum.</i>	68. 69				
<i>Gummi mastiches similitum in Chondrille ramulis.</i>	566				
<i>Gummi nullam igni liquatur, nisi additis alijs, sed vititur.</i>	153				
<i>Gummi optimum ex Spina Aegyptia.</i>	160.				
<i>Gummi ad podagram.</i>	1793				
		<i>H</i>			
		<i>Hacchie arbor Indica.</i>	151		
		<i>Halaadth Serapioni & Auenenna, Lycium.</i>	151		
		<i>Hairi.</i>	1844		
		<i>Haloderon Theophrasti.</i>	485		
		<i>Halicacabum.</i>	596. 598		
		<i>Halicacabum peregrinum, seu Vesicaria repens Fuchsj.</i>	598		
		<i>Halicacabum peregrinum, sive Vesicaria repens Matt.</i>	ibid.		
		<i>Halicacabus.</i>	1719		
		<i>Halimatia.</i>	295		
		<i>Halimus. 294. eius historia controuersa.</i>	ibid.		
		<i>Halimus verus Dalechamp.</i>	265		
		<i>Halimus vulgaris Matth.</i>	552		
		<i>Haliphlaeos. 1. & 7. unde dicta.</i>	7		
		<i>Haliphlaeos Sequanorum.</i>	ibid.		
		<i>Halmades Oliua quæ.</i>	344		
		<i>Hamamelis quare sic dicta.</i>	158		
		<i>Hamamelis Athenæi.</i>	202		
		<i>Haounay arbor.</i>	1846		
		<i>Haplofiles Marcello qui dicantur.</i>	518		
		<i>Harar seu Iuniperus, maior & minor.</i>	184		
		<i>Harmala.</i>	972		
		<i>Harmala Syriaca.</i>	1669		
		<i>Haftula regia.</i>	1588		
		<i>Haftula Regia, sive Asphodelus Matthio.</i>	1588		
		<i>Hatilig, Serapioni.</i>	1687		
		<i>Hedera tria genera Theophr. 223.</i>			
		<i>Hedera arborea Matthio.</i>	1418.		
		<i>Hedera Cilissa.</i>	1421		
		<i>Hedera Dionysias Dalecha.</i>	1420.		
		<i>Hedera Helix Matth.</i>	1419		
		<i>Hedera mollis.</i>	1310. 1424		
		<i>Hedera terrestris.</i>	1310		
		<i>Hedera terrestris Malacocifos, Mat.</i>	1311		
		<i>Hedypnois, sive Cichorium luteum Dodon.</i>	562		
		<i>Hedypnois Dalec.</i>	564		
		<i>Hedysarum.</i>	444		
		<i>Hedysarum Dod. I.</i>	445		
		<i>Hedysarum alterum Dodonæ. ibi.</i>			
		<i>Hedysarum Dodon. III.</i>	ibid.		
		<i>Hedysarum alterum, Clypeatum Lobell.</i>	446		
		<i>Hedysarum maius, sive Securidaca, Matth.</i>	444		
		<i>Hedysarum minus Matth.</i>	445		
		<i>Hedysarum minimum.</i>	446		
		<i>Helennium. 867. minus Dioscori.</i>	868		
				<i>Heliosc.</i>	868
				<i>Heliosc.</i>	775
				<i>Heliosc.</i>	1344
				<i>Heliosc.</i>	269
				<i>Heliosc.</i>	1349
				<i>Heliosc.</i>	1350
				<i>Heliosc.</i>	ibid.
				<i>Heliosc.</i>	ibid.
				<i>Heliosc.</i>	1352.
				<i>Heliosc.</i>	1241
				<i>Heliosc.</i>	1423
				<i>Heliosc.</i>	ibid.
				<i>Heliosc.</i>	4
				<i>Heliosc.</i>	1497
				<i>Heliosc.</i>	1500
				<i>Heliosc.</i>	1493.
				<i>Heliosc.</i>	1494
				<i>Heliosc.</i>	1498
				<i>Heliosc.</i>	1579
				<i>Heliosc.</i>	1286
				<i>Heliosc.</i>	1165. 1217
				<i>Heliosc.</i>	1218
				<i>Heliosc.</i>	1217
				<i>Heliosc.</i>	1218
				<i>Heliosc.</i>	1215
				<i>Heliosc.</i>	1083
				<i>Heliosc.</i>	1021
				<i>Heliosc.</i>	1274
				<i>Heliosc.</i>	ibid.
				<i>Heliosc.</i>	1251
				<i>Heliosc.</i>	1241
				<i>Heliosc.</i>	30
				<i>Heliosc.</i>	1009
				<i>Heliosc.</i>	412
				<i>Heliosc.</i>	ibid.
				<i>Heliosc.</i>	273. & 1355.
				<i>Heliosc.</i>	743
				<i>Heliosc.</i>	1273
				<i>Heliosc.</i>	ibid.
				<i>Heliosc.</i>	650
				<i>Heliosc.</i>	1721
				<i>Heliosc.</i>	1349
				<i>Heliosc.</i>	855
				<i>Heliosc.</i>	1659
				<i>Heliosc.</i>	651
				<i>Heliosc.</i>	508

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Herba fortis.</i>	1279	<i>Herba venti.</i>	841.849	<i>Hirci Barbula.</i>	224
<i>Herba Hungarica.</i>	497	<i>Herba venti, Parietaria Cordi, Si</i>		<i>Hirci spina.</i>	1477
<i>Herba S. Iacobi.</i>	575	<i>deritis genus.</i>	1120	<i>Hirculus.</i>	925
<i>Herba impia Plinij.</i>	1115. 1125.	<i>Hermodactylus officinarum.</i>	1573	<i>Hirundinaria.</i>	1062
1387		<i>Hermodactylus Italarum.</i>	1567	<i>Hirundinaria Herbariorum.</i>	1144
<i>Herba Ioannis infantis.</i>	1906	<i>Hermodactylus quorundam.</i>		<i>Hirundinaria maior.</i>	1249
<i>Herba Iudaica.</i>	1118	1612.		<i>Hirundinaria minor.</i>	148
<i>Herba Iudea, qui & Flos tinctorius.</i>	174. 501	<i>Hermodactylus versus Matthio.</i>		<i>Hierca siue Iucca America.</i>	737
<i>Herba Malucana.</i>	1916	1573		<i>Holcus Plinij</i>	427. 428
<i>Herba margarita.</i>	853	<i>Herniaria, siue Herba Turca.</i>		<i>Holofcha nus. 987. altera.</i>	ibid.
<i>Herba D. Mariae.</i>	678	1126		<i>Holofium.</i>	1188. Matthioli. ibid.
<i>Herba omnes marine ob falsitatem insitam non tam refrigerare, quam adstringere cogereque videntur.</i>	1373	<i>Hesperis Theophrasti quorundam</i>		<i>quorundam.</i>	ibi.
<i>Herba mimosa.</i>	1916	1360		<i>Holofium Loniceri.</i>	1189
<i>Herba miliaria.</i>	412	<i>Hetich Americum.</i>	1907	<i>Holofium Ruellij.</i>	422
<i>Herba mirabilis.</i>	540	<i>Hibiscus Pastinaca.</i>	721	<i>Holofium Salmanticense, Clusij.</i>	1189
<i>Herba de Monteferrato.</i>	1638	<i>Hierobotane.</i>	1334	<i>Hordeolum, Monardis.</i>	1906
<i>Herba mora.</i>	1339	<i>Hierobotane mas, & famina, Do</i>		<i>Hordeum.</i>	398
<i>Herba mortem aut vitam in morbis prænuncians.</i>	1921	<i>donci.</i>	1337	<i>Hordeum distichum, ibid. polistichum.</i>	399
<i>Herba muralis.</i>	1241	<i>Hieracium.</i>	569	<i>Hordeum in cibus antiquissimum.</i>	401
<i>Herba in Cannarijs insulis, Oricelle dicta.</i>	175	<i>Hieracium macrocaulon Dalech.</i>		<i>Hordeum mundum.</i>	ibid.
<i>Herba paralytici & arthetice.</i>	833	570		<i>Hordeum murinum.</i>	416
<i>Herba Paradis.</i>	1737	<i>Hieracium magnum Dalecham.</i>	569	<i>Horminum, 964. sylvestre Matt.</i>	
<i>Herba Peris.</i>	1312	<i>Hieracium minus Dalechampij.</i>		<i>& Fuchsj.</i>	595
<i>Herba pedicularis & pituitaria.</i>	1629	<i>Hieracium maius Matthio.</i>	ibid.	<i>Hyacinthus.</i>	254. 256. 1505
<i>Herba S. Petri.</i>	1671	<i>Hieracium Matthioli, Dodonei.</i>	561	<i>Hyacinthus albicans seu femina.</i>	
<i>Herba Phœnicea.</i>	416	<i>Hieracium Narbonense falcata si</i>		<i>Fuchsj.</i>	1515
<i>Herba pudica, Herba aschinomene.</i>	1878	<i>liqua Lobellj.</i>	570	<i>Hyacinthus autumnalis, Dodon.</i>	1513
<i>Herba pulicaris.</i>	1172	<i>Hieracium Sabaudum Pena &</i>		<i>Hyacinthus autumnalis maior, Ti</i>	
<i>Herba Reginae.</i>	1895	<i>Lobellj.</i>	570	<i>phym Theoph.</i>	1514
<i>Herba ad renum morbos utilis.</i>	1919	<i>Hilum in faba quid.</i>	452	<i>Hyacinthus brumalis, Orientalis</i>	
<i>Herba Roberti.</i>	1120	<i>Hippia.</i>	1232	<i>Gemma ex Lobellio.</i>	1508
<i>Herba Roberti, Geranij III. genus</i>		<i>Hippia herba à Plinio ex Theo-</i>		<i>Hyacinthus caruleus maior, Fuch</i>	
<i>Matthio.</i>	1278	<i>phrasio pro Hippace hoc est ca-</i>		<i>sij.</i>	1511
<i>Herba ad rupturas utilis.</i>	1919	<i>seo equino, ineptè conficta. 250</i>		<i>Hyacinthus caruleus mas minor</i>	
<i>Herba sacra.</i>	1334	<i>Hippobacis. Hippobasium.</i>	1485.	<i>Fuchsj.</i>	1515
<i>Herba sacra, Agrippæ.</i>	881	1709		<i>Hyacinthus comosus albus, Lobe.</i>	1412
<i>Herba sacra quorundam.</i>	1335	<i>Hippobasium quorundam, Da-</i>		<i>Hyacinthi comosi maioris genui-</i>	
<i>Herba sagminalis.</i>	1334	<i>lechampi.</i>	1486	<i>na effigies, Lob.</i>	ibid.
<i>Herba sancta.</i>	1895	<i>Hippoglossum Matthioli.</i>	205	<i>Hyacinthus comosus minor Bul-</i>	
<i>Herba scelereta, Apulei.</i>	1027	<i>Hippoglossum Valentinum Clusij</i>		<i>bine Plinij.</i>	1511
<i>Herba scripta Anguillara.</i>	1273	1681		<i>Hyacinthus Dioscorid. non scrip-</i>	
<i>Herba stellaris.</i>	870	<i>Hippolapathum.</i>	600	<i>tus, Dodoneo.</i>	1507
<i>Herba Symeonis.</i>	593	<i>Hippolapathum hortense.</i>	607	<i>Hyacinthus Dodon.</i>	ibid.
<i>Herba terribilis Narbonensium.</i>	1671. 1680	<i>Hippolapathum rotundifolio, Lo</i>		<i>Hyacinthus latifolius, Dalecha.</i>	1516
<i>Herba Trinitatis.</i>	800	<i>bellj.</i>	606	<i>Hyacinthus Liliaceus Lob.</i>	1515
<i>Herba Trinitatis. Matthioli.</i>	1274	<i>Hippolapathum satium latifo-</i>		<i>Hyacinthus maior, Bulbus sylue-</i>	
<i>Herba Trinitatis, quorundam.</i>	1095	<i>lium, Lobellj.</i>	ibid.	<i>stris.</i>	1512
<i>Herba Turca.</i>	1126	<i>Hippolapathum sylvestre Matth.</i>	ibid.	<i>Hyacinthus Orientalis Græcus,</i>	
<i>Herba vicia, Acoffa</i>	1915	<i>ibid.</i>		<i>Lobel j.</i>	1507
		<i>Hippolapathorum vires & tem-</i>		<i>Hyacinthus Orientalis maior po-</i>	
		<i>peramentata.</i>	907	<i>tyanthes, Lobel.</i>	1508
		<i>Hippomarathrum.</i>	688. 690	<i>Hyacinthus Orientalis I. Matt.</i>	
		<i>Hippofelinum.</i>	700. 706	<i>1509 II. eiusd.</i>	ibi.
		<i>Hippofelinum Matth. siue Leu-</i>		<i>Hyacinthus Ouidij.</i>	1494.
		<i>sticum vulgare.</i>	703	<i>Hyacinthus poetarum latifolius,</i>	
		<i>Hippuris.</i>	1069	<i>Lob.</i>	

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Lob.</i>	1614.1615	<i>℥ Lobel.</i>	936	<i>Idea vitis.</i>	191
<i>Hyacinthus poetarū Hispanicus, Lobell.</i>	1615	<i>Hyssopus montana, Fuchsij.</i>	934.	<i>leseminum.</i>	1430
<i>Hyacinthus poeticus Hispanicus, Lob.</i>	1580	<i>Arabum flore rubio, Lobellij.</i>		<i>Ilex Gallia Narbonensi & Provincia frequentissima.</i>	21
<i>Hiacinthus poeticus Pena & Lob.</i>	1510	<i>ibid.</i>		<i>Ilex maxime atatem fert ibid.</i>	
<i>Hyacinthus stellaris albicans Lobell.</i>	1514	<i>Hyssopus nemorensis. 869.1200</i>		<i>Ilex omnium syluestrium profundissimas radices habet. ibid.</i>	
<i>Hyacinthus stellaris alius Lilifolius. ibid.</i>		<i>Hyssopus nemorensis & lutea. 936</i>		<i>Ilicis vsus in medicam. ibid. & 12. ad materiam.</i>	22
<i>Hydrolapathum. 600</i>		<i>Hyssopus nemorensis quorundam. 1364</i>		<i>Ilex vocatur huber fœmina. 23</i>	
<i>Hydrolapathum maius Lobellij. 604</i>		<i>Hyssopus sariuum vulgaris. 937.</i>		<i>Ilicis pro habere vsus. ibi.</i>	
<i>Hydrolapathum minus Lobellij. 605</i>		<i>vulgaris ex codice Casareo. ibid.</i>		<i>Ilex aquifolia. 27</i>	
<i>Hydropiper. 1038</i>		<i>Hynourabe. 1833</i>		<i>Illecebra. 1128.1130</i>	
<i>Hydropiper Lanceolatum. ibid.</i>			1	<i>Imperatoria. 726</i>	
<i>Hydropiper, Matth. ibid. alterū, Dalechampij. 1039. Pseudoecuatorium fœmina, Dodonæi. ibid. aliud, Dalech. 1040</i>				<i>Imperatoria Matthioli. 727</i>	
<i>Hypphear. 8. Arcadum. 17</i>		<i>I Ace in Persico mari vocatur Corallium. 1371</i>		<i>Imperatrix. 758</i>	
<i>Hypecoum. 1081.1715</i>		<i>Iaca, Acofse. 1898</i>		<i>Impia Plinij. 1125.1387</i>	
<i>Hypecoum Matth. 441. eiusdem non sine errore. 595</i>		<i>Iacea. 192. montana Dalechamp. ibid. alba eiusdem. ibid. maior Lobellij. ibid.</i>		<i>Igname. 1909</i>	
<i>Hypericum. 1153. Matthi. ibid.</i>		<i>Iacea humilis, Hieracij folio, Pen. 1193</i>		<i>Inguinatis. 859</i>	
<i>Hypericum humistratum, Clusij. 1154</i>		<i>Iacea incana, Dalech. 1194</i>		<i>Intubus & Intubum. 554</i>	
<i>Hypericum Syriacum & Alexandrinum Lobellij. 1155.</i>		<i>Iacea incana folio Olea Lobellij. 1193</i>		<i>Intubum crispum. 557</i>	
<i>Hypericum tomentosum, Lobellij. 1154</i>		<i>Iacea lutea Clusij. 1474</i>		<i>Intubum sariuum angustifolium Dodo. 556</i>	
<i>Hypnus. 1323</i>		<i>Iacea maior lutea, Pena. 1193</i>		<i>Intubum satium angustifolium Matth. ibid.</i>	
<i>Hypochæris. 563</i>		<i>Iacea montana Narbonensis Lobellij. 1193</i>		<i>Intubum satium latifolium. ibid.</i>	
<i>Hypocitis. 223 unde dicitur. 224. eius genera ibid. Fungus non est ut quidam volunt ibid.</i>		<i>Iacea nigra Dodon. 1098</i>		<i>Intubum syluestre angustifolium Matthioli. 557</i>	
<i>Hypocistis vulgaris adulterina est 224</i>		<i>Iacea rubra maior laciniosa. ibid.</i>		<i>Intubum syluestre latifolium, Cichorium satium Matthioli, Seris fœmina Lobel ij. ibid.</i>	
<i>Hypoglossum. 206.207</i>		<i>Iacoba, sine Senetio maior. 574 575</i>		<i>Inturis Gazea. 155</i>	
<i>Hypoglossa. 208</i>		<i>Iacoba marina Dodonæi. 1384</i>		<i>Intula, & Intula Campana. 867</i>	
<i>Hypoglossidion. ibid.</i>		<i>Iacoba amarissima, Pena. 1183</i>		<i>Iouis Barba. 194.1128</i>	
<i>Hypomelides. 99</i>		<i>Iagera. 1762</i>		<i>Iouis flos. 1408</i>	
<i>Hypocyamus. 1716</i>		<i>Iamboloins. 1873</i>		<i>Iouis glandes. 30</i>	
<i>Hypocyamus peregrinus, Dalecha. 1718</i>		<i>Iambos Acofse. 1872</i>		<i>Iphyrum Theophr. 806</i>	
<i>Hypocyamus, Mat. 1716</i>		<i>Iangomas. 1874. Iasion Plinij. 1426</i>		<i>Iringus officinarum. 1458</i>	
<i>Hypocyamus albus, Matthioli. 1717</i>		<i>Iasme montana. 1204</i>		<i>Irio. 652. Matth. 653</i>	
<i>Hypocyamus niger Matthioli luteus, Dodo. ibi.</i>		<i>Iasminum album Matthioli. 1430</i>		<i>Irio altera Matthioli. ibid.</i>	
<i>Hypocyamus III. Matthioli. 1718</i>		<i>Iasminum luteum. 1187</i>		<i>Irio Plinij. 383</i>	
<i>Hoscyamus Peruvianus. 628</i>		<i>Iasminum puniceum Dalechamp. 1431</i>		<i>Iris. 254.1609</i>	
<i>Hosfris Plinij. 1067</i>		<i>Iasminum rubrum Dalechamp. 1432.1433</i>		<i>Iris & Ireos vulgaris Herbariorū distinctio inepta. 1611</i>	
<i>Hyssopus & Hyssopum vulgare. 933</i>		<i>Iberis. 665</i>		<i>Iris agrestis. 1570</i>	
<i>Hyssopus folio Origani, Dalecha. 933</i>		<i>Iberis, Fuchsij. & Dod. Nasturtiū syluestre. 655</i>		<i>Iris angustifolia flore luteo, Clusij. 1615</i>	
<i>Hyssopus gemina Græcorum, Pen. 933</i>		<i>Iberis, sine Lepidium Matthioli, 666</i>		<i>Iris biflora, Clusij & Dodonæi. 1621.613</i>	
		<i>Ibiga. 1159</i>		<i>Iris bulbosa angustifolia flore vario, Clusij & Dodon. 1615</i>	
		<i>Ibicus. 589 591</i>		<i>Iris bulbosa latifolia I. Clusij. 1613. 1614</i>	
		<i>Idea Ficus nostra, vulgo Frangula. 200</i>		<i>Iris Palmarica maior. ibid.</i>	
		<i>Idea radix. 192</i>		<i>Iris domestica Matthioli. 1610</i>	
				<i>Iris flore caruleo polyanthos, Lobellij. 1613. 614</i>	
				<i>Iris lutea variata. 1616</i>	
				<i>Iris perpusilla & Saxatilis. 1611</i>	

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

Laundula

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Lauandula, siue laeundula.</i>	919	<i>Lepidium Matthioli.</i>	666	<i>Lignum semp. ruiuum.</i>	150
<i>Lauandula, siue Laeundula.</i>	919	<i>Lepidium Pauli & Plinij.</i>	ibid.	<i>Ligusticum Matth.</i>	744
<i>famina ibid. mas. 920. multi-</i>		<i>Leporis cuminum.</i>	441	<i>Ligusticum alterum, Lob.</i>	ibi.
<i>fido folio Clusij.</i>	ibid.	<i>Leporis palatum.</i>	571	<i>Ligustrum, magnaue super eo</i>	
<i>Lauandula vulgo vocata.</i>	1365	<i>Leucacantha.</i>	1463	<i>& Cypro siue eadem sint, siue</i>	
<i>Lauer.</i>	1091	<i>Leucacantha Monspelensium, Da</i>		<i>diuersa, contentiones.</i>	252
<i>Laurcola famina, Chamædaph-</i>		<i>lechamp.</i>	1465	<i>Ligustrum nigrû Columella.</i>	1425
<i>ne multorum.</i>	211	<i>Lencacantha quorundam.</i>	1464	<i>Lilac Matt.</i>	355
<i>Laureola, aut Laurago.</i>	832	<i>Leucanthemus & Leucanthemus.</i>		<i>Lilionarcissus luteus Bononienfis</i>	
<i>Laureola officin. & Herbarior.</i>		968		<i>Lob.</i>	15.0
219		<i>Leucas Plinij.</i>	679	<i>Lilionarcissus pelyanthos, Lobell.</i>	
<i>Lauri multa genera.</i>	205	<i>Leucena</i>	30	1584	
<i>Laurocerasus.</i>	348	<i>Leuceoron.</i>	1344	<i>Lilium Aegyptium.</i>	457
<i>Laurus.</i>	351	<i>Leucographis.</i>	1474-1475	<i>Lilium album Matthioli.</i>	1492
<i>Laurus Alexandrina.</i>	108	<i>Leucophragis Plinij.</i>	1273	<i>Lilium Alexandrinum.</i>	1584
<i>Laurus diuinatrix arbor.</i>	353	<i>Leucoij multa genera.</i>	271	<i>Lilium conuallium.</i>	838
<i>de Lauri Fraxinea Manardi</i>		<i>Leucoium.</i>	801.1309	<i>Lilium conuallium.</i>	15.4
<i>quid sentiendum.</i>	205	<i>Leucoium album. 802. album &</i>		<i>Lilium cruentum bulbos gerens,</i>	
<i>Laurus syluestris.</i>	210	<i>purpureum Matth. ibid. aureû</i>		<i>Lob 149. aliud cruentû eiusd.</i>	
<i>Laurus Taxa.</i>	205	<i>eiusdem.</i>	ibid.	ibid.	
<i>Laurus Tinus.</i>	203.204	<i>Leucoium bulbosum.</i>	1526	<i>Lilium inter spinas.</i>	1427
<i>Ledi species Baurini.</i>	231	<i>Leucoium bulbosum minus anti-</i>		<i>Liliû non bulbosum Hemerocal-</i>	
<i>Ledum.</i>	227	<i>nale Dodonæi, & Clusij.</i>	1527	<i>lû Dodonæi.</i>	1499
<i>Legumina quid.</i>	407	<i>Leucoium marinum.</i>	1183	<i>Lilij vires & temperam.</i>	1496
<i>Legumina vnde dicta.</i>	449	<i>Leucoium maritimum Dalecha.</i>		<i>Lilium Persicum, Lobel.</i>	1495
<i>Legumina omnia spiritum & hu-</i>		1360		<i>Lilium polyrrhizon Nyceni, Pha-</i>	
<i>morem impurum ingenerant</i>		<i>Leucoium maritimum minus, Da</i>		<i>langium quorundam.</i>	1496
<i>corporibus, atque hanc ob cau-</i>		<i>lechamp.</i>	ibid.	<i>Lilium purpureum maius, Dodo.</i>	
<i>sam ad venerem incitant. 454</i>		<i>Leucoium maritimum alterum la-</i>		1493	
<i>Lemma, Theophr.</i>	1014	<i>tifolium, Lobellij.</i>	ibi.	<i>Lilium rubens quod Græci Crinô.</i>	
<i>Lens & Lenticula.</i>	475	<i>Leucoium Patavinum marinum,</i>		1492	
<i>Lenticula marina Serapionis.</i>		<i>Lobel.</i>	611	<i>Lilium rubrum, non bulbosum.</i>	
1196		<i>Leucoium puniceum, Fuchsij.</i>	803	1499	
<i>Lenticula marina Serapionis, &</i>		<i>Leuconarcis foliorum.</i>	1527	<i>Lilium syluestre.</i>	1493.1498
<i>Vua marina quorundam.</i>	1397	<i>Leuisticum vulgare.</i>	703	<i>Limeum Plinij.</i>	1736
<i>Lenticula marina serratis folijs</i>		<i>Libadion.</i>	1286	<i>Limeum pardalianchis genus v-</i>	
<i>ob.</i>	1397.198	<i>Libanotis.</i>	763	<i>no tantum folio Da ech.</i>	3738
<i>Lenticula palustris, Lenticularia</i>		<i>Libanotis II. Dodonæi. Dauci III.</i>		<i>Limeum alterû triplici folio.</i>	1739
<i>seu lenticulaque officin.</i>	1014	<i>Fuchsij.</i>	765	<i>Limnæum & Limnæum.</i>	1286
<i>Matth. ibi. palustris altera e-</i>		<i>Libanotis III. Dodon.</i>	ibid.	<i>Limnites.</i>	1286
<i>iusem.</i>	105	<i>Libanotis siue Rosmarinum Mat</i>		<i>Limones.</i>	1838
<i>Lentisci bacca edules future con-</i>		<i>thio.</i>	764	<i>Limonia Malus.</i>	301
<i>diuntur.</i>	66	<i>Libanotû Theophr. maior, Ligu-</i>		<i>Limonium.</i>	1417
<i>Lentiscina denticulapia.</i>	65	<i>sticum II. Mat.</i>	766	<i>Limonium. 1024. Matth. alterum</i>	
<i>Lentiscus.</i>	63	<i>Libanotis minima.</i>	ibi.	<i>eiusd. ibid. Narbonense parvû</i>	
<i>Lentiscus frequis in Italia. Nar-</i>		<i>Lichen seu limus morbus arborû.</i>		1025 aliud.	ibid.
<i>bonensis provincia maritima. 64</i>		12		<i>Limonum succus.</i>	302
<i>Lentiscus Xylobalami ὠβελᾶν</i>		<i>Lichen. III. Matthioli, 184. Lobe.</i>		<i>Limus & Lichen morbus arborû.</i>	
<i>vi officinis.</i>	63	II. & III.	ibid.	152	
<i>Leo, Carduus ferox.</i>	1489	<i>Lichen primus.</i>	1196	<i>Linaria.</i>	1150
<i>Leontice.</i>	1308	<i>Ligna lapidea.</i>	1398	<i>Linaria.</i>	1332
<i>Leontopetalon.</i>	1608	<i>Lignum aloës.</i>	1799	<i>Linaria aurea Tragi.</i>	1152
<i>Leontopodium.</i>	1281.1142	<i>Lignum aromaticum, lignum ad</i>		<i>Linaria carulea Dalech.</i>	1151
<i>Leontopodium Leoniceri.</i>	1143	<i>nephridi m.</i>	1788	<i>Linaria magna Belueder.</i>	1333
<i>Leontopodi m. Matt.</i>	1343	<i>Lignum Colubrinum. 1911. I. & II</i>		<i>Linaria minor Dalecha.</i>	1151
<i>Leontopodium paruum Lobellij.</i>		<i>Acofæ.</i>	ibid.	<i>Linaria odorata Dodon.</i>	ibid.
ibid.		<i>Lignum Indicum. 1649 sanctum</i>		<i>Linaria rubra.</i>	866
<i>Lepidium.</i>	665	1750		<i>Linaria tenuifolia Dalech.</i>	1151
<i>Lepidium Aeginete, quorundam.</i>		<i>Lignum Moluccense.</i>	1864	<i>Linaria Valentina Clusij.</i>	1133
1298		<i>Lignum nobis Segunorum.</i>	214	<i>Lingua bonis, seu Lingua bu-</i>	
<i>Lepidium annuum, Lob.</i>	1297	<i>Lignum sanctæ crucis.</i>	19	<i>bulæ.</i>	578 579
				<i>Lingua</i>	

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

Lingua canis.	1104.1261	Lotus urbana Dodon.	506	815	
Lingua ceruina.	1217	Lotus Aegyptia ex codice Casareo.	1076	Lychnis marina.	1361
Lingua ceruina officinarum.	1218	Lotus Aegyptia Theophrasti.	1077	Lychnis marina Anglica, Penæ.	1361
Lingua, Plinij. 1037. maior, Dalech.	ibid	Lotus syluestris ex codice Casareo.	1076	Lychnis multiflora Anglica, Penæ.	816
Lingua serpentis, vulgo dicta.	1016.1047	Lotus herba.	506	Lychnis syluestris coronaria.	418
Linum.	1491	Lotus asperior fruticosa Lobellj.	510	Lychnis syluestris purpurea, Dodonæi.	816
Linum album officin.	ibid.	Lotus Enneaphyllos Dalecham.	herba ibid	Lychnidis syluestris species Myconis.	817
Linospartum Theophrasti.	177	Lotus latifolia Dalechampi.	509	Lychnis syluestris I. Clusij, & Behen album Salamanicum ibi.	
Linosyris recentiorum.	Lob. 1152	Lotus Libyca Dalecham herba.	508.509	Lychnis syluestris altera Clusij, Papaueris pumum quorundam.	ibid.
Linozostis.	1626	Lotus, pratensis purpurea. herba.	509	Lychnis syluestris III. Clusij, cauculiculis striatis.	88
Linum.	493	Lotus sativa Matth herba.	507	Lychnis syluestris IIII. Clusij. ibid.	
Linum perpusillum, siue Chamaelinum.	495	Lotus (herba) sativa altera Matt.		Lychnis syluestris V. Clusij, birra Lob.	ibid.
Linum pratense.	1116	Melilotus officinarum ibid.		Lychnis syluestris minima. VI. Clusij.	89
Linum pratense, Tragi.	1026	Lotus syluestris Matthioli. herba ibid.		Lychnis syluestris quorundam.	1339
Linum syluestre primum, Linum marinum Penæ.	494	Lotus syluestris altera Matthioli.		Lychnitis.	1298
Linum syluestre secundum, flore albo.	ibi.	herba. ibid.		Lycotomum caruleum flore Delphinij. Dodonæi.	1742
Linum syluestre tertium.	495	Lotus syluestris minor Dodonæi.		Lycotomum caruleum paruum. Dodon.	1743
Liparea Theophrasti seu Colutea vesicaria.	214.215	herba. ibid.		Lycopersum Galeni.	628
Liquidambar & eius oleum.	1792	Luccio'a.	1047	Lycopodium, Dodonæi.	1325
Liquiritia replasiorum.	247	Lucernula.	814	Lycopsis.	1104
Liriodaphnodelus phaniceus, Lobel.	1590	Luch Auicennæ.	178	Lycopsis Anglica Lobellj.	1263
Lirium maius, aut Lirium verū, Dod.	1615	Lunaria siue Lunaria Græca quorundam.	805	Lycopsis Anguillare.	579
Lithospermum. 1176. maius Mat.	ibid.	Lunaria Italica.	1214	Lycopsis Loniceri.	1104
ibid. minus eiusd.	ibid.	Lunaria lutea Dalechampi.	ibid.	Lycopsis syluestris.	580
Lithospermum Anchusa facie, Lobel. j.	1178	Lunaria maior Chimistarum.	1215	Lysimachia.	1058
Lithospermum Arundinaceum, Dalech.	ibi.	Lunaria minor.	1142	Lysimachia, Matth. 1059 altera	ibid.
Lithospermum maius Dodonæi.	1177	Lunaria minor.	1312	Mat. ibi. purpurea l. Dodon.	
Lithospermum Fuhij, min' Dod.	ibid.	Lunaria alia minor cerulea, Dalecham.	1314	Lysimachia cerulea.	1060
Lithospermum nigrum Dalecha.	ibid.	Lunaria quorundam.	1735	Lysimachia filiquosa alia, Lob. ibi.	ibid.
Lotium.	416	Lunaria filiquata.	493	galericulata, eiusdem.	ibid.
Lotium, frugum morbus potius, quam pestis.	417	Luparia.	1633.1742		
Lotium syluestre.	416	Lupinus.	466		
Lomentum sabaceum.	456	Lupulus.	144		
Lonchitis.	1185.1220	Lupulus reptans.	ibid.		
Lonchitis aspera Dodonæi.	1217.1221	Lupus salictarius.	ibid.		
Lonchitis aspera linensis Dalech.	221	Lupinus sativus Matth.	466		
Lonchitis aspera maior Matthio.	1210	Lupinus syluestris Dodonæi.	ibid.		
minor eiusdem.	ibid.	Lut. ola.	503		
Lonchitis prior Dioscori quorundam.	1612	Lycium quod spumosum, aptissimum medicina.	149		
Longina.	1221	Lycium Alpinum, italicum, Hispanicum.	148.149		
Lopima.	30	Lycium quomodo adulteratur.	149		
Loromera, siue Lotos hemera, Plinij.	1077	adulterinum à legitimo quibus notis dignoscatur.	150		
Lotus arbor.	346	Lycii officinarum, adulterinum ibi.			
Lotus Celtis arbor.	347	Lycij in medicam vires. ibid.			
Lotus secunda.	349	Lycium Dalecham.	151		
		Lychnis.	814		
		Lychnis coronaria. Matthioli.			

M

<i>MAcer & Macis</i>	1776
<i>MACis.</i>	1790
<i>Ma'aleb.</i>	256
<i>Mahaleb Serapionis.</i>	153.154
<i>Maiorana.</i>	881
<i>Malabathrum, Betre.</i>	1776
<i>Malacocissos.</i>	1310
<i>Malacocissos ex pictura Dodonæi.</i>	1311
<i>Malacocissus maior, quorundam.</i>	1049.1052
<i>Malicorium quid, & unde dictum.</i>	304.305
	Malico

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

Malinathalla.	1730	Manga Amba.	1835	Medica sylvestris prior fructu tri-	
Maltum.	402	Mangas.	1870	plici & diuerso.	ibi.
Malua.	584	Manibot.	1908	Medica sylvestris altera lunata.	
Malua arbor.	586	Manna Thuris.	1753.1755	503	
Malua maior I. Matthioli.	585	Manzianion.	457	Medica sylvestris altera, lunata,	
Malua maior II. Matthio. ibid.		Maraka & Tamaraka.	1845	1214	
Malua maior III. Matth. ibid. &		Margarides.	364	Medium Dioscoridis.	825
586.		Marsicus iuncus.	988	Mebebe bene.	1768
Malua hortensis.	ibid.	Marmoraria.	1443	Mebeſe engi Auicennæ.	1652
Malua palustris.	590	Maronion.	1286	Mel Corſicum inſuaequamobrè.	
Malua Raſca ſimpliciore flore, Lo-		Marrubiaſtrum.	1212	166	
bellij.	587	Marrubium.960.album.961.Cre-		Mel frugum.	411
Malua Roſea multiplex, Lobellj.		ticum, Pene.	962	Mel Ponticum venenatum.	246
588		Marrubium aquaticum. 1064.		Mel ſuccus ex flore Lilij.	1496
Malua ſatiua laciniſa Cord. 585		1065		Melampyrum	1136
Malua ſylveſtris maior.	587	Marrubium Hiſpanicum odore		Melapſyrum perpaſſillum luteum.	
Malua ſylveſtris pumila repens.		Stoechadis, Lobel j.	684	420	
586.587		Marrubium nigrum officinarum.		Melampyrum Theophraſti.	1178
Malua ſylveſtris à Theophraſto vo-		1252		Melampyrum ſive Triticum vac-	
catur quæ Althea ſuo nomine		Marrubium paluſtre, ſive aquati-		cinum.	419
dicitur.	590	cum.	1119	Melandryon Plinij.	1186
Malua vulgaris, Matth.	585	Martagon, Matth.	1493	Melandryon Plinij, quorundam.	
Maluanifcus.	590	Marum.	883	1080	
Malucana, Acoſta.	1917	Marum, quorundam:	885	Melanium montanum.	1204
Malus.	285	Marum Cyriacum, Lobellj. ibid.		Melanſpernum.	812
Malorum genera propè infinita.		Marum verum, vulgo Maſtic.		Melanthemon.	968
285		ibid.		Melanthium.	812
Malus Armenia.	297	Maſticum.	727	Melanthium ſatiuum, Matthioli,	
Malus canina, aut terriſtris. 1725		Maſſariis vna...	1406.1047	812	
Malus Citria ſeu Citrea.		Maſtiche.	62	Melanthium ſylveſtre.	418
Malus Cydonia, vel Cotonea. 290		Maſtiche Acanthice.	64	Melanthium ſylveſtre prius, Mat-	
Malus Limonia.	301	Maſtichos Chia pretium. ibid.		thioli.	812
Malus Medica & Aſyria.	298	Maſtiche non ſolum Chia (quan-		Melanthium ſylveſtre prius, Mat-	
Malus Perſica.	293	quæ eapreſtantiſſima) verum		thio, ſecund. edition.	813
Malus Punica. 101. eius genera		etiã talia, atque adeo Aegy-		Melanthium ſylveſtre alterum.	
controuerſa. ibid. locus & vi-		ptia, Indica, Arabica, Ponti ibi.		Matth.	ibid.
res.	304	Maſtiche quibus, ubi optima, &		Meleagris ſlos, Dodon.	1530
Malum.	285	quomodo conſiciatur. 63	64	Melenken.	1841
Mala Aethiopica.	1730	Maſtiche nunquam liquida eſt,		Melica.	410.421
Ma'um aureum quod & quare		ſed ſemper in ipſa arbore ſpiſ-		Melilotus, ſui. Melilotus corona-	
dictum.	299	ſatur.	69	ta Pene & Lob. 508. Melilotus	
Mala Epirotica, Latine orbicula-		Maſtiches adulteratio.	64	Germanica Fuchſij.	508
ta.	289	Maſtiche perſonata quare dicitur		Melilotus ſive Serrula Campana.	
Mala Indica, Acoſta.	1873	Marcello Empirice.	65	511	
Malum grauiſſimum.	303	Maſtiches facultates.	ibid.	Melilotus vulgaris, ſive Triſolium	
Malum Heſperidum.	299	Maſtierum.	727	odoratum Dod.	ibid.
Mala principatum in Hetruria ob-		Maſtos Plinij.	1065	Melilotus officinarum 507.	508
ſtinentia.	288	Mater Violarum, Dalech.	799	Melimela unde dicta.	287
Malum Medicum & Perſic. 298		Matricaria.	953.1147	Melinum oleum.	291.292.293
Malorum temperamēta & quibus		Matricaria, Parthenium Matth.		Meliſſa Moldauica, Matthioli.	
eorum uſus.	288	954		960	
Mambroni Cini, radix apud Ca-		Maſiſalua.	965	Meliſſa officinarum.	957
rainos.	1702	Maſiſalua, Herbariorum.	965	Meliſſa Turcica alia Dalech. 960	
Mamb, ſive Arbor Tabaxir.		Matſiſſua.	1427	Meliſſophyllum.	957. Matſio
1863		Mechinum, Pene.	1892	li. ibid. Fuchſij & Dodon.	
Marnei 1836. eius folium. ibid.		Mechioacan. 1901. Pene. 1902. Do-		958	
Mandragoras.	1725	don.	ibid.	Meliſſophyllum Conſtantiſopolit-	
Mandragoras mas & ſemina.		Meconis lactuca.	545.549	tanum Matſh.	959
1726		Meconium.	1711	Melocardus echinatus, Pene.	
Mandragora mas Theophraſti.		Medica.	502	1441.1442	
626		Medica ſatiua Dodon.	ibi.	Melo Cortopa.	1837

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

Melones.	622	Milium ad omnia Panico præstan- tius.	413	Moschatella pratensis.	1196
Melongenæ.	626.627	Milium Solisvel Soler potius,	1176	Mula.	1215
Melopepones.	622.623	Millefolium.	768.769. III7	Multiradix.	1286
Memecylon.	196	Millegrana Cordi.	1126	Mungo.	397
Menyanthes.	503	Milleniorbia.	1085	Mugo similis fructus, Buna.	1794
Menianthes palustre, Theophrasti.	1019. & 1020. Dalecham. cum flore.	Mirrhis vel Mirrhix.	1277	Muralium.	953
Mentha.	671	Miscipula, siue Armeria altera,	809	Murex.	1435
Mentha aquatica, siue Sifymbria,	Lobellj.	Mogli.	1852	Musa arbor.	1838
Mentha casti.	908	Molle arbor.	1787	Musacum fructu.	1839
Mentha cataria angustifolia, eiusd.	909	Mollis Hedera.	1310	Musa Pacovera Theueti.	1840
Mentha cataria peregrina latifo- lia, Lobellj.	ibid.	Mollugo.	1116	Muscaria planta, Pene.	683.684
Mentha Græca.	672.678	Mollugo, Galium album quorun- dam.	1088	Muscipula altera flore muscosa, Pene.	684
Mentha Romana siue crispæ.	677	Mollugo altera montana, Dodon.	ibid.	Muscus.	1323
Menthe Sarracenicæ species altera Myconi.	672	Mollugo vulgatiore, Herbariorum.		Muscus arboreus.	ibid.
Mentha sativa crispæ Dod. prima	671	Mollusca nux.	320	Muscus clavatus Lobellj.	1324
Mentha sativa quarta Dod.	673	Molluscum.	95.166	Muscus marinus.	1367
Mentha sativa Matth. prima, Do- don. tertia.	671	Molochæ agria.	591	Muscus marinus siue Corallina, Dodonæi.	1368
Mentha sativa altera Matth.	672	Molochi, id est, Halimus.	265	Muscus marinus vulgatissimus, Muscus marinus candidus	
Mentha vires.	674	Molochia.	552	Coralloides	1368
Menthastrum.	671	Molochia Serapionis quorundam,	566	Muscus scoparius, Lob.	1326
Menthastrum niueum Anglicum Pene & Lobellj.	674	Molucca spinosa, Dodonæi.	959	Muscus terrestris genus,	1364
Menthastrum Campense & zuuol- ense, Lobellj.	673	Molucca siue Melissa Turcica, Da- lech. ibid. alia eiusd.	960	Muscus terrestris genus descriptum à Trago, nomine Sabine silue- stris.	1200
Menthastrum minus spicati, Lo- bellj.	674	Moly.	1591	Muscus 1. terrestris Tragi.	1323
Menthastrum vulgare Matthio.	673	Moly indicum, Dodonæi.	1592	Muscus terrestris II. & III.	1324
Mercurialis.	1626	Moly Liliflorum, Lob.	1593	Muscus alius terrestris, Lycopo- dium Dodonæi.	1325
Mercurialis mas Matth.	1627.	Moly Matt.	1594	Muscus terrestris denticulatus Lo- bellj.	ibid.
femina, eiusd.	ibid.	Moly folijs Narcissi, Lobellj. ibid.		Muscus terrestris denticulatus al- ter, Muscus terrestris repens	
Mercurialis siluestris mas.	1628	Moly serpentinum, Lobellj.	1593	Clusij.	1326
Mercurialis utraque.	1195	Moly Theophrasti & Plinij,	1594	Myacanthos.	1473
Mespili species secunda, siue Epi- melis,	198	Moly Tragi perperam.	1571	Myacanthos Theophrasti.	1473.
Mespilus & eius genera.	332	Molybdæna, Plinij.	1041	1474	
Mespilus Anthemois.	135.136	Molibdena Plinij, quorundam.	1298	Myagræ.	419.1136
Mespilus Anthemois.	198	Momordica.	629.1277	Myagræ aliud Thlaspi effigie, Lob.	1117
Mespilus Aronia.	135.136	Momordica nostra.	617	Myagræ alterum minus Dale- champ.	ibid.
Mespilus Aronia.	333	Montium, ipse nota.	80	Myagræ Dioscor.	1178
Mespilus Setania.	334	Moringa, 1865. Acoska.	1866	Myagræ Dodonæi.	1136
Meterana Castanea.	31	Morian.	627.1725.1727	Myosotis.	1232.1233
Mium.	758	Moriscos.	328	Myosotis parua Dalech.	138
Mium Matthioli. 759. alterum spu- rium Italicum, ibi. alid. ibid.	758	Morsus diaboli.	564	Myosotis Tragi.	565
Mex vel mes.	1794	Morsus diaboli genus.	865	Myrobalani.	1687.1688
Mezereon vulgare.	210.212	Morsus diaboli vulgi.	1066	Myrobalanos.	1684
Milaci vulgo Græcorum.	24	Morsus galline.	1232.1236.1239	Myrica seu Myrica.	179.185
Miliaria Oleæ.	341	Morsus Ranae Herbariorum.	1010	Myrica pro Gallæ omphacitide sub stiri potest.	181
Militaris millefolia.	768	Morus.	325. sapientissima a boru ditæ	Myrica humiles quare Virgilio di- cantur.	179
Milium.	408	Mora.	120	Myrica radices pro odorata Cassia venundata magna impostura.	182
Milium Indicum.	581	Morus Aegyptia.	340		
Milium Indicum, siue Melica.	410	Morus loci natales, tempus, vires & temperam.	326.327.328		
		Morus succus.	327.328		
		Mora terrestria.	63		
		Moschatella cerulea.	1184		

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Myriophyllum prius & alterum</i>		<i>Napus sylvestris.</i>	541	<i>Nasturtium orientale</i> Serapionis.	
<i>Matibio.</i>	770	<i>Napus sylvestris Dodonai.</i>	645		663
<i>Myrrha.</i>	1775	<i>Napy Persicum.</i>	661	<i>Nasturtium peregrinum seu Peru-</i>	
<i>Myrrha aut Bdellium suo furculo</i>		<i>Narcissus.</i>	1492. 1516	<i>nianum, Myconij.</i>	656
<i>spinoso herens, Pene</i>	1757	<i>Narcissus totus albus Dodonai.</i>		<i>Nasturtium sylvestre Dalechamp.</i>	
<i>Myrrha Kinaa vel Aminaea.</i>			1519		655
	1791	<i>Narcissus autumnalis minor, Do-</i>		<i>Nasturtium si' uestre Valentinum</i>	
<i>Myrrhiu.</i>	760	<i>don & Clusij.</i>	1512	<i>Clusij.</i>	657
<i>Myrrhis Fuchsij 761. altera parua</i>		<i>Narcissus autumnalis quorundā</i>		<i>Nasturtium scelerum.</i>	660
<i>Lobell ibid. Lappa Dalecham.</i>		<i>ex Clusio.</i>	ibid.	<i>Natrix Plinij Herbariorum.</i>	449
<i>ibid.</i>		<i>Narcissus Constantinop. l. Matt.</i>		<i>Nautica.</i>	105
<i>Myrra & Murta.</i>	237		1523	<i>Nausegi, id est, Rhamnus.</i>	295
<i>Myrtatum.</i>	241. 242	<i>Narcissus II. & III. Constantino</i>		<i>Naxia Amigdala veteribus Gre-</i>	
<i>Myrtilidanum Piper à plerisque ap-</i>		<i>politianus. IIII. V. VI. VII. VIII</i>		<i>cis commendata.</i>	316
<i>pellatur.</i>	239	<i>Matthi.</i>	1524. 1525	<i>Negundo. 866 mas, Acofta. ibid.</i>	
<i>Myrtilidanum vinum.</i>	240	<i>Narcissus flore multiplici, Clusij.</i>		<i>femina eiusd ibid. &</i>	1867
<i>Myrtilli.</i>	237		1520	<i>Nenufar officinarum.</i>	1008
<i>Myrtilus Germanica.</i>	192	<i>Narcissus Matth.</i>	1526	<i>Nepa Gaze, Scorpius Theophra-</i>	
<i>Myrtomelis Cordi.</i>	202	<i>Narcissus IIII. Matth.</i>	1583	<i>sti, planta.</i>	163
<i>Myrtus.</i>	110	<i>Narcissus luncifolius prior, Clusij</i>		<i>Nepeta IIII. Tragi. Calamintha</i>	
<i>Myrtus seu Murtus.</i>	236		1521	<i>Menthastrifolio, Pene. 907</i>	
<i>Myrtus Batica latifolia dome-</i>		<i>Narcissus luncifolius, Dodonai.</i>		<i>Nerij facie arbor, Pene. 1831</i>	
<i>stica fecunda, Clusij.</i>	238		1520	<i>Nerij siliqua.</i>	194
<i>Myrtus Batica sylvestris, Clusij.</i>		<i>Narcissus luncifolius flore rotun-</i>		<i>Neris.</i>	244
	239	<i>do Roseo Lob.</i>	1522	<i>Nerium sue Rhododendrum.</i>	
<i>Myrtus Brabantica.</i>	110	<i>Narcissus luteus multiplex Dod.</i>			244
<i>Myrtus exotica.</i>	238		1523	<i>Nerium Alpinum.</i>	270
<i>ex Myrti floribus destillatur aqua</i>		<i>Narcissus luteus sylvestris Dodon.</i>		<i>Nerium aliud flore albo, Lobellij</i>	
<i>odoratissima.</i>	242	<i>ibid.</i>	ibid.	<i>& Pene.</i>	246
<i>Myrtus minima angustifolia.</i>	238	<i>Narcissus medio luteus Do.</i>	1518.	<i>Neslion.</i>	1286
<i>Myrtus præter baccas Myrtidanū</i>		<i>alter eiusdem.</i>	ibid.	<i>Neuras.</i>	1487
<i>producit.</i>	239	<i>Narcissus medio purpureus Do-</i>		<i>Nicolij.</i>	364
<i>Myrti in alijs præterquam in</i>		<i>don.</i>	1517	<i>Nicotiana.</i>	1895
<i>re medica vsus.</i>	242	<i>Narcissus montanus luncifolius</i>		<i>Nicotiana sue Tabacum.</i>	ibid.
<i>Myrtus succorum natura præci-</i>		<i>minimus, Lob.</i>	1521. 1522	<i>Nidus avis.</i>	1073
<i>pue admiranda.</i>	241	<i>Narcissus purpureus Plinij & Vir-</i>		<i>Nigella.</i>	812
<i>Myrtus sylvestris.</i>	243	<i>gilij.</i>	1570	<i>Nigella Citrina, flore albo multi-</i>	
<i>Myrtus sylvestris duplex.</i>	207	<i>Nardus sine Nardum & Nardi-</i>		<i>plici.</i>	ibid
<i>Myrtus Tarentina.</i>	237	<i>spica.</i>	920	<i>Nigella foliosa.</i>	438
<i>Myrtus Tarentina.</i>	238	<i>Nardus Celtica. 923. Matthioli.</i>		<i>Nigellastrum.</i>	ibid.
<i>Myos.</i>	35	<i>924. altera, Pene.</i>	ibid.	<i>Nimbo. 867. Acofta.</i>	ibid.
<i>Myxa, Myxa, Myxaria.</i>	359	<i>Nardus Italica.</i>	919	<i>Noli me tangere, Herbariorum.</i>	
<i>Atyos arbor, sine Sebestena no-</i>		<i>Nardus montana. 926. Matthio.</i>			1205
<i>stra.</i>	ibid.	<i>ibid.</i>	ibid.	<i>Nuces Castaneaica.</i>	30

N

N Achani semen apud Indos.	
	151
<i>Nana. 1840. fructus, Vayama.</i>	
	1841
<i>Napellus. 1745. Dodonai. ibid.</i>	
<i>Napellus luteus, officinarum.</i>	
	1742
<i>Napellus prior Matt.</i>	1748
<i>Napellus racemosus, Dodo.</i>	1747
<i>Napus.</i>	644
<i>Napi Amiternini in magna lau-</i>	
<i>de.</i>	647
<i>Napi.</i>	646
<i>Napus sativus.</i>	644

<i>Nardus spuria Narbonensis, Pe-</i>	
<i>ne.</i>	922
<i>Nardus sylvestris.</i>	927
<i>Naribecium Theophrasti, Ferula</i>	
<i>go Gazæ.</i>	754
<i>Nasturtium.</i>	654
<i>Nasturtium album Arabum.</i>	636
<i>Nasturtium album Arabum.</i>	663
<i>Nasturtium aquaticum officina-</i>	
<i>rum.</i>	68
<i>Nasturtium aquaticum Tragi &</i>	
<i>Herbariorum.</i>	1094
<i>Nasturtium Babylonicum.</i>	663
<i>Nasturtium hortense.</i>	655
<i>Nasturtium Indicum Dodonai.</i>	
	657
<i>Nasturtium maritimum.</i>	1393

<i>Nuces Cupressi.</i>	57
<i>Nuces Græcæ.</i>	316
<i>Nuce Pineæ Conus & Strobilus</i>	
<i>vsurpatur.</i>	52
<i>Nuces regia.</i>	30
<i>Nuces Tarentina.</i>	48
<i>Nucis iuglandis temperamenta</i>	
<i>& vires in re medica, vsusque</i>	
<i>in cibis varius. 322. 313. 324.</i>	
	325
<i>Nucis nomine permulta fructuū</i>	
<i>genera comprehenduntur. 320</i>	
<i>Nucifolium.</i>	1758
<i>Nucipersica.</i>	294. 295. 358
<i>Nucipruna.</i>	313
<i>Nuclei pinei calthartici.</i>	1789
<i>Nucleus glandis & chalybis Pli-</i>	

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

nio quid.	16	Ocimum paruum.	680.681	Oleum luncinum.	990
Nucum inglandium & vinearū		Ococol, arbor Americana.	1792	Oleum de Keri, id est, ex floribus	
parferè proventus.	322	Oculus.	1128	lutei Leucoj.	804
Nucum Pinearum vis.	51.53	Oculus bouis.	862	Oleum Laurinum.	353
Nummularia.	1062	Oculus Christi.	1349	Oleum Lentissimum.	65
Nummularia anst Etatine.	1239	Oculus Christi minor Herbariorū		Oleum ex Ligustri floribus.	255
Nursine pila.	645	1134 & 1135.		Oleum de Lilio.	1496.1497
Nux Auellana.	30	Odontilis lutea.	1068	Oleum de Lini semine.	496
Nux Auellana, eadem quatenus		Oenanthe.	782.1406	Oleum ex Liquidambar.	1792
sive parua Prænestina, Heracle		Oenanthe aquatica, Lobellij.	1093	Oleum ex Malabathro.	1777
otica.	319	Oenanthe l. Mal. hio. 782. 11. 111.		Oleum ex nucleis Mali Persice.	
Nux Follicularis.	102	1111. eiusdem.	783	298	
Nux Heracleotica.	30	Oenanthe, sive Filipendula altera		Oleum Masti binum.	66
Nux indica. 1761. Matthioli, ibi.		montana, Pene. 784. alia eius-		Oleum ex Melithij semine, vul	
Nux Indica officinar.	364	dem. Cicute facie.	ibid.	go Nardinum.	814
Nux Ingians.	320	Oenantes species, Dalecham	785	Oleum ex Myagro.	1137
Nux quibus locis gaudeat.	312	Oenanthe, Myconi. ibid. alia eius-		Oleum ex Myrio. 241. 242. eius sa	
Nux Melhel.	628 629	dem.	786	ciundi ratio.	244
Nux moschata.	1760	Oenothera, & Oenotheris.	865	Oleum Narcissinum.	1526
Nux myristica, Macis.	1760	Oenuris.	ibid	Oleum ex Nenusar.	1013
Nux Persica & Basilica, Auella-		Oefos, vel, ut alij, l. fos. 131. 132. 133		Oleum ex Nimbo.	1867
na.	320	Oefus Theophrasti anst Amerina		Olei duo genera ex Nuce Indica.	
Nux Pine.	43	salix cuius ille nusquam alio-		1762	
Nux à Pomo quid differat.	285	quin meminit.	278	Oleum ex Nucibus inglandibus.	
Nux Pontica sylvestris.	101	Officinarum Mastix.	63	323. Carynium vocatum. 324.	
Nux Vesicaria.	102	Oleago, vel Oleastellus.	1664	usus & præstantia. ibid. &	
Nux Vomica & Melhel.	1763	Olea etiam Viscum fert in Pale-		325	
Nymphaea. 1008. maior alba. ibid.		stina.	18	Oleum ex Penobson arbore A-	
lutea maior & minor. 1009.		Olea sativa.	342	mericana.	1834
altera lutea minor. ibid. mi-		Oleum genera varia.	342.	Oleum de Platani baccis.	94
nor alba. 1010. alia minor al-		343		Oleum ex Pyrethro.	1170
ba.	ibid.	Olea maior adescam, minor oleo		Oleum ex Ricino.	1630.1631
		est aptior.	343	Oleum ex Ricino Americo.	1790
		Olea sylvestris seu Aethiopica,		Oleum Rosaceum.	128 129 130
		1352		Oleum Sampsuchinum sive Ama	
		Oleaster.	ibid.	racinum.	883
		Oleum maris rubri lacrima.	153	Oleum ex Sesamo.	482.483
		Oleum Olina succus, eius cōfectio		Oleum Stachadis.	918
		& genera.	344.345	Oleum Styracinum.	117
		Oleum Asari.	914	Oleum miris virtutibus præditū	
		Oleum nucum Auellannarum.	101	ex arbore tinctoria.	1832
		Oleum de Balano. 1484. 1685. 1686		Oleum ex Trifolio.	506
		Oleum de Ben.	1789	Oleum de Tritico.	381
		Oleum ex Canella arboris Theue		Oleum ex Vaccinio.	255
		ii fructus nucleis. 1805. aliud		Oleum optimum Venæfranti.	343
		ex Canella baccis.	1806	Oleum ex vrtica.	1245
		Oleum ex Castaneis apud Indos.		Oleum ex Xilo arbore.	1774
		33		Oleum zambacinum sive Samba-	
		Oleum Chal. f.	111	cinum.	1432
		Oleum factitium ex Chamelea.		Olida.	543
		1664		Olinarum generatua.	342
		Oleum Chimisticum ex Iuniperi		Olina Boemica, sive Flaagnus	
		ligno.	69	Matth.	111
		Oleum ex Cydoneis Melinum vo		Olina Phanlia, quæ & Regia, &	
		catum.	291.292.293	Maiorina.	143
		Oleum Cyprinum.	253.254	Olina tumore crescere oleum sal-	
		Oleum ex Flammula.	1172	so existimatur.	344
		Oleum ex arbore Gehuph.	1842	Olla.	1762
		Oleum ex glande.	14	Olus.	518
		Oleum Handacoehe.	1078	Oleribus multis, quæ nos negligi-	
		Oleum ex Hyperico.	1154	gimus, Graci & sculi valde	
				delectan	

O

Ocellus & Ocellus Dumasce-
nus & Ocellus Barbari-
cus. 806
Ocellus, Lichnis coronaria. 85
Ocimastrum. 682. 1165. 1356. 1356
Ocimastrum Fuchsj. 982
Ocimastrum quorundam. 912
Ocimastrum Valentinum, Clusij.
684
Ocimastrum Valeriantes. 1186
Ocimoides. 682. 930
Ocimoides Dioscoridis. 1186
Ocimoides Matthioli. 682
Ocimoides minus, sive albū. 683
Ocimoides minimum. ibid.
Ocimoides repens Polygoni folio.
1429. 1430
Ocimum. 679
Ocimum antiquorum. 384
Ocimum aquaticum, quorundam.
1086
Ocimum Cariophyllatum. 80 681
Ocimum maximum. 680
Ocimum medium Fuchsj. ibid.
Ocimum medium Matthioli, ibi.
Ocimum montanum. 1175

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>leſtantur.</i>	564
<i>Olusatrum.</i>	793
<i>Olyra.</i>	389
<i>Olyra Græcorum anſiligo Latino- rum.</i>	375
<i>Omyhaciliſ Galla.</i>	15
<i>Omphalocarpus.</i>	1330 1331
<i>Onagra, & Oenagra</i>	865
<i>Onobrychis.</i>	488. 490
<i>Onobrychis prima Dod.</i>	490
<i>Onobrychis ſecunda.</i>	491
<i>Onobrychis tertia, purpurea Dale- champij.</i>	ibid.
<i>Onobrychis lutea Dalecham. ibid.</i>	ibid.
<i>Onocleis.</i>	1100. 1101
<i>Onoclea.</i>	ibid.
<i>Ononis.</i>	1107
<i>Ononis lutea non ſpiñoſa, & Matrix Plinij Herbariorum.</i>	449
<i>Onopordon Dalech.</i>	1472
<i>Onopixos. 1471. Dodon.</i>	ibi.
<i>Onopixus alter, Dalech.</i>	1472
<i>Onopryxus tertius, Dalech.</i>	ibid.
<i>Onofma.</i>	1107
<i>Onofma Matth.</i>	ibid.
<i>Ophioſſum Matth.</i>	1047
<i>Opiſcorodon.</i>	1545
<i>Ophioſtaph, lc.</i>	155
<i>Ophrys.</i>	1260. 1261
<i>Ophthalmica.</i>	1167
<i>Opion.</i>	1711
<i>Opobalſamum.</i>	1771
<i>Opopanax, officin. Opopanacum. 741. 742</i>	
<i>Opulus campeſtris.</i>	94
<i>Opulus Columella.</i>	197
<i>Orchis.</i>	1549
<i>Orchis batrachoides Gemma.</i>	1560
<i>Orchis I. ſpecies Dodon. S. Matth. 15.0</i>	
<i>Orchis II ſpecies Dodon. & Mat- thioli.</i>	1559
<i>Orchis III. Dodon.</i>	ibid.
<i>Orchis IIII. & V. Dodon. 7. Matth. 1552</i>	
<i>Orchis Friſia litoralis Gemma. 1560</i>	
<i>Orchis Hermaphroditica Gemma ſive Orchis pſycoides diphylla. ibid.</i>	
<i>Orchis melittias Gemma.</i>	1557
<i>Orchis myodes I. & II. Gemma. 1558</i>	
<i>Orchis ornithophora folio leni, Gemma.</i>	1559
<i>Orchis ornithophora fulgjs macu- loſis, Gemma.</i>	ibid.
<i>Orchis rotundus Dalechampij. 1556</i>	
<i>Orchis ſaurodes vel Sincophora</i>	

<i>Gemma. Teſticulus hercynus vulgaris.</i>	1553
<i>Orchis ſerapias primus. Dodon. 1554</i>	
<i>Orchis ſphcodes Gemma.</i>	1558
<i>Orchis ſtrateumatica maior, & Baſilica. 3. Gemma.</i>	1559
<i>Orchis ſtrateumatica minor, Gem- ma.</i>	ibid.
<i>Orchites oliuæ unde dicantur. 343</i>	
<i>Oreofelinum.</i>	700. 701
<i>Origanum vel origanum.</i>	886
<i>Origanum Heracleoticum, Matt. ibid.</i>	ibid.
<i>Origanum Onitis.</i>	887
<i>Origanum vulgare ſylueſtre ibid.</i>	ibid.
<i>Ornithogalum.</i>	1581
<i>Ornithogalum Dodon. ſeu Bulbus leucanthemus.</i>	1582
<i>Ornithogalum luteum Lobellij, ſue Bulbus ſylueſtris Dodon. 1583</i>	
<i>Ornithogalum I. Matt. 1581 II. eiſdem.</i>	1582
<i>Ornithogalum magnum, Myconi, 1583</i>	
<i>Ornithogalum Narbonenſe, Dod. 1582</i>	
<i>Ornithopodium.</i>	486
<i>Ornithopodium Dod.</i>	ibid.
<i>Ornithopodium puſillum P. n. e. 487</i>	
<i>Ornithopodium tuberoſum Dale- champij.</i>	486
<i>Orni nomine Tragum vltimum A- tiniam depina it.</i>	81
<i>Ornus.</i>	82. 83. 99
<i>Orbanche.</i>	484
<i>Orbanche Dioſcorid. alia ab Oro banche Theophraſti.</i>	485
<i>Obrobanche legumen, Aphaca Do- don.</i>	484
<i>Orbanche altera Matthioli. 485</i>	
<i>Orobethron.</i>	223. 124
<i>Orobus.</i>	488
<i>Orobus Creticus.</i>	ibid.
<i>Orontium herba.</i>	1341
<i>Oruala Fuchſio. 964. tertia Dod. 566</i>	
<i>Oryonia, Tamarix Achaia dici- tur</i>	180
<i>Oryza.</i>	407
<i>Oſna.</i>	1107
<i>Oſmunda, ſive Oſmundaregalis, 1125</i>	
<i>Oſteocolum Hieroclis & Abſyr- ti.</i>	1205
<i>Oſtocollos arbuſcula.</i>	1795
<i>Oſtria.</i>	35

<i>Oſtrys.</i>	180
<i>Oſtrys vel Oſtria Theophraſti 355 356</i>	
<i>Oſyris, Linaria.</i>	1332
<i>Othonna Dioſcor.</i>	120
<i>Otraqua.</i>	1761
<i>Ouloudia, Græci vulgi.</i>	1530
<i>Ouloudia ſeu Tulpa lutea.</i>	1531
<i>Oxalis.</i>	600 601
<i>Oxalis maior.</i>	604
<i>Oxalis minor Matthioli.</i>	ibid.
<i>Oxalis minuta.</i>	602
<i>Oxalis rotunda.</i>	605
<i>Oxalis tuberoſa Lobellij.</i>	ibid.
<i>Oxyacantha.</i>	134
<i>Oxyacantha, Acuta Spina Matth. 136</i>	
<i>Oxyacantha Matth.</i>	133
<i>Oxyacantha Vum Criſpinam ſi- ue Creſpinum non eſſe.</i>	135
<i>Oxyacanthus a bor Galeno.</i>	136
<i>Oxyagroſtis maritima Dalecha. 1391</i>	
<i>Oxycedrus.</i>	36. 38
<i>Oxylapathum.</i>	600 60 602
<i>Oxylapathum aquaticum Dalec. 603</i>	
<i>Oxymyſine.</i>	243
<i>Oxyphœnix.</i>	160
<i>Oxytriphyllum.</i>	563
<i>Oxys.</i>	1354
<i>Oxys lutea corniculata repens, O- xys lutea Cluſij.</i>	1355

P

<i>P^{acal.}</i>	1876
<i>Padus Theophraſti.</i>	310
<i>Paonia.</i>	855
<i>Paonia ſæmua polyanthes, L. b. 858</i>	
<i>Paonia mas Matthioli ſæmina Dalechamp. 856 ſæmina prior ibid. ſæmina altera, Dodon. e. 857</i>	
<i>Pagana lingua.</i>	205
<i>Pala marina.</i>	1364
<i>Palea marina Nonſſelienſium, 1372</i>	
<i>Palmarus.</i>	139. 143
<i>Palma.</i>	362
<i>Palma chamærops Plinij.</i>	369
<i>Palma Chriſti Herbariorum. 1561. 1630</i>	
<i>Palma Chriſti ſive Satyrium Ba- ſilicum.</i>	1565
<i>Palma Chriſti minor Matth. o. Sa- tyrium Baſilicum minus, Dod. 1569</i>	
<i>Palma Elate.</i>	163
<i>Palma Indicum Nucem ſerens,</i>	

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

qua & Elephantis.	1761	Papauer nigrum sativum flore	Pedicularis, seu Pedicularia.
Palme sancta similis arbor.	1750	Malva hortensis, aut Pœonia,	1074
Palma victorica symbolum.	369	Pen. & Lob.	1710
Palma vinifera.	1834	Papauer Rhœas maius & minus.	Pedicularis maior, Alpina. 113
Palmacea, seu Arundinacea pin-		439	Pelasgus.
nata spinosa.	1830. & 1831	Papauer spontaneum sylvestre &	Pelichronia.
Palma pinus, siue Conifera.	1832.	hortense, Pen. & Lob.	1286
sylvestris, ibid. Penæ.	ibid.	1710	Penoabson.
Palmlula.	362	Papauer spumum.	1833
Paludapium Gaë.	701	1186	Pentadaetylon.
Panace Heraclea.	1117	Papauer spumum Dioscoridis,	1630
Panaces & Panax.	718	Apoguillare.	Pentadaetylon gramen.
Panaces Asclepium Matthio.	719	1085	420
Panaces Asclepium alterum, Da-		Papauer spumum quorundam.	Pentaphyllum.
lechamp.	740	817	1263
Panaces Chironium.	603	Papauer sylvestre siue nigrum, Do-	Pentaphyllum flore albo & rubro,
Panaces Chironium, siue Flos so-		donai.	Lob.
lis Matth.	740	1710	1266
Panaces Chironium quorundam,		Pappus.	Pentaphyllum supinum, Tormen-
Dodon.	741	574. 1440	tile facie, Lob.
Panaces Heracleum.	886	Papyrus.	ibid.
Panaces Herculeum Matthioli.		1878	Peplion, Dalech.
739		Papyrus Aegyptia, Penæ.	1659
Panax Caronion.	738	1883	Peplis minor Dalecham.
Panax Chironium, Dodonæi.		Paradisus Mahumetis.	ibid.
741		1857	Peplis, Matthioli.
Panax Heracleum.	1278	Paralytica Alpina angustifolia,	ibid.
Panax Heracleum, Lobellij, Spho-		Lobellij. 837. minor siue media	Peplus Parisiensium.
dilium alterum, Dodon.	740	eiusd.	456
Pancratium. 1578. Dalecha.	579	1141	Pepones.
Clusij.	ibid.	Parietaria officinarum.	612. 623
Pancratium maritimum.	1525	Pariz ataco.	617
Pancratium quorundam.	1151	1811	Pepon latus Dodon.
Panicum.	411	Paronychia asine folia, Lobellij.	Pepo maximus Indicus Lobellij,
Panicum Indicum, aliis peregrini-		1214	615
um ibid &	411	Paronychia altera, Rutaceo folio,	Percepier Anglorum.
Panicum sativum.	412	Lobellij.	713
Panicum sylvestre Matthioli. ibi.		ibid.	Perdicium.
Panicum sylvestre aliud Dalech.		Paronychia altera Matthioli.	953. 1241. 1503
413		1213	Perdicium secundum Plinij.
Panis cuculi, Herbariorum.	1354	Parthenis.	683
Panis porcinus & terræ.	1604	949	Perdicium Theophrasti.
Panis varia genera & confectio.		Parthenium.	1392
378. 379. 380. 381		1241. 1626	Perebennuc.
Papauer.	1707	Parthenium Dioscoridis, Dodo.	1901
Papaueris corniculati species, Do-		951	Perfoliata & Perfoliatum.
donei.	1712	Parthenium leptophyllum.	1321
Papauer corniculatum alteri, Clu-		1344.	1321
sij.	1713	1345	Perfoliata species, Bisfolium.
Papauer corniculatum violaceum		Parthenium maritimum mini-	1260
Dod.	ibid.	rum.	1427
Papauer cornutum, Matthioli.		1395	Perichlymenum alterum quorun-
1712		Parthenium μικρόφυλλον, Myconi.	dam.
Papauer fimbriatum, & cristatū		954	1605
album, & nigrum, Lobellij.		Passerina Linaria folio, Lobellij.	Perichlymeni erecti duo genera
1709		1152	Clusij.
Papauer fluidum, Erraticum, ru-		Pastinaca.	273
brum.	ibid.	718	Perichlymenum tertium Dod.
Papauer sativum, Matthio.	1708	Pastinaca aquatica, Herbariorū.	272
Papauer sativum rubrum fim-		1092	Perychlymenum perfoliatū.
briatum, Dalech.	1709	Pastinaca marina.	1427
		1367	Perichlymenum non perfoliatum,
		Pastinaca marina Penæ & Lobel.	Lob.
		Critimum II. Matth.	1428
		1396	Pepioca repens, & non repens.
		Pastinaca pratensis.	1731. 1732
		Pastinaca sativa vulgi, Matthio.	Peristereom.
		719	1314
		Pastinaca sylvestris Matthioli.	Persea.
		720	18.6
		Pata Leonis.	Persea America, Clusij, cum fru-
		1342	ctu, Dalech.
		Pater noster, Vel radix S. Helena	Persea Malus & Persicus.
		Monardi.	293
		1826	Perficorum genera, & quæ ex iis
		Pacton tertium Caryote genus.	prestantiora.
		364	ibid.
		Pauate. 1862. Acofte.	Perficaria. 1040. Matthioli.
		1863	1041
		Paussa Oliva unde dicantur	pustilla Lob.
		343	ibid.
		Payco.	Perficaria non maculosa & Persi-
		1918	caria vrens.
		Pecten Veneris, Scandix quorun-	1038
		dam	Perficaria siliquata.
		712. 713	205
			Perfolata, Plinij.
			1055
			Personata & Personata
			1054
			Personata, siue Lappa maior,
			Mat. 1055. altera, eiusd.
			ibid.
			Pernuina

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Pernuica maior, Lob.</i>	833	<i>Phasolus.</i>	472	<i>Phyllitis.</i>	1218
<i>Pernuica officinarum.</i>	832	<i>Phasolus sativus, sine albus & vulgaris.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Phyllitis laciniata Clusij.</i>	1218
<i>Peruniana alia facie arboribus item innascens.</i>	1829	<i>Phasolus sylvarum.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Phyllon.</i>	1461.
<i>Pes aserinus.</i>	542	<i>Phasolus sylvestris.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Phyllum.</i>	1194
<i>Pes asini.</i>	911	<i>Phellandrium Plinij.</i>	725	<i>Phyllum arrhenogonum, Dalech.</i>	1196
<i>Pes columbinus.</i>	1176.1277	<i>Phellandrium, Plinij.</i>	1093	<i>Phyllum arrhenogonum maius, Dalecham.</i>	1196
<i>Pes columbinus vulgaris Herbariorum.</i>	1815	<i>Phellodrys, eiusque quinque riorum.</i>	25	<i>Phyllum arrhenogonum thelygonon Theophrasti.</i>	1157
<i>Pes corninus Herbariorum.</i>	670	<i>Phellodrys Arcadum, Doru, ætola.</i>	146	<i>Phyllum thelygonum, Dalecham.</i>	1195
<i>Pes corni, & Pes galli, Herbariorum.</i>	1027	<i>Phellodrys coccifera.</i>	27	<i>Phyllum thelygonum, Matthioli.</i>	1196
<i>Pes gallinaceum Herbariorum.</i>	670	<i>Philetaria.</i>	1186	<i>Phytocuma.</i>	1197.
	714.1.91	<i>Philantropos Aparine.</i>	1331	<i>Phytocuma Narbonensium, Pena.</i>	1198
<i>Pes grus.</i>	814	<i>Philetarium Ocimoides à quibusdam cognominatur.</i>	684	<i>Phytocuma quorundam, Dalecha.</i>	1198
<i>Pes Leonis & leoninus.</i>	1175.	<i>Phillyra Theophrasti à Dioscor.</i>		<i>Phytocuma quorundam Herbariorum.</i>	1342
	1281.1324.1342	<i>Phillyrea plurimum dylat.</i>	153	<i>Picata vina. 75. vna.</i>	77
<i>Pes leporia.</i>	441	<i>Phillyrea Dioscor.</i>	90	<i>Picea nitrus.</i>	43 49
<i>Pes lupinus.</i>	1325	<i>Phillyrea & eius varie icones, Matth. Serapionis, Clusij.</i>	153.	<i>Picea resina Galeni an Abiegna la cryma.</i>	54
<i>Pes vitu'i.</i>	1596	<i>Phillyrea Dioscoridis.</i>	252.	<i>Picnocomon Eretæ Salonenfis, Pena & Lob.</i>	1466
<i>Petafites.</i>	1053	<i>Philyca.</i>	257	<i>Picris Dalechampiij, Hieracium Matth. Dodon.</i>	561
<i>Petafite odorati flos.</i>	1054	<i>Philyca tertia Dalech.</i>	258	<i>Piganum, Dodon.</i>	1.80
<i>Petilius flos Plinij.</i>	840	<i>Philyca prima.</i>	258	<i>Pilosella.</i>	1098
<i>Petrapium.</i>	702	<i>Philyca minor Pena, quarta Clusij, Philyca secunda.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Pilosella an Elatine.</i>	1239
<i>Petrofelinum.</i>	700 706	<i>Phleas 1015 mas sine Stæbe Theophr. angustifolia 1016. mas latifolia, sagitta maior Matthi.</i>	1017	<i>Pilosella maior Matth.</i>	1098
<i>Petrofelinum Alexandrinum.</i>	703	<i>ibid. famina.</i>	1017	<i>Pilosella minor Fuchsj.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Petrofelinum Dalechamp.</i>	701	<i>Phlomis.</i>	1107	<i>Pilosella maxima Syriaca Lobel.</i>	1099
<i>Petrofelinum Macedonicum Matt. ibid.</i>		<i>Phlomis lychnitis.</i>	1303	<i>Pilula Cupressi.</i>	57
<i>Petrofelinum Macedonicum Matthio.</i>	702.703	<i>Phlomis lychnitis Clusij.</i>	1304	<i>Pimpinella seu Pimpinella.</i>	1087
<i>Petum.</i>	1895	<i>Phlomos lychnitis altera Syriaca, Lob.</i>	1304	<i>Pimpinella anisif. Elatine.</i>	1239
<i>Peucedanum & Peucedanus.</i>	745	<i>Phlomis lychnitis Pena.</i>	1303	<i>Pimpinella nostra.</i>	1119
<i>Peucedanum Dod.</i>	746	<i>Phlox Theophrasti.</i>	800	<i>Pimpinella, sine Sanguisorba maior, Fuchsj.</i>	1088
<i>Peucedanum minus Italicum, Lobel.</i>	747	<i>Phlox sine Flamma Theophr. Anguillara.</i>	871	<i>Pimpinella sine Sanguisorba maior, Matth. 1087. minor, eius. ibi.</i>	786
<i>Peucedanum Matth.</i>	746	<i>Phenicolobalanus.</i>	365.366	<i>Pimpinella saxifraga.</i>	787
<i>Phacoides.</i>	1671	<i>Phenix.</i>	416	<i>Pimpinella saxifraga maior Matthioli.</i>	787
<i>Phacoides Oribasij.</i>	1669	<i>Photel arbor Catayna.</i>	1840	<i>Pimpinella saxifraga minor, Do. & Lobel.</i>	78
<i>Phanion.</i>	841	<i>Phrinium.</i>	1487	<i>Pinafcellus.</i>	74
<i>Phum Pena & Lob. 1026. 1027.</i>		<i>Phtirion.</i>	1074	<i>Pinafster & eius genera.</i>	44
<i>Phagus.</i>	5	<i>Phullus Batavicus integer, eiusque separate partes.</i>	1398	<i>Pinafster Bellonij, Teda Plinio.</i>	46.47.
<i>Phagus Idæorum & Macedonicum.</i>	6	<i>Phucus marinus.</i>	1369	<i>Pinafster seu pinus sylvestris quaresterilis dicatur.</i>	45
<i>Phagus Theophrasti diversif. 14.</i>		<i>Phu. 927. magnum.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Pinaftrum alio nro male conuer tit Plinius.</i>	43
<i>Phago nostra.</i>	5	<i>Phu Grecum, sine peregrinum.</i>	1043	<i>Pinea nux.</i>	43
<i>Phagus valentius adstringit.</i>	21	<i>Phu minimum.</i>	1127	<i>Pinea ruces & earum vis</i>	51
<i>Phalangius.</i>	851	<i>Phu minimum alterum Lobellij.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Pinei nuclej Malacani, Acosta.</i>	1874
<i>Phalangium.</i>	1496. 594	<i>Phu minimum, Matth.</i>	1043		
<i>Phalangium, Matthioli. 852. Dalechampij. ibid. ramofum, Lob. ibid.</i>		<i>Phu sylvestre.</i>	1042		
<i>Phalaris.</i>	415	<i>Phyllice an meminerit Plinius.</i>	158		
<i>Phallus Hollandicus.</i>	1398				
<i>Pharmaceum.</i>	1273				
<i>Phascolus Brasiliensis; Clusij.</i>	1905				
<i>Phascolus alter Indicus, Clusij.</i>	<i>ibid.</i>				
<i>Phascolus parvi ex America.</i>	1906.				

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Pinipinichiarbuscula.</i>	1790	<i>Pityusa sine Esula minor, Dodon.</i>	rum.	8
<i>Pinorum in sua genera distribu- tio ex quorundam sententia.</i>	49	<i>Hist. stirp. Tithymalus platy- phyllus. Fuchsij.</i>	<i>Plumbago, Plinij.</i>	1041
<i>Pinorum morbus.</i>	49	<i>Pityusa sine Esula minor altera floribus rubris, Lob.</i>	<i>Plumbago Plinij quorundam, 1148</i>	
<i>Pinum montanarum & mariti- marum differentia.</i>	45	<i>Pix quid. 73. ultima pag. unde & quomodo fiat.</i>	<i>Podagra Lini.</i>	1683
<i>Pinus melu.</i>	41	<i>Pix Brutia.</i>	<i>Pogonia castanea.</i>	31
<i>Pinus maritima duo genera, Mat.</i>	45	<i>Pix Brutia, Lycia, Idæa, Nar- ssa, seu Laricia, sine Narycia.</i>	<i>Polemonium & Pol. monia.</i>	1186
<i>Pinus Tubulus, Mugoltalorum.</i>	47	<i>Nem-turica, Corticata, Raslis Rabulana, sine Radulana sine Rasulana sine rubrica.</i>	<i>Polemonij alt. rasfigura.</i>	1187
<i>Piper.</i>	1807	<i>Pix Brutia maxime probata.</i>	<i>Polemonij Dodon.</i>	1186
<i>Piper Aethiopicum, Matth.</i>	1809		<i>Polemonij species Dodon.</i>	1187
<i>Piper apum.</i>	167		<i>Paermonia Monspel lasminum la- teum.</i>	1187
<i>Piper aquaticum.</i>	1038		<i>Polenta.</i>	40041
<i>Piper Breslicum, Calecutium, Hispanum, Indicum.</i>	631		<i>Potum.</i>	1190
<i>Piper Guineæ.</i>	632		<i>Potum. 928. Matth. ibid. alterum eiusd. 928. luteum, Dalech. ibi. quartum, Clusij ibid. monta- num supinum minimum Lo- bell.</i>	939
<i>Piper longum.</i>	1810		<i>Pollen sine Pollin.</i>	39
<i>Piper, Matth.</i>	1809		<i>Polyacantha Cordi.</i>	1473
<i>Piper murinum.</i>	1128		<i>Polyacanthos Theophrasti. ibid.</i>	
<i>Piper quidam vocat Myrtidanū.</i>	239		<i>Polyanthemum.</i>	875
<i>Piper nigrum & album.</i>	1808		<i>Polyanthemum multiplex Dod. ibid.</i>	
<i>Piper rusticum, seu montanum.</i>	213 6 51666		<i>Polyanthemum simplex Dodon. Chrysanthemum Fuchsij. ibid.</i>	1286
<i>Piperula.</i>	694		<i>Polybidion.</i>	1286
<i>Piperella.</i>	132. 898		<i>Polycarpum.</i>	444
<i>Piperifera arbor Theueti.</i>	1808		<i>Polycnemon.</i>	896
<i>Piperis virem apud antiquos ob- tinebant ante illius inuentio- nem Myrti bacca.</i>	241		<i>Polycnemom. 932. Dalechamper & Lob. ibid.</i>	
<i>Piperitis.</i>	666		<i>Polygala multorum, quibusdam Onobrycis.</i>	488
<i>Piperitis Plinij, diuersa à Piperi- ti Herbariorum. 631. eadem.</i>	678. 679		<i>Polygala repens.</i>	489
<i>Pistacia & Pistacea, & Pistacia.</i>	360		<i>Polygala Galeniana.</i>	ibid.
<i>Pistacium.</i>	102		<i>Polygonum.</i>	488
<i>Pistaciorum arbor.</i>	360 361		<i>Polygonum Cordi.</i>	210
<i>Pistolochia.</i>	591. 976. 977		<i>Polygonum Matth. Astragaloides Lob.</i>	488
<i>Pistuna, Magonia.</i>	1016		<i>Polygonaton.</i>	1463
<i>Pistolochia Lufij. 978. Dodonæi. ibid.</i>			<i>Polygonatum.</i>	1621
<i>Pistolochia Plinij.</i>	1193		<i>Polygonatum angustifolium, Fuch- sij. Lob. ibid.</i>	1623
<i>Pisti non meminit Dioscorides.</i>	450		<i>Polygonatum maius, Matth. ibid.</i>	
<i>Pisum.</i>	449		<i>Polygonium.</i>	1105
<i>Pisum Americum.</i>	40		<i>Polygonium alterum Serpylli fo- lio, Pene.</i>	1124
<i>Pisum cordatum.</i>	157		<i>Polygonum samina.</i>	1071
<i>Pisides, Pinorum viceque fru- ctus qui in conis inueniuntur, & eorum vis.</i>	51		<i>Polygonum Heruaria foliis.</i>	1124
<i>Pitvinon Phylerna.</i>	73		<i>Polygoni Hispanici genus Clusij. 1115</i>	
<i>Pityusa.</i>	1652		<i>Polygonum marinum.</i>	1386
<i>Pityusa Matth. sine Esula maior. ibid.</i>			<i>Polygonum marinum primum & alterum Dalech. ibid.</i>	
<i>Pityusa sine Esula minor, Dodo. Hystor. stirp. Tithymalus Cypa- rissus, Fuchsij.</i>	1654		<i>Polygonum mas.</i>	1123
			<i>Polygonum minus Matth.</i>	126
			<i>Polygonum montanum, Pene 1124</i>	
			<i>Polygonum syluestre a Plinio des- criptum.</i>	1386
				<i>Polyneu</i>

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Polynuron.</i>	1254	<i>Poshos caruleus Theoph.</i>	1025	<i>Pseudomyagr.</i>	1138
<i>Polypodium.</i>	1112.9	<i>Præcoia vel Præcoqua mala.</i>	297.	<i>Pseudomyagr. Matt.</i>	1137.
<i>Polypodium ilicense.</i>	1210	<i>unde dicta.</i>	ibid.	<i>Pseudomyrsine.</i>	110
<i>Polypodium primum Matth.</i>	1229	<i>Præstium officin.</i>	960	<i>Pseudonarcissus.</i>	1523
<i>Polypodium secundum Matthio.</i>	1230	<i>Præstium fatidum.</i>	1251	<i>Pseudonardus.</i>	919
<i>Polypternum.</i>	554	<i>Primula hortensis Anglica, Lo.</i>	834	<i>Pseudorhys bifolium.</i>	1260
<i>Polyrrhison latifolia Dalechamp.</i>	120	<i>& Pena.</i>	834	<i>Pseudorhabarbarum ecentiorum.</i>	666
<i>Polyrrhison Plinij, Dalechampij.</i>	ibid.	<i>Primula Veris minor, Dod.</i>	835	<i>Pseudochenantium.</i>	1395
<i>Polyrrhison Castiani.</i>	537	<i>Primula Veris prior, Matthioli.</i>	834	<i>Pseudolachys, Matt.</i>	963
<i>Polystrum.</i>	444	<i>Primula Veris altera, Matthioli.</i>	ibid.	<i>Pseudotruthium Matthio.</i>	822
<i>Polytrichan.</i>	1209	<i>ibid.</i>	ibid.	<i>Pseudoscyomorus.</i>	358
<i>Polytrichum aurum maius & minus.</i>	1212	<i>Primula Veris pachyphyllos, sine Auricula vrsi, Matth.</i>	836	<i>Psidion officin. quid.</i>	304
<i>Polytrichum officinarum.</i>	1211	<i>Primula Versi sylvarum flore multiplici.</i>	815	<i>Psilothrum.</i>	1409
<i>Poma Adami.</i>	301.302	<i>Primula sylvarum, Lob.</i>	ibid.	<i>Psora.</i>	1065
<i>Poma amoris.</i>	626	<i>Primula sylvarum floris obscuri.</i>	ibid.	<i>Psicotrophum.</i>	1282
<i>Poma vti seruitur. 289. colligatur.</i>	ibid & 290	<i>ibid.</i>	ibid.	<i>Psyllium. 1172. Matth.</i>	ibid.
<i>Poma sylvestria pissima.</i>	286	<i>Præserpinaca.</i>	1113	<i>Psidium alterum Matt.</i>	1173
<i>Pomi nomen apud Latinos late patet. 285 unde.</i>	286	<i>Præfopis, sine Ariction.</i>	1055	<i>Psarmica. 1168. Fa. hsq.</i>	ibid.
<i>Pomorum genera in Gallia propè innumera.</i>	ibid.	<i>Pruna.</i>	313	<i>Psarmica altera Matth.</i>	1169
<i>Pomorum primis inuentor.</i>	287	<i>Pruna laudatissima.</i>	314	<i>Psarmica montana Dalechampij.</i>	ibid.
<i>Pomum amoris sine aureum.</i>	628	<i>Prunella.</i>	1075. 1310	<i>Pternix.</i>	1440
<i>Pomum Nicaragæ.</i>	1857	<i>Prunella sine Consolida minor, Matth.</i>	ibid.	<i>Ptissana ex hordeo. 199. eius præparandi modus ibi. & 100. ex tritico ibid.</i>	ibid.
<i>Populi fructifera necne.</i>	87	<i>Prunorum apud Gallos innumera ferè differentie.</i>	314	<i>Ptissana pharmacopœorum potio.</i>	401
<i>Populus quibus locis gaudeat & eius vires.</i>	87 88	<i>Prunorum vires ibid. &</i>	315	<i>Pulegium.</i>	890
<i>Populus Alba, Nigra, Lybica, seu Alpina.</i>	86 87	<i>Prunus.</i>	33	<i>Pulegium Regium. 891. cerninum.</i>	892
<i>Populus Alpina.</i>	220	<i>Prunus Sebestena Matth.</i>	359	<i>Pulegium si uesire.</i>	6-6
<i>Populus americana.</i>	1830	<i>Prunus sylvestris.</i>	130	<i>Puls in maluar quid.</i>	1689
<i>Portulaca.</i>	563	<i>Prunus ueris.</i>	833	<i>Pulicaris herba.</i>	1172
<i>Portulaca agreßis.</i>	1128	<i>Pseudanthisa.</i>	1101	<i>Pulmonaria.</i>	1326
<i>Portulaca hortensis species Cæpæa quibusdam</i>	1346	<i>Pseudoarum caruleus Tragi.</i>	69	<i>Pulmonaria fungosa.</i>	1327
<i>Portulaca marina, Halimus vulgaris Matth.</i>	582	<i>Pseudopapilion.</i>	650	<i>Pulmonaria Gallorum, sine Auriculamurie maior, Tragi</i>	1328
<i>Portulaca sativa.</i>	551	<i>Pseudocapsicum.</i>	600	<i>Pulmonaria maior.</i>	1327
<i>Portulaca sativæ cõdiendaratio.</i>	551	<i>Pseudocassia.</i>	1796	<i>Pulmonaria minor Dalech.</i>	1328
<i>Portulaca sylvestris 551. 1128. 618</i>		<i>Pseudochamæpitys Dod.</i>	1161	<i>Pulsatilla 849. alba Lob.</i>	ibid.
<i>Potamogeton 1007 alter.</i>	108	<i>Pseudocinnamum.</i>	1797	<i>Pulsatilla I. Alpina, Dalec. 850.</i>	
<i>Potamogeton, Castoris.</i>	1012	<i>Pseudocoronopus Dod.</i>	670	<i>Pulsatilla II. Alpina, Dalec. 851.</i>	
<i>Potentilla.</i>	1064	<i>Pseudocostus Matth.</i>	757	<i>Pulsatilla II. Alpina, Dalec. ibi.</i>	ibid.
<i>Potentilla maior, Anguillare. 1081</i>		<i>Pseudocrania Cordi.</i>	197	<i>Pulsatilla altera, Dod.</i>	ibid.
<i>Poterium Clusij.</i>	1478	<i>Pseudodictamnium. 892. 894.</i>	895	<i>Pulsatilla rubra, Lob.</i>	ibid.
<i>Poterium. 1477 Matth. Pena & Lob.</i>	1488	<i>Matth & Dod.</i>	895	<i>Punilio.</i>	1560. 1561
<i>Poshos caruleus Matth.</i>	1430	<i>Pseudoelleborus sine Cõslogo. Matthio.</i>	1638	<i>Punicum sylvestre.</i>	305
		<i>ibid.</i>	1053	<i>Pycnitis.</i>	1248
		<i>Pseudohermocladus Italorum.</i>	1567	<i>Pycnocomum.</i>	1681
		<i>ibid.</i>	1573	<i>Pyracantha.</i>	14
		<i>Pseudohermocladus Matthio.</i>	1573	<i>Pyra Cotonæ.</i>	290
		<i>ibid.</i>	1573	<i>Pyramidalis Lutetiana.</i>	828
		<i>Pseudolanthus aspera Matthioli, Lanthus aspera Marantha.</i>	1221. 1225	<i>Pyrraria.</i>	1595
		<i>ibid.</i>	1221. 1225	<i>Pyrastr.</i>	134. 135
		<i>Pseudolanthus Matth.</i>	349	<i>Pyrethrum Anthemidis.</i>	1170
		<i>Pseudonelambium.</i>	417. 438	<i>Pyrethrum Gesneri.</i>	1170
		<i>Pseudomoly Dod.</i>	1594	<i>Pyrethrum sylvestre.</i>	1168
				<i>Pyrethrum verum Matt.</i>	1170
				<i>Pyrethrum alterum Matth. ibid.</i>	ibid.
				<i>Pyrola.</i>	841

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

Pyros achne. 1666
Pyrus 306. unde sic dicta. ibi. eius
genera apud veteres. ibid. &
307. infinita hodie in Europa
ibid.
Pyrus Carica. 1595
Pyrus quadam satina spinis arma
ta, in Lugdunensi. 136
Pyxacantha. 148
Pyxacanthon Chironium vocant
Græci Spinam ex qua Lycium
fit. 149

Q

Q *Vadrifolium, Phæum Pene*
& Lob. 1027
Quebulgi. 1687
Queiro. 185
Quercula minor. 1162
Quercus modo pro genere, modo
pro unica glandiferarum spe-
cie capitur, & unde dicitur 1.
Quercus genera quinque. 2. & 4.
Quercus genus aliud à superiori-
bus quinque, in Sequanus. 8.
Quercus genera Dalech. optime
distribuit. ibid.
Quercus marina Lusitana fabu-
losa. ibid.
Quercus peregrina siue Maurita-
nica. ibid.
Quercus qua ferant prater glan-
das. ibid. & 9. 10. & 11
de *Quercu* dignissima cognitu. 11
Quercus fructum & animal gi-
gnit. 17
Quercus species perpetuo vi-
rens. 4
Quercus sudor. 17
Quercus vires & medicamenta.
12. & 13
Querni corticis usus ad coria. 14.
Quinquefolium. 1263
Quinquefolium album. 1265. ru-
brum ibid. album *Matth.* ibid.
rubrum. *Dod.* ibid.
Quinquefolium luteū maius. 126
minus. ibid.
Quisquilium. 27

R

R *Abich Arabum Africano-*
rum. 145
Radix contra venena, Carto san-
cto, Radix S. Helene. 1825. 1826
Radix Drakena. 1858
Radix Idæa. 192
Radix Olivæ unde dicantur. 343
Radix sulphurea. 745

Radix Syriaca, Columella. 812
Ranunculus. 1027
Ranunculus aquaticus. 1021
Ranunculus aquaticus angustifol-
lius ferratus, Lob. 1041
Ranunculus Constantinopolitanus
Clusij. 1034
Ranunculus flore globoso. 1033
tuberosus. 1034
Ranunculus Hederaceus, Dalech.
1031
Ranunculus hortensis prior, Dod.
1031. alter eiusdem. 1032
Ranunculus hortensis I. Fuch. al-
bus prior, siue echinatus, *Dod.*
1030
Ranunculus IIII. Fuch. la. Feus. al-
bus nemorensis. *Dod.* ibid.
Ranunculus IIII. Fuch. luteus.
luteus nemorensis, *Dod.* ibid.
Ranunculus Illyricus. 1032. Lusit-
anicus. 1033
Ranunculus I. *Matt.* 1027. II. 111.
eiusd. 1028. IIII. V. VI. eiusd.
1029
Ranunculus montanus albus, Da-
lech. 1031
Ranunculus micus polyanthes,
Lob. 1035. flammeus aquaticus.
angustifolius, eiusd. ibid.
Ranunculus phœniceus, Myco-
ni. 1036
Ranunculus purpureus. 1036 latif-
olius. ibid.
Ranunculus I. sylvestris Fuch. au-
ricomus, *Dod.* 1029
Rapa, quadraginta libras exce-
dentia singula. 639
Raphani genera tria. 519
Rhaphanus. 634
Rhaphanus siue Radicula palustris.
1090
Rhaphanus purpureus minor, Lo.
636
Raphanus rusticus. 663
Rhaphanus rusticus, Matth. 636
Rhaphanus sativus, Matthioli.
635
Rhaphanus secundus, Matthioli.
ibid.
Raphanus sylvestris. 1595
Rhaphanus sylvestris Dodonæi.
635
Raphanus sylvestris officinarum.
666
Rapheion. 1608
Rapistrum. 652. 653
Rapistrum carorum. 542
Rapistrum campestre. 1239
Rapitius colis Catonis. 522
Rapontium. 641

Rapum, & Rapa. 639. 1604
Rapum D. Antonij. 1034
Rapum longum. 640
Rapum sativum orbiculatum, ibi.
Rapum silvestre. ibid
Rapunculi pyramidalis genus, Da-
lechamp. 641. 642
Rapunculus maior Dod. 641
Rapunculus minor Dodon. ibid.
Rapunculus minor, Matthioli.
640
Regina prati, Herbariorum. 1080
Remedium pauperum. 1916
Remora aratri. 447
Reseda. 1199
Reseda lutea. ibid. candida. ibid.
Resina Græcis g^{rum} dicitur. 63
Resina Abiegna Indica 1783. Car-
thaginensis. ibi.
Resina ex Abiete, vltuti ex Pinu,
ac Picea sicca & candida, ibus
ementiens, & vulgo pro eo v-
surpata. 55
Resina Colophonia. 72
Resina cretica ex Lentisco. 64
Resina Lentiscina, vulgo Mastic.
63. 96
Resina liquida omnium prestan-
tissima ex Terebinto. 62
Resina liquidam fundit Larix.
56. 57
Resina picea 54. id est albus. ibi.
Resina unde manant. 69. 70
Resina 990714. 72
Resina, Spagas dicta, Epargos, Pfe-
cas, Stagonia Stalactis. 71
Resina Strabilina, Abielina Cere-
bintina. 73
Resina 504205 vel potius 151805.
71
Resina 50714 vel potius Phrygia.
ibid.
Resina calida & sicca sunt. 57
Resina coctura. 71
Resina ex Lentisco vires. 64
Resina usus varius. 73
Resinifera arbores. 35
Resibonis Herbariorum. 447
Rhabarbarum. 1699
Rhabarbarum Chagi Memet &
Matth. 1701
Rhabarbarum Indicum. 1901
Rhabarbari sputum quorūdam.
1080
Rhabarbarum monachorum. 601
606. vires. 608
Rhacapatu, Helenij folio. 1700
Rhamni vires. 142
Rhamnorum vna icones aliquot.
140. 141
Rhamnus, eiusque historia valde

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>controuersa.</i>	138.139	<i>Rosarū genera, Prænestina, Campana, Milesia, Trachynia, Alabandica, Spineola, Centifolia, Græca seu Lychnis, Græcula, Moscheutos, Autumnalis seu Coroneola icō.</i>	124.125.126	<i>Sagittaria aquatica, Plinij.</i>	1016
<i>Rhamnus Canaricus.</i>	142	<i>Rosarum loci natales.</i>	127	<i>Sagitta vel Sagittalis, Herbariorum.</i>	1016
<i>Rhamnus Catharticus.</i>	145	<i>Rosmarinum & Rosmarinum coronarium.</i>	763	<i>Sagitta maior, & minor, Matth.</i>	ibid.
<i>Rhaponticum alterum angustifolium Lobell.</i>	1701	<i>Rosmarinum officinarum.</i>	967.1365	<i>Sagittalis herba.</i>	1334
<i>Rhaponticum quarundam officinarum non sine errore.</i>	1286	<i>Rosmarinum sylvestre, seu Bohe-micum, Matth.</i>	967	<i>Salariaria castanea.</i>	31
<i>Rha Turcicum siue Poticum.</i>	1600	<i>Rosmaris aculeatus.</i>	173	<i>Salicaria.</i>	865.1058
<i>Rhexia.</i>	1101	<i>Rostrum ciconia & Rostrū gruū.</i>	1275.1277	<i>Salicastrum.</i>	1413
<i>Rhodacena mala.</i>	293.294	<i>Rostrum porcinum officinarum.</i>	564	<i>Salicornia.</i>	1377
<i>Rhodia radix.</i>	980.981	<i>Ruberta.</i>	1278	<i>Salicornia, siue Kali Matthioli.</i>	1378
<i>Rhododaphne.</i>	244	<i>Rubia.</i>	1329	<i>Salinaris.</i>	1170
<i>Rhododaphne parua.</i>	192	<i>Rubia satua. ibi. sylvestris. ibid.</i>	ibid.	<i>Salunca.</i>	923
<i>Rhododendron.</i>	270	<i>Rubia leuis Taurinensium, Lobe.</i>	1330	<i>Salunca Neapolitana.</i>	982
<i>Rhododendrum.</i>	244	<i>Rubia minima Lobellij. ibi.</i>	ibid.	<i>Salix, eiusque apud veteres varia genera ex colore, & si, secū-ditate. 174. Matthioli quat-tuor.</i>	275
<i>Rhodora Gallica Plinij, quorundam.</i>	1064	<i>Rubi mora.</i>	253	<i>Salix alba pericalis vulgaris.</i>	275
<i>Rhoë.</i>	257	<i>Rubi vires ad medic.</i>	120.121	<i>Salix Amerina.</i>	111
<i>Rhois tria genera Plinio.</i>	107	<i>Rubigo.</i>	418	<i>Salix Helice Theophrasti.</i>	277
<i>Rhois multa nomina.</i>	108	<i>Rubus, eiusque genera.</i>	119	<i>Salix Homero ὄνομασται & id est, giperda dicta.</i>	279
<i>Rhois species Herbarijs credite.</i>	109	<i>Rubus caninus, seu Canirubus.</i>	121.	<i>Salix humilis repens angustifolia.</i>	278
<i>Rhopalon.</i>	1009	<i>Rubus idæus spinosus,</i>	123	<i>Salix marina.</i>	279
<i>Rhus vel Rhos.</i>	105.107.416	<i>Rubus idæus nō spinosus, Chame-batos Tragi.</i>	124	<i>Salix phœnicophleas, siue phœ-nicea.</i>	277
<i>Rhus sylvestris Plinij, & altera abilla.</i>	110	<i>Rubus idæus non spinosus.</i>	613	<i>Salix platyphyllos leucophleas Matth. & Dalec. altera</i>	276
<i>Ribem rubrum male quidam Vnam vrsesse putant.</i>	134	<i>Rumex.</i>	600.601	<i>Salix purpurea nigra viminalis. ibid.</i>	ibid.
<i>Ribes Arabum.</i>	132	<i>Rumex vntuosus Tragi.</i>	602	<i>Salkali.</i>	1377
<i>Ribes officinarum.</i>	ibid.	<i>Ruscus.</i>	207	<i>Salvia 879. maior. ibi. minor qua & nobilis, ibid. sylvestris ibi.</i>	880
<i>Ricinus. 1630 Matth.</i>	ibid.	<i>Ruscum vel Ruscus.</i>	236	<i>Salvia agrestis, phacelus Dodon.</i>	880
<i>Ricinus Americus.</i>	1790	<i>Ruscus & Ruscum.</i>	242	<i>Salvia baccifera Creticis. 879.880</i>	ibid.
<i>Rithrum.</i>	1481	<i>Ruta. 472. satua. ibid. sylvestris, Matth.</i>	ibid.	<i>Salvia Romana.</i>	672.678
<i>Roboris appellatio. 1. & 4.</i>		<i>Ruta canina, Herba S. Antonij, Lob.</i>	973	<i>Salvia vieta.</i>	1109.1213
<i>Robur ab Haliphloeo Plinius dis-singuis.</i>	3.	<i>Ruta capraria.</i>	975	<i>Salutaris herba.</i>	139
<i>Robus tritici genus. 374. pondere & nitore præstat. ibid.</i>		<i>Ruta Harmala, Matth.</i>	973	<i>Samara quid.</i>	80
<i>Ros Solis & Korella Herbariorū.</i>	1212.	<i>Ruta muraria.</i>	1209	<i>Sambucus. 266. eius genera. ibid.</i>	267.268
<i>Rosa.</i>	124	<i>Ruta muraria, paronychia.</i>	1213	<i>Sambucus aquatica. Thraupalus Theophrasti.</i>	270
<i>Rose temperamēta & vires. 128. 129</i>		<i>Rutula sylvestris, Pena & Matt.</i>	973	<i>Sambucus Sylvestris.</i>	98
<i>Rosa A'pina.</i>	270	<i>Ruthrum Theophrasti.</i>	1481	<i>Sambucus Sylvestris pro Mandra gora, si illa desit, usurpari po-terit. ibid.</i>	ibid.
<i>Rosa Damascena quæ & Moscha-ta, & eius icon. 125. quando flo-ret.</i>	128	<i>S</i>		<i>Sambucus valida.</i>	102
<i>Rosa Damascena & Mesue & veteribus Græcis tum La-tinis incognita.</i>	130	<i>Abdariffa Lob.</i>	595	<i>Samolium Plinij, quorūdam.</i>	1090
<i>Rosa Græca.</i>	815	<i>Sabdariffa alia.</i>	ibi.	<i>Sampuchum.</i>	881
<i>Rosa de Hiericho, Loniceri.</i>	1796	<i>Sabina arbor.</i>	59	<i>Sanamunda.</i>	685
<i>Rosa Lutea, veteribus indicata, & eius descriptio.</i>	125.126	<i>Sabina vel Saina.</i>	182.245	<i>Sanamunda prima, Clusij.</i>	1668
<i>Rosa Pestane bifere.</i>	128	<i>Sabina vires.</i>	184	<i>Sanamunda secunda Clusij.</i>	1365
<i>Rosa Sylvestris multæ varietates.</i>	127	<i>Sabinam Plinius herbam vocat, quam fruticem atque etiam ar-borem omnibus esse cōstat. 182</i>		<i>Sanamunda tertia Clusij.</i>	1669
<i>Rosa sylvestris Anglicana Pene. ibid.</i>		<i>Sabucus, seu Sambucus.</i>	266	<i>Sana sancta siue Tabacum mini-mum, Lobellij.</i>	1896
<i>Rosa sylvestris Pomifera. ibid.</i>		<i>Sacra herba.</i>	1334		
<i>Rosæ transmarina.</i>	584				

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>S. n. f. spiritus radix.</i>	724	<i>Saxifraga.</i>	1111	1576 sine flore, eiusd.	1577
<i>Sandalides P. m. a.</i>	364	<i>Saxifraga alba, Fuchsj. seu Saxi</i>		<i>Scilla Matth.</i>	1576
<i>Sandalis.</i>	265	<i>fraga quarta Matthioli.</i>	1113	<i>Scilla pusilla.</i>	1578
<i>Sandaracha.</i>	67	<i>Saxifraga Alpina.</i>	1114	<i>Scirpus quid.</i>	983
<i>Sanguinalis & Sanguinaria.</i>	1123	<i>Saxifraga altera Matthioli.</i>	1112	<i>Scitima fagus.</i>	3435
<i>Sanguinaria & Sanguinalis fœmina.</i>	1072	<i>Saxifraga Anglica Pene.</i>	ibid.	<i>Scleara.</i>	965
<i>Sanguinaria radix.</i>	1281	<i>Saxifraga aurea Dodonai.</i>	1113	<i>Scleara, siue Scarlea, Herbariorū.</i>	916.
<i>Sanguinella.</i>	414.423	<i>Saxifraga aurea, Lob.</i>	1114	<i>Scolecion granum.</i>	2829
<i>Sanguisorba.</i>	1119	<i>Saxifraga magna Matth.</i>	1113	<i>Scolymus.</i>	1416
<i>Sanguisorba maior, & minor.</i>	1087	<i>Saxifraga III. Matth.</i>	1112	<i>Scolymus Dioscoridis, Cynara f.</i>	
<i>Sanguis draconis.</i>	602	<i>Saxifraga seu Saxifragia officinar.</i>	786	<i>uestrius, Pene.</i>	1417
<i>Sanguis Herculis.</i>	1286	<i>Saxifraga Romanorum, Lob.</i>	1114	<i>Scolymus Theophrasti, Clusij.</i>	1418
<i>Sanicula.</i>	1295	<i>Saxifraga vera Dioscor.</i>	1111	<i>Scolopendrium.</i>	1215
<i>Sanicula. 1268 mas.</i>	ibid.	<i>Saxifraga umbellifera Anglorū.</i>		<i>Scopa regia.</i>	1117
<i>Sanicula femina Fuchsj. ibid. & 1269</i>		711		<i>Scoparia Belueder.</i>	1333
<i>Sanicula femina Fuchsj.</i>	1636	<i>Saxifragia officinarum.</i>	1111	<i>Scordium, Scordalis Plinio.</i>	909
<i>Sanicula maior quorundam.</i>	1281	<i>Scabiosa.</i>	1065	<i>Scordium Matthioli.</i>	910
<i>Sant'um.</i>	1768	<i>Scabiosa Hispanica Clusij maior.</i>		<i>Scordalis altera Plinij.</i>	906
<i>Santolina Dodonai, Santonicum maius Cordi.</i>	945	1110		<i>Scordoprasen Matth. 1549. alterū duplex Lob.</i>	ibid.
<i>Sapini nomine Bellonius Piccam descripsit.</i>	49	<i>Scabiosa maior vulgaris Pene & Lob.</i>	1108	<i>Scorpioides. 1353. Dod. Matth. ibi.</i>	
<i>Sapinus, Abietis pars inferior.</i>	5153	<i>Scabiosa Matthioli maior.</i>	1066	<i>Scorpioides leguminosi.</i>	493
<i>Saponaria 811 maior.</i>	822	<i>minor.</i>	ibid.	<i>Scorpioides montanum Dal.</i>	1191
<i>Saponaria altera.</i>	1186	<i>Scabiosa media Lob.</i>	1110	<i>Scorpio.</i>	609.610
<i>Saponaria minor, Dalechampij.</i>	823	<i>Scabiosamontana.</i>	1107	<i>Scorpio maritimus.</i>	1387
<i>Saponaria spherule.</i>	1877	<i>Scabiosa montana Dalech.</i>	1108	<i>Scorpiurus.</i>	1388
<i>Sardianæ glandes.</i>	30	<i>Scabiosa montana calidarum regionum, Lob. & Pene.</i>	1110	<i>Scorpius alter, primus Plinij, siue Genista spinosa Vlex Plum.</i>	164
<i>Sardoa herba.</i>	1028	<i>Scabiosa montana omnium minima, Pene.</i>	1108	<i>Scorpius alter quibusdam Aspalathus II. Hispanus.</i>	283
<i>Sarga, o.</i>	1917	<i>Scabiosa peregrina Lobellij.</i>	1108	<i>Scorpius Theophrasti.</i>	163 164
<i>Sarxiphagoz.</i>	1282	<i>Scabiosa, seu Stæbe salmantica prior, Clusij.</i>	1109	<i>Scorzonera.</i>	1206
<i>Sarza parilla vera.</i>	979	<i>Scalia.</i>	1440	<i>Scorzonera Boëmica, Matt.</i>	1207
<i>Sassifras arbor Monard.</i>	1786	<i>Scammonia.</i>	1662	<i>Scorzonera Hispanica, Matt. ibid.</i>	
<i>Sassifra Italorum.</i>	1079	<i>Scammonium.</i>	ibid.	<i>Scourgeon frumentum.</i>	394
<i>Satureia Dioscoridis & Matthi.</i>	897	<i>Scammonia, Matthioli.</i>	1662	<i>Scrophularia maior.</i>	1147
<i>Satureia durior, Dalechampij. ibid.</i>		<i>Scammonia maritima Monspelici fcs.</i>	ibid.	<i>Scrophularia maior, Matth.</i>	1085
<i>Satureia lutea, Dalechampij.</i>	899	<i>Scammonie succus, cuius usus est quomodo colligendus, & sincerus ab adulterato secernendus.</i>	ibid.	<i>Scrophularia minor, quorundam.</i>	1048.
<i>Satureia vulgaris, Matth.</i>	838	<i>Scammonie succi magnus delectus habendus, quia nullus nisi varie adulteratus ad nos affertur.</i>	1664	<i>Scrophularia secunda Dod.</i>	1356
<i>Satyrja.</i>	1549	<i>Scammonij facultates.</i>	1663	<i>Scythica herba.</i>	249.250
<i>Satyrjum.</i>	165	<i>Scammonium & nue Plinij quorūdam.</i>	1426	<i>Sebesten officinar.</i>	359
<i>Satyrjum Basilicum maius, Dod. 1568. alterum eiusdem. 1569 minus.</i>	ibid.	<i>Scanaria.</i>	72	<i>Secale.</i>	390.396
<i>Satyrjum castrum Gemme.</i>	1564	<i>Scandix, Petten Veneris quorundam.</i>	ibid.	<i>Securidaca.</i>	444
<i>Satyrjum Dalechampij forte Pseudohermoadiculus. Matthioli.</i>	1567	<i>Scandulaceum.</i>	660	<i>Securidaca montana Mart.</i>	492
<i>Satyrjum erythronium Matthioli ibid.</i>		<i>Scariola.</i>	546 555 556	<i>Sedar.</i>	345
<i>Satyrjum primum Matthio.</i>	1568	<i>Scatum cali, officin.</i>	1091	<i>Sedum.</i>	1128
<i>Satyrjum rubrum Dalecha.</i>	566	<i>Scba, id est Absinthii maris.</i>	184	<i>Sedum minimum arboreseens, Lobel.</i>	132
<i>Satyrjum trifolium, seu album, Dalech.</i>	1567	<i>Sebananthi flores, Lob.</i>	1885	<i>Sedum minimū tertium, Lob.</i>	1133
<i>Savina officin.</i>	182	<i>Scilla.</i>	1575	<i>Segetalis.</i>	1620
<i>Sawron.</i>	645	<i>Scilla Hispanica sine flore, Clusij.</i>		<i>Selago Plinij.</i>	1364
				<i>Selago Plinij, siue Comphora: a. 1200. 1201</i>	
				<i>Selago Plinij quorundam.</i>	1324
				<i>Selinus Brasica.</i>	519
				<i>Semen.</i>	384
				<i>Semen sanctum Matthioli.</i>	945
				<i>Semen sanctum, Semen lumbicorum, semen cōtra officinarum.</i>	

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

941.944	unde dicta.	ibid.	tè patent eius significatum.
Semina vt à vermiculis non e-	Seruilla & Seruillum.	722	375
rodantur.	Sesama vel Sesamum.	652	Siliqua. 480
Seminalis.	Sesamoides Cordi.	1639	Siliqua, & Siliqua dulcis. 112
Semperuuium.	Sesamoides magnum & paruum.	1668	Siliqua Aegyptia. 113
Semperuuium arborescens alterum	Sesamoides minus Dalechampi.	1670	Siliqua siue Castia cathartica.
Matthioli.	1670		ibid.
Semperuuium marinum quorun-	Sesamoides minus Gesneri.	1638	Siliqua Phaeoli Brasiliensi, Lo-
dam amarum Columelle.	Sesamoides minus Matthio.	1670	bel. 1905
Semperuuium montanum.	Sesamoides paruum siue Ocimo-	683	Siliqua.
Senetio.	des minimum.	482	473 474
Senetio fatidus Dalechampi.	Sesamum & Sesama.	482	Siliquarum vires. 113
576	Sesamum verum.	748	Siliquas in cibis damnat Galenus.
Senetio maior, siue Flos S. Iacobi	Seseli.	748	ibid.
Fuchsi.	Seseli Aethiopicum Matthiol.	748	Siliquastrum Plinij. 631
Senetio maior, siue Flos S. Iacobi,	Seseli Aethiopicum verum.	750	Siliquastrum Plinij. 678. unde
Matth.	Seseli Massiliense.	744 749	dictum. 679
Senetio Matth.	Seseli Massiliense, Pene.	749	Silphij succum controuersus. 730
Senetionis species Dodon.	Seseli Peloponnesense, Matth.	750	Silybum. 1438. 1465
Senetionis genus Myconi.	Seseli Peloponnesense folio Cicute,	ibid.	Silybum, siue Leucacantha Loni-
Senna. 217. quare Alexandrina	Pene.	ibid.	ceri. 1446
dicta.	Seseli Peloponnesense folio Cicute,	790	Simila. 376
Senna folij an folliculū magis pur-	quorundam.	790	Similago. 379
get.	Seseli pratense, Lobellij.	752	Sinapi, & Sinapis. 645
Senna Mauritanorum.	Setania vel Setanios Messilus.	334	Sinapi album Dalechampi. 1168
Sentis.	Seutolopathus.	543	Sinapi Alexandrinum probat
Sentio quid.	Seutomalache.	ibid.	Galenus, sicut Plinius Aegypti-
Septifolium.	Sicla, pro Sicula, Beta omnis ho-	531	trium. 648
Serapias candido flore, Lobellij.	Sida.	1011. 1012	Sinapi amarum, Dalechampi.
1562	Sideritis.	1117	647
Serapias Dioscor. 2. Gemmae. Orchis	Sideritis alia.	1122	Sinapi echinatum, Dalechampi.
Basilica altera. Cynoforchis altera	Sideritis prima, Matthioli.	1117	ibid.
maior Lobbell.	Sideritis secunda, Matthiol.	1118	Sinapi hortense. 646
Serapias famina pratensis, siue	Sideritis tertia, Matth.	ibid.	Sinapi Persicum. 661
Palma Christi, atrion basilicum	Sideritis quarta, Matthioli.	ibid.	Sinapi Persicum quorundam. 806
alterum Dod.	Sideritis Monspelicisum.	1120	Sinapi rusticum. 661
Serapias minor rubra, Gemmae.	Sideritis Monspelicis, Pene.	1122	Sinapi satinum.
1562	Sideritis montana, Pene.	ibid.	646
Serapias montana folio leui, Gem-	Sideritis pratensis lutea.	1121	Sinapi sylvestre. 642. 646
ma.	Sideritis pratensis rubra.	ibid.	Sinapi & Thlaspi media Prouin-
Serapias palustris altera leptophy-	Sideritis, Querno folio, Dalech.	ibid.	cialis planta Pene. 1183
la, Gemmae.	Sideritis quorundam.	1241	Singadi. 1891
Serapias palustris III. Gemmae.	Sideritis tertia quorundam, ma-	1294	Sion. 658
1563	gno errore.	1294	Sirium. 1496
Sericazihypba 357. controuersum	Sidia qua dicantur.	855	Sisara. 185. 1482
an eadem.	Sidion quid.	304	Sisarum. 722
Seris.	Sigillum beate Mariae.	1411. 1412	Sisarum maius, Matth.
Seris satina Lobellij.	Sigillum Salomonis.	1623	723
Serpentaria.	Silaum Plinij, quorundam.	1093	Sisefios. 748
Serpentaria maior vulgo dicta.	Siler est montanum officinarum.	744	Siser. 722
ibid.			Siser palustre. 723
Serpentaria minor.			Sison. 708
Serpentaria minor, Matth.			Sison, seu Petroselinum Macedo-
maior, eiusd.			nicum Dodon. 709
Serpina omnium minima, Lobel.			Sisymbrium. 676. unde dictum.
669			ibid.
Serpyllum 902. Matthioli & Nar-			Sisymbrium aquaticum, Matthi.
bomense Lob.			1094
Serpyllum zygis Dioscor.			Sisymbrium, Cardamine I. Cres-
Serratula.			sio vulgaris Matth. 658
Serta vel Sertula Campana.			Sisymbrium, Cardamine II. Mat-
311.			thioli. ibid.
			Sisymbrium, Cardamine III. Do-
			donci. 659
			Sisymbrium

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Sisymbrium hortense.</i>	677	<i>Solea equina, siue Securidaca mō-</i>	<i>Spina quid.</i>	1435
<i>Sisymbrium siluestre.</i>	ibid.	<i>tana, Matth.</i>	<i>Spina vnde nomen accepit.</i>	161
<i>Sisyrinchion Dodonæi.</i>	1579. 1580	<i>Solidago.</i>	<i>Spina & Spina Aegyptia.</i>	160
<i>minus Clusij.</i>	1580	<i>Solidago medica.</i>	<i>Spina acris.</i>	134
<i>Sisyrinchium quorundam.</i>	1625	<i>Solidago minor.</i>	<i>Spina alba.</i>	135. 139. 1462
<i>Sium.</i>	1091	<i>Solidago Sarracenica.</i>	<i>Spina alba Dalechampij.</i>	ibid.
<i>Sium alterum, Eruce folio.</i>	1094	<i>Solidago Sarracenica Fuchsj. ibi.</i>	<i>Spina alba horrensis Fuchsj. ibid.</i>	
<i>Sium non odoratum Tragi.</i>	1090	<i>Lob.</i>	<i>Spina alba altera Matthioli.</i>	1463
<i>Sium verum, Matthioli.</i>	1092. vul	<i>Solis flos, & Sol Indianus.</i>	<i>Spina alba Matth.</i>	1462
<i>garum, eiusdem. ibid. Grateuæ,</i>		<i>Somphos.</i>	<i>Spina Appendix Plinij.</i>	135. 137.
<i>maius Dodonæi.</i>	ibid.	<i>Sonchus.</i>	<i>quare ita appellata.</i>	138
<i>Smilax.</i>	24. 1421	<i>Sonchus asperior Lob.</i>	<i>Spina Arabica.</i>	160. 1467
<i>Smilacis anceps & multiplex si-</i>		<i>Sonchus asper Matth.</i>	<i>Spina Arabica & Aegyptia.</i>	1466
<i>gnificatio errorem sæpe inducit</i>		<i>Sonchus dendroides Dalechamp.</i>	<i>Spina infestoria.</i>	145
<i>in re herbaria.</i>	24	573. 574	<i>Spina mollis.</i>	582
<i>Smilax Arcadium.</i>	ibid.	<i>Sonchus Lewis.</i>	<i>Spina peregrina.</i>	1481. 1482
<i>Smilax aspera Matthio.</i>	1422	<i>Sonchus Lewis alter Matth. ibid.</i>	<i>Spina purgatoria.</i>	1486
<i>Smilax hortensis, seu Dolichus.</i>		<i>Sonchus Lewis latifolius Lobbell.</i>	<i>Spina regia.</i>	1464
473. 474		571	<i>Spinacia siue Spinachia, siue Spi-</i>	
<i>Smilax humilis angustif. folio</i>		<i>Sonchus Lewis laciniatis folijs Lo-</i>	<i>naceum olus, salsis metribus in</i>	
<i>non serrato.</i>	25	<i>bellij.</i>	<i>cognita.</i>	544
<i>Smilax Lewis Matth.</i>	1423	572. 573	<i>Spinuinaeta.</i>	134
<i>Smyrnum.</i>	706	<i>Sonchus lanatus Dalechamp.</i>	<i>Spinus.</i>	130
<i>Smyrnum Creticum.</i>	707	<i>Sophia.</i>	<i>Spinus ceruinus.</i>	139
<i>Smyrnum Matth.</i>	ibid.	1146. 1147	<i>Spica a Theop.</i>	256
<i>Smyrnum verum Dioscoridis &</i>		<i>Sorba.</i>	<i>Splith a'bum quorundam.</i>	1294
<i>Dodon.</i>	ibid.	<i>Sorbus ibid. genera eius, & fru-</i>	<i>Splith Ilyriorum.</i>	1292. 1293
<i>Sacotorina Aloë.</i>	1693. 1695	<i>etus differentia</i>	<i>Spondylium.</i>	733
<i>Solanum.</i>	596. 1719	<i>Sorbus torminalis.</i>	<i>Spondylium alterum Dodon.</i>	739
<i>Solanum arborescens.</i>	600	99	<i>Spögia in radicibus Asparagi.</i>	611
<i>Solanum Halicacabum, Matthio.</i>		<i>Sparganium. 1018. alserum, Lob.</i>	<i>Spurry Belgarum & Anglorum</i>	
597		1019	1331	
<i>Solanum hortense.</i>	ibid.	<i>Sparagus officinarum.</i>	<i>Squilla.</i>	1375
<i>Solanum hortense Græcorum.</i>	1429	609	<i>Squinanthum officin.</i>	1884
<i>Solanum Indicum, seu Americū,</i>		<i>Spartium aphyllon fruticosum, iū</i>	<i>Stachys. 962. Matthi. 963. Fuchsj.</i>	
<i>Dalechampij.</i>	599	<i>ceis lanatis capitulis.</i>	ibid.	
<i>Solanum ligneum, vel lignosum.</i>		165	<i>Stachys Lusitanica quorundam,</i>	
1407. 1413		<i>Spartium Dioscoridi & Græcorū</i>	<i>Lob.</i>	964
<i>Solanum lignosum quorundam</i>		<i>siue Genista.</i>	<i>Stacte.</i>	1755. 1756
<i>Herbariorum.</i>	1338	167	<i>Staphis agria.</i>	1408
<i>Solani manici forma.</i>	1721	<i>Spartium vnde dicitur.</i>	<i>Staphisagria. 1629. Matthio ibid.</i>	
<i>Solanum monococon Gesneri.</i>	1312	168	<i>Staphylo dendron.</i>	102
<i>Solanum pomiferum Herbariorū,</i>		<i>Spartij Hispanici duo alia genera,</i>	<i>Statice Dalech.</i>	1190
632		<i>Clusij.</i>	<i>Stella leguminosa Lobellij.</i>	493
<i>Solanum somnificum, Fuchsj.</i>		170	<i>Stellaria. 1175. 1281. 1342. 1384.</i>	
1721		<i>Spartij icones aliquot ex Clusio.</i>	1473	
<i>Solanum somnificum, Matthio.</i>		178	<i>Stelephuros.</i>	419
1720		<i>Spartium Hispanicum.</i>	<i>Stela Euboicorum.</i>	17
<i>Solanum somnificum alserum,</i>		177	<i>Stephanomelis, Plinij, quorundā.</i>	
<i>Matthioli.</i>	1720	<i>Spathe.</i>	1064	
<i>Solanorum vires & temperamen</i>		362. 367	<i>Stephanos Alexandri.</i>	210
<i>ta.</i>	598	<i>Spathula fetida.</i>	<i>Stergetrum.</i>	128
<i>Solaris.</i>	1349	1621	<i>Strobon, Ladanum quidam dixe</i>	
<i>Solarium maius, Herbarior mor</i>		<i>Spelta.</i>	<i>runt.</i>	227
<i>tale officinar. Solanum leihale,</i>		385	<i>Stechas viridis, Dalech.</i>	781
<i>quorundam.</i>	1721	<i>Spergula.</i>	<i>Stirpes plurimæ iisdem qualitati</i>	
<i>Solarium officinarum.</i>	596	1331	<i>bus, viribusque præditæ, for</i>	
<i>Solbstrella.</i>	1087	<i>Spergula marina.</i>	<i>ma & genere sunt diuersæ.</i>	196
<i>Soldanella officinarum.</i>	526	<i>Spergula odorata.</i>	<i>Stirpes multæ heliotropiæ & he</i>	
<i>Solea equina.</i>	492	<i>Sphacelus.</i>	<i>lioscopia.</i>	1349
<i>Solea equina, Dalechampij. ibid.</i>		879	<i>Stirpes quæ non nisi aliis innixæ</i>	
		<i>Sphacelus vernus Theophrasti</i>	scandun	
		880		
		<i>Spherocephalus Carduus.</i>		
		1481.		
		1482		
		<i>Sphagnos.</i>		
		1323		
		<i>Sphondylium.</i>		
		733		
		<i>Sphondylium vulgare.</i>		
		734		
		<i>Spica. 919. quid.</i>		
		377		
		<i>Spica Celtica quorundam officina</i>		
		<i>rum, magno errore.</i>		
		1125		
		<i>Spica mutica quæ dicitur Varro</i>		
		<i>ni.</i>		
		374		
		<i>Spica Nardi Indica.</i>		
		921		
		<i>Spicafolium Pene & Lob.</i>		
		1426		

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>scandunt.</i>	~1401	<i>Syagri.</i>	364	<i>Tarcon.</i>	685
<i>Stirpes Umbellifera.</i>	688	<i>Sycomotorus.</i>	220. 340	<i>Taurion.</i>	85
<i>in Stirpibus, ut in cæteris rebus,</i>		<i>Sycomotorus unde nomen habeat.</i>		<i>Taxus.</i>	24
<i>interdum aut monstra exsistunt</i>		341. & 342		<i>Taxus eiusque descriptio, ubique</i>	
<i>aut prodigiosa quadam, & digna</i>		<i>Sycomotorus, Aegypti peculiaris ar-</i>		<i>frequens nascatur & quo an-</i>	
<i>que literarum monumentis cõ-</i>		<i>bor.</i>	342	<i>ni tempore. 78. - 9 quibus no-</i>	
<i>signentur,</i>	132	<i>Sycomeri succus.</i>	317	<i>cendi præcipue viribus. ibid.</i>	
<i>Stirpis eiusdem non omnes partes</i>		<i>Syderitis quarta Plinij.</i>	576	<i>de eius temperamento, que-</i>	
<i>ad idem utiles.</i>	1596	<i>Sylæ mater.</i>	1427	<i>sio. ibid.</i>	
<i>Stirpium differentie aliquot</i>	688	<i>Symeonis herba.</i>	593	<i>Taxi vel umbra letalis. 24. non</i>	
<i>Sticas Citrina, siue Sticados</i>		<i>Symphonia vel Symphona, v. l.</i>		<i>ubique.</i>	25
<i>Citrinum officinarum.</i>	779	<i>Symphena Plinij.</i>	540	<i>Taxi umbra sub ea obdormienti-</i>	
<i>Stabe, Theophr.</i>	1015. 1016	<i>Symphytum magnum 1074. Mat-</i>		<i>bus lifera. 779</i>	
<i>Stabe Salmatica altera Clusij.</i>	1109	<i>thio ibid. tuberosum, Lobelij.</i>		<i>Teda arbor, Cembro Italorum, eius</i>	
<i>Stachas & Stichas.</i>	917	<i>ibid.</i>		<i>natales forma, usus 47. 48</i>	
<i>Stachas capitulâ foliatis.</i>	918	<i>Symphytum petraum.</i>	1510	<i>Teda quid sit, quando id multies</i>	
<i>Stachas Citrina.</i>	775. 779	<i>Symphytum petraum, Matt 1174</i>		<i>exercuit, diffusus explicatur</i>	
<i>Stachas Citrina, Matth. Stachas</i>		<i>Lob. ibid.</i>		49	
<i>Citrina altera.</i>	779	<i>Symphytum pumilum repens Bor-</i>		<i>Teda vocis multiplex significa-</i>	
<i>Stachas Matthioli.</i>	918	<i>raginis facie, Lob.</i>	580	<i>tio. 48</i>	
<i>Storax calamita offic.</i>	115	<i>Symphytum quorundam.</i>	1205	<i>Tembul.</i>	1777. 1778
<i>Strangulatur Leopardi.</i>	1203	<i>Synanchica. 1185. Dalecham ibid.</i>		<i>Theombrotum Persarum.</i>	540
<i>Stratiotes aquaticus.</i>	1061	<i>Synanchica species, Iuncaria Sal-</i>		<i>Telephium.</i>	551. 1315
<i>Stratiotes lutea Clusij.</i>	771	<i>manticensis, Clusij.</i>	1185	<i>Telephium floribus purpureis, Lo-</i>	
<i>Stratiotes millefolia.</i>	768	<i>Syringa.</i>	355	<i>belij 1315</i>	
<i>Stratiotes millefolia maior, Matt.</i>		<i>Syringa caruleo flore, Lilac. Mat.</i>		<i>Telephium Hispanicum, Clusij.</i>	
769		355		1316	
<i>Stratiotes millefolia minor, Matt.</i>				<i>Telephium minus semper vivens</i>	
769				<i>Lob.</i>	1316
<i>Stratiotes milefolium aquaticum,</i>				<i>Telephium purpurascens, Euchs.</i>	
<i>Matth.</i>	770			1315	
<i>Strobilus.</i>	43. 52			<i>Terra capillus.</i>	1209
<i>Strumaria quorundam.</i>	1056			<i>Terra corona.</i>	1310
<i>Strumeca, Herbariorum.</i>	1027			<i>Terra merita.</i>	1822
<i>Strumum.</i>	596. 599. 1429			<i>Terbintharia Dilfij.</i>	1356
<i>Struthia mala & Struthiomela.</i>				<i>Terebinthina Veneta & eius col-</i>	
290				<i>ligenda ratio. 54</i>	
<i>Struthium.</i>	1186			<i>Terebinthina Veneta que vulgo</i>	
<i>Struthium Euchsij.</i>	823			<i>dicitur, Venetias afferitur ex</i>	
<i>Struthium quorundam.</i>	820			<i>Cypro.</i>	62
<i>Strychnodendrum.</i>	600			<i>Terebinthinum oleum ex fructu</i>	
<i>Strychnus.</i>	596. 599. 1429			<i>maturo Terebinthi. ibid</i>	
<i>Stubulus.</i>	47			<i>Terebinthus.</i>	61
<i>Sturax. 115. eius vires. 116. 117</i>				<i>Terebinthus apud Syros Picem</i>	
<i>Sturax ut adulteretur.</i>	116			<i>fundit.</i>	74
<i>Syracis liquidi apud veteres nul-</i>				<i>Terebinthus Indica Theopha-</i>	
<i>lamenti.</i>	116			<i>sti. 361</i>	
<i>Suber 22. eius duo genera. ibid.</i>				<i>Testiculus canis.</i>	1549
<i>Suber detracto in orbem cortice e-</i>				<i>Testiculus III. species Matthioli.</i>	
<i>tum iuuatur, contra cæterarum</i>				1551	
<i>arborum naturam.</i>	23			<i>Testiculus morionis famina, Do-</i>	
<i>Suber tardissime cariem sentit.</i>				<i>don.</i>	1552
<i>ibid.</i>				<i>Testiculus morionis mas, Dodon.</i>	
<i>Suberis vires. ibid.</i>				<i>ibid.</i>	
<i>Succisa.</i>	1066			<i>Testiculus odoratus Dodonai.</i>	
<i>Succus ex Tribulo.</i>	514			1555	
<i>Succus Quicentæ.</i>	1200			<i>Testiculus vulpis Dodonai.</i>	1556
<i>Suiphur Quittenfe.</i>	1793			<i>Tetrabit Herbariorum & offi-</i>	
<i>Supercilium terre.</i>	-1199			<i>narum.</i>	1118
<i>Sura.</i>	1761			<i>Tetrahit, Herba Indica, Sideri-</i>	
<i>Sutungen Serapionis.</i>	1572			<i>tis prima, Euchsij.</i>	1119

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Tetrahitis</i> , <i>Sideritis</i> <i>Heraclea</i> Dio-	<i>Thora</i> .	1745	<i>thioli</i> .	1644
<i>scoridis</i> .	<i>Thora</i> unde dicatur.	1736	<i>Tithymalus Helioscopius</i> , <i>Dodon.</i>	
<i>Tetragonia</i> <i>Theophrasti</i> .	<i>Thoryberon</i> .	1344	1647	
<i>Terralice</i> .	<i>Thuia</i> arbor, & super ea varia		<i>Tithymalus Helioscopius</i> , <i>Dod.</i>	
<i>Terralix</i> .	disfidentium opiniones.	59	1648	
<i>Terralix spinosa</i> <i>Tragi</i> .	<i>Thuia</i> genera quatuor. <i>ibid.</i> &		<i>Tithymalus Helioscopius</i> <i>Matth.</i>	
<i>Tetraphyllum</i> .	60.61		1644	
<i>Terrorchis</i> , vel <i>Triorchis</i> alba	<i>Thuia</i> genus tertium, <i>Arbor vitæ</i>		<i>Tithymalus leptophyllos</i> , <i>Matth.</i>	
<i>Gemma</i> .	<i>Gall'æ</i> .	60	1645	
<i>Teucrium</i> .	<i>Thuia</i> <i>Masiliensis</i> .	183	<i>Tithymalus Myrsinites</i> seu <i>firmi-</i>	
<i>Teucrium</i> 1165 primum, <i>Matth.</i>	<i>Thuia</i> odorata.	110	<i>mina</i> , <i>Matth.</i>	142
<i>ibid</i> alterum eiusdem.	<i>Thui</i> quod apud <i>Homeru</i> . <i>Citrü</i>		<i>Tithymalus Myrsinites</i> melius	
<i>Teucrium Babicum</i> <i>Clusij</i> . <i>ibid.</i>	interpretatur <i>Macrobius</i> .	61	expressus.	1643
<i>Teucrium</i> .	<i>Thurifera</i> arbor <i>Theueti</i> .	1754	<i>Tithymalus paralius</i> , <i>Do ex hist.</i>	
<i>Thalictrum tenuifolium</i> , <i>Cordi-</i>	<i>Thuris</i> adulteratio.	71	purgant.	1647
1081	<i>Thus</i> .	1752	<i>Tithymalus paralius</i> , <i>Dod. & Pe-</i>	
<i>Thalictrum</i> , <i>Dod.</i>	<i>Thus</i> terra.	1159	<i>ne</i> .	1647
<i>Thalictrum magnum</i> , <i>Dod.</i>	<i>Thuris</i> <i>lympidi</i> folium, <i>Pene.</i>		<i>Tithymalus paralius</i> , <i>Matthioli</i> .	
<i>paruum</i> .	1754		1643	
<i>Thapsi</i> .	<i>Thya</i> <i>Masiliensis</i> .	40	<i>Tithymalus platyphyllos</i> , <i>Clus &</i>	
<i>Thapsia</i> .	<i>Thymbra</i> & <i>atureia</i> .	894	<i>Dod.</i>	1649
<i>Thapsia</i> <i>Matth.</i>	<i>Thymbra</i> <i>Dod.</i>	898	<i>Tithymalus serratus</i> <i>Dale</i> . 1649.	
<i>Thapsia</i> <i>Pene vera</i> .	<i>Thymbra vera</i> , <i>Pene.</i>	897	<i>verrucosus</i> , eiusd.	1650
<i>Thapsia</i> <i>noces</i> .	<i>Thymelea</i> . 1666 <i>Mat. h</i> <i>ibid.</i> <i>Dod.</i>		<i>Tithymalus tuberosus</i> sine <i>Apios</i> .	
<i>Thasphonum</i> .	<i>ibid.</i>		1751	
<i>Theriacaria</i> .	<i>Thymelea</i> species <i>Mycono</i> .	1668	<i>Tomentaria</i> , seu <i>Tomentitia</i> . 1115	
<i>Thertonarca</i> <i>Plinij</i> .	<i>Thym</i> <i>lea vera</i> <i>Clusij</i> , & <i>Dod.</i>		<i>Tora</i> <i>Valdensium</i> , <i>Aconitum</i> <i>I.</i>	
<i>Theron</i> <i>La c. b.</i> <i>Endivia</i> <i>Tragi</i> .	<i>histor</i> purgant.	1667	<i>Diofco</i> <i>Gesneri</i> .	1735
164	<i>Thymus</i> & <i>Thymum</i> . 829. 1642		<i>Tordylium</i> .	748. 751
<i>Thlasia</i> & <i>Thlaspe</i> . 660. 1180.	<i>Th. mum</i> <i>Creticum</i> .	900	<i>Tordylium</i> , <i>Dod.</i>	751
<i>Thl</i> <i>sp</i> <i>angustifolium</i> <i>Dodo.</i> &	<i>Thymum</i> vulgare, sine <i>durius</i> ,		<i>Tordylium</i> , <i>eseli</i> <i>Creticum</i> , <i>Lo-</i>	
<i>Fuchij</i>	<i>Dod.</i>	901	<i>bellij</i> .	752
<i>Thl</i> <i>sp</i> <i>angustifolium</i> <i>Fuchij</i>	<i>Thysellum</i> <i>Plinij</i> .	701	<i>Tordylium</i> , sine <i>Seseli</i> <i>Creticum</i>	
692	<i>Tibulus</i> .	47	<i>maius</i> . <i>Lob.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Thl</i> <i>sp</i> <i>fruticosum</i> foliis <i>Leucoj</i>	<i>Tilephon</i> .	1118	<i>Tormentilla</i> .	1267
<i>marini</i> minoris.	<i>Tilia</i> .	89	<i>Tormentilla</i> candida.	1175
<i>Thl</i> <i>sp</i> <i>fruticosum</i> spinosum <i>Nar-</i>	<i>Tilia</i> locus, temperamenta, vires		<i>Totabona</i> vulgi.	602
<i>b. nense</i> .	& <i>vsus</i> .	91	<i>Toxicon</i> <i>Ladanum</i> in <i>Africa</i> .	
<i>Thl</i> <i>sp</i> <i>fruticosum</i> alterum, <i>Lob.</i>	<i>Tilium</i> confusum <i>Plinius</i> cum		210	
<i>ibid.</i>	<i>Philyrea</i> .	90	<i>Trachelium</i> 829. <i>maius</i> <i>ibid.</i> <i>mi-</i>	
<i>Thlaspi</i> <i>Hederaceum</i> <i>Lobellij</i> .	<i>Timearea</i> .	779	<i>nus</i> .	830
1420	<i>Tinctorium</i> granum.	151	<i>Trachelium</i> <i>maius</i> , sine <i>Vuulla-</i>	
<i>Thl</i> <i>sp</i> <i>incanum</i> <i>Mechliniense</i> ,	<i>Tinctorios</i> flos, sine <i>Genista</i> hu-		<i>rea</i> <i>Dod.</i>	1197
<i>Lob.</i>	<i>mi</i> <i>is</i> .	174	<i>Trachelium</i> montanum, <i>Dalech.</i>	
<i>Thlaspi</i> <i>maius</i> <i>Cordi</i> .	<i>Tipha</i> & <i>Tiphe</i> . 35. 389. 150. 92		1202	
<i>Thl</i> <i>sp</i> <i>maritimum</i> .	<i>Ti</i> <i>h. um</i> .	806. 1050	<i>Tragacantha</i> .	1477
<i>Thlaspi</i> <i>I. Ma. th.</i>	<i>Tiphyum</i> <i>Theophrasti</i> . 1050. 1503		<i>Tragacantha</i> altera, sine <i>Poterü</i> ,	
<i>Thlaspi</i> <i>I. Ma. th.</i>	<i>Tithyma</i> .	1642	<i>Clusij</i> .	1478
<i>Thlaspi</i> <i>I. Ma. th.</i>	<i>Tithymalus</i> <i>characias</i> , <i>Matth</i> <i>se-</i>		<i>Tragacantha</i> <i>lacryma</i> .	1477
<i>Thlaspi</i> <i>I. Ma. th.</i>	<i>cundus</i> , <i>Dod.</i>	1642	<i>Tragacantha</i> <i>Matth.</i>	1478
<i>Thl</i> <i>sp</i> <i>III. Ma. th.</i>	<i>Tithymalus</i> <i>characias</i> <i>primus</i> ,		<i>Tragium</i> secundum <i>Dioscoridis</i>	
<i>Thl</i> <i>sp</i> <i>minus</i> <i>clypeatum</i> , <i>Pene.</i>	<i>Dod</i>	1645	<i>quorundam</i> .	1313
1183	<i>Tit</i> <i>ymalus</i> <i>characias</i> <i>quartus</i> ,		<i>Tragon</i> <i>Matthioli</i> & <i>Lobell.</i>	1388
<i>Thlaspi</i> <i>montanum</i> <i>candidum</i> .	<i>I. od.</i>	1645	1389	
1180	<i>Tithymalus</i> <i>Cyparissias</i> , <i>Dodon.</i>		<i>Tragopogon</i> .	712
<i>Thl</i> <i>sp</i> <i>montanum</i> <i>minimü</i> , <i>Da-</i>	1648		<i>Tragopogon</i> , <i>Matth.</i> 1078 <i>alterü</i>	
<i>Lob.</i>	<i>Tithymalus</i> <i>Cyparissias</i> , <i>Matt.</i>		<i>eiusdem</i> .	1079
<i>Thlaspi</i> <i>Narb. nense</i> <i>Pene</i> 1182	1644		<i>Tragopogon</i> <i>spicatus</i> .	<i>ibid.</i>
<i>Thlaspi</i> secundum sine <i>Cratene.</i>	<i>Tithymalus</i> <i>dendroides</i> , <i>Dodo-</i>		<i>Tragorhis</i> .	1550. 1553
<i>quorundam</i>	<i>nei</i> , ex <i>codi</i> & <i>Cesareo</i>	1645	<i>Tragorhis</i> minor & <i>ucrior</i> , <i>Gé-</i>	
<i>Thlaspi</i> <i>umbellatum</i> , <i>Pene</i> . 1183	<i>Tithymalus</i> <i>dendroides</i> , <i>Mat-</i>		<i>ma.</i>	1557
			<i>Trago</i>	

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Tragoriganum.</i> 888	<i>Triphylum.</i> 1353	<i>pina, Clusj. ibid. montana mi</i>
<i>Tragoriganum</i> 11. Clusj. 890	<i>Tripolium Dodon.</i> 1389	<i>nima, Lob. ibid.</i>
<i>Tragoriganum</i> , Matth. 888. Dod.	<i>Tripolium vulgare Lob.</i> 1390. <i>mi</i>	<i>Typha palustris.</i> 994. <i>aquatica ibi</i>
<i>ibid.</i> Monspeliense, Dalecham.	<i>nus eiusdem.</i> <i>ibid.</i>	<i>minor, Pena.</i> 995
889. <i>nothum eiusd.</i> <i>ibid.</i>	<i>Trithales.</i> 1128	
<i>Tragus frumenti</i> genus, <i>Spica ca</i>	<i>Tritiana Brasica nostra.</i> 521	V
<i>rulea.</i> 376. 377. 391	<i>Tritici ex Dalechampi sententia</i>	<i>Accaria rubra maior.</i> 55
<i>Tragus</i> Matth. 1477	<i>diuisio.</i> 374	<i>Vaccaria rubra minor.</i>
<i>Tragus, siue Scorpion maritimus.</i>	<i>Tritici vires & temperameta.</i>	<i>ibid.</i>
1387. Dalech. 1388	381	<i>Vaccinia nigra.</i> 192. <i>rubra. eodem</i>
<i>Trasi.</i> 1584. <i>cum flore, Matt. ibid.</i>	<i>Tritici usus tum in alimentis,</i>	<i>fol.</i>
<i>Tribulus.</i> 512	<i>tum in medicina.</i> 378	<i>Vaccinium.</i> 253. 254
<i>Tribulus aquaticus.</i> 514	<i>Triticum.</i> 371	<i>Vaccinium nigrum.</i> 200
<i>Tribulus aquaticus, marinus of-</i>	<i>Triticum Bouinum.</i> 419	<i>Vaccinium palustre.</i> 187
<i>ficin.</i> 1082	<i>Triticum candidum prastantius</i>	<i>Vaccinium Plinij, Lacatha Theo-</i>
<i>Tribulus marinus.</i> 1367	<i>rufo ad panificium.</i> 374	<i>phrafi.</i> 255
<i>Tribulus minor rectus Dalecha.</i>	<i>Triticum Indicum.</i> 381	<i>Valeriana maior & hortensis.</i>
513	<i>Triticum Indicum Matthioli.</i>	927
<i>Tribulus terrestris.</i> 512	382	<i>Valeriana montana.</i> 1127
<i>Tribulus terrestris</i> Matth. 513	<i>Triticum nigrum.</i> 1136. 1137	<i>Valeriana rubra.</i> 1186
<i>Tribulus terrestris minor repens.</i>	<i>Triticum ramosum.</i> 376. <i>Centigra</i>	<i>Valeriana sylvestris maior, Dodon.</i>
514	<i>num.</i> 376	<i>Phu paruum, Matt.</i> 1042
<i>Trichomanes.</i> 1209. 1211	<i>Triticum rufum.</i> 375	<i>Valeriana sylvestris minor, Phu</i>
<i>Trichomanes aquaticum.</i> 1022	<i>Triticum Spica mutica.</i> 378	<i>mininum Dodon.</i> 1042.
<i>Tricocum pomum Messili.</i> 334	<i>Triticum Tiptinum.</i> 393	<i>Vallaria.</i> 814
<i>Trifolium.</i> 503	<i>Triticum Turcicum Fuchsj.</i> 382	<i>Verba alba Auicenne.</i> 1147
<i>Trifolium acetosum.</i> 1354. 1355	<i>Triticum vaccinum siue boui-</i>	<i>Venenis inter se plerumque con-</i>
<i>Trifolium ex America, Dodon.</i>	<i>num.</i> 136	<i>traria natura.</i> 505
506	<i>Triticum vaccinum, siue Melam-</i>	<i>Veratrum album.</i> 1631
<i>Trifolium Asphaltites logioribus</i>	<i>pyrum.</i> 419	<i>Venerca.</i> 1617
<i>folijs.</i> 504	<i>Trifago siue Tryxago.</i> 1162	<i>Veratrum nigrum.</i> 1633
<i>Trifolium Asphaltites rotundis</i>	<i>Trifago palustris.</i> 909	<i>Verbasculum minimum.</i> 1304
<i>folijs.</i> <i>ibid.</i>	<i>Trychnus.</i> 596	<i>Verbasculus Alpinus, Dalecham-</i>
<i>Trifolium cochlearum.</i> 503	<i>Tuber.</i> 1604	<i>pij.</i> 1126
<i>Trifolium equinum.</i> 259	<i>Tubera & Fungi.</i> 1585. 1586. 1587	<i>Verbasculum quorundam.</i> 1303
<i>Trifolium Hepaticum.</i> 1274	<i>Tuberum duo genera.</i> 357	<i>Verbasculum.</i> 1298. <i>eius genera.</i>
<i>Trifolium luteum minimum, Pe</i>	<i>Tubera, Matth.</i> 1585	<i>ibid.</i>
<i>na & Lob.</i> 1354	<i>Tuberaria maior Myconi.</i> 1099	<i>Verbasculum album femina flore</i>
<i>Trifolium minus.</i> 1076	<i>Tuberaria minor Myconi.</i> <i>ibid.</i>	<i>albo, Dod & Fuchsj.</i> 1300
<i>Trifolium odoratum alteru, siue</i>	<i>Tubuli ad asthma viles.</i> 1922	<i>Verbasculum album mas, Fuch. &</i>
<i>satium.</i> 506	<i>Tubulus.</i> 47. 52	<i>Dod. flore luteo.</i> 1301
<i>Trifolium pratense luteum, Fuch</i>	<i>Tulipa</i> 1493. 1528. <i>maior Clusj.</i>	<i>Verbasculum femina, Lobellj.</i>
<i>sj.</i> 1355	<i>1529. minor Dod.</i> <i>ibid.</i>	1300
<i>Trifolium pratense l.</i> Matth. 1354	<i>Tulipa siue Lilionarcissus luteus</i>	<i>Verbasculum laciniatum, Matthiol.</i>
<i>alterum eiusdem.</i> <i>ibid.</i>	<i>latifolius, Lob.</i> 1330	1301. 1302
<i>Trifolium pratense Salamanticu,</i>	<i>Tune lndorum.</i> 1795	<i>Verbasculum l.</i> Matthioli. 1298:
<i>Clusj.</i> 1356	<i>Tunica minima Dalechampi j.</i>	<i>11. & 11. eiusdem.</i> 1299
<i>Triorchis.</i> 1286. <i>vne dicta.</i> 1287	1191	<i>Verbasculum nigrum Salusfolium,</i>
<i>Triorchis lutea flore luteo Gem-</i>	<i>Tunica seu unice Officin.</i> 806	<i>Lob.</i> 1299
<i>mae, Lob.</i> 1561	<i>Turbith Alexandrinum, quorum</i>	<i>Verbasculum sylvestre Dodonai.</i>
<i>Triorchis lutea Gemma, Lobellj.</i>	<i>dam.</i> 1646	1301
1561	<i>Turbith nigrum quorundam.</i>	<i>Verbasculum sylvestre exoticum,</i>
<i>Triorchis Serapias, Aegineta.</i>	1655	<i>Lob.</i> 1301. 1302
1569	<i>Turfanum.</i> 1495	<i>Verbasculum sylvestre, folio Saluie</i>
<i>Triorchis Serapias mas, Fuchsj.</i>	<i>Turpetum nigrum Actuarij.</i> 1653	<i>tennisfolia, Lob.</i> 1301
1554	<i>Turpetum officin.</i> 1680	<i>Verbasculum 1111 sylvestre, Mat-</i>
<i>Triorchis Serapias secundus, Do</i>	<i>Tusilago siue Farfugium, Mat-</i>	<i>thioli.</i> 1300
<i>donai, Matthioli Testiculus</i>	<i>thioli.</i> 1049	<i>Verbasculum sylvestre Monspeliens-</i>
11. 1555	<i>Tusilago. 1050. Matth.</i> 1051	<i>sum.</i> 1304
<i>Triorchis Serapias 111. Dodonai.</i>	<i>Tusilago Alpina, siue montana,</i>	<i>Verbena & Verbenaca.</i> 1334
<i>ibid.</i>	<i>Dalechampi j.</i> 1052. <i>altera Al-</i>	

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Verbena Perùana.</i>	1920	<i>Vinum ex Berberi.</i>	137	<i>Viscum apud Gallorum veterum</i>	
<i>Verbenaca recta Dod.</i>	1336	<i>Vinum ex Castaneis apud Indos,</i>		<i>Drydas in magna veneratio</i>	
<i>Verbenaca recta, siue mas, Fuchsf.</i>		<i>tradente Curtio.</i>	33	<i>ne.</i>	20
1335		<i>Vinum ex Cydonijs.</i>	291	<i>Viscum ex itio est arboribus. ibid.</i>	
<i>Verbenaca supina & tenuifolia,</i>		<i>Vinum è Loto Celti. 347. 348. 349</i>		<i>Viscum Indicum.</i>	1810
<i>Clusij.</i>	1337	<i>Vinum è malis.</i>	289	<i>Viscum neotericis quibusdam</i>	
<i>Verbenaca vulgaris, Matthioli.</i>		<i>Vinū myrtites. 241. obsoleuit. 242</i>		<i>quare Lignum sancta cecis</i>	
1335		<i>Vinum è Pyris.</i>	308	<i>dictum.</i>	19
<i>Vetrum.</i>	1505	<i>Vinum Rhoëtes ex Punici matu</i>		<i>Viscum in olea.</i>	18
<i>Vermicularis siue Illecebra maior</i>		<i>ris.</i>	306	<i>Viscum è quercu.</i>	19
<i>Lobellij siue Sempervivum mi</i>		<i>Viola alba.</i>	1526	<i>Viscum sine radice arboribus ad</i>	
<i>nus a terum, Dod.</i>	1132	<i>Viola alba bulbosa Fuchsfij.</i>	1527	<i>nascitur, & quibus.</i>	18
<i>Vermicularis officinarum.</i>	1128	<i>Violabarbata maior. 810. latifolia</i>		<i>Viscum ad aucupia ex radicibus</i>	
<i>Vermiculatus frutex maior. Lo</i>		<i>& angustifolia. ibid.</i>		<i>Viburni.</i>	257
<i>bellij.</i>	1132	<i>Viola flammea, siue tricolor. 800</i>		<i>Vinaga, Gingidium Dod.</i>	711
<i>Vernicis sicci vires.</i>	69	<i>maior Matth. ibid. minor. seu</i>		<i>Vinaga, Gingidium Matthioli.</i>	
<i>Vernix.</i>	39	<i>lacea altera, eiusdem. ibid.</i>		710	
<i>Vernix quid, & unde fiat.</i>	67. 68	<i>lacea.</i>	800	<i>Vitalba.</i>	1407. 1605
<i>Vrceolaris.</i>	1241	<i>Viola latifolia, aut peregrina. 805</i>		<i>Vitalis Apuleij.</i>	1128
<i>Vrinalis & Vrinaris.</i>	1332	<i>Viola lutea multiplex.</i>	803	<i>Vitex.</i>	280
<i>Veronica fœmina. 1050. Dodon.</i>		<i>Viola Mariana, Medium Diosco</i>		<i>Vitex à Salice Amerina multum</i>	
<i>& Matth. ibi.</i>		<i>rid.</i>	815	<i>differt.</i>	278
<i>Veronica fœmina Fuchsfij. 1139.</i>		<i>Viola matronalis, vel Viola Da</i>		<i>Viticella vulgi.</i>	1409
1240		<i>mascena & marina 804. alba</i>		<i>Vitis. 1401. vinifera. ibid. &</i>	
<i>Veronica mas.</i>	138	<i>& purpurea. ibi.</i>		1402.	
<i>Veronica mas Fuchsfij. 1319. Matth.</i>		<i>Viola palustris.</i>	1022	<i>Vitis alba.</i>	1409
<i>ibid.</i>		<i>Viola purpurea.</i>	797	<i>Vitis Idæa Theophrasti, Alex. adri</i>	
<i>Veronica maxima. Dalech.</i>	1165	<i>Viola purpurea, Matth.</i>	798	<i>na Plinij.</i>	191
<i>Veronica recta minima, Lobellij.</i>		<i>Viperina.</i>	1104	<i>Vitis insana.</i>	1406
1319		<i>Virga aurea altera, Lob.</i>	1273	<i>Vitis nigra.</i>	1407
<i>Verrucaria.</i>	134	<i>Virga aurea. 1272. Matth. ibid.</i>		<i>Vitis nigra & Vitis Chironia.</i>	
<i>Verrucaria alia minor.</i>	1350	<i>Dod.</i>	ibid.	1411. 1415	
<i>Verrucaria Chondrilla prior.</i>	559	<i>Virga lanalis Ouidij, Rhamnus</i>		<i>Vitis partium vires & tempera</i>	
<i>Vescicaria. 596. 598. repens.</i>	597	<i>seu Spina alba, & eius mira</i>		<i>menta.</i>	1402
<i>Vetonia.</i>	1282	<i>vires aduersus fascinum. 142</i>		<i>Vitis Precia.</i>	131
<i>Vetonica coronaria Fuchsfij, alti</i>		<i>Virga pastoris.</i>	1447	<i>Vitis sylvestris. 257. 1406. 1407.</i>	
<i>lus & coronaria Dodo. Cantan</i>		<i>Virga sanguinea Plinij.</i>	197	1629	
<i>brica Pezæ.</i>	8. 6	<i>Virga sanguinea Plinij.</i>	270	<i>Vitis sylvestris, Dalech. Clematis</i>	
<i>Vetonica sylvestris, Dodon.</i>	1068	<i>Viscaria plantæ. Vene. 683. 684</i>		<i>III. Matth.</i>	1407. 1408
<i>Vgetal.</i>	1849	<i>Visci confectio varia.</i>	19	<i>Vlex Plinij.</i>	164
<i>Vhebebason.</i>	1845	<i>Visci discrimina.</i>	18	<i>Vlmaria.</i>	1081
<i>Viburnum Spirea Theophr.</i>	256	<i>Visci planta descriptio. ibid.</i>		<i>Vlmi vires ad med.</i>	81
<i>Viburnum Matth.</i>	204	<i>Visci quæ rini ad superstitionem</i>		<i>Vlmus, eius genera, & forma. 80</i>	
<i>Vicia.</i>	478	<i>etiam inter Christianos abu</i>		<i>Vlmus Alina siue montosa. 81</i>	
<i>Vicia sylvestris.</i>	479	<i>sus.</i>	19	<i>Vlmus Samarâ fert, præter quo</i>	
<i>Vicia vera, Aphaca Matthioli.</i>		<i>Visci temperamenta & vires. 18.</i>		<i>rundam sententiam. 80 & gū</i>	
478		19. 20		<i>mi. St. cachryn. ibid.</i>	
<i>Vicia peruinca.</i>	211. 832	<i>Viscitria an plura genera. 17. 18</i>		<i>Vmbellifera plantæ.</i>	688
<i>Vincetoxicū siue Asclepias Fuch</i>		<i>Visci usus.</i>	19	<i>Vmbilicus marinus Monspeliens</i>	
<i>sfij.</i>	1144	<i>de Viscis per alium animum red</i>		<i>ium.</i>	1362
<i>Vincetoxicum Matth.</i>	ibid.	<i>dito animaduersione digna.</i>		<i>Vmbilicus terre.</i>	1604
<i>Vincetoxicum officinarum. ibid.</i>		19. 20		<i>Vmbilicus veneris aquaticus of</i>	
<i>VVinteranus cortex.</i>	1858	<i>Visco arboreo carent Insubres.</i>		<i>ficinar.</i>	1091
<i>Vina picata.</i>	76	19		<i>Vmbilicus Veneris alter</i>	1322
<i>Vini medicina radix.</i>	1698	<i>Viscum.</i>	17. 1457. 1458	<i>Vmbilicus Veneris. 1608. Matth.</i>	
<i>Vinis condiendis misceri solita à</i>		<i>Viscum ex Aquifolio.</i>	1. 8	<i>ibid.</i>	
<i>vereribus.</i>	77	<i>Viscum ex radice Chondrilla.</i>		<i>Vnedo.</i>	196. 198. 199
<i>Vinogalla, quæ à Græcis diuincis.</i>		568		<i>Vnifira.</i>	1186
16		<i>Viscum Damasenum, quod fit</i>		<i>Vngues Rosarum quid.</i>	116
<i>Vinum acinaticium, seu Coqueret</i>		<i>ex myxis, querno bonitate ce</i>		<i>Vngula caballina officinarum.</i>	
<i>ticum.</i>	599	<i>dit.</i>	19	1050	

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Vnifolium.</i>	1260	<i>Vua marina quorundam.</i>	1397	<i>Tuca.</i>	1908
<i>Vnio Capsa genus.</i>	1338	<i>Vua marina vulgaris, Clus.</i>	1070	<i>Z</i>	
<i>Volubilis aculeata.</i>	1421	<i>Vua passa.</i>	1404	<i>Z Acintha, sive Cichorium</i>	
<i>Volubilis maior Herbariorum.</i>		<i>Vua tamini.</i>	1408	<i>verrucosum.</i>	559
1423		<i>Vua tranſmarina, Groſſularia ru-</i>		<i>Zarza Parilla. 1898. Matth.</i>	1899
<i>Volubilis media. ibi, nigra.</i>	1424	<i>bra.</i>	131	<i>America.</i>	<i>ibid.</i>
<i>minor.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Vua verſa & vulpina.</i>	1737	<i>Zea, 391. 83. duplex.</i>	385
<i>Volucrum maius.</i>	1427	<i>Vua viperina.</i>	155	<i>Zedoaria Auicenna</i>	1748
<i>Voluulus ceruleus ſine Campana</i>		<i>Vua uſſi.</i>	133. 192	<i>Zedoaria, Zerumbet.</i>	1810
<i>azura Lob.</i>	1425	<i>Vua vulpina.</i>	596	<i>Zephyron.</i>	394
<i>Voluulus terreſtris.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Vuularia Dod.</i>	1197	<i>Zephyron Gymnocrihon.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Vrtica.</i>	1243	<i>Vuularia Herbariorum.</i>	205	<i>Zerumbet Serapionis, & Zedo-</i>	
<i>Vrtica canina Plinij.</i>	1244			<i>ria eiſdem radicis partes. 1811</i>	
<i>Vrtica Herculea, Tragi.</i>	<i>ibi.</i>			<i>Zerumbet Serapionis, Cluſio.</i>	
<i>Vrtica labeo & Vrtica ſetida.</i>				1822	
1247				<i>Zingiber. 890. Acoſta.</i>	1892
<i>Vrtica I. Matth. 1243. II. eiſ-</i>				<i>Zingiber caninum Auicenna.</i>	631.
<i>dem.</i>	<i>ibid.</i>			133	
<i>Vrtica III. Matth.</i>	1244			<i>Ziziphus.</i>	144. 145
<i>Vrtica oligophyllos.</i>	<i>ibid.</i>			<i>Ziziphus alba noſtra.</i>	358
<i>Vſtilago.</i>	418			<i>Ziziphus alba Matth. ſine Pfe-</i>	
<i>Vuularia.</i>	543			<i>doſcomorus.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Vua Corinthia.</i>	1406			<i>Ziziphus Cappadocica.</i>	110
<i>Vua Criſpa ſine Groſſularia.</i>	139			<i>Ziziphus Punicea.</i>	356
<i>Vua criſpa, ab aliis marina, aliis</i>				<i>Zoophtha'mum</i>	1128
<i>verd creſpina, non nullis Groſ-</i>				<i>Zoophyta.</i>	1878
<i>ſularia.</i>	131			<i>Zo. yron.</i>	930
<i>Vua lupina.</i>	596			<i>Zoſter.</i>	1371. 1372
<i>Vualupina ſine Vua verſa.</i>	1312			<i>Zurumbet & Zerumbet.</i>	1810

X

<i>X Anthium.</i>	1056
<i>Xilo, Indis dicta noua ar-</i>	
<i>bor in Hiſpania naſcens</i>	1774
<i>Xylobalſamum.</i>	1773
<i>Xylocinnamomum.</i>	1797 1798
<i>xylon</i>	221
<i>Xyloſteum alterum.</i>	201
<i>Xyloſteum Dod.</i>	272
<i>Xyphidion.</i>	108
<i>Xyris. 1621. Lob. ibid. Matth.</i>	1612
<i>Xyris maritima.</i>	1392

Y

<i>Y Ayama fructus. 1840. 1841</i>	
<i>Yayagna.</i>	<i>ibid.</i>

FINIS INDICIS LATINI.



INDEX GRÆCVS.



Βρότονον. 936	Ἀχνητα λολυή.	1462	ἀναγράφιον.	1764
Ἀγέλλοχον.	ἀχνητιον.	1445	ἀναρρινον.	1339
fol. 1769	ἄχνητος καὶ ἄχνητα.	1442	ἀνδράχνη.	550
Ἀγάρεμος, <i>vel</i>	ἄχνητώδη.	1436	ἀνδράχνη ἀγρία.	1128 1658
ἀγάρηον.	ἄκνος, <i>vel</i> ἄκνος.	912	ἀνδρόειμον.	1153 1155 1156
Ἀγύρεα recentioribus Græcis	ἀκοντιον.	1732	ἀνδρόεικες.	1361
<i>Cucumeres.</i>	ἄκονα καὶ ἄκωνα.	1483	ἄνεμώνη.	841
Ἀγήραον.	ἄκονα καὶ ἄκονος.	167	ἄνηθον.	691
Ἀγνόκοκκος χαρπός.	ἄκρῖδρυα.	1	ἄνηθον.	692
ἄγνος.	ἄκρη.	266	ἀνθεμῖς.	968
ἀγρία <i>vox apud Theophrastū</i>	ἄκυλοι <i>quid.</i>	20.21.24.26	ἀνθεμῖς <i>vulgaris, siue hylæ-</i>	
<i>non satis intellecta, multis</i>	ἄκυλώνιον.	814	<i>stris.</i>	1344
<i>in errorem induxit.</i>	Ἄλδρον ἐρέγγιμον.	454-456	ἄνθημιον φυλλώδες.	438
ἄγρια.	ἄλθαία.	589	ἀνθέριος.	1588
ἄγρια θιρῦς.	ἄλκυφάκος.	1724	ἄνη τῶν ῥόδων.	126
ἄγριελαία.	ἄλιξ.	385	ἄνθος καὶ ἄνθηνα.	792
ἄγριοχόρδαμον.	ἄλιτταντα.	241	ἀνθρωποειρρος.	1725
ἄγριοκοκκυμηλαία.	ἄλκεια.	593	ἀνθυλλῖς.	1380
ἄγρωφῖς.	ἄλκυιδάδιον.	1104	ἄνηθον.	692
ἄγχυθ.	ἄλκυιον.	1104	ἀντίμαλον.	1725
ἄδράφαξ.	ἄλοη.	1692	ἀντίρριον.	1339
ἄδράφοξος.	ἄλσινη.	1232	ἀντίρριον.	<i>ibid.</i>
ἄείζων. 1128. μέγα, μικρόν,	ἄλυτον.	1680	ἄνωις.	447
τετραλές τεττον.	ἄλωστον.	1141	Ἀπαλίζ καὶ παλίζ <i>vulgo</i>	
ἄγριπος.	ἄλφτον.	401	<i>Græcorum hodie quid.</i>	144
ἄγρινον <i>oleum.</i>	ἄμυμαλίδες.	199	ἄπαρνη.	1330
ἄγριλωφ.	ἄμαμυλῖς.	202	ἄπαιος καὶ ἄπια 306.1595.1651	
ἄγρις.	ἄμαρανθον.	775	ἄπύκνον.	1730
ἄγρικερος.	ἄμβροσία.	1147	ἄπύρηνος.	403
ἄγριοπικὴ ἔλαϊα.	ἄμπελόπραγον.	1543	ἄπύρηνος <i>τυμα.</i>	1406
ἄγριοπῖς.	ἄμπελος ἀγρία.	1406	ἄραχος.	480
ἄγρια.	ἄμπελος λευκή.	1409	ἄργεμώνη.	440
Ἀγρία.	ἄμπελος μέλαινα.	1411	ἄρις καὶ ἄριον.	1599
ἄγριφ.	ἄμπελος οἰνοφόρος καὶ ἡμε-	1401	ἄριστοσχία.	976
ἄγρινα ἀγρία.	ρος.	1401	ἄριστον.	1054
ἄγρινα καὶ ἄγρινα ἀγριπ-	ἄμπελος χεῖρῶν ἔστα.	1411	ἄρκευθίδες.	66
τία.	ἄμυγδαλή.	316	ἄρκευθῖς καὶ ἄρκευθος. <i>ibid.</i>	
ἄγρινα ἀραβική καὶ ἀγριπ-	ἄμυγδαλον.	<i>ibid.</i>	ἄρκιον καὶ ἄρκιθρος.	1306
τία.	ἄμυμον.	1813	ἄρκις φαρυγλή.	133
ἄγρινα βασιλική <i>Theophras-</i>	ἄμυτα καὶ ἄμυτάντα.	30	ἄρηνόλωστον.	1254
<i>sti.</i>	Ἀνάσσις.	1069	ἄρηνόλωστον θαλάσσιον.	1359
ἄγρινα ἀγαθὴ <i>vulgo</i>	ἀναγάλλῖς.	1236	ἄρον.	1596
<i>hodierno Peloponnesiorum</i>	ἄναγυρις καὶ ἄναγυρος.	106	ἄρτεμῖς.	949
<i>quid.</i>	ἀναδενδράδες ἄμπελοι.	1401	ἄρτοι κλεανῖται, <i>siue</i> κλεα-	
			<i>νῖται.</i>	

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

νῆται. 380. ἰπνῆται. *ibid.*
 ἄρτος ἐχ' ἄρτης. 381. ὀρε-
 λίας. *ibid.*
 ἄρτος ἐπαύθραξ, ἐγκρυφίας,
 τρεῖς ἐγκρυφίος. 381
 ἄρτυνικῶν. 1436
 Ἀλφρον. 913
 ἀσκληπιάς. 1144
 ἀσκυροῖδεις. 1155
 ἀσκυρον. *ibid.*
 ἀσπάλθεος 1815
 ἀσπαργία, τρεῖς ἀσπαργία
Theophrastus quid. 610
 ἀσπάργος τρεῖς ἀσπάργος.
 690

ἀσπάργος εἶδη, ἐασικὰς,
 ἔλεις, ὀρμίνιος, μυάαν-
 γος. 609
 ἀσπληνον. 1215
 ἀσπρίς. 1404
 ἀσπρίς ἀγρία. 1629
 ἀσπρίον. 496
 ἀσπρὶ ἀτλίκος. 859
 ἀσπράγδος. 1346
 ἀσφόδελος. 1588
 Ἀτραυλίδης. 1467
 ἀτράφαις. 535
 αὐτόπυρος ἄρτος. 378
 Ἀφάρεμα. 386
 ἀφροδισία. 1617
 ἀφροσκόροδον. 1545
 ἀφύλλανθες. 864
 ἄφυλλος. 1296
 Ἀχερωὶς *populus quæ dicatur*
Homero. 86
 ἀχιλλεῖος καὶ ἀχιλλεῖος σι-
 δηεῖς. 772
 ἀχεῖς. 308
 Ἀφινθιον. 940

B

B Ἀθύπικρον καὶ βαρύπι-
 κρον. 940
 Βάχαις. 914-915
 βαλάνη. 1
 βάλανος μυρεφικῆ. 365
 βάλανος καὶ βάλανος μυρεφί-
 κῆ. 1584
 βάλανος τρεῖς ἀνὶ δρυὸς τρεῖς

Hippocrates. 12
 Βαλάνης *nomen laicæ patet.* 320
 Βαλλέριον. 814
 βαλλωνῆ. 1252
 βάλλω. 1770
 βαρυκόκκλον. 628
 βάρυθρον. 182
 βασιλικὸν ἄκμον *quare di-*
ctum. 679
 βάτινα *mora.* 120. 121
 βάτινα, καὶ βατίνια. 253
 βάτος. 119
 βατράχιον. 1027
 Βδέλλιον. 1782
 Βέτιον. 879
 Βήχιον. 899. 1050
 Βίκιον. 478
 βισκία. 360
 Βλάχιον. 1222
 βλήθρον. 1222
 βλήτον. 538
 βλήχιον. 890
 βλήχων. 890
 Βολκοκράτης. 773
 βολκος. 1500
 βόλχον. 1782
 βοσχος *Pix.* 75
 βότρυσ. 952
 Βυβώνιον. 859
 βύγλωστον καὶ βύγλωστον.
 578
 βύκερος. 480
 βυμελία. 82
 βενιάς. 644
 βένιον καὶ βενιάς. 774
 βύββαλον. 862
 Βράθυ. 245
 Βράθυς. 182
 Βρετανικῆ. 1081
 Βρίζα. 305
 Βρύον *Pinus Populi.* 88
 Βρύον. 1083. 1323
 Βρύον γαλόστον. 1367
 Βρυωνία. 1409. 1414
 Βρυωνία μέλανα. 1411
 Βρώμος καὶ βρόμος. 403. 404
 Βρώμος πύα. 404
 Βρύζα *apud Thracas frugum*
genus. 67
 Βύνη. 401

Γ

Γ Αλφύρα. 1893
 Γάλαξ. 487
 Γάλιον. 1088
 Γαλιόψις, τρεῖς γαλιόψις καὶ
 γαλιόδοσος. 1247
 Γαστέρες *Lacedæmonii Kara,*
Boeotis Brasica. 639
 Γεινιανῆ. 1258
 Γεράνδριον. 1
 Γεράνιον. 1275
 Γερανοπόδιον. 814
 Γήθιον. 1538
 Γγγίσιον. 1890
 Γγγίδιον. 709
 Γλάξ καὶ Γλάξ. 487
 Γλέθρος. 94
 Γλήχιον. 890
 Γλήχιον ἀγρία. 892
 Γλυκύπικρον καὶ γλυκύπι-
 κρίς. 1413
 Γλυκύρριζα. 247
 Γλυκυσιδὴ καὶ γλυκυσίς. 585
 Γογύλοκράτης. 522
 Γογγύλη καὶ γογγύλις. 639.
 644
 Γοσπίτιον. 221
 Γυρτῆς ἄρτος. 379

Δ

Δ Αχρύδιον. 1662
 Δακτύλοι. 362
 Δας. 48
 Δαδίων. *ibid.*
 Δαίσιος. 716
 Δάφνη. 351
 Δαφνίδης. *ibid.*
 Δάφνη ἀγρία. 203. 245
 Δάφνη ἀλεξανδρεῖα καὶ ἐ-
 δαία. 208
 Δενδρίτιδες ἀμπελοι. 1401
 Δενδρομαλῶχ. 586. 588
 Δενδρόφλοιος. 23
 Διόκοκος ζέα. 384
 Δίκταμνον καὶ δίκταμον, τρεῖς
 δίκταμος καὶ δίκταμος.
 892
 Διὸς ἄνθος. 815. 821
 Διὸς βάλανος. 30. 320
 Διόσωρος. 346. 350

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

Διραια	1338	Επιθυμῶν.	561, 562	H	
Διχαυήιον.	855	Επικλυδούφυλλο.	1681	H	Δύσοςμος. 671
Δίφακος.	1447	Επικλυσόφυλλο.	561	H	Ηδύσοςμος ἀγρίος. 673
Δόλιχος.	473, 474	Επίκλιδιον.	1094	Η	Ηλύθρον. 444
Δοράτια.	293, 294	Επίκμηλιν.	198	Η	Ηλιοτρόπιον. 1349
Δορύκειον.	1724	Επίπαλιν.	1311	Η	Ηλόχρυτον. 775
Δορακόδιον.	1285	Επίπετρον.	912	Η	Ημεροκαλλις καὶ ἡμεροκαλ- λές. 1479
Δρακόδιον καὶ Δρακονία.	1601	Επιρικόφυλλον.	562	Η	Ημιόνιον. 1215
Δρυός nomine quid Græci int-		Επίφύλλον.	1267	Η	Ημιονίτις. 1217
telligent, quàmque eius		Ερέβινθος.	461	Η	Ημίονον. 1215
novus significatio late pa-		Ερεμνός.	455, 456	Η	Ηέλερον. 574
teat.	1	Ερενη.	185		
Δρυός Hyphear.	18	Ερενός.	335		
Δρυοπίεις.	1227	Ερινός.	1086		
Δρυπέτης Olea Græci quid.		Εριμέβοζιον, sine έριμέ-			
342. oleum ex his.	345	τωτα.	1626		
Δρύτις.	1479	Ερπυλλός.	902		
E		Ερύγιον.	1458		
E		Ερύγη.	ibid.		
E		Ερυθρόδανον.	1329		
E		Ερυσίτην.	418		
E		Ερύσιμον.	652		
E		Ερυσισκηπτρον.	1815		
E		Ερύτος.	449		
E		Ερύτος κυάμινον.	453		
E		Ερύωμιν.	649		
E		Ευθύρπιος Oxycantha fru-			
E		ctus Dioscor.	134		
E		Ευπατόριον vel ἡπατόριον.			
E		1251			
E		Ευφόρειον.	1590		
E		Ευφροσύνη.	1166		
E		Εφήμερον.	1570		
E		Εχιάνιον.	1104		
E		Εχιών.	ibid.		
Z					
Z		Αδύρα Gracis recentio-			
Z		ribus.	1820		
Z		Ζακελτίδες.	639		
Z		Ζέα καὶ ζεία.	384		
Z		Ζηγυβερ καὶ Ζηγγίβερι.	1890		
Z		Ζίζυφα.	356		
Z		Ζίντζιφα.	ibid.		
Z		Ζιτζίφα.	ibid.		
Z		Ζυρία Refina, vel potius			
Z		Phrygia.	71		
Z		Ζυρία.	94		
Z		Ζωόβαλον.	1128		
				I	
				I	Βερίς. 665
				I	Γείσκος. 589
				I	Ιέρα βοζίνη. 1334
				I	Ιερκαϊον. 569
				I	Ιέρπιν. 1609
				I	Ιξία. 17
				I	Ιξός. ibid.
				I	Ιξώδης Refina. 71
				I	Ίτυσον. 554
				I	Ίον καὶ Ίον μέλαν. 797
				I	Ίον πορφύρεον. 797
				I	Ίπποσίλειον. 703
				I	Ίππος. 1069
				I	Ίπποφαές. 1485, 1705
				I	Ίππός.

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

Ἰππόφαγον.	1485	χοσύθα.	1683	κνήκος.	1449
Ἰρις.	1609	χόσσανα καὶ χόσσανετα.	30	κνήκος ἀγρία.	1467
Ἰρις ἀγρία.	1570.1621	χοσανικὴ κάρυα.	30	Κοῖξ.	1624
Ἰσάτις.	499	χοσανάκη.	1366	κόκχος.	44 52
Ἰσάτις ἀγρία.	<i>ibid.</i>	χοσλίας succus.	727	κόκκος βαφικῇ.	27 29
Ἰσάτις ἡμέρος.	<i>ibid.</i>	χοσυγλίας.	714	κόκκος κινιδίος.	1666
Ἰσκαμ.	324	κάφρα.	1783	κόκκος φοινίκης.	27
Ἰς.	133	Κεγχραμίδες.	336	κοκκύμυλα.	313
Ἰχάδες.	335.1651	Κένχρος.	408	κοκκύμυλῆα.	193 313
Ἰτέα.	274	κένχρος.	<i>ibid.</i>	κοκκύμυλῆα ἀγρία.	130
Ἰθυόθρον.	1604	κεδρέα.	37	κοκκίτις.	214
Ἰψος.	12	κεδρίς.	36. 39	κοκκασιον.	457
K		κεδρία pro κεδρίς mendosè a pud Theophrastum quodā loco legitur.	36	κοκκυμυθα, κοκκυμύθη, κοκ- κυμῶ.	614
Καλίπας.	1685	κῆδρος.	<i>ibid.</i>	κοκκυμυθα ἐδώδης.	614
Κακαλία.	1308	κενταύριον.	1286	κοκκυμυθίς.	1675
Καλιμάγρωσις.	420. 421.	κεντρομυρρίνη.	242	κολώτῆα.	214
καλμίνθη.	1006	κεραύτης.	480	κολυβία.	2 5
καλαμίνθη.	904	κεράσια.	309	κολυβικόν.	1570
καλαμίνθος.	995	κέραιος.	<i>ibid.</i>	κολώτῆα.	214
καλαμίνθος ἀρωματικὸς.	1888	κεράτιον.	112	κόμαρος.	195. 613
καλαμίνθος.	1724	κερκίς.	86. 87	κομβέβας.	1813
καλαμίνθος.	1480	κέφρον.	1282	κόμμη θησαύκων Galeni.	162
καλαμίνθος.	1491	κεφαλαὶ τῶν ῥόδων.	126. 128	κόνιζα.	1043
καλαμίνθος.	1309	Κηκίς.	15	κοράλλιον.	1374
καμπυλόκυνθα.	1436	Κήμης.	1342	κόρεον καὶ κορέανον.	735
καμναβίς.	496	κηπαία.	1346	κορύμβιον.	814
καπνός, κάπνιον καὶ καπνί- της.	1291	κηπύλη μαλάχη.	584	κόρυγχος.	1236
καπνός φραγμίτης.	1292	Κιβώμα καὶ κιβώτια.	460	κότινος.	152
καππαίς.	155	κίθαρον.	222	κοτυληδών.	1608
καπυρά Mastix.	65	κίκι.	1630	κοτυληδών ἐτέρα.	1322
καρδαμύνη.	654	κικωελώδην.	554	Κράμβη.	518
καρδαμύμων.	1810	κινάρα.	1436	κράμβη ἀγρία.	524
καρδία in arboribus.	74	κιρχία.	1338. 1725	κράμβη θαλασσία.	526
καρδία.	335	κίρσιον.	582	κρανία.	329
καρδός καὶ καρδόν καὶ καρδών.	693	κίσθος.	222	κρίστη.	398
καρδία πωνική.	100. 319	κίσταρον.	<i>ibid.</i>	κρίθιον καὶ κρίθαμον.	767
καρδία μυρεπτικόν, vel κάρυον ῥωμαϊκόν.	1760	κίστιον.	1144	κρίμενον.	376 404
καρδία nomen multa comple- ctitur. 320. unde Juglan- dis significatione dicatur. ibidem.		κιστός.	222. 223	κρίνον.	1491
καρυόφυλλον καὶ καρυόφυλ- λος.	1758	κιστόφυλλον.	1144	κροκίδες.	1531
καρυωτὸς φοινίξ.	366	κίστος.	222	κροκοθέλιον.	1475
καρσία.	1796	κισθόρη, κισθόρα, κισθόριον, κισθόριον.	555	κρόκος.	1531
καρσία μέλαινα.	113	Κλήψα.	95	κρόκος ὀρεστικός.	1535
		κλιντοπόδιον.	930	κρόμμιον.	1536
		κλιντοπόχος.	94	κρότων.	1630
		Κνάφον.	1485	κύμας. 451. 478. prater fabā quid etiam significet.	454
		κνήκος.	1449	κύμας αἰγυπλίος.	457
		κνίδην.	1243	κύμαμον ἐλαιοπρόν.	454 456
				κύμα.	

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

Κύημα seu κύμα, in Brasica	Δέντρος.	30	Μαλακκόστος.	1424
quid.	Δεσποκάριον.	319	Μαλαχίη.	584
κυκλάμιος.	λεωφόλλον.	195	Μαλαχίη ἀγρία.	589.721
κυμβάλιον.	λαοφύκτον.	1463	Μάλακκον.	1782
κύμιον.	λαοκί.	86	Μαλίον.	815
κυνώθεμις.	λαοκία.	3309	Μαυδραγόρας.	1725
κυνάρα.	λαοκίον καὶ λαοκίον μήλι-		Μάραθρον.	688
κυνία.	νον.	801.802	Μαραθρόφυλλον.	769
κυνόβοζην.	λαοκόφυλλον Verbaſci masi		Μάρον.	883
κυνόγλωσσον καὶ κυνόγλωσ-	1299		Μαρόλιον.	549
σος.	Δήλον.	227	Μάσσιον.	727
κυνοκράβη.	Διβανος καὶ λιβανώσος.	1752	Ματίκρον.	ibid.
κυνόμαρον.	Διβανώσις.763, καὶ λιβανώσις		Ματίκη.	66
κυνόσδατος.	σεφανώματιν.	967	Μαχαμώνιον.	1620
κυνός ὄρχις.	λίβυσικόν.	744	Μέζον.	758
κυνόσδατος vel κυπάριτος;	λίγυσικόν.	ibid.	Μελαμπόδιον.	1633
ἀπὸ τῆς κύειν παρίσας τὴς	λιθόλιενδρον.	1374	Μελάμπυρον.	1136
ἀκρεμόνος.	λίθωσπερμον.	1176	Μελάμφυλλος.	1442
κύπριος siue κύπριος.	λιθόρωσις.	1626	Μελάνθιον.	812
κύπριος ἐδάδιμος Theophras-	λιθόρωσις ἀγρία ἄρρη.	1628	Μελάνιον.	797
σις.	λίνον.	493	Μελανόφυλλος Salix qua di-	
κύπριος.	λινόσπαρτον.	177	catur Theophrasto.	276
κύτιος.	λίνα σπέρμα, λινόσπαρμα καὶ		Μέλαν πρόστιον.	1252
κύτταρος.	λινόσπαρμον.	494	Μελανόσπαρμον.	812
κωδία quid.	λιχίν.	131	Μελία.	82
κωάριον.	Λόβιον.	473	Μελίλωτος.	511
κώνιστον.	Λοβοὶ in Rosis quid.	126	Μελίνη.	408
κῶνος.	Λωός quid.	144	Μελίνη καὶ μέλιτος.	411
	Λωός.	473.474	Μελισσόφυλλον, μελίφυλλον	
	Λογχίτις.	1220	καὶ μελίταινα.	957
	Λοπίμα πάγων.	31	Μεμαίικυλον.	195
	Λόσον in Abiete quid.	54.166	Μενιάθες.	504
	λύγος.	280	Μέλα prima qua.	315
	Λυκοπόδιον.	1325	Μέσον Galla apud Dioscori-	
	λύκοψις.	1104	dem quid.	16
	Λυσιμάχον, καὶ λυσιμάχιος.		Μέσσινος καὶ μεσσίνη.	332.
	1058		μέσσινον.	ibid.
	Λωτός δένδρον.	346	Μηδική.	502
	Λωτός herba.	506	Μυκωνίδες Lactuca	545.549
	Λωτός ἡμερος herba.	ibid.	Μήκων.1707.ἡμερος, κηπό-	
	Λωτός ἀγριος herba.	ibid.	τή, θυλακίτις, κερατίτις,	
	Λωτός ἀγύπτιος.	1077	ἀφρώδης. ibid. καὶ κερα-	

M

Λ	Αγώστρος Hippocratis.	430	Λεπίδιον.	709	Μ	Αγύδαεις.	727.729
τίς.						μαμάκιον.	545
Δάδιαιον.	227					Μακέρ.	1776
λάδιον.	ibid.					Μακρόφυλλον ἱεράκιον.	569
χαθύρις.	1657					Μαλακάθρον.	1776
λάθυρος.	470					Μάλαθρον.	688
λαμψίνη.	541						
λάπαθος καὶ λάπαθον.	600						
λάριξ.	55						
λαφάνη.	541						
λάχανα.	518.560						
Λετειον.	1491.1516						
λετχήν.	1083						
λέκυθος.	449						
λέκυθος κυαμίνη.	453						
λεονίση.	1308						
λεονόβοζην.	485						
λεονόπτερον.	1608						
λεονόποδιον.	1342						
λεπίδιον.	709						

Μηλέα

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

Μηλέα μηδική.	298
Μήλινον <i>oleum.</i>	293
Μήλον.	285
Μήλον <i>in Rosa, cortex Plinio.</i>	128
Μηλοπλάκας.	293
Μήλωτρον <i>Theophrasti.</i>	1413
Μήλον.	758
Μήτρα <i>in arboribus.</i>	74
Μίλαξ βαχέα καὶ λεία.	1441
Μίλος.	2578
Μύλωτρον <i>Theophrasti.</i>	1407
Μήνη.	671
Μολόχη.	584
Μονόκοκκος ξεία.	385
Μονόφυλλον.	1260
Μορέα.	325
Μόρον.	<i>ibid.</i>
Μοροχάρειον, μοροχαρδίδιον.	1760
Μύαχρον.	1136
Μύκηες.	324 1585
Μύλη.	1594 1595
Μύξος, μύξα, μύξα, μύξα- εα.	359
Μυσοβρος.	1328
Μυσοσώτις.	1232
Μυός ὅτα, καὶ μυός ὅτις, καὶ μυός ὅτιον.	1317
Μυεμένη.	179
Μυεμόφυλλον.	769
Μυροβάλθνος θάρακη.	365
Μυρρίνη.	236
Μύρρις-vel μύρρα.	760
Μυρσίνη.	236
Μυρσίνη ἀγρία.	242
Μύρτα.	237
Μύρτα ἀγρία.	242
Μώλυ.	1592
Μώτα.	30

N

N Ἄψυ.	645
Νάρδος καὶ Νάρδοστα- χυσ.	920
Νάρδος ἀγρία.	913 927
Νάρδος κελτικὴ.	923
Νάρδος ὀρεννή, <i>ab aliquibus</i> <i>Γουλακίτις καὶ ἰνέις dicta,</i> <i>Galeno περὶ τῆς.</i>	926

Νάρθηξ.	753
Νάρκισσος.	1516
Νενράς.	1487
Νήλεον.	244
Νικητοξικόν.	1144
Νυμφαία.	1008

Ξ

Ξ Ἀνθιον.	1056
Ξ Ξηρά Pix.	75
Ξιφιδιον.	1018
Ξίφιον.	1620
Ξυλοχαστία.	1796
Ξυλοκείρατα <i>quid Gracis re-</i> <i>centioribus.</i>	112
Ξύλον.	221
Ξυλώδης <i>Refina.</i>	71
Ξυεῖς.	1621

O

O Ἄ, Ὀη.	330
Οἰάθη.	782
Οἰδίνα.	1585
Οἰοκηκίς <i>Galla.</i>	16
Οἶος κωνίας καὶ πωσιτίτις.	76
Οἶος.	133
Οἶσιον.	1188
Οἶφακος.	478
Οἶλυθος.	335
Οἶλυν.	389
Οἶμυλῆς.	202
Οἶμακίς <i>apud Paulū Argin.</i> <i>quid, ὅτι quomodo Diofcor.</i> <i>ὅτι Galen. hac voce usi.</i>	15
Οἶμαλόχαρτος.	1330
Οἶαξα, καὶ οἶαχρον.	865
Οἶοβρυχίς.	490
Οἶοθήρα, καὶ οἶοθεῖς.	865
Οἶοκηκίς <i>Galla.</i>	16
Οἶοπυξος καὶ οἶοπηξος.	1471
Οἶνεῖς.	865
Οἶνυχες τῶν ῥόδων.	126
Οἶνις.	447
Οἶνα <i>Theophrasti, nostra est</i> <i>Phagus.</i>	5
Οἶξυ.	3435
Οἶμυρσίνη.	242
Οἶστεῖφυλλον.	503
Οἶσις καὶ ὀπιον.	1711
Οἶπώρα. 285. <i>quid.</i>	365

Ὀρεσιπέλεια.	80
Ὀρεσιγάμθα.	1436
Ὀρέγανος.	886
Ὀρένδης.	397
Ὀρένδιον.	<i>ibid.</i>
Ὀρμιον.	964
Ὀρμιθόγαλον.	1581
Ὀροβος.	468
Ὀρόλιον <i>Archigemis.</i>	1341
Ὀρύζα καὶ ὀρύζον.	407
Ὀρχίς.	1549
Ὀσσεα.	412. 449
Ὀσσεολέων.	485
Ὀσσεῖς.	1332
Ὀυά, οὐή.	330
Ὀυνεδών.	196
Ὀυρανία <i>Iris.</i>	1609
Ὀφιδόλωστον.	1047
Ὀχνη.	308

Π

Π Αγκράτιον.	1578
Πέγγαρις.	915
Παίδερος.	1443
Παιονία.	855
Παλίμπισμα.	75
Παλίπρος.	143
Πάνακες καὶ πανάξ.	733
Πάπυρος.	1878
Παραδόχαλον.	628
Παρθένιον.	1626
Πασσάλη καὶ πάσσαλος.	408
Πελεκίνος.	444
Πεντάφυλλον.	1263
Πεντόροκος.	855
Πέπερι.	1807
Πέπλος.	1658
Πέπλιον.	<i>ibid.</i>
Πέπων.	622
Περδικιόν.	1241
Περυλίμυρον.	1427
Περικλοάς.	<i>ibid.</i>
Περικτερεών.	1334
Περσέα.	1826
περσικόν μήλον.	293
περσικὴ μηλέα.	<i>ibid.</i>
πέλασιτης.	1033
πέλας <i>quid.</i>	419
πετροσέλινον καὶ πετροσέλινον μεκεδονικόν.	72

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

Πακιδάανος.	745	Πυξάχυνθα.	148	Σημύς.	92
Πάκη.	43	Πύξος.	165	σήμα.	358
Πάκη Theophrasti, <i>Latino-</i>		πυξάχυνθα <i>Diosco-</i>		σημασιδὲς μέγα καὶ μικρόν.	
<i>rum Pinus est.</i>	43-46	<i>ridi dicitur.</i>	134	1668	
πάκη ἀρχία Theophr. <i>Pinus</i>		πυρὸς. 371. <i>unde.</i>	374	σήμαον.	482
<i>sylostus siue Pinastr est.</i>		πῶμα, <i>Palma fructus immat-</i>		σήμαιος πυρὸς qui dicitur.	
46		<i>turus.</i>	366	373	
Πήγανον.	- 972			Σίδλη.	IOII. IOI2
Πῶος <i>quid.</i>	459	P		σιδηρέτις.	1117
πῶσάμα.	360	P' ΑΞ.	17-7	σικύα.	614
πῶσις.	1652	P' αὖ μέλας, πυρρὸς.	598	σίκυος ἡμερος καὶ σίκυον.	619
πῶσις καὶ πῶσις. 73. 74. 75.		P' αφανὶς ἀραιοτέρα.	636	σικυοπέπων, σίκυος πέπων.	
76. 77		P' αφανὶς ἡμερος καὶ ἀρχία.	634	622	
πῶτινον φύσημα.	71	P' αφανος.	518	σίκυος ἀρχιος.	1672
πῶτις	43	P' αφανος καὶ βαφανὶς, καὶ βα-		σίλυνον.	1465
πῶτις Theophrasti, <i>Picea.</i>	50	φανή.	634	σίλιγνης.	378
πῶτις φθέρει, οφόρος <i>que Theo-</i>		P' αφανος ἀρχία.	638 1595	σίλριον.	727
<i>phrast.</i>	51	P' ἡτινη.	63 69	σίναπυ καὶ σίνηπι.	645
πῶσις τανος 93. ἀμφιφύης		P' ἡτινη τερμυθινή.	62	σίνηπι ἀρχιον.	660
<i>dicit.</i>	<i>ibid.</i>	P' ῥίσις <i>succu.</i>	727	σίον.	1091
πῶσις.	1498	P' ῥιτίνη χινίνη.	63	σίλρον.	722
Πόρος, <i>quorundam.</i>	820	P' ῥοδάκη.	293. 294	σισύμερον.	676
Πολέμειον.	1186	P' ῥοδία ῥίζα.	981	σισυρήχιον <i>vel</i> σισυρήχιον.	
πῶσιον.	928	P' ῥοδόαρη.	244	1579	
πολύσθεμον.	875	P' ῥοδόδενδρον.	<i>ibid.</i>	σίσιων.	708
πολύγαλον, <i>siue</i> πολύγαλα.		P' ῥόνον.	124	σίσιος.	372
488		P' ῥοιὰ καὶ ῥοιὰ.	303	Σχημμονία.	1662
πολυγόνατον.	1623	P' ῥοὺς <i>vel</i> ῥόος.	106	Σκησίδιξ.	712
πολύγονον ἀρρεν.	1123	ῥόος γυναικίτις.	367	σικίλας.	1575
πολύγονον θῆλυ.	1072	P' ῥοώσις <i>affectus.</i>	136	σικίπτρον.	815
πολύκνημον.	932			σικολοπένδεμον.	1215
πολυπόδιον.	1229	Σ		σικολυμος.	1436
πῶσις γέντων.	1007	Σ Αλίστα.	923	σικρόδιον.	909
πῶσις ἐλιν.	1487	Σάρακος.	478	σικρόδοον.	1545
Πράσινα.	962	Σαρδιανὰ βάλανοι.	30	σικρόπτερον.	1349
Πράσον.	1541	Σαρξίμαχος βοσκή.	1282	Σμίλξ.	24. 67 78
Πράσινοι <i>homines.</i>	21	Σάρακος <i>tax prisca Græc.</i>		Σμίλξ κηπαία.	475
Πράσιος. 20. <i>unde dicitur.</i>		ἀνὴ τῆς θυρῆς.	1	Σμίλξ τραχέια καὶ λεῖα.	
<i>ibid.</i>	26	Σελήνιον.	855	1421	
Πράσιον.	182	σεληνόγειον.	<i>ibid.</i>	Σμύδος.	78
Πράσιον καὶ ὄψωπις.		σεληνόγειον <i>Brassica.</i>	519 523	Σμύρα.	1715
1054		σέλινον ἀρχιον. 700. 717. 1029		Σμύριον.	706
Πρότοτοι καὶ καυλαί.	528	σέλινον ἰλεότρεπλον <i>quare</i> το		Σόγχος.	571
Πρόμνος.	130	<i>cet</i> <i>Homerus.</i>	700	Σόμφος.	617
Πρόμνα.	554	σέλινον ἔσέλινον κηπαίον. <i>ibi.</i>		Σπανόχια.	543
Πτελία.	80	σεμιθαλὶς.	378	Σπαργάνιον.	1018
Πτέρειξ.	1215	σέσις.	554	Σπάρτα <i>apud</i> <i>Homeri</i> <i>quid.</i>	
Πτερίς καὶ πτέριον.	1222	σέσις.	748	170	
Πισάνη πυρήν.	386. 399	σέσις.	554	σῶτος.	168
Πυκνόκομον.	1681	σῶτον.	531	σῶτον.	1323
				σῶτον.	

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

σπλήνιον.	1215. 1217
σποδιάς <i>vel</i> σπονδλιάς.	130
Σταφυλίνος.	78
σταφίς.	1404
σταφίς ἀγρία.	1408. 1629
σταφίς τραυλή.	555
σταχυίτης.	1007
στάχυς.	962
Στέμφυλα.	113. 1403
στέρνθρον.	1128
στέφανος, στέφος ἢ στέμψ.	796
στοιχάς καὶ στιχάς.	917
στρωμάτης ἐνυδρος, <i>sive</i> ὁ ἐπὶ τῶν ὑδάτων φυόμενος,	<i>quæ</i> ὅν ποτίζετο <i>nunc</i> <i>rapi.</i> 1061
στρωμάτης ὁ χιλιόφυλλος.	768
στρόβιλος <i>nux</i> πώκιος.	43.
44. 52	
στρύχος.	596
στρύχος ἀλικιόχθος.	596
στρύχος κυπαῖος.	<i>ibid.</i>
στρύχος μενικῆς.	<i>ibid.</i>
στρύχος ὑπανθικῆς.	<i>ibid.</i>
στύβον.	1485
στύραξ.	115
Συγκομιστὺς ἄριος.	378
Συγκίμνα <i>mora</i> .	120
Συγκίμνος, ἢ συγκίμνον.	325.
328. 340	
Συκή.	335. 1658. 1660
Συκή ἀγρία.	335
Συκή ἡμέρος.	<i>ibid.</i>
Συκόμορος.	340
Σύκον.	335
Σύκον ἐρενθ.	<i>ibid.</i>
Σύμφυτον μέγα.	1074
Σύμφυτον πετραῖον.	1174
Σφακελισμός.	419
Σφακέλος.	879
Σφένδαμνος.	94
Σφονδύλιον.	733
Σχεδλιάς μικρά καὶ μεγάλη.	1100
Σχινιάδες, <i>Lactici fructus</i> .	63
χίος, <i>quasi</i> χιτῶς.	<i>ibid.</i>
χονότρογον.	1544
χονοτρόφον.	496
Σχοῖος.	983

Σχοῖνος καὶ χοῖνος δῖαμα- τικὸς.	1884
-------------------------------------	------

T

Τέρμινθος.	61
Τετραύρα.	619
Τετράλιξ.	185. 1482
Τάθριον.	928
Τάχερον <i>vel</i> τεύχερις.	1165
Τάπλον.	531
Τάλλοφάκη.	533
Τήλις.	480
Τιβύμαλος ἢ τιθύμαλον.	1642
Τίφη.	392
Τραγάκανθα.	1477
Τραγόπυρος.	383
Τραγοπόγων.	224. 1078
Τραγοστέφανον.	888
Τράγος.	925
Τρίβολος ἐνυδρος.	1082
Τριβόλος χειρῶν.	512
Τριπόδιον.	1389
Τριφυλλον.	503
Τριφυλλον ἐν χαρτοκοπέτοις γυνώμιον.	1353
Τριχομανές.	1209. 1211
Τρίχνος.	596
Τρωγλοδύτα <i>unde dicta</i> .	1231
Τρώξιμον.	554
Τύφη.	994

Υ

Υάκινθος.	1505
Υάδινα.	1585
Υάδριον.	293
Υάδριον πέτρα.	1038
Υάδριον.	1716
Υάδριον.	1153
Υάδριον.	1715
Υάδριον.	1715
Υάδριον.	933

Φ

Φακός.	1671
Φακός καὶ φακή.	475.
Φακός ὁ ἐπὶ τῶν τελεμάτων.	478
1014	
Φαλαγγιον καὶ Φαλαγγίτης.	851

Φαλῆς.	415
Φάσανον, <i>vel</i> φασάνον.	1056. 1620
Φασόλος.	473
Φάσκον <i>quid</i> <i>Greci</i> <i>dicat</i> .	10
Φηγάπυρος.	383
Φηγά.	534
Φιλαθήριον.	1330
Φιλελαΐα <i>Pene, sive</i> <i>illa potius</i> <i>φιλελαΐα dicenda est</i> .	153
Φιλελαΐον καὶ φιλελαΐα.	1186
Φιλλός.	22
Φιλυρα.	89
Φιστάλια.	360
Φλόις.	1298
Φλόξ <i>Theophrasti</i> .	800. 970
Φοίνικες, καὶ φαίνιξ.	362. 416
Φοίνιες ἀνέχοι, ἀνέχοι, ἀπύρνοι.	366
Φόνος.	271
Φόνος <i>Spina quæ nominata</i> .	1467
Φῶ.	927
Φρυκτὴ <i>Resina</i> .	72
Φύκος γαλακτοπ.	1369
Φυλλάκανθα.	1436
Φυλλίτης.	1. 18
Φύλλον.	732. 1194. 1776
Φύλα.	82
Φυλάς.	596
Φύτλημα.	1197. <i>Marth. ibid.</i>
Φυτόν μαυλικόν, <i>Laurus</i> .	353

X

Χαμαίλη.	269
Χαμαβάλλος.	1596.
Χαμαβάτος.	119
Χαμαβίλρις καὶ χαμαβίλρις.	1162
Χαμαβίλρις λωτός.	1452.
μέλας.	<i>ibid.</i>
Χαμαβίλρις.	968. 1344
Χαμαβίλρις.	1153. 1159
Χαμαβίλρις.	176
Χαμαβίλρις.	1660
Χαμαβίλρις καὶ χαμαβίλρις κοκκίος.	1664
Χιδροπα, <i>ἔλ.</i>	449

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

Χελιδόνιον μέγα.	1249
Χελιδόνιον μικρόν.	1048
Χερσική μελαγχ.	584
Χιμωδιώμις.	1186
Χοιροστέλεθρον.	1100
Χοιρίδα.	566
Χοιροπριόσσην.	386.399
Χοιρος Græcorum Latino- rum Alica.	385
Χρυσολόχανον.	535

Ψευδοκρανέα.	197
Ψυδόνειδος.	919
Ψιλωθρον.	1409
Ψυχότροπον.	1282
Ψύλλον.	1172
Ψάρα morbus arborum.	1352

Ωκυρεδες.	682
Ωκίμων.	679
Ωλεσίνερος Salix a- pud Homerum quare di- catur.	279
Ωμή Pix.	74
Ωμή λύσις vel αμύλυσις.	402
Ωνυχισμός πόδια.	126
Ωχρος.	465

FINIS INDICIS GRÆCI.

INDEX ARABICVS.



Banus & Abe nus.	1751
Abg.	1588
Abhel.	182

Achachengi.	506
Achachie.	160
Acin.	1423
Adhar vel Adher.	1886
Adlen aut Adhlen.	499
Adurion.	106
Aeliphacos.	879
Aes.	236
Affinthium.	940
Agalugin seu Agalugen.	1769
Agileuz.	319
Aibeig.	1229
Aiersa.	1609
Alas.	236
Alafci.	899
Alberas.	1629
Albatin.	61
Alboucor.	1754
Alcanna.	252.253
Alchamech.	1585
Alchat.	489
Alchiri.	801
Alfasafat.	502
Alfscera.	1409
Alfifire seSera.	ibid.

Alharar.	182
Alharmel.	972
Alieumeiz.	340
Alkali.	1377
Alkitran.	37
Alluf.	1601
Almacharam.	1707
Almharut.	732
Almezerion.	1664
Alnam seu Alnegen.	890
Alfadar.	346
Alfsebram.	1128
Alfebram.	1652
Alfegiem.	639
Altuth.	732
Alzarur.	332.333
Alzelin.	1585
Alzir.	1500
Ambela.	1875
Amirberim, seu Amyrbarim, seu Berberim.	133
Amiron.	566
Anahamen.	841
Anas.	313
Anazue.	694
Andrachahara.	1128
Anegen.	892
Anesim & Anexisum.	692
Angeiden.	732

Angiara.	1243
Aniuden.	732
Anlic.	ibid.
Araba siue Bari.	892
Archanas aut Arornas.	66
Arornas, aut Archenas.	ibid.
Arz.	49
Arz, seu Arzi.	407
As.	236
Asahafasra.	1569
Aschil seu Alachil.	1575
Asleugi.	823
Asmeni iuni.	1609
Assinalfach.	763
Assilis.	701
Astochados.	917
Athamos.	461
Athim.	1238
Anas.	313
Asel.	1575
Axeras.	1588
Axis.	1914
Axnec.	1323
Azadarache.	318
Azez Alfachel.	1083

B

Bacha'a iamenia.	538
Bachale alermanie.	ibid.
Eache	

A R A B I C V S.

Bache.	1866	C	Chastara.	1282	
Bachele alhanica.	550	C Afal, Casil, seu Gasel.	Chasus.	229	
Bak'leanch.	ibid.	1251	Chare.	499	
Balador.	1764	Casur.	1783	Chathe.	619
Balsam, balsema, belfan.	1770	Cahade, lahade, seu Giae.		Chatheth.	1477
Barbes siue Carmas.		de.	928	Chatini & chatinie.	590
Basar.	1500	Calab.	1176	Chatis.	499
Basirrahagi.	1123	Calamentum.	904	Chauch.	293
Bassad.	1374	Calchala.	763	Caum.	1545
Bassil seu Bassal.	1336	Callidunium.	1249	Champs.	461
Bathec, seu Batheca.	625	Caluegiam.	1893, 1894	Cheiri.	801
Batheca alzuhi.	625	Camum.	696	Cherbachem, seu Charbech	
Batheca filistin.	ibid.	Canab.	496	Abaid.	1631
Batheca Inda.	ibid.	Candaret, Candaron.	566	Cherbachem, seu Charbech	
Batheca viridis.	ibid.	Caphor seu Chasur.	1783	Asued.	1633
Baton.	61	Cappar.	155	Cherbas.	545
Bazara Chatona.	1172	Capur.	1783	Chermes.	29
Bazari chichen.	493	Carfa.	179	Chetaalhamar.	1672
Bedarog.	679	Cardel.	645	Ch-thar.	619
Bedequar.	1462, 1474	Carhamfel, & Carienfel.	1758	Chete allimar.	1672
Bederangie, bedaringi, bederenzegum.	957	Carmas, siue Barbes.		Cheunce.	1588
Bessaigi.	1229	Carua seu Carui.	693	Chia has.	34
Beulahalalen.	1128	Casab.	995	Chilodomontoma.	1249
Benefsigi.	797	Casoras.	1621	Chinaos.	34
Bengi.	1716	Castal.	31	Chitini.	590
Bengichest.	280	Cathsum.	936	Chilira.	1477
Berbengine.	629	Cebar.	1693	Chubas.	584
Berberim.	135	Celb.	531	Chubeze.	ibid.
Berendaros.	679	Cembul & Cembul Indi.	920	Churtal.	403
Bersausan.	1209	Chachile.	526	Chuxtaid.	1871
Bersegnaesen.	1209	Chairim.	1545	Cirmetre.	306
Besd.	1374	Chalef.	111	Colt.	1176
Bezercorhume.	1172	Chalif.	274	Condes & Condisum.	823
Bhulles.	74	Chamadrios.	1162	Condisi.	820, 822
Bhunte.	1588	Chamafithius.	1159	Cordumcni.	1810
Birnach.	ibid.	Chandel.	1675	Corumb.	518
Bisberg.	1229	Charba.	614	Costos siue Chost, Cost,	
Bothormarie.	1604	Chardel.	645	Cast.	1817
Boton & Botin.	61	Chares.	700	Cot.	502
Buchale.	451	Charfi.	ibid.	Cubea.	242
Buchormarien.	1604	Charmen.	27	Cubebe & Quabebe.	1813
Bulef.	274	Charnub.	112	Culbare albir.	1209
Buleich.	119	Charß.	700	Cult.	176
Bundurch.	319	Chartom.	1449	Curat.	1541
Burdi, siue Berdi.	1878	Chas.	545	Cuscuth.	1683
Buthermarien.	1604	Chasras.	1707	Cyse.	933
Baziden, siue Buridan.		Chasi alkes, seu Chasi alchils.	1549		
		Chasi atraleb.	1565		
		Chassuth.	1683		

		D	D Acu.	755
			Dalifit.	405

D

D Acu. 715
Dalisit. 495

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM,

[illegible]

A R A B I C V S.

K	K		Luphia.	1196	P	Anax asclibet.	738
Ali.	1377		Luzach.	80	P	Panax.	1868
Kalungen.	1893	M			Pu.		927
Kameactis.	269	M	Achla.	362	Pustech.		360
Kanturion sages.	1286		Mahendane.	1657			
Kanturion sege & segir.	ibid.		Marmacor.	977	Q	Verfaa & Querfe.	1805
Kappar.	155		Masmocra.	976	1805		
Karabe.	68		Mastech, Masteche siue Ma		Quermes.		27
Karawia.	693		stochs.	66	Queura.		1871
Karrin.	1401		Me.	758			
Karni.	ibid.		Melato.	1753	R		
Kartam.	1449		M elonabrachi	625	R	Aienigi.	688
Karumb.	518		Melongena.	626		Ramech.	1585
Kasiston.	1620		Nemiram.	1249	Ramet.		222
Katealhener.	1672		Mensana.	1657	Rafen.		867
Kaurouch.	1249		Mergen.	1374	Ratim.		63
Kauroch.	1823		Mermex seu Mirmix.	297	Roma.		1585
Kauz.	316		Merzenius, seu Mersangius.		Roman.		303
Keisene, siue Kersene.	468		881		Rorcalhalmi.		1091
Kemadrius.	1162		Mescatremsir.	892	Rosaidicos.		106
Kemetri.	306		Mesmes.	297	Rosbar Sadtificos.		ibid.
Kemum.	696		Mex.	297-397	Ruman.		303
Kenne.	252		Mezereon.	1664			
Kermes.	27		Mismis.	297	S		
Kerua.	1630		Minberzygi.	1629	S	Achmunia.	1661
Kesum.	936		Mokaita.	359	Sadar.		346
Keyri.	802		Morgian.	1374	Sadeb.		972
Kilulem.	148		Motheica.	359	Sadianalach.		31
Kir.	74		Muibazagi.	1629	Saffaf.		274
Kitran.	37		Mukeita.	359	Safaheramon.		1018
Kulb.	1176		Mumeiz.	340	Saffargel.		290
Kuman.	303		Muza.	303	Saherade.		991
Kurat.	1541				Sakaikanheamen.		841
		N			Salkali.		1377
		N	Ahatnaho.	671	Samacheft.		280
			Nachal.	362	Sambach.		1430
			Nafalchess seu Narf.	654	Sandal.		1768
			Nahati.	1543	Sandarax.		67.68
			Nanachue.	694	Sandaros.		ibid.
			Nanochach.	ibid.	Sara.		1596
			Narces seu Nargies.	1516	Sarafia.		309
			Nard.	124	Sarax & Sarachs.		1222
			Naron.	ibid.	Sarch.		293
			Natig.	63	Scammonea.		1661
			Negen.	420	Scobran & Scobram.		1652
			Negien.	ibid.	Scylem.		416
			Negil.	ibid.	Schededenegi.		496
			Nil.	499	Scheitregi.		1291
			Nilofar, Ninofar & Nilufar.		Schlusselfblumen.		833
		</					

INDEX HISTORIÆ PLANT. ARABICVS.


<i>Scolofendrium</i> , & <i>Sculufendrium</i>		<i>Sumach.</i>	106	V	
<i>Sebesten.</i>	359	<i>Sunis seu Sunizi.</i>	812	V	<i>Age, seu Vgi.</i> 1617
<i>Sebet.</i>	691	<i>Suro.</i>	57	V	<i>Vagen.</i> 420
<i>Sedab.</i>	972	<i>Sus</i>	247	V	<i>ard.</i> 124
<i>Seil.</i>	1707	<i>Susen.</i>	1491	V	<i>efme.</i> 499
<i>Selgem.</i>	639			V	<i>raihlatum.</i> 1243
<i>Selicha, Seliche, siue Selihacha.</i>	1796	T		V	<i>snec.</i> 1323
<i>Seliem.</i>	639	T	<i>Ahaleb seu Thaleb.</i> 1014	X	
<i>Semsem.</i>	482	T	<i>Tamar.</i> 362	X	<i>Abaer.</i> 398
<i>Sena, Mauritanis.</i>	215	T	<i>Tarfa.</i> 179	X	<i>Xaier Almeriem.</i> 763
<i>Senabar.</i>	43	T	<i>Tarinns seu Tormus.</i> 466	X	<i>Xanim.</i> 812
<i>Sene.</i>	217	T	<i>Tartarichi.</i> 1565	X	<i>Xanxer.</i> 1642
<i>Seneffigi.</i>	797	T	<i>Tatoula.</i> 628	X	<i>Xebet.</i> 691
<i>Sensera.</i>	482	T	<i>Thahabel.</i> 1367	Y	
<i>Sent.</i>	121	T	<i>Thaleb.</i> <i>ibid.</i>	Y	<i>Abrohae.</i> 1725
<i>Serbin.</i>	36	T	<i>Thaxthax.</i> 1707	Z	
<i>Sereth.</i>	175	T	<i>Thespic.</i> 358	Z	<i>Ahafaram.</i> 1531
<i>Seru.</i>	57	T	<i>Thum.</i> 1545	Z	<i>Zaizalacht.</i> 358
<i>Shair.</i>	398	T	<i>Thusf.</i> 506	Z	<i>Zambach.</i> 1430
<i>Sin.</i>	335	T	<i>Tilafon.</i> 1128	Z	<i>Zameni.</i> 590
<i>Sifalios.</i>	748	T	<i>Tin.</i> 335	Z	<i>Zarar seu Zarur.</i> 332-333
<i>Sonofrig.</i>	797	T	<i>Tufa & Tufaha.</i> 285	Z	<i>Zaraund, seu Zaraned.</i> 976
<i>Stebuler.</i>	31	T	<i>Turner.</i> 1585	Z	<i>Zefs.</i> 74
<i>Stensfir.</i>	738	T	<i>Tupha.</i> 1873	Z	<i>Zeruba.</i> 1822
<i>Sucaram.</i>	788	T	<i>Turbith.</i> 1389	Z	<i>Zeuen.</i> 416
<i>Suchaha.</i>	1466	T	<i>Turingem, siue Trugiam.</i> 956	Z	<i>Zingibel.</i> 1890
<i>Suluc.</i>	1915	T	<i>Tut.</i> 325	Z	<i>Zufalzeff.</i> 356
		T	<i>Tuth.</i> <i>ibid.</i>		

FINIS INDICIS ARABICI.

INDEX



INDEX GALLICVS.

A		Aspic.	919	Blé rouge.	374
	Bricots.	Aspic d'oultre mer.	920	Blé qui truche.	376
	gros Abricots.	Athanafie.	955	Blé Turquet.	ibid.
	ibid.	Aubeau.	86	Blé de Vache.	419
	petits Abricots.	Auberges.	295	Blete.	538
	ibid.	Aubefpin.	136	Bluet.	436
Abfinfe <i>fine</i> Abfinthe.	940	Aubifoin.	436	Bois gentil.	214
Ache.	701	Aucron <i>vel</i> Aueneron.	404	Bois à faire lardoires.	272
Agarie.	1703	Auet.	53	Bois puant.	105
Agnus Castus.	278	Aulbour.	103	Bonnes Dames.	535
Agourre de lin.	1683	Aulne.	96	Borrage.	578
Agrimoine.	1251	Aulne noir.	97	Borrache fauuage.	1104
Agripaume.	1249	Aunce.	867	Bouillon blanc mafle.	1298
Agron & Agreuon.	147	Auoine.	403	Bouillon blanc femelle.	ibi.
Aigrette.	605	Aurenges.	301	Bouillon noir.	ibi.
Aiguille de bergier.	710	Auriole.	1464	Bouillon fauuage.	ibid.
Ail & Aux.	1545	Auronne.	937	Bouleau.	92
Ailpourreau.	1548	Auuia.	47	Bourgespine.	139.145.158
Airelles.	191			Bourrache.	578
Alarders.	159.257	B		Bourfe de berger.	1097
Albour.	103		Acille.	Bouys.	165
Alexandre.	703		Baguenaudier.	Bouys picquant.	242
Alifier.	202.203		Barbe de Cheure.	Branche vrfin e.	1443
Aloë.	1692		Barbe de bouc.	Bray <i>aut</i> Brac.	1369
Alquaquenge.	596		Barberenard.	Brayes de cocu.	833
Aluyme.	940		Barbotine.	Bredone.	540
Amalenchier.	202		grande Bardane.	Bronde.	187
Amandrier & Amandes.	316		Bafilic.	Brouchin.	96.166
Amarines.	274.278		Bafilic fauuage.	Bruiere.	185
Ambres.	ibid.		Bafinet.	Brulure.	418
Amourettes.	433		Bafinetz.	Bugle.	1075
Ampes.	123.124		Bauhino.	Bugloffie.	578
Ancolye.	820		Baume.		
Anet.	691		Bec de gruë.		
Angelique.	724		Bec de cigoigne.		
Anis.	692				
Api.	701				
Appetitz.	1539				
Arbouffier, <i>fructus</i> , Arbouffes.	195				
Arbre du Brefil.	1846				
Arbre de la graine d'efcarlate.	27				
Argentene.	1064				
Argouffes.	139				
Armegnes.	297				
Armoities.	808				
Armoities fauuaes.	809				
Armoife.	49				
Arreftebeuf.	447				
Arroches.	535				
Artichans.	1439				
Afnes.	124				
Asparge.	609				

Aspic.	919	Blé rouge.	374
Aspic d'oultre mer.	920	Blé qui truche.	376
Athanafie.	955	Blé Turquet.	ibid.
Aubeau.	86	Blé de Vache.	419
Auberges.	295	Blete.	538
Aubefpin.	136	Bluet.	436
Aubifoin.	436	Bois gentil.	214
Aucron <i>vel</i> Aueneron.	404	Bois à faire lardoires.	272
Auet.	53	Bois puant.	105
Aulbour.	103	Bonnes Dames.	535
Aulne.	96	Borrage.	578
Aulne noir.	97	Borrache fauuage.	1104
Aunce.	867	Bouillon blanc mafle.	1298
Auoine.	403	Bouillon blanc femelle.	ibi.
Aurenges.	301	Bouillon noir.	ibi.
Auriole.	1464	Bouillon fauuage.	ibid.
Auronne.	937	Bouleau.	92
Auuia.	47	Bourgespine.	139.145.158

Acille.	767	Bourrache.	578
Baguenaudier.	214.215	Bourfe de berger.	1097
Barbe de Cheure.	1080	Bouys.	165
Barbe de bouc.	1078	Bouys picquant.	242
Barberenard.	1477	Branche vrfin e.	1443
Barbotine.	945	Bray <i>aut</i> Brac.	1369
grande Bardane.	1054	Brayes de cocu.	833
Bafilic.	679	Bredone.	540
Bafilic fauuage.	682.912	Bronde.	187
Bafinet.	875.1027	Brouchin.	96.166
Bafinetz.	794	Bruiere.	185
Bauhino.	8	Brulure.	418
Baume.	1770	Bugle.	1075
Bec de gruë.	1275	Bugloffie.	578
Bec de cigoigne.	ibid. &		

Abaret.	913
Cade.	67
Calamente.	904
Cameline.	1136
Camemine.	ibid.
grande Camomille.	940
Camomille bleüe.	1389
Camomille vulgaire.	1344
Campanes blanches.	1526
Camphre.	1783
Canne.	995.999
Cappres.	155
Cardons.	1439
Cardon lechal, ou lecher.	1438
Carottes iaunes.	719
Carottes & Carottes rouges.	721
Carotte ou Pafenade fauaa.	719
ge.	

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

Carogues.	112	Coing & Pomme de Coing.	Drylie.	1
Carui.	693	Cognasses.	Dureines.	310
Casse.	113	Coingnier & Coignacier. <i>ibid</i>		
Ceboule.	1538	Coloquinte.		
Cedre.	36	Comin.		
petite Centauree.	1286	Concombre.		
Cerfueil.	710	Confanons.		
Cerifier, Cerises.	309	grande Consolide.		
Ceterac.	1215	Consolide, & Consolide Sarra		
Chamaraz.	909	zine.		
Champignons.	1586	Consyre.		
Chanure.	496	Coq.		
Chapperon ou Coqueluehon		Coques de Leuant. 1722.		
de moyne.	1745	Coqueliquoc.		
Charbon de quartier.	3	Coquelourde.		
Charbon de branche.	4	Coqueret.		
Chardon à cent testes.	1458	Coral.		
Chardon argentin.	1445	Cormes.		
Chardon à carder <i>vel</i> Chardô		Cormier.		
à fouillon.	1447	Corne de Cerf.		
Chardon nostre Dame.	1474	Corneole.		
Chardonerette.	1437	Cornouilles.		
Chardouffe.	1453	Cornouillier.		
Charme.	81	Corrigiole.		
Charpene.	<i>ibid.</i>	Cotton.		
Chastaigne, Chastaigner.	31	Coucombre sauuaage.		
Chausse trappe.	1473	Coucourde.		
Chellidoine.	1249	Couillon de Prestre.		
Cheneue.	496	Couillon de chien.		
Chermillat.	5	Couldre.		
Cheruy.	722	Coleuuree.		
Chesne.	2.8	Couleuuree noire.		
petit Chesne.	6	Couleuuree sauuaage.		
Chesne verd.	20	Courge.		
Chesnette.	1162	Courge sauuaage.		
Cheueux de Venus.	1209	Couffines.		
Cheure feuil.	1427	Cousines de marais.		
Chou.	518	Ciamoisi.		
Chou capu.	521	Creneuse.		
Chou capu rouge.	523	Cresson de iardin & Cresson		
Chou-de chien.	1628	alenois.		
Chou crespou noir.	523	petit Cresson aquatique. <i>ibid.</i>		
Chou de Cypre.	521	Cresson d'eau.		
Chou fleuri.	<i>ibid.</i>	Cresson sauuaage.		
Chou noir.	523	Crete marine.		
Chou raue.	522	Croisette.		
Chou rouge.	523	Carage.		
Chou de Sauoye.	521	Cuyderelles.		
Charles.	1581	Cypres.		
Ciche.	461	Cyprez de iardin & petit Cy		
Cichoree de iardin.	555	prez.		
Cichoree sauuaage.	<i>ibid.</i>			
Cicidaire.	760			
Cidre.	1283			
Ciguë & Cocuë.	788			
Cirier.	202			
Citrouille.	615			
Citrons.	298			
Ciues & Ciuons.	1538			
Codignat.	29			
Clou de Gyroste.	1758			

GALLICVS.

Fouteau.	34.35	Grosse Germandree.	1165	Houbelon & Houblon.	1414
Fraisier & Frascs.	613	Guede.	499	Houx & Houffon.	147
Framboisier & Framboises.		Guimauc.	590	Hyssope.	933
123		Guimauc de Venise.	594		
Franc-osier.	278	Guimauc sauage.	593	I	
Froument.	371	Guindoles.	310	I Euse.	20
Froument Locar.	395	Guines.	309.310 311	I f.	24.78
Froument rouge.	ibid.	Gurguet.	418	Iosemin & Iasmin.	1410
Froument à six quartes.	376	Guy.	17	Iosmin rouge & Iosmin large.	
Froumentee.	ibid.	Gyroffle.	1758	1431	
Fumeterre.	1291	Gyrofflee de Damas, ou des		Ionc.	585
Fusain.	272	Dames.	804	Iote.	331
Fustet.	194	Gyrofflees.	806	Ioubarbe. 1128 grande Ioubar	
		Gyrofflee d'eau.	1012	be. ibid. petite Ioubarbe.	
G		Gyroffliers iaunes.	801	ibid.	
G Ainier.	220	Gyrofflee iaune.	802	Iue muscate & Arctique. 1159	
Galle ou Noix de Galle.				Iugioline.	482
I5		H		Iuiubes.	356
Gantelee, ou Gans nostre Da-		H Ache Royale.	1588	Iuraye.	416
me.	829 831	Hanebane.	1716	Iuraye sauage.	ibid
Gelee de Coing.	292	Hai deau.	257	Iusquame.	1716
Genest. 168. & Geneste.	172	Hautains.	95		
Genest d'Espagne.	168	Hepatique.	1083. 1274	L	
Genest de Florence.	ibid.	Hestre.	34.35	L Aisterons.	571
petite Geneste, petit Genest.		Hieble	269	Laietue.	545
173 174		Hissope.	933	Laietue crespue.	ibid.
Geneure & Geneurier.	66	de l'Herbe.	422	Laietue pommee.	ibid.
Gentiane.	1258	Herbe aux Aulx.	911	Lampe.	601
Germand. ee.	1162	Herbe S Barbe.	650	Langue de cerf.	1218
Gesses.	470	Herbe de Bouc.	543	Langue de chien.	1261
Gingembre.	1850	Herbe à cent maladies.	1062	des Lans.	164.173
Glaieul puant.	1621	Herbe au chancre.	1349	Lapas, & du Lapais.	601.602
Glaieul de marais.	1618	Herbe au Charpentier.	1310	Lauande.	919
Glais & G'aitel.	1620	Herbeau chat.	908	Lauande femelle.	ibid.
Gland de terre.	1347	Herbe aux cloches bleties	816	Laureole.	210
Gloutteron aigu.	1056	Herbe de cœur.	673 1327	Laurier.	351
grand Gloutteron, & Glette-		Herbe à cotton.	115	Lentille.	475
ron.	1054	Herbe aux cuilliers.	1320	Lentille d'eau.	1014
petit Gloutteron.	1056	Herbe doree.	1273	Lentisque.	63
Goutte.	1683	Herbe d'esperuier.	569	Leueche.	706
Grace de Dieu.	1085	Herbe de feu.	1041	Liege.	22
Graine d'escarlata.	27	Herbe contre la grauelle.	1114	Lierre.	1415
Graine	29	Herbe S. Iacques.	575	Lierre terrestre.	1310
Graine iaune.	151	Herbe à iaunir.	1742	Limons.	301
Graine à teindre.	ibid.	l'Herbe S. lean.	949	Lin.	493
Graine d'Auignon.	ibid.	Herbe au lait.	487.1642	Lis.	1491
Grame.	420	l'Herbe aux limassons.	502	Lis d'estang.	1008
Grande Esclair.	1249	Herbe du masclou.	264.266	Lis sauage.	1493 1437
Grateron.	1310	Herbe militaire à millefeuil-		Liferon.	1421.1423
Gremil.	1176	les.	768	petit Liferon.	1424
Grenadier.	303	Herbe aux perles.	1176	Liferon de vigne.	1423
Grenouillette.	1027	Herbe du Perroquet.	1632	grand Lifet.	1421
Griotes, Griotier.	310	Herbe aux puces.	1172	Lifet piquant.	ibid
Grosfeli.	131	Herbe aux pouilleux.	1629	Long gran.	376
Grosfelle.	ibid.	Herbes aux poumós.	1326.1327	Louchon.	54.166
Grosfeli noir & Grosselles		Herbe du prés.	412	petite Lunaire.	1313
noires.	132	Herbe Robert.	1278	Lupin.	466
Grosfeli rouge & Grosfeli		Herbe aux tigneux.	1053	Lusse.	166
d'oultre mer.	131. 132	Herbe aux viperes.	1104	Luzerne & Luzert.	503
Grosfelles rouges & Grosfelles		Huile de Cade.	39.59		
d'oultre mer.	ibid.			Mandra	

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM,

M		Muguet.	870	Pain bourgeois.	ibid.
Andragore.	1725	grand Muguet.	838	Pain cuit au four.	ibid.
Manternier.	202	petit Muguet.	1088	Pain cuit en la terrasse.	ibid.
Mariottes.	825	Myrecolons.	295	ibidem.	
Mariolaine.	881	Myrte.	236	Pain farin.	ibid.
Mariolaine menue & musquée.	882	Myrte petit.	238	Pain de mefnage.	ibid.
Mariolaine d'Angleterre & grosse Mariolaine.	884	N		Pain dict Oblies.	ibid.
Mariolaine bastarde.	886	Nafitort.	654	Pain à tout.	ibid.
Magaritons.	855	Nauveau rond.	639	Pain de cocu.	1354
Marguerites.	853	Naueu & Naucau.	644	Pain d'oifeau.	1128. 1130
Marguerite bleüe.	1389	Nefflier, 332. Neffle.	ibid.	Pain de pourceau.	1604
Marrons.	31.32	Nerprun.	145	Palais au lieure.	571
Marrube & Marrubin.	960	Nielle.	812	Palme & Palmier.	362
Marrube d'eau.	1064	Nielle vulgaire.	438	Panetz.	719
Marrube noir.	1252	Noifelier.	100	Panetz sauuage.	721
Marrube puant.	ibid.	Noix, Noyer.	320	Panis & Panic.	411
Mauue.	584	Noix de Galle.	15	Parelle.	601
Maffes.	994	Noix de la S. Iean.	321	Paritoire & Parietaire.	1241
Mafitre.	1637	Noix muscade.	1760	Pas de cheual, & Pas d'afne.	
Maflic, ou Maflich.	66. 868.	petit Nombriil de Venus.	1322		
884. 931				Pafquettes.	853
Marricaire.	953	O		Pafferage.	666
Menthe.	671	O Bier.	270	Pafferage sauuage.	658. 666
Menthe aquatique.	676	Oeillet, & Oeillet Dieu.		Pafferoses.	815
Menthe cheualine.	673	Oeillet.	815	Paffelouclours.	870
Menthe crespie.	672	Oeillet d'Inde.	839	Paftenade.	718. 719. 721
Menthe de nostre Dame.	ibid.	Oeillet sauuage.	815	Pafteil.	499
Menthe Romaine.	ibid.	Oeilletz.	806	Pafture de chameaux.	1884
Menthe sauuage.	673	Oignon.	1536	Patience.	606
Mefefe.	55	Oignon marin.	1575	Paume de Christ.	1610
Melffe.	957	Oliues & Oliuier.	342	Pauot.	1707
Mercuriale.	1626	Opier.	270	Pelleboffe.	1018
Mercuriale sauuage.	1628	Oranette.	1100	Pelofsier.	130
Mefcle.	393	Oreilles.	617	Penfces & Menues penfces.	
Meflier.	332	Oreille d'afne.	1074		
Mefle.	ibid.	Orge.	398	Pepon.	622
Mefplier. ibid. Mefple. ibid.	393. 396	gros Orge.	ibid.	Perceboffe.	1058
Meurier, Meure.	325	Origan.	886	Perfefeucille.	1321
Meurte.	236	Orme.	80	Perfes.	295
Mezanes.	303	Orpin.	1315	Perficair.	1040
Micocoulier.	346	Ortie.	1243	Perfil.	700
Micocoules.	ibid.	Ortie morte.	1246	Perfil d'afne.	760
Migraine.	303	Ortie puante.	1247	Perfil de marez.	701
Mil & Millet.	408	Orualle.	965	Perfil de montagne.	ibid.
Millefueille.	708	Osier.	133. 278	Perueneche.	832
Mirrhe.	1755	Osmunde.	1225	Pefche.	293
Monnoyere.	1062	Ouchon.	54	Pefche-noix.	286
Morelle.	596	des Oarles.	271	Pefchier.	293
Morgeline.	1232	Ozaille, ou Ozeille.	605	Pefle.	49
Morilles.	1588	Ozeille menue & Ozeille de brebis.	ibid.	Per d'afne.	1472
Mors de diable.	1066	Ozeille ronde, Ozeille franche, & Ozeille Romaine.	ibid.	Peuplier.	86
Mort-aux chiens.	1570			Phafiois.	472. 473
Mort aux porceaux.	542			Pied d'Alexandre.	1170
Mouron à fleurs rouges.	1236			Pied d'Aloüette.	698
Mouron violet.	1339			Pied de geline.	1292
Mouffe.	1123			Pied de leure.	441
Mouffe de mer.	1367			Pied de lion.	1281
Mouftarde.	645			Pied de Loup, vel Pate de Loup.	1325
				Pied d'Oye.	342
				Pied	

Pied d'oiseau.	486	Pois ramé.	449	Q Vêue de cheual.	1069
Pied de pigeon.	1276	Poiure.	1807	Q Quêue de souris.	118
Pied de veau.	1596	Poiure aquatic.	1038	Q Quintefeuille.	1263
Pignons.	4452	Poiure d'Inde, & Poiure d'E-			
Piloselle.	1098	spaigne.	631		
Piment Royal.	110	Poiurette.	812		
Pimpinelle sauage, & culti-		Poirurier.	132	R	
uee.	1087	Poix fondue.	74	R Abe.	619
Pin.	43	Poix refine.	6972	R Racine sentant les Ro-	
Pins sauages, ou Pinnateaux.		Poix seche.	75	les.	981
46		Polipode.	1229	Raisin de renard.	1312
Pirethre.	1170	Polytric.	1211	Raiponce.	641
Pirole.	841	Polytric dore.	1212	grande Raiponce.	ibid.
Pissenliet.	564	Pomcires.	298	Ramebouc.	1477
Pistaches.	360	Pomier, & Pome.	285	Raued.	606
Piuoine.	855	Pomes d'Adam.	302	Rauemon.	541.640
Plane.	94.201.220	Pomme d'Amour.	626	Reclisse & Regalife.	247
Plantain d'eau.	1056	Pomme d'Amour, & Pomme		Reifort.	634
Plantain de mer.	1319	d'or.	628	Reifort sauage.	636
Platane.	93	Pomme Apiole.	286	Reifort d'eau.	1090
Poerce.	531	Pommes de Capandu.	ibid.	Renouée femelle.	1072
Poirier, Poires.	306	Pommes Follanes.	ibid.	Renouée masle.	1123
Poire Acciole.	307	Pomme Girandete ou Pom-		Reperet.	828 829
Poire d'Angoisse.	ibid.	meipoire.	ibid.	Refine.	6369
Poire d'Argent.	306	Pome de Grenade.	303	Restincle.	63
Poire Bergamote. ibid. & 307		Pomme Grillote, & Pomme		Reuille matin.	1648
Poire Blauchete.	306	de Passepomme.	286.287	Reuille matin des vignes.	
Poire Bon Chrestien. ibid. &		Pomme de S.lean.	286	1638	
307		Pomme de Merueille.	629	Rhu.	194
Poires de Cailloian.	ibid.	Pommes Panettes.	286	Rorte.	257
Poire d'ete Caluau Rosat.		Pomme de Paradis.	287	R marin.	763.967
ibid.		Pomme du Perou.	628	Romp pierre.	1112
Poire Carmagnole.	ibid.	Pommes de Pin.	44	Romp pierre doree.	1114
Poire Certeau.	ibid.	Pomme Rembure.	287	Ronce.	119
Poire Chat.	ibid.	Pomme Rose.	286	Roquette.	649
Poires de Chio.	ibid.	rosses Pommes rouges.	ibi-	Rosage, & Resagine.	244
Poire Courle.	ibid.	dem		Roseau.	995
Poire Cuiffe-madame.	ibid.	Pomme Suzine.	ibid.	Rose.	114
Poires d'eau Rose.	ibid.	Pomme Taponne.	280	Roses de Dames incarnates.	
Poirier d'Espine.	136	Pomole.	398	115	
Poire Espine.	137. & 307	Ponceau.	439	Roses de Damas rouges.	
Poires d'Estranguillon.	308	Porcellaine.	550	ibid.	
Poires de fin or.	307	Porreau.	1541	Roses incarnates.	ibid.
Poire Forest.	306	Porreau de chien.	1543	Roses Musquees, & Muscadel	
Poire d'Hyuer.	307	Potirons.	1586	le.	ibid.
Poire de saloufie.	ibid.	Poule gra.	154	Rose d'oultremer.	584
Poire S.lean.	ibid.	Poulliot.	890	Roses de Prouins.	125
Poire de Liure.	ibid.	Poupom.	622	Roure.	4.6.
Poire S.Martin.	ibid.	Poupons succrins, & succre-		Roulee de Soleil.	1212
Poire grosse Muscadelle.	306	des.	623	Rue.	428.972
Poires Muscadelles. ibid. &		Pourchailles, & Pourpier.		Rue de mur.	1212
307		550		Rys.	407
Poire Mustet.	306	Ptele.	1069. 1070		
Poire Nostre Dame.	307	Presses.	205	S	
Poire Perle.	306	Primeuere.	853	S Affran.	1531
Poire Pomme.	307	Prunes, Prunier.	313	S affian bastard.	1449
Poire Prenoist.	306	Prunelier, & Prunier sauage.		Saint foim.	502
Poires à deux Testes.	307	Prunelle.	130	Salette.	605
Pois.	449	Pudis.	105. 312	Sallade de Chanoine.	1127
Poix bechu.	461	Pulier.	ibid.	Sanguins.	197
Poix ciche.	ibid.	Pyment.	952	Sanicle.	

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM, GALLICVS.

Saniele.	1268	Solane furieux.	ibid.	Treffle.	503
Sap & Sapin.	51. 53	Solane mortel.	1721	Treffle odoriferante.	506
Sarrasine.	976. 979	Sorbes & Sorbier.	330	Treffles des pres.	1353
Sarrazine.	1270	Souchet.	991	Triolet.	ibid.
Saryrion.	1549. 1565	Soude.	1377. 1378	Triguemadame.	1128
Satyriion Royal.	1565	Soulsû.	811	Troefne.	253
Sauge, grande Sauge, Sauge franche, & Sauge menue.	879	Soulsû d'eau.	1058	Truffiles.	1585
Sauinier.	182	Sparfe.	489	Tue-chien.	1570
Saulx & Saulé.	274	Staphisagré.	1629		
Saunes blanches.	542	Stichedes.	917		
Sauue vie.	1212	Stipoule.	1575		
Saxifrage.	786	Sureau.	266		
Saxifrage blanche.	1112	Suyer.	ibid.		
Scabieuse.	1065	Sycomore.	340		
Scammonee.	1661				
Scariole.	555				
Scordion.	909				
grande Scrofulaire.	1085				
Sebestes.	359				
Sécle ou Segle.	396				
Semoule.	376				
Senelle <i>vinum</i> .	137				
Seneflon.	574				
Seneue.	645				
Seneue sauvage.	661				
Serbin.	59. 183				
Serpentaire & Serpétine.	1601				
Serpentaire d'eau, & aquati- que.	ibid.				
Serpoller.	902. 904				
Siboule.	1538				
Signet de nostre Dame.	1409				
Signet de Salomon.	1623				
Simoule.	379				
Soiffe.	49				
Solane dormitif.	596				

T

Tabouret.	1097
Tamaris.	179
Tanaïsie.	955
Targon.	781
Tarnottes.	1347
Tartouraire.	1669
Teigne de Thym.	1681
Terebinthe.	61
Terbentine de Venise.	54
Tillet, Teilleu, Teil.	89
Thése, ou Thie.	49
Thym.	904
Tifane.	401
Tithymal.	1647
Tourmentille.	1267
Tormigne.	99
Tortelle.	653
Toufelle.	376
Toutebonne.	602. 965
Toutefaine.	1156
Tréble. 86. petit Tréble.	ibid.

V

Vaciet.	256. 1506. 1514
grande Valeriane.	927
grande Valeriane sauvage.	1042. petite.
Velar.	653
Veraire.	1631
Ver de vefcie.	146
Verge d'or.	1172
Vermillon.	27
Veronique femelle.	1050
Veronique masle.	1315
Verueine.	1334
Vefce.	478
Vid de prestre.	1596
Vigne.	1401
Vigne sauvage.	1406
Vignoble.	1616
Vinette.	605
Violette d'Automne.	824
Violette de Damas ou des Dames.	804
Violette de Maric.	825
Violette de Mars & Violette de Mars double.	797
Violier iaune.	802
Viorne.	257. 1407. 1605
Vnefeuille.	1260

FIN DE LA TABLE FRANCOISE.

I N D E X



A		<i>Barzaz bianco.</i>	135	<i>Canalo.</i>	58
<i>Bete.</i>	53	<i>Barba di becco.</i>	1078	<i>Cauli fiori.</i>	521
<i>Abrotono.</i>	936	<i>Basilico.</i>	679	<i>Ceci.</i>	461
<i>Agarico.</i>	1703	<i>Basilico saluatico.</i>	679	<i>Cedri.</i>	298
<i>Aglio.</i>	1545	<i>Bedollo.</i>	92	<i>Cedrinolo.</i>	619
<i>Agno Casto.</i>	280	<i>Belurdere.</i>	826.1333	<i>Cedro.</i>	34
<i>Agretto.</i>	654	<i>Berbena.</i>	1334	<i>Cefaglione.</i>	369
<i>Agrofio.</i>	147	<i>Betula & Bettoia.</i>	92	<i>Cefaglioni.</i>	1762
<i>Alaterno.</i>	159	<i>Biada.</i>	384	<i>Celidonia.</i>	1249
<i>Albatro.</i>	195	<i>Bidone.</i>	264	<i>Celidonia minore.</i>	1048
<i>Albero da le Patenoftri.</i>	338	<i>Bietola.</i>	531	<i>Centaurea minore.</i>	1286
<i>Albero de l'vua.</i>	102	<i>Biondella.</i>	1286	<i>Centograna.</i>	1126
<i>Alga.</i>	384	<i>Bislingua.</i>	205	<i>Cercone.</i>	1232
<i>Amarella.</i>	953	<i>Bisinalua.</i>	593	<i>Cerro.</i>	6
<i>Amor di donna.</i>	1561	<i>Blito.</i>	528	<i>Chambrossena.</i>	252
<i>Amperlo.</i>	135	<i>Bonifucia.</i>	205	<i>Chamedrio.</i>	1162
<i>Ampomele.</i>	123	<i>Borragine.</i>	578	<i>Chamepitio.</i>	1159
<i>Anagiri.</i>	105	<i>Bracche di cuculo.</i>	833	<i>Charantia.</i>	629
<i>Anetho.</i>	691	<i>Bruscandula.</i>	1414	<i>Chioua di loue.</i>	1164
<i>Aniso.</i>	692	<i>Buon vischio.</i>	593	<i>Chondrilla.</i>	563
<i>Anguria.</i>	625			<i>Ch. rtal.</i>	403
<i>Apio domestico.</i>	700	C		<i>Cicerbita.</i>	571
<i>Apio palustre.</i>	701	<i>Acapuzza.</i>	1657	<i>Ciclamino.</i>	1604
<i>Arabeia.</i>	465	<i>Calamandrina.</i>	1162	<i>Cipolla.</i>	1536
<i>Armeniache.</i>	297	<i>Calamento.</i>	904	<i>Ciregie.</i>	309
<i>Aro.</i>	1596	<i>Calami a fur canoechie.</i>	999	<i>Ciregie Acqua'uole.</i>	310
<i>Asparago.</i>	609	<i>Camphora.</i>	1783	<i>Ciregie Amarine.</i>	ibid.
<i>Asperella.</i>	1069	<i>Canella.</i>	1796	<i>Ciregie Corbine.</i>	ibid.
<i>Asphodelo.</i>	1188	<i>Canape.</i>	486	<i>Ciregie Duracine.</i>	ibid.
<i>Auellano.</i>	319	<i>Cappellazi.</i>	1053	<i>Ciregie Marasche.</i>	ibid.
<i>Assenza.</i>	940	<i>Capriola.</i>	670	<i>Ciregie Marine & Marinel-</i>	ibid.
<i>Astoni.</i>	131	<i>Cardocello.</i>	574	<i>le.</i>	ibid.
<i>Atriplice.</i>	535	<i>Cardo da Cardare.</i>	1447	<i>Ciregie Marobiane.</i>	ibid.
<i>Au'no.</i>	96	<i>Cardo fiero Leone ditto.</i>	1401	<i>Ciregie Versule.</i>	ibid.
<i>Azarolo.</i>	333			<i>Ciregie Ursinale.</i>	ibid.

B Acoche.
Bagata.
Bagolaro.
Balsamina.
Balsamo.
Bambagia.

	Carduncello maggiore.	575	Cirmolo.	48
	Caro.	693	Cisto.	222
297	Carobe & Carobole.	112	Citroni.	298
135	Carofino.	1718	Cocomero.	619
346	Carrobaria.	220	Cocomero saluatico.	1672
677	Castia.	113	Coda di cavallo.	1069
1779	Castagne.	31	Coda di leone.	485
221	Cataputia minore.	1657	Coloquintida.	1675

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM,

<i>Conastello.</i>	252	<i>Fauoscello.</i>	1048	<i>Grana de tintori.</i>	27
<i>Consolida maggiore.</i>	1074	<i>Felce.</i>	1222	<i>Granellofa.</i>	1128
<i>Copertoiole.</i>	1608	<i>Fesfre sentanim.</i>	1411	<i>Grano.</i>	371
<i>Corallo.</i>	1374	<i>Fichi.</i>	335	<i>Grasella.</i>	1128
<i>Cornioli.</i>	329	<i>Fico d' Egitto.</i>	340	<i>Grisomele.</i>	297
<i>Corniole.</i>	ibid.	<i>Finocchio.</i>	688	<i>Guado.</i>	499
<i>Corrigiola.</i>	1123	<i>Finocchio marino.</i>	767	<i>Guistrico.</i>	252
<i>Cotone.</i>	221	<i>Fior Campese.</i>	436	H	
<i>Crepalo.</i>	562	<i>Fiore d' ogni mese.</i>	574.811		
<i>Cressina.</i>	137	<i>Fior di primavera.</i>	833.853	<i>Halicacabo.</i>	596
<i>Cressione.</i>	658	<i>Fior raucio.</i>	811	<i>Hedera.</i>	1415
<i>Cuculos de Leuante.</i>	1723	<i>Fior ueluto.</i>	870	<i>Hedera spinosa.</i>	1421
<i>Cumino.</i>	696	<i>Fongino. 1586. Prignoli. ibi. Pra</i>		<i>Herba Belladonna.</i>	1721.1727
<i>Cuneno.</i>	414	<i>taoli, Turini, Boleti, Orceffe,</i>		<i>Herba Gatta.</i>	908
<i>Cypresso.</i>	57	<i>Cardarelle, Ordinoli, Parigioli, Vescie di Lupo. 1587</i>		<i>Herba Giulia.</i>	777
D		<i>Formento.</i>	371	<i>Herba inoderata.</i>	1215
		<i>Formentone.</i>	383	<i>Herba lupa.</i>	485
<i>Dattoli.</i>	362	<i>Frasinella.</i>	1623	<i>Herba de la marauiglia.</i>	540
<i>Dittamo.</i>	892	<i>Frasino.</i>	82	<i>Herba de la Milza.</i>	1246
<i>Dolzolini.</i>	1584	<i>Fusaro.</i>	272	<i>Herba del moro.</i>	672
<i>Dragoncello & Dragone.</i>	685			<i>Herba di Sarnpetro.</i>	767
<i>Dragoncello.</i>	781			<i>Herba stella.</i>	668
<i>Dragontea.</i>	1601			<i>Herba tora.</i>	485
E		G		<i>Hyacintho del pater nostro.</i>	
<i>Ebeno.</i>	1751	<i>G Alla.</i>	15		
<i>Ebulo.</i>	269	<i>Garofoli.</i>	806	<i>Hydropepe.</i>	1038
<i>Echelo.</i>	104	<i>Gattaria.</i>	908	<i>Hissopo.</i>	933
<i>Egilopo.</i>	405	<i>Garzo.</i>	1447	I	
<i>Elice.</i>	20	<i>Gelsimino.</i>	1430		
<i>Elleboro bianco.</i>	1631	<i>Genestra.</i>	168.172	<i>Incenso.</i>	1752
<i>Elleboro nero.</i>	1633	<i>Gengeuo.</i>	1890	<i>Ingiolina.</i>	482
<i>Endiuia.</i>	554	<i>Ghianda vnguentaria.</i>	1684	<i>Iride.</i>	1609
<i>Enola & Enoa.</i>	867	<i>Gigaro.</i>	1596	<i>Ischia.</i>	6
<i>Erica.</i>	185	<i>Giglio.</i>	1491	<i>Iua.</i>	1159
<i>Eruo.</i>	468	<i>Giglio azurro.</i>	1609	<i>Iunco.</i>	983
<i>Esculo.</i>	6	<i>Giglio celeste.</i>	ibid.	<i>Iusquiamo.</i>	1716
<i>Euforbio.</i>	1690	<i>Giglio matto.</i>	1574	L	
<i>Eufrasia.</i>	1167	<i>Giglio rosso.</i>	1493		
F		<i>Giglio saluatico.</i>	1497	<i>Acca & Lachetta.</i>	1780
		<i>Ginepro.</i>	66	<i>Lagrimos</i>	54
<i>F Agio.</i>	34	<i>Ginochieto.</i>	1623	<i>Lambrusca.</i>	1406
<i>Fagioli.</i>	472	<i>Gioglio.</i>	416	<i>Lantagine.</i>	204
<i>Fagiuolo Turchesco.</i>	473	<i>Giooglio saluatico.</i>	ibid.	<i>Lantana.</i>	256
<i>Farfara, Farfarella.</i>	1050	<i>Girasole.</i>	1630	<i>Lapatio.</i>	600
<i>Farnia.</i>	27	<i>Gittone.</i>	438	<i>Lappola maggiore.</i>	1054
<i>Farro.</i>	388	<i>Giuggiole.</i>	356	<i>Lappola minore.</i>	1056
<i>Faua.</i>	451	<i>Gladiolo.</i>	1620	<i>Larice.</i>	55
		<i>Gorgolestro.</i>	1091	<i>Lattaiola.</i>	566
		<i>Gramigna.</i>	420	<i>Lattuca.</i>	545
				<i>Lauandula.</i>	919
				<i>Lauanese</i>	

<i>Lauanefe.</i>	975	<i>Minutola.</i>	1424	<i>Pece secca.</i>	75
<i>Lauro.</i>	351	<i>Mirra.</i>	1755	<i>Pennachi Perfiano.</i>	1494
<i>Lauro faluatico.</i>	204	<i>Monacucchie.</i>	1620	<i>Peonia.</i>	855
<i>Lella.</i>	867	<i>Moniache.</i>	297	<i>Pepe.</i>	1807
<i>Lente de i paludi.</i>	1014	<i>Moro.</i>	325	<i>Pepe aquatico.</i>	1038
<i>Lenticchia.</i>	475	<i>Mofco.</i>	1323	<i>Pere. 306. Campane, Carouelle,</i>	
<i>Lentifco.</i>	63	<i>Mugo.</i>	47	<i>Ciampoline, Durelle, Gentili,</i>	
<i>Licio.</i>	148	<i>Myrto.</i>	236	<i>Ghiaciuole, Giugnole, Mof</i>	
<i>Limon.</i>	301	<i>Myrto mortella.</i>	238	<i>chatelle, S. Nicolo, Papali,</i>	
<i>Linterno.</i>	159			<i>Porcine, Quadrane, Roggie</i>	
<i>Lithospermo.</i>	1176			<i>Sementine, Spinofe, Verna</i>	
<i>Lodano.</i>	229			<i>reccie, Zuccaie. 308. Mena-</i>	
<i>Loglio.</i>	416			<i>té.</i>	309
<i>Loto albero.</i>	346			<i>Perlaro.</i>	346
<i>Loto domeftico.</i>	506			<i>Perfa gentile.</i>	882
<i>Lupino.</i>	466			<i>Perfiche.</i>	293
				<i>Petra findula.</i>	786
				<i>Petraciani.</i>	626
				<i>Petrofello.</i>	700
				<i>Petrofello, & Petrofello falua</i>	
				<i>tico.</i>	714
				<i>Pettimborsa.</i>	824
				<i>Pezzo.</i>	49
				<i>Piantagine aquatica.</i>	1056
				<i>Pie coruino.</i>	1027
				<i>Pie d'oca.</i>	94
				<i>Pignola.</i>	1128
				<i>Pino.</i>	43
				<i>Pirra.</i>	384
				<i>Pirra farra.</i>	ibid.
				<i>Piftacchi.</i>	360
				<i>Piftacio faluatico.</i>	102
				<i>Piza gallina.</i>	1232
				<i>Platano.</i>	93
				<i>Platano aquatico.</i>	94
				<i>Polenta.</i>	384
				<i>Poliogno mafchion.</i>	1123
				<i>Polpodio.</i>	1229
				<i>Pomi.</i>	285
				<i>Pomi d'oro.</i>	628
				<i>Pomogranato.</i>	303
				<i>Pomo di Ierufaleme.</i>	629
				<i>Pomo fpinofo.</i>	628
				<i>Pongilopi.</i>	242
				<i>Popolo bianco.</i>	86
				<i>Popolo nero.</i>	ibid.
				<i>Porcellana, Porcellina, Por-</i>	
				<i>chella bia.</i>	550
				<i>Porranello.</i>	1543

N

<i>N Arciffo.</i>	1516
<i>Naffo.</i>	24
<i>Nufturio.</i>	654
<i>Nafturio faluatico.</i>	666
<i>Nauone.</i>	644
<i>Nefpoli.</i>	332
<i>Nocelle.</i>	319
<i>Noce mofcada.</i>	1760
<i>Nociuole.</i>	319
<i>Noci.</i>	320

O

<i>O Dano.</i>	229
<i>Oleandro.</i>	244
<i>Olio d' Aueto.</i>	54
<i>Oliuella.</i>	210
<i>Oliuella & Oliuetta.</i>	252
<i>Oliuo domeftico.</i>	342
<i>Olmo.</i>	80
<i>Ombilico di Venere.</i>	1608
<i>Opolo.</i>	94
<i>Oreola.</i>	210
<i>Origano.</i>	886
<i>Orniello.</i>	82
<i>Ortica.</i>	1243
<i>Orzo.</i>	398
<i>Ouio.</i>	96

P

<i>P Alma.</i>	362
<i>Panarina.</i>	1232
<i>Panico.</i>	411
<i>Pan d'orfo.</i>	135
<i>Pan porcino.</i>	1604
<i>Papauero.</i>	1707
<i>Papauero faluatico roffo.</i>	439
<i>Parietaria.</i>	1241
<i>Patrufo.</i>	1072
<i>Pece liquida.</i>	74

INDEX HISTORIÆ PLANT. ITALICVS.

Porro.	1541	Satirio & Satirione.	1565	Taffo.	2478
Porro faluatico.	1543	Scammonea.	1661	Taffo Barbaffo.	1298
Primo fiore.	853	Schiaria.	965	Tartuffi.	1585
Prouenca.	832	Scolopendria.	1215	Terebintho.	61
Prune.	313	Scotano.	194	Terracrepolo.	563
Pfillio.	1172	Segala.	396	Testicolo dicane.	1549
Pulegio.	886	Semenzina.	945	Thymbra di S. Iuliano.	897

Q

Q^{Vercia.}
Querciuiola.

R

R^{Adice.}
Ragia.

Ramoracia.

Ranunculo.

Raphano.

Rapo.

Reppice.

Rhu.

Rigolitia.

Rizo.

Rombice.

Rofa.

Rofalauro.

Rofa Mofcheta.

Rofmarino.

Roffolo.

Rouere.

Rouiglione.

Rouo.

Rouo canino.

Rouo ceruino.

Ruchetta.

Rucola.

Rufco.

Ruta.

S

S^{Abina.}

Sagina.

Salequa.

Salice & Salcio.

Sambuco.

Sanguinella.

Sanguino & Sanguinello.

Santolina.

Saracino.

1541	Satirio & Satirione.
1543	Scammonea.
853	Schiaria.
832	Scolopendria.
313	Scotano.
1172	Segala.
886	Semenzina.
	Semperuiuo.
	Semperuiuo maggiore.
	Semperuiuo minore.
1162	Sena.
	Senape.
	Sesamo.
634	Silio.
63	Silla.
634	Sinasbarium, feu Sinasbar.

673	Smilace de gli horti.
639	Solatro hortolano.
535	Solatro fomnifero.
106	Somachi.
407	Sorbe.
600	Sorgo.
124	Sofimano.
244	Speliciofa.
125	Spelta.
763.967	Speronella.
194	Spigo.
4.8.	Spigonardo.
465	Spin guerzo.
119	Spino ceruino.
121	Spino di Chrifto.
1421	Spino merlo.
649	Spino fanto.
ibid.	Stanca cauallo.
242	Stechade.
972	Strammonia, & Strammo-

673	Smilace de gli horti.
639	Solatro hortolano.
535	Solatro fomnifero.
106	Somachi.
407	Sorbe.
600	Sorgo.
124	Sofimano.
244	Speliciofa.
125	Spelta.
763.967	Speronella.
194	Spigo.
4.8.	Spigonardo.
465	Spin guerzo.
119	Spino ceruino.
121	Spino di Chrifto.
1421	Spino merlo.
649	Spino fanto.
ibid.	Stanca cauallo.
242	Stechade.
972	Strammonia, & Strammo-

673	Smilace de gli horti.
639	Solatro hortolano.
535	Solatro fomnifero.
106	Somachi.
407	Sorbe.
600	Sorgo.
124	Sofimano.
244	Speliciofa.
125	Spelta.
763.967	Speronella.
194	Spigo.
4.8.	Spigonardo.
465	Spin guerzo.
119	Spino ceruino.
121	Spino di Chrifto.
1421	Spino merlo.
649	Spino fanto.
ibid.	Stanca cauallo.
242	Stechade.
972	Strammonia, & Strammo-

673	Smilace de gli horti.
639	Solatro hortolano.
535	Solatro fomnifero.
106	Somachi.
407	Sorbe.
600	Sorgo.
124	Sofimano.
244	Speliciofa.
125	Spelta.
763.967	Speronella.
194	Spigo.
4.8.	Spigonardo.
465	Spin guerzo.
119	Spino ceruino.
121	Spino di Chrifto.
1421	Spino merlo.
649	Spino fanto.
ibid.	Stanca cauallo.
242	Stechade.
972	Strammonia, & Strammo-

673	Smilace de gli horti.
639	Solatro hortolano.
535	Solatro fomnifero.
106	Somachi.
407	Sorbe.
600	Sorgo.
124	Sofimano.
244	Speliciofa.
125	Spelta.
763.967	Speronella.
194	Spigo.
4.8.	Spigonardo.
465	Spin guerzo.
119	Spino ceruino.
121	Spino di Chrifto.
1421	Spino merlo.
649	Spino fanto.
ibid.	Stanca cauallo.
242	Stechade.
972	Strammonia, & Strammo-

673	Smilace de gli horti.
639	Solatro hortolano.
535	Solatro fomnifero.
106	Somachi.
407	Sorbe.
600	Sorgo.
124	Sofimano.
244	Speliciofa.
125	Spelta.
763.967	Speronella.
194	Spigo.
4.8.	Spigonardo.
465	Spin guerzo.
119	Spino ceruino.
121	Spino di Chrifto.
1421	Spino merlo.
649	Spino fanto.
ibid.	Stanca cauallo.
242	Stechade.
972	Strammonia, & Strammo-

673	Smilace de gli horti.
639	Solatro hortolano.
535	Solatro fomnifero.
106	Somachi.
407	Sorbe.
600	Sorgo.
124	Sofimano.
244	Speliciofa.
125	Spelta.
763.967	Speronella.
194	Spigo.
4.8.	Spigonardo.
465	Spin guerzo.
119	Spino ceruino.
121	Spino di Chrifto.
1421	Spino merlo.
649	Spino fanto.
ibid.	Stanca cauallo.
242	Stechade.
972	Strammonia, & Strammo-

673	Smilace de gli horti.
639	Solatro hortolano.
535	Solatro fomnifero.
106	Somachi.
407	Sorbe.
600	Sorgo.
124	Sofimano.
244	Speliciofa.
125	Spelta.
763.967	Speronella.
194	Spigo.
4.8.	Spigonardo.
465	Spin guerzo.
119	Spino ceruino.
121	Spino di Chrifto.
1421	Spino merlo.
649	Spino fanto.
ibid.	Stanca cauallo.
242	Stechade.
972	Strammonia, & Strammo-

V

V^{Aldebona.}
Valeriana maggiore.

Vena.

Vena vana.

Verbasco.

Verca.

Vermiacola.

Viburno.

Vilucchio maggiore.

minore.

Vincibosco.

Violla ialla.

Viola porporea, & Viola mam

mola.

Vischio.

Vite bianca.

Vite nera.

Vite vinifera.

Vitice.

Viticella.

Vitriola.

Vnghia di cauallo.

Vua d'India.

Vua dell'orfo.

Z

Z^{Affarano.}

Zaffarano faluatico

Zaffarano Sarrafinesco.

Zucca.

Zucca faluatica.

FINIS INDICIS ITALICI.

INDEX



INDEX HISPANICVS.



A			
Beto, ar-		Armoles.	535
bol.	53	Arroz.	407
A bogalla.		Arrula.	972
15		Arueria.	63
Abrolhos.		Aruga.	649
512		Aselgas.	531
Abrotono.	936	Asprilla.	1125
Abroyos.	512	Auellanas.	319
Acibar.	1693	Auellana dela India.	1684
Acoseiso.	356	Auena & Auca.	403
Adelfa.	244	Auzina.	20
Agarico.	1703	Auzinheira.	ibid.
Alamo Blanco.	86	Ayos.	1545
Alamo nigrilho.	ibid.	Azebo.	147
Albahara.	679	Azeure.	1693
Albarchigas.	297	Azeytuno.	342
Albardin.	179	Azufecifa.	356
Albiricoques.	297	Azumbar.	900
Albocigos.	360	B	
Alcaparas.	155	B Accarra.	913
Alcaranea.	693	Baldroegas.	550
Alcarobas.	112	Batades.	1909
Alcolcaz.	457	Bexigo de perro.	596
Alcornoque.	22	Bonnaron.	574
Alegria.	482	Borraia.	578
Alfalfa, & Alfafa.	504	Box.	165
Alfena, seu Alhena.	252	Brufalagam.	1668
Alforuian.	1690	la Burladora.	1913
Algodon.	221	C	
Allahaqua môtcfina.	682	C Alabazza.	615
Al Mastiga.	66	Câpanilla.	1426 1523
Almendras.	316	Cannas.	995
Almez 346.	Alfalfa.	Canela.	113 1796
Aluaricoques.	297	Caninero.	266
Amapolas.	439	Carumbolas.	1872
Amapolas morades.	1713	Carca.	119
Ambarcs.	1874	Cardon.	1698
Amexias.	313	Cebolla albatrana.	1575
Ananas brauo.	1871	Cedro.	36
Andrinas.	313	Ceguda.	788
Anorca.	1409	Celiduenha.	1249
Arbol contralas eryfipola-	1862	Centeno.	396
las.		Cepolha.	1536
		Cerezas.	309
		Cerezo sylueftre.	329
		Cerguacos.	222
		Ceudadilla.	1906
		Ceuada.	398
		Cidras.	298
		Ciegegato.	1668
		Cipolle maligie.	1538
		Clauo de efpecia.	1758
		Coda di mu'a.	1069
		Cogombrillos amaragos	1672
		Cogombro.	619
		Cogomelos.	1586
		Cothes.	518
		Colleion.	525
		Coloquintida.	1675
		Comino.	696
		Contrayerua.	1825
		Corallo.	1374
		Cornicabra.	61
		Cornizolos.	329
		Coronilla de Roy.	490
		Corregula mayor.	1912
		Cofcoria.	20
		Couues.	518
		Coyon de perro.	1549
		Cuentas.	1001
		Culebras de Capillo.	18 5
		Culátrillo de pozo.	1209
		Cylherquas.	1586
		el Cypres.	57
		D	
		D Attiles.	362
		Datura.	1913
		Doradilha.	1215
		Dormidera.	1707
		E	
		E Dera.	1415
		E Encienfo.	1752
		Endiua.	554
		Enebro.	66
		Eneldo.	691
		Entramocos.	466
		Euzina.	6

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM,

Enzo.	1485	Inucia odorosa.	992	Mostaza	645
Eruaye.	502	Ionquillos.	1520	Murta.	236
Escudetes del rio.	1008	Iorgilin.	482	N	
Esparagos.	609	Isopo.	933	N Abicas.	644
Esfigafil.	920	Iua arthetica.	1159	N Nabo redondo.	639
F		Iunco.	983	Naranzas.	302
F Abaras paparaz.	1629	Iunquicra.	568	Nasturcyo.	654
Fallado.	205	Iusbarba.	242	Neguillia.	812
Fauade Malaqua.	1764	L		Nelperas.	332
Feyones.	473	L Abaca.	600	Norchila.	1866
Figuera del'inferno.	1630.	L Larice.	55	Nozelhas.	1580
1790		Laurel seu Laureiro.	351	Nuxa.	1409
Fil y Aguilla.	1698	Laureizo.	ibid.	Nuez de especie.	1760
Frailillos.	1600	Lechuga.	545	Nuezes.	320
Fresno.	82	Lengua de Cauallo.	205	O	
Frexo.	ibid.	Lenteias.	475	O Lioo.	342
Funcho.	688	Lenteya dellagoa.	1014	O Oregano.	886
G		Lentciuela.	490	Ortiga.	1243
G Amones & Gamoni		Liga mordago.	17	Oruga.	649
tes.	1588	Lino.	493	P	
Gatillo Casto.	280	Lirio.	1580.1615	P Almeida.	362
Genestra, Giesteira, Gie-		Lirios azules.	ibid.	P Palmitos.	1762
stra.	168.172	Lirio espadanal.	ibid.	Palomilla & Palomina.	
Gigante.	874	Lirio Illyrico.	ibid.	1294	
Gingiure.	1890	Loreola.	210	Paniqueso del flor blan-	
Giralda.	874	M		quo.	661
Grana en grano.	27	M Acucas.	1580	Paniso & Panizo.	411
Grana para tegnir.	ibid.	M Madronho seu. Ma		Papolos.	439
Granadas.	303	dromeiro.	195	Parra & Parilla.	1898
Grauanços.	461	Maïos flores.	1412	Pastel.	499
Guindas de las Indias.	600	Malpica.	654	Paya de la Mequa, sine Pa	
H		Maluas.	584	ya de Camelhios.	1884
H Aba de India muy		Malua de Vngria.	593	Pepitas del Peru.	1861
larga.	1892	Malua montefina.	ibi.	Perexil.	700
Haia.	34	Mácanas de la India.	1873	Perexil de la mar.	767
Helechoyerua.	1222	Mandracola.	1725	Pexegos.	293
Hiezguos.	269	Manfanás.	285	Pex negra.	74
Higos.	335	Marmello.	290	Pie de Borro.	1535
Higos del rio.	1008	Marroio negro.	1452	Pimenta de Bresil.	633
Hinoio.	688	Marrones.	31	Pimienta.	1807
Hissopo.	933	Mata.	63	Pimienta del rabo.	1809
Hongos.	1586	Matuhalua.	692	Pinilho.	1159
I		Mechioacan.	1901	Pino.	43
I Ambeiro.	1873	Membrilho.	290	Pino negro.	49
I lambos.	ibid.	Merenderas.	1572	Pinones de Maluco.	1875
Iaro.	1600	Mierda cruz.	1668	Pirlitero.	135
Ieruos.	468	Milho.	408	Porcellanes.	560
Ignose.	457	Miyo.	ibid.	Prunas.	313
Ignose cicorero.	1909	Moras del Moral.	325	Puerro.	1541
				Pyras	

HISPANICVS.

Pyras.	306	Soagem.	1100	Violetas amarelhas.	801
R		Sombrereta.	1053	Vlmo.	80
Abacas.	1091	Sorbas.	330	Vua de Perro.	205
Rabo de mula.	1069	Sparto.	177.178	Vuero.	1850
Raiam.	236	Spelta.	384	X	
Rapontis.	1288	Sumach.	106	Xara.	229
Rauano & Rauanillo.	634	Sumagro.	ibi.	Y	
Regaliza.	247				
Reylla bucy.	1615	T		Y	
Romanas.	303	Tabaco.	1895	Yerua de Baleste.	1630
Romero.	763.967	Tamaras.	362	Yerua belida.	1027
Rofas.	124	Tamarqueira.	179	Yerua buena.	671
Rosa albandeira.	855	Taxo.	24	Yerua Cidreira.	957
Rosa del monte.	ibid.	Teia.	89	Yerua dulce.	692
Rosella.	439	Texo.	78	Yerua di S. Gayteria.	568
Rosetta.	1713	Tomilho falso.	899	Yerua de las golaudri-	1249
Rucas de mar.	1394	Tonnanda.	1522	nas.	
S		Torongil.	957	Yerua de Monteferrato.	1668
Abina.	182	Treuol.	503	Yerua mora.	596
Sabugo.	266	Trigo.	371	Yerua del muro.	1241
Sabugo pequenno.	269	Turmas de terra.	1585	Yerua Turmera.	1100
Salce & Salgueiro.	274	A		Yerua Tuffera <i>vel</i> Pelu-	
Sarza parilla.	980	V		da.	838
Scorzonera.	806	Elenho.	1716	Yoio.	416
Scorzonera, <i>aut</i> Scurzo-		Vellotas, <i>Hispane</i>		Z	
nera.	1206	<i>glandes Esculi vocant.</i>	6	Z	
Scudetes.	1608	Verangenes.	626	Z	
Sene d'Alexandria.	217	Verdezilla.	1426	Argatona.	1172
Serpollito & Serpam.	902	Verdolagas.	550	Zarza parilla.	1898
		Violeta.	797	Zizania.	416

FINIS INDICIS HISPANICI.

INDEX GERMANICVS.



A	
Achelbaum.	86
Abthyon.	111
Agley & Ageley.	820
Aker, aut Ackerwurtz.	1347
Alant, aut Alantwurtz, Alantkrant.	867
Amelkorn, aut Ammelmeel.	390
Ampfier.	600
Angelick.	724
Angenthroß.	1167
Aniß.	792
Apffel.	285
Aposentkraut, aut Aposiementkraut.	1065
Aspen.	86
Attich.	269
Argentofigras.	422

B	
Bacchoder, & Bachmang.	270
Bachpunghe.	1090
Bacillen.	767
Balsamkraut.	673
Balsamung.	672
Balsigram.	679
Basilien.	ibid.
Baummol.	221
Baumfarn.	1229
Baurnenfiff, aut Baurenenfiff.	661
Baurntreß, aut Branttreß.	ibid.
Barabnaga.	1346
Bech.	74
Beetlap.	1325
Bellere, aut Bellen.	86
Beerwurtz.	718
Berfuß, aut Beyfuß.	949
Bernisten.	67
Bernkraut.	1443
Betram.	1170
Bettlersenf.	1056
Beynholglin, aut Weinwel.	252
Bibernel.	782
Biesloot.	1544
Bilsamkraut.	1716
Bingen.	983
Bingen helmer.	416
Birckenbaum.	92
Wifem.	1716
Wifmijg.	1629
Witterwurg.	1128
Wlaterkrant.	1028
Wlaw gügen.	1609
Wlawwiedelens, aut Wlaw violen.	824

Wlawwollkern.	826
Wlaw schwertel.	1609
Wlicfen.	395
Wlaw wolffswurg.	1745
Wlatwurg.	1278
Wocksbart.	1078
Wuch weidt.	383
Wonen.	451
Worrefcht.	578

Wramen.	119
Wrant.	418
Wrantlattich.	1050
Wrambetonik.	1282
Wramfleichblumen.	419
Wramrodel.	1074
Wrammella.	1310
Wramwurg.	1085
Wremen.	119
Wrinthunigen.	272
Wromber.	119
Wuchwurg.	1251
Wranling.	1512
Wramentroß.	658
Wrammenlechekrant, aut Wrammen leberkrant.	1083
Wrafch.	242
Wrafchbeerlin.	356
Wrafchwurg.	724
Wraynettelens.	969
Wubenftrel.	1447
Wuckweyolt.	383
Wuchbaum.	34
Wuche.	ibid.
Wargelkrant.	550
Wurbaum.	165
Wyrbaum.	306
Wyre.	402
Wypren, & Wyr.	306
Wyfenkraut, aut Wifentkraut.	1181

C	
Campfer.	1783
Canariensack.	415
Castant, aut Castanienbaum.	31
Casteng.	886
Chamill & Chamillen.	1344
Chermefin.	28
Chirfchen.	309
Chriftwurg.	1636
Citrinoeffel.	298
Citronaten.	ibid.
Coloquint.	1675
Coraln.	1374
Cornelbaum.	329
Cornelcin.	ibid.
Creagbaum.	1630
Creefteruyt.	1349
Cren.	534
Creagblumen.	1565
Creagwurg.	574
Cucamern.	619
Cypreffen.	57
gurten Cyprey.	937

D	
Dannenschwan.	1703
Dattelbaum.	362
Deschelkrant.	1097
Des heiligen geifts wurg.	724
Deymet.	672
Diclem.	329
Dinkelkern, aut Dinkel.	384
Dolkrant.	1721. 1727

Dollopffel.	626
Dolwurg.	1721. 1737
Donderbar.	1128
Dondernegele.	808
Dort.	404
Drachenwurg.	1618
Drinkelkern, aut Dinkel.	394
Durchwachß.	1321
Eyllen.	691

E	
Elckolen.	1041
Elckelkrant.	1062
Eibenbaum.	78
Eichbaum.	2
Eichenniffel.	17
Eickenfarn.	1227
Emblat.	1260
Eingattang.	20
Entorn.	395
Eifenkrant.	1334
Eifenhart.	ibid.
Ellerbaum.	96
Endiuin.	554
Engelfuß.	1229
Eniß.	692
Entzian.	1258
Epfich.	701
Ephenn.	1415
Eppich.	701
Eraltbeer.	613
Kranttrauch.	1291
Erbb.	449
Erofeighen.	1588
Eropftimmen.	173. 176
Erdwurg.	1604
Eronaß.	1588
Erenbreißweiblin, aut Ehyrenpreiß.	1050
Erenbreiß.	1318
Erica.	185
Ertenbaum.	96
Ernen.	468
Eruoerffen.	465
Efchbaum.	82
Efchern.	82
Efelz cucamern.	1672
Eybenbaum.	24
Eychoeppel.	15

F	
Faulbaum.	97. 197
Faulbeerbaum.	ibid.
Faulholz.	ibid.
Feighonen.	466
Feighen.	335
Feighenbaum.	ibid.
Feigwartzen, aut Feigwartzenkrant.	1048
Felbinger.	274
Feldßweibel.	1503
Feldmorem.	782
Fenchel.	688
Feldandorn.	963
Feldtnege	

GERMANICVS.

[illegible]

INDEX HISTORIAE PLANTARVM,

Dayet.	538	Flaumenboen.	313	S. Johans Pfersich.	293
Dayfomen.	1707	Flür.	172	S. Johans treublin, oder beerlin.	
Deerhitzg.	1176	Flüymmen.	ibid.	132	
Deergwibel.	1575	Fließen.	531	Sanctus Peters schluffel.	833
Deintraut.	1048	Flimpernuffel.	102	Samulter.	1268
Delangant.	626	Flöley.	890	Sant Christo ffelskran.	479
Deltram.	953	Flomerangen.	301	Santpeters Korn.	395
Dengelwurzg.	602	Flonfelbeel.	157	Saurach.	137
Densforlin.	1098	Floppelbaum.	86	Saurampffer.	605
Dernieff.	1367	Floppelweiden.	ibid.	Saurercker.	1354
Derretich.	636	Florff.	179	Saurkraut.	1007
Dergenuiolen	797	Flraumen.	313	Scaffirpp.	768
Deydenbaum.	274	Flaffenblat.	564	Scarlachber.	27
Deyenblumie.	838	Flifferting.	1586	Schaffbeere.	1721. 1727
Deyenriff.	ibid.	Flilientkraut.	1172	Schaffs mullem.	280
Deyeron, & Deygram.	881	Flynholg.	43	Schalach.	28
Dilchtraut.	487	Flpyren.	306	Scharlach.	965
Dilten.	535			Schechwurg.	1249
Diglkraut.	1221	Q. Ederel.	902	Schirling.	788
Dürthen.	1755	Q. Quitten.	290	Schlangenkraut.	1601
Düffel.	17	Q. Quittenbaum.	ibid.	Schlehen.	130
Düffelwindt.	1424	Q. Quittenoppffel.	ibid.	Schlekraut.	1249
Dolken.	535			Schlingbaum.	256
Donkraut.	1313	R. Äden.	438	Schmalgblum.	875
Dooß.	1323	R. Rapinctzeln.	641	Schmerwurg.	1074
Dofchat nuff.	1760	R. Rappenblumen.	1745	Schwalbenwurg.	1144
Dooß.	994	R. Rauchoppffel.	628	Schwarz hirtwurg.	764
Dottenblumen.	779	R. Raute.	972	Schwarz Rommich, & Schwarz	
Duckenkraut.	1038	R. Reinfarn.	955	Funel.	812
Duncks cappen.	1745	R. Rettich.	634	Schwarz windt.	1424
Dundholg.	252	R. Keyßeln.	1586	Schweinfiod.	542
Duotterkraut.	953	R. Rhenblumen.	779	Schweinfenchelg.	745
Dut villen.	808	R. Rheinweiden.	252	Schwenbrot.	1604
Dung.	671	R. Rheiß.	407	Schwetel.	1620
		R. Rhenifchguandel.	899	Schenbaum.	182
N. Nächtschadt.	596	R. Rhurkraut.	1115	Schwarz Andorn.	1252
N. Naegel.	1758	R. Rieghenderdorn.	963	Senff & Senff.	645
N. Narenkolben.	994	R. Ringelblumen.	811	Senet.	217
N. Natterwurg.	1282	R. Ringelkraut.	1616	Senkraut.	1721
N. Natterzanglin.	1047	R. Rifinholg.	80	Seufenchel.	745
N. Negelblumen.	806	R. Ritterforn.	698	Seutod.	542
N. Nefpel.	332	R. Roßen.	396	Sibengezeil.	506
N. Nefpelbaum.	ibid.	R. Roßelen.	649	Sigmars.	593
N. Neffel.	1243	R. Roßette.	ibid.	Sondan.	1212
N. Nidererholder.	269	R. Roemfcheterwe.	393	Somewende wolffmell.	1648
N. Nigellkraut.	1098	R. Rosambaum.	125	Sorgfamen.	411
N. Nuffen, Nuff.	320	R. Roßen.	124	Spargen.	609
		R. Refenwurg.	981	Speckgülen.	1427
O. Chfembrech.	447	R. Rosmarin.	763	Spelg.	384
O. Oedermenig.	1251	R. Roßhuob.	1050	Spenschaet.	415
O. Oelbaum.	342	R. Roßmurg.	673	Sperbieren.	330
O. Oepffel.	285	R. Roßfchwang.	1069	Spererling.	ibid.
O. Olander.	244	R. Roßmarin.	967	Sperwerbaum.	ibid.
O. Olinebaum.	342	R. Rotbustbeerle.	356	Spicaut.	1221
O. Orant.	1339	R. Rotermangolt.	531	Spindelbaum.	272
O. Osterlucy.	976	R. Roßweilwurg.	1267	Spinet, vel Spinnat.	543
		R. Roßfeinbrech.	782	Spigletten.	1056
P. Antoffelholg.	22	R. Rottosten.	886	Sporoeppfel.	330
P. Pappel.	584	R. Rotzentreuble.	1128. 1130	Sprinkelkraut.	1205
P. Pasteney, & Pastnachten.	718	R. Roynetle.	1080	Sprinkkraut.	1657
P. Peonienblum.	855	R. Raebem.	639	Stabwurg.	937
P. Patschkraut.	1040	R. Ruprechtkraut.	1278	Stalkraut.	447
P. Pestileng wurg.	1053	R. Rychel.	1347	Stechend buint.	1421
P. Peterlin, & Peterfilien.	700			Stechende Binsf.	173
P. Pafenboedlin.	1048	S. Affran.	1531	Stechepchen.	20
P. Paffen pint.	1596	S. Salbaum.	86	Stechoppffel.	618
P. Pfeffer.	1807	S. Salbey.	879	Stechtruben.	644
P. Pfefferkraut, aut Pfeffer kraut.	666	S. Samatblum.	870	Steinlinde.	89
P. Pfenich.	411	S. gros Sanikel.	1281	Steintrauten.	1213
P. Pfenigkraut.	1062	S. Barbara kraut.	650	Steinsomen.	1176
P. Pfersichbaum.	293	S. Jacobs Blum.	575	Stendekwurg.	1555
P. Pfersing.	ibid.	S. Joans brot.	112	Steyneschen.	82
P. Pflaumen.	313	S. Joans Burtel.	949	Sticakraut.	917

GERMANICVS, ET BELGICVS.

Stuckwurg.	1409	Uaasser andorn.	1064	Uvilden Saleguen.	991
Storkenschnabole.	1275	Uaasser Batenig.	909	Uvildengarten saffran.	1449
Streich.	174	Uaasser linsen.	1014	Uvilder balsam.	673
Stein Streublumen.	176	Uaasserfarnung.	676	Uvilderbertram.	1168
Sueßholz.	147	Uaasserpeffter.	1038	Uvildercoffel.	758
Synaw.	1281	Uaasser wegrich.	1056	Uvilder cucumert.	1672
		Uaatter Betony.	1356	Uvildergalgam.	991
T Ag und nacht.	1241	Uaatter Earm.	1225	Uvilder kreß.	659
Tamariskten.	179	Uaungentkraut.	955	Uvilderröt.	1211
Tanberfuß.	1176	Uauekärten.	1447	Uvilde wicrem.	479
Klein Tanfend.	1286	Uauegendornbeer.	145	Uvildochsenjungen.	1104
Taubnessel.	1246	Uaegraß.	1123	Uvildofingekraut.	1628
Tausentblatt.	768	Uaucken.	478	Uvildolauch.	1543
Tausent Korn.	1328	Uaelden.	274	Uvildouneureb.	1406
Teitlofen.	1570	Uaenrauten.	972	Uvillsbeer, aut wolfsbeer.	1737
Teufelmilch.	1658	Uaetrauch.	1752	Uvilkraut, aut Uvulkraut.	1298
Teuffel abbij.	1066	Uaefentkeel.	1444	Uvindenkraut.	1421, 1423
Thamen baum.	49	Uaefinsießwurg.	1631	Kleyn Uvindenkraut.	1424
Thannem & Thannembaum.	53	Uaeiß Andorn.	960	Uvintergruen.	841
Thierlinbaum.	329	Uaeiß distel.	1465	Uvinterviolen.	804
Thym.	899	Uaeiß garten distel.	ibid.	Uvingleuch.	1544
Tinkel.	384	Uaeiß Hilgen.	1491	Uvoffbeer.	1312
Todtnessel.	1246	Uaeißhirzwurg.	765	Uvoffsmilch.	1642
Tormentil.	1267	Uaeißhimelschlüssel.	833	Uvollschnuß, aut welschnuß.	320
Tournesol.	1349, & 1352	Uaeiß hornunge blumen.	1526	Uvundkraut.	1315
Trubentkraut.	952	Uaeiß wege distel.	1445	Uvurnkraut.	955
Tunach.	416	Uaeißwurg.	1623	Uurgetin.	788
		Uaekureb.	1401	Uufterepffich.	1091
V Zielwurg.	1609	Uaekholz.	66	Uuyffentker.	1353
Vergifmynnicht.	1160	Uaekbaonen.	473	Uuyßail.	801
Vernsten.	67	Uaekche wyffen.	393		
Versich.	137	Uaeklinfen.	215	Y Elenger yelieber.	1159, 1160
Almen.	80	Uaeksch Bimpenußlin.	360	Yngrien.	832
Anderbaum.	1630	Uaekschediffel.	1481	Ylope.	933
Anser frauwenmurg.	672	Uaekschkirschen.	329		
Aogelkraut.	1232	Uaekschnußbaum.	310	Z Amer Kanß.	496
Aogellen.	17	Uaekfomen.	1146	Zangarten distel.	1465
Aogemuth.	886	Uaekermol.	941	Zeidelpaff.	210
Aualdoiffel.	147	Uaekermel.	940	Zeilaud.	ibid.
Aualdiblam.	1358	Uaeketrich.	788	Zepffierkraut.	205
Aualdmangolt.	841	Uaekoyt.	499	Zimmet, seu Zimmet roeglin.	1796
Aualdreben.	1407	Uaekyffen.	371	Zimmet Roetim.	113
Aualendiffel.	1472	Uaekyffenklee.	503	Zunibel.	1536
Aualstraoc.	1088	Uvildobalorian.	1041	Zuyblat.	1260
Aualwurg.	1074	Uvildokurbß.	1675		
Auandteufkraut.	1621	Uvildonargenroeglin.	815		

FINIS INDICIS
GERMANICI.

INDEX BELGICVS.

A Arangie appel.	302	B Baspeldoren.	164	Z Zaarusboom.	351
B Betropfen.	1127	Beellisch.	1618	Zepelkrayt.	1320
Blauwoylwortele.	1745	Beelratelen.	1073	Zinden.	89
Boxbonen.	1019	Bedders Roosen.	279		
		Beneuerboom.	66	D Dilgheboom.	274
C Christus ooghen.	815	D Dadick.	269	Doerbessenboom.	315
Citroemen.	298	Doenderbeet.	1239	Donothout.	252
Cornolieboom.	329	Doendererne.	1239	Dayse Koren.	416
Cracyenbloemkens.	809	Doylichkerstrayt.	1636		
Crof.	479	Deyden.	185	H Hoeten.	320
Croonkens cruyt.	1648	Dulst.	147	Hottelaere.	310
D Dayeboom.	362	J Jonettekens.	815	O Ockernoetenboom.	320
Dotterbloemen.	1013, 1049, 1052	K Keelerayt.	252	Olmbloom.	80
Draulich.	404	Kemp.	496	Olueboom.	342
		Kepkens.	808		
E Egelfoelen.	1035	Koolen.	518	P Palmeboom.	165
Eichen.	82	Krieken.	309	Papagalli.	540
Figuenboom.	335			Percintinkbloemen.	805
				Peere.	306
				Pinap.	

INDEX BOEMICVS, ET ANGLICVS.

Phappelboom.	43	Roomſcheiſtel.	1481	Piercruyt.	1636
Playmfens.	808	S		U	
Prunboom.	313	Saueboom.	182	Uitwaterend.	758
		Sclardep.	965	Uwaterlyſch.	988. & 1018
Queperreboom.	290	Steenruyte.	1213	Uvelot. & Uvoit. & Uvoit.	
R		T		499	
Rietgras.	1018	Terwe.	371	FINIS INDICIS	
Rogghje.	396	Thunisbloemen.	839	BELGIC.	

INDEX BOEMICVS.

[illegible]

INDEX ANGLICVS.

A	Zmonatree.	316	B	Figgetree.	315	D	Oetes.	403
	Appel.	285		Hafeltree.	319		Olinetree.	342
	Aſhetree.	82		Bauer.	403		Orengetree.	302
	Aſp, or Poplertree.	86		Bech.	185	P	Pear.	306
				Blimp, & Bemp.	496		Piſhetree.	49
	Barberis.	137		Bloly.	147		Piſtaſkes & Fiſtiſkes.	360
	Blodtounort.	269	T				Plumtree.	313
	Bramblebush.	119		Junipetree.	66		Pomaranat tree.	303
	Burs.	165	K				Potades.	1909
				Keale.	518		Pryuet.	252
C	Cheriff.	309		Kuchull & Kuchulme.	242		Pynnetree.	43
	Croire.	298	X			Q		
	Cucur.	503		Laureorbay tree.	351		Quintetra.	290
	Cole.	518		Limontree.	301	R	Riſt.	407
	Corneltree.	319		Linden tree.	89	S	Sauintree.	182
	Cypres.	57	O			T		
				Maluourt.	269	U	Tarpentine tree.	61
D	Daets tree.	362		Maſſietree.	63		Ualnuttree.	320
	Deede.	53		Maſſitree.	53		Ueet	371
E				Medeler.	332		Uode & Uuane.	102
	Elmtree.	80		Mederte.	ibid.			
	Etes.	403		Medilote.	511			
F				Mulbertytree.	325			
	Fiſhe.	478						

FINIS INDICIS ANGLICI.



APPENDIX HISTORIÆ GENERALIS PLANTARVM: CONTINENS

IMAGINES QVARVMDAM RARIORVM,

& paucis cognitarum, quæ è longinquis
regionibus missæ fuerunt.



G. R. L E C T O R I.

QUVM iam hac Plantarum generalis historia excusa propemodum tota esset, hinc inde alie quadam raræ & paucissimis notæ, vel earum imagines, missæ ad me fuerunt: quas nullo modo ante, quamvis nulli nec labori nec sumptui parcens, nancisci potueram. Huius etiam boni quum te participem facere in hac ipsa editione, potius quàm alij reservare vellem (etiamsi hoc plerique mihi suaderent, ut isti mora longior non afferretur) eas quoque plantas, quàm fidelissimè & exactissimè fieri potuit expressas, in hanc Appendicem redegi: quum in sua quæque classe locum una cum ceteris habere non possent, utpote iam excusis. Quamobrem non est quòd dubites quin omnium plantarum, siue stirpium (id est, herbarum, arborum, & aliorum quæ illis nominibus comprehenduntur) veras iconas liber hic tibi sit exhibiturus: non solum quarum ab ullo scriptore facta mentio fuit, sed & quarum insuper notitia ad plurimos, qui diversas regiones incolunt, pervenire potuit: quum antea incognita fuissent. Si quæ tamen præter has omnes in manus meas venerint, ne iis quidem te privabo, simulque sumptu te non grauabo. Neque enim eas in alia totius operis editione, sed seorsum in secunda Appendice tibi dare decreui.

DE CANELLA.



CANELLÆ arbor mali aureæ amplitudine est, nonnunquam maior, interdum minor, ramosa admodum, cuius teneriores rami recti sunt: folium Laurino simile, latius tamen, colore dilutius, & minus siccum, tribus nervis insignitum: flos candidus, odoris propemodum expers: fructus silvestris oleæ baccis par, virefcens initio, deinde rufescens, & ubi plenam maturitatem consecutus est, niger atque splendescens (quo tempore colligi

Forma.

Tempus.

debet) osciculum intus continens silvestribus oliivis simile, similique carne præditus, ex qua exstillat oleaginosus quidam liquor subvirefcens, odore baccarum Lauri, sapore acri cum pauxillo amarore coniuncto. Præditus verò est hic fructus sessili parte parvo calyce, læuiore minúsque crispo quàm sint ilicis calyces.

A A A a

CANELLA *A Costa.*

Locus.

Vires.



Harum arborum magna est frequentia in siluis prouinciæ Malabar: sed præstantia & odore longè sunt inferiores iis quæ in Zeylan insula nascuntur. Stillatitius Canellæ liquor vitreis aut plumbeis organis extractus is præfertur, qui è viridi cortice, præsertim radicem, minutim inciso eductus est: etenim non modò corroborat & stomachi imbecillitatem, colivæ dolores ex frigida causâ prouenientes lenit: sed vrinam cit, & oris anhelitum commendat: utilis est præterea iecoris, splenis, cerebri & neruorum agritudinibus, atque in syncope cardiacisque affectibus confert: venenis resistit & virulentorum animalium moribus, menses mouet, & vteri affectibus prodest, vomitiones cohibet, & appetentiam excitat: valet item ad spasmos, & comitiales morbos: atque vt summatim dicam, aperit, incidit, digerit, calefacit & corroborat. Elicitur etiam liquor ex Canellæ floribus, sed longè minore quantitate, minúsque præstans superiore.

D E M A C E R E.

Locus.

Forma.



ASCITVR quibusdam Orientalibus insulis, præsertim verò in prouincia Malabar, in insula S. Crucis regni Cochīn, tum in ripis fluminis Mangate & apud Cranganor vasta quædam, & multis ramis prædita arbor Vlmo multò maior, cuius folia in longitudinem sex aut septem vncias longa sunt, duas lata, exteriore parte dilutius virentia, interiori saturata. Ea non alium florem, non alium fructum habere creditur præter semen quoddam denarij magnitudine, tenue, cordis effigie, colore flauo, sapore verò amygdalæ, aut nuclei persicorum malorum, tenui & candida tunica tectum, quod vesica quadam ex tenuissimis duabus simul iunctis & transparentibus membranis constante includitur: ea autem vesica in medio folio nascitur aliis magnitudine non dissimili, sed cuspidè obtusiore, & circa pediculum angustiore, colore medio inter rubrū & fuluū, inæquali, & multis fibris à pediculo ad extremitatem recta linea ductis, crispo & rugoso, haud absimilis illi quæ in Vlmo nascitur, paulò tamen latior & planior. Succo lacteo prædita est hæc arbor vtj Morus, radicésq; habet Illici persimiles, magnas, crassas, in larum & profundum diffusas & cortice tectas crasso, aspero, scabro, duròque, cinereo foris colore, interius albo & lacteo succo prægnante dum recens est, flauescente autem dum sicca est, & admodum adstringente: & licet succus ille cum adstrictione non nihil mordicet, breui tamen euanescit hæc veluti insensibilis mordicatio. Arenosa & humida loca amat, & reliquas ferè plantas circūnascens enecat. Nomen vulgare huius arboris apud Lusitanos est *Arbore de las camaras*, & *Arbore sancto*, hoc est, Arbor dysentericæ, & Arbor sancta: ab indigenis Christianis *Arbore de sancto Thome*, id est arbor D. Thomæ, & *Macruyre*: à Medicis Brachmenis *Macre*, apud quos summo in pretio est arboris cortex. Radicis cortice recēti trito, & cum oxygala seu lacte acido mixto, omnis generis dysenterias & alui profluvia mirabili successu curant omnes Medici, cum Brachmenes tum Canarini & Malabarici. Aliqui huius corticis sicci &

Nomina

Tèperam.

Vires.

in

in puluerem redacti semunciam per noctem macerant in quatuor vnciis feri lactis, eumque bis in die propinant manè & vesperti, deinde medicamento sumpto orizam sine sale & butyro coctam, atque pullos gallinatos coctos, maceratos & tritos in orizæ decoctione statim ægro exhibent: interdum si necessitas urgeat, opium admiscunt roborandi medicamenti causa: solent verò etiam Arabes cuiuscunque generis alui profluvia opio nuce moschata admixta curare. Huius item radi-

MACER A Costa.



cis usus salutaris creditur ad vomitus cōpescendos, & ventriculū roborandū cum aqua Menthæ & maltices puluere. Rogatus Brachmenes quidam medicus mihi familiaris, virque probus, boni iudicij & magnæ existimationis apud omnes ciuitatis S. Crucis regni Cochin incolas cum gentiles tum Lusitanos, quod illius fideli opera sæpius usi essent, ut bona fide exponeret istius corticis quem *Macre* vocant facultates, in hæc verba respondit: Sivos Lusitani hunc corticem probè nosseris, multò pluris illum faceretis quàm Piper: Sed quoniam istic in Lusitania eius facultates ignoratis, idcirco contemnitis. Puluis quem in omnis generis alui profluvio ex oxygala propinare soleo, ex hoc cortice de quo percontaris conflatus est. Eius magnam quantitatem tibi ostendere domi possem, quam in Bengala & Iapan sum misurus. Sine verò inutile medicamentum, tu ipse qui illius effectus plerumque conspexisti, iudicare potes. Hunc corticem etiam ostendi rhizotomo cuidam *loque* (genus quoddam hominum est cir-

cumforaneorum qui peregrinando pœnitentiam agere sese profitentur in illis regionibus) petiique ut quid esset (tamen si probè nossem) significaret: respondit ille, eum sequerer, cuius arboris cortex esset se demonstraturum, ostenditque arborem quam antè scieram & addidit, Apud nostros homines appellatur *Cura sancta macre mistusa garul*, hoc est, Macre ab Angelis ostensum hominibus ad ipsorum salutem. Subiunxit insuper istius corticis apud ipsos usum esse in compescendis vomitibus, aluique profluvii sistendis, plūsque pollere huius radices portiunculam, quàm magnam quantitatem corticis Myrobalanorum aut Arecæ, eamque præstantiorem esse Cori Malabarico de quo proximè dicemus. Referebat præterea Macre fructum omnis generis lumbricos in humano corpore natos necare & expellere, & calculum in renibus frangere: tum etiam eos qui singulis diebus manè eo vterentur, liberos fore à calculo & à coli doloribus, nec inebrari posse. Magna disceptatio est inter Neotericos, an Græci Macin & Arabes Macerem nouerint. Negari non potest quin multo plura medicamenta nunc nouerimus quàm veteres: inficiari etiam non possumus, pleraque illis cognita fuisse, de quibus dubitamus. Nam certissimum est, Græcis probè norum fuisse Macer de quo dubitamus, & quod plerique adhuc ignorant: nesciuisse autem Macim & nucem moschatam nobis adprimè nota, ut ex eorum scriptis constat. Galenus simplicium lib. septimo Macerem aduehi ait ex India, constare essentia pleraque frigida & terrestri, paucula verò frigida: conferre sua adstrictione aduersus dysenterias & cruentas excreationes. Dioscorides verò, Macer qui ex Barbaria aduehitur, est cortex flauescens, crassus, & gustu perquam adstringens, qui contra cruentas excreationes

Dios. lib. 1.
cap. 94.

Plin. li. 12.
cap. 8.

bibitur, dysenterias & alui fluxiones. Quæ facultates inueniuntur in cortice nuci descriptæ arboris, non in Maci odorato nucis moschatæ operculo, quod calidius siccumque est in fine secundi gradus, aut initio tertij, tenuiûmque partium & leuissimi amaroris, pauculeq; adstrictionis particeps: itaque certum est vtrumque loqui de cortice nostræ arboris, non de Maci quod illis ignotum fuit. Admonuit me præterea medicus quidam Regis Cochîn, ne dubitarem quin hic cortex Auicennæ Macer esset: magnæque inscitia esse de re tam aperta disceptare: huius etenim *Macer* facultates, eis, quas suo Maceri veteres tribuunt, persimiles, facile id demonstrare. Plinius etiam Macer, inquit, ex India aduehitur, cortex rubescens radicis magnæ, nomine arboris suæ. Minimè verò nos mouere debet quòd Dioscorides ex Barbaria Macerem aduehi asserat, quem Plinius & Galenus ex India deferri scribunt: idem enim illis accidisse potest in hoc medicamento, quod in Cinnamomo & Calsia, vt (quoniam ex peregrinis & longinquis regionibus ad eos adueherentur) eorum natales non fuerint probè cogniti. Ait tamen Ptolemæus: Quædam in Indo fluuiio insula vel vrbs sita est, quæ Barbaria dicitur, ex qua facile comportabatur Macer: vel quòd afferretur ex Arabia eo maris sinu qui à Barbaria insula Barbaricus appellatur. Cui suffragatur Strabo, Omnia, inquit, quæ in India proueniunt, ea scilicet parte, quæ ad Austrum vergit, similiter in Arabia nascuntur. Macis & Maceris differentia Auicennæ probè fuit cognita, quippe qui Macim odoratæ nucis inuolucrum cap. 436. & Macerem radicis corticem capit. 694. sub titulo Talisfar descripsit. Non igitur etiam fuit Serapioni, qui ex auctoritate Isach, Macim esse nucis odoratæ operimentum dixit, diuersum ab eo cuius Dioscorides meminit, quippe qui scriptum reliquerit, Macerem esse ligni corticem siue corium. Liquet itaque Macim & Macerem differre inter se qualitate, substantia, figura, planta & regione, quandoquidem Macer radicum arboris cortex in Malabar nascitur: Macis verò nucis Moschatæ operimentum, in Banda, longissimè inter se disitis. Tamen Monachi qui in Mesuen commentarios scripserunt, asserant non differre, suam negligentiam ista ratione prodentes. Vulgaris admodum huius corticis Maceris est vsus in omnibus nosocomijs provinciarum Chinæ, Iapan, Malacæ & Bengala, in dysenteriis, alui profluiis, & sanguinis reiectionibus, cuius causâ ex Malabar vsque petunt.

DE NUCE MOSCATA.

Locus.



N insula Banda nascitur arbor quæ Nucem moschatam fert, colligiturque ad externos solitam. Alunt & quasdam generis eius arbores Moluccæ, & Zeilan insulæ, verum humiles, fructuque tam paucos & pusillo vt nihili sit. Bandenses Pala vocant, Macin verò à Macere diuersum, Buna Pala: Decanenenses Iapatri, *Macin Iayfol*: Arabes *Seygar*, & *Iauziband*, id est, Nucem Bandensem, Macim vero *Thalisphar bibese*, vel *Besbaça*, id est Nucis corticem: Persæ arborem ipsam, *Drach*: Turcæ, *Agache*: oleum Macerinum Arabes *Geuzisami*, Turcæ *Geuziat*: Persæ, *Geuzi erugaant*. Assurgit in Pyri vel Persicæ magnitudinem hæc arbor, rotundiore folio quam Pyri, in extremo acuto: fructu Pyris simili, aliquanto rotundiore: cortice foris cornoso, subduro, quem pro nihilo ducunt Bandenses, tamen quidam eo vescantur ob astringentis saporis incunditatem, condito sale & aceto, Lusitani verò Nucem adhuc immaturam integram condiunt saccharo. Nuce iam matura cortex ille carnosus ac externus in multas partes dehiscit, ac tum sub eo videtur Macis, colore perquam eleganti rubescens: acuti odoris, ac saporis, membrana reticulatim

Nomina

textæ,

NUX MOSCATA,

A Costa.



textâ, interioris Nucis proximè calycem ambiens, & sic agglutinata, vt tubercula in solido Nucis putamine elata repræsentet. Macis color à ficcata & purgata Nuce reuulsi, minus ruber, quam in ipsâ prius arbore. Abditur Maci Nucis interioris putamen, quo rupto Nux detegitur, nunc amplior, nunc otrigola, quam recentem si dispartiantur, apparet intus candida medulla, languidioris acrimoniæ, quam Nucis reliquum corpus. Vertitur autem spatio temporis in Nucem ea medulla, & eadem cum Nuce fit. Grandiores India longe pluris facit quam nos, & charius emit. Ex hac Nuce paratur oleum Brachmanibus, & Indorum medicis valde laudatum, ad vteri & neruorum frigidos morbos, quemadmodum & ex Maci. Eligenda Nux moschata recens, grauis, pinguis, humore plena, minime pertusa. Emendat illa & tollit fœtorem anhelitus: visum acuit: roborat ventriculum, & hepar: adiuuat cibi coctionem: flatus dissipat: aluum cohibet: vrinam prouocat: maculas faciei delet: vteri morbis prodest: splenis duros tumores lenit, & emollit, itémque hepatis: impetigini medetur.

Vires.

CARYOPHYLLUS, A COSTÆ.



ARBOR Caryophyllos proferens *Forma.* magnitudine & forma Lauri est, sed superiore parte magis ramosa, minore & angustiore folio: copiosos fert flores, initio candidos, deinde virides, cum nunc in fructum efformati sunt, at vbi maturuerunt, rubros, qui deinde collecti & siccati nigrum colorem contrahunt: nascuntur ficus modo sparsim per ramos ad foliorum basim bini, terni aut quaterni simul iuncti, vel vnici interdum. Dicitur Arabibus, Persis & Turcis *Caranful*, ipsa arbor *Siger*, foliū *Varaqua*. Paulus Ægineta acres illos constituit, calidos & siccos ordine tertio: alij duntaxat secundo. Ventriculum, iecur & cor roborant, concoctionem iuuant, vrinas cient, aluum cohibent, oculis instillati eorum aciem exacuunt, nubescq; extergunt: & quatuor drachmarum pondere ex lacte sumpti venerem extimulant.

Nomina

Vires.

DE PIPERE.


Genera.

Forma.

PIPER aliud domesticum, cuius vsus est, aliud siluestre, quod ob amarorem negligitur. Domestici planta sarmentosa est, scanditque hederæ modo, arboribus quas nancisci potest sese circumuoluendo: nodis per intervalla prædita, ad quos folia nascuntur Betele foliis similia, parte interiore saturè virentia, exteriori dilutiora, cuspidè mucronata, & gustu linguam vellicante. Horum foliorum alia aliis nigriora sunt: quæ dilu-

TIPER NIGRVM,

A Costa.

Temper.
& Vires.

tiora sunt fibræque æqualiter nascentes habent, feminas censent (nam vtrumque sexum in foliis eiusdem plantæ constituunt) nigriora verò, inæqualibus fibris, mares. Ad singula internodia, vnde folia dependent, ex ipsa foliorum sede nascuntur vix, quarum maximæ circiter quinquaginta grana obtinent, minores verò triginta. Radix pusilla est, & summa tellure fibras agit. Summa autem similitudo est plantarum quæ nigrum Piper proferunt & album: albi tamen folia tenuiora & molliora videntur: eius etiam fructus magis aromaticus, meliorisque saporis quàm nigri. Huius verò foliorum nullus est vsus apud eius regionis incolæ: sed nigri Piperis folia duntaxat expetuntur in coli doloribus, aliisque omnibus alui agritudinibus è frigida causa provenientibus: ea oleo Cocci siue Nucis Indicæ prius inuncta, deinde calefacta supra aluum adhibentur magno effectu. Porro feritur Piperis planta hoc modo: sarmentum eius seu ramus iuxta prægrandem qualemcumque arborem aut palum defoditur, atque bubulcum sterces & cineres cum aqua insperguntur: infra annum deinde fructifera est, quòque ve-

tustior est planta, eò feracior, quippe quæ ad ipsius arboris, cui maritata est, fastigium sese circumuoluendo scandere soleat.


DE AVELLANA INDICA.

Forma.



AMODVM procera est hæc arbor rectaque, tenuis, rotunda, & fungosa materia: folia habet longiora latioraque quàm Palma quæ Cocco seu Indicæ Nuces fert, ex summa arbore nascentia, inter quæ prodeunt tenues virgæ parvis floribus onustæ, albis & ferè inodoris, quæ deinde in fructum *Areca* nuncupatum efformantur, Nucis iuglandis magnitudine, minimè tamen rotundum, sed oblongum oui gallinacii exigui modo, exteriori cortice admodum virente, dum recens est, & vbi maturuit, admodum flauo, vt longè spectantibus veluti dactyli siue palmulæ maturæ appareant: materia molli & tomentosa constat hic cortex, continetque inclusum fructum Castanæ grandioris magnitudine, altera parte similiter sessilem, candidum, durum, rubris venis plenum, quem incolæ edunt. Eum adhuc virentem sub are

AVELLANA INDICA,
A Costa.



sub arena condere solent, ut melior graviorque
esui fiat: vulgo autem edunt cum foliis *Betele*:
confringunt etiam, folique exponunt & siccant,
(tum *Checeni* appellant) eoque plurimum utun-
tur tum in cibo, tum in lotionibus adstringen-
tibus: & cortice, seu inuolucro dentes repur-
gant. Cum vero adeo fungosa huius arboris sit
materia, frangitur difficulter: idcirco virga
duorum digitorum crassitudine ex hac arbore
parata Crocodilum cum in aqua, tum in terra
facile retinere potest, si per eius fauces tran-
smittatur (ea etenim ratione illos venari solent,
ut saepe conspexi.

Vfus.

DE PALMA INDICA,
qua & Elephantis.



RAEALTA est haec arbor, & recta, *Forma.*
nec admodum crassa, praesertim in
fastigio: nam ab infimo ad sum-
mum paulatim gracilescit, & colo-
re cinereo est: truncum à radicibus ad fastigium
usque parvis quasi gradibus circumdant, qui

ascensuris scalarum vicem praebent: flos Castaneae similis: fructus vero integer
capite humano maior, forma oblongiore, triangulari, & colore viridi admodum
diluto. Tametsi *Narel* huius arboris nucem vulgo appellant cum *Perla* tum
Arabes, negant tamen *Perla* legitimum esse nomen sed *Nargel* dicendum: ipsam
arborem *Darach* *Perla* vocant, Arabes *Siger Indi*, Turci autem arborem *Agach*,
fructum *Cox Indi*: Brachmaenes arborem nuncupant *Maro*, nucem *Naralu*.

Nomina

Ex hac arbore ex insulis de Nalediua fabricantur naues, atque clavis, malis, velis,
rudentibus aliisque armamentis necessariis instruuntur: instructa iam, mercibus
ex eadem arbore conflatis onerantur, oleo, vino, aceto, saccharo nigro, fructibus
aqua, & ardente aqua vulgo vocata. Ex eadem arbore extruuntur ades cum suis
tabulatis satis firmæ: atque eiusdem ramis, (quos *Ola* dicunt) contegunt imbric-
um vice, nam imbres commodè arcent. Ex iisdem ramis tecta comparant ad
regendas hieme naues, quæ in portum deductæ, remulco deinde in terram tra-
huntur. Istarum porro Palmarum duo genera constituunt: Vnum enim *Suræ*

Vfus.

cogendæ gratia deligunt, ea est veluti vinum mustum, quæ ignibus decocta in
licorem transit vino similem, incolis *Orraca* appellatum, alterum fructuum geren-
dorum causa adseruant. Colligitur verò *Sura* in hunc modum: Aliquem e ramis
cerebro viciniorum præcidunt, duorum pedum longitudinem relinquentes, ad
quem vascula ampla, oris tamen angustî, illis *Caloins* nuncupata, colligant: per
hunc rami præcisum exstillat arbor *Suram* iam memoratam, qua organâ distil-
latoriis imposita, ignis vi aquam eliciunt ardentem, purior, illis *Fula* dicta, hoc
est, flos, facilius igne incenditur quàm nostra aqua ardens, siue vinum adustum:
altera *Orraca* nuncupata non item: sed huic purioris aliquantulum admiscere
solent. *E Sura* antequam ignibus decoquatur, soli exposita, fit acetum satis inter-
dum acre, tametsi neque *Mentha*, neque cortex arboris *Myrobalani* iniiciantur,
quæ medicamenta plerumque admisceri solent ut acetum acrius reddant. Exem-
pto primo vase *Suræ*, exstillat alia, quæ ignis vel solis caloribus inspissata, Saccha-

Genera.



PALMA *Elephantis*
A Costa.

Locus.

Vires.

CYCLOPHERA *Math.*

Temper.



Vfus.

est, frequentiorem huius nucis vsum, lumbricos generare: cui morbo totius provincie Malabar incolæ admodum obnoxij sunt. Externo illo primoque cortice sue operimento crasso, foris læui, intus verò tomentoso dum resiccatus est, fiunt rudentes & alij funes nautici, vti in Hispaniis ex sparto. Tomentum illud Malabares *Cayro* vocant, magni apud eos vsus, nam quoniam aqua marina non corrumpitur,

rum fit incolis *lagra*, appellatum: præstantior censetur, quæ in Nalediua colligitur, quàm quæ in Malabar. Fructus recens sub primo illo crasso viridique operimento, alio cortice nigro præditus est, medullam tegente, qui recens antequam nigrum colorem contrahat, tener & candicans est, editurque cum sale, vel sine sale, vel cum aceto & pipere interdum, atque gustu est Cinaræ: cum verò iam nonnihil indurari cœpit, Cardui caput sapit. Medulla cortici adhærens tenera & dulcis est, continetque multam aquam limpidam, suauem, nec fastidium aut nausæam sua dulcedine parientem quæ vulgo in solis ardoribus bibitur. Frequens est huius aquæ sub dio refrigeratæ, atque etiam *lagra* vsus aduersus iccoris renumque nimios calores, purulentæque materiæ per virgam excretionem: refrigeratur verò hæc aqua in sua nuce viridi *Laña* appellata: diu conseruatur, nam toto anno inueniuntur istæ nuces virides, quarum nonnullæ interdum tres aut quatuor libras siue pintas aquæ continent. Postquam iam indurata est hæc nux, duriorémque medullam contraxit, remanet in cõcauitate limpida quidam aqua, at non adeò dulcis vt prior: nucem tum vocant Malabares *Eleni*. In annotinis nuncibus mutatur hæc aqua in rotundam quãdam substantiam mali instar, candidam, spongiosâ & leuem, sapore dulci. Medulla nucis recentis tenera alba & dulcis, sola editur ab incolis aut cum *lagre*, hoc est, Saccharo è *Sura* confecto, vel cum *Auela*, pulmento ex Oriza in aqua cocta, deinde trita & probè sole exsiccatâ: editur item cum piscis quodam genere siccato ex insulis de Nalediua aduecto, simili ferè bubulis carnibus fumo induratis, *Comalamasu* appellât, bonumque condimentum est ad bibendi appetentiam prouocandam. Ea verò mixtura non modò incolis in vsu est, sed ab ipsis etiam Lusitanis expetitur. Ex eadem medulla lac conficitur Amygdalino simile, ad edulia parâda vtile. Solibus exsiccata hæc medulla vocatur *Copra*, suavis est, reconditur, illisque perinde in vsu est, atque nostris Europæis castanæ siccæ.

Vulgo creditur, & experientia comprobatur

pitur, stipantur eo omnis generis naues: itaque illis populis vsum præber lanæ, xyli, stuparum, lini, & sparti. E secundo nigrôque & duro cortice, qui à nostris *Cocco* dicitur, ab incolis verò *Xareta*, fiunt scutellæ & alia vasa potoria in tenuiorum vsum. Fiunt etiam ex eo vstulato carbones auri fabris vtilis, qui in iis prouinciis periti & industrij, nec admodum sumptuosi reperiuntur. Solent enim suum opificium proclamantes compita circuire, secum deferentes vrceolum, malleolum, & duo cæla, cannæq; tubulum palmari longitudine manu tenentes quo focum incendunt. Ij in ædes admisi, vasa ex auro & argento conficiunt, pro eorû qui ipsos euocarunt arbitrio. Fiunt ex huius Palmæ foliis petasi maiores & minores ad Solis ardores & imbres arcendos idonei: textuntur etiam storeæ & alia plerâque. Coccus porrò de Nalediua cognominatus adeò commendatur ab ipsis incolis, & à Malabarësis, non modò à plebe, sed à Regibus & Principibus viris, vt in omni fere morborum genere ad eum confugiant tanquam ad sacram anchoram. Fiunt in eam gratiam ex illo pocula quæ auro vel argento excipiuntur, & in nauium trirremiumq; figuram efformantur, ad aquam bibendam, in quam ex catenula medullæ ipsius Cocci fragmentum pendere sinunt: sibiq; certo persuadent, illis, qui aquam ex similibus poculis hauriunt, nullum venenum nocere posse, futuròsq; immunes à multis morbis, in quos memini multos incidere, qui ex iis poculis bibere soliti erant. Et licet omnem diligentiam adhibuerim, nunquam tamen obseruare potui, similia pocula aliquem ex morbis curare, ad quos vtilia esse creduntur: potius igitur arbitror tantam laudem obtinuisse à vulgi opinione. Nonnulli ex huiusmodi vasculis bibere soliti, mihi affirmarunt sese experientia didicisse iecur incendi, renes noxam contrahere, & calculum generari: nihilominus tamen magnû est eorû pretium, longeq; pluris æstimantur iis locis vbi inueniuntur, quàm aliis procul inde distitis: nam interdum eiusmodi Nuces nudæ, neque auro aut argento exornatæ quinquaginta aut amplius aureis nummis æstimantur. Nigrior autem, nitidior, longior, maiorque est hic *Coccus* quàm aliæ nuces *Cocci* communis.

TAMARINDUS, A COSTÆ.



SUNT Tamarindi fructus elegantis & aspectu pulchræ arboris, Castaneæ aut Ceratiorum arboris magnitudine, multis ramis præditæ, & foliis latam umbram præbentibus, materie solida admodum: folia filicis femine (quam Hispani *Helecho*, Cantabri *Aristora* appellant) foliis persimilia, dilutè virentia, valde elegatia, gustu acido, gratòque, è quibus condimentum fit (*Salsam* vocant) perinde atque è petroselino: flores candidi, Auræ mali floribus admodum similes forma exteriori, & odore: attamen octonis foliis constant, quorum quatuor interiora alba sunt & crassiora velut Mali auræ florum folia, quatuor verò exteriora tenuiora, & bina ex his eleganti neruo radiata: è medio flore quatuor enascuntur stamina corniculorû modo inflexa, candida & tenuia. Fructus initio dum similis est Ceratiis foris virefcens animo, deinde per siccitatem cinereus, continens ossicula

Forma.

cula rotunda Calsiæ solutiæ modo aut paruis Lupinis similia, dura admodum, & colore nitido terreo, haud quaquam flauo, quemadmodum nonnulli referunt: his non vtimur, sed sola pulpa quæ nonnihil lenta & viscida est, iucunda tamen aciditate grata, tametsi nonnulli indigenæ asserant ossicula assata & in pollinem redacta ex oxygala in alui profluuiis vtiliter exhiberi: faciliè auellitur hic fructus, & etiam sponte decedit. Folia sub noctem sese contrahunt, suumque fructum amplecti solent, qui si desit, sua virgulta & ramos complectuntur: summa verò aurora sese explicare incipiunt grato spectaculo: hæc trita partibus erysipelate infectis imponunt, atque etiam circa phlegmonas ad arcendum qui influit humorem: iidem cum sale Ormuziano phlegmonas resoluunt, & cum cineribus ex Cambaya pituitosos & melancholicos tumores. Vocatur hic fructus in Canarin *Chincha*, ossicula verò *Chincharo*, in Malabar *Puli*, & in Guzarate *Ambili*: Arabes, Persæ, Turci *Tamarindi* vocant, ossicula *Abes*, arborem *Siger Tamarindi*. Præferuntur qui in locis montanis iisque Septentrioni obuensis nascuntur: vsu verò compertum est, huius arboris vmbra sub ea dormientibus non minus noxiam esse, quàm arboris iuglandis.

Temper.

& Vires.

Nomina

DE RADICE CHINÆ.

Nomina

Locus.

Forma.



Ocatur hoc excellens medicamentum in Chinaram regione *Lampatan*, in Decam *Lampaos*, in Canarin *Bonti*, ab Arabibus, Persis & Turcis *Chophchina*. Nascitur abundantissimè in Chinaram regione: inuenitur tamen etiam in Malabar, Cochin, Cranganor, Coulan, Tannor, & aliis locis. Planta est multis tenuibus spinosisq; sarmentis prædita, similaci asperæ non absimilibus, quorum maxima minimum manus digitum crassitie non superant, foliis plantaginis latifoliæ magnitudine: radices pugnum nonnumquam æquant, interdum minores sunt, solidæ, graues, candidæ, interdum etiam rubescentes, & multæ sæpenumerò simul cohærentes.

RADIX CHINÆ,

A Costa.

Vires.



Temper.

Plurimus est huius radices vsus in omnibus Orientalis Indiæ prouinciis ad varios morbos: quin adeò innoxia censetur, vt eam sumētibus, tametsi nullam victus rationem obseruent, sed liberè carnibus & piscibus vescantur, nihil incommodi adferre credatur. Vulgaris tamè quæ in Chinaram Indiæ prouinciis obseruatur, sumendi huius radices decocti consuetudo est, vt radices vncia vna, additis radicem Apij duabus drachmis decoquatur lento igne & sine fumo, in decem & sex aquæ libris ad sex librarum consumptionem reliquos decem in fictili vitriato adseruant, sumuntq; singulis diebus recens decoctum, quoniam facile corrumpitur, nec vltra diem obseruari potest. Eius verò tepidi manè sumit æger plenum haustum, duabusq; horis in lecto remanet, postea surgit, duabus autem horis ante cœnam totidem haurit, interdiu de eodem frigido bibit. Plerique tamen etiam dum sua negotia exercent & nauigant singulis diebus manè & vespere duas eius radices in puluerem redactæ drachmas ex vino, aut ipsius radices decocto

CROCUS INDICUS,

A Costa.




decocto felici successu bibere solent. Organis etiam ex hac radice recenti, aqua elicitur, delicatioribus admodum familiaris: attamen & ab aliis magna quantitas absumitur, quoniam illi plurimum fidunt nō modō in morbis à D. Orta enumeratis, sed etiam in hemicrania, in herniis humoralibus, & vëtoſis, in colli, vesicæ & penis callis, eorūque vlceribus, venerem etiam admodum excitare creditur: decoctum tamē ipsa stillatitia aqua præstantius est. Optimè conseruatur radix, si Piper conſtracto inuoluatur.

DE CROCO INDICO.

MAIORA latioꝝq; habet Crocum *Forma.*
Indicum folia quā Orchis Serapias dicta, colore foliorum Scille, dilutiora tamen & tenuiora, caulē habet e foliis simul implicatis, & sese mutuo amplexantibus constantem: radicem foris Zingiberi similem, intus croceam. Præter nomina *Nomina*
ab Orta enumerata, apud Arabes etiam *Curcuma* dicitur, apud Turcos *Saroth.*

DE MUSA, SEV FICV INDICA, A Costa.



DECEM & octo aut viginti Palmorum magnitudine hæc pulchra & *Forma.*
elegans arbor, cuius truncus ex multorum corticū sibi mutuò incumbentium coniunctione constat, & humani crucis crassitiem adipiscitur, radice rotunda & crassa, Elephantorū grato pabulo: foliis nouem palmorum longitudine, duorum cum semisse latitudine, neruo fatis crasso per longitudinem excurrente, & transuersis fibris in latera sparsis, parte superiore saturis, inferiore dilutioribus: ex huius arboris fastigio nascitur veluti thyrsus quidam florum simul congestorum in modum pinei strobili coloris rufi: deinde vniciū ramum fert humani brachij crassitie in multos nodos diuisum, è quorum singulis decem aut quatuor decem dependent Ficus, ita vt nonnunquam ramus centenis aut ducentenis ficibus onustus conspiciatur. Hos in diuersas species distinguunt Lusitani prouinciam incolentes: nam *Cenorins* appellant qui admodum flauent, læues, longi-

sculi, gratique saporis sunt, & odoratiores: *Chincapanoe* verò qui virescunt nonnihil, longiorēsque sunt, iisque etiam grati saporis. Laudantur præterea qui in *Cofula* nascuntur, *Æthiopibus* *Iminga* dicti. Legitimum autem nomen apud Arabes & Persas

Locus.

Nomina

& Persas (vt è præstante medico Persa in Ormuz nato intellexi) est *Mous*, non autem *Musa* aut *Amusa*: arboris verò *Daracht Mous*. Reliqua nomina ex Garcia petenda. Semel dumtaxat feritur hæc arbor, nam ex eius radice aliæ enascuntur: singulæ verò vnicum (quemadmodum retuli) fructuum ramum gestant, qui, dum maturi sunt, rescinditur, plantamque ipsam sponte exficari sinunt, tanquam in posterum inutilem, aut amputant, in domesticorum Elephantorum pabulum.

Vsus.

Nonnulli interiora tenerioraque, antequam explicentur, folia, florúmque thyrsum Pipere, Zingibere recenti, allio, sale & aceto condiunt, & capparum modo edunt. Folia verò quoniam amplissima, mollia frigidaque sunt, substernere ad accumbendum in æstu solent: & amibustis nonnunquam imponunt. Ruellius huius fructus meminit ex auctoritate Theophrasti & Strabonis.

DE ANANAS.

Locus.

Forma.

PREGRIIVS est hic fructus, & exprovincia S. Crucis in Brasilia primum in Indiam Occidentalem, deinde etiam in Orientalem Indiam delatus, in quibus nunc vberimè provenit. Citrij verò mali minoris magnitudine est, admodum flavus & odoratus cum probè maturus est, adeò vt prætereuntes ex odore dignoscere queant ædes in quibus sit: succulentus & gratissimi saporis, procul intuentibus cinara videtur, sed pungentibus aculeis caret. Singulæ stirpes Cardui edulis magnitudinem æquant, vnicumque malum gestant in medio quasi caule, & circa eum multas alias proles, quarum nonnullæ etiam suo fructu præditæ sunt. Qui itaque fructus maturos colligunt, proles ilicò terræ mandare solent: è quibus singulæ deinde stirpes proveniunt suo malo onustæ, vti mater, quæ intra annum spatium colliguntur. Eius radix carduo eduli perquam similis est, sed & folia non sunt disparia, tametsi ad *Ananas* silvestris folia magis accedant. Vulgo *Ananas* vocant: Canariini verò *Ananasa*. Cum primum in Indiam illatus est hic fructus, singuli decem ducatis, aut paulò amplius æstimati sunt: nunc verò propter abundantiam (tametsi neque sapore neque odore primis cedant) vix duobus regalibus Castellanis veneunt. Hactenus in medicum usum non est receptus, sed solummodo ob saporis gratiam commendatur. Calidus & humidus est, editurque maceratus in vino vti Persicum malocotoneum, & facilis est concoctionis, nimius tamen eius vsus inflammationes parit quemadmodum Duriones Malacenses.

ANANAS A Costa.



Nomina

Vsus.

Si medius secetur, & partes denuo coniungantur, vniuntur vti cucumeres: perfossus verò cultello, si in vulnere vnius diei aut noctis spatio cultellus relinquatur, inuenietur tota ea pars quæ in vulnere hæsit absumpta.

DE CARCAPULI.

CARCAPULI Malabaribus, *Garcapuli* Canarinis, vastæ magnitudinis *Forma.*
 arbor est, fructum ferens malo aureo cui cortex exemptus sit, magnitudine & forma similem, ex grumis omnino constantem, (sed non separabilibus ab inuicem vt in malo aureo) tenui, lauique & splendenti cortice tectum, non admodum sicco, colore pallido, at vbi maturuit

CARCAPULI A Costa.



aureo: gustu admodum austero, sed quadam adstrictione grato. Eo vtuntur in cibis, magnaque apud incolas eius est laus in curationibus: sed inter omnes quæ experientia comprobata sunt primas obtinet profluuij alui cuiusq; generis constrictio, in iis præsertim qui nimio veneris vsu hoc malum contraxerunt: editur verò aut ipse fructus maturus, aut eius succus cum oxygala sumitur, aut illius exsiccati puluis: *Vires.*
 cum oxygala autem mixtus & cocta oriza, mirificè appetitū deiectum reuocat. *Tèperam.*
 Vtilis etiam est eius succus, & exsiccati puluis in oculorum caliginibus & suffusionibus. Familiaris est eius fructus puluis obstetricibus, eum enim puerperis exhibere solent ad pellendas secundas, & ad purgationes, atque lactis vbertatem præstandam, tum etiam ad facilitandum partum magna, vt aiunt, efficacia. Succus eius cum aliis plantis mixtus vngui maioris digiti pedis imponitur eodem latere quo quis aut caliginem, aut suffusionis initium in oculo habet, vtilémq; esse perhibent. Transfertur hic fructus siccus ex Malabar in alias provincias.

DE BETRE.

REQVENTISSIMO in vsu est apud Índos Betre: ab instituto igitur alienum non erit, si hoc loco eius mentionem fecero. Betre masticatum, amarum inuenitur: eam ob causam ei Arecam admiscent, *Temper.*
 & calcis momentum, sicque præparatum suauissimi esse saporis affirmant. Mihi sanè cum primum degustauì, propter amarorem ita displicuit, vt ab eo tempore semper abhorruerim, nec vnquam degustare potuerim. Sunt qui addant Lycium: potentiores verò & opulentiores Caphuram de Burneo, nonnulli lignum aloës & Moscuum aut Ambarum. Sic autem paratum adeò suavis est saporis, orísque halitum adeò commendat sua fragrantia, vt perpetuo ferè illud masticent opulentiores, tum etiam alij pro facultatum ratione, tamen non desint, qui Arecam cum Cardamomo aut Garyophyllis masticent. In solitudinibus autem & remotioribus à mari locis caro venditur. Ideo fertur Nizamoxa singulis annis in id impendere trigiesis mille aureos Lusitanicos. Hæc sunt eorum tragemata, hoc abeuntem donant: atque Rex ipse interdum propria manu potentioribus elargitur, aliis verò per manus famuli sui quem *Xarabdar*, aut *Tambuldar* vocant. Sed quia Betre venas habet aut costas secundum folij longitudinem excurrentes, vngue pollicis (quem ea de causa in acutum præsecant, non, veluti nos,

in rotundum) eas eximunt, deinde admisto calcis momento (quæ ob exiguam quantitatem & materiam vnde conflata est, fit enim ex ostreorum testis concretis, nullum nocumentum adferre potest) & Areca confusa aut confracta, folium Betre complicant, atque in os iniectum masticant, priorem illum succum expuentes (quod tamen nonnulli non faciunt) qui cruentus videtur, deinde alia

BETRE, Garcia ab horto.



atque alia folia simili modo præparata subsequenter sumunt. Solent aliquem dimissuri, aut ipsi ab adstantibus discedentes his foliis præparatis plena bursula sericea abeuntem honorare. Nemo discedere sustinet, donec Betre sit donatus, id enim dimissionis est indicium. Ceterum opulentiores aliquos adituri, hoc Betre masticare pro more habent, ut odore os commendent. Siquidem apud eos summæ incivilitatis est odoratum non habere anhelitum: ita ut si tenuioris fortunæ aliquem cum potentiori fabulari necesse sit, manu ori opposita id faciet, ne teter aliquis odor alterius nares feriat. Sic etiam mulieres viris congressuræ, Betre masticant antequam colloquatur, existimantque ad lascivium summum esse illectamentum. Omnes huius regiones incolæ id, sumpto cibo, mandere solent, alioqui cibos nauseam quodammodo mouere aiunt: & masticare assuetis, oris halitum tetrum olere, si quando abstineant. Solent ab eius usu per aliquot dies abstinerere, quibus obierunt sanguine iuncti, & in quibusdam ieiuniis. Ab huius etiam esu abstinent, & humi se abiiciunt Arabes & Moabii,

hoc est, Alii sectatores dicti, decem diebus quibus ieiunant. Fabulantur autem isti Alii sectatores, siti se morituros conclusos in quadam arce, multasque præterea fabulas addunt. Nasctur Betre in omnibus Indiæ regionibus maritimis Lusitanis cognitis: nam in continenti non reperitur, nisi è maritimis allatum. Verum quidem est in Dultabado, vrbe opulenta in Decan, & Basnagua inueniri, sed minori certè quantitate, quàm vt ad Persas & Arabes deferatur. Supra Calaiate, quod octoginta leucis ab Ormuz distat, inuenire haud erit facile. Nam neque regionem frigidam amat, ut est China, neque solibus nimium austam, ut Mosambique & Sofala. In Malauar vocatur *Betre*, in Decan, Guzarate, & Canam *Pam*, in Malaio *Siri*. Hallucinantur qui Betre folium Indum esse putant: in quo errore etiam versatus sum, cum primum in Indiam appuli. Sed sententiam mutare coactus sum postea, à Nizamoxa, quem Nizamaluquo vocant, euocatus: cui medicamentum roborando stomacho iussus componere, ea simplicia quæ medicamentum ingrederentur enumeraui, addens, id folium quod masticaret, Folium Indum esse. Ad quam vocem, risit ille (siquidem hoc vocabulum intelligebat) & Auicennam mihi ostendit Arabica lingua conscriptum, qui diuersis capitibus de folio & Betre agebat. Ducetesimo enim quinquagesimo nono capite, lib. 2. de Folio Indo, *Cadegi Indi* illi nuncupato scribit, & septingentesimo septimo capite lib. 2. de Betre, quod ille *Tembul* vocat corrupto, ut mihi videtur, aliquantulum vocabulo, quod ab omnibus *Tambul*, non *Tembul* dicatur. Huc adde, quod si quem Arabem Æthiopem perconteris, quæ vocetur Betre, statim *Tambul* dicet. Auicenna lib. 2.

cap. 709. gingiuas confirmare est auctor, in quem etiam vsum semper ab Indis masticatur, & paulò post subiicit, stomachum roborare, ob quam facultatem etiam ab Indis expetitur. Quod autem frigidam illi facultatem tribuat in primo gradu, & exsiccantem in secundo, putauerim exemplar vitiosum esse, aut (quod eruditi Arabes arbitrantur) Auicennæ, in temperamenti descriptione, impositum esse, fit enim plerumque vt vulgus erret in temperamenti dignotione, vt pote cui Piper, Cardamomum, Ceba sint frigida. Calidum autem & siccum esse Betre ad finem secundi excessus, ipse expertus sum, & sic ex sapore & odore coniicio. Est autem Betre folium simile ferè Mali medicæ folio, oblongius tamen & per extremum artius venas, siue costas, vt diximus, per longitudinem excurrentes habens. Optimum censetur bene maturum, quippe quod maiorem sonum edat in ore dum masticatur. Corripitur, si recens à planta collectum diutius manibus tractetur. Fert Betre in Maluccis fructum quendam contortum, Lacerti caudæ similem, quem istic edunt, quod bene illis sapiat. Fuit id semen delatum Malacam, atque degustatum oprimi saporis inuentum est. Seritur autem Vitis modo, addunturque stipites, & pedameta per quæ repens se sustineat nostratis Hederæ modo. Quidam maioris quæstus gratia Piperis aut Arecæ arboribus id maritant, atque ita pulcherrima vmbracula conficiunt. Multam verò curam, & assiduam rigationem desiderat.

Forma.

DE N A R D O I N D I C A.



LVLD affirmare possum, multò plura aromata, maiorique quantitate, & minus adulterata ad nos adferri, viliorique emi, quàm antiquitus fiebat: quod nunc Lusitanorum nauigationibus Indiæ nobis apertæ sint, ipsæq; regiones, quæ aromata gignunt, longè cultiores nunc sint, quàm Veterum tempore fuerunt. In eorum numero Nardum repono quæ legitima & sine mangonio ad nos importatur, licet interdum aut maris humore sibi ascito situm contrahat, aut senio suaueolentiam illam amittat, qua initio prædita erat. Vocatur autem Nardus incolis (nam Græcum & Latinum nomen notum est) *Cahzçara*: Auicennæ lib. 2. cap. 646. & omnibus huius tempestatibus Arabibus *Çembul*, quod est Spica, & *Çembul indi*, id est, Spica Indica: eadem ratione, quam nos Spicam Celticam vocamus, illi *Çembul rumim* appellant. Quod autem corruptè Marthæus Syluaticus cap. 640. *Simibel* & *Sumbel* protulerit, mirum non est, cum is linguam Arabicam ignorarit: nisi malimus tempore paulatim corrupta fuisse vocabula. Ceterum nascitur Nardus in Mandou & Chitor prouinciis, Regni Delli, Bengala, & Decan vicinis, iuxta flu. Gangem, quem incolæ *Ganga* appellant, & sacrosanctum existimant, ita vt morituri regni Bengala incolæ hoc flumine mergi se iubeant, sed pedibus duntaxat. Sunt in eo flumine certa idolorum delubra, ad quorum cultum cateruatim conflunt Mercatores è Guzarate & regno Decam, magnâque donaria in hæc idola conferunt, inde redeuntes sanctificari, vt ipsi sibi persuadent, imò potius à cacodæmone obsessi. Porro non sunt diuersa Nardi genera: sed vnicum duntaxat mihi notum genus, id scilicet quod ex iam memoratis locis adferri diximus. Prouenit quidem in monte quodam, qui altera parte Orientem spectat, altera Occidentem, ad quem scilicet Occidentem sita est Syria multis regionibus ab India discreta. Sed tamen multis aliis eius regionis locis sæta prouenit, non facillè enim sponte nascitur. Neque vna præstantior est altera: Spicamve habet alia altera multò longiorem. Certè radix est, spargens supra solum breuem virgulam seu caulem circiter tres palmos longum, cum longissimus, atque alias insuper virgulas multò breuiiores: in summa

Nomina

Locus.

Genus.

Forma.

NARDVS INDICA,

Garcia ab horto.

Li. 12. c. 12.

Lib. 1. ca. 6.

radice spicæ producuntur, item aliæ per virgulas. Tali enim modo venditur in Cambayete, Afurate & Gogua, aliisque portubus marinis, vnde mercatores Arabes & Persæ petunt: potissimâ tamen partem ab indigenis absumi ferunt. Inuenitur interdum sordida & pulueru lenta, villis ipsius plantæ in pollinem redactis. Emitur tamē ab iis quos dixi mercatoribus, & eo puluere manus eluere intelligo. Hac vnica Nardo quæ iuxta Gāgem oritur, quamq; in Occidentē exportat, vuntur medici cū Indici tū Turci, Persæ & Arabes. Nā quod ex ingēti pretio quo antiquitus, teste Plin. emebatur, inferre volūt, nostram Nardū non esse legitimā: objectioni me satis respōdisse arbitror, cū dixi Indias nunc magis apertas & cognitatas esse, quā tēpore Pl. fuerint, & ipsa aromata maiori copia ad nos adferri. Ceterū fabulosū omnino iudico quod And. La. suis in Diosc. cōmētariis scribit, Nardi vsū apud Indos esse periculosū, quoniā ex ea fiat veneni quoddā gen^o mortiferū, quod nō modō haustū, sed etiā cuti in sudoribus inspersum, hominē illico iugulet, idq; toxicum

Pisum vocari. Nam cū multis in India annis Medicinā exercuerim, & non modō versatus sim cū omnis generis medicis Asiaticis, sed etiā Regibus & Principibus familiaris fuerim, nunquā tamē hoc Pisū videre mihi cōtiguit, aut eius nomen audire. Id genus quod Sepulueda *Satiech* & *Satiach* appellat, id esse puto, quod ex Satiguā adfertur, celeberrimo regni Bégala portu & Emporio ad fluuij Gāgis ostia.

ACONITVM PARDALIACHES PRIMVM.



Locus.

PRÆCESSIT inter Aconitorum genera Pardaliāchis figura, qualē Matth. exhibuit, verissīma, & certissīma, quamuis falsā ac cōmentitiā esse quidā existimarint, sed mutila, radice tantū picta cum foliis. Ego integrā nactus à seplasiario Treuorensi, in cuius horto plantæ aliquot multis iam annis viuūt, & vigent, controuersiam pertinaciorem de hoc Aconito, quod his oculis conspexi, iactatam inter Gesnerum ac Matthiolum viros præstantissimos, clarissimos, doctissimos, vt dirimā, Matthiolo fidem suam, quæ labare videbatur, asserui, & plantam ostendi, minimē decurtatam, adiectis pauculis quæ totam historiam reddant locupletiolem, ac illustriorem. Nascitur copiosē in Allobrogibus, haud procul à primario cænobio Carthusianorum, in confragoso & arduo mōte, quem ideo Scalas nominant, vulgō, *les Eschelles*, ob angustos tramites in saxo velut gradibus excisos, per quos

per quos in cacuminis fastigium conscenditur. Primo veris clementioris accessu *Tempus.*
caulis exit, antequam folia prodeant, vt in petasite officinarum, & Bechio, palmū
altus, opertus candicante lanugine. Foliola quatuor, bina ex aduerso ferè sibi op- *Forma.*
posita, extant in caule, quorum alterum altero paulò demissius est. Flos densus, ac
velut congestus in globum, gracilibus peciolis insidet, caulis verticem ambiēti-
bus, ex subluteo pallescens, arrectis in cuiusque flosculi medio complusculis apici-
bus, subluteis. Diuanescente ac dilapso flore, emergunt folia, hirsuta, ferè quatuor,
huc illuc diducta, tenui pediculo subnixa, venosa, supernè virentia, infernè abdi-
cantia, & tomentosa, punctis quamplurimis notata, rotunda ferè margine. Subest
radix, nodis articulatim siue geniculatim multis compacta, similis caudæ Scorio-
nis, prorsus ea specie quam Matthioli delineaui, ac expresit. Quo sapore linguā
feriat, taceo, non ausus illius mortiferæ venenatæq; herbæ gustum explorare.

DE GVATAVAS.



ARBOR cuius fructus est Guayaas, apud Indos & Hispanos celebra- *Forma.*
tissimus est, mediocris magnitudinis, ramis sparsis, folio laurino, flo-
re candido aureæ mali floribus simili, aliquanto tamen maiore, odo-
rato: facillè nascitur quocunque loco feratur, adeoque luxuriat & ser-
pit, vt in terræ vitiorum nomine habeatur, nam plurimorum agrorum gramen
quod depasturi essent greges corrumpit nimio vti rubi implexu: fructus nostris
malis similis est, eorum magnitudine quæ ab Hispanis *Camuesas* vocantur, viridis
initio, & per maturitatem aureus, pulpa interiore alba, interdum etiam rosea: diui-
sus quatuor concamerationes aut vascula habere conspicitur, in quibus semina
reconduntur, mespilorum seminibus similia, durissima, colore fusco, omnino *Vires.*
osseæ, medullæ & saporis expertia. Fructus edi solet prius dempto cortice, palato
gratus est, sanus & facilis concoctionis: viridis in alui profluuiis vtilis est, nam
valde adstringit: præmaturus aluum soluit: at medius, hoc est neque immaturus
neque præmaturus, si assetur, valentibus & ægris confert, nam ea ratione para-
tus, sanior est gratiorisq; saporis: præstantior autem is est quem domesticæ &
cultæ arbores ferunt. Foliorum decocto Indi vtiliter tumentia crura lauant, eodè
lienis obstructions tolluntur. Fructus frigidus esse videtur, propterea febricitan- *Locus.*
tibus assatus datur. Vulgaris est per vniuersam Indiam.

BALSAMVM TOLVTANVM.



AD VEHITVR ex Continentis quadam prouincia inter Carthaginem *Locus.*
& Nomen Dei sita, Tolu ab Indis appellata, Balsami quidam liquor,
maximarum virium, & præstantissimum omnium quæ hæcenus ex
iis regionibus attulerunt, medicamentum. Arbores è quibus colligi-
tur pumilis Pinis sunt similes, multos ramos quaquauersum spargentes, foliæque *Forma.*
Ceratix similia obtinentes perpetuò virentia: præferuntur domesticæ & in cultis
natæ. Colligunt verò hunc liquorem Indi vulnerato & inciso arborum cortice
qui tenuis & tenellus est, suppositisque, & arbori adnexis veluti quibusdam co-
chlearibus è cera nigra in illis regionibus nata confectis, quæ emanantem è vulne-
ribus liquorem excipiant, quem deinde in alia vascula ad eam rem parata effundūt:
id verò feruentissimo sole fieri necesse est, vt liquor facilius emanet, nam noctus
ob frigiditatem nihil effluit: erumpit etiam interdum ex ipsis arboris nodis & alis
nonnihil liquoris, qui cum exiguus sit, & in solem decingat, perit. Porro apes quæ
ceram istam conficiunt, nigre sunt, eamque in terræ hiatus & cauernis subter-
raneis elaborant. Plurimam autem huiusmodi ceram in Hispaniam deferri vidi,

qua ad paranda funalia utebantur : sed ob tetrum quem eius fumus spirabat odorem vetitus fuit eius vsus, postea tamen in medicamenta receptus. Etenim perutilia ex hac fiunt cerata ad mitigandos dolores è quauis causa frigida prouenientes : nam tumores resoluit, & plurima alia commoda præstat. Ceterum Balsamæus hic liquor apud Indos maxime celebris est, ob insignes eius facultates, à quibus edocti deinde Hispani, cum miros eius effectus animaduertent : pro re maximi pretij inde in Hispaniam detulerunt, magno illum istic redimentes, nec abs re, quandoquidem mihi præstantius esse maioribusque facultatibus pollere videtur eo qui è noua Hispania aduehitur. Colore rubro ad aureum tendente est, mediæ inter liquidum & densum consistentiæ, glutinosus admodum, & vbicunque reponatur firmiter inherens, sapore dulci & grato, nec si fumatur nauseam mouente quemadmodum reliqua Balsama, odore excellentissimo, & limonum fragrantiam quodammodo referente, sic vt vbicunque reponatur, abscondi non possit, sed suo odore locum gratiorem reddat : etiam pauxillum in vola manus attritum, suauissimum spirat odorem vti lasmini ferè. Eius facultates insignes sunt, quoniam incisione elicitur, quemadmodum olim Balsamum in Ægypto, ad eadem omnia ad quæ illud celebrabatur, efficax. Omnia recentia vulnera, curat consolidat, glutinatque labra, nec materiam purulentam in iis exoriri sinit; quodque maius est, nullum cicatricis vestigium curatis vulneribus relinquit, si eorum labra probe iuncta fuerint, quapropter in faciei vulneribus singularis est, quandoquidem ea sine purulentæ materiæ generatione curat, nec vestigium vllum relinquit. Primum autem emundandum est vulnus ab omni spurcitie, & vino eluendum, deinde eius labra probe vnienda, Balsamumque subtepidum illinendum, & lineus pannus duplicatus eodem Balsamo intinctus superimponendus, atque ita colligandus, vt labra hiare nequeant : postmodum victus ratio sit tenuis, secreturque vena si necesse sit : quarto demum die soluatür ligatura (nisi symptoma aliquod ante soluere cogat) & vulnus consolidatum inuenietur. Quod si singulis diebus vulnus curare necesse sit, lineum pannum Balsami liquori intinctum subinde adponendo glutinabitur : etenim eius facultas est prohibere, ne materia in vulnere generetur. Præsertim verò vtile est in vulneribus in quibus contracta sint ossa, exemplis prius iis quæ separata sint fragmentis, & reliquis intactis, quoniam Balsami facultas ea expellet, vulnusque sensim consolidabit. Miræ etiam virtutis est in articulorum vulneribus, & neruorum sectionibus, omnibusque puncturis, etenim ea curat, atque à contractione liberat, ne partes inutiles fiant & motu priuentur. Altè penetrantia & cuniculosa vulnera curantur huius Balsami albo vino mixti per syringam iniectione, & post ternas deinde horas eius educatione : idem fit in vulneribus punctim inflictis, semel in die mediocriter calidum iniiciendo. Vtile præterea est in contusionibus, reliquisque chirurgi operam requirentibus, modo nulla insignis inflammatio adsit : ea verò conuenientibus medicamentis subblata, balsami est vsus. In morbis chirurgi operæ minimè requirentibus plurimum prodest, veluti in asthmate, haustis eius aliquot ex albo vino guttis : capitis dolor è frigida causa prognatus lenit, lineo panno eius liquori intincto, capiti circumligato : & temporibus adpositum, omnem defluxionem cohibet, in oculos præsertim, eorumque dolores leuat, calidum admodum cerebro impositum dolorem tollit, roborat, & paralyfi remedio est. Vbi sunt eo nonnulli phthifici, manè aliquot guttas è manu lambendo, magnūque senserunt commodum, quoniam pectus egregiè expurgat. Aliquot eius guttæ ex aqua vitæ calida initio rigoris in quartanis, aut tertianis diuturnis & importunis sumptæ, vtilis sunt, sed etiam ante frigus eodem balsamo feruenti oleo rutaceo permixto ceruices inungendæ. Si quis ab orificio vetriculi ad vmbilicū vsque inungatur, ventriculus

trculus roboratur, & dolore liberatur, languens cibi appetentia excitatur, concoctio iuuatur, flatus discutiuntur: at longè maiore efficacia istud molitur, si æquales balsami & olei nardini compositi vel simplicis partes misceantur, & facilius etiam illinitur. Longa experiētia apud Indos probatum est, eos qui Hydropicorum in morem tument, si hoc balsamo æquis partibus cum vnguento aperituo mixto ventrem illinant, lienis regionem præsertim, magnum leuamen sentire: quoslibet tumores & œdemata cuiuscunque partis corporis resoluit: omnes dolores à frigida causa promanantes etiam diuturnos tollit emplastri modo applicatum, & continuè delatum donec sponte decidat. Eisdem effectus præbet calidè adpositum, lineoque panno, qui aqua vitæ selectissima & calefacta madeat superimposito, vbi sunt flatus siue in ventre, siue in alia corporis parte, magnæ est etiam efficaciæ in nephritico dolore, si feruēs cum aliis oleis ad eum morbum vitilibus mixtum illinatur: contractorum neruorum dolorem lenit, & si per sūmos æstus illo illinantur & fricentur, eos relaxat: parotides seu scrophulas tum cæcas tum apertas curat. Alias præterea multas facultates obtinet hic mirabilis liquor, quæ me latent, sed quas intelligere potui, vniuerso orbi notas facio, vt adeo præclaro medicamento & tam insignibus viribus prædito (quibûsque lōgè plures & maiores tempus deteget) quilibet vti queat. Donatum se ait Clusius pauillo simili Balsamo à suo Morgano sub suum è Londino discessum anno 1581.

PLANTARVM ÆGYPTIARVM ET

Syriacarum eiconica figura, & historia summa diligentia

& cura descripta à Leonardo Rauwolf

Medecina doctore Augustano.

⑥③③

KALI ARABVM PRIMVM GENVS.



PRIMVM genus Kali Arabum ab illis *Usnen*, ab incolis verò regionis, quæ hanc Plantam fert *Schinan*, nominatum: ex cuius cinere Sapo fit, & vitri liquandæ inflandæq; materiæ nitrosa massa: (quam Galli vocant *Soude*.) Hæc Planta surculosa est, multisque veluti ramulis tenuibus venustè dispersa, in summis virgis hinc, illinc, nodulos multos edit, sub quibus folia emergunt angusta, tenuia, acuminata, (quæ forma, & facultate, minori Kali respondent,) infernè candida, supernè cinerea. Hæc non de foliis tantum, sed tota Planta intelligenda.

Forma.



LTERVM genus Kali, multos quoque ramulos spargit, & genicula plurima: Radicem habens crassam, lignosam, cinerei coloris.

CONYZA STRIAE.


Locus



IRCA ciuitatem Tripolin, in Prouincia Syriae, in multis locis gignitur, crescitque planta, quam Dioscorides, Graeci & Latini Conyzam nominant. Ex cuius radice cauliculi multi gignuntur ad longitudinem pedis, quorum alij sese erigunt, alij vero, & maior copia, in terram se humilant, & prosternunt: ex quibus postea, nouae radicae succrescunt, quae rursus alios caules recentes producant, vt possint transponi. Folia huius Plantae sunt longa, Oliuae similia, pingua, aliquantulum hirsuta. Odoris non exigui, suavis tamen, quae sicut & flores Conyzae maioris sunt similes.

KALI ARABVM
secundum genus.

CONYZA STRIAE.



BRASSICAE MARINAE GENUS.



Nomina


Locus.

Forma.

IN Hortis, & locis incultis, & desertis, prouenit, Brassicae marinae genus, seu Soldanellae, quod ab incolis Meudheudi à Rhase, libro ad Almanforem, Corigiola nominatur, Germani Brassicam marinam, sua lingua, in vniuersum Mierkoil appellant. Planta haec crescit in arida & sicca terra, & locis arenosis, habetque radicem tenuem, huc illucque per terram diffusam. Folia eius sunt oblonga & parua, non vt in vulgari, rotunda, sed euntibus in latera venis, tanquam virgata, ad pediculum cui insident, latiora, & quadrata, in summo veluti crenata. Flores ex turbinatis capitulis emergunt, qui cum adolescunt, in quinque foliola sese expandunt.

BRASSI

BRASSICÆ Marina genus.



FICVS CYPRIA.



FICVS CYPRIA.

FXTRA Ciuitatem Tripolin, conspiciuntur variæ arbores, & inter alias, *Locus.*
 multæ à Græcis Sycomori, ab Arabibus verò Mumeitz nominatæ, harū
 Dioscor. & Theophrastus, duo ponunt genera, quorum alterum Ficus *Genera.*
 Aegyptia dicitur, alterum verò Cypria dicitur, à loco denominatæ, ubi hæ copiosè
 proueniunt. Huius Cypriæ nempe, quæ & in Syria frequens, arbores sunt magnæ,
 proceræ, vt etiam nonnullæ altitudinem Mori *Forma.*

PLANTA RARA
 Plantagini longè similis.



PLANTA rara Plantagini similis.

Descriptionem Plantæ addere nolui, ne
 ob vires occultas, quas attribuit Diosc.
 Veneficis innotescat, & in abusum ve-
 niat, quæ non tantum hac præcipua nota, quod
 eiusdè primæ speciei folia arefcentia, ad formam
 vnguiū Milui exanimati, sese cōtrahunt cognos-
 cenda, sed & reliquis omnibus, quas attribuit
 Diosco. Eam ob causam, illam tantam nomine,
 Græcis characterib⁹ impresso, inscribere volui.

CYPRVS



re, tingunt. Ex radice huius arboris trita, vel vsta, Arabes Spodium parant, cuius Auicenna capite 17. meminit.

VIDIMVS quoque arborem nostræ in Germania *Beynholtz* seu *Mundholtz* nominatæ similem: à Latinis *Ligustrum*, ab Arabibus & Mauris *Alcanna* seu *Henne*, à Græcis nunc publico & communi vocabulo *Schenna* nominatur. Ex Ægypto, & præcipuè ex Cayro, vbi copiosa prouenit, eò deferitur. Hanc Turci & Mauritani, propter gratum & suauem odorè Muscho similem, quæ flores exhalant, diligenter in vasis custodiunt, & Hyeme, ne frigore pereant, in cubiculis, & subterraneis locis, seruant. Flores eius sunt pallidi, subflauo, duobus digitis longiores & tenelli, quatuor foliolis paruis constant. Ramuli flori concolores extant, quibus acuminatis leuigatis dentes purgant, & in eum vsum, vendunt. Folia tota Hyeme durant, ex quibus, Succo Citriorum madefactis, liquorem eliciunt & recondunt, quo vngues digitorum, & capillos infantium, festis diebus, rubro colore, vt etiam equorum iubas & caudas, Turcarum more,

PLANTA LACTARIA.



& *Sabeam*, ab Arabibus vocatam, cuius, Rhafis, sæpius mentionem fecit.

IN AVO procul ab Horto quodam, oblata nobis est incognita Planta Lacte turgida, cuius flores & folia, deciderant: Alta illa fuit cubitos duos, extrinsecus à summo ad radicem vsque scabra, nõ quidem tota, sed hinc inde scabrities illa apparet quam pictura ostendit. Sicca & intus concaua, Sambuci modo: coloris è flauo virentis, multos habuit ramulos, recta sursum se attollentes veluti arundinaceos tubulos, compactos, non geniculis, sed scissura aliqua manifestæ, ac si studio cultello esset facta, in interiore parte apparente, quæ ramis grandioribus inferuntur minores, separatim fusos, intus Lacteo succo plenos, qui succus acrius pungit, quàm Tithymali lac, aut Esule. Ab Tucolis, nomen eius, quamuis sæpe percuntatus sim, scire non potui. Tandem, vt ex multis signis & coniecturis cognoscere licuit, iudicau, hanc Plantam esse Xabra, & Camarronum Rhafis, *Tanaghut*,

MELANTZANA ARABUM.

VIDIMVS quoque Plantam, Melantzanam, ab Arabibus *Melongena*, *Nomina*
 seu *Bedengia*, nominatam, trium generum, colore distinctorum,
 nempe Cinereo, Flauo, & ferè Purpureo. Fructus oblongos, cur- *Forma*.
 uos, longæ cucurbitæ similes, procreat, & cuiuscunque generis
 sunt, inter se forma non discrepant.

MELANTZANA NIGRA.

MELANTZANÆ nigra, duo genera, Mauri vocant *Bathleschain*.
 Fructus longus, altus, aliàs rotundus, colore nunc atro, nunc sub- *Forma*.
 nigro, cortice læui, & procul intuenti, splendido, qui, vt Auerrhoes
 inquit, salubrior est coctus, quàm crudus.

MELANTZANA,
Arabum Melongena.



MELANTZANA
Nigra.



SECACUL ARABVM, PASTINACA SYRIACA:
Germanis Gerelen, siue Siferis Species.

EXTRA Halepi hortos gignuntur duæ raræ plantæ, quæ quia, in vul-
 garibus cibus commendantur, inter Hortenses poni, numerarique *Locus*.
 debent. Harum altera quam Arabes nominant *Secacul*, extra urbem
 Halepi, in locis opacis & sub arboribus, & in segetibus, reperitur.
 Radice læui, fragili & tenera, foris coloris cinerei, & intus albi. Carne lenta, molli, *Forma*.
 & tenera. Ei crassities, digiti, sesquidigiti longitudo, pro fibris sunt, quædam tubercula,

HISTORIÆ GENERALIS PLANTARVM,

cula, parua rotunda, instar verrucarum, grati, & dulcis saporis, qualis est nostræ Pastinacæ flauæ, cui carne, caule & umbella valdè similis est, sed floris colore flauo, qui in Pastinaca nostra, candidus est. Radices, circumferanci seplasiarij, vèrè, filo connexas, & asseruatas, publicè, multas magnâq; quantitate vendunt, & distrahūt.

PLANTA SPINOSA, MAVRORVM ALHAGI.

Nomina

Locus.

Forma.

Temper.



PLANTA rara Spinosa, Maurorum, Alhagi, Agul, & Algul. In eius fronde, præcipuè apud Persas, colligitur Manna, quam illi *Trunschibin*, Arabes verò *Tereniabin* & *Trungibin* vocant, multis spinulis rubris ea liquata manum tractantis, pungentibus. Circa ciuitatem Halepi, Plantæ spinosæ multæ, nascuntur cubito altiores, ramulis teretibus, & rotundis quamplurimis, multis tenuibus & molliusculis hinc, inde, spinis rigentibus. Spinæ quibus riger Planta hæc, sunt subcinericei coloris quemadmodum & folia, quæ Polygono sunt simillima sed siliquulas habet rubras, quæ & semina eiusdè coloris continent, quibus etiam hæc Manna scater. Flore purpureo, ex capitulis paruis & rubris, quibus oriuntur siliquulæ, scorpiodi, vel Coluteæ Scorpiodes simillimæ. Intus eiusdè coloris semina concluduntur. Radix mediocriter longa, fusca. Folia longiuscula, Gramini vel potius Polygono similia, cinerei coloris, circa spinularum radicem exeunt. Sicut Cuscuta variis sese implicat plantis, ita hac spinam illam fere totam circumuolutam reperi. Temperamento, calida & sicca, incolæ, decocto horum foliorum, corpûs purgaturi vnus manipuli decoctum, in aqua fontana, pauca paratum, bibunt. Manna, quæ his arboribus illabitur, *Tiri-miabin* à Costa vocat, cap. 66. & *Carduis* insidere, scribit.


SECACUL ARABVM,

Pastinaca Syriaca.



PLANTA SPINOSA,

Maurorum Alhagi.



SAFSAF SYRORVM.



Safsaf rarum genus Salicis, extra ciuitatem Halepi nascens incolis Saffsaf nominatur. Multæ hæ arbores ibi crescunt, magnitudine tæquales, sed trunco, ligno, ramis similes Betulae, & præsertim virgis, quæ longæ, prætenues, flexiles, pallentis, sublaui, aut sublutei sunt coloris, quibus insunt folia oleagina, supernè virentia, infernè candicantia, Vitias similia, & in caudice, ramisq; grandioribus germina, instar Ficus Cypriæ. At non sunt illa sine foliis, è quibus in Vere prodeunt, flosculi tenues, molles, & lanuginosi, populi albi, pallidi, & iucundi odoris. Incolæ hos flosculos, eo quod nullum ferat fructum, auellunt & colligunt, aquamq; ex illis igne eliciunt, cordi roborando conuenientissimam & valentissimam. Has arbores Arabes vocant *Zarneh*, & *Zarnabum*, vt Rases cap. 353. & Auicenna ca. 749. Serapio verò cap. 26. cõmuni nomine *Zurumbeth*, prout ex eorũ scriptis cognoscimus. Arbor hæc non videtur esse Ziziphus Cappadocia, quam etiam eodem ferè loco sub nomine Seisefan describo. Siquidem hæc quæ & in Syria frequens, fructifera, illa verò cuius suprà mentionè facio, sterilis est. Præterea memini me & Ziziphi speciem aliam describere, folio 461. Hædæporici mei, quam & in finibus Tyri & Sidonis reperi, quæ videtur omnino respondere Paliuro Theoph. Ibi, qui præterea quid cupiet plura inueniet.

Forma.

Nomina

MORGSA NI SYRORVM.



Lantam hanc raram, Syri Morgsani vocant, aspectu pulchram, ac elegantem, valde virentem, mediocriter crassam, & frondosam, radice longa, minimè succulenta, sed sicca ligniferæ modo, ex qua cauliculi aliquot erumpunt. Foliis rotundis Cappari similibus, vtrinque binis semper, & eodem ortu, vt in Faba. Inter hæc prodeunt flores, intus rubri, extrinsecus albi, quibus succedunt siliquæ oblongæ, quales Sesami: Plantæ toti ingratus inest sapor odorque grauis, incolæ illa vtuntur lumbricis necandis, & depellendis. Quo autem nomine Veteres illam appellarint, dubitant, imò nesciunt. At ego, ex descriptione, & facultate illius suspicor esse Ardistrigi Auicennæ, & Andirian Rhafis.

Forma.

Vfus.

ANEMONES GENERA.

Forma.



Genera.

ASTRAGALVS DIOSC.

vulgo Christiana radix.

Forma.



NEMONES genera, floris rosei, lutei, purpurei varietate, distincta, aspectu pulchra, quæ Arabes Sakaick vocant. Iisdem locis nascuntur genera aliquot Anemones venusta ac insignia, vario floris colore, aliàs rubro, aliàs purpureo, nonnunquam luteo, quæ inco^{la} communi nomine Sakaick appellant cognomen addentes è floris colore sumptum, Sakaick achmar, Sakaick alfar, Sakaick aferach, id est, Anemone, rubra, purpurea & lutea.

ASTRAGALVS DIOSCORIDIS,

vulgo Christiana radix.



PERIUNTUR iis in locis, Astragali genera duo, alterum foliis parvis Hedydari, siue Securidacæ, aut quomodo quidam pronuntiant Securidacæ: alterum, quod descriptioni Dioscoridis omnino respondet, ac ideo mihi verus Astragalus esse videtur. Frutex est exiguus, radice fusca, longa, magnitudine Raphani grandioris ex qua prodeunt cauliculi nigri, ipsa radice duriores, alij in terram inclinantes, alij in altum assurgentes, fastigio, velut in cornua diuiso, gustu dulci, cum mediocri siccitate & adstrictione. Cauliculorum qui è radice nascuntur, & in terram flectuntur, idem est color, longitudo verò digitalis. Ex iis spissi veluti ramuli diffunduntur, in quibus folia Lentis aut Orobi, ex aduerso, bina semper, nouem ferè aut vndecim. Flos, purpureo, fusco & cæruleo, distinguitur. Semen, in folliculis densis & carnosus, flatu distentis, Colutæ modo, continetur. Depictæ radici non dedit proportionem, quamuis enim exigua sit Planta, minor tamen longè apparet in eicone, quàm in viuâ.

CHONDRILLÆ, ALTERUM GENVS
DIOSCORIDIS.



IN Agris cultis, & terræ aggeribus nascitur secundum genus Chon- *Locus.*
drillæ Dioscoridis, radice rotunda, satis crassa, lævi, nigra, aut fusca,
cum in altum excreuit, forma & crassitie vnus digiti. Longitudine *Forma.*
digitorum quinque, ac interdum octo, tanquam bulboſo, infernè
tuberculo, Castanæ simili, quod Lactæum succum fundit. Ex summa radice, cau-
liculi ferè tres oriuntur, folia Graminis, longa, tenuia, multa in terram flexa, flos
luteus, ac flauus, auriculæ Muris similis, inter illa prodit: florum cuique suus est
pediculus.

CHONDRILLÆ ALIVD GENVS
DIOSCORIDIS.



ON procul ab iis locis quæ memorauimus, in Agris lapidosis & aridiori- *Locus.*
bus, prouenit alterum genus Chondrillæ Dioscoridis, superiori,
quam descripsimus, radice & flore similis. Foliis vero, quæ sola dif- *Forma.*
ferentia est, latioribus & crassioribus, colore cinereis, & ferè talibus,
qualia nos in Holostio Mompelij vidimus.

CHONDRILLÆ,
alterum genus Dioscor.




CHONDRILLÆ,
aliud genus Dioscor.



HISTORIÆ GENERALIS PLANTARVM,
CHRYSOGONVM DIOSORIDIS

Forma.



CHRYSOGENVM Planta rara, inter Segetes, ad cubiti altitudinem confurgit, quam flore, caule, & tuberosa radice, quæ intus rubea, Leontopetalo valde similem comperi, differunt tamen inter se, eo quòd Chrysogoni caulis, exilior & tenuior est, in plures veluti furculos diuisus, à se inuicem separatos, in quorum vertice aureus flos emicat, coronis aptus, formosior, & copiosior, Verbasci quàm in Leontopetalo maiores. Exeunt ex radice superiore parte, quæ è terra proflit, tres aut quatuor ferè furculi. Plerumque quatuor apparent, nec memini me tres reperisse: fili modo tennes, in quibus folia sunt ex aduerso vtrinque bina, obscurius virentia, humi strata, in summo & extremo, qua parte latiora sunt, Quercus modo dissecta.

LYCOPSIS DIOSCORIDIS.

Locus.

Forma.



IN eodem agro, vidi plantam raram, Cynoglossi genus, & vt arbitror veram Lycopsin Dioscoridis, radice rubra, caule recto, bicubitali. Foliis multis, asperis, duris, Rubi modo, aut Sylvestris Cynoglossi scabris, propè radicem in orbem circumiectis & distentis, superiori parte caulis, non sic dispositis, sed hinc inde è caule prodeuntibus, & in summo & vertice acuminatis, furculis paruis, tenuibus, numerosis viginti, aut pluribus, nudis, folioq; nullo vestitis, vt in Echio. In horum summo, flores purpurei micant, exiles, extrinsecus minimè diuisi, intrinsecus verò in sex foliola dispartiti, vt in Sylvestri Bethonica.

MAVROVUM RHASVT, ET RVMIGI.



DESCRIPTEÆ Lycopsidi, vicina fuit planta rara, & nobis incognita, quam Incolæ Rhasvt & Rumigi nominant, odoris exiguï, sed haud quaquam grati. Ramulos habet albicantes, plerunque quatuor, aliquando plures, prope radicem, fili modo, valdè tenues. Folia circiter septem, vel octo, tenuia, mollia, cinerei coloris, ex aduerso bina, ab utraque parte sita & inuicem sibi obiecta, magnitudine, longitudine, & incisuris, florenti Filici similia, nisi quòd adnatas habent, ad exortum suum, Lacinias duas, velut auriculas quasdam rotundas, omnino folij principio coherentes & coniunctas, vt in Salvia minori. Quaparte, folia cauliculo adnexa sunt, exeunt flores Aristolochiæ similes, aliquanto maiores, colore magis fusco, & longiore pediculo subnixi. Radix longa, satis profundè demissa, gustu amara, vnde cognoscimus, eam siccare, & non nihil calfacere. Plantam hanc non in-

Forma.

commode ad Aristolochias referri posse existimo.

TRAGIVM ALTERVM DIOSCORIDIS,

Secudes & Sucodus Auicennæ.



CIRCA riuulos & aquosa loca, nōnunquam & in Montosis, frequē nascitur Tragium alterum Dioscoridis. Radice longa, tenui, candida, ex qua prodeunt lignosi tanquam surculi graciles, digito non longiores, à quibus conflurgunt folia multa simul longa, quæ rursus multis foliolis à latere vtrunque dispositis cinguntur, Saxifragiæ rubræ, Trichomanis modo, paulò longioribus. Cuiusmodi in Aspleno apparent, quæ lanuginosa, præsertim minora, quæ inter alia oriuntur. Flores huius Plantæ iam primum tum temporis incipiebant apparere, ita vt nondum potuerim illos exactè cognoscere. Flos violaceus & fuscus, oui figura stipatus, sui & peculiaris pediculi fastigio, euehitur. Incolæ hanc plantam Secudes appellant, quo nomine & Arabibus fuit cognita præsertim Auicennæ, cap. 679. qui facultatem illi astringentem attribuit, & Dysentericis vtilem esse tradit. Aliam

Locus.

Forma.

Vus.

tamen Plantam suprà descriptam, Secudes Arabum esse, quidam potius existimât.

Forma.



A DIVINGENDAM his Plantis duxi
raram Lilij albi speciem, & ima-
ginem, pingendam, quam Phar-
macopolæ ciuitatis Halepi, nar-
rant in locis aquosis prouenire. Caulis proce-
rus est, crassitie & colore Lilio nostro similis,
sed latior, præcipuè circa verticem, qua in par-
te, latitudinem, trium digitorum excedit.
Vndique quantum porrigitur emergunt, folia
tenuia, longiuscula, tenella, & quæ facile deci-
dant. In eius summo fastigio aliquot flores
candidi, nostratibus, similes visuntur. Hanc
Plantam, quidam esse volunt Lilium à Theo-
phrasto memoratum, lib. 4. cap. 9. Cæterum
de Stratiote aquatico Theophrasti, verba in-
telligenda sunt, cuius meminere, Athenæus
lib. 14. & Plinius cap. 15. lib. 24.

GARAB MAVRORVM.

Forma.



Vires.



C ARAB Maurorum, rarum & pe-
regrinum Salicis genus, è quo
Aphronitrum, Salem Petre vo-
cant optimum fit igniario pulue-
ri parando, quo in bellicis tormentis, pilis ex-
cutiendis vtuntur. Appicta Plâta rarum & exo-
ticum genus est Salicis. Incolæ apud quos na-
scitur, etiam nunc veteri Arabum nomine
Garab vocant. Hæ Arbores non multum se in
altum attollunt, sed humiliores huc illucque
diffundunt virgas crassiores, & firmiores, quàm
nostrarum Salicum, idèoque minus vegetas, &
ad ligaturas aptas, cortice luteo vtrumque pal-
lescente, quem & folia habent, quæ ad Palmum
longa, duos digitos lata, in ambitu serrata.
Attriplicis modo duos digitos longis, qua no-
ta ab aliis Salicibus differunt: modicè quod ob-
seruare potui, siccant & adstringunt folia. De
fructibus & floribus, (quorum Auicenna cap.
326. & cap. 686. meminit) quoniam ego, tum
temporis nec vidi, nec quicquam aliunde co-
gnoui, nil certi scribere possum.

TRIONVM THEOPHRASTI.



TN agris Planta rara gignitur, ob altitudinem facile spectabilis Sefamo non dissimilis, sed caule longiore & crassiore. Foliis superioribus circa extremum, in tres partes à sedistantes & separatas, fisis, quod in Sefami foliis Salici, longitudine & colore similibus, non conspicitur. Ex imo foliorum, eo quòd certis intervallis prodeunt, emergunt Flores, aspectu pulchri, foris, lutei coloris, cum rubentibus virgulis, intus verò, purpurei ad fulcra vergentes, in quorum medio extant parvi torulei, quibus post florum lapsum, vascula succedunt in modum siliquarum, longitudine ferè & crassitie digiti, extrinsecus aspera. & in summo acuminata, intrinsecus in quinque veluti loculos divisa: quibus continetur digestum semen omnino Pisum simile seminibus Maluæ, vel Ibisici, quod pro Abutilo Auicennæ habetur. Planta hæc ab illis, *Lubie Endygi*, id est, Indicus Phaseolus vocatur: ni fallor, puto esse Trionvm Theophrasti, cuius ille sæpe mentionem facit.

Forma.

Nomina

TEREBINTHVS INDICA, prior Theophrasti.



The officina pharmacopolarum, Terebinthi fructus passim venduntur gustu pistacii simili. Incolæ iis vescuntur ubique, ut nostri Germani Auellanis. Ego cum manderem, lenè falfedinem in iis cum mediocri siccitate, deprehendi. Arabes *Botin*, Persæ *Therbaick*, nominant. Horum duo sunt genera, magnitudine distincta, maiores quidem Arabes, ut differentiam indicent, *Botin quibir*, id est, magnos, minores, *Botin Sougier*, id est, paruos, appellant. Maiores, figura similes sunt nostris Pistaciis, mediocri magnitudine, non tamen sic longi ut Pistachia, sed globosi magis. Minorum ea est magnitudo, ut quæ Pisi habitioris, forma turbinata, ut Cordis, siue Milij Indici, quorum magnus est in Perside, Mesopotamia, & Armenia proventus. Quæ hos fructus profert Terebinthi, ubiuis hic nascuntur, folio, aliàs longo, ut in Terebintho nostrate, aliàs maiore & rotundiore, quale est Pistaciorum sequentis arboris depictæ, quibus folia sunt sub-

Nomina

Genera.c

Locus.

Forma.



longa, ut in Terebintho nostrate, non ut in Pistachiis rotunda: ita ut hæc primo intuitu, dignosci hisce possint.

RIBES ARABUM, cum suis Capreolis.

Locus. **N** editissimis locis montis Libani, præter Scottzoneram, luteo flore & Tulipam, sub flauis Ribes veram, ego quoque reperi, sed Autumno incommoda Plantis inuestigandis anni parte, sine flore, ac semine, duobus tantum foliis recenter enatis, asperis, rotundis, Petasiti similibus, pediculo quidem breui, subnixis, sed crassiusculo: radice satis longa, magna, dura, incurua, rugosa, colore fusca, saporis, odorisque ingrati. Gaudet humidis & opacis locis. E iuncea huius plantæ Capreolis, extrinsecus scabris, & ruvidis, supernè virentibus, infernè rubris, quod etiam tradit Serapio. Caulibus fructu & foliorum pediculis, succus acidulus exprimitur, vt ex nostratis Ribes vua & acinis, quo Rob Arabes parant, viris primariis, ac ditioribus, quod in magno pretio habetur.

TRAGACANTHÆ ALTERVM GENVS.

Locus. **D** IGRESSIS à monte Libano in descensu occurrerunt tria Tragacanthæ genera. Quorum primum, cuius doctissimus vir Carolus Clusius meminit, veræ videtur esse simillimū. Alterum illo quidem hamilius, forma tamen, aspectu & habitu, haud dissimile, nisi quod flores flauescunt, ex rotundis & subflauis, tanquam vasculis exeuntes, & per tenues surculos, vtrinque impari exortu, sint dispositi. Tertium est altitudine & statura simile secundo, ramos habet densos, oblongos colore, fusco in quorum vertice, capita multa subalba visuntur, qualia sunt Poterij cū floribus, purpureis & speciosis.

RIBES ARABVM,
cum suis Capreolis.TRAGACANTHÆ
alterum genus.

*MEDIUM DIOSCORIDIS, VEL
MINDIUM RHASIS.*

VLERIUS progrediendo, in locis obscuris, vmbrosis & opacis, *Locus.*
inter arbuta, vidimus Medium Dioscoridis, seu Mindium Rhasis,
in signi proceritate, Violæ Marianæ, Dodonæi, simile, foliis Planta-
ginis minoris, valde Laciniatis, à se inuicem multum separatis, flore *Forma.*
lato & amplo, purpureo, nonnihil albicante, foliolis octo reclusum & apertum,
cingentibus. Maturum semen videre & colligere, non licuit. Historiæ Dioscori-
dis prorsus hæc planta, conuenire videtur.

BACCHARIS DIOSCORIDIS.

PLANTA hæc, quam pro Bacchari Dioscoridis nos ostendimus, fru-
tcosa est, altitudine cubitali, foliis lanuginosis & albicantibus,
Verbasci modo, eo minoribus, quæ veluti exculta, sima sui parte,
sine pediculo, caulem amplectuntur, vt in Nicotiana siue Tabaca.
Flos in ima parte, & summis virgis nitet, purpureus, subalbicans, densus & valde *Forma.*
stipatus, qualis Elichrisi, vel auriculæ muris, seu Pilosellæ Fuchsi. Radicem effo-
dere non potui. Ea si Veratro similis est, & odorata, vt videtur esse, prout ex pau-
cis fibris in illa relictis apparet, veram Dioscoridis Baccharim esse iudicarem.

*MEDIUM DIOSCORIS
vel Mindium Rhasis.*



*BACCHARIS
Dioscoridis.*



GINGIDIVM DIOSCORIDIS.

Forma.



INGIDIVM illud nostrati haud ab simile est, sed folio fœniculi tenuiore, gustûque amariore, quàm sylvestris Pastinacæ nostratis, cui in cacumine umbella alba, & in medio purpureû quiddam apparet è quibus semen prodit, quod altera parte inter squamulas, quibus, quasi corolla circumdatum, extuberat forma rotunda Coriandri, minori tantum, quo maturescente, tota sese contrahit umbella, radix parua, candida. Ex his scilicet notis Gingidium Dioscor. esse ego censui.

MAVRORVM BELLAN, FORTASSE

Sanguisorba spinosa.

Locus.



RVTEX in decliui montis Libani parte nascens, furculis compluribus cubitalibus, foliis tenellis, longiusculis, in pediculis ordine ex aduerso positis, supernis utcunq; virentibus, infernè cinereis, nostræ Pimpinellæ, Sanguisorbæ similibus, cui hæc Planta, tam forma, quàm viribus, astringente namque & exsiccante, videtur admodum respondere. In summis ramulis eminent spinæ, è quibus aliæ deorsum, aliæ ad latus, quamplurimum autem sursum spectant. Ex iis tempore Veris præsertim eminentioribus, flosculi prodeunt, è viridi pallentes, stellati, quibus succedunt bacca albicantes, magnitudine Piperis, cum rubore non nihil conspersæ, racematim coherentes, vt in vuis

Forma.

Nomina


Ribes nostratis, quibus similes sunt. Bellan Incolæ nominant, quidâ Hippophaën Dioscor. esse existimant, sed, quod in multis descriptioni non responder, in Pimpinellæ, Sanguisorbæ species videtur recensenda.

GINGIDIVM,

Dioscoridis.


MAVRORVM BELLAN

fortasse Sanguisorba spinosa.



BEHMEN ABIAD ARABVM,

Id est, BEHEN ALBUM.



ELEGANS

genus Limonij.



D radices Libani, vmbroso solo & aquoso, gignitur verū Behen album Arabū, quod etiam hodie incolæ, Behmen Abiad vocant, vt Behen rubrum, Behmen Ackmar: ea planta, instante iam Hyeme, ferè interierat, multis ramulis & foliis exsiccatīs & arefactis, verūm alio loco, noui ramuli & surculi extiterunt, vt Ve: is tempore germinare solent. Folia, magna, longa, spissa, qualia Oxylapathi. In horum ima parte, folij Lacinia quatuor, ex aduerso binæ: at quæ ex caule superiori nascuntur, longitudine cubitali amplectuntur illum sine pediculo, vt in Perfoliata vulgari, & Smyrino Cretico. In caulis fastigio, surculi prominent, cum foliis minoribus, oblonga, flaua, squamosa capitula sustinentes, è quibus prodit flauus quoque flos. Radix longa, geniculata nullis capillata fibris, serpit instar Glycyrrhizæ, quā æmulatur & forma & crassitie, sed intus alba potius, quàm flaua. Quod autem scribit Aui-cenna huius Plantæ radices contrahi & corrugari, conspicitur id quidem, in crassis & inueteratis, non in gracilioribus, & nuper enatis.

Locus.

Tempus.

Forma.

ELEGANS GENVS

LIMONII.



N opacis & humidis locis nascitur elegans genus Limonij, decem aut duodecim foliis, Aspleno similibus. Radice oblonga, extrinsecus fusca, intus rubra, duobus aut tribus ramulis, inter folia exorientibus, cubitum altis, in quorum vertice multi surculi emicant, cum tribus foliis longis & tenuibus, quæ illos circumdant, flore purpureo aspectu pulcherrimo, flores & surculi siccandi vim habent. Eos mensis apponunt, incolæ pro acetariis, folia tantum.

Locus.

Forma.

Vires.

SCHEHA

SCHEHA ARABVM, ABSINTHII GENUS.

Locus,

Forma,



CIRCA Berhlechem prouenit, copiosum Absinthij genus, foliis cinereis, quale est nostratis: ramulis tenellis multis, in quorum vertice, semen copiosissimum est grauis odoris, qui nauseam moueat, etiam valde molestam, gustu acre, salsum, amarum. Hanc Plantam Arabes *Scheha* vocant. Semen huius minutissimum est, semen Zina, lumbricis necandis vtilissima: quamobrem semen contra vermes Mercatores, qui vendunt & emunt, nuncupant.



FINIS APPENDICIS.



INDEX APPENDICIS

HISTORIÆ GENERALIS
PLANTARVM.



Conitum Pardalianches primum.		Maceris Bracmenici facultates.	3
pag. 16.		Macer Dioscoridis.	ibid.
Ananas à Costæ.	12	Macer Galeni.	ibid.
Anemone, & eius genera.	26	Macis & Maceris discrimen.	4
Astragalus Dioscoridis, & eius genera.	ibid.	Maurorum Bellan siue Sanguisorba spinosa.	34
Auellana Indica à Costæ.	7	Medium Dioscoridis vel Mindiu Rhafis.	33
B		Melantzana, Arabum Melongena.	23
Balsamum Tolutanum.	17	Melantzana nigra, & eius genera.	ibidem
Baccharis Dioscoridis.	33	Morsani Syrorum.	25
Behmen abiad, siue album Arabum.	35	Musa à Costæ.	11
Betre Garcia ab horto.	13		
Brajsica Marine genus.	20	N	
C		Nardus Indica Garcia ab horto.	15
Canella à Costæ.	1	Nux Moschata à Costæ.	4
Carcapuli eiusdem.	13	P	
Caryophyllus eiusdem.	5	Palma Indica, qua & Elephantis, & eius	7
Chondrilla Dioscor. alterum genus.	27	genera.	
Chondrilla eiusdem aliud genus.	ibid.	Palma Indica nux Persis Narel & Nar-	ibidem
Chrysogonum eiusdem.	28	gel.	
Coccus Palma Indica cortex.	9	Piper nigrum à Costæ, & eius genera.	6
Conyza Syria.	20	Piperis ferendi modus.	ibidem
Crocus Indicus à Costæ.	11	Planta rara Platagini similis.	21
Cuciophera Matthioli.	8	Planta Lactaria.	22
Cyprus Grecorum.	22	Planta spinosa, Maurorum Alhagi.	24
F		R	
Ficus Indica à Costæ.	11	Radix China à Costæ.	10
Ficus Cypria, & eius genera.	21	Rhasus Maurorum vel Rumigi.	29
G		Ribes Arabum cum suis Capreolis.	32
Garab Maurorum.	30	S	
Gingidium Dioscoridis.	34	Safsaf Syrorum.	25
Guayanas.	17	Scheba Arabum, Absinthij genus.	36
K		Secacul Arabum, Pastinaca Syriaca: siue Si-	23
Kali Arabum primum genus.	19	seris species.	
Kali Arabum secundum genus.	20	T	
L		Tamarindus à Costæ.	9
Lilium album Syriacum.	30	Terebinthus Indica prior Theophrasti, & eius	32
Limoni elegans genus.	35	genera.	ibid.
Lycopsis Dioscoridis.	28	Tragacantha alterum genus.	29
M		Tragium alterum Dioscoridis.	31
Macer à Costæ.	2	Trionum Theophrasti.	
		F I N I S.	

LECTORI.

Nonnulli negligentia crimen pertimescentes sub librorum finem Errata subicere dubitant: ego autem aliam sequiui viam, malo delicta passim in his impressis admissa, Errata ipsi ad calcem annexis & representatis, libere ingenuèque profiteri, quam hesitantem, suspensam, & incroribus perquirendis solitum tenere Lectorem, utq; facilius exactiusque, suo loco & tempore, mendaque emendare & corrigere possit. Vale.

ERRATA PRIMAE PARTIS.


Prior numerus paginam, posterior lineam indicat.

Repone, procul. pag. 30. lin. 4.	Scillæ. ibid. 26	coqui debet. ibid. 26	seruarius & imphobus. 408. 37. & 38	alas. 816. 45
Gallis. 31. 48	luphis nō filiquata. 86. 7	partij modo striatos. 171. 14	Phœnix folia. 416. 18	& multis. 821. 1
corbæj ex ea. ac. 31. 30	iulus. ibid. 14	Cientibus. 173. 37	417. 12	conflant. 866. 9
Sabin vocat. Gallie. 36. 9	Acheronte. ibid. 16	Camass. ritum. 175. 16	418. 14	aut Delphinium. 866. 9
Cedria itaque. 38. 9	iuli, bis. ibid. 23 & 28	Hispanico spatio. 177. 38	419. 15	Urticulis. 869. in lēm.
lyce alterum redundat. ibid. 45	Ruellij. 87. ult.	flor. femine. ibid. 44	420. 16	Erythrodanō. 870. 3
repullulat. 43. 31	Porrō semen tum Refi- na. 88. 43	421. 17	421. 16	422. 16
Boëmis. ibid. 41	422. 17	422. 17	422. 16	423. 16
Boëmia. 44. 2	423. 17	423. 17	423. 16	424. 16
424. 2	424. 17	424. 17	424. 16	425. 16
425. 2	425. 17	425. 17	425. 16	426. 16
426. 2	426. 17	426. 17	426. 16	427. 16
427. 2	427. 17	427. 17	427. 16	428. 16
428. 2	428. 17	428. 17	428. 16	429. 16
429. 2	429. 17	429. 17	429. 16	430. 16
430. 2	430. 17	430. 17	430. 16	431. 16
431. 2	431. 17	431. 17	431. 16	432. 16
432. 2	432. 17	432. 17	432. 16	433. 16
433. 2	433. 17	433. 17	433. 16	434. 16
434. 2	434. 17	434. 17	434. 16	435. 16
435. 2	435. 17	435. 17	435. 16	436. 16
436. 2	436. 17	436. 17	436. 16	437. 16
437. 2	437. 17	437. 17	437. 16	438. 16
438. 2	438. 17	438. 17	438. 16	439. 16
439. 2	439. 17	439. 17	439. 16	440. 16
440. 2	440. 17	440. 17	440. 16	441. 16
441. 2	441. 17	441. 17	441. 16	442. 16
442. 2	442. 17	442. 17	442. 16	443. 16
443. 2	443. 17	443. 17	443. 16	444. 16
444. 2	444. 17	444. 17	444. 16	445. 16
445. 2	445. 17	445. 17	445. 16	446. 16
446. 2	446. 17	446. 17	446. 16	447. 16
447. 2	447. 17	447. 17	447. 16	448. 16
448. 2	448. 17	448. 17	448. 16	449. 16
449. 2	449. 17	449. 17	449. 16	450. 16
450. 2	450. 17	450. 17	450. 16	451. 16
451. 2	451. 17	451. 17	451. 16	452. 16
452. 2	452. 17	452. 17	452. 16	453. 16
453. 2	453. 17	453. 17	453. 16	454. 16
454. 2	454. 17	454. 17	454. 16	455. 16
455. 2	455. 17	455. 17	455. 16	456. 16
456. 2	456. 17	456. 17	456. 16	457. 16
457. 2	457. 17	457. 17	457. 16	458. 16
458. 2	458. 17	458. 17	458. 16	459. 16
459. 2	459. 17	459. 17	459. 16	460. 16
460. 2	460. 17	460. 17	460. 16	461. 16
461. 2	461. 17	461. 17	461. 16	462. 16
462. 2	462. 17	462. 17	462. 16	463. 16
463. 2	463. 17	463. 17	463. 16	464. 16
464. 2	464. 17	464. 17	464. 16	465. 16
465. 2	465. 17	465. 17	465. 16	466. 16
466. 2	466. 17	466. 17	466. 16	467. 16
467. 2	467. 17	467. 17	467. 16	468. 16
468. 2	468. 17	468. 17	468. 16	469. 16
469. 2	469. 17	469. 17	469. 16	470. 16
470. 2	470. 17	470. 17	470. 16	471. 16
471. 2	471. 17	471. 17	471. 16	472. 16
472. 2	472. 17	472. 17	472. 16	473. 16
473. 2	473. 17	473. 17	473. 16	474. 16
474. 2	474. 17	474. 17	474. 16	475. 16
475. 2	475. 17	475. 17	475. 16	476. 16
476. 2	476. 17	476. 17	476. 16	477. 16
477. 2	477. 17	477. 17	477. 16	478. 16
478. 2	478. 17	478. 17	478. 16	479. 16
479. 2	479. 17	479. 17	479. 16	480. 16
480. 2	480. 17	480. 17	480. 16	481. 16
481. 2	481. 17	481. 17	481. 16	482. 16
482. 2	482. 17	482. 17	482. 16	483. 16
483. 2	483. 17	483. 17	483. 16	484. 16
484. 2	484. 17	484. 17	484. 16	485. 16
485. 2	485. 17	485. 17	485. 16	486. 16
486. 2	486. 17	486. 17	486. 16	487. 16
487. 2	487. 17	487. 17	487. 16	488. 16
488. 2	488. 17	488. 17	488. 16	489. 16
489. 2	489. 17	489. 17	489. 16	490. 16
490. 2	490. 17	490. 17	490. 16	491. 16
491. 2	491. 17	491. 17	491. 16	492. 16
492. 2	492. 17	492. 17	492. 16	493. 16
493. 2	493. 17	493. 17	493. 16	494. 16
494. 2	494. 17	494. 17	494. 16	495. 16
495. 2	495. 17	495. 17	495. 16	496. 16
496. 2	496. 17	496. 17	496. 16	497. 16
497. 2	497. 17	497. 17	497. 16	498. 16
498. 2	498. 17	498. 17	498. 16	499. 16
499. 2	499. 17	499. 17	499. 16	500. 16
500. 2	500. 17	500. 17	500. 16	501. 16
501. 2	501. 17	501. 17	501. 16	502. 16
502. 2	502. 17	502. 17	502. 16	503. 16
503. 2	503. 17	503. 17	503. 16	504. 16
504. 2	504. 17	504. 17	504. 16	505. 16
505. 2	505. 17	505. 17	505. 16	506. 16
506. 2	506. 17	506. 17	506. 16	507. 16
507. 2	507. 17	507. 17	507. 16	508. 16
508. 2	508. 17	508. 17	508. 16	509. 16
509. 2	509. 17	509. 17	509. 16	510. 16
510. 2	510. 17	510. 17	510. 16	511. 16
511. 2	511. 17	511. 17	511. 16	512. 16
512. 2	512. 17	512. 17	512. 16	513. 16
513. 2	513. 17	513. 17	513. 16	514. 16
514. 2	514. 17	514. 17	514. 16	515. 16
515. 2	515. 17	515. 17	515. 16	516. 16
516. 2	516. 17	516. 17	516. 16	517. 16
517. 2	517. 17	517. 17	517. 16	518. 16
518. 2	518. 17	518. 17	518. 16	519. 16
519. 2	519. 17	519. 17	519. 16	520. 16
520. 2	520. 17	520. 17	520. 16	521. 16
521. 2	521. 17	521. 17	521. 16	522. 16
522. 2	522. 17	522. 17	522. 16	523. 16
523. 2	523. 17	523. 17	523. 16	524. 16
524. 2	524. 17	524. 17	524. 16	525. 16
525. 2	525. 17	525. 17	525. 16	526. 16
526. 2	526. 17	526. 17	526. 16	527. 16
527. 2	527. 17	527. 17	527. 16	528. 16
528. 2	528. 17	528. 17	528. 16	529. 16
529. 2	529. 17	529. 17	529. 16	530. 16
530. 2	530. 17	530. 17	530. 16	531. 16
531. 2	531. 17	531. 17	531. 16	532. 16
532. 2	532. 17	532. 17	532. 16	533. 16
533. 2	533. 17	533. 17	533. 16	534. 16
534. 2	534. 17	534. 17	534. 16	535. 16
535. 2	535. 17	535. 17	535. 16	536. 16
536. 2	536. 17	536. 17	536. 16	537. 16
537. 2	537. 17	537. 17	537. 16	538. 16
538. 2	538. 17	538. 17	538. 16	539. 16
539. 2	539. 17	539. 17	539. 16	540. 16
540. 2	540. 17	540. 17	540. 16	541. 16
541. 2	541. 17	541. 17	541. 16	542. 16
542. 2	542. 17	542. 17	542. 16	543. 16
543. 2	543. 17	543. 17	543. 16	544. 16
544. 2	544. 17	544. 17	544. 16	545. 16
545. 2	545. 17	545. 17	545. 16	546. 16
546. 2	546. 17	546. 17	546. 16	547. 16
547. 2	547. 17	547. 17	547. 16	548. 16
548. 2	548. 17	548. 17	548. 16	549. 16
549. 2	549. 17	549. 17	549. 16	550. 16
550. 2	550. 17	550. 17	550. 16	551. 16
551. 2	551. 17	551. 17	551. 16	552. 16
552. 2	552. 17	552. 17	552. 16	553. 16
553. 2	553. 17	553. 17	553. 16	554. 16
554. 2	554. 17	554. 17	554. 16	555. 16
555. 2	555. 17	555. 17	555. 16	556. 16
556. 2	556. 17	556. 17	556. 16	557. 16
557. 2	557. 17	557. 17	557. 16	558. 16
558. 2	558. 17	558. 17	558. 16	559. 16
559. 2	559. 17	559. 17	559. 16	560. 16
560. 2	560. 17	560. 17	560. 16	561. 16
561. 2	561. 17	561. 17	561. 16	562. 16
562. 2	562. 17	562. 17	562. 16	563. 16
563. 2	563. 17	563. 17	563. 16	564. 16
564. 2	564. 17	564. 17	564. 16	565. 16
565. 2	565. 17	565. 17	565. 16	566. 16
566. 2	566. 17	566. 17	566. 16	567. 16
567. 2	567. 17	567. 17	567. 16	568. 16
568. 2	568. 17	568. 17	568. 16	569. 16
569. 2	569. 17	569. 17	569. 16	570. 16
570. 2	570. 17	570. 17	570. 16	571. 16
571. 2	571. 17	571. 17	571. 16	572. 16
572. 2	572. 17	572. 17	572. 16	573. 16
573. 2	573. 17	573. 17	573. 16	574. 16
574. 2	574. 17	574. 17	574. 16	575. 16
575. 2	575. 17	575. 17	575. 16	576. 16
576. 2	576. 17	576. 17	576. 16	577. 16
577. 2	577. 17	577. 17	577. 16	578. 16
578. 2	578. 17	578. 17	578. 16	579. 16
579. 2	579. 17	579. 17	579. 16	580. 16
580. 2	580. 17	580. 17	580. 16	581. 16
581. 2	581. 17	581. 17	581. 16	582. 16
582. 2	582. 17	582. 17	582. 16	583. 16
583. 2	583. 17	583. 17	583. 16	584. 16
584. 2	584. 17	584. 17	584. 16	585. 16
585. 2	585. 17	585. 17	585. 16	586. 16
586. 2	586. 17	586. 17	586. 16	587. 16
587. 2	587. 17	587. 17	587. 16	588. 16
588. 2	588. 17	588. 17	588. 16	589. 16
589. 2	589. 17	589. 17	589. 16	590. 16
590. 2	590. 17	590. 17	590. 16	591. 16
591. 2	591. 17	591. 17	591. 16	592. 16
592. 2	592. 17	592. 17	592. 16	593. 16
593. 2	593. 17	593. 17	593. 16	594. 16
594. 2	594. 1			

Prior numerus paginam, posterior lineam indicat.

F I N I S.









720th

21.
0

